





إدوار غَالِب المَوْسُوعَة

٢٤٢٠ صفحة • ٣١٤٦٤ ضافة

٦٩٦٢ رسماً • ٢٤ لوحة ملونة


في عُلُوم الطَّبِيعَة


تبحثُ في الزراعةِ والنباتِ والحَيوانِ والجيولوجيا



دارالمشرق بيروت



 منشورات ،
دار المنشورات ش.م.م
ص.ب. ٩٤٦ - بيروت ، لبنان

 التوزيع ،
المكتبة الشرقية - ساعة الجمعة
ص.ب. ١٩٨٦ - بيروت ، لبنان

الموسوعة في علوم الطبيعة

الرسوم :

جورج ديب

جورج غنتوس

جان قريطاري

جهاد جبر

سليم غصن

المصدرة : ISBN 2-7214-2148-4

المجلد الثالث : ISBN 2-7214-2151-4

يحتوي هذا المجلد من

الرسوم :

١٠١٠٤ مواد

٢٠٧٧ رسمة

٨ لوحات ملونة

الأوزان غالب

مهندس زراعي


الموسوعة في علوم الطبيعة

تبحث في الزراعة والنبات والحيوان والطير والسمك والحشرات والفطور
وأجلاشيم والأراض الحيوانية والنباتية والمصطلحات العلمية على اختلافها
أخصها الفيزياء والكيمياء والرياضة والجولوجية والطبيعة والجغرافيا
وتألف من أربعة مجلدات يمتد على مسارد المصطلحات باللغات :
الألمانية ، الإنكليزية ، الإيطالية ، الفرنسية ، اللاتينية ، واليونانية

طبعة ثانية محدثة

المجلد الثالث

من القاف إلى الياء



ق

٢١٣٧٠ - قابيل الإثلاق Fissile, Fissile (F).
Fissile (E).

نعت تعريفي يطلق على ما كان يحمل في تكوينه ميزة الانفلاق .

٢١٣٧١ - قابيل الانهضام Digestible (F).
ما كان حاضه هيناً كادراً .

٢١٣٧٢ - قابيل التمثيل Assimilable (F).
هو السائغ من الغذاء .

٢١٣٧٣ - قابيل القسمة Divisible (F).
هو ما كان مقدور القسمة .

٢١٣٧٤ - قابلية استععداد Aptitude (F).
Taste (E). ميل طبيعي أو آفتابي نحو شيء معين .

٢١٣٧٥ - قابلية الإنطال Annulabilité, Nullité (F).
Nullité (E). هو انتقاص عقد بسبب فقدان أحد الشروط الجهرية أو الشكلية اللازمة لصحته .

٢١٣٧٦ - قابلية الاختيذاء Faculté nutritive (F).
Nutritive faculty (E). هي المقدور الغذائي .

٢١٣٧٧ - قابلية الانتاش Faculté germinative (F).
Germinative faculty (E). هي المقدار النسبي إلى ما ينتش من عدد بزور معين . فإذا

تنتش سبعون برة من أصل مائة برة يقال إن قابلية الانتاش في تلك البزور هي سبعون من المئة .

٢١٣٦١ - قباب ، قيب Rayon (F). Radius (E).
نصف قطر الدائرة .

٢١٣٦٢ - قباب Troisième année (F).
القباب اسم السنة الثالثة بعد الحاضرة . يقال أنك لا تستغل أرضك لا العام ولا القابل ولا القباب .

٢١٣٦٣ - قبابه Couvi (F).
القابة والقابية : بيضة الطير المحفوظة .

٢١٣٦٤ - قاييس Récepteur (F). Receiving (E).
كل جهاز قابل أو آخذ كما في التلفزيون .

٢١٣٦٥ - قابض ، عَقُول Astringent
القابض من الطوم ما ينقبض اللسان منه . والقابض من الادوية ما يحبس الفضلات المنتمية من المعدة .

٢١٣٦٦ - قابض ، مُقَلِّص Contractif (F).
Contractive (E). ما يجمع اجزاء العضو ويكثفه .

٢١٣٦٧ - قابض ، مُكْسِم Accipiens (F).
هو من يقبض المفقود عليه أو الملكية .

٢١٣٦٨ - قابضات الأسنان Pleurodonte (F).
Pleurodontes (E).

نعت تعريفي توصف به العظام من ذوات الأسنان القابضة المرتزة في الحالة الداخلية من الفك . يقابلها شاربقات الأسنان .

٢١٣٦٩ - قابيل An prochain (F). Next year (E).
اسم لعام المقبل بعد العام الحاضر .

21392 - قادمة Rémlge primaire, Flèche (F).
Wing primary (E).
ريشة من إرياش مقدم الجناح. ج قوام. والأشعار
والعواشر هي القوام.

21393 - قادوس Trémie (F), Hopper (E).
هو حين الطاحون. ثقب أو فرجة أو شق يلقى الحب
الذي يمر به شيئاً خفيفاً.

21394 - قاديوس Albatros
طائر بحري كبير اللد مشهور باسم قطرس، أطلية.

21395 - قار Asphalt (F), Asphalt (E).
هو الزفت أو الأسفلت، نوع من الحجر المنسج الاسود
الجامع. يستعمل في ترصيف الطرقات.

21396 - قار Caryat (F), Hickory (E).
جنس أشجار حرجية وزراعية من فصيلة الجوزيات.
أنواعه عديدة أصنافها البلاد الحارة. جميعها كبيرة اللد،
دائمة. أوراقها مركبة، عابلة. أزهارها الأكرية أبوية
الارتكاز، سلبية التجميع، دقيقة متدلية. أزهارها
الانثوية طرفية الارتكاز، ثلاثية التجميع. ثمارها جزوية،
جامدة الغلاف، رباعية الفلق || أحرف أنوعه
وأشهرها ما يقع.

21397 - قارة المتالع Caryat aquatica (S).
Caryer des marais (F), Swamp hickory (E).
Sumphoricarbaum (D), Caria palustre (I).
نوع من القار ثمرته كبيرة اللد فاشرة تملو من ٢٥ إلى
٣٠ م. وريقاتها كبيرة اللد وثرية التجميع براوح
مدعها بين ٩ و ١٣. نصلها أحليسي الشكل ذات الزام
الاخير وهو بارز العروق سنن الحافة || ثمارها بيضية
مقطعة عادمة الجناح.

21398 - قارة بيضاء، قارة بيضية Caryat alba, C. ovata (S). Caryer blanc (F). White
hickory (E).
نوع من القار ثمرته سبروتية تملو من ١٥ إلى ٢٠ م.
براعمها متراكبة الحراشف الجذوية اللون. أوراقها كبيرة
اللدة. وريقاتها سنانية النصل تطول نحو ٢٠ سم. تعرض
نحو ٨ سم. || ثمارها بيضية، لوزها صلب اللدة،
مستحب العلم.

21399 - قارة زيتونية Caryat pican, C. olivaeformis (S). Caryer picanier,
Noyer pican (F). Pecan-nut tree (E). Pekanaum (D).
Caria (I).
نوع من القار ثمرته كبيرة اللدة فاشرة تملو من ٢٥ إلى
٥٠ م. براعمها عادمة الحراشف. أوراقها كبيرة اللدة.
وريقاتها وثرية التجميع براوح مدعها بين ١١ و ١٧
م. وهي أحليجية الشكل متعة، نصلها يطول من ٨ إلى
١٥ سم. ويعرض من ٣ إلى ٦ سم. وهو سنن الحافة
مزغير العروق. ثمارها بيضية الشكل مقطعة للعقب
تطول من ٣ إلى ٤ سم. قشرة الثمرة تنلق عنه الإدراك
عن لوزات زيتونية الشكل لباها أبيض اللون مستحب
العلم والتكهة.

21398 - قابلية التصرف، قابلية التملك Aliénabilité (F), Alienability (E).
صفة قانونية عاتقة بما يمكن نقل ملكيته بموس أو بلا
عوض.

21399 - قابلية النقل، قابلية العزل Amovibilité (F), Removability (E).
تقال عن موظف يجوز نقله أو استبدال وظيفته أو عزله
بقرار.

21400 - قابلية الانهضام Digestibilité (F).
Digestibility (E).
مقدور الشيء حل الانهضام. وهو ما يسبب فوارق
الانهضام في الأغذية.

21401 - قابليق Kapoquier (F).
هو الكايوك، أطلية.

21402 - قات *، شاي العرب، حرايبها كولة Catha edulis, Celastus edulis (S). Célastre comestible, Catha comestible, Gaz (F). Cafsa, Khâs, Kât, Arabian tea plant (E). Kasplianze (D). Catha (I).
نوع من الحرايبة وهي جنبة برية وزراعية من فصيلة
القاتيات. ساقها فريدا تملو نحو ٣ أمتار. أوراقها متعة،
مقابلة، أحليجية النصل، يقال أنها طيبة. أزهارها
صفوية، طرفية الارتكاز، خضراء اللون، صفراء الملوحة،
خاصية النصل والبتلات والاسدية. ثمارها دقيقة مستديرة
حازرة الطعم مأكولة || زرع في اليمن وأحليجة حيث
يعقرون أوراقها الثنية المهنفة ويستخرجون من تقطير
ثمارها مشروب كحولي شديد الوقع على الأعصاب.

21403 - قاتل أبيض Arbousier (F).
هو القسطب، أطلية.

21404 - قاتل أخيه Orchis (F).
هو السحلب، أطلية.

21405 - قاتل البق Cimicaire (F).
هو الأبق المنقودية، أطلية.

21406 - قاتل البقر Cigu des marais (F).
هو الشوكران الألم، أطلية.

21407 - قاتل الحشرات، حاشو Insecticide
كل مادة تصلح لقتل الحشرات.

21408 - قاتل الكتكب Colichque d'automne (F).
هو سورجان الحريف، أطلية.

21409 - قاتل التيس Aconit napai (F).
هو الاكوينت أرمي، أطلية.

21410 - قاتليات Celastraceae (S).
Celastracées (F). Celastraceae (E).
هي الحرايبات فصيلة نباتية من ذوات الفلتين. أشهر
اجناسها الحرايبة وبها القات.

21411 - قاحل Asperme (F), Asperme (E).
القاحل من النبات العادم البذور.



قات



.....



قارة زيتونية (الباز)

اصطحابها منظم اقالم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي. تعتبر من اسماك سطح اليم والمسابح الهيداعية || جسدها وشي الشكل، يطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ويوزن من ٤ الى ١٢ كيلو. ثوبها الى الصهبة الفضية يسمر عند الظهر ويميلو تبيج يستدير اسود في الظهر وفي الجانبين. رأسها مستدل الجرم، مخروطي الحطم. ذنباها رجب الانفراج. فكها متادلان. اسنانها صغيرة، ذرية. عيناها كبيرتان، جاسطتان. زعانفها الظهرية الى الحمرة، الصدرية صفراء اللون والخصوية كذلك. زعنفتها الشرجية حمراء. اما الذيلية فسوداء وعلاية التقدير || لحمها فاخر الصنف، مرغوب فيه.

٢١٤١٠ - قارون (F). Acore
نبات جنسوري عطر يقال له حيد الوج. اطلبه.

٢١٤١١ - قاري، كودكي (F). Continental
هو ما يمت الى قارة، كتوك مخاخ قاري او كودي.

٢١٤١٢ - قاريّة (F). Rollier
هي الشقراق. قال فيها الجاحظ والكسائي: طائر اخضر الظهور، اسود المنقار الطويل، قصير الرجلين، اضم من الخلفات. ج. قواري.

٢١٤١٣ - قاريط (F). Graine de tamarin
حب التمر الهندي.

٢١٤١٤ - قارب، برماني (F). Amphibie
Amphibious, Amphibian (E).
كل حيوان مسكنه الماء لكنه يستطيع الخروج منه بعض الوقت كالقطة وفرس البحر والتساحل الخ.

٢١٤١٥ - قاس، قدار، متمر، ذرع، مسح، صاع، كمال (F). Mesurer
To measure (E).
اغذ قياس مختلف ويؤد الشيء لمعركة مقداره. كقياس الطول والعرض لمعركة المساحة وقياس الطول والعرض والارتفاع لمعركة الحزم.

٢١٤١٦ - قاسح (F). Exertile
نعت تعريفي يوصف به الحشو المقابل الانتشار ان في الحيوان او في النبات.

٢١٤١٧ - قاسم، مفسوم عليه (F). Diviseur
Divisor (E).
٢١٤١٨ - قاسم مشترك (F). Diviseur commun
Common divisor (E).

٢١٤١٩ - قاسيات الجلد (F). Sclérodermes
قاسيات الجلد أو متصلبات الجلد. مرتبة من الاسماك للمحومات الفكوك.

٢١٤٢٠ - قاشرة (F). Oculée
نعت تعريفي توصف به البلطة الشبيهة بالعين.

٢١٤٢١ - قاصير (F). Mineur
Minor (E).
هو الذي لم يبلغ الحادية والنشرين من عمره فهو حديم أهلية الاداء الا في حالات فيها القانون.

٢١٤٢٢ - قاصوصة (F). Siève
Hamper (E).
جونة من القصب او القصب.

٢١٤٠٠ - قارة قطنيّة (F). Carya tomentosa (S).
Caryer cotonneux (F).

نوع من القار شجرته تملو من ٢٠ الى ٢٥ م. براعمها متراكبة الحراشف الجروية اللون. اوراقها متوسطة الكبر. وريقاتها سباعية او تساعية التركيب، جميعها لاطئة، نصلها خل الصمغة السفل. ثمارها صغيرة اللد، لوزها سكري العلم المستحب.

٢١٤٠١ - قارة مرّة، قارة قطنيّة (F). Carya cordiformis, C. amara (S). Caryer amer (F).

نوع من القار شجرته سبروتية تملو من ٢٠ الى ٣٠ م. براعمها عادمة الحراشف صفراء اللون. اوراقها طول من ٣٠ الى ٤٠ سم. وريقاتها وترية التجميع، عدها براوح بين ٧ و ٩ نصلها يطول نحو ١٦ سم. ويرعى ٣ سم. لونه الى الخضار الزاهي، حناره منشاري التفرغ. ثمارها مكورة، جامدة الغلاف، مجنحة القعب. لوزها قلبي الشكل مر العلم، قلوي المادة.

٢١٤٠٢ - قارح (F). Coin
Corner tooth (E).
سنّ قاطعة تن الرابية. وما عند الخيل قارحان في كل فك || ترتيب اسنان الخيل يتنق بالثلاثيا ثلثيا الرباعيات ثم القوارح.

٢١٤٠٣ - قارح (F). Cniquier
هو البندق الهندي، اطلبه.

٢١٤٠٤ - قارص (F).
هو الهرم نبات طلي من الففليات، اطلبه.

٢١٤٠٥ - قارص، قاصم (F). Rongeur
Rodent (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان ينتمي الى رتبة القواضم.

٢١٤٠٦ - قاروص، قارودي (F). Acaratoxique, Acaricide (F). Acaricide (E).

نعت تعريفي يطلق على كل مادة تستعمل لقضاء على القرواد والحلم.

٢١٤٠٧ - قارورة (F). Ballon en verre (F).
Glass receiver (E).
آنية زجاجية لاقياس الحزم والسعة تستعمل في اختبرات.

٢١٤٠٨ - قاروس، قاروس (S). Morone labrax (S).
Bar, Loup, Loubine (F). Sea bass (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الفرشيات. انواعه المعروفة ٧ اصنافها مياه المتوسط والاطلسي. جميعها كبيرة القد نحو ١٢ كيلو. اثنائها الى الصهبة الفضية المالحج يطولها في بعض الانواع تبيج اسمر مستدير || وهي تألف الشواطئ الصخرية. قوتها الاسماك الصغيرة والقشريات. تغلق خور الانهر وتترغل صعدا في طلب المراس وقد يكون ذلك في الشتاء قنصرا وتعود الى البحر في الربيع || وهي من الاسماك لماكولة لحمها لذية العلم مرغوب فيه.

٢١٤٠٩ - قاروس مبدول، قاروس مبدول (S). Labrax lupus (S).
Bar commun, Loup de la Méditerranée, Loubine vulgaire (F). Common sea bass (E).

نوع من القاروس. سمكة بحرية بيوض من فصيلة الفرشيات.



قاروس



قاروس مبدول

وتعرض من ٣ الى ٥ سم. نصلها جاهد الصفحة ، بحري
الون شذلي القصة الصلبة الناعمة . ازهارها خافتة العرف.
ثمراها كرزوية || يستخرج من ساقها عصارة صمغية حرا
الون شاذلة الاستعمال .

٢١٤٣١ - قاطِر عَطِير
Dracena fragrans (S).
Dragonier balsmique, D. odorant (F).
شجرة زينة تلو من ٣ الى ٦ امتار . اوراقها سائية
الشكل تلو نحو ١٠٠سم. نصلها اسمن المنسفة . فسقي
الحصار اللامع . ازهارها فواحة العرف الطري . ثمراها
كرزية ارجوانية الون || زرع في المراكم والمصاردي
ترغب في الارية الدبالية .

٢١٤٣٢ - قاطِع
Interruptif (F). Interruptive (E).
عمل قانوني يعطل مفعول عمل آخر .

٢١٤٣٣ - قاطِع
Interrupteur (F).
اداء يقطع بها التيار الكهربائي .

٢١٤٣٤ - قاطِع
Sécante (F). Secant (E).
خط مستقيم يقطع الدائرة .

٢١٤٣٥ - قاطِع ، حَكَم
Péremptoire (F).
نعت الحكم القيسل الذي لا يقبل الجدل .

٢١٤٣٦ - قاطِع التَّعَام
Cosécante (F).
Cosecant (E).

٢١٤٣٧ - قاطِع التَّزَوُّج ، حَكِيم الدِّم
Hémostatique (F). Haemostatic (E).
كل دواء يقطع النزف او السيلان .

٢١٤٣٨ - قاطِع
Inclive (F). Inclisor (E).
في اسدى الاسنان الامامية في كل من الفكين . والقرطع
عد الخيل مثلاً ست اسنان : ثلثان ورباعيتان وقرطعان .

٢١٤٣٩ - قاطِب مَوْشَع
Anthrribus nebulosis (S). Anthrribu nébuleux (F).
Anthrribus nebulosis (E).

حشرة وائمة قانصة وأخمة من فصيلة القاطوبيات ودية
مفصلات الاجنحة . موطنها بعض اقالي حوض البحر
الايض المتوسط . تألف ارجاج الصنوبر . غنائها
واشمة تعيش على اثمار النباتات البرية تقضم البلات
والكلوس والمأبر . يرقاتها قانصة تعيش على ما تفرمه
من البرقات الخاشية التي تفرم الصنوبر والشرين ||
جسمها صغير لثقة يطول من ٢ الى ٤ سم. ثوبا الى
الواد الفصحي يملوه خل اشهب ينمكس عليه النور
فيكو كانه موشع . رأسها محدد الجرم ، قصير الخيط .
عينها كبيرتان . زياناها خطياني . فكاهما ذرياني
غدها شديتنا الصلبة ، شخاضتا المنكيز . ارساغها
ثلالية المقل || الانثى اكبر قدماً من الذكر وأهت فوياً
مه واقصر زياناً || لها جيل واحد في الجيل . تظهر
الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اوائل الصيف .
تسرح في النهار وتبيت في الليل تحت قشور الصنوبر ||
الطور البري يستمر نحو ٣٦ اسبوعاً . واليرقة عند ادراكها
الكامل الجسدي تلو نحو ٦ م. جسمها وشي الشكل ،
مستطيل القدم ، مستقيم الخصر . ثوبا الى الخيطي
الاصفر المواج . رأسها ورواجها ويدها وشرجها الى
الصورة || طود الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع



قَط امود



قَطِر

٢١٤٣٣ - قاضِم
Rongeur (F).
هو القارض ، آكله .

٢١٤٣٤ - قاضِي ، حَاصِم
Ester en justice, Agir en justice

٢١٤٣٥ - قاضي الجبل
Agame (F).
هو الحرفون ، آكله ومنه الارزق والاخر .

٢١٤٣٦ - قاط
Elacates (S).
Elacate (F). Elacate (E).

الاسم العلمي والفرنسي والانكليزي من العربي القاط .
جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسقمريات شالكتات
الزعانف . انواعه المعروفة قليلة العدد . اصلها من
البلاد الحارة || اجسامها مستطيلة وشية الشكل . رؤوسها
اسطوانية ذلقة . اشداها كبيرة . عينها صغيرة ، ماصحة
زعانفها الظهرية تمتد من اواسط الظهر الى مؤخره متقدمه
بعض المتناقص الحادة . زعانفها البالية مقعرة || لحويها
متوسطة الصنت ، مأكولة .

٢١٤٣٧ - قَط أسود *
Elacates nigricans (S).
Elacate noir (F). Black elacate (E).

نوع من القاط . سمكة بحرية بيوض . اصلها البحر
الاحمر والمحيط الهندي || جسمها وشي الشكل يطول من
٨٠ الى ١٠٠ سم. ثوبا الى السمرة السوداء . يملوها غطوط
قضية ، قاطية ، مستعرضة || رأسها مستدل الجرم ، ذلق
الخيط . فكها الاسفل يتقدم الاعلى بعض الشيء . شفتها
رصب الانفراج . عينها مستديرتان صغيرتان ، ماصحتان .
زعانفها الظهرية مستطيلة تقطعها ثمانية مناسخ حادة .
زعانفها الشرسية تقابل الظهرية . وتمثلها شكلاً . زعنفتها
البالية مقعرة الطرف || جسمها متوسط الصنت ، مأكول .

٢١٤٣٨ - قاطِر * ، دَم الشَّيْن ، دَم الشَّعْبَان
Dracena (S). Dragonier (F). Dragon tree (E).

جنس الشجار ونبات برية وزينة من سبط الحلويتيات
وفصيلة الزنبقيات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ اصلها البلاد
الاستوائية جميعها بطيئة النمو مديدة العمر . بعضها يشبه
الشغل . اوراقها طرفية الاذنكاز يكثر فيها الشكل السني .
ازهارها عذوكلية التصعب ، ثاجية الاذنكاز ، يضاء الون .
ثمراها كرزوية اللد والشكل ، ورقاقية الون اوجراء .
من خصائصها انها لا ترعر قبل بلوغ ٢٥ سنة من العمر .
يستخرج من سوق بطن اوراقها عصارة صمغية حرا
تتحول بعد تجفيفها وصحتها الى دقيق احمر الون كبير
الاستعمال الصمغي || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢١٤٣٩ - قاطِر اَرْجَوَانِي
Dracena terminalis (S). Dragonier pourpre (F).

جنية زينة صغرة القل ، مشدودة ، بطيئة النمو ، ليفة
الجلد . اوراقها سيفية الشكل مستطيلة . نصلها اسمن
الصمغ ارجواني الون || منبتها الصين . زرع في المراكم
ترغب في الارية الدبالية .

٢١٤٤٠ - قاطِر حَيَّار ، دَم الاخوين
Dracena draco, Pleomele draco (S). Dragonier

sang-draco, D. gigantesque, Sang-draco (F).
Dragon's-blood tree (E). Drackenbaum, Blutbaum
(D). Dragone, Dragoncello, Sanguie di drago (I).
شجرة اريقية جبارة تلو نحو ٢٠ م. قطر جلعها يبلغ
٤ امتار . اوراقها سيفية الشكل تلو نحو ٦٥ سم .

اي يوم من القمر يقابل ٢٥ حزيران سنة ١٩٦٦ . اتبع الطريقة التالية : القاعدة ٨ اخف اليها علامة شهر حزيران اي ٤ ثم اخف ٢٥ اي ايام الشهر الشمسي فيصبح المجموع ٣٧ ، اسقط ٣٠ يبقى ٧ وهو المطلوب .

٢١٤٤٩ - **قَاعِدَةُ المُنْتَلِث** (F). Base de triangle (F).
السطح الذي يرتكز عليه الخط العمودي .

٢١٤٥٠ - **قَاعِدَةُ المَوْشُور** (F). Base de prisme (F).
السطح الذي يرتكز عليه الخط العمودي .

٢١٤٥١ - **قَاعِدِيّ ، أُسَامِيّ** (F). Basilaire, Basique (F). Basilar, Basic (E).
صفة الجسم الذي يحوي خاصية القاعدة . ولتت تعريف يطلق على كل ملح حوى شطراً من القاعدة .

٢١٤٥٢ - **قَاعِدِيَّة** (F). Basicité (F). Basicity (E).
صفة الاجسام التي تمثل دور القاعدة في التراكيب الكيميائية .

٢١٤٥٣ - **قَاعِلَاتُ الذَّكَب** (F). Collemboles (F).
هي الكهديات . اطلها .

٢١٤٥٤ - **قَاعِلَةُ القُطْن** (F). Lepidocyrtinus incertus (S).
هي كهدل القطن ، اطلها .

٢١٤٥٥ - **قَاعِلَةُ المَوْز** (F). Drépanure du bananier (F).
هي كهدل الموز ، اطلها .

٢١٤٥٦ - **قَاقُور ، قَاقُور** (F). Spathe (F).
هو الكافور ، وعاء طلع النخل .

٢١٤٥٧ - **قَاقِي** (F). Cornelle candrée (F).
هو الفراق الايقع . يعتبر من الطيور المؤذية .

٢١٤٥٨ - **قَاقِي البَحَر** (F). Corbeau de mer (F).
سمكة بحرية تدعى قرية سواد ، اطلها .

٢١٤٥٩ - **قَاقِي الماء** (F). Cormoran (F).
هو الناق ، اطلها .

٢١٤٦٠ - **قَاقِل ، قَاقَالِيّ** (F). Cacalia (S). Cacalia (E). Kakalia (D). Cacalia, Cacano (I).
جنس نباتات عشبية معمرة ، برية وزراعية من فصيلة المركبات . انواعه عديدة بعضها طبي وزرعي . اوراقه متعاقبة ، لائحية الشكل . ازهارها حلقية التجميع ، بيضاء اللون . يزهر مهدبة ، اهدابها وحيدة الصف . اشهر انواعه ما يلي .

٢١٤٦١ - **قَاقِل سِرْمَكِي الْوَرَق** (F). Cacalia atriplicifolia (S). Cacalia à feuilles d'arroche (F).
نوع من القاقال وهو جنبة معمرة تملو من ٩٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها مفصصة ، حادة التنتين . نصلها اغصن الصفحة العليا ، بحري السفلى . اهدابها مستعرضة ، لائحية التراكيب . ازهارها بيضى || ازهارها يستمر من آب الى تشرين الاول .

٢١٤٦٢ - **قَاقِل طَبِي ، قَاقَالِيّ بُوَصْرِيَّة الْوَرَق** (F). Cacalia verbascifolia (S). Cacalia sacrée (F).
نوع من القاقال وهو جنبة طيبة صغيرة معمرة تملو من ٦٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها بيضية الشكل ذائقة ، نصلها يطلو

يتغذى في آخر سرداب دخلته البرقة ضمن غشاء رقيق هزيل .

٢١٤٤٠ - **قَاطُوبِيَّات** (S). Anthribidae (S). Anthribidae (F). Anthribidae (E).

فصيلة حشرات واسعة دامت قاطعة وانجحة من رتبة غديات الاجنسة || اجسامها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المتعددة الحرارة . تألف الاجراج وقد تعيش على المواد النباتية المنحلة وعلى ما تقتصره من يرقات الحشرات الخاشية || اجسامها متباينة الاحجام بين الصغيرة والوسطى . اشكالها قريبة الشبه بالسوسيات . رؤوسها صلبة . اعطاسها مستعرضة وقصيرة . زباناها خيطية نحولة . قد تنتهي بفصل صقبة متطاولة . كواسلها لائحية الشكل . احمادها لاسفة . جراثيمها نقطية . ارساغها ثلاثية العقول || اشهر اجناسها القاطوب والطحانة .

٢١٤٤١ - **قَاطُور العُتَب** (F). Tordouse de la grappe (F).

حشرة مؤذية تدمر عناقيد العنب تدعى ادوييس اطلها .

٢١٤٤٢ - **قَاع** (F).
القاع : ارض سهلة مغطاة قد انفرجت عنها الجبال والاكمام .

٢١٤٤٣ - **قَاعِدَة** (F). Base (F).
هي الاساس . اطلها .

٢١٤٤٤ - **قَاعِدَة** (F). Règle (F). Rule (E).

الخطوط الواجب اتباعها للوصول الى الهدف .

٢١٤٤٥ - **قَاعِدَة ، نظريّة** (F). Théorie (F). Theory (E).

٢١٤٤٦ - **قَاعِدَة السَّنَوَات السَّابِقَة** (F). Règle de la pénultième année (F).

٢١٤٤٧ - **قَاعِدَة السَّنَوَات المسيحية والمجرية** (F).
هي القاعدة التفرعية المتبعة لمعرفة السنة الهجرية اعتباراً من السنة المسيحية او السنة المسيحية اعتباراً من الهجرية .

١) السنة الهجرية = $XX + \frac{XX}{4}$

٢) السنة المسيحية = السنة الهجرية - $\frac{622}{4}$

٣) السنة الهجرية = السنة المسيحية - $\frac{622}{4}$

٤) السنة المسيحية = السنة الهجرية - $\frac{622}{4}$

٥) السنة الهجرية = السنة المسيحية - $\frac{622}{4}$

٦) السنة المسيحية = السنة الهجرية - $\frac{622}{4}$

٧) السنة الهجرية = السنة المسيحية - $\frac{622}{4}$

٨) السنة المسيحية = السنة الهجرية - $\frac{622}{4}$

٩) السنة الهجرية = السنة المسيحية - $\frac{622}{4}$

١٠) السنة المسيحية = السنة الهجرية - $\frac{622}{4}$

١١) السنة الهجرية = السنة المسيحية - $\frac{622}{4}$

١٢) السنة المسيحية = السنة الهجرية - $\frac{622}{4}$

١٣) السنة الهجرية = السنة المسيحية - $\frac{622}{4}$



قَاقِل

Moule (F), Mould (E).

٢١١٧٤ - قَائِلْ

الجهاز الخامس بالبك .

Fibrophage (F).

٢١١٧٥ - قَائِلْ

Fibrophagous (E).

القائف من الحيوان والحشرات ، الذي يقضي على قشور النبات وأليافها .

Madura (S).

٢١١٧٦ - قَائِلْ ، مَكْلُورَة

Madura, Maclure (F), Osage tree (E).

جنس اشجار وغبيرات ممررة فراء من فصيلة التوتيات . انواعها قليلة منها البرية والزراعية . فروعها شائكة . اوراقها معتقة متعاقبة . نصلها يبيضي الصفحة الكاملة او ثلاثي التفرع . ازهارها ثنائية المسكن ، الذكورية منها متعديرة التجميع اما الانثوية فطليقة . اشكالها قوية ، متينة ، لينة ، لونها الالفصاح المحلطي ، تستعمل في صناعة القسي || اشهر انواعها القائة البرتقالية .



قائم ، هورين

٢١١٧٧ - قَائِلْ مَرْتَقَالِيَّة * ، مَكْلُورَة مَرْتَقَالِيَّة

Maclura aurantiaca, Toxylon pomiferum (S). Madura oranger, Oranger des Osages, Bois d'Arc (F). Bow-wood tree, Osage orange (E). Osagedorn, Osagenapfel (D). Maclura aurantiaca (I).

نوع من القائة وهي شجرة سبروتية فراء داخلة تعلق من ١٥ الى ٢٠ م . اوراقها تطول من ١٦ الى ٢٠ سم . وتعرض من ٣ الى ١٠ سم . نصلها اخضر الصفحة للامعة البشرة ، يارز العروق الباحة للين . ازهارها يستمر من سزيران الى تموز . ثمارها مأكولة بني رتقالية الشكل والحجم واللون .

Géler (F), Gizzard (E).

٢١١٧٨ - قَائِلْ

ثالث جيب في جهاز هضم الطير . وهي منة دون القبة تعرف باللاخطة والجربنة والحوصل والحوصلة والفرفة والقرفضة والمشفلة ...

Canon

٢١١٧٩ - قَائِلْ

جمجمة شرائع كنسية متباينة المصادر بعضها يرتكز على التسليم السابرة وبعضها يجاري الحقوق الطبيعية والعرف والتقاليد والقانون المدني .



قائمة رتقالية

Lai (F), Law (E).

٢١١٨٠ - قَائِلْ ، شَرِيعَة

القانون او الشريعة معناه مجموعة القواعد القانونية التي سبها المشرع || والقانون معناه القوانين مجموعة القواعد الاجتماعية الثابتة التي تسبها السلطة العامة وتكفل الفقرة تنفيذها .

٢١١٨١ - قَائِلْ ، مَجْمُوعَة الْقَوَائِن

Code (F). اسم شامل يطلق على مختلف فروع علم القانون وتصنوه التشريعية المنسقة والمجموعة في ادواب ودوا .

٢١١٨٢ - قَائِلْ الاحْوَالِ الشَّخْصِيَّة

Code du statut personnel (F).

هو القانون الذي ينظم حالة المرء الشخصية من الولادة الى اللبقة وذلك من حيث الارتباط الاجتماعي والاعلى والخصائص .

٢١١٨٣ - قَائِلْ التِّجَارَة

Code de commerce (F).

هو القانون الذي ينظم المعاملات التجارية .

من ١٠ الى ٢٠ سم . وهو جامد الصفحة ، يارز العروق المتوازية . اعناقها صغيرة القند خمسية التركيب || ازهارها يستمر طوال شهر سزيران .

٢١١٦٣ - قَائِلْ عَطْرِي

Calcia suaveolens, Synosma suaveolens (S). Calce odoriférante (F).

نوع من القائل وهو جنبة صغيرة القند ممررة تعلق من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها السفل حراية الشكل مجنحة المالحق ، اوراقها العليا مثلثة الزوايا . اعناقها كبيرة القند ، لاقيلية التركيب تقسم من ٢٥ الى ٣٠ زهرة عرفها عطر فواح . ازهارها يستمر من آب الى تشرين الاول .

٢١١٦٤ - قَائِلْ كَلَرِي الْوَرِّي

Calcia reniformis (S), Calcele réniforme (F).

نوع من القائل وهو جنبة ممررة تعلق من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها السفل كلوية الشكل ، كبيرة القند تعرض نحو ٦٠ سم . اوراقها العليا اهلجسية مستطيلة . نصلها خضر الصالغاح المسننة المختار . اعناقها صغيرة القند ، خمسية الازهار البيض || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

Amome (F).

٢١١٦٥ - قَائِلْ ، بَلْشِي

في الحال ، اطليه .

٢١١٦٦ - قَائِلْ تَيْش الْفِيل

في الحال الجوزي ، اطليه .

Amome de Madagascar

٢١١٦٧ - قَائِلْ حَبَشِيَّة

في الحال الجبشي ، اطليه .

Méléguece (F).

٢١١٦٨ - قَائِلْ ذُكْرِيَّة

في الحال الذكر ، اطليه .

Cardamome petit (F).

٢١١٦٩ - قَائِلْ صَغِيرَة

في الحال الصغير ، اطليه .

٢١١٧٠ - قَائِلْ عَشْرِيَّة

في حال حاما ، اطليه .

Cardamome allé de java (F).

٢١١٧١ - قَائِلْ مُجْتَنَعَة

في حال جاوا ، اطليه .

Amomaceae (S).

٢١١٧٢ - قَائِلَات

Amomacées (F), Amomaceae (E).

في المالحيات سبط من فصيلة الزنجبليات . نباتاتها جذمورية ، صغولية ، ممررة . بعضها طبي وبعضها عطري وزدراحي وذريسي .

٢١١٧٣ - قَائِلْ * ، قَائِلْ ، هَرْمِين

lctis erminea, Putorius erminea (S). Hermine, Belette hermine (F). Ermine, Stoat (E). Hermelin (D).

حيوان من الراسعاب طائفة اليلاد الجبلية المالحية . ثوبه الصيني الى الجفوة المباحة . اما الثنوي فابيض اصفر او ابيض يلق الا طرف ذنبه الذي يبقى على لونه الجفوي يطول ملج اسود . جسمه اعيف القند ، قصير الجرامز ، طوله يراوح بين ٢٤ و ٢٧ سم . وذنبه من ١٠ الى ١١ سم . وهو من الحيوانات الشجاعة الشرسة . يسرح في الليل ، يدمر على الارض ويتسلق الانجار . قوته القزاع والارنب والطير والزحافات على اختلافها من الافاعي الى العظاء . انثاه تقسم مرة في الحزن من جبروين الى ثمانية . فروته جيدة الصنف نجبة القندر .

القد، تشوه مستقلة، غلوة، بارزة الضلوع، لونها الى الصفرة || يرغب في الآثرة المرورية الخفيفة الغنية بالناصر الغضوية .

٢١٤٩٨ - قارون الميسر هو القطين الأقصر، اطلبه .

٢١٤٩٩ - قارون هندي *

Cucumis anguria (S). Angurie, Anguria, Concombre des Antilles, C. marron (F). Beer-gherkin, West indian gherkin (E). Birgurke, Anguriengurke (D). Anguria, Cocomero anguria (I).

نوع من القرعيات الحولية، غروبها عديدة منها البرية والزراعية، اصطناعها البلاد الحارة. جميعها مدادة وتسلفه. اوراقها كفية ثلاثية التخصيص، حية النصل حل صفحته. ثمارها بقلية مأكولة وهي مستطيلة المالحق، رقيقة الشكل والحجم، مفصلة القشور الخليلوية الشاذية. ألوانها تختلف باختلاف الصروب منها الاخضر والاصفر والمخض والمشم والآخر.

٢١٥٠٠ - قايوة

Coccomyces
جلس فطور مجهرية من الرغبات وفصيلة الفشاريات. يتميز بصدائه النائرة وفيه الرسة. بوزه غيطي او غروي الشكل مستقيم الانصباب او احسن، إخلاله كيدي وكثائه حدية الشكل. بوفاته كيفية التجميع شفاقة غيطية مستقيمة او منمقة || انواعه قليلة منها واحد مؤد يفس قايوة الكرز.

٢١٥٠١ - قايوة الكرز *

Coccomyces hiemalis, Cylindrosporium hiemalis (S).
فطر مجهرية يركب الناد الكرز وابوراه وأمن ثماره. مظهره الحاشي على الاوراق رشفة كيفية، لونها الى الجفوة تركب صفحة النصل العليا ويحبب الضلع والورق. قطر البقعة منها يراوح بين ١ و ٢ م. وهي شبه مستديرة او مقرنة الزوايا || يسبب جفاف النصل والاهبال البكر بعد ان يوفت التبادل التسفي قبل زين الركون الطيحي. وهو على الامن يقع صغيرة مبعرة لونها الى الحمرة تسبب جفاف التسج الواصلة وتقرن نقل النسج الى التبار فتجسم وتسقط || اما على الفروع والافانف فهو يقع قرحة وبسادة الشكل متوسطة الكثافة مبعرة بدون انتظام تركب البشرة وتحترف اللحاء فتدخل الاوعية وتمطها وتمتها من القيام بوظيفتها || يكافح باستعمال احد الوسائل السلفوكسية التجارية بعد تخفيفها ٥٠ ٪ وترويضها نحو ٠,٦ ٪ من سلفات الحديد. تنفض الانجبار على مرتين او ثلاث مرات. الاول على اثر العقد والثانية بعد الاول بسبوعين والثالثة بعد الثانية بثلاثة اسابيع.

٢١٥٠٢ - قايده

Alkalid (F). Alkalid (E).
القائد آخر نيم من كوكبة بنات نمش الصغرى .

٢١٥٠٣ - قايكة

Morphologie interne (F).
Internal morphology (E).
هي درس تركيب الاجسام وعضيتها الداخلية في الحيوان والنبات.

٢١٥٠٤ - قايمة

Membre (F). Member (E).

٢١٥٠٥ - قايض

Troquer (F). To truck (E).
استعاض سامة بسملة .

٢١٤٩٤ - قانون الحراج، قانون الأجر

Code forestier (F). Forest rule (E).

هو القانون الذي ينظم ملكية الأجر وصيانتها واستغلالها الى آخره .

٢١٤٩٥ - قانون الصناعة

Droit industriel (F).
Industrial law (E).

هو القانون الذي ينظم الشؤون الصناعية ويحميها .

٢١٤٩٦ - قانون الضرائب

Droit fiscal (F).
Fiscal law (E).

هو القانون الذي ينظم الضرائب على الاعيان الثابتة والمنقولة فيقدرها ويفرضها ويمن طرق جبايتها .

٢١٤٩٧ - قانون الطرق

Code de la route (F).
Rule of the road (E).

هو القانون الذي ينظم السير على الطرق .

٢١٤٩٨ - قانون العرف والعادات

Droit coutumier (F). Unwritten law sanctioned by usage (E).

مجموعة التقاعد القانونية التي قررها العرف .

٢١٤٩٩ - قانون العقوبات

Code pénal (F).
Pénal law (E).

هو القانون الذي يبين الجرائم وعقوباتها والاشخاص الذين تصح معاقبتهم .

٢١٤٩٠ - قانون المحكمة

Lex fori
صفة لائنية تشمل في القانون الدولي الخاص دلالة على نصوص القانون الذي تأخذ به المحكمة المطروح عليها النزاع .

٢١٤٩١ - قانون زراعي

Droit rural (F).
Rural law (E).

هو الذي ينظم الملكية الزراعية ويحمي الزراعة .

٢١٤٩٢ - قانون مكان التعاقد

Lex loci contractus

صفة لائنية تشمل في القانون الدولي الخاص دلالة على قانون البلد الذي انمقد فيه العقد .

٢١٤٩٣ - قانون موقع المال

Lex rei sitae

صفة لائنية تشمل في القانون الدولي الخاص دلالة على قانون البلد الذي يقع فيه المال. وهو يسري على الاموال الخاصة بجماع .

٢١٤٩٤ - قانوني

Légal (F). Legal, Lawful (E).

نمت يستعمل دلالة على مطابقة القانون او على صدور المنصوص به عن القانون .

٢١٤٩٥ - قايوتد

Martin-pêcheur (F).

هو القرق، اطلبه .

٢١٤٩٦ - قايوتد شائع

Martin-pêcheur vulgaire

هو القرق الشائع، اطلبه .

٢١٤٩٧ - قايون، قايون سطاوي

Cucumis angulatus (S). Melon santavi (F). Santawi melon (E). Santavische melon (D). Melone santavi d'Egypte (I).

نوع من الثيام الزراعي للأكل، وهو من ثبوت البلاد الحارة تكثر زراعته في مصر. ثماره رقيقة الشكل، كبيرة



قارون



قارون هندي



قايوة الكرز

Tetraophsis (S).

Tétraphase (F). Tetraophsis (E).

جنس طير من فصيلة التلرجيات . ثوباء المعروفان يعيشان في جبال التبت . شكله قريب الشبه بالفهر . جسمه متوسط القد . ثوبه الى السرة المنمرة بالافير . زوره اسود مطوق بالابيض . ذنبه متوسط الطول ، مستدير الطرف . مقامه ورجلاه الى الخولة السوداء .



قَبْ

٢١٥١٥ - قَبْاح

القَبْاح طرف عظم المضغ مما يلي المرفق .

Ours (vieux) (F) Bear (old) (E).

القَبْاح : اللب المرم .

Claprier commun (F).

٢١٥١٧ - قَبْار

هو الكبر الشاك ، اطلبه .



قَبْ اسم

Monogénie (F). Monogeny (E).

القَبْاسة منقش تناسل قوله ان الاجسام المعضة تنتج اجساماً تنفصل عنها وتقتل بذاتها .

٢١٥١٩ - قَبْاع * ، قَبْع ، قَار البُوس

Aulacodus (S). Aulacode (F). Can rat (E).

جنس حيوانات لبنة قاضية ، من فصيلة الدافيات . انواعه عديدة قريبة الشبه من الجردان . اجسامها ربة قوية تطول من ٥٠ الى ٦٠ سم . وذانها من ١٤ الى ٢٢ سم . روارها صغيرة عريضة . اذنانها نصف مستديرة . جردانها قصيرة خامة الاصابع . اطرافها قوية منجلية الشكل ، اذنانها حليلة الشعر شاككة || الثوباء عند الصلبة السوداء تتبع مع اقترابها من الظهر وتبيض عند البطن . صوفها غثن للملص قليل الكثافة || دولها يعض الاصابع الاخرى تكثر في المناطق الجنوبية والوسطى . تأكل مختلف الاقاليم الزراعية . اجبرتها افاحيص تنضجها في الادغال والمقاصب وبين السور القرية من الخول المزديرة . قوتها الفتق وسائر النباتات السقريلة وقصب السكر والخيزران .



قَبْاح

Telson

٢١٥٠٦ - قَبْ

آخر حلقة من بطن القشريات .

Sécher (F). To dry (E).

٢١٥٠٧ - قَبْ

قب النبات : ييس .

Apside (F). Apse (E).

٢١٥٠٨ - قَبْا

كل طرف من طرفي فلك المحور الاكبر في الكواكب الخلس اي السيارة .

Pleurotomaria (S).

Pleurotomaria (F). Pleurotomaria (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل وفصيلة القبابيات . انواعه المعروفة كثيرة العدد ، منها نحو ٥٠٠ من متحجرات الاحقاب الاول ، واربة انواع معاصرة منتشرة في مجار البلاد الحارة || اصداها كبيرة ، عتقة ، رنية ، سباعية الثمرة الخلزوية التي تصيق مع الاقتراب من القب .

Polyprion (S).

Cernier (F).

٢١٥١٠ - قَبْاب ، قَبْاب

جنس اسماك بحرية من فصيلة الصرانيات شاككة الزمائف . انواعه عديدة معظمها من اسماك البحر المتوسط . جميعها كبيرة القد ، طول اجسامها يراوح من ٧٠ الى ٢٠٠ سم . فلوها مستديرة ، نهامة ، متراكبة . زانها شاككة بسطلية . اقرباها الى السرة البنية يعلوها تبيج ابيض . وهي من الاسماك المأكولة المسحة الطعم .

٢١٥١١ - قَبْاب أسمر * ، كَعْبَد ، دَبْج

Polyprion cernium (S). Cernier brun (F).

Brown Stone-bass (E).

نوع من القباب . سمكة بحرية يبيض من فصيلة الصرانيات . كانت ، في التصنيف السابق ، تتبع فصيلة القشريات . اعطائها مظهر اقاليم البحر الابيض المتوسط || جسمها اعليجي الشكل ، كبير القد ، يطول من ٧٠ الى ١٠٠ سم . حراشفها صغيرة ، عميلة ، مسنة الحواشي . ثوبها الى السرة البنية يعلوها تبيج ابيض || رأسها مخروطي الشكل ، ذلق الخيط . شفتها واسع الانفرج . فكها الاسفل يتقدم الاعل . عينها كبيرتان ، مستديرتان ، نائزتان || زمانها متباينة الاشكال والاحجام ومنها المنسية الشاككة ومنها المفصلة السرة || عليها جبه الصفت ، مرقوب فيه الا في زين مرض الخرجان الذي يمتد من شباط الى نيسان ومن ايلول الى تشرين الثاني .

٢١٥١٢ - قَبْابيات *

Pleurotomaridae (S). Pleurotomaridae (F). Pleurotomaridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل اماميات التياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد معظمها من متحجرات الاحقاب الاول وبعضها معاصر || اصداها متفاوتة الاحجام والاشكال معظمها مستغلط الخلزنة التي تبدو كاقب متراكبة || اعرف اجناسها واشهرها القباب والشرمة .

٢١٥١٣ - قَبْاسة ، قَبْاسة

عفة تنبت في الفلظ ولا تنبت في الجبل ترتفع عن الارض قيس الاسع او اقل ترتعا الموائ (١ م.) ج قبا .



قَبْاح

Bascule (F). See-saw (E).

٢١٥٢١ - قَبْان

جهاز توزن به الاشياء .

Cordylone (F).

٢١٥٢٢ - قَبْيب *

جنس نباتات برية وزيينية من فصيلة الزليقيات ، انواعه عديدة مهددة بالباد الحارة . اربوئها خضنة ، جذوعها منتصب ، اوراقها صفيحة لشكل مستطيلة . انهارها حامية الارزكاز ، عتقة التجميع ، صغيرة القد يكثر فيها الابيض والبيكي || اشهر انواعه ما يلي .

Cordylone rubra (S).

Cordylone rouge (F).

٢١٥٢٣ - قَبْب أحمر

نوع من القبيب وهو شجيرة تزيينية سرولية ، تطول من ٣٠٠ الى ٤٥٠ سم . اوراقها صفيحة لشكل منقطة . نصلاها يطول من ٣٠ الى ٤٠ سم . وهو جامد الصفة الخالصة ، شديد الخضار . طلفها صغير القد ، اسفل الشرخ . انهارها الى الحرة يعلوها موج بتنجسي .



قَبْ

مقارو ال السررة الزيتونية || موته خضاب وسهل الشرق الاوسط واروبة . يكثر في العراق || انشاء تبويض من ١٢ الى ١٨ بيضة تحضنها بعدها ثلاثة اسابيع .

٢١٥٣٠ - قُبَّة ، قُبَّة ، قُبَّة ، قُبَّة

Alauda (S). Alouette (F). Lark (E).
ج. قبر وقناير . جنس طير من فصيلة القبريات ، انواعه عديدة ، اسمائها فسيحة تشمل معظم البلاد الحارة والمعتدلة . جميعها نافعة . اجسامها صغيرة اللد تطول من ١٤ الى ٢٥ سم . مناقيرها مخروطية قصيرة . اجنحتها مستطيلة . ذنابها فارقة . اناؤها موشة مرقشة || قوتها الحشرات والهور البرية . اشهر انواعها مايي .

٢١٥٣١ - قُبَّة الحَقْل * ، قُبَّة مَعْرُوفَة

Alauda arvensis (S). Alouette des champs, A. commune (F). Skylark (E).
نوع من القبرة وهو طائر صغير اللد ، طوله نحو ١٨ سم . ثوبه متناخل الالوان ، رأسه وظهوره الى الكعبة الموشة بالاسود والاصهب والافبر . بطة وعواينه الى اليباض الاخر تملو رشفة سمره . حنار عينه الاجل مستطيل الشكل اشقر اللون . عيناه جوزيتان . مقارو الى السررة . يطن في القبرة بين الزروع وفي المراعي والمنتاح . انشاء تبويض من مرتين الى ثلاث مرات في السنة . حضانها اربع بيضات او خمس ، اما البيضا فيندم ١٤ يوما تقوم به الانثى بمناوبة الذكر .

٢١٥٣٢ - قُبَّة النِياض *

Alauda arborea, Lullula arborea (S). Alouette lulu, A. des bois (F). Wood lark (E).
نوع من القبرة ، وهو طائر صغير اللد يطول نحو ١٥ سم . ثوبه ثوب قبرة الحقل ، لكنه اصعب بيضا واشقر صهبة . يأنف اليرز والحساب والنباض والمجرة الانجار ، رغب في حراثة الخلل والسمتر . انشاء تبويض ثلاث مرات في السنة والحفن يكون بمناوبة الذكر .

٢١٥٣٣ - قُبَّة سَمَرَة * ، قُبَّة ، عَلْبَعَة

Alauda brachydactyla (S). Alouette calandrelle (F).
نوع من القبرة ، صغيرة اللد تطول نحو ١٤ سم . ثوبها ثوب قبرة الحقل الا انه اشد سمره . وهي اطول جناحا من قبرة النياض واكثر رسدا منها || تألف الاراضي الكنسية والريالية . انشاء تبويض ثلاث مرات في السنة . يبضها اصهب اللون تملو رشفة حنطية .

٢١٥٣٤ - قُبَّة مَنُوجَة *

Alauda cristata, Galerida cristata (S). Alouette cochevis, Cochevis huppé (F). Tufted lark (E).
نوع من القبرة ، ومنهم من جعلها جنسا مستقلا . جسمها يطول نحو ١٨ سم . رأسها مستطيل القنزعة . ظهرها اسمر اللون ، وبداي المولج ، حنار ريش رأسها وظهورها وجناحها الى الصهبة الحنطية . صدرها وبطنها وخواتمها الى اليباض الاصهب تملو رشفة مستطيلة سوداء اللون . اسمائها البلاد الحارة والمتحدة . تألف المناطق الوعرة والمراعي والحقل والزروعة ويوانب الطرقات . قوتها الحشرات والمواوم واليزور والزروعة في القرية في القرية في الاشباض او تحت التلع . وهي لا تبويض اكثر من مرتين في الحول . حضانها تألف من ٥ الى ٦ بيضات تقوم بها الانثى بمناوبة الذكر .

٢١٥٣٤ - قُبَّ الجَنُوب (S). Cordylus australis (S). Cordylus australis (F).

نوع من القتب وهو شجرة سبروتية برية وتربيتية تملو من ١٠ الى ١٢ سم . ساقها فراء . اوراقها تشبه اوراق اليوكا . نصلها يطول من ٨٥ الى ١٢٠ سم . وهو مالمش البشرة جبل اخضر الزاهي يعلو توتج اخضر او احمر . انماها الى اليباض الاخر . اعدلتها كبيرة اللد متوسطة الكثافة . ازهارها من اذار الى نيسان .

٢١٥٣٥ - قُبَّ كَثِيف الزهر

Cordylus dense (S). Cordylus dense (F).
نوع من القتب وهو جنبة تربيتية تملو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . ساقها نحيلة فراء . اوراقها تطول من ٣٠ الى ٧٠ سم . نصلها جامد الصفحة مسن الحافة اسجن الزام الاخير ، لونه الى اخضر المايق || شراخها الزهرى قرمزي اللون ، حلقها كثيف التنجيع ، ازهارها ليكية .

٢١٥٣٦ - قُبَّة

Azha
القة بقص نجم كركية الاكليل الجنوبي . سميت قبة لاستعدادتها . بين العرب من يسميها ادعى النعام لانها حل جنوب النعامين .

٢١٥٣٧ - قُبَّة ، قُبَّة ، حَفْث

Peullet (F). Third stomach of ruminantia (E).
هي من لثني واسلاما حنة ذات اطباق متصلة بالكروش وهي اللواء الذي يتنلى اليه القرت .

٢١٥٣٨ - قُبْتُور * ، جَمَل مَكْرَم

Ateuchus laticollis (S). Scarabée à large dôme (F). Ateuchus laticollis (E).

حشرة نائلة من فصيلة الجمليات ورتبة غدييات الاجنحة . يأنف المزارع والبراري يبويض حل الخفي والروث والبر . ماراء يدهي كبرتل يتألف من نفق او نفقين وحجرة فسيحة لسكرانه لا يواء القنطرة التي يبويض عليها || جسمه متوسط اللد يطول من ١٦ الى ٢٢ سم . ثوبه الى السواد اللامع . رأسه صغير الحجم ، قصير الخطم . زبانه صغيران دقيقان . عيناه صغيرتان مساحتان . ظهرانه محجوب الشكل ، بالغ التصديق السدي ، مقطوم المؤخر ، لا يلبس كابل اللين في الاثنى اصغر قدما من الذكر واهت ثوبا منه واكثر سمره || له جبل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجسلانة في ايار وتعيش حتى ايلول . تسرح في النهار . تساه في حيزران . تنجح مكنة واسعة في القنطرة || البرقة عند بلوغها الادراك اتمام تطول نحو ٢٢ سم . جسمها غليظ البطن والطرف ، مقوس الشكل ، قصير الراجب ، ضليع التآخير ثوبا الى القبرة السمره . رأسها اسود اللون ، احمر المولج . تعيش في اول عهدا على المواد العضوية الموجودة في القنطرة ثم على الزبل حتى زين الاكمال .

٢١٥٣٩ - قُبَّج * ، قُبَّج ، حَجَل أَرْبَد ، حَجَل عِرَاقِي

Sterna (S). Sterne, Perdrix grise (F). Sand partridge, Bonham (E).
طائر وحيد الجنس والنوع من عمارة الجملية وفصيلة الطيوريات . واجهته قبيجة للذكر والانثى ، وهي طائر ربع الجففة . متوسط اللد ، طوله نحو ٢٨ سم . ثوبه الى الردة الرصاصية النضبة المولج يعلوها تنجيع وتوشم وتنجيع .



قُبُور



قُبَّ



قُبَّة الحَقْل



قُبَّة النِياض



قُبَّة سَمَرَة



قُبَّة مَنُوجَة

الحافة . شراعيها الزهري يعلو من ٣٠ إلى ٤٠ سم .
أزهارها إلى الصفار المباهج يعلو توشم سنلي يستقر صه
المحار || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران .

٢١٥٤٣ - قيس
Type
هو النموذج المثلث الذي يجمع الملامح الشكلية الرئيسية
المائدة إلى الضرب أو البلاء أو المرق .

٢١٥٤٤ - قيس * **بوليمونيم**
Polemonium (S). Polémoine (F).
جنس نباتات برية وزراعية ترابية من فصيلة القديسات
أنواعه عديدة جميعها عشية ممررة . أوراقها شتاقية ،
مركبة ، مستطيلة . أزهارها عشوية أو محكول التجميع .
اشهر أنواعه الزراعية الترابية ما يتبع .

٢١٥٤٥ - قيس أزرق
Polémoine bleue (F).
هو عشية المغرب ، اطباء .

٢١٥٤٦ - قيس يهي

Polemonium pulcherrimum (S). Polémoine
superbe (F).
عشية ممررة صغيرة لثة زياه . تملو نحو ٢٥ سم . ساقها
فرماة منتصبه قليلة الورق . وريقاتها وريية التجميع
عندما يروح بين ١٧ و ٢٧ عناقيدها الزهرية متصلة
الكثافة . أزهارها ثنائية اللون منها الأزرق والاصفر ومنها
الأزرق والأبيض ومنها الأزرق والأبيض الموشم بالاحمر .
أزهارها يستمر من تموز إلى أيلول .

٢١٥٤٧ - قيس حووي

Polemonium lanatum (S). Polémoine laineuse (F).
عشية ممررة صغيرة لثة . مهيها البلاد الباردة . تملو من
١٠ إلى ٢٥ سم . ساقها وأوراقها وأزهارها زغبية البشرة .
ساقها محملة . أوراقها قليلة العدد . وريقاتها وريية التجميع
تألف من ١٧ إلى ١٩ ورقية . أزهارها لبنة
زرقاء اللون || أزهارها يستمر من تموز إلى أيلول .

٢١٥٤٨ - قيس قليل الزهر

Polemonium pauciflorum (S). Polémoine pauci-
flora (F).
عشية ممررة زياه الفروع تملو من ٢٥ إلى ٣٥ سم . ساقها
منتصبه . أوراقها نظامية . وريقاتها ٢٧ عشوية
الزهرية قليل الأزهار . أزهارها صفراء اللون مستطيلة الشكل .
أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

٢١٥٤٩ - قيس مسطح

Polemonium reptans (S). Polémoine couchée (F).
عشية ممررة صغيرة لثة . تملو من ١٥ إلى ٢٥ سم . ساقها
منبطحة . أوراقها مرطاة النصل ، صغيرة الحجم . وريقاتها
وريية ، خلسية أو سباعية أو تساعية العدد . عناقيدها
الزهرية رطلة التجميع ، أزهارها إلى القرحة اليلكية || أزهارها
يستمر من حزيران إلى تموز .

٢١٥٥٠ - قيس
Endémique (F). Endemic (E).
نمت تعريف يطلق على النباتات والأمراض التي تعيش
وتتكاثر في محيط مناخي معين محصور .

٢١٥٥١ - قيس
Monogénique (F).
Monogenic, Monogenetic (E).
نمت تعريف يطلق على كل ما هو عائله إلى القيسية .

٢١٥٣٥ - قديسات
Alaudidae (S).
Alaudidae (E). Alaudidae (E).

فصيلة القديس ، من الطوائف المحروطينات المنافير . اجتمعا
عديدة منها القبرة واللبل والمكاه والرهمل والرهمل والقديس .
معظمها من الطوائف وبضها آله . جميعها تألف الحفصية
أكثر من الاجواء والاشجار . اجسامها ربة . رؤوسها
كبيرة ، مناقبها لا تقاسية . اجنتها مسطحة ، أذنانها
قصيرة || قوتها الحشرات والبرور البرية .

٢١٥٣٦ - قديسة * **قديس**
Corydalis (S). Corydalle (F). Corydalis (E). Klee-
sterder (D). Coridalide (I).

جنس نباتات برية وترابية من فصيلة الحشاشيات .
أنواعها عديدة معظمها جندموري وبضها دوسي . أوراقها
جلدية الاثناكز أو قرصية ، نصلها كثير التفريش
والتشريح . أزهارها عشوية التجميع تركز حل شراخ
يقوم مقام الساق || اشهر أنواعها ما يتبع .

٢١٥٣٧ - قديسة جوفاء

Corydalis cava (S).
Corydalle creuse (F).
عشية جندمورية ممررة . جندورها دوفسية جفاه . ساقها
شراخ يعلو من ٢٥ إلى ٣٥ سم . ينهي بالمعقد الزهري .
أنواعها حمر أو بيض || أزهارها يستمر من آذار
إلى أيار .

٢١٥٣٨ - قديسة سد آيسية الورق

Corydalis rutacfolia (S). Corydalle à feuilles
de rue (F).
عشية جندمورية ممررة . جندورها دوفسية مفلطحة جامدة
اللباب . أوراقها سلاوية الشكل . أزهارها وريية كبيرة
القد . شراعيها يعلو نحو ١٥ سم . || أزهارها يستمر
من نيسان إلى أيار .

٢١٥٣٩ - قديسة صفراء

Corydalis lutea (S).
Corydalle jaune (F).
عشية جندمورية ممررة . أوراقها مستطيلة التفريش
والتشريح ، مالة البشرة . شراعيها الزهري يعلو من ٢٥
إلى ٣٥ سم . أزهارها ذهبية اللون ، بزوها تسمية لامة .
أزهارها يستمر من أيار إلى أيلول .

٢١٥٤٠ - قديسة قيصونية الورق

Corydalis cheilanthifolia (S). Corydalle à feuilles de
cheilanthé (F).
عشية جندمورية ممررة . أوراقها قيصونية الشكل ، مالة
البشرة تطول نحو ٢٥ سم . شراعيها الزهري يعلو نحو
٢٥ سم . أزهارها كثيرة العدد ، جيلة الصفار القائم .
أزهارها يستمر طولا فصل الربيع .

٢١٥٤١ - قديسة مزخرفة

Corydalis tomentosa (S). Corydalle tomentueuse (F).
عشية نجسية محملة . أوراقها قرصية الانتشاح ، نصلها
يعلو من ١٥ إلى ١٨ سم . وهو متباح التفريش ، كثير
التشريح ، مزشر الصفصة . أزهارها إلى الصفار الكبيرتي .
شراعيها يعلو نحو ٢٥ سم || أزهارها يستمر طولا
فصل الربيع .

٢١٥٤٢ - قديسة نيسلة
Corydalis nobilis (S).
Corydalle noble (F).
عشية جندمورية ممررة . أوراقها متباحة التشريح ، مسنة



قديسة



قيس

٢١٥٦٠ - قُبَيْبَات (S). Dermochelidae (F). Dermochelidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية بيوضة من رتبة السلاحف. النوع الماعس الوحيد من هذه الفصيلة هو القبيصة || يتبين القبيص بفقره وصلوه الطليقة غير الملتصحة بالذبل. وبذيله المركب من صفيفات متتالية تنتم في السفن. ويجلو من المهف القرني المادة الذي يكون ذبال سائر السلاحف || الانثى وحدها تأتي الى البر من مرتين الى ثلاث مرات في الحول وذلك في زين الاشلاق حيث تقع في كل مرة من ١٠٠ الى ١٥٠ شلفة تنفث بعد وضعها بنحو قسمة اسابيع. والقبيص فور نقله يتوجه فوراً نحو البحر.

٢١٥٦١ - قَبِط (F). Mélanger (F). To mix, To mingle (E).

قبط الشهي: خلطه جيداً. يقال قبط الاسمدة الكيماوية.

٢١٥٦٢ - قَبِيع (F). Aulacode (F).

هو القباغ حيوان لبين قاضم، اطلبه.

٢١٥٦٣ - قَبِيعَة (F). Alouette calandrelle (F).

هي القبرة السراء. صفور ابقع ارقش تكثر اقامته قرب اجساد الجردان فاذا فرغ اتبع فيها.

٢١٥٦٤ - قَبِيعَة (S). Pécasote (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات، انواعه عديدة منها البرية والعلبية والتربينية. اوراقها جلدية معتقة متراكبة فارشة النصل المستدير او القلبي الشكل. ازهارها سليل التجميع رأسي الاوتكاكز قادته شجراج غليظ متصطب تكسو الحراشف. ازهارها متعددة الالوان. اشهر انواعه ما يتبع.

٢١٥٦٥ - قَبِيعَة بَيْضَاء (S). Pécasote albus (S). Pécasote blanc (F).

عشبة جبلية معمرة تملو نحو ٨٠ سم. اوراقها كبيرة فارشة طولها نحو ٧٠ سم. ورضها ٣٠ سم. نصلها ازغب البشرة اطول اللون اخضر العروق السفلى. شراخها الزهري، يملو نحو ٨٠ سم. حراشفه خضر، ازهاره صفر.

٢١٥٦٦ - قَبِيعَة لَبْجِيَّة (S). Pécasote niveus (S). Pécasote neigeux (F).

عشبة جبلية معمرة تملو نحو ٦٠ سم. اوراقها كبيرة، مثثة ازوايا، نصلها غثن الصفحة العليا البحرية اللون ازغب الصفحة السفلى الطحال. اللون. شراخها يملو نحو ٦٠ سم. ازهارها الى البياض اللطبي.

٢١٥٦٧ - قَبِيعَة عَطْرَة (S). Pécasote fragrans, Nardosmia fragrans (S). Pécasote odoriférant, Hélioctrope d'hiver (F).

عشبة معمرة تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقها صفيرة، كلوية الشكل، خضراء النصل حل مسفيحة، مسنة الحافة. ازهارها بنفسجية اللون عطرة. عرفها يشبه الونولا. تزدهر القرين. ازهارها شوي.

٢١٥٦٨ - قَبِيعَة مَخْرَنْجِيَّة (F). Pécasote officinal (F).

هي حشيشة القرماز، اطلها.

٢١٥٥٢ - قَبَيْبَات (S). Polemoniacae (F). Polemoniacae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. اجناسها واتواعها المعروفة عديدة معظمها بري ويمضها زراعي تزييني.

٢١٥٥٣ - قَبِينِيَّة (F). Monogénisme (F). Monogenism (E).

وحدة الاصل واللدية. نظرية علمية، ركيزتها التسلسل المنطقي، توضح ان الاجناس البشرية تنفرع من قبس اصلي واحد.

٢١٥٥٤ - قَبِشْرَكَة (F). Gononourrhánie (F).

تصاب فرزي تكون انك انفاه عاقرة أما ذكوره فتأثرة.

٢١٥٥٥ - قَبِش، قَبِش (F). Fourmillière (F). Ant-hill, Ant's-nest (E).

تجتمع النمل الكبير الكثير. وهو ما يدعى قرية ومنسلة.

٢١٥٥٦ - قَبِشَة (S). Truxalus (S). Truxale, Truxalis, Tryxalis (F). Truxalus (E).

حشرة قاضمة نشاطها من فصيلة الجملديات. اصطلها جميع الاصقاع الحارة والمعتلة الحارة من العالم القديم || جسمها كبير القد يعلو من ٣٥ الى ٤٠ سم. عته الذكر ويعلو من ٥٥ الى ٦٠ سم. عته الانثى. ثوبها الى الكهبة الفراء يعلوها سواج اخضر ويعلوهم اسمر. زباناها قلابدا الشكل، مسطبا اضف. اجنتها شفافة ملونة حمره القواعد، وردية الشجاع، مسطبة الحاشية || تحبب المراعي والمواقع الرطبة من حزيزان الى آب || اضربها زديدة لانها قليلة العدد.

٢١٥٥٧ - قَبِش هو الايد، اطلبه.

٢١٥٥٨ - قَبِش (S). Dermatochelys coriacea, Dermochelys coriacea (S). Dermatochelyidae, Dermochelidae, Tortue-luth, Tortue-cuir géante, Sphargis (F). Leather turtle (E).

سلفطاه بحرية ربيدة الجلس والنوع من فصيلة القَبِشِيَّات. كانت في التصنيف السابق تتبع لفصيلة البشيات || اصطلها معظم بحار العالم. قوتها الاسماك والرخويات والنباتات البحرية والمرجان. لا تقرب من الشطوط الا في زين الاشلاق. محاضنها المشهورة شواطئ الهند والخليج والبرازيل || جسمها كبير القد، يعلو من ١٨٠ الى ٢٥٠ سم. وزنها يراوح من ٥٥٠ الى ٩٠٠ كيلو. ذيلها سفى المادة والتركيب، سباهي الاكطار القاطبة المسترسعة عته قواعدها، الضيقة والقصية التجميع عته اطرافها. زعها منسط الصفنة. رأسها معتدل الجرم، شبه اقلس. عتقها غليظ، معتدل الطول. قوائمها بسيطة، زعنفية الشكل، عادمة المقانب. قاتمها الاماميتان كبيرتان، شليحتان، محورنا الى ملتئين مجدائيتين لا يقل طولها عن ٣٠٠ سم. ولا يتجاوز ٣٦٠ سم. || هويلها عته اقتناصها زعاق صاحب شديد النقع || لحمها مأكول.

٢١٥٥٩ - قَبِشْبان (S). Strombus lambis (S).

نوع من الدلاع وهو من الحلازين الكبيرة يحثف فيكون منه اطباق الطيب.



قبة



قبة



قبة



قبة



قبيل

وحيدات الاجهزة وفضيلة القيوييات. انزلها الممارسة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم. تعيش على الصخور الغمورة قرب الشواطئ || اصداؤها غريبة قبيبة الشكل. اجسامها تأخذ اشكال الاسداف. رؤوسها بيضاء. افواهها مستعرضة تنتهي باعظام متغايرة الطول. لواسها مستطيلة ذلقة. حيوانا تحتل قواعد القوارس. خياشيمها وحيدة النصف تملأ الحناجر الامامي من الرداء قرب السقف. ارجلها وحيدة، كبيرة ورفيعة.

٢١٥٧٧ - قبُولِيَّات (S).
Capulidés (F). Capulidés (E).

فضيلة حيوانات بحرية من الرخويات مدييات الارجل وحيدات الاجهزة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || تتميز باصداؤها المخروطية التي يكثر فيها الشكل الشبهي وبافواهها المستعرضة || اعرف اجناسها واشهرها القوية والبابيرية والمقنعة والوفس.

٢١٥٧٨ - قبُول (F). Easterly wind (E). القبُول : ريح السبا.

٢١٥٧٩ - قبُول (F). Acceptance (E). هو الرضا بما يعرض.

٢١٥٨٠ - قبُول ، مَوَالَفَة (F).
Acquiescement, Compliance (E). هو الرضا بسل تم أو حكم صدر.

٢١٥٨١ - قبُول اِثْقَار (F).
Lévis d'option (F). عقد يقصص فيه من كان خيرا في الشراء يهود مكتوب من قبل الشراء بالشروط التي توضع عليها الفزان.

٢١٥٨٢ - قبُول الكَيْسِل (F).
Réception de caution (F). قبول كفالة شخص قدمه للمدين الى الدائن.

٢١٥٨٣ - قبُول اَلِيَّة ، اِنْتِهَاب (F).
Acceptation de donation (F). تصريح الموهوب له في القصد بقبول الهبة.

٢١٥٨٤ - قبُول قَرَمَكَة ، قبُول وَصِيَّة (F).
Acceptation du succession, A. d'un legs (F). هو قبول الوارث أو الموصى له بما جا أو ما عليه.

٢١٥٨٥ - قبُول شَرْطِيّ ، قبُول مُعْتَق (F).
Acquiescement conditionnel (F). هو اظهار الرضا أو القبول بشرط ان يؤدي الراضي أو التفريق الآخر عملا معينا.

٢١٥٨٦ - قبُول صَرِيح (F).
Acquiescement exprès (F). هو القبول الذي يقرره القابل صراحة.

٢١٥٨٧ - قبُول ضَمِيح (F).
Acquiescement implicita (F). قبول يدل عليه تفويت الاجال المحددة للفنن في مقد أو طلب أو حكم.

٢١٥٨٨ - قبُول مَسْكُوت عَنْهُ (F).
Acquiescement tacite (F). قبول يدل عليه ، لزما ، بعض التصرفات ان كان معصدا صاحب الشأن أو غيره.

٢١٥٦٩ - قبُولِيَّة *
Antina (S).
Antaine (F). Antaine (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات فضيحات الخياشيم وفضيلة التفاليات. انواعها المعاصرة المعروفة متوسطة البعد يكثر وجودها في بحار الهند ثم البحر الاحمر فالبحر الابيض المتوسط || اصداؤها متباينة الاحجام ، لاقربية الشكل ، قبيابة ، فارقة ، رفيعة ، مائلة ، شغافة ، عادية الحلزونة والتعديد.

٢١٥٧٠ - قبُول ، صَرْب (F).
Cave (F).
Cellar, Vault (E). بناء او دهليز وما اشبه يصلح لحفظ بعض المحاصيل الزراعية الصناعية كالخمر والخبز الخ. ج. انباء.

٢١٥٧١ - قبُولَات (F). Pluck, Harriet (E). هي السقط مجموعة اعضاء الحيوان الداخلية التي تسقط من حساب الدم القائم بالقلب والكسر والمطعم الكرش ، الخ.

٢١٥٧٢ - قبُول ، قُفُول ، مَزَارَة (F).
Blettissement, Blettissure (F). Becoming over-ripe or sleepy (E). هو ابتداء دور اللبؤل في الثمار وقد يكون ذلك بعد فوط الايناع || وهو في الارواح دور اللبؤل بعد الازدهار.

٢١٥٧٣ - قبُول *
Antaxius pedestris (S).
Sauterelle des champs (F).
جنس جننادب من فصيلة القيوييات. انواعه خمسة. انزلها الى السمرة البنية المخضرة المرقطة. طولها يراوح من ١٧ الى ٢٧ م. اقتضاها الخلفية تطول من ١٧ الى ٢٦ م. احماها عند الذكر نحو ٥ م. وعند الاناث نحو ٢ م. مرزاتها تطول من ١٣ الى ١٨ م. حذافرها حلبيّة ، كواسلها لاحقة. اسراك ذكورها مفلطحة مسنة للصفحة الداخلية. تألف الارض البور ويكثر وجودها في القسم الثاني من فصل الصيف.

٢١٥٧٤ - قبُول اخْضَر * ، تَطَّاط اخْضَر (F).
Homocoryphus nitidulus (S). Sauterelle verte (F).
لوع من القبول اخضر اللون تحيل الجسم بطول من ٣ الى ٥ سم. رأسه مخروطي الشكل. رواشته كبيرة ، رفيعة ، شفاقة ، زبانا دقيقان مستطيلان. اشتره تطول نحو ٢٢ م. يآلت المراعي والحقول المزروعة. يرغب في النباتات النجيلية ومنها الزروع.

٢١٥٧٥ - قبُولِيَّات (F).
Phasgonuridae, Tettigonidae (S). Phasgonuridae, Tettigonidae (F).
Long-horned grasshoppers, Geen meadow grasshoppers, Katyids (E). Laubheuschrecken (D).
فضيلة حشرات من مستطيلات الأجنحة. اجناسها عديدة اشهرها القبول. اجسامها متباينة الاحجام والالوان. قرونها الاستشعارية طويلة. ارجلها الخلفية قاذفة. ارساخها رباعية المقل. قرونها الشرجية لا عقدية. اشهرها مؤلفة من ثلاثة ازواج مستطيلة. ملاسها الشرجية عامة توجد في الذكور كما في الاناث.


٢١٥٧٦ - قبُولَة *
Pileopsis (S).
Capule, Cabochon (F). Pileopsis (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدييات الارجل



قبول



قبول اخضر



قبولة

أجناسها وأنواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاحتياط الغابرة . جميع أنواعها المعاصرة يمينية قل ما تقترب من الشطوط . أسرابها وأفرقة العدد . زناقتها رقيقة شفافة متفارقة الانفلاق عادمة التفصيص الشفائي . أصداؤها كلسية المادة رقيقة الصلصات || أعرف أجناسها وأشهرها أفتاتبة والصلصلة والقوامة .

٢١٥٩٨ - قَتَات ، قَتَاد (F). *Acacia du Sénégal* .
هو سبط السنغال ، أطليه .

٢١٥٩٩ - قَتَاد الصَّمغ (F). *Astragale gommifère* .
هو الإسفراغولوس البديق ، أطليه .

٢١٦٠٠ - قَتَار (S). *Neocosmopora* .
جنس طور مجهرة من السناقيات وفضيلة المشويات أصابها سطحية الارتكاز حر الشفاء تكاثرت غروبية الشكل تحضن بيضاً مستديراً أسير القرن || أنواعها عديدة جميعها حيودة كانوا يتخذون أنها مفررة ويطلون بها بعض أراضى اللعل والبيطخ والتغليل .

٢١٦٠١ - قَتَال (F). *Orque* .
هو الاركة ، أطليه .

٢١٦٠٢ - قَتَب (F). *Bêc* .
هو الاكاف أو الرجل .

٢١٦٠٣ - قَتَب (F). *Intestin, Boyau* .
هو المعى . يقال أبو حبيده : « القتب ما تحوَّى من البطن أي ما استدار منه وهي الحوايا وأما الأسماء فهي الإقصاب » . ج . أفتاب .

٢١٦٠٤ - قَتَرَة ، قَتْلُوم (F). *Affûc* .
ناموس الصائد الذي يشبه ليرتير فيه هنة الصيد .

٢١٦٠٥ - قَتَرَال (S). *Calurus resplendens* .
Quetzal, Calura resplendissans (F). *Quetzal* .
طائر من فصيلة الطيرغويات . موطنه بعض مناطق المكسيك وأمريكا الوسطى . يألف الإحراج الجبلية التي يراوح ارتفاعها بين ١٥٠٠ و ٢٥٠٠ متر عن سطح البحر || طوله نحو ١٠٠ سم . منبهاً ٨٠ سم . الذنب ٢٠ و الجسم ثوبه حشاهل الألوان الساطعة . رذائله وصدره إلى الحفرة اللحية المواج . يطنه إلى الحفرة الفريزية القائمة . عينه كستنية اللون . حواجه سود . متقاده وساقه إلى الصفار الاسمر . عزالان ذنبه محجنا الاطراف || قوته التار البرية والبرزور والحشرات والندويات الصغيرة || يطن عشه في صلوح الإحجار الحرة . الاثنى تبيض من ٤ إلى ٥ . يبيضات تحضنها بمنابرة الذكر نحو ثلاثة أسابيع .

٢١٦٠٦ - قَتَع الإحاص * ، حَمَلَر سَاك التَفَاح (F). *Zeuzera pyrina* , *Z. aesculi* (S). *Zeuzera* , *Z. du poirier* , *Z. de l'olivier* , *Z. du marronnier* , *Coquette* (F). *Wood leopard* , *Leopard moth* , *Wood leopard moth* (F). *Kastanienbohner* , *Blausle* , *Roskastanienbohner* , *Apfelbohner* (D).
حشرة من فصيلة القضايات حيلفاً القد طولا نحو ٣ سم . ثوبها إلى البياض الاغبر . رواضها غيرة اللون تعلوها رقيقة حنطية سوداء المواج . ريقها تطول نحو ٥ سم . ثوبها اغبر

٢١٥٩٩ - قَتِيب (F). *May* (E).
هو القن ، ما يمس من الخشيش وجع وانخزن كملث .

٢١٥٩٠ - قَتِيبِي (F). *Ebb* (E). *Jusant* .
القَتِيبِي حركة المياجة عند ابتداء الجزر وسرعة تقلصه وإياها .

٢١٥٩١ - قَتِيبُ (S). *Polyplectron* .
Eperonnier (F). *Asiatic pea-cock* (E).
جنس طير من فصيلة الطيريات أنواعه المعروفة ١٠ جميعها من طيور الزايج والهند الصينية . تألف المناطق الحرجية الجبلية . أبسائها قروية الشبه من التلوج ، أذيالها مستطيلة منقشة كاذيال البلوروس . تتميز بصبغ أسياغها التي يراوح مددها بين ٢ و ٦ . قنارها تاجية متصبغة . أنولها عديدة الألوان يكثر فيها الأخضر الاسفع والاريد الخشنى الاظفري البقيج والتزييم || أناتها قنع من ١٢ إلى ١٦ بوصة تحضنها بسدها في أناسيص رصمها بالفسش والورق اليابس بين الادغال الكثيفة .

٢١٥٩٢ - قَتِيبُ (F). *Mimeux* (F). *Mimous* (E).
لعت تعريفي يطلق على كل نبات تنقبض أوراقه من الشمس .

٢١٥٩٣ - قَتِيبَع ، قَتِيبَع ، قَتِيبَعَة (F). *Narine du porc* (F). *Nostril of the pig* (E).
هي ثخرة نطسية الخنزير .

٢١٥٩٤ - قَتِيل (S). *Calypso Helense* .
Calypso Hélène (F).
طائر من فصيلة القريسيات . أصله بعض مناطق أمريكا الجنوبية . يعتبر أصغر صفور في العالم || جسمه يطول نحو ٥ سم . ثوبه متداخل الألوان الزاهية ، فيه الرمادي والاحمر والاصفر والاعضر . متقاربه رقيق مستطيل || قوته اللذاب والهلوم ورحيق الانجاز . يطن عشه في الادغال . انثاه تحضن من مرة إلى مرتين في الحمل . حشنتها من ٣ إلى ٤ يبيضات تربطها بمنابرة الذكر نحو ١٣ يوماً .

٢١٥٩٥ - قَت (F). *Luzerne sauvage* .
هي الفصة البرية ، أطليه .

٢١٥٩٦ - قَتَابَة (S). *Cavolinia* (S). *Cavolinia* (F). *Cavolinia* (E).
جنس حيوانات مجرمة من الرضويات مجنحات الارجل وفضيلة القتايات . أنواعها المعروفة نحو ٣٠ منها ٢٠ منتشرة في جميع بجان البلاد الحارة والمعتدلة الحارة ، ويشرة أنواع من متحجرات الاراضي المسانية والبيسانية || أبسائها صفيرة القند ، مكرونة الصفة البطينية ، ثلاثية الانسان أو الحماة ، كبيرة الزمانف القمية القليلة التفصيص ، لونها إلى الصفرة يطولها مواج يختلف مع الأنواع يكثر فيه الأزرق والبيضيسي || أشهر أنواعها قتابة البحر الاخر الثلاثية الانياب الحادة .

٢١٥٩٧ - قَتَابِيَت (S). *Cavolinidae* (E). *Cavolinidae* (F). *Cavolinidae* (E).
فصيلة حيوانات مجرمة من الرضويات مجنحات الارجل .



قَتِيب



قَتَابَة



قَتَرَال



قَتَع الإحاص



قَعَّ البَصَل

أرمادي والحطلي الاسمر . قرونها الإستعمارية قصيرة القته، مشطية الشكل . أنثاها أكبر قداماً من ذكورها . مكنتها مختلف الاشكال والالوان تتمتع الاناث من سلق الأجبار .

٢١٦١٢ - قُتُون * *Chetodon saxatilis* (F).

هو صعل الصخور ، اطليه .

٢١٦١٣ - قُتُون * الواحدة قطة . راجع ميرمين .

٢١٦١٤ - قُتُون * القطة نبات كزبرة الرائحة . (عيط الحيط) .



قَعَّ الجفنة

٢١٦١٦ - قُتُون * *Xerophile* (F). *Xarophilous* (E). نعت تعريفي يطلق على النباتات التي ترغب في المناخات الجافة .

٢١٦١٧ - قُتُون * *Gerres* (S). *Gerre* (F). *Gerres* (E). جنس اسماك بحرية من فصيلة القناتيات . انزاعه المعروفة نحو ٢٠ اطرافها بجار البلاد الحارة اغصنها اليسر الاحرى وشواطئ الهند وسرديب . اجسامها مبطلة ، عريضة ، قدر راحة الكف . زعانفها بارزة اغصنها الظهيرة الشائعة للمقدم والشرجية القارعة .



قَعَّ الساق

٢١٦١٨ - قُتُون * *Gerridae* (S). *Gerridae* (E).

فصيلة اسماك مبطلة من شالكات الزمانات اجنتها وانواعها عديدة . اطرافها بجار البلاد الحارة . اصرف اجنتها واشهرها القن .



قَعَّ الصفصاف

٢١٦١٩ - قُتُون * *Anemopaegma miranda*, *Catuaba* (S). *Catuaba* (F).

جنس بيرة طيبة معمرة من فصيلة البنتونيات . معدها بعض اصقاع البرازيل ساقها تملق نحو ٣ امتار .

فروعها مستطيلة فناء . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، معقفة ، متنايلة التصلب الجليد العابق الخضار . انزاعها عقنودي التجميع ، طرفي الاذنكار . انزاعها جريسية الشكل ، وردية اللون ، مرقطة بالابيض والاصفر . ثمارها كالبسر شكل وقد لكنها لا تؤكل لا اشترت بانها اقوى منط نباتي وضادة للفسلس .

٢١٦٢٠ - قُتُون * *Pteropros* (S). *Pteropros* (F).

جنس حشرات مجهرية من فصيلة النمشيات . انزاعه قليلة جميعها عمياء قصيرة القته يضيبة الشكل مبطلة طويلاً نحو ملبرتر واحد . انثاها الى الصفرة المحتطية يملوها بعض الزراكنس الجلوية . يركب الطير والحفايش .



قُن

٢١٦٢١ - قُتُون * *Glyciphagus* (S).

جنس حشرات مجهرية من فصيلة السكيات . انزاعه المعروفة ثمانية . اجسامها مبطلة تعليل من ٢ الى ٥ اعشار المليمتر . اعطافها ثمانية ماصة . ظهورها منشأة هليلج دقيق مستطيل . قوائمها اربعة أزواج . اولها تراوح من الثيرة السمراء الى السمرة الخفيفة الملوحة || تركب جنس الحواد المضوية والنفاذية والبيج عته عته ويده تلمع والبيج



قُتُون

الاجانة . وقد تصيب الانسان في يديه ورجليه تسبب له

اللون تشوبه حرة ارجوانية ورشفة سوداء . رأسها ودقائها الصدرية والشرجية كسنتية اللون . وهي تعيش من ٢٤ الى ٣٠ شهراً تركب سوق الاجاص والفاخ والسفرجل والزيتون والديدار ... تنفخها وتعلبها || تظهر الفراشة من حزيران الى تموز . الذكر منها اصفر قداماً من الانثى . زين كويها يدم نحو الشهر ينهي . ينجح الممكن على السوق ثم ينقث الملك بعد ذلك بضعة ايام من رقات دقيقة يتأثر عملها التخريبي فور انسلخها الاول .

٢١٦٠٧ - قَعَّ البَصَل * *Dyspessa utula*, *Endegria utula* (S). *Dyspessa des oligans* (F).

حشرة من القناتيات صغيرة القته طويلاً نحو ١٠ م . وبسطها ٢٢ م . ثوبها ابيض اللون حطلي الملوحة . روشناها الاناميان الى البياض الاطحل يعلموا يتبعج حطلي واصفر . روشناها الخلفيان سمر المروق يبيض الاهداب || تظهر الفراشة من نيسان الى ايار ومن تموز الى آب . لها جيلان في الحول . ربتها صغيرة القته سمراء اللون تركب مختلف انواع بصل الزيتقيات . يكثر وجودها على البصل في حزيران والى ايلول .

٢١٦٠٨ - قَعَّ الجفنة * *Paropota paradoxa* (S).

Paropota paradoxal (F). حشرة من القناتيات . فراشها متوسطة القته سمراء الخشب مبقية الرواشن المهدية . ربتها قصيرة ، غليظة ، حنتية اللون جلوية الملوحة تركب الجفنة قنسردها تحت القشور .

٢١٦٠٩ - قَعَّ الساق * *Costus cosus*, *C. ligniperda*, *Trypanus cosus* (S).

Costus gîte-bois, *Gâte-bois* (F). *Goss-moth* (E). *Weidenbohrer* (D).

حشرة من القناتيات ، فراشها خضعة غليظة سمراء اللون . روشناها حنتية يعلموا يتبعج ودي ، وقش ، ويتجانبع اسمر . ربتها تعيش من سنتين الى ثلاث سنوات وهي جلوية الثوب ، سمراء الظهر ، مشطية اللب . تركب سوق واصقان واناد بعض الاجبار المشرة والحرجية تنفخها وتعلبها ، منها الاجاص والفاخ والكرز والخلوخ والمشش والقرز والاكينديا والربان والزيتون والسنديان والحور والصفصاف .

٢١٦١٠ - قَعَّ المَصَّاف * *Cossus honleyi* (S). *Cossus du saule* (F).

حشرة من القناتيات . فراشها صغيرة القته نحو ٢٥ م . اما بطنها فتراوح بين ٤٢ و ٥٥ م . ثوبها الى الوردية العلحاح روشناها الاناميان الى الكهكة الخفيفة الملوحة تتخللها حروق سمر . روشناها الخلفيان افنح لواناً من جسمها || ربتها مستطيلة الشكل ، تيلز ، عته كالك دورها الجليانية ، نحو ٦ سم . ثوبها في اول عهدا يدم ودي اللون ثم ينصرف تدريجياً نحو الجلوية تشوبها صفرة شاملة ويقع سويد ربيانية تملق جميع مقلقات الجسم ما عدا الحلقة الصدرية الاول || وهي تركب الصفصاف والسلب والائل والحور . تحفر السوق في شكيرها تحت التللك فتؤذي اشد الانى .

٢١٦١١ - قُتُون * *Cossidae*, *Zeuzeridae* (S).

Cossidae, *Zeuzeridae* (F). *Cossidae*, *Zeuzeridae*, *Carpenter moths* (E). *Holzbohrer* (D).

فصيلة حشرات من رتبة حشرقيات الاجنحة . اجنتها وانواعها زهاء ٩٥٠ منظمها بجوي المرح . اجنتها لا قياسية القته . روشناها كبيرة . الوانها عديدة ينقلب ثوبا



فتاء البحر



فتاء بري



فتاء ليمانية



تنعب



قَيْمَةُ الْبُوط

حكاكا مزييا يبيج بشرة الجله . يتقى على الحكاك باستعمال الكمون عيار ٧٥° .

٢١٦٢٢ - **فَتَاء ، قَتِي ، مِقَتِي ، قَقُوس ، قُشْمُر**
Cucumis sativus flexuosus (S). Concombre serpent, C. flexuosus, Melon serpent (F). Snake cucumber, Curving cucumber (E). Schlaugengurke (D). Cocomero serpente, C. di turchia (I).

نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة القرعيات اصمره اربعة او خمسة سوقيا ممدادة . اوراقها طويلة الزناد مفصصة . ثمارها اسطوانية ، مستطيلة ، خلية البشرة في اول مهدها . طولها يراوح بين ٣٠ و ١٠٠ سم . وقطرها من ٣ الى ٨ سم . لونها الى الخضار المايق وسها البصري والاغبر الاصفر . طعمها بين الحار والكوي || تكثر زراعتها في البلاد الحارة . تربى في الارثية المنطوقة الاندماج والرطوبة .

٢١٦٢٣ - **فَتَاء الْبَحْر ، عَجِيَار الْبَحْر ، دُوب**
Holothuria (S).
Holothurie, Biche de mer (F). Holothurian, Sea-Slug, Sea-cucumber (E).

جنس حيوانات بحرية من قناتيات البحر . انواعه عديدة جميعها اسطوانية عذبة الجسم المستطيل ، مدنية الطرف ، مخزقة الفتق ، فارشة الحواس القسية التي يراوح عددها بين ١٦ و ٢٠ || اعرف انواعه واشهرها . الثلاثة التالية :

Holothuria tubulosa (S). **فتاء البحر الأنبوبي**
يكثر وجوده في المتوسط يعيش بين صخور الشواطئ .
Holothuria edulis (S). **فتاء البحر المأكولي**
يكثر في بحار الصين واسبانية والخليج الفارسي والبحر الاحمر .

Holothuria intestinalis (S). **فتاء المصرائي**
موطنه بحار الشمال وهو مستطيل الجسم الدقيق .

٢١٦٢٤ - **فَتَاء الْحِطَار**
Ecbala (F).
هو الفتاء البري نبات يعمل ثمراً كالفناء من الطعم كرهه الرائحة يسقط بخصارته ليرقان الاصفر فيقلد من الالف مادة صفراء يزول اليرقان باستعمالها . (ا. م.)

٢١٦٢٥ - **فَتَاء الْمُنْد**
Bei indian (F).
هو الايكل أو البيل ، اطليها .

٢١٦٢٦ - **فَتَاء بَرِّي ، فَتَاء الْحِمَار ، قَقُوس**
اقليمير ، عَوَزَوَر ، اَطَرِين

Ecballium elaterium, Momordica elaterium, Elaterium officinale, E. agreste (S). Ecbale, Cornichon d'âne, Concombre sauvage, Giclet (F). Squirting cucumber (E). Echte Springgurke (D). Cocomero asinino, Elaterio, Paponcio salvatico (I).

نبات عشبي بري من فصيلة القرعيات . يعيش في المواق الرطبة . اوراقه تشبه اوراق الفتاء والخضر تطلبها وتأكليها . ثماره رنية ، مستطيلة ، حجبها حجب بيض الوز ، تنفصل من الساق عند نضجها وتقلد بزورها بعيداً عند الضغط عليها وهي سامة يستخرج بن صيرها مادة قاتلة تدعى ايلاتريوم تدعى من المسهلات المنيفة وما استعمالها الطبي المعروف .

٢١٦٢٧ - **فَتَاء لُيْمَانِيَّة ، زَهْرَة شَعْرِيَّة**
Thrichosanthes angulata (S). Thrichosanthe serpent, Patole, Serpent végétal (F). Snake gourd, Serpent gourd, Viper gourd (E). Haarblume, Sinesischer kùrbis (D). Serpentine, Zuccetta cinese (I).

نوع من قرع الحش وفضيلة القرعيات وهو نبات عشبي حولي حاشئ ساقه تطول نحو ٥ امتار . اوراقه ثلاثية او خماسية التفتيص ، انزاعا جميلة الشكل مهددة البتلات البيضاء ، ثماره اسطوانية مستطيلة ملتصقة ملتصقة طولها يراوح بين ٧٠ و ١٠٠ سم . وقطرها من ٤ الى ٥ سم . لونها في اول مهدها الى الخضار البحري يطول تسليج ابيض ، ثم يمتدح تدريجياً الى ان يستقر عند النضج على الاصفر البرتقالي || ثماره مأكولة وتطبخ كالقوياء وغيرها من البقول .

٢١٦٢٨ - **قَنَاتِيَّات الْبَحْر**
Holothurides
رنية حيوانات بحرية من شعبة الشوكيات .

٢١٦٢٩ - **قَشَد**
Concombros (F).
هو الخيار واحده قشدة .

٢١٦٣٠ - **قَشْرُد**
Moignon sec (F). Dry stump (E).
الفناء اليابس في اصل الشجرة والكزرة .

٢١٦٣١ - **قَتْنَب ، قَتْنَبَان ، قَتْنَبَان**
Lixus (S).
Lixe (F).

جنس حشرات قارضة نازعة من فصيلة السوسيات ، انواعه نحو ٣٥٠ جميعها مستطيلة الشكل مقطعة ، طولها يراوح بين ٨ و ٢٢ مم . اثارها عديدة يكثر فيها الاسود والاسمر والحطلي يطولها طيل اصفر او اسع . رقاتها دقيقة فبره اللون مستحبة الظهر تميش داخل الراديب التي تحفرها في سوق النباتات البقلية والصناعية والمزروية التي تركبها انفسها الشواذر والمفوف والنبع والبزيم والنمل الخ .

٢١٦٣٢ - **قَتْنَب مُسْتَطِيل**
Lixe elongé (F).
حشرة تدعى لكسون مستطيل ، اطليها .

٢١٦٣٣ - **قَتِيْث ، وَدِيَّة**
Pousse (jeune) (F).
Shoot (young) (E).
الفصيلة الفتية جاز اقتلاعهن من اروعها .

٢١٦٣٤ - **قَتَيْمَةُ الْبُوط**
Phragmatiphila typhae, Nonagra typhae (S).
Phragmatiphile des massettes (F). Phragmatiphila typhae (E).

حشرة من الفسقيات حشرغيات الاجتمعة . موطنها عند الشروق الاقصى الى اربعة واربعية التالية . الفرائة جارية قوتها رحيق الازهار . السرقة خاضلة كثية تميش في اول مهدها على اوراق النباتات المتفتحة ثم على البوط والقصيب تضطبع سلاحياتها وتعيش في داخلها حتى نهاية طور الاكمال || جسمها مستطيل الجرم يطول نحو ٢٢ مم . بطنها نحو ٢٦ مم . راسها حطلي اللون يطول منخس قرني المادة . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . جرشها ونفصها الى الحطلي الصنابي المواجه || روارشها صغيرة الحجم . الأزواج الانامي ، عند الشقين ، الى الحطلي الصنابي المواجه يطول تمشج وتبيض وتنطبع كسني . روارشها الخلفيان الى الحطلي الانثى المواجه يسر بعض



فجاج

Houppler (F). **٢١٦٤٥ - قَحْمَة ، فَحَّاح**
Crown (E).
الشجرة اقتطعت أغصانها حتى السنة. ج. ققام ويوقر.

Marouta (F). **٢١٦٤٦ - فُحْرَان**
هو الاقمارون الحُمن ، أمليه .

Décrepitude (F). **٢١٦٤٧ - فُحُونَة**
Decrepitude (E).
القنوة سالة الهرم وما ينتج عنها من وهن .

Cranis (S). **٢١٦٤٨ - فُحَيْقَة ***
Cranie (F). Cranis (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات عضديات الأرجل
وفصيلة القمحيقيات. أنواعها المعاصرة المرفوعة قليلة العدد
بعضها من صلم البحر الأبيض المتوسط والبعض الآخر
يعدو إلى المحيط الهندي || أمدها إلى مقايير الصرايع ،
شبه مستديرة الشوزن ، مسطحة الصفحات السفل الثلاثة
المتقرب ، محدة الصفحات العليا المجهز من الداخل بكتابين
نلشرين || تعيش لاصقة بالصخور المنقورة القليلة النمو.

Cranidae (S). **٢١٦٤٩ - فُحَيْقِيَّات ***
Cranidés (F). Cranidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات عضديات الأرجل ،
أجناسها وأنواعها المرفوعة عديدة منظما من متحجرات
الطبقة الأرضية الأولى وبعضها يعود إلى الطبقة الطباشيرية .
أما الأنواع المعاصرة فقليلة وتعيش في بحار البلاد الحارة
والمعتدلة الحارة . جميعها ملتصقة بأصدها ، عادة
السويقات الطنبية || أعرف أجناسها وأشهرها التحفينة
والقنوة .

Cottus (S). Costa (F). Bull-head (E). **٢١٦٥٠ - قُدَّ**
الأسماك صغرة القند مسطحة الشكل من فصيلة
الطريخيات الشالكانت الزمائف || أنواعه عديدة منها
البحرية والبرية جميعها تعيش في المسق. حولها دون المادي.

Chaboissau (F). **٢١٦٥١ - قُدَّ بَحْرِي ***
Short-spined (E).
نوع من القند موطنه البحار يعيش قرب الشواطئ الصخرية
المسقة النور . جسمه أهليجي الشكل مستطيل الزمائف
الشائكة . رأسه كبير القند طوله يمازي الزام الأول من
الجسم . فوه متراكب الألوان فيه الأبيض والأسمر والأخضر
والأشقر || اشواك زفافه سادة مؤذية غشاهما السيادون .

Cottus gobio (S). **٢١٦٥٢ - قُدَّ تَهْرِي ***
Chabot (F). Father-lasher (E).
نوع من القند يعيش في المياه العذبة . وهو سمكة صغيرة
القند ، كبيرة الرأس والزمائف الحادة الشائكة . فوه
متداخل الألوان المراكية . لحمه كره الطعم لا يؤكل .
والأشقر || اشواك زفافه سادة مؤذية غشاهما السيادون .

Arôme (F). Aroma (E). **٢١٦٥٣ - قُدَّ**
الرائحة الطيبة . يقال فاح قداء .

Fleurs de bigaradier (F). **٢١٦٥٤ - قُدَّاح**
Flowers of a Seville-orange tree (E).
القداح هو زهر التانج أو القاش . ومنهم من قال نور
النبات قبل أن يتفتح . وأطراف الثبت القش .

الشيء عند اقترابه من الحمار الحادجي || لها جيل واحد
في الحول . تظهر الفرائشة في تموز وتبقى حتى أواخر
أيلول . تسرح في الليل . تعاطل بعد ظهورها بنمو سنة
اسابيع وتفتح المكن لقطاً على الصفحات السفلى من نصال
الأوراق || السرة تقطع نحو ٣٤ سم . جسمها شبه أسطواني
الشكل ، حاجي اللون ، تنهي الموج يملو بعض الحلب
القصر الاغبر . رأسها اسود مدنها ورواجها إلى الصرة ||
طور الاكمال الذي يستمر نحو أربعة اسابيع يتقضي
داخل سلامة البوط أو القصب .

Pagrus (S). **٢١٦٣٥ - فُجَّاج ***
Pagre (F). Braze, Porgy (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبوريات الشالكانت
الزمائف . أنواعه نحو ١٥ أصلها بحار البلاد الحارة .
أجسامها ببعضها الشكل مسطحة طولها يراوح بين ٢٥
و ٧٥ سم . زناقتها كبيرة ، الفرجية منها غارقة . فلونها
زرقاء مسنة . أنوارها متداخلة الألوان ، ظهورها وردية
أو مرجانية وظهرها فضية . حولها قليلة الطعم مرغوب
لها || أشهر أنواعه :

Pagrus vulgaris (S). **الفجاج المبدول**
Pagre commun (F).
سمكة شبيهة بالمرجان . شائعة في المتوسط .

Pagrus orphus (S). Pagre orphe (F). **الفجاج الأرفي**
سمكة مسطحة القند مسطيلة الجسم تكثر في شمالي المتوسط
رعل شرطي الاطلي .

٢١٦٣٦ - فُجَّاج سمال الخيل .

٢١٦٣٧ - فُجَّاج سمال الايل .

٢١٦٣٨ - فُجَّاج هو السيل الجارف .

Benne préneuse (F). **٢١٦٣٩ - قُجَّالَة**
Grab-bucket (E).
جهاز آلي يستعمل لرفع التراب والحجارة ونقلها من مكان
إلى مكان .

٢١٦٤٠ - فُجَّال داء يصيب القدم تنجف جلودها .

Catabolisme (F). **٢١٦٤١ - قُجَّامَة ***
Catabolism (E).
علم يبحث في دور انحطاط الكائنات الحية .

Orontium (S). **٢١٦٤٢ - قُجَّط**

Oronce (F). Floating arum (E).
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة القنطاريات .
أنواعه قليلة ، أصلها مناطق وضايف بحيرات البلاد الحارة
أغصانها ضفاف الماصي . أوراقها قرصية الانتشاح
منقطة أهليجية . نصليها يبدل من ١٢ إلى ٣٠ سم .
ويبرز من هـ إلى ١٢ شمراخها الزغري يملو نحو ٥٠ سم .

Crâne (F). **٢١٦٤٣ - قُجَّف**
الضفدع هو أجمعة أو عظما .

Aspermie (F). **٢١٦٤٤ - قُجَّف ***
Aspermatism, Aspermia (E).

التمل اندام الحويثات التنوية في المذي وأندام البزود
في ثمار النبات .



قد



قد بحري



قد سهري

Altise du tabac (F).

٢١٦٦٥ - قَدَادَانِ التَّبَاقِ

راجع التيز التبغ .

Altise des céréales (F).

٢١٦٦٦ - قَدَادَانِ الزَّرْعِ

راجع التيز الزروع .

Altise de la vigne (F).

٢١٦٦٧ - قَدَادَانِ الْكَرْمَةِ

راجع التيز الكرمة .

Chaton (F). Setting of a gem (E).

٢١٦٦٨ - قَدَدَكَة

هي المهرمة ، نظام بهيمة يرتكز على سبله مركبة من ازهار وسيدة الشق .

Gobelet, Vase (F).

٢١٦٦٩ - قَدَدَحْ *

شكل من اشكال التعليل في الاشجار .

Goblet, Vase (E).

٢١٦٧٠ - قَدَدَر

القدر دائرة نجوم من كوكبة قيفاوس .

Puissance (F). Power (E).

٢١٦٧١ - قَدَدَرَكَة

هي القوة على الشيء ، والتسكن منه .

Interligne (F).

٢١٦٧٢ - قَدَدَرَكَة

Interlining, Space-line (E).

هي الفراغ أي المسافة بين الرزق والرزقي في الغرس المنسق .

Kadsura (S).

٢١٦٧٣ - قَدَصُورَة

Kadsura, Kadsoura (F).

جلس جنات برية وريشية من فصيلة المنطليات . انواعه عديدة منها الشرق الاقصى . سيقها فراء تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، متعقبة . ازهارها فردية التجميع ، ابطية الارتفاع . ثمارها انوية لؤلؤية القشور || أشهر انواعها زراعة القصور اليابانية .

٢١٦٧٤ - قَدَصُورَة يَابَانِيَّة *

Kadsura japonica (S). Kadsoura du Japon (F).

نوع من القصور الزراعية والريشية وهي جنبة جاذبة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها اعلمجية ذرية ، تصلها جامد الصنفه مائل البشرية . ازهارها الى البياض الاخير يملو موج اصفر . ثمارها الى الحسة القرزية . افتادها واوراقها تستعمل في صناعة الورق . تنبع انفلها واوراقها يستعمل في تنظيف الشر من مواد المعدنية .

Anchase (F).

٢١٦٧٥ - قَدَفْ *

نمن فخر الزهرة أي زين افتتاح فجرة الطلع .

Caranx trachurus (S).

٢١٦٧٦ - قَدَقُود

نوع من السم وهو سمكة بحرية مستطيلة الشكل طولها نحو ٥٠ سم . مرتها المياه الاقليمية ، توجد في المتوسط . لحمها مستحب الطعم مأكول .

Lignée (F). Issue, Progeny (E).

٢١٦٧٧ - قَدَدُور

السلالة المنتجة من صرم معرف الصفات الشوذية .

Plophila (S). Plophile (F).

٢١٦٧٨ - قَدَدُوح *

جنس شجرات صغيرة القند ثنائية الجناح من فصيلة القنوصيات . انواعه عديدة انواعها الى البصرة الالامه ،

Astragale (F).

٢١٦٥٥ - قَدَاد

هو الاسطراغالوس . اطلية .

Cricetus (S). Cricet (F).

Cricetus (E).

جنس حيوانات لبونة قاضية من القاربات . انواعه عديدة موطنها العالم ، منها ١٣ مهدا العالم القديم . اجسامها رمية . رؤسها مخروطية . مخاضها متقطعة . آذانها متوسطة القند . جرائدها واذاها قصيرة . انواعها مختلفة الالوان . دبها نام قصير ، صفها جامد مستطيل || اعرف انواعه واشهرها :

Cricetus nigricans (S).

٢١٦٥٧ - قَدَادِ اسْتَمَر

Cricet noirâtre (F).

نوع من القداد موطنه شرقي البحر المتوسط . يوجد في جبال لبنان من حلو ١٢٠٠ الى ١٨٠٠ م . طوله نحو ٣٠ سم . وزنه ٣ سم . ثوبه الى الربة السراء يملو موج اسود ، ظهره ابيض من بطنه || يألف الاسراج والادغال قوته المواد النباتية والمضوية .

Cricetus arenarius (S).

٢١٦٥٨ - قَدَادِ الرِمَالِ

Cricet des sables (F).

نوع من القداد موطنه الشرق الاوسط والقفاس واروية . ثوبه الى الربة السراء . طوله الكامل نحو ٢٧ سم . يألف المناطق الرملية والجرف الثقلة الملية .

٢١٦٥٩ - قَدَادِ هَمَسْتَر ، قَدَادِ اَلْمَمانِي

Cricetus frumentarius (S). Cricet Hamster, Hamster (F). Hamster (D).

نوع من القداد طوله ٣٠ سم . وزنه ٣ سم . ثوبه الى الفسار الخفي يملو موج اخضر . مخاضه ابيض . جنسه موهبة خط اسود . خداه الى الصفرة . عنقه الى الصبغة الصنانية . بطنه الى السرة الباقية || موطنه بعض المناطق الاروية اعصها المائي والذرك || جمره رطب الارباء يقيم في الحرم حل عنق يراوح بين المتر والمترين . وهو مؤلف من جرة وسطى فسيحة ولفق مستطيل تعرضه من اليمين واليسار عدة دهايز مستطيلة يحزن فيها ما به من حنطة ويغريها من الحبوب || انتاد تقص من ٤ الى ٨ اذراس رضعها ثلاثة اسابيع .

Cricetidae (F).

٢١٦٦٠ - قَدَادِيَّات

عائلة حيوانات لبونة قاضية من فصيلة القاربات اجناسها وانواعها كثيرة موطنها العالم . انواعها الامريكية فقط تمتد ٨٢ جميعها رمية الجسم قصيرة الجرامز والذنب . قوتها الحبوب ومائل المواد النباتية .

Vanne (F). Water-gate (E).

٢١٦٦١ - قَدَدَاس

القنساس حاجز ينصب على مصب الماء لتقنين كمية انسيابه .

Altise (F).

٢١٦٦٢ - قَدَادَانِ

هي الاليز جنس شجرات من النضاريات .

Altise bleue (F).

٢١٦٦٣ - قَدَادَانِ اَزْرَق

راجع التيز زرقاء .

Altise potagère (F).

٢١٦٦٤ - قَدَادَانِ البُقُولِ

راجع التيز البقول .



قَدَاد



قَدَحْ



قَدَصُورَة يَابَانِيَّة

Occipital ٢١٦٩٠ - قُدْكَالِي ، قُدْكَسِي
نمت تعريفي يطلق على كل ما هو مخصص بالذئال .

٢١٦٩١ - قُدْأَنْبِيَات ٥

Aphanipetères, Siphonaptères (F). Aphaniptera, Siphonaptera (E).
رَبِيَّة حشرات صغيرة القُد من طبقة عديمات الجناح .
فصائلها خمس أما أجناسها وأقسامها فخمسون ٥٠٠ || أجسامها خافتة الجوانب المصغرة ، عليه الزغب المشبه إلى الورد . رؤوسها صغيرة القُد ، عيونها بسيطة . قرونها الاستشعارية تحيلة مركبة من ثلاث فواصل . مثاك اغطائها ثاقبة خاصة . أربطها قوية مدة القفز || وتتميز أفراد بعض فصائلها بعصف أو صفين من الإنسان تعرف بالمشط وهذا المشط قد يكون عدي أو صفري الأرتكاز . ذكرها أصغر من أنثىها تحمل عدة الكوم في قصبتها المستقيمة نحو البلاد || أشهر فصائلها البرغوثيات .



قُدُوح الجبن

Vexille (F). Vexillum (E). ٢١٦٩٢ - قُدْكَو ٥

القُدَّة نصل الريفة . وهما قُدَّتَان ، القُدَّة الرحيطة أي الحامضية والقُدَّة الانسية أي الداخلية .

Ejaculation ٢١٦٩٣ - قُدْكَو ٥

راجع المذق .

Balistique (F). Ballistic (E). ٢١٦٩٤ - قُدْكَفِيَّة ٥

القُدَّة علم يبحث في رمي القُدَّائف أي في ضبط حساب مدى المرمى وتسديده .

٢١٦٩٥ - قُدْكَو ٥ هو حبل القُر .

Froid (F). Cold (E). ٢١٦٩٦ - قُدْكَو ٥

هو البرد الشديد .

Poussin (F). Chick (E). ٢١٦٩٧ - قُدْكَو ٥

صغير الدجاج . هو الصوص والكتكتوت .

٢١٦٩٨ - قُدْكَو ٥ ، قُدْكَو ٥ ، قُدْكَو ٥

Chaleurs, Durée du rut (F). Heats, Duration of the rut (E).
مدة استمرار أنثى الحيوان أو زمن ريقها وقد يندم عادة نحو ٤٨ ساعة وهو يعاود كما يلي :

بعد الوضع

— بستة أيام عند الفرس

— بعشرين يوماً عند البقرة

— بأربعين يوماً عند الخنزيرة

— بأربعة أو ستة أشهر عند الشاة

عند الأنثى غير الحامل

كل ٢٥ يوماً عند الفرس

كل ٢٠ يوماً عند البقرة

كل ٢٠ يوماً عند الخنزيرة

من ١٥ إلى ٢١ يوماً عند الشاة

Caranx Korab (F). ٢١٦٩٩ - قُرَاب ٥

سمكة بحرية تدعى شم قراب ، أظلمها .

Gaine ovarique (F). ٢١٧٠٠ - قُرَاب يَشْقِي ٥

Ovaric sheath (E).

عضو من شوار أنثى الطير وأخضرته وهو وهاء جراي الشكل يتكون فيه البيض



قُدْكَو

جميعها هوائية نائلة تركب مختلف المواد العضوية اغصها ألبين والذهن || أشهر أنواعه قُدُوح الجبن .

٢١٦٩٩ - قُدْكَوَح الجبن ٥

Plophile cael (S).
(F). Philophile du fromage, Mouche du fromage (F).
نوع من القُدُوح وهو ذبابة صغيرة القُد طولها نحو ٣ م .
نوعها إلى العسرة السوداء ، مقدمها وأرجلها إلى الصبغة ،
عورتها بحر . تنجح سكها في الجبن فينضف عن رقات
دقيقة تحيلة تعيش على الجبن فتتغذى وتعلمه .

٢١٦٨٠ - قُدْكَوَحِيَّات ٥

Phophilidae (S).
Phophilidae (F). Phophilidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . أجناسها وأقسامها قليلة ، جميعها من الذباب الملوكة النازل الصلير القُد المستطيل الأبريل || رقاتها تعيش على المواد العضوية الغضيرة وصل السعوم المقلدة والجبن والسمك ...

٢١٦٨١ - قُدْكَيَّات ٥

Cottidae (S).
Cottidae (F). Cottidae (E).
فصيلة اسماك من شالكات الزعانف . أجناسها وأقسامها قليلة العدد تنقسم إلى قسمين قسم الاسماك البحرية التي تقضي حياتها في البحار وقسم الاسماك النهرية التي تعيش في المياه العذبة . جميعها من الاسماك المسبجة الشكل ، كبيرة الرؤوس ، صغيرة الأجسام المستقيمة ، مستطيلة الزعانف الحادة الشائكة حولها دنوتة الصف .

٢١٦٨٢ - قُدْكَيَّات ٥

فصيلة نباتية تعرف بالمرقيات ، أظلمها .

٢١٦٨٣ - قُدْكَيَّات ٥

Vande desséchée (F).
Dried meat (E).
لحم مقعد .

٢١٦٨٤ - قُدْكَيَّات ٥

هي القُدَّيَّات ، فصيلة نباتية ، أظلمها .

٢١٦٨٥ - قُدْكَيَّات ٥ ، لا مَرَكِيَّة ٥

Lamarckie (S).
Lamarckie, Codion, Eledendron (F).
جنس نباتات عشبية برية من التنبليات المكشبات .
أنواعها المعروفة عديدة منها براري حوض البحر الأبيض المتوسط || أوزانها صغيرة النصال المسطحة . أزهارها سليل التجميع . سبيلاتها صغيرة .

٢١٦٨٦ - قُدْكَو ٥

Branchipuz (S).
Branchipe (F). Branchipuz (E).

دورية من القشريات الدنيا غشيرات الأطراف . تعيش في المياه العذبة . جسمها عديم الحواف ، مستطيل الشكل ، طويل نحو ١ م . عيناها مزنة ثنائيتان . زباناها مستطيلتان عند الذكر . قوائمها الصدرية ضفيرة الشكل . تنمو على ظهورها .

٢١٦٨٧ - قُدْكَو ٥

Brachyne (F).
في الرئاة ، أظلمها .

٢١٦٨٨ - قُدْكَو ٥ أحمر الرأس ٥

Brachyne crépissant (F).
هو الرئاة الحمراء الرأس ، أظلمها .

٢١٦٨٩ - قُدْكَو ٥ ، قُدْكَو ٥

Nuque (F). Nape (E).
جماع مؤخر الرأس ويقل ما بين فقرة القفا إلى الاذن .
والقُدَّال من الفرس مقعد المذار خلف الناحية . ج قُدْكَو وأقذنة .

٢١٧١٤ - قَرَّاص ، هو البراد ، اطلبه .

٢١٧٠١ - قَرَابَكَة ، هي الصبابة ، اطلها .

٢١٧١٥ - قَرَّاص ، قَرَّيْن ، حَرَّيْن ، اَنْجُرَة
Urtica (S), Ortie (F), Nettle (E).

جنس نباتات عشبية برية طيبة من فصيلة القَرَابِيَّات
انواعها المعروفة ٣٠ اصطلاحاً البلاد المعتدلة الحارة . منها
منتصبه فراء . اوراقها متعنة متقابله او متعاقبة . نصلها
مُزَيَّعة الحامض ريشها هليبي دقيق يفرز عصارة حمرة ترتكز
على الحامض التل وهو يتشب بهيئته في اسمه فينبج الجلد
ويلهبه || اضرارها خضرار البثور وحيدة او ثنائية المسكن .
يزورها طيبة عديدة الفوائد مثيرة لرغبة الجنسية وقد تضاعف
في العطالة الى اكثر الادوية الجنسية المستعملة لهذه الغاية .
واققراس الجلاف يفقد الحلاوس اللاهية بعد انحلال الحامض
التل || احرف انواعها واشهرها الكاري والكبير والحرق .

٢١٧١٦ - قَرَّاص كَذَاب ،
Lamier blanc (F). هو اللابيين الابيض ، اطلبه .٢١٧١٧ - قَرَّاص كَتَاوْ * ، قَرَّيْن رُومَانِي ،
Urtica pilulifera (S).

Ortie à pilules, O. romaine (F). Roman nettle (E).
Pillennassel (D). Ortica romana (I).
نوع من القَرَّاص وهو نبات عشي بري طيب حول يكثر
في البساتين والحقول . ساقه دقيقة زباء . اوراقه معتقة ،
متعاقبة ، احليلبية ؛ نصلها غشن البشرة ، سنن الحافة ،
كثيف الملب الشائك . ازهاره وسيدة المسكن خضرار اللون .

٢١٧١٨ - قَرَّاص كَبِير *

Urtica dioica (S). Ortie dioïque, Grande Ortie,
Ortie puaente (F). Stinging nettle, Large nettle (E).
Grosse Brandnetel, G. Nessel, Brennessel (D). Ortica
grande, O. maschia, Orticone (I).
نوع من القَرَّاص وهو نبات عشي بري طيب حول يكثر
في البور وقرب البساتين . ساقه فراء عالية . اوراقه
ستطيلة لزاق الاخير ، سننة الحافة ؛ نصلها كثيف
الحمل الثقيل مبهر الملب المستطيل . ازهاره ثنائية
المسكن .

٢١٧١٩ - قَرَّاص مُحَرَّق * ، قَرَّيْن الْعَصَوُزْ

Urtica urens (S). Ortie brûlante, Petite ortie (F).
Small nettle, Dwarf stinger (E). Kleine Nessel (D).
Piccola ortica, Ortica ardente (I).
نوع من القَرَّاص وهو نبات عشي بري طيب حول يعيش
ايها كان وفي اي تربة كانت . ساقه قصيرة فراء زباء .
اوراقه بيضية الشكل منشارة الحافة نصلها لبد الحمل
الحلي الشائك . ازهاره وسيدة المسكن .

٢١٧٢٠ - قَرَّاصِيَّ *
Prunus cerasifera (S).

Pruiner cerise (F).
نوع من الفوخ شيرته صغيرة القند تلغوز ٣ الى ٤ امتار .
ساقها فراء . اوراقها احليلبية النصل شديدة الخضار العابق .
ثمارها مأكولة وهي كرزينة الشكل والقد ، بنفسجية اللون ،
خضرار المواج .

٢١٧٢١ - قَرَّاصِيَّات

Urticaceae (S).
Urticacées, Urticées (F). Urticaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عادمة التعلالات اجناسها
وانواعها عديدة معظمها لياتات عشبية وجنينة وبعضها
شجري . جميعها عادمة الحلايب . اوراقها طيبة النصال .
ازهارها رباعية او خلية التركيب . ثمارها فقيرة او
نوعية ، صغيرة القند .

٢١٧٠٢ - قَرَّاح ، قَرَّاح (F).
Ploughed but unsown land (E).

ارض حرثت ولم تزرع ولم تقرس . وقيل المزرعة التي
ليس عليها بناء ولا فيها شجر . وقيل الارض المخلصة لزراع
او لغرس .

٢١٧٠٣ - قَرَّاد ، قَرَّاد ، حَكَم .
Tique (F). Tick (E). حَكَم .
اسم شامل يطلق عادة لا عرفاً على معظم انواع الطلحيات .
الواحدة قرادة وحلما .٢١٧٠٤ - قَرَّاد الْجَرَب *
Symbiote
جنس قراد يحدث جرباً في الخيل والمجترات .

٢١٧٠٥ - قَرَّادِيَّات ، حَلَسِيَّات

Acariens (F). Spiders (E). Milben (D).
رتبة حشرات من التكنيديات فصلاتها واجناسها وانواعها
كثيرة العدد . جميعها صغيرة القند . اجسامها حادة الفواصل
والخلفات . رؤوسها وصغورها ويطونها متدبجة . منضها
ازب الجلد . ملابسها الفكية لانياسية الشكل منها الملقطة
والبيضة ... غاطسها قارضة او ثاقبة ماصة . ارجلها
ثمانية في الحشرات الكاملة . سداسية في البقرات وهي مجننة
الاطراف او غليظة || اشهر فصائلها : الارغشيات
والبراميات والجربيات والحليقيات والسكيات والشبقيات
والطلحيات والفشليات والكهديات .

٢١٧٠٦ - قَرَّار
Arrêté (F). Order in council (E).
هو آخر ما اسبقر عليه الرأي في تدوين الاجراءات التي
يقضيها نشر القوانين وتنفيذها || اما السلطات التي
يؤمها القانون سبق استصدار القرارات فهي سلطة القضاء
والوزير والمحافظة والبلدية .٢١٧٠٧ - قَرَّار
Décision (jur.) (F). Decision (E).
هو الرأي النهائي الذي تستقر عليه الآراء ، وهو من الحكم
منطقة ومن السلطات التصريح بها .٢١٧٠٨ - قَرَّار الْاَهْلَام
Réquisitoire (F).
Lest of charges, indictment (E).

هو مرافعة النيابة العامة وطلبها تطبيق مواد معينة من القانون .

٢١٧٠٩ - قَرَّار الْإِحَالَة
Ordonnance de renvoi (F). Sending ordinance (E).
هو القرار الذي يصدره قاضي الاحالة .٢١٧١٠ - قَرَّار التَّحْمِيل
Mise en recouvrement
قرار تصدده الادارة او مصلحة الضرائب يحمل قسام
التحصيل ثلثة مند صغورها .٢١٧١١ - قَرَّار الرَّفْض
Décision de rejet (F).
Carrying decision (E).
هو القرار القاضي برفض الطلب المقدم .٢١٧١٢ - قَرَّار تَحْمِيل الْخَالِف
Arrêt de cessibilité (F). Transferrability order (E).
قرار تدوين فيه الادارة المقررات التي ستوزع ملكيتها من
اصحابها في سبيل تنفيذ عمل تقتضيه المصلحة العامة .٢١٧١٣ - قَرَّار النَّافِذ
Décision exécutoire (F).
Executory decision (E).
هو القرار الواجب تنفيذه .

قراد الجرب



قَرَّاص كَوْر



قَرَّاص كَبِير



قَرَّاص حَرَق



قَرَّاصِيَّ

معظم أنواعها صساعة حبابية حراء اللون سرية الجفاف تستعمل استعمال الكينو والكاشو .

Cornouiller (F).

٢١٧٣٢ - قُرَانِيَا

هي القُرُنْج ، اطبله .

Cornacées (F).

٢١٧٣٣ - قُرَانِيَّات

هي القُرُنْجِيَّات ، اطبلها .

٢١٧٣٤ - قُرْبَكَة

هي الرق ، اطبله .

Corvina (S).

٢١٧٣٥ - قُرْبَكَة

Corb (F). Corvina (E).

جنس اسماء بحرية بيوضة من شائكات الزعانف وصيدلة البحاريات || أنواعها المروعة نحو ٢٠ معظمها من اسماء المحيط الهادي والهندي والمحيط الاخر ، وبعضها يعيش في البحر الابيض المتوسط || اجسامها متفارقة القد ، اطولها تراوح من ١٢ الى ٣٥ سم . اذنيها متباعدة الالوان يكثر فيها الرصاصي والاسمر القاتم || طليها جيدة الصنف مأكولة || اعرف أنواعها واشهرها القُرْبَكَة السوداء .

٢١٧٣٦ - قُرْبَكَة سَوْدَاء * ، قَلَقِي الْبَحْرِ

Corvina nigra (S).

Corb noir, Corbeau de mer (F). Crow fish (E).

نوع من القُرْبَكَة . صمكة بحرية بيوض . اصلها البحر الابيض المتوسط || جسمها اعليها الشكل يطلي من ١٨ الى ٣٥ سم . ثوبها الى السرة السوداء المواج . ظهرها اسود . بطنها قصي . زعانفها الى السوداء الارزاق المواج يطلو تنطيق ذهبي . رأسها مخروطي الشكل ، قصير الخط . فكها متعادلان . شفتها معتدل الانفرج . فمها كبيرتان ناشرتان . زعانفها متباعدة الاشكال . الظهريه الارزاق محسنة . الظهريه الثانية مستطيلة . الصدرية مجذافية . الخوضيه قديمة . الشرجية مستطيلة . الذيلية بمقو الطرف || لها جيد الصنف ، مدهرب فيه .

٢١٧٣٧ - قُرْت الْجِلْدَة

Kératose (F). Keratosis (E).

علة في الجلد تنشط الطليقة القرنية تشخن وتتصلب .

٢١٧٣٨ - قُرْءَة * ، قُرْءَة الْعَيْن

Nasturtium officinale (S). Cresson de fontaine, Santé du corps (F). Water cress, Water grass (E). Brunnenkresse, Brunnenwasserkresse (D). Crescione di fonte, Nasturcio, N. acquatico, Sisembrio acquatico (I).

بقلة مسمرة من فصيلة الحليبيات تموش حل سطح الماء سوتها عشية . اوراقها منتقة ، مركبة ، ثلاثية الورقيات . ازهارها متفرقة التجميع ، يبيض اللون . لروصها واوراقها وازهارها مأكولة ، نائمة (راجع جندول الفيتامين).

٢١٧٣٩ - قُرُنْج *

Cyclostrema (S).

Cyclostreme (F). Cyclostrema (E).

جنس حيوانات بحرية من القُرُونْجِيَّات مملوكة الاربل وفصيلة القُرُونْجِيَّات . انواعها المماصرة المروعة عديدة منتشرة في جميع بحار المال || اصنافها صغيرة القد قمرية ، محلوقة ، متدلة الانفرج ، جانبية الفوعة المستديرة كالبيو . لونها الى البياض الاخير يطلو زيفرة بجويرة متناسقة تمتد من الفوعة والقاعدة الى القمة .



قُرْبَكَة



قُرْم



قُرْبَكَة سوداء



قُرْنَة

٢١٧٣٢ - قُرَامِيَّاتُ الْبَحْرِ

رقة من القُرَامِيَّات تنتمي الى صف الهيدرات اللوسية . لصالها واجناسها مدينة تتميز بشكلها القمي التركيب تطلو اهداب شائكة اذا لامست الجلد الميت كما يفعل القُرَص . اصلها جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة تعيش على الصخور .

٢١٧٣٣ - قُرَامَة *

Karata (S). Karata, Karatas, Caratas, Ananas à feuilles longues (F). Curra-towplant (E). Karatas Ananas (D). Karatas (I).

جنس نباتات مسرة برية وزراعية تربيتية من فصيلة الانتاسيات . اوراقها لحمية لينة مستطيلة طعمها اللون شائكة الاطراف والمقصية . ازهارها جميلة الشكل والالوان ، سلبية التجميع || انواعها قليلة اشهرها ما يتبع .

٢١٧٣٤ - قُرَامَة سَانْ دُومِنْج

Karata de St. Domingue

نوع من القُرَامَة اوراقها صساعة لسيبة وقد تستعمل فتح الجلود بعد سحطها في تدويج السلك لاصيد .

٢١٧٣٥ - قُرَامَة غُوِيَان ، شَجَرَة الْفَتَايِل

Karata de la Guyane, Bois de miche

نوع من القُرَامَة لها كالصفيان يستعمل استعمال الفتائل . ثمارها صساعة القد رقيقة الشكل تلي ليمون الارض لانها حازمة الطعم وتنضج في التربة .

٢١٧٣٦ - قُرَام * ، قُرَام * ، قُرَام * ، قُرَام *

Picus (S). Pic (F). Woodpecker (E).

طائر جسم الدورل يتنقل جلوس الاشجار وينقرها لاستخراج الحرد من شقوقها . راجع لغار .

٢١٧٣٧ - قُرَام

Dermatomycozosis (S).

Dermatomycoze (F).

مرض جلدي سببه القُرَام .

٢١٧٣٨ - قُرَامَة

Ecorce (F). Bark (E).

هي اللحم بويه حام وفي التخصص حلاء سوق النباتات الخولية والمخولة .

٢١٧٣٩ - قُرَام

هو البشع المقيدة نبات عشي علي من النجيليات .

٢١٧٤٠ - قُرَام *

Rhizophora (S). Rhizophora, Manglier (F). Mangrove tree (E). Gemeiner Wurzelbaum, Mangelbaum (D). Rhizophora (I).

جنس اشجار منتقية من فصيلة القُرَامِيَّات . انواعها اشجارها كبيرة القد . اوراقها منتقة ، متباعدة ، جلدية التصل اللامع . ازهارها محورية الارتكاز ، نورية التجميع ، مستطيلة الزناد . ثمارها خدرقية الشكل ، مأكولة الحب . يستخرج من حصارها ثمارها بعد تخميرها مشروب غري لا بأس به .

٢١٧٤١ - قُرَامِيَّات

Rhizophoraceae (S). Rhizophoracées (F). Rhizophoraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الملتين مستقلة الفعالات . اجناسها ٥٠ وانواعها ٥٠٠ اصلها المناطق الاستوائية . جميعها اشجار وجنبات . اوراقها منتقة ، متباعدة ، بسيطة ، كاملة . ازهارها نورية التجميع ، ابطية الارتكاز او ناجية . ثمار بعض اجناسها مأكولة ويستخرج من سوق

أزهاره صفويدة التجميع ، كبيرة القد ، تبدو بيشاء اللون ثم تتحرف شيئا فشيئا إلى الأحمر || أزهاره يستمر من تموز إلىيلول .

٢١٧٥٢ - قُرْدُوبُ المناقع

Renouée à feuilles de patience (F).
يمر بالددار ، أظله .

٢١٧٥٣ - قُرْدُوبُ شرقي

Polygonum orientale (S). Renouée d'Orient, Bâton de St Jean, Cordon de cardinal, Monte au ciel (F).
لوع من القردوب الأزرقى شروبه عديدة سوقه سرحة قليلة الفروع تنمو من ١٠٠ إلى ٣٠٠ سم. أوراقه كبيرة القد ، نصلها بيضي الشكل ، ذات الزايم الأخير . أزهاره سفلية التجميع ، طرفية الإرتكاز وحرورية ، مستطيلة الزنصاد متدلية ، لونها يختلف باختلاف الضرب منها الأبيض والوردي والآخر والملوئح || أزهارها يستمر من آب إلىيلول .

٢١٧٥٤ - قُرْدُوبُ صوفي

Polygonum lanigerum (S). Renouée laineuse (F).
لوع من القردوب الأزرقى ساقه زهاب الجاه ، طحلاء اللون . ستانية ، نصلها خلي المصفى الفضية الملوأ . أزهارها سفلية التجميع ، متبادعة ، بيشاء اللون أو ودية . أزهارها يستمر طوال شهر أيلول .

٢١٧٥٥ - قُرْدُوبُ صيني

Polygonum chinense (S). Renouée de Chine (F).
لوع من القردوب الأزرقى ساقه فراء تنمو من ١٥٠ إلى ٣٠٠ سم. أوراقه أعليجية مستطيلة ، نصلها قصير المنق ، سنن الحافة ، أضضر البشرة أو أحر . أزهاره صفويدة التجميع ، تاجية الإرتكاز ، قرزية اللون . أزهاره يستمر طوال الصيف .

٢١٧٥٦ - قُرْدُوبُ

Guenon (F). She-monkey (E).
أني القرد .

٢١٧٥٧ - قُرْدُوبُ

Papion (F).
هو القردوح ، أظله .

٢١٧٥٨ - قُرْدُوبُ ، تم

Philopterus (S). Philoptère (F). Philoptère (E).
جنس حشرات جلدية صغيرة من فصيلة اللسنايات . أنواعه عديدة جميعها مغطاة الجسم . مستطيلة الرأس ، طولها يراوح بين ١ و ٤ مم. ألوانها إلى الخنطي يسمر أو يفسفر مع الأنواع . وهي من الحشرات المؤذية ، تركب البعير فتضيقه بانساعها الدم .

٢١٧٥٩ - قُرْدُوبُ أسمر

Philopterus stratus (S). Philoptère noir (F).
لوع من القردوح طوله نحو ٢ سم. جسمه بيضي الشكل ، كثيف الحلب المستطيل . ثوبه إلى السرة يطولها تبعج مثلث الزوايا حتى اللون || يركب القربان أنصها البناف .

٢١٧٦٠ - قُرْدُوبُ البَطِّ ، تم

Anaticola anseris (S). Anaticole des anserides (F).
لوع من القردوح طوله يراوح بين ٢ و ٣ مم. جسمه شبيه الشكل . ثوبه إلى الصفار الخنطي . حليه صغير القد ، كيف التجميع || يركب البط ويؤذي .

٢١٧٤٠ - قُرْدُوبِيَّات *

Cyclostrematidae (S). Cyclostrematidae (F). Cyclostrematidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مهديات الأرجل حشبات الخياشيم . أجسامها وأنواعها المرفقة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم أنصها بحار البلاد الحارة والممتدة الحارة || أمصاتها مفتحة أو شفافة ، عادمة المادة القلوية ، متبادعة الإحجام ، يكثر نها الصفر . جميعها قرزية عذولة ، قليلة الارتفاع ، مستديرة الفضة أنجائية الإرتكاز القرزية المادة || أشهر أجناسها القربح .

٢١٧٤١ - قُرْدُوبَانَة

ضرب من الكدابة . ج. قرحان . والقرحان يبيض صفار ذوات رؤوس كرويس القطر .

٢١٧٤٢ - قُرْدُوبُ ، قُرْدُوبُ

Ulcère (F). Ulcer (E).
تريد نسيجي لاتياني الشكل والشان يحل في الإحجام الحمرانية والتبائية فيعطها .

٢١٧٤٣ - قُرْدُوبُ الغنم ، قُرْدُوبُ الحراشيف

Bacqueriau du mouton, Chancres des lèvres (F).
مرض ضئال يصيب الفم . مظهره الخلارجي يشود ببع مقروسة تعلم مراشفت الحويوان المصاب .

٢١٧٤٤ - قُرْدُوبُ القنقا

Mal de nuque (F).
عارس يصيب الخيل .

٢١٧٤٥ - قُرْدُوبُ ، سَمَدَدَان

Singe (F). Ape (E).
اسم شامل يطلق على كل حيوان لبون من القرديات . كتبه أبو خاله وأبو حبيب وأبو خلف وأبو ربة وأبو شفة . جمه قردية بقردة . والأثنى قردة جمها قرد . وتلقى لفة ودحية .

٢١٧٤٦ - قُرْدُوبُ المغرب

Magot (F).
هو الشديم ، أظله .

٢١٧٤٧ - قُرْدُوبُ الهند المقدس

Singe saint des hindous (F).
هو حبار انتلوس . أظله .

٢١٧٤٨ - قُرْدُوبُ أميركي

Saki (F).
هو الساي ، قرد كث اللب واللعية .

٢١٧٤٩ - قُرْدُوبُ مقدس

Semnopithecus (F).
هو الحبار ، أظله .

٢١٧٥٠ - قُرْدُوبُ ، عصا الراعي

Polygonum (S). Persicaire, Renouée (F). Persicaria (E). Knöterich (D). Persicaria (I).
جنس نباتات معمرة من فصيلة البطاطيات . أنواعه عديدة منها البرية والأزرقية والششية والجنسية والمارة . سوقها عقدية ، أوراقتها لأفياية الشكل ، أزهارها عقدوية التجميع أو سفلية ، أشهر أنواعه ما يلي .

٢١٧٥١ - قُرْدُوبُ الترمستان

Polygonum badschuanicum (S). Renouée du Turkestan, R. du Badschouan (F).
لوع من القردوب الأزرقى . ساقه عارشة تطول من ٥ إلى ٨ أمتار ، فروعها رطلة ، أوراقتها أعليجية الشكل ، قليلة القاعدة ، نصلها ملس البشرة ، سنن الحافة .



قردوب التركستان



قردوب شرقي



قردوب مصري



قردوب امير



قردوب البيلج

٢١٧٦٩ - قُرْدُوعُ شَحَوْت ، رُبَّاح أَبُو الْحُلُوبِ ، دَهَاب

Papio sphinx (S).
Papion sphinx, Papion grand (F). Cynocephalus mormon (E).

نوع من القردايع كبير الجثة اقلب الزقودوم . موطنه عند من النيل الى النيجر والكنغو . ثوبه الى الجوزة الباهية يمتد مع اقترابه من شج الطهر وقررة الرأس . صاحب اوطف الشعر الابيض . اذنه متوسطة القد ممدودة . صوته يشبه قباغ الخنزير || جماعته متوسطة العدد .



قردع الحام



قردع الحام

٢١٧٧٠ - قُرْدُوعُ عَشْتَرِي ، شَحْمَكَة

Papio porcarius (S). Papion chacma (F). Chacma (E).

اكبر القردايع جثة واسطوا زقارياً وهو حادم العفرة صغير الكتاب . ثوبه الى الكهكة السمره يطولها موج اخضر . حاتم كفه ابيض اللون وشعر صاحبه كحل || بألف الحجاب والجبال والمناقع . يعيش جماعات كبيرة تكد بعض العشرات .



قردع النور



قردع الزنج

٢١٧٧١ - قُرْدُوعُ مَزْوَاج ، مَيْمُون

Mormon malmom (S). Papion mandrill (F). Papio malmom, Mandrill (E).

نوع من القردايع وبرابيع القردود وادنها واسطها واسطها وانسحقا وادسرها خلقتا واشدما بأس . موطنه البلاد الافريقية يكثر في التافين والكنغو || جسمه صمغوي يطول نحو ١٠٠ سم . ويصل ١٠٠ سم . ذنبه ١٠ سم . قوائمه شديدة اللطش . رأسه متوسط الحجم . زرقويه مستطيل مقطوم . عيناه غائرتان . انفه اجر اللون . كتابه مخددة . بارزة . زرقاء اللون || ثوبه الى السرة الزرقية الخفيفة الموج . يمتد حته الطهر والرأس || يعيش جماعات كبيرة تكد بعض العشرات .



قردع الحيشة

٢١٧٧٢ - قُرْدُوعُ يَمَسِي ، رُبَّاح

Papio hamadryas (S). Papion hamadryas, Hamadryas Tatarin (F). Hamadryas (E).

اعرف وحشر انواع القردايع . موطن الحيشة والسودان والجزيرة . قد قد الكلب الكبير النظيف . ثوبه الى الكهكة الغصية . وجهه حطلي اللون . كتابه زائجة اخمدرة . قوائمه غليظة وقوية . ذنبه بالغ الطول جلي الطرف || الذكر منه يتصل بمقرة كيفية مستطيلة الشعر تحمق الرأس والتمت والصدر ونصف الطهر .



قردع بيران



قردع خنزري

٢١٧٧٣ - قُرْدُوعُ ، لِيْطُورُ

Lipeturus (S). Lipetur (F).
جنس حشرات جلدية صغيرة من فصيلة التنتانيات انواعها حديثة جميعها دقيقة . طول اجسامها يراوح بين ١ و ٢ سم . رؤوسها مستطيلة ، عليها خيل وكثيف . اوتارها الى التربة الطمارة . تركيب النجايات على اختلاف انواعها تختلجها لانها تفضل الدم .

٢١٧٧٤ - قُرْدُون

Chardon (F).

هو الحرفش . اطليه .

٢١٧٧٥ - قُرْدِي

Simien (F). Simian (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما يتفق بالقرد .



قردع بني

٢١٧٧٦ - قُرْدِيَّات

Simians (F). Simians (E).
مرتبة القردود وهي حيوانات لينة من الرئيسات . فصائلها وانجاسها وانواعها كثيرة العدد تقسم الى مجموعتين :

٢١٧٦١ - قُرْدُوعُ الْجَوَائِمِ ، تَمَّ الْجَوَائِمِ

Philopiterus sublivascens (S). Philopitère des passeriaux (F).

نوع من القردود طولها يراوح بين ١ و ٢ م . ثوبه الى الصفار الخفلي . جسمه كثيف الحلب العتيق || يركب الجوام اخمصا الشرويات .

٢١٧٦٢ - قُرْدُوعُ احْتِمَام ، قَمَّ احْتِمَام

Columbicola columbae (S). Colombicola (F).

نوع من القردود طول ذكوره ٢ م . واناثه ٣ م . جسمه رؤاسه وزبانه وطليه الى الاستطالة . ثوبه حطلي اللون ، اصفر الموج || يركب الحام على اختلاف انواعه .

٢١٧٦٣ - قُرْدُوعُ الزُوج ، تَمَّ الزُوج

Dageariola ornata (S). Dégariola ornée (F).

نوع من القردود طولها نحو ٢ م . رأسه غمري الشكل . جسمه يضي منقطع . عليه دقيق مستطيل . ثوبه الى الصفرة يملوه توشيح متفرق اسمر || يركب الزوج رنجد الماء .

٢١٧٦٤ - قُرْدُوعُ النُّسُور ، قَمَّ النُّسُور

Ethiopterum monile (S). Ethioptérisme (F).

نوع من القردود يطول نحو ٤ م . ثوبه الى الخفلي الاسمر . زبانه عادية الاطراف . عليه صغير القد ، متوسط الكتلة || يركب النسور على اختلاف اجناسها وانواعها .

٢١٧٦٥ - قُرْدَمَات

Cardamine amara (F).

هي الحاشية . اطليه .

٢١٧٦٦ - قُرْدُوعُ ، قُرْدُوع

Papio (S). Papion, Cynocéphale (F). Baboon, Cynocephalus (E).

جنس قردود من فصيلة الببرسيات . انواعه ٩ تتميز بقباچه منظرة وسفالة اخلاقتها ودعارتها وقذارتها واحتياها . اجسامها صمغوية ، عضلاتها قوية ، رؤوسها ضخمة ، اعطاشها زلقوية الشكل مقطوعة . اذانها صغيرة . قوائمه قصيرة وقوية تمكها من المدد السريع وتحول دون خفة التسلق . اذانها لاقياسية الشكل والعليل || موطنها قسح الاربا . يتم نصف القارة الافريقية وكال الجزيرة العربية . تألف المناطق الوعره تتجنب الاسراج والندابات . تعيش جماعات كبيرة العدد قوتها ما استطاعت اليه سبيلا من الحبوب والفاكر والجذور والحشرات والمظار ويؤسس الطير || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢١٧٦٧ - قُرْدُوعُ الحِشْمَةِ ، قُرْدُوعُ دُجِيْرَة

رُبَّاح دُجِيْرِي

Papio doguera (F). Doguera baboon (E).

نوع من القردايع موطنه عند من الجثة الى الكنگو ثوبه الى الصفار الزيتوني ، قوائمه سود . مفره ذكره عادية اللون يطولها موج اسمر || يأت المنطق الجبلية البعيدة من كل مران . جماعته متوسطة العدد .

٢١٧٦٨ - قُرْدُوعُ بَبُون ، بَبُون ، رُبَّاح

Papio babuin (S). Papion babouin, Babouin (F). Baboon (E).

نوع من القردايع الحامد العفرة والكنائب . موطن الحيشة وجوارها . ثوبه الى الصفار الخفلي يمتد حته الطهر وينير حته الرأس والليل || يأت الاماكن القريبة من الحقل الزردرة اخمصا حطول القد والنبش || يعيش جماعات تكد بعض العشرات .

من ٤٦ إلى ٤٨ م. رأسها حطلي اللون. عينها كبريتان. زباناها عظيمان. جوشها ويطنها إلى الحطلي الاسمر المولج || روشنها الاماميان إلى الحطلي الجزوي المولج تملو مجموعتان من الزراكش والقراريق الجزوية. روشنها الخلفيان إلى الحطلي الاسمر المولج. اهدابها إلى الحطلي الاسمر || لها جبل واحد في الحبل. تنهر القرشة في اوائل تموز وتبقى حتى اواخر ايلول. تسهر في الليل. تعامل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع ويمتدح الممكن لمحا على الصفحات السفلى من نصال الأوراق || السرعة طفول نحو ٤٠ م. جسمها شبه اسطواني الشكل يطول في السكة بالباشرة تنو هربي. لونها إلى الخضار الاصفر تملو جده قاطبة سواء يتخللها تنقيط ابيض ويحدها من الجانبين خط اصفر. رأسها اسود يطولو تمشيع اصفر. مدها ورواجها إلى الخضار الداكن || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما يتقضي في التربة حيث تكمن السرعة ملتصقة بجلباب من الطين.

٢١٧٨٥ - قُرْس ، قُرْس ، قُرْس ، قُرْس
Simulium (S), Simulie (F), Simulium (E).
جنس حشرات صغيرة القند من فصيلة القُرْسيات
الذباب. انواعها عديدة منتشرة في جميع اقطار العالم.
تألف الاماكن الرطبة. ذكورها تعيش على الانهار.
انها لامة تمتص الدم.

٢١٧٨٦ - قُرْس احمر الرأس
Simulium erythrocephalum (S).
Simulie à tête rouge (F).
حشرة موزونة من فصيلة القُرْسيات. جسمها مستطيل صغير يطول نحو ٤ م. رأسها كبير. عينها مقاربتان. زباناها اسطوانيان قصيران. روشنها كبريتان شفافان. رأسها احمر. صدرها إلى السرة البنية. يطنها اصفر الزام الاول والاخير، بني الزام الثاني والثالث. قوائمها بيضاء سمر || تظهر الحشرة الجبلالة من ايار إلى تموز. الذكر يعيش على رصيق الانهار. الانثى لامة، ماصة، تهاجم كل حيوان ولا تمتع من الانسان. تقسم بنوع خاص الآلاف والعين والاذن والرجل.

٢١٧٨٧ - قُرْس الخيل
Simulium equinum (S). Simulie du cheval (F).
نوع من القُرْس طوله يراوح بين ٢ و ٤ م. انثى تلسع الدواب انحصها الخيل وقد لا تمتع من الانسان قُرْبها وتكلمه || يكلف بصالح الا د د د ت. واثامها من الادوية التي لا تؤذي الانسان والحيوان.

٢١٧٨٨ - قُرْسَة
Crassatella (S). Crassatella (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم وقصيلة القُرْسليات. انواعها المعروفة تناهر المكة، اكثرها من متحجرات الاباج الثاني. انواعها الماصرة وقدرها نحو ٣٠ تعيش في بحار البلاد الحارة || اصداها متنوعة الحجم، عرجة الشكل، ثنائية المضاريع المتساوية. مزخرفة السطح الخارجية المائلة.

٢١٧٨٩ - قُرْسِيَّات
Crassatellidae (S). Crassatellidae (F).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اصداها بحار البلاد

مجسومة قرد العالم القديم المعروفة بفيليات المخزون. ومجسومة قرد العالم الجديد المعروفة بالحمات ارفقنطاسيات ٢١٧٧٧ - قُرْدِيَّة
خط شج الظهر.

٢١٧٧٨ - قُرْدِيْس *
Cardina (S). Cardine (F).
جنس دويبات مائية من القُرْسيات، عشاريات الارجل، طول الذيل، وقصيلة القُرْدِيْسيات. انواعها المعروفة قليلة العدد، بعضها هربي يعيش في المياه العذبة وبعضها بحري || اجسامها متوسطة القند. صدرها مستطيل المنك. مؤخرها معتدل الخانة والخطيط. تصبغ عنتاشها المغالية الاطراف || اشهر انواعها واكبرها قُد القُرْدِيْس الهندي (C. fossatum) الذي يكثر وجوده في نهر جنسن.

٢١٧٧٩ - قُرْدِيَّة
Ochradenus (S). Ochradene (F).
جنس نباتات برية بجملة مصرية من فصيلة الخرازيات. انواعها المعروفة قليلة مدها بعض مناطق حوض البحر المتوسط. سيقانها مشبكة الفروع مستشيكها. اوراقها غرزية النصل او خلية، قليلة العدد، متباعدة الاوتكار. ازهارها حادة القمالات. خاسية او مفاسية الفص، لا نظامية الادمة التي يراوح عددها بين ١٥ و ١٥.

٢١٧٨٠ - قُرْدِيَّة *
Atraphaxis (S). Atraphace (F).
الواحدة قُرْدِيَّة. جنس نباتات جنينية مصرية صغيرة القند من فصيلة البيلابيات. انواعها قليلة. اوراقها يضيئة، كاملة، صغيرة، جلدية النصل. فصل ازهارها الباعلية تطول وتتلون بعد التور || اشرف انواعها ما يلي.

٢١٧٨١ - قُرْدِيَّة سنانية
Atraphaxis frutescens (S). Atraphace lanceolée (F).
نوع من القُرْدِيَّة وهو جنينة برية سرية تطول من ١٠ إلى ١٥٠ سم. اوراقها سنانية الشكل، صغيرة القند، بحرية اللون. ازهارها إلى البيضاء الناصع || ازهاره يستمر من تموز إلى ايلول.

٢١٧٨٢ - قُرْدِيَّة شاكلي
Atraphaxis spinosa (S). Atraphace épineux (F).
نوع من القُرْدِيَّة وهو بجملة برية شاكلة تطول نحو ٥٠ سم. ساقها بظرفية غير اللحماء. اوراقها صغيرة القند، سميكة النصل، بحرية اللون، ازهارها ودية || ازهاره يستمر من ايار إلى آب.

٢١٧٨٣ - قُرْدِيَّة شمخدية
Atraphaxis buxifolia (S). Atraphace à feuilles de buis (F).
نوع من القُرْدِيَّة وهو بجملة صغيرة سرية تطول من ٥٠ إلى ١٠ سم. اوراقها يضيئة شمخدية الشكل والتسج. ازهاره يستمر من ايار إلى سزيان.

٢١٧٨٤ - قُرْدِيَّة هرمية
Amphipyra pyramides (S). Amphipyre pyramidal (F).
حشرة من فصيلة السقيات حشرقيات الاجنحة. موطنها يشل معظم اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق الباعلية المتاخمة. قراشها واشعة قويا رصيق الانهار. سرتها خاضعة تميش على اوراق الاشجار الوريفة || جسمها متوسط القند يطول نحو ٢٠ م. يطنها قراوح



قردوس



قرديس



قردق



قردومة هرمية



قردس الخيل

مسكها مدون القشار ، جيد الصنف ، شائع الاستعمال .
لحمها متوسط الصنف مأكول . ويستخرج من كبدها
زيت مرغوب فيه .



قُرْشُ أَسْهَد

٢١٧٩٤ - قُرْشُ شَالِك * ، كُتَبُ بَعْرُ شَالِك

Squalus acanthias (S). *Aiguillat* (F).
Picked dog-fish, *Hound-fish*, *Spiny dog-fish* (E).
سكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة القرشيات . اعطائها
البحر الأبيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي ||
تعتبر من الاسماك البسة . مسرحها الاطراف والتقايف ||
جسمها وشي الشكل بطول نحو ١٢٠ سم . رأسها مخروطي
الشوذن ، متدل التبطيط ، ذلق انبل المستدير الطرف .
اسنانها ثلاثية الصفوف ، متباينة الاشكال بين الفكين .
تكثر فيها الاطراف المشاوية الحادة || ثوبها الى القطعة
السراء وملعها موانع ازرق ، يبق عند الظهر . جانبها الى
القطعة الموشة بالازرق تنير مع الاقارب من البطن
الابيض || تتميز بانعدام الزعنفة الشرجية وبالمتمنخ
الصلب القرني المادة الذي يستيق الزعنفة الظهرية الاول
والثانية || الاثني متتابة تقع في فصل الصيف نحو ٧٠
جمرًا || لحمها قاس ، كثير الالياف ، كامن الصنف .
مسكها مرطوب فيه ويستخرج من كبدها زيت جيد
شائع الاستعمال .



قُرْشُ خَزِيرِي



قُرْشُ شَالِك

٢١٧٩٥ - قُرْشَامُ * *Hoplocampa* (S).

Hoplocampe (F).
جنس حشرات صغيرة اللد من فصيلة المشاريات . انواعه
المعروفة ١٦ جميعها يسجد الجبل الحولي اثنائها ملقاة
تكثر فيها السرة . ورأسها شائعة . رقانها بطرية تركيب
الآثار وتطليق || أشهر انواعه وأضرها قرشامة التفاح
والاجاص والمخوخ .



قُرْشَامَةُ الْاجَاص

٢١٧٩٦ - قُرْشَامَةُ الْإِجَاص * *Hoplocampa brevis* (S).

Hoplocampe des poires (F).
Pear sawfly (E). *Birnensägegwespe* (D).
حشرة من القترام طولها براوح بين ٤ و ٥ سم . ثوبها
حنطي اللون تملو بقع سمر . ارجلها الى الصغار المابق
اناثها تمتع المكان على زهر الاجاص فينتفخ عن رقات
دقيقة نحيلة تنخر الثمرة عنه بدء تكوينها فتقرض البيض
وقبب الاغلاس .



قُرْشَامَةُ التَّفَاح

٢١٧٩٧ - قُرْشَامَةُ التَّفَاح * *Hoplocampa testudina* (S).

Apple sawfly (E). *Apfelsägegwespe* (D).
حشرة من القترام . طولها براوح بين ٦ و ٧ سم . رأسها
ورباناها وجوشا الى الصفرة تملوها رشفة سوداء . بطها
اسد اللون مطوق بالاصفر || رقاتها حنطية لونها الموانع ،
كرية الرائحة تركيب ثمار التفاح تقترضها سطحيًا تحت
القشور ثم تنقبها باتجاه الحزور .

٢١٧٩٨ - قُرْشَامَةُ الْفَوَخ * *Hoplocampa minuta* (S).

Hoplocampe des prunes (F). *Schwarze Pflaumensägegwespe* (D).
Plum sawfly (E).
حشرة من القترام طولها براوح بين ٤ و ٥ سم . ثوبها الى
السرة السوداء . اناثها تمتع المكان داخل قشور الثمار
فينتفخ عن رقات دقيقة تتابع التغب والنشر حتى بلوغ
العجالت .



قُرْشَامَةُ الْفَوَخ

الحارة || اصداها متشابهة ، مألوفة ، مزعزعة ، شبه
عمرسة الشكل ، ثنائية المصارع ، عادية المادة الخلوية ||
اعرف اجناسها واشهرها القرسة .

٢١٧٩٠ - قُرْشِيَّات *Simulidae* (S).

Simuliidae (F). *Simuliidae*, *Sand Rias*, *Buffalo gnats* (E).

فصيلة حشرات من ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها
كثيرة البدع عينة الانتشار . جميعها صغيرة اللد طولها
برايوح بين ٢ و ٦ سم . اجسامها خيطية الشكل . غلبة
الحراشف المستندة ، رؤوسها وجوشاها كبيرة . قرونها
الاستشعارية قصيرة ، ارجلها قوية ، ورأسها شائعة
كبيرة || ذكورها تمتش على رقيق الانهار . اناثها
لاسعة تنمخ الدم ، لفها مؤلم يذوي ، لامها يبعج البشرة
وقد يسبب حدة امراض ومجالت تنقلها الحشرات من الاجسام
المريضة الى السليمة .

٢١٧٩١ - قُرْشُ ، كُتُوسُج ، لَحْمُ ، بُلْبُكُ ، كُتَبُ الْبَحْرِ *Squalus* (S).

Raquin (F). *Shark* (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة القرشيات . انواعه المعروفة
٣٥ جميعها كبيرة اللد مستطيلة الشكل ، مفترسة لا تمر
بني . ألا تقصص باسنانها الى شطرين .

٢١٧٩٢ - قُرْشُ أَسْهَد * *Centrophorus squamosus* (S).

Centrophore squameux, *Requin chagrin* (F). *Porpoise* (E).
سكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة القرشيات . اعطائها
البحر الأبيض المتوسط . تعتبر من الاسماك البسة .
مسرحها الاطراف والجانح ولا تقترب من الجاهج الا نادرا
جداً || جسمها وشي الشكل بطول نحو ١٥٠ سم . رأسها
متدل الجرم ، مستطيل النمل اللدق . فها سفلي الزنكاز ،
صغير اللد ، متدل الشدق ، متباين الانسان بين الفكين
المروي والسفلي . ثوبها الى القطعة السوداء الموانع يسمر
ويميق عند الظهر ويملر ويبيض عند البطن || تتميز
بمسكها البعشر السهف اللانثاسي الحجم والترتيب وبانعدام
الزنقة الشرجية وبالمتمنخ الصلب الدرب الذي يتقدم
كل من الزنقتين الظهرين || الاثني متتابة تقع في فصل
الصيف نحو ٧٠ جمرًا || مسكها شائع الاستعمال . لحمها
كامن الصنف قل من يربب فيه . ويستخرج من كبدها
كية من الزيت الجيد .

٢١٧٩٣ - قُرْشُ عَيْنِزِيرِي * *Oxynotus centrina* (S).

Centrène, *Humantin*, *Cochon de mer* (F). *Seahog* (E).

سكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة القرشيات . اعطائها
البحر الأبيض المتوسط || تعتبر من الاسماك البسة .
مسرحها الاطراف واحالي الجاهج ولا تشاهد قرب الجاهج
الا نادرا || جسمها شبه وشي الشكل ، مستطيل الحوض ،
يظلم نحو ١٢٠ سم . رأسها متدل الجرم ، محيط المقدم
والنمل القصير . فها سفلي الزنكاز ، قصير الشدق
العريض ، متباين الانسان بين الفكين المروي والسفلي .
اعكاسها الخيشوية خامية الفلوج القصية . ثوبها الى
الحمرة القرميدية تبق عند الظهر وتبرر عند البطن .
زنفتها الظهرين شراعيها الشكل ، كبيرها اللد ||
الاثني متتابة تقع في فصل الصيف نحو ٥٠ جمرًا ||

للتوصلة الارتفاع . ساقه ليفية دقيقة فراء عادمة الازراق
تطول من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه جلدية الانتشاب متراكبة ،
نصلها متموج الصفيحة الجامدة المفروسة الشائكة الاستان .
ازهاره عطرية التجميع ، ثاجية ، زرقاء اللون || اوراقه
ماكولة وقد تحلل .

٢١٨٠٨ - قُرْشُومَة *

Cyclostoma (S).
Cyclostoma (F). Cyclostoma (E).
جنس حيوانات برية من الرخويات مديات الارجل وفصيلة
القرصيات . انواعها المعروفة قليلة البد منتشرة في
معظم اقطار العالم || اشهر انواعها القرصية المحددة
(C. sulcatum) التي يكثر وجودها في معظم مناطق حوض
البحر الابيض المتوسط . صدفها صغيرة ، بطينة ، مخزنية ،
قصيرة العقب ، برتقالية اللون .

٢١٨٠٩ - قُرْشُومِيَّات *

Cyclostomidae (S).
Cyclostomidae (F). Cyclostomidae (E).
فصيلة حيوانات برية من الرخويات مديات الارجل
اماميات الحياشيم وحيدات الاجزاء . اجناسها وانواعها
للمعاصرة المعروفة عديدة . جميعها برية تعيش عل الارض
في المواقع الرطبة || اصداؤها شبه حلزونية الشكل ،
متباينة الحلزونة ، صغيرة الاقباب ، اسطوانية انقباضا ،
كلسية الاسقاط || احرف اجناسها واشهرها القرصية .

٢١٨١٠ - قُرْشُوم *

Cerianthus (S).
Cérinthe (F). Cerianthus (E).
جنس حيوانات دنيا من المزهريات وفصيلة القروصيات .
انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة
والمعتدلة احمررة || مدانها لحمية تنبت في رمال القاع
حوارلقها مستطيلة ، صفيحة الشكل كأوراق التنبليات ||
اشهر انواعها قروص المتوسط (Cérinthe de la Méditerranée).

٢١٨١١ - قُرْشُومِيَّات *

Ceriantidae (S).
Cérinthis (F). Ceriantidae (E).
فصيلة حيوانات دنيا من المزهريات . اجناسها وانواعها
عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || مدانها اسطوانية ،
مستطيلة ، هريضة او ملففة ، تنبت بحلق متباعدة
الزوايا || احرف اجناسها واشهرها القروص .

٢١٨١٢ - قُرْشِي *

Discoide (F). Discoid (E).
لنت تعري توصف به الاجسام القرصية الشكل كالتار
وغيرها .

٢١٨١٣ - قُرْشِيَّات *

Discomycetes (F).
فصيلة الفطور القرصية ترف بالفشاريات ، اغلبها .

٢١٨١٤ - قُرْش ، تَحَات *

Erosion
انحاث وجرف جزء من شي . سببه العوامل القارضة كالحياه
التي تقرض التربة وتجرفها .

٢١٨١٥ - قُرْش ، عَارَكَة ، عَارِيَة *

Prêt (F).
Lending (E).
عقد يدفع به المرء الى غيره متقرا او حيا او شيئا معينا
ليستلمه زمتا مجددا ثم يرد . ضمان القرض قارض او
مير وآخذ مستقرض او مستعير .

٢١٧٩٩ - قُرْشُوم *

Paederia (S). Pédérie (F).
جنس جنبا حارسة ملتصقة معمرة من فصيلة الفويات انواعها
قليلة اصلاها البلاد الحارة . ساقها تطول من ٤ الى ٦ امتار .
اوراقها عابلة معنقة متعاقبة . نصلها بيضي الشكل ، ذات
الزوايا الاخير . كبري خل الصفيحة السفلى ، كبري الفراخ
عند المس . ازهارها عتيوية التجميع ، حلبي البترة ،
كرجة الرائحة ، انايبها وردية اللون ، ابواقها الى الياض
الاخضر المالح .

٢١٨٠٠ - قُرْشِيَّات *

Squalidae (S).
Squalidae (F). Squalidae (E).
فصيلة اسماك مفترسة من رتبة الاشلاق . اجناسها وانواعها
عديدة ، اجسامها مستطيلة وشبيهة للشكل . انطامها ذلقة ،
شاربة . اسنانها حادة مشاوية تقطع كل شي . زعانفها
كبيرة . اصلاها بحار البلاد الحارة وقد تجرب انوار الانهر
العميقة الغور .

٢١٨٠١ - قُرْش *

Gaufre, Rayon (F).
Honeycomb (E).
مجوعة فخاريف السطح الواحد في خلية النحل .

٢١٨٠٢ - قُرْش *

Placement (F). Nipping (E).
هو القتر اي قطع رؤوس الانضاضان او الانان الطرية .

٢١٨٠٣ - قُرْشِيَّات *

Renard corsac (F).
هو الثلب التري ، اطلبه .

٢١٨٠٤ - قُرْشِيَّات *

Mytilae (S). Mytilae (F).
جنس اسماك بحرية من مفتوحات الخافطة وفصيلة القروصيات
انواعها المعروفة خمسة منها نومان يمشان في انهر الهند
وسيام وفيتنام ، وثلاثة انواع تعيش في انهر امريكا
الاستوائية || اجسامها متوسطة القد ، بيضية الشكل ،
مسطحة ، تطول من ١٨ الى ٢٤ سم . رؤوسها صغيرة .
زعانفها الظهرية كبيرة ورفيعة ويقعها زعنفتان شحمية
صغيرة . زعانفها الشرسية مستطيلة مقعرة . زعانفها الذيلية
منقربة القوس ، قريبة الشبه بالحلل . اثوابها الى الخصار
الاطحل المتفاوت المابجات || طوبها ماكولة ، متوسطة
الصف .

٢١٨٠٥ - قُرْشِيَّات *

Characidae (S).
Characidae, Characnidae (F). Characidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من مفتوحات المثانة . اجناسها وانواعها
المعروفة عديدة اصلاها انهر وبحيرات المناطق الاستوائية
الاسيوية والافريقية والامريكية || اجسامها لاقيايسية
الشكل والقد . حراشفها صغيرة متراكبة . رؤوسها عريضة
فكوكها مرصوة الانسان الصغيرة الحادة . زعانفها الظهرية
والذيلية لانظامه || احرف اجناسها واشهرها القروصية
والمرقون والمسين والينفوش والوفف .

٢١٨٠٦ - قُرْشَة *

Scrofolaire du désert (F).
هي خنازيرة الصمره ، اطلبها .

٢١٨٠٧ - قُرْشِيَّات *

Eryngium creticum (S). Eryngie, Panicaud de Crète
(F). Field eryngo (E). Feldmannstren (D). Eringio (I).
نوع من الشذاب وهو نبات عشبي بري يكثر في الجبال



قُرْشَة



قرط



قرط موز



قرط الارز



قرط البط



قرط الدجاج

٢١٨٢٦ - قُرْطُ ، قُرْصُ ، جُتْمُ Pincement (F).
Nipping (E).
تقطع رؤوس الاصغاص أو الانداد أو الانثان .

٢١٨٢٧ - قُرْطُ مَوْزُ * ، طَوْحُ مَوْزُ Régime de bananes (F). Bunch of bananas, Cluster of bananas (E).
هو البنية الشجرة المشطية المتتابعة المتدلية التي يتألف منها حل الموزة .

٢١٨٢٨ - قُرْطُبُ Melampyrum (S).
Mélampyre (F).

جنس نباتات برية حشوية حولية من فصيلة الخنازريات. أنواعه ٦ جميعها اشباب متصبية فناء . اولها سنانية او خيطية التصل . انهارها صفراء اللون او بنفسجية . اشهرها واضرها قرطب الارز .

٢١٨٢٩ - قُرْطُبُ الزَّورُ * Melampyrum arvense (S). Mélampyre des champs.

Ble-de-vache, Cornette, Queue de loup, Queue de renard, Rougeole (F). Purple cow-wheat (E). Roter Wachtelweizen (D). Melampiro, Grano di vacca, Coda di volpe (I).

نوع من القربط يعتبر من النباتات الضارة لانه يكثر في زروع الحنطة فينشب جلوره في جنودها ويقامها الغذاء . يزوره الى السرة ، دقيقها احمر اللون مر الطعم .

٢١٨٣٠ - قُرْطُوعُ Ménopon (F). Menopon (E).
جنس حشرات جلدية من فصيلة القرطيات . انواعه نحو ٦٠ جميعها مؤذية تركيب الطير قضيه || امرف انواعه واضرها الثلاثة التالية .

٢١٨٣١ - قُرْطُوعُ الْاَوْزُ Ménopon pectinatum (S). Ménopon des oles (F).

نوع و القرط وهو حشرة صغيرة اللد طويلا يراوح بين ١ الى ٢ سم . واسها مستعرض الشكل ، مقر القطن . ثوبا الى الرعدة يطويها توشم اشقر . تركيب الاوز وتزديه .

٢١٨٣٢ - قُرْطُوعُ الْبَطُ * Trimonot anserinum (S). Trimonot des canards (F).

نوع من القرط يتركب البط فؤديه . جسمه الى الرعدة السراه . يطول من ٤ الى ٥ سم . واسه مثليث الزوايا المستديرة . جيشه وبطه مساويان في الطول والشكل ، ترجاب بطه بجلعة بالحنطي .

٢١٨٣٣ - قُرْطُوعُ الدَّجَاجُ * Menopon gallinae (S). Ménopon des poules (F).

نوع من القرط وهو حشرة صغيرة اللد طويلا نحو ٧ سم . جسمها احليجي الشكل ، كيف الحلب البقي . واسها محدد اللد ، مقر القطن ، دبايح الحلب المستطيل . ثوبا الى الرعدة الصفراء المواج || تركيب جمع الطيور الداجنة اغصها الدجاج .

٢١٨٣٤ - قُرْطُوعِيَّاتُ Ménoponidae (S). Ménoponidés (F). Menoponidae (E).

فصيلة حشرات جلدية من رتبة القمليات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة اللد اجسامها مفلطحة ، بيضية الشكل او احليجية . طولها يراوح بين ١ و ٦ سم . رؤوسها مستديرة او مثثة الزوايا . اساغها مستطيلة عذاشة .

٢١٨١٦ - قُرْصُ ، صِلْفَةُ Emprunt (F).
Borrowing (E).

مقد ترم به صفة قانونية يدفع بمقتضاها عادة مبلغ من المال او اي شيء آخر الى أحد طرفيه الذي يصبح ملتزم به بشرط يتفق عليها . والقرص اشكال منها :

قرص جبري او ائلامي Emprunt forcé (F).
Forced borrowing (E).

قرص طويل الاجل Emprunt à long terme (F).
Long-dated borrowing (E).

قرص قصير الاجل Emprunt à court terme (F).
Short-dated borrowing (E).

قرص جمده Emprunt consolidé (F).
Funded borrowing (E).

قرص مقدور الاستهلاك Emprunt amortissable (F).
Redeemable borrowing (E).

٢١٨١٧ - قُرْصُ الْمُخَامَرَةِ Prêt à la grosse aventure (F). Bottomry lending (E).

قرص يسري حل اشياء معرضة لاختطاف البحر . شرطه انه اذا هلكت هذه الاشياء كلياً او جزئياً كان المقرض في حل من رد مقابل ما ملك منها .

٢١٨١٨ - قُرْصُ يَصَالِيدَ Prêt à incérêt (F).
Lending in interest (E).

نوع من انواع الاعارة الا انه يعاقب اي ان المستعير يدفع الى المير فائدة قدرها ما جرى عليه الاتفاق .

٢١٨١٩ - قُرْصُ زِرَاعِي Crédit agricole (F).
هو التسليل الزراعي .

٢١٨٢٠ - قُرْصَابُ Xérophage (F).

Xerophagous (E).
نمت تعريبي يطلق على الحيوانات والحشرات التي تعيش على المواد الجافة .

٢١٨٢١ - قُرْصِبُ

ما يبقى في الغرابل يسمى به مع الرذالة .

٢١٨٢٢ - قُرْصِيمُ قشر الريان يستعمل في الدباغة .

٢١٨٢٣ - قُرْصِيَّةُ

القرصنة ج. قرص . من غريب شجر البر شكلاً ولوناً زهره اشد صفرة من الروس . قال ابو حنيفة : « القرصية شلق بالشجر وينبت في اصل السرة والبربط وزهره اشد صفرة من الروس ورقه لطاف رقاق » .

٢١٨٢٤ - قُرْصُ * ، ثَوْمُ مُعَصَّر Allium schaeenoprasum (S) Ciboulette, Cive (F).

نبات دوفسي معمر من فصيلة الزنبقيات . قصوه خضيلة الشكل غليظة . اوراقه قرصية الانتساب . دقيقة ، ضيقة ، جواء النمل ، متصبية ، تطول نحو ٢٠ سم . شماريخه الزهرية تملو نحو ٣٠ سم . انهارها حراء اللون ، هامية الانكسار ، صيرالية التجميع .

٢١٨٢٥ - قُرْطُ Méliot à petites fleurs (F).

هو الحنطوق الصغير الزهر . نبات مرجوي تنطفه الدواب بشوة .

٢١٨٥٧ - قرع طويل * دُبَاء، كَرْبِيب، حَرْف

Lagenaria vulgaris (S). Calabasse, Gourde, Bouteille, Courge d'ornement (F). Bottle-gourd, Calabash cucumber (E). Echter Flaschenkürbis (D). Zucca lunga, Z. bottiglia, Z. fiasco (I).

نوع من القرع الحولي، فسر به عديدة منها البرية والزراعية المأكلة والبرية. سيقه مدادة عارضة. أوراقه كبيرة القد لاقياسة التفميس والتفريس. ثماره غنغلة الاشكال والأحجام منها الاطرونية والمغلطة والبرية والناورية والمردنية، الخ.



قرع اسود البزور

٢١٨٥٨ - قرع كبير * يَطْفِين مَصْنَع

Cucurbita maxima (S). Potiron, Citrouille, Grosse courge (F). Large gourd, Spanish gourd, Winter squash (E). Spätskürbis (D). Popone, Cetrinollo, Zucca potirone (I).

ويسمى قرع سلق وقرع مالطي. نوع من القرع الزراعي المشهور. فسر به مدينة أوروبا قدر واشكال ثمارها الصنعة المستديرة المغلطة التي يراعى قطرها من ٢٥ و ١٠٠ سم. ووزنها من ٤ الى ٦٠ كيلو. لهاها جامد المكسر عادم الالياف يحوي نحو :

٩٥,٩٠ % من الماء

١٧,١ % من المواد الازوتية

١٢,١ % من المواد الدهنية

٦٧,٣ % من المواد الاستخلاصية



قرع دوبي



قرع طويل



قرع كبير



قرع مسكي

٢١٨٥٩ - قرع مسكي * Cucurbita moschata (S). Courge musquée, Carabacette (F). Musky gourd (E). Moschuskürbis, Bismkürbis (D). Cetriolo muscato (I).

نوع من القرع الزراعي الشائع الاستعمال. فسر به مدينة. سيقه مدادة طويلة. أوراقه مستديرة، خلية النصل، لاقياسة التفريس. ثماره مستطيلة غنغلة الوسط يبلغ طولها في بعض الفسور نحو ١٠٠ سم. ووزنها ٢٥ كيلو. لهاها اصفر اللون، قابل الالياف، مسكي الرائحة.

٢١٨٦٠ - قرعاه Cérase (F).

هي الحادية من اخبث الحيات.

٢١٨٦١ - قرعيل * دوية عريضة محبطة الظهر والبطن (السان).

٢١٨٦٢ - قرعة * يَطْفِينَة

Citrouille, Courge (F). Pumpkin, Gourd (E).

هي ثمرة القرع أو البطيخ اشكالها واحجامها متباينة تختلف باختلاف النوع.

٢١٨٦٣ - قرعص، قيرعص، قرعوش Chameu (F).

هو الفالغ جل ذو ستاين.

٢١٨٦٤ - قرعبي Péponifère (F). Pepo (E).

نمت وصفي يدل على ما شكله شكل القرع المستدير.

٢١٨٦٥ - قرعيات * يَطْفِينَات

Cucurbitaceae (S). Cucurbitaceae (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين شجيرة القناعات. اجناسها وانواعها كثيرة العدد. سيقها مدادة او عارضة. أوراقها متعاقبة، سواقتها متعقبة. ازهارها وريدة المسكن، خلية الاكام. ثمارها لياينة غنغلة الاشكال والاحجام. اشهر انواعها القرع والبطيخ والشام والجار والقاء والحظل، الخ.

٢١٨٥٠ - قرع الخيل Teigne du cheval (F).

نوع من القرع يركب صهوة القوس وصنعه وكفه.

٢١٨٥١ - قرع الغنم Telgne du mouton (F).

نوع من القرع يركب لسان ولاماز فيسب ايمانها اسوانها وقد يتركز غالباً في اعناقها.

٢١٨٥٢ - قرع شهدي Teigne favose (F).

نوع من القرع يركب الطير والارانب والسنابر والكلاب.

٢١٨٥٣ - قرع * يَطْفِين Cucurbita (S).

Courge (F). Gourd (E). جنس نباتات حولية او معمرة من فصيلة القرقيات. انواعه عديدة. سيقها مستطيلة مدادة او عارضة. أوراقها مدقة كبيرة القد متعقبة الزناد الاويج. نصلها قلمي القاعدة لاقياسة التفميس. حوافها متعقبة. ازهارها وريدة المسكن، كبيرة القد، صفراء اللون. ثمارها غنغلة الاشكال والاحجام. اشهر انواعها الزراعية، المأكولة البار، ما يتبع.

٢١٨٥٤ - قرع اسود البزور * Cucurbita scifolia (S). Courge à graines noires (F).

نوع من القرع الزراعي الممر. ساقه ليفية، دقيقة، مستطيلة، عارضة، فضاء. أوراقه خلية التفميس، نصلها حاقب الخضار يملو تمسح وتسبح اصفر. ثماره بيضية الشكل كالبطيخ فطورها صلبة صفراء اللون تعلوها ريشة بيضاء. لهاها ابيض اللون كثير الالياف متوسط تركيبه يشمل :

٩٥,٩٠ % من الماء

٢٢,١ % من المواد الدهنية

١٤,٣ % من المواد الازوتية

١٤,٠٦ % من السيلولوز

٩٣,٤ % من الرباد

٥٩,٥ % من المواد الاستخلاصية

زوده سوية اللون الاسود لهاها يحوي ما قدر

٢٢,٨٠ % من المواد الدهنية

١٨,٩٥ % من المواد الازوتية

٢١٨٥٥ - قرع الحشيش Trichosantha (F).

جنس نباتات مدادة عارضة من فصيلة القرقيات. انواعه نحو ٣٠ معظمها حولي وبعضها ممر. اعطائها البلاد الاسيوية الحارة وبعض مناطق استراليا. سيقها عشية او ليفية مستطيلة. أوراقها كبيرة متعقبة. ازهارها وريدة البتلات. ثمارها وزوياً لاقياسة الشكل والحجم. اشهر انواعها القنات العشبية، العليا.

٢١٨٥٦ - قرع رومي * قرع مغربي عسامة Cucurbita pepo (S). Courge pépon, Giraumon, Courgeron (F). Pumpkin, Gourd (E). Schmuckkürbis (D). Gramonte. Zucca Indiana (I).

نوع من القرع الزراعي فسر به مدينة منها المكور والمستدير والمسطل والقمبي والصنبر والكبير والمالسي والمفلج وانغدد. لباها ثماره جيد الصنف عادم الالياف.

المواج. ازهارها عذقي التجميع. محوري وطرفي الارتكاز. ثمارها عنقية ، لاصقة التفت والكم ، للذقة الطعم ، قطرها نحو ١٠ مم. || قرفها سمراء اللون. غبراء المواج ، جيدة الصنف. يستخرج منها وين الاوراق والازهار والثمار طيوب وادهان فاخرة .

٢١٨٧٤ - قَرْفَة كَنَازِيَّة (F).
Fausse cannelle (F).
هي دريس بجلان ، اطبله .

٢١٨٧٥ - قَرْفَة مَلَبَار * ، سَاكَج
Cinnamomum citriodorum (S). Cannellier de Malabar (F). Malabar cinnamon (E). Malabarischer Zimmetbaum (D). Cannella di Malabar (I).

شجرة زراعية من الافاوية. مهدا بلاد ملبار وقد انتشرت زراعتها في جزر الزانج وغيرها من جزر المحيط الهادي . ثمرتها صغيرة اللد ، فراءه . يستخرج منها اجود الطيوب والادهان . اما قرفها فنادية .

٢١٨٧٦ - قَرْفَينِيَّة هي الغلويس الفلسطيني ، اطبله .

٢١٨٧٧ - قَرْفول *
Caryophyllia (S).
Caryophyllie (F).
جنس حوريات بحرية من الرجان عنقية المدافع ، مستديرة الثمرات المفردة || اشهر انواعه القرفول الجملي (C. cyanithus) الذي يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط .

٢١٨٧٨ - قَرْفِيَّات
Cannellaceae (S).
Cannellacées (F). Cannellaceae (E).
فئة من فصيلة الناريات تشمل القرفة والبيلون وغيرها .

٢١٨٧٩ - قَرْفِيَّات
Manidae (S).
Manidés (F). Manidae (E).
فصيلة حيوانات من الدرد اجناسها وانواعها عديدة اخرها ام قرفة .

٢١٨٨٠ - قَرْقِي
Gloussement (F). Clucking (E).
صوت للدجاجة عندما تدعو فراخها .

٢١٨٨١ - قَرْقِي
Liège (F).
هو القلين ، اطبله .

٢١٨٨٢ - قَرْقَب
Mésange (F).
هو القرقف جنس طير من الجرائم .

٢١٨٨٣ - قَرْقَد
Apocyn (F).
هو الخوشان ، اطبله .

٢١٨٨٤ - قَرْقَدَان
Guilmauve jaune (F).
هو الابوتيلين الاسرح ، اطبله .

٢١٨٨٥ - قَرْقَدَن ، قَرْقَدُون ، قَرْقُضُون ،

جَرْدَة سَنَجَايِي
Myoxus (S). Loir (F).
Dormouse (E). Siebenschläfer, Bilch (D).
جنس حوريات قاتمة من فصيلة القرقدييات . انواعها قليلة . اجسامها صغيرة اللد مسطيلة . اذناها سوية اللون. اذنانها جبليات الصفوف . رؤوسها اسطوانية الشكل . سالها طويلة قاسية . عيونها كبيرة . آذانها مستديرة رصية . تسرح في الليل . تتسلق الاشجار . قوتها الثار والبول

٢١٨٦٦ - قَرْف
Ecimage (F).
هو المصف ، اطبله .

٢١٨٦٧ - قَرْف
Ecorce (F). Bark (E).
لحاء الشجر ، وكل قشر قرف . ويت قرف الرمان .

٢١٨٦٨ - قَرْف الزَوَالِد ، تَكَرِيف
Epamprage (F). Lopping off, Pruning (E).
تقليم الفصينات او السروع الزائدة في الكرم .

٢١٨٦٩ - قَرْفَة
Brou (F). Musk, Peel (E).
في غلاف صحال الشرة قبل جفافه او عند انفصاله يمد تمام الجفاف .

٢١٨٧٠ - قَرْفَة
Cannelle, Cannellier (F).
Cinnamon-tree (E).
جنس اشجار ومخبرات برية وزراعية من القرفيات وفصيلة القارليات . انواعه عديدة منهاها البلاد الاسيرية . سوقها منتسبة فراءه . اوراقها ابيدة متفة . ازهارها صغيرة اللد لا قياسية التجميع والارتكاز || جميعها من الافاوية

ازهارها وثمارها واوراقها ولحاء سوقها وطرورها وجلوورها عطرية للمادة ، لذعة الطعم . يستخرج منها طيوب وادهان طيارة شائعة الاستعمال الطبي . وفي تفيد اللد والكد ، تلبه الاصاب وتقلشها وتبهر بها . وين منافها انها مفادة للشنج . اشهر انواعها ما يلي .

٢١٨٧١ - قَرْفَة بَيْشَاه
Cannelle blanche (F).
Canella (E).
في البيلون ، اطبله .

٢١٨٧٢ - قَرْفَة سَرْكَدِيْب * ، قَرْفَة سِيلَان ، دَارَمِينِي

Cinnamomum Zeylanicum (S). Cannellier de Ceylan, Cinnamon (F). Common cinnamon tree, Cinnamon (E). Zimmetbaum, Zimmet, Zimmetrinde, Kaneel (D). Cannella, C. del Ceylan, Cinnamon (I).
شجرة زراعية من الافاوية مهدا سرينيب (سيلان) ساقها منتسبة فراءه تملو نحو ١٠ اطار . فروعها متقابلة الانتشاب ، مستقيمة الزوايا ، اوراقها متفة ، متقابلة ، بيفية الشكل ، ابيدة ؛ تصلها جامد النسيج ، مائل البشرة . اغضر الصفحة العليا ، بحري السفلي ، ثلاثي السروع الرئيسية || ازهارها صغرة اللد ، غبراء اللون ، عديدة الالامدية ، سداسية البلات . ازهارها عذقيدي التجميع ، تاجي الارتكاز . ثمارها عنقية لاصقة التفت والكم . جمع اعضاء الشجرة عطرية تستخرج منها الطيوب والادهان اما لحاء السوق والفروع فتعتبر من الافاوية الفاخرة الصنف .

٢١٨٧٣ - قَرْفَة صَيْبِيَّة * ، دَاَرْصُوصِي ، سَكِيحَة تَجَب

Cinnamomum obtusifolium, C. cassia (S). Cannellier casse, C. de Chine, C. d'Annam, C. du Tonkin, Laurier casse (F). Chinese cinnamon tree, Cassia tree (E). Kasien Zimmetbaum (D). Cinnamo cassia, Lauro cassia, Cassia lignea (I).
شجرة زراعية من الافاوية . اصلها فسيحة الارتباء تمتد من الالام الى الصين وتتش حتى ارتفاع ٢٠٠٠ م . من سطح البحر || ساقها منتسبة تملو من ١٣ الى ١٧ م . اوراقها ابيدة اهليجية متقابلة متفة . تصلها جامد الصفحة ، ثلاثي السروع الرئيسية . لونه الى الخضار البصري || ازهارها صغرة اللد لونها الى البياض الاخضر



قرفة سرنديب



قرفة صينية



قرفة ملبار



قرفول



تَرْقُذَنُ الْبَلَرُوط



تَرْقُذَنُ شَائِع



تَرْقُذَنُ



تَرْقُذَنُ اَبْقَةُ الشَّكَل



تَرْقُذَنُ التَّوْبَع



تَرْقُذَنُ اَزْرَق

شديد الصغر ، مكاثف الحلب ، يطول من ٢ الى ٣ سم. ثوبها الى الكلسة ، زياناها مطوقان بالاسود والابيض . ووشانها كبيران القند ، مكاثفا الخليل || ظهور الحشرة الجلجلة لا ينقطع طوال السنة ، وهي مبلولة في كل مكان من القبايات الى المساكن الملوثة || الاثنى اكبر قدأ من الذكر . تنجع مكثها في كل مكان مظلم رطب . ينقث المكان بعد متحه ياسويين عن قيرقات مستطيلة ، مسطحة القدم والمخبر ، متطيلة ابيض ، حليلة اخضر والرأس والشرج || تعيش على المواد النباتية المتحللة حتى الاكمال .

٢١٨٩٥ - تَرْقُذَنُ الْمُتَوَسِّط *

Phlebotomus papatasi (S).

Phlebotome papatasi (F).

حشرة من ذوات الجناحين وفصيلة القرقشيات . جسمها صغير الحجم ، يطول من ٢ الى ٥ سم. ثوبها الى الصفار الباهت ، غلي القشدار . رأسها مخروطي الشكل . خطمها معتدل القند . صدرها بياض القالب . بطنها اسطواني . زياناها كثيفا الحلب النقيص . صينها صغيرتان . ووشانها كبيرتان ، مهيانان || تظهر الحشرة الجلجلة من نيسان الى تشرين الثاني . تألف جميع المراتع الرطبة والشلط الرطيلة . تسرح في الليل وتختفي في النهار وراء كل شيء لانها تخشى ربح النور || تنجع الاثنى مكثها في كل مكان مظلم رطب وتحت الانقاض والحجارة . ينقث المكان بعد متحه بمدة فراعوس من اسبوعين الى ثلاثة || البقرة مستطيلة ، صبرها اسطوانية الشكل ، حليلة الخلد . خبرها اللون ، صبرها الرأس ، يطولها في مخبرها زوج من الحلب الجلجلة المستطيل . تعيش على المواد النباتية المتحللة حتى الاكمال .

٢١٨٩٦ - تَرْقُذَنُ سَكْبِيَت * سَكْبِيَت

Psychodidae (S). *Psychodidae* (F). *Psychodidae* (E).

فصيلة سحرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وراشها عديدة جميعها صغيرة القند زيدا الجسم والرواشن والقروذ الاستشمارية || اشهر اجناسها القرقشي .

Loir (F).

٢١٨٩٧ - تَرْقُذَنُ

هو الترقذ ، اطبله .

٢١٨٩٨ - تَرْقُذَنُ ، تَرْقُذَنُ

Parus (S).

Mésange (F). *Tie* (E).

جنس طير من فصيلة القرقشيات انواعه كثيرة البعد اعطائها العالم . اجناسها صغيرة القند . مناقيرها مخروطية الشكل ، جالسة ، قصيرة ، قوية . اجنحتها حوشلة القند . اذانها مطبوعة او فارقة . ارسافها صغيرة حبيبية الخلد || تألف القبايات والخلائق . قوتها الحشرات ويكثها ويرقاتها والبروز البرية والنائر || اثنائها تخضع مرتين في العام ، الاول في نيسان والثانية في تموز . عدد بيض الحفنة فراعوس بين ٦ و ١٦ اما الترسيم فيستمر من ١٤ الى ١٥ يوما . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

Parus coruleus (S).

Mésange bleue, *M. azuree* (F). *Blue titmouse* (E).

نوع من الترقذ ، طوله فراعوس بين ١١ و ١٢ سم. ثوبه جميل الالوان . قة رأسه وجناحاه وذنبه الى الزرقة السنجابية يطولها في الجناحين يتجيج ابيض . ظهره زيتوني ، بطنه اصفر ، صبرها الى البياض الناصع . طوق عنقه اسود اللون ازرق المواجه || وهو طائر ابد يالغ الاسراج والخلائق والجنان .

والجزر واللينق والكنسة وبيوض الصائير ... || اجناسها اركان تربتها بين شقوق الصخور او في صدوع الاشجار . اثنائها تنقع من ٦ الى ٦ اذراس تبصر وتكتفي بعد اسبوع وترضع نحو الشهر || اعرف انواعه ما يلي .

٢١٨٩٦ - تَرْقُذَنُ الْبَلَرُوط *

Myoxus nitadula (S). *Loir dryade* (F).

نوع من الترقذ ، طوله نحو ١٥ سم. وذنبه ٨ . ظهره اريد اصفر . بطنه ابيض اثير || موطنه يعتد من السج الى اروبة . يالغ اسراج الستيدان لان ركة فوته البلوط .

٢١٨٩٧ - تَرْقُذَنُ اَبْقُ

Myoxus elegans (S).

Loir élégant (F).

نوع من الترقذ . موطنه اليابان . طوله نحو ١٥ سم. وذنبه ٤ . ثوبه الى الصبغة الصندابية يمتد مع اقترابه من نج الظهر . رأسه جلوي المواجه ، بطنه وشوئي جرامزه الى الصفرة || قوتها اثار على احتلالها .

٢١٨٩٨ - تَرْقُذَنُ شَائِع *

Myoxus glis (S). *Loir commun* (F).

نوع من الترقذ . طوله نحو ١٦ سم. وذنبه ١٤ . ظهره الى الصبغة الزبداء يطولها مواجه اسود . بطنه وشوئي جرامزه الى البياض القضي . خداه وصفه واسفل ذنبه بيض . موطنه فسبح الاربعاء يعتد من القرق الى اطراف اروبة . يوجد في لبنان وسورية .

٢١٨٩٩ - تَرْقُذَنُ كَبِيَت * تَرْقُذَنُ كَبِيَت

Myoxidae (S). *Myoxidae* (F). *Myoxidae* (E).

فصيلة حيوانات لبرنة قافسة من مرتبة ترقذيات الشوزب ورتبة القواضم . اجناسها ثلاثة الترقذون والزغبة والقرب . موطنها العالم القديم || اجناسها صغيرة القند مستطيلة الشكل والذنب . برامطها العليا مطبوعة ، جوامزها قصيرة . جميعها شاجرة تسرح في الليل . قوتها اثار والمخبرات . يالها الشوئي يدوم نحو ستة اشهر .

٢١٩٠٠ - تَرْقُذَنُ كَبِيَت الشَّوْزَب *

مرتبة حيوانات لبرنة من رتبة القواضم تشمل حصى نصائل القرقذيات والفاغريات والمخلديات والجويبيسات والبريويسات

٢١٩٠١ - تَرْقُذَنُ قَدَر

Puteolus fidele (F).

هو ابن حرس مدن ، اطبله .

٢١٩٠٢ - تَرْقُذَنُ

Curcus (F).

هو الدنة البري ، اطبله .

٢١٩٠٣ - تَرْقُذَنُ ، سَكْبِيَت *

Phlebotomus (S).

Phlebotome (F).

جنس حشرات من فصيلة القرقشيات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القند ، طولا فراعوس بين ٢ و ٥ سم . اجناسها وراشها وقروها الاستشمارية حليلة اللشاه ، صفراء اللون ، متطيلة المواجه . اعطائها البلاد الحارة . ذكورها تعيش على رقيق الاضمار والافرازات السكرية النباتية . اثنائها تنقص اللحم حيث تستطيع . لسنتها مزبغة يقال انها تنقل الحصى البردية رعية حلب .

٢١٩٠٤ - تَرْقُذَنُ اَزْبِيَةُ الشَّكَل *

Psychods phalaenoides (S).

Psychode phalénoidé (F).

حشرة من ذوات الجناحين وفصيلة القرقشيات . جسمها

Alcedinidae (S).

٢١٩٠٨ - قُرْلِيَّات

Alcedinidae (F). Alcedinidae (E).

فصيلة طير من الجواثم المصصقات الأصابع تتميز بصغر حجمها وسدنة صبرها وسرعة اختفائها. رؤوسها غليظة. أجسامها ربعة منكمشة. مناقيرها قوية مستطيلة ذلقة. أجنحتها متوسطة القد. أذناها وأرأسها قصيرة. ألوانها قزمية الألوان الزاهية || أجناسها وألوانها عديدة تتجمع إلى عازمين القريات والمأزوريات.

Alcedo (S).

٢١٩٠٩ - قُرْلِي، قَاوُكْد

Martin-pêcheur (F). Plad kingfisher, Ceryle rudis (E).

جنس طير من القريات. أنواعه ٣٠ موطنها العالم. ذكره في المناطق الحارة والمعتدلة. تتميز باستطالة مناقيرها السود. أجنحتها متوسطة القد مستدرة. أذناها وأرأسها قصيرة. ألوانها قزمية الألوان الزاهية الجميلة || وقد قيل فيه : طائر حزموم حوى بأسطى عليه إلى قمر الماء طمعا || هو ما يصيده ويرفع الأخرى سلفا بما يصيده منه المثل « هو احزم أو احل من قري إن رأى غيرا تدل وإن رأى شرا توله » || وذلك لأنه إذا أبصر في الماء ما يستغل بحمله انقض عليه كالهمر الحمرل فانخرجه من قمر الماء وإذا أبصر في الجو كاسرا دخل البر هربا بسرعة البتلة. احرف أنواعه واشهرها ما يتبع.

Alcedo cyanotis (S).

٢١٩١٠ - قُرْلِي أَزْرَقْ *

Martin-pêcheur bleuâtre (F).

طائر من القري. ثوبه إلى الزرقة الجميلة الخضراء الملاج. مناقره أسيد. ريشه إلى الجفوة. موطنه أفريقية الغربية. اخلاقه اخلاق القري الشائع.

Alcedo bangalensis (S).

٢١٩١١ - قُرْلِي بَنَغَالِي

Martin-pêcheur bengalis (F).

طائر من القري. ثوبه قزحي الألوان الحاركة الجلال. موطنه يمتد من الهند إلى أقصى الشرق. أرياشه مزرقرة، ثميته، مرغوب فيها || اخلاقه اخلاق القري الشائع.

٢١٩١٢ - قُرْلِي شَالِعْ * ، قَاوُكْد شَالِعْ ، أَبِي

الرَقَصْ ، صَلاَعِبْ فَلِيلْ

Alcedo ispida (S). Martin-pêcheur vulgaire (F).

Common kingfisher (E).

طائر من القري. مناقره اسمر. رأسه مرقط. زوجه وأعل عتقه إلى البياض العاجي. حمراره إلى الصبغة القائمة. ظهوره لآزوردي. قنقه وبتناحه إلى الزرقة الخضراء الملاج. صدره وبتنه إلى الشبه الصفاء. ذنبه إلى الزرقة المخططة الملاج. ريشه إلى الجفوة || موطنه يمتد من الهند إلى بلاد فارس والشرق الأوسط وأروبة وأفريقية الشمالية. يألث جرف مجاري الماء وصفات الصفاء. قوته الاسماك والفقريات والحشرات || أثناء تبيض من ٦ إلى ٨ بيضات تحضنها وحدها من ١٩ إلى ٢١ يوما.

Alcedo cristata (S).

٢١٩١٣ - قُرْلِي قُتْبَرَانِي *

Martin-pêcheur huppé (F).

طائر من القري. ثوبه قزحي الألوان الجميلة. رأسه قزحي الريش. موطنه أفريقية الشرقية والشمالية || اخلاقه اخلاق القري الشائع.

Alcedinini (F).

٢١٩١٤ - قُرْلِيَّات

عمارة طير من القريات تشبه القري والقراف وخطب الماء. جميعها صغيرة الحجم، زاهية الألوان المتراكبة.

٢١٩٠٠ - قُرْتُفُ الْمَقَاصِبِ

Mésange des roseaux (F).

طائر من القريات يدهى سبال، اطلبه.

٢١٩٠١ - قُرْتُفُ قُتْبَرَانِي *

Parus cristatus (S).

Mésange huppée (F).

نوع من القرفت، طولها يراوح بين ١٠ و ١٢ سم. رأسه قنبري الريش الاسود المنقح بالاكيب. ظهوره إلى الصبغة الرمضاء. بطنه إلى الصبغة البهراء الصفراء الملاج. زوجه اسود، عتقه مطوق بالاسود والابيض. حمراره إلى البياض. الاغبر تملوه وقشة سراء || يألث احراج السنوبر.

Parus major (S).

٢١٩٠٢ - قُرْتُفُ كَبِير *

Mésange charbonnière, Mésangère (F). Graat tilmouse, Ox-eye (E).

نوع من القرفت، طولها يراوح بين ١٢ و ١٥ سم. ثوبه متراكب الألوان. ظهوره إلى الخضار القزبي يملوه مواج اصفر. بطنه إلى الصفرة الباهجة يملوه خط قاطب اسود يمتد من طول العنق إلى اواسط البطن. رأسه وعتقه إلى السوداء اللامع، حمراره وقفته يبيض، جنتاه وذنبه إلى الزرقة الزرادية. قوامه يفيض الحمار || يألث الحدائق والجنائن والنباتات والاشجار.

Fauvette orphée (F).

٢١٩٠٣ - قُرْتُفَتَة

طائر من النخل. اطلب دخلة خفيفة.

Paridae (S).

٢١٩٠٤ - قُرْلِيَّات

Paridae (F). Paridae (E).

فصيلة طير من الجواثم افروسيات المناقير، اجناسها وألوانها كثيرة العدد. اصطناعها العالم. معظمها غري. ذكورها واناثها متشابهة. تعيش على الاشجار. قوتها الحشرات وبتنها وريقاتها والثمار والبزور || تثن في تجاريف الاشجار وارقاب الصغور والابنية المهجورة. اركنها كروية الشكل تحببها بمهارة وتفرشها بالورب والصفوف.

Calendula officinalis (F).

٢١٩٠٥ - قُرْلَهَان

هو الاذرين الهزني، اطلبه.

Pristipoma stridens (S).

٢١٩٠٦ - قُرْقُور *

Pristipome strident (F).

سمكة من الشجرم تقتني إلى فصيلة القرفيات. طولها نحو ٥٠ سم. ثوبها إلى الكهبة الغضبية للملاج. حراشها مبدية. زامتها كبيرة، الظهريه مستطيلة شالكة والشرجي فارقة. يكثر وجوده في المتوسط والبحر الاحمر.

Coriscus rostratus (S).

٢١٩٠٧ - قُرْقُوس *

Sublet groin, Sublet, Sublaire (F).

Coriscus rostratus (E).

سمكة بحرية يبيض من فصيلة الكيديات. اصطناعها البحر الابيض المتوسط. مسرهما حشاش المهادن والاغواط || جسمها احليلجي القوي يتلون من ١٠ إلى ١٥ سم. ثوبها إلى الخضار الخجلي الملاج يملوه شمشع وردي واصفر. رأسها مخروطي، ذات القبط المنقح. زمنتها الظهريه مستطيلة تنتهي بمستوى الشرجية. زمنتها القبلية شبه منطوية || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه.



قُرْتُفُ قُتْبَرَانِي



قُرْتُفُ كَبِير



قُرْقُور



قُرْقُوس



قُرْلِي أَزْرَقْ



قُرْلِي شَالِعْ



قُرْلِي قُتْبَرَانِي



قرمطة البرازيل



قرمزة استرالية



قرمزة البرتقال البيضاء



قرمزة البرتقال السوداء



قرمزة التفاح



قرمزة الثوت

الولج . مكانها غدد الصفعة ابيض اللون يحوي من ٦٠٠ الى ٨٠٠ مكنة قرمزية اللون ممرسة السنف . لها جيلان في الحول، الاول يستمر من آذار الى تموز والثاني من آب الى شباط || تركيب الحشويات والورد ويسقط والدار والوردياء وبالطباط || تكاثر عند نفث مكن الجليل الاول وذلك في خلال شهر نيسان .

٢١٩٢١ - قُرْمِزِيَّة البُرْتُقَالِ البَيْضَاء * مَغْفِرِيَّة الحَشَوِيَّات الدَّقِيقِيَّة ، كُوشَنِيَل البُرْتُقَالِ الْاَيْض

Pseudococcus citri, *Dactylopius citri* (S). *Cochenilla* *blanche de Foranger*, *C. farineuse de Foranger* (F). حشرة من القرمزيات . انتاها سمره اللون ، حراء الملوخ، بيضيه الشكل ، ملشارية الخنار، تطلو من ٦ الى ٦٠٠ م. جسمها مثنى بمادة دقيقة بيضاء. مكانها يحوي من ٤٠٠ الى ٥٠٠ مكنة صفراء اللون || ايجالها الحولية تاروح بين ٤ و ٥ تركيب الحشويات والكرية والتين والغرنوب والصبار ... وهي شديدة الاذى تقضي على الاوراق والازهار والبار || مكافحتها صعبة تستلزم عناية خاصة قوامها التطوير بالانزات السامة . وقد تم الآ استعمال الحشرات المضادة التي تقضي عليها اغصها الكريبتولوس (Cryptoloeus).

٢١٩٢٢ - قُرْمِزِيَّة البُرْتُقَالِ السَّوَدَاء * ، مُكَمَلَة البُرْتُقَالِ السَّوَدَاء ، حَشَرَة قَشْرِيَّة سَوَدَاء ، كُوشَنِيَل البُرْتُقَالِ السَّوَدَاء

Aspidiotus zonidum, *Parlatoria ziziphi* (S). *Cochenille* *noire de Foranger*, *Aspidiot de Foranger* (F). حشرة من القرمزيات . دقيقها مسطحة الشكل قائمة الزوايا تطلو نحو ١ م. ستة خطوط وتوسر نحو ٦ خطوط. قوامها الى السواد اللامع . مكانها تخروبي الشكل يجمع الخنار الابيض يحوي نحو ٣٠ مكنة رافية الشكل ، بنسجية اللون || ايجالها الحولية من ٢ الى ٣ تركيب الحشويات دون غيرها وهي لا تقرب الشاب ابدأ في حين ان تسيبها الملحية كثير اليه || تكاثر باستعمال مزيج من الزيت النباتية والبيضاء .

٢١٩٢٣ - قُرْمِزِيَّة التفاح * ، وَهَن حَكَوِي ، مَغْفِرِيَّة التفاح المَدَنِيَّة ، كُوشَنِيَل التفاح ، كُرْمِيس التفاح ، دَسْبُوس التفاح

Lepidosaphes ulmi, *L. ceratoniae*, *Mytilaspis flava*, *M. pomorum*, *Diapris pomorum* (S). *Cochenille* *du pommier*, *C. virgule du pommier*, *Kermès virgule*, *Diapris du pommier* (F). *Muscal scale* (E). حشرة من القرمزيات فاصلة الشكل ، دقيقة . طولا من ٣ الى ٤ م. قوامها الى الخشن الايمن تفسله مادة شمعية بيضاء . مكانها يحوي من ٤٠٠ الى ٦٠٠ مكنة حنطية اللون || جبلها الحول واحد وهي تركيب التفاح واللاجاس والحوخ والمشمش والجوز والارز والورد والورد والحوخ والصنصن ... || تكاثر على اثر نفث المكن وقد يكون ذلك في حزيران .

٢١٩٢٤ - قُرْمِزِيَّة الثَّوْت * ، مُكَمَلَة الثَّوْت ، دَسْبُوس الثَّوْت

Diapris pentagona, *Pseudaulacaspis pentagona* (S). *Cochenille* *du mûrier*, *Diapris du mûrier* (F). حشرة من القرمزيات . دقيقها صافية ظهرها يراوح من

روسيها خفيفة . مناقيرها سادة مسطحة . ارسافها قصيرة . تألف خطوط البصار ويرف الانهار وصفات البحيرات . قوتها الاسماك والقشريات والحشرات || تكثر في الفاحيص تحصرها في الاماكن الرطبة المشرية حل مجاري الماء .

٢١٩٢٥ - قُرْم * « ثوب كالدب غلفاً وبياضاً » ينبت في جوف البحر (اللسان) .

٢١٩٢٦ - قُرْم الفحل الكرم من الابل الذي ترك للقملة لم يسه حبل ولم يحمل عليه || وقيل السيد العظيم حل تشبيهه بالفحل . قال المتنبي : ولكننا نأصحب منسلك قُرْمًا تراجمت القروم له حفاقا

٢١٩٢٧ - قُرْمَاط * *Curimatus* (S). *Curimatus* (F). *Curimatus* (E).

جنس اسماك نهريه من ملتوحات الحافة وصبيلة السلمونيات. انواعها المعروفة لا تتجاوز المشرية . اصطناعها المياه السطية الايركية اغصها امريكة الجنوبية || اجسامها اهلبيجية الشكل ، متوسطة القد . تتميز باصطناعها الحادة الاطراف الدرية القاطعة وبشكلها الخالية من الانسان || اشهر انواعها قرامطة البرازيل .

٢١٩٢٨ - قُرْمَاطَة البرازيل * *Curimatus laticeps* (S). *Curimatus laticeps* (E). *C. du Brésil* (F). *Curimatus laticeps* (E).

نوع من القرامط . مهدا نهر البرازيل وبحيرات وفي شاعت تربيتها في اكثر صامك العالم لانها سرورية وقلة التطلبات ، جيدة اللحم || جسمها اهلبيجي الشرن يطول نحو ٣٠ م. رأسها عذروني الشكل ، مستعرض القاعده . قوامها الى الخشار القضي يثق مع التراب من ثوب القير ويؤزو عند البطن . زعنفتها الظهرية واحدة شبه شراية الشكل يتبعها في مؤخر الظهر جعدة فخرورية . زعنفتها الشريفة تقابل الجعدة . زعنفتها الذيلية فارقة || اغصها جيد الصنف مغروب فيه .

٢١٩٢٩ - قُرْمِزِيَّة ، مَغْفِرِيَّة ، حَشَرَة قَشْرِيَّة ، مُكَمَلَة الثَّوْت ، كُرْمِيس ، كُوشَنِيَل مَغْفِر

Cochenille, *Kermès*, *Céroplata* (F). *Cochineal*, *Kermès* (E).

اسم شامل يطلق على مختلف انواع القرمز والمغفر وهي حشرات صغيرة القند تقضي الى فصيلة المغفرات. تركيب الاشجار المشرية ويغمرها من التباتات الزراعية والحرجية فتؤذيها وتوقع بها الاضرار || اشرف انواعها المؤذية ما على .

٢١٩٢٠ - قُرْمِزِيَّة اُسْتَرَالِيَّة * ، كُوشَنِيَل اُسْتَرَالِي ، اِسْتَار

Icerya purchasi, *Pericarya purchasi* (S). *Cochenille* *australienne*, *Icerya* (F).

حشرة من القرمزيات طول الذكر فيها يراوح بين ١ و ٢ م. ثوبه الى الحمرة، جناحه الى البياض الشفاف . (S) الاثني تطلو من ٤ الى ٥ م. ومكانها يطول من ٣ الى ٤ م. جسمها وردي اللون تغشاها خيوط زغبية شمعية فضية

٢ م. وسطى الى ٢ م. واربعة خطوط. ثوبها الى البياض الاغبر. الذكر يطول نحو ١ م. وخسة خطوط وهو يتغالىق اللون. شفاط الخناج. سريع الحركة. الانثى مستعرضة الشكل، صفراء اللون. اجيالها الحولية ثلاثة. مكثها اصفر اللون تنجح على اللبوق والاضمان والافنان ابتداء من اواخر نيسان فينتفج ابتداء من اواخر ايار || تركب التوت والبراقز واللشش والاروز والكشمش والياعين والصفصاف || تكاتف باستعمال الحشرات المضادة او بعض الحواشير الفعالة اغصها الملوكن الشقية كالزيت النباتية المركزة بمعدل ٢٪.

٢١٩٢٩ - قمرزفة الصبار ، كوشنيل الصبار
Diaspis echinocacti (S). Cochenille des cactées (F).
حشرة من القمرزفات. درفها صابية الشكل قطرها نحو ٢ م. انثاها مستعرضة، مبطلة، ثوبها الى الخضرة المبراة. اجيالها الحولية ثلاثة. تركب نباتات الصبار على اختلاف اجناسها وانواعها || تكاتف باستعمال اسد الحواشير الفعالة على حدة دفحات متتالية فترها تراوح من ١٥ الى ١٢ يوما.

٢١٩٣٠ - قمرزفة القرنوس
Eulecanium corni (S). Lecanium du cornouiller, Cochenille du cornouiller (F).
حشرة صغيرة من القمرزفات. انثاها بيضية الشكل مبطلة، تطول نحو ٦ م. وتعرض ٤ م. ثوبها الى الجوزة الالامسة. زيانها سباجية الفواصل. مكثها نحو ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ مكنة تنفج بهد منها باسويين اذا كان ذلك في حزيران او في تموز || وهي من الحشرات البنية الملوذبة. تركب القرنوس والكرمة والخوخ والدرافق والجوز والبنق والورد والسنديان والبليلة. تصطب الاناث وتبيضن الثمار وتسبب الختان || تكاتف في الشتاء باستعمال سائل الكريوتيل المركز من ٤ الى ٥ ٪ وتكاتف في الصيف من تموز الى آب باستعمال مركبات الباراثيون او اسد الحواشير الفعالة او الزيتون البيضاء المركزة من ١ الى ٢ ٪ على ان يتجه النشغ من اسفل الى اهل ليم جميع صفحات الاوراق السفلى.

٢١٩٣١ - قمرزفة الكرم القبراء ، كوشنيل الكرم القبراء
Heliothecus hyssici, Phenacoccus hyssici (S). Cochenille farineuse de la vigne (F).
حشرة من القمرزفات. طويها نحو ٤ م. لونها وردي. زشها الشمعي يلحف الظفر دون سواء. مكثها وشي نحو ٤٥ الى ٦٠ مكنة ريفية الشكل حمراء اللون. اجيالها الحولية ثلاثة. تركب الكرمة والعنب.

٢١٩٣٢ - قمرزفة الكرمة البيضاء ، دمة بيشام
Dactylopius vitis (S). Cochenille blanche de la vigne (F).
حشرة من القمرزفات. جسمها بيضي مفلطح. ذكرها مجنح يطول نحو ١ م. لونه الى الصفرة. انثاها عديمة الجناح، تطول نحو ٤ م. لونها الى الجوزة الصفراء. تفرز مادة شمعية بياض اللون تنشجها بكاملها. تمتع مكثها على صفة النصل السفلى في خلال حزيران فينتفج من رقات هسة تحصى صلالة الاوراق ولا تنف من العنب. ثم تقضي ياتها الشتوي في شقوق غلاف الجلود ويصنع انتشاج الجلود في التربة || تكاتف بكشط اللحاء القديمة اليابسة وبطرش الجلود بماء الكلور او بسائل سفلات الخلد المحلول ١٠٪.

٢١٩٣٣ - قمرزفة الكرمة الحمراء ، قمرزفة الكرمة الطوطية ، كوشنيل طوطي
Pulvinaria vitis (S). Cochenille floconneuse de la vigne, C. rouge de la vigne (F). Grappe scale (E). Wollige Reben Schildlaus (D).
حشرة من القمرزفات. درفها بيضية الشكل تطول من ٤ الى

٢ م. وسطى الى ٢ م. واربعة خطوط. ثوبها الى البياض الاغبر. الذكر يطول نحو ١ م. وخسة خطوط وهو يتغالىق اللون. شفاط الخناج. سريع الحركة. الانثى مستعرضة الشكل، صفراء اللون. اجيالها الحولية ثلاثة. مكثها اصفر اللون تنجح على اللبوق والاضمان والافنان ابتداء من اواخر نيسان فينتفج ابتداء من اواخر ايار || تركب التوت والبراقز واللشش والاروز والكشمش والياعين والصفصاف || تكاتف باستعمال الحشرات المضادة او بعض الحواشير الفعالة اغصها الملوكن الشقية كالزيت النباتية المركزة بمعدل ٢٪.

٢١٩٢٥ - قمرزفة الحمضيات ، وعسف الحمضيات ، وعسف ارجواني

Lapidaspis citricola, L. pinnaeformis (S). Cochenille virgule des oranges (F).
حشرة من القمرزفات. درفها مبدية الشكل ثوبها الى البسرة. حثارها اغبر، فلانها شمعي اللادة على التركيب. طويها يراوح من ٢ م. وخسة خطوط الى ٤ م. وخسة خطوط. عرضها نحو ٢ م. مكثها مستطيل الحجاب نحو ٢٠٠ الى ٤٠٠ مكنة وشعية الشكل حطيفة اللون. اجيالها الحولية تراوح من ثلاثة الى اربعة. تركب اوراق الافنان وثمار الحمضيات اغصها البرتقال واليوسفي وليوسف الجنة || تكاتف باستعمال الغزازات السامة لان الحواشير والزيتون البيضاء لا تقضي عليها تماما فطرأ لكثرة وجودها على صفحات الاوراق العليا.

٢١٩٢٦ - قمرزفة الخرنوب ، كوشنيل الخرنوب
Chionopsis carstoniae (S). Cochenille du caroubier (F).
حشرة من القمرزفات، اجاصية الشكل مفلطحة. الذكر حاجي اللون طوله نحو ١ م. الانثى يتغالىق اللون تطول نحو ٣ م. || يقال ان جيلها الحولي واحد، تركب اوراق الخرنوب واللؤلؤ والزيتون || تكاتف باستعمال الزيتون النباتية والبيضاء.

٢١٩٢٧ - قمرزفة الزيتون السوداء ، قمرزفة الزيتون المخططة ، كرميس الزيتون
Saissetia oleae, Lecanium oleae (S). Cochenille noire de l'olivier, Lécane de l'olivier, Kermès de l'olivier (F).
حشرة من القمرزفات. درفها بيضية الشكل تطول من ٢ الى ٤ م. وتعرض من ٢ الى ٣ ثوبها الى البسرة الفسجية. مكثها مكور الشكل نحو ١٠٠٠ الى ١٩٠٠ مكنة ريفية، حطيفة اللون || جيلها الحولي واحد. تمتع مكثها ابتداء من ايار وييسر الى اواخر تموز. اما القنفذ فينتفج بهد اللع يتنوع ثلاثة اسابيع || تركب الزيتون والحمضيات واللؤلؤ واليوسف... قنسب الختان الاسود بالإضافة الى اضرارها || تكاتف باستعمال الحشرات المضادة او الزيتون الشقية البيضاء او الحواشير الفعالة الصيفية.

٢١٩٢٨ - قمرزفة السنديان ، كرميس السنديان
Lecanium ilicis (S). Cochenille du chêne vert, Lécane du chêne vert, Kermès du chêne (F).
حشرة من القمرزفات. درفها مستديرة. سواء القرص، صفراء الجسم، مرقطة الختان تحققة مادة شمعية لزنية،



قمرزفة الحمضيات



قمرزفة الخرنوب




قمرزفة الزيتون السوداء



قمرزفة الكرم القبراء




قمرزفة الكرمة البيضاء



قمرزفة الكرمة الحمراء



قزمية اللوز



قزمية النخيل



قزمية اللوز



قزمية فتاكه



قزمية فرومزه



قزمو

باستعمال اسد الحواشير الفعالة موزعاً بالزيت الابيض .
وقد تجري لمكافحة حل عدة مرات ابتداء من زين القملة .

٢١٩٣٨ - قزمية فرومزه * ، مفترسة مذبذبة ، وعف صيني

Lepidosaphes gloweri (S). Serpette (F).
حشرة من القزميات . مقسية الشكل سمراء الثوب طولها يتوسط من ٣ م . الى ٣ م . وخمسة خطوط ، بينها عرضها من خطين الى ثلاثة خطوط . غشاء ظهرها شهي المادة ، نحيل النسيج ، ابيض اللون . مكنتها يحوي نحو ٢٠٠ مكنة رنية الشكل ، وردية اللون || ابيها الحولية ثلاثة . تركب اوراق الحنفيات ولكنكالية . تكافح مكافحة قزمية الحنفيات .

٢١٩٣٩ - قزميات ، مفترسات ، كرميات *Coccidae* (S). *Coccidae* (F). *Coccidae*, *Scale* *Insecta* (E). *Schildläuse* (D).

فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة البعد جميعها صغيرة الله ، مزدوجة الشكل ، لا نظامية التناسل منها البيوضة والوردة والسرولة || ذكورها مستطيلة الشكل مجنسة . اجنسها شائعة ، ثنائية الفروق الناطقة . اناثها عادمة الجناح ، مستعرة مطقة ، وروسيه وجوانها مندهجة ، متاكها ثالثة ماصة . قوائمها قصيرة ، اسافلها وريدة المقلدة ، مقلاتها فردية ، مدبية . اغشية اجسادها هدية تفرز بعض المواد الزلالية كالشمع والشمع واللصق والغرير وما اشبه || اشهر اقسامها القزمية والقرمز والقرمز

٢١٩٤٠ - قزمو *Chamaea* (F). *Camela* (F).

الابل الصغار الكثيرة الاورار ذات السنين .

٢١٩٤١ - قزمو *Capselle* (F).

٢١٩٤٢ - قزمو *Tragelaphus selousi* (S).

Tragelaphus de Selous (F). *Statunga* (E).
نوع من الجبل قده قدر اللب . ثوبه اشبه احمر يملو تجلج وتبيج || يألف المنافع ويقيم كئامه بقرها . ج . قراميد . والاني قزمو .

٢١٩٤٣ - قزمو ، افحوص *Nid en terre* (F). *Nest in land* (E).

وكر الطائر حيث ينصنع في الارض .

٢١٩٤٤ - قزمو ، سلور النيل *Clarias anguillaris* (S). *Clarias commun*, *C. du Nil* (F). *Common catfish* (E).

نوع من الجبل يكثر وجوده في النيل وهو قريب الشبه بالكنكليس الا انه مفلطح الرأس . طوله نحو ٦٠ سم . ثوبه الى السمرة الزرقية يملو موج اخضر || لحمه حادي الصنف والمذاق .

٢١٩٤٥ - قزمو *Bouquetin femelle* (F). *She ibex* (E).

هي انثى الويل . ج . قراميد .

٢١٩٤٦ - قزمو *Tulle* (F). *Tile* (E).

صفيحة من الصلصال الجادة او المنصت المشوي .

٢١٩٤٧ - قرن *Accouplement*, *Accouplement*, *Attelage* (F). *Coupling*, *Harnessing*, *Yoking* (E).

هو شد او ربط البهائم للمرث او للجر ...

٥ م . وتقرض من ٣ الى ٤ م . ثوبها الى السمرة الناعية . مكنتها كبير اللد طولي المادة اللوحة البيضاء يحوي من ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ مكنة رنية الشكل ، سمراء اللون ، جزوية المواج || جيلها الحولي واحد . تنجح مكنتها من اواخر ايار الى اواخر فيف في تموز وكب . تركب الكرية والريلا واللفش . تكافح كئامها من القزميات باستعمال اسد الحواشير الفعالة .

٢١٩٣٤ - قزمية اللوز * ، كوشيل اللوز *Locanium amygdali* (S). *Cochenille de l'amygdier*, *Lécanio* (F).

حشرة من القزميات . مستدرة الشكل قطرها نحو ١ م . وخمسة خطوط . ثوبها الى الرمادي . افرايزها لزج اسمر . مكنتها مركزي ، اطول اللون ، يحوي نحو ٢٠٠ مكنة وشعية الشكل ، حسنة اللون || جيلها الحولي واحد . تركب اوراق ولوراق جميع الاشجار القوزية انصها اللوز . تكافح في الشتاء باستعمال مزيج من الزيت الابيض والناتبي المركز بمعدل ٢٪ .

٢١٩٣٥ - قزمية النخيل * ، وكمه النخيل ، كوشيل النخيل *Parlotes blanchardi*, *Websteriella blanchardi* (S). *Cochenille du dattier* (F).

حشرة من القزميات . اطرافها تشعل نخيل العالم . الذكر دقيق نخيل ابيض اللون بطول نحو ١ م . الانثى بنفسجية اللون رمعية الشكل طول نحو ١ م وثلاثة خطوط . رديتها سمراء اللون يحويها حاد من الرطب شهي المادة اطول اللون . مكنتها يحوي من ٤٠ الى ٨٠ مكنة كروية الشكل ردية اللون || ابيها الحولية ثلاثة او اربعة . تركب نخيل النخيل فتذيق اشه الاثني || تكافح باستعمال الزيوت النباتية او بعض الحواشير الفعالة الجبرية .

٢١٩٣٦ - قزمية اللوز * ، ديسوس اللوز ، قملة اللوز ، كرميس اللوز ، كوشيل اللوز *Diaspis rosae*, *Aulacaspis rosae* (S). *Cochenille du rosier*, *Diaspina du rosier*, *Kermès du rosier*, *Pou du rosier* (F).

حشرة من القزميات . رديتها صابية الشكل قطرها يراوح من ٢ الى ٣ م . ثوبها الى الجوزة حادها ابيض . الذكر خري اللون . ابيض الجناح ، بطول نحو ١ م . الانثى مستطيلة الشكل حمراء اللون . مكنتها جراب مستعرض يحوي نحو ١٠٠ مكنة رنية الشكل خرية اللون || جيلها الحولي واحد . تركب اللوز والشمج . تكافح باستعمال الزيوت البيضاء موزبة بالزيوت النباتية بمعدل ٥ و ١٪ .

٢١٩٣٧ - قزمية فتاكه * ، قملة سكان جوزة ، كوشيل سكان جوزة *Aonidiella perniciosus*, *Aspidiotus perniciosus*, *Quadrasipterus perniciosus* (S). *Pou de San José*, *Cochenille de San José* (F).

حشرة من القزميات . رديتها صابية الشكل قطرها نحو ٢ م . ثوبها الى الرمادي الاسمر تملو رقة بيضاء . الانثى سرولة صفراء اللون ، حسنة المواج تنقص بطول سنة اسابيع ما تقدر ٤٠٠ رقة || ابيها الحولية تراوح من ٣ الى ٤ تركب التفاح والاباصم والدرقان والخوخ والشمج والكرز والصرة والقزوين والورد ... || تتركز على سوق واغصان يروع النبات حيث تنصص الفسح || تكافح

حيات سامة من فصيلة الاناميا لها نتوان صغيران في رأسها كأنها قرنان . أنوعها أربعة جميعها خفيفة تسرح في الليل . موطنها الصحاري من مراکش الى جنوب الهند . تكثر في تونس وليبيا ومصر والجزيرة العربية حيث تندس في الرمل فاذا مر بها احد لدنته || أنوعها : ابن قرة ، سارية ، قرنا مصرية ، قصرى .

٢١٩٥٦ - قَرْبِيّ شَوْش
Locier cultivé (F).
هو اصابع العروس ، راجسه .

٢١٩٥٧ - قَرْبِيّ
Capricorne, Longicorne (F).
Longicorn, Long horned beetle (E).
جنس حشرات من فصيلة القرنبيات . أنواعه كثيرة المد تميز باجسامها الكبيرة القند المهدبة الظهر وبجرانها وقوتها الاستثنائية المستعيلة . قال الاخطل يصف جارية وبها :

الا يا حباد اقد ظلي ميم
ياحسن من صل واتبعهم بعل
ينام اذا نامت حل عكاتها
ويلم فساداً كالسلالة او اسل
يدب الى احشائها كل ليلة
ديب القرني بات يملو نقاً سهل

٢١٩٥٨ - قَرْبِيّ الدَّب *
Xystrocrea globosa (S). Xystrocrea globuleux (F).
حشرة من القرنبيات . ريشة الشكل . محبة الظلم طويلاً نحو ٢٢ سم . ثوبا الى البني ثوبه حرة قائمة واخاذه خضر تملو الاغاد || يرقاتها تركيب الدلب والنسج والقيح تنتشر السرق وتعلها .

٢١٩٥٩ - قَرْبِيّ السنديان *
Cerambyx cardo (S). Capricorne (le grand). Capricorne du chêne (F). Great capricorn beetle (E). Grosser Eichenbock (D).
حشرة من القرنبيات . طويلاً نحو ٥ سم ، ثوبا الى السرة ، ماجتها خشبية لامة . زباناها مستطيلة . تسرح عند الغروب || يرقاتها كبيرة القند تعيش اربع سنوات داخل السرايد التي تحفرها في خشب السنديان .

٢١٩٦٠ - قَرْبِيّ المصصاف * ، لامية المصصاف
Lamia textor (S).
Lamia des saules (F).
حشرة من القرنبيات طويلاً نحو ٢٧ سم . ثوبا الى السواد النحسي || يرقاتها نحيلة القند تركيب جلودع وسوق المصصاف والخور قندسها وتعلها .

٢١٩٦١ - قَرْبِيّ صغيرة *
Cerambyx scopoli (S). Capricorne (le petit) (F). Capricorn beetle (E). Buchenbock (D).
حشرة من القرنبيات طويلاً نحو ٢٢ سم . ثوبا الى السرة الداكنة . تعيش حل ازهار الفروديات والطحيبات والبلسان . تسرح في النهار || يرقاتها تركيب سرق الاشجار الحرجية ولا تمتع عن الاشجار للتمرة اعصها التفاح والكرز والبتين .

٢١٩٦٢ - قَرْبِيّ مسكية
Aromie musquée
هي الاروية المسكية ، اطبا .

٢١٩٤٨ - قَرْن * هو السفة ، اطبا .

٢١٩٤٩ - قَرْن
Corne (F). Horn (E).
ج قرن . والقرن يوارز قاسية غضلفة الاجسام والاشكال تنشأ على رؤوس بعض الحيلوانات كالبقير والتمم والظباء والمناخر وغيرها ...

٢١٩٥٠ - قَرْن إسفصاري ، دُبائي ، رُبان
Antenne (F). Antenna (E).
عضو مفصل متحرك شكله كالترن يكون في رأس الحشرات وبعض الحيلوانات الدنيا . وما قرنان وزبانيان تستعملها الحشرات للمس كما في الجراد او القس كما في الذباب او اللس كما في اليموس او للضام كما في النمل || والقرن الاستثنائية عديدة الاشكال غضلفة الاجسام والتركيب وقد وضع لكل شكل منها كلمة تعريف خاصة . أشهرها :
أرسي
Aristée (F). Aristate (E).
عظمي
Filliforme (F). Filliform (E).
رأسي
Capitulée (F). Capitata (E).
ريشي
Pennée (F). Pinnate (E).
شوكي
Sétacée (F). Setaeous (E).
صيني
Lamelée (F). Lamellar, Scaly (E).
صوتياني ، صقي
Calviforme (F). Calviform (E).
قلادي ، سبهي
Moniliforme (F). Moniliform (E).
غزاري
Stylée (F). Stylate (E).
مرفقي
Coudée (F). Bent (E).
مسطحي ، عالي
Pectinée (F). Pectinata (E).
مسطحي مزدوج
Bipectinée (F). Bipectinate (E).
منشاري
Serrulée (F). Serrate (E).

٢١٩٥١ - قَرْن الأروس
Platycerium bifurcatum (S). Platycerium à cornes d'élan (F). Common staghorn fern, Elk's horn fern (E). Geweihfarn (D). Alceorne (I).
نبات عشبي يساهي بممر من البرصيات يزرع لتزيين . أرواته قرصية الانتشاب ، مستقيمة اللون ، خشبية الفلج ، منشعبة كقرون الاروس .

٢١٩٥٢ - قَرْن الأيل
Coronope (F).
هو لسان الحمل القرني ، اطبا .

٢١٩٥٣ - قَرْن الغزال
Lozier corniculé (F).
هو الرطس القرني ، اطبا .

٢١٩٥٤ - قَرْنَاء
Ceratoccephalus (S).
Cératocéphale (F).
جنس نباتات عشبية ، حولية ، برية من فصيلة الشقيقيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها جبال البلاد المحتلة الحارة من الشرق الاذن || سوقها قصيرة فراء . أرواقها متعاقبة . معقة ، كفية ، مفروسة وبشيرة . انزاقها صغيرة صفراء اللون ، خامسة التركيب ، قليلة الاندية ، مشرقة . يحرسها النمل || تنويعها ديني || أشهر أنواعها الغراء المبدولة والمنحيلة .

٢١٩٥٥ - قَرْنَاء * ، حريش
Cerastes (S).
Céraste (F). Ceraste, Horned viper (E).
ويدعوها مرقية وذات القرنين وذات الزبيتين . جنس



قرومط



قرنا



قَرْبِيّ الدلب



قَرْبِيّ السنديان



قَرْبِيّ المصصاف



قَرْبِيّ صغيرة

٢١٩٦٣ - قَرْنُفَلَات ، زُحْفُفَلَات

Cerambycidae (S). Cérambycidae, Capricornes, Longicornes (F). Cerambycidae, Longicorns, Longhorned beetles (E). Bockkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة غدييات المنحاج. عمارياتها واجنتها وانواعها تعد نحو ٢٠ ألف. أجسامها مستطيلة، اشكالها مختلفة، اطولها تمتد من ١٠ إلى ٨٠ سم. أذنيها عديدة الألوان. قرونها الاستشعارية غليظة حركية من ١١ فاصلة وهي في الذكر أطول مما هي عليه في الإناث. أرساها خاصة أما تيمون كاتها رباعية لأن خلعها صغير القد لاسمى الارتكاز. غالبها حادة. تطير في الليل أو في النهار. قوتها الأجزاء وجميع المواد النباتية. جيلها يمتد من سنتين إلى أربع سنوات. مكنتها لاقياسي الشكل، أصفر اللون، تمتصه الأنثى في لحاء النبات أو تحت ثشور أو ترز في التربة قرب الجلود || رقاتها مودية الشكل، غليظة الرؤوس والمنطقة الصدرية، تحية الأطراف والمنطقة الشرجية. قوتها المواد اللينة والخشبية، تسردب الانفاد والفرور والمعدن والسوق والجذور والجذور. حورياتها تتلصق بشفاة خشنة تصنعها من خثات الخشب المصين بالوراك في آخر سرداب حفرته عند آخر السلاخ.

٢١٩٦٤ - قَرْنُفِلُط * ، قَرْنُفِلُط

Brassica oleracea botrytis (S). Chou-fleur (F). Cauliflower (E). Blumenkohl (D). Cavolfiore, Cavolflore (I).

بقلة زراعية حولية شائعة الاستعمال من فصيلة الصليبيات. ترطب في الآتية المسقوة التركيب الحكسي، للمتلة الاندماج، البقية الغرور، اللينة بالمواد الآتية واللصوية. تتكاثر بالبزور. تتقلل التثليل من الأكواد إلى المستقل عند بله لشوه المادة اللينة وتقرس حل إبعاد تراوح من ٦٠ إلى ٧٠ سم.

٢١٩٦٥ - قَرْنُفَل

Coriandrum (F). Coriandrum (E). حجر من اللوين الصوف وهو أصلب الأجسام يمد للانس. أنواعه عديدة منها الحجارة الكريمة كالسفير. كسره يستعمل في صبح المادان.

٢١٩٦٦ - قَرْنُفَلَة

Mue des oiseaux de proie (F). Moulting (E).

الفرقة زين قصير الريش عند الجوارح.

٢١٩٦٧ - قَرْنُفَل

Dianthus (S). Œillet (F). Pink (E). Nelke, Sommernelke (D). Garofano (I). جلس نباتات عشية معمة من فصيلة القرنفليات. أنواعه البرية والزراعية نحو ٨٠٠ أما ضرويه المشهورة فزهاء ٥٠٠ جميعها زراعية زينة. سوقها عقدية فراء. أوراتها صاعدة متعاقبة. نصلها سنائي الشكل ثخين الصفحة البحرية اللون. أزهارها جميلة الشكل، ناجية الارتكاز، غليظة التجميع والألوان، حطرية العرف الفواح. بزورها صغيرة القد، مستديرة الشكل، رقيقة الجرم، سمره اللون || يتكاثر بالبزور والمقل. يرغب في الآتية للتوسط الاندماج والطرطية اللينة بالمواد اللصوية واللصوية العناصر المعدنية || أشهر أنواعه الرئيسية ما يتبع.

٢١٩٦٨ - قَرْنُفَل أَحْمَر زَهَّارِي

Dianthus cinnabarinus (S). Œillet rouge écarlate (F). نوع من القرنفل مهدد اليونان، ساقه فراء تملو من ٣٠

إلى ٤٠ سم. أوراتها شديدة الخضار، خالصة العروق. أزهاره إلى الحرة الزينة، كلها تطلو نحو ٣٥ سم. وقطر بتلاتها أيضا || أزهاره يستمر من تموز إلى آب.

٢١٩٦٩ - قَرْنُفَل لُؤْمِيَرِيَّة *

Dianthus armeria (S). Œillet velu, O. armeria (F). Armeria pink, Deptford pink (E). Raue Nelke (D). Armeria, Garofano peloso, Viola da lepre (I).

نوع من القرنفل ضرويه وهابله عديدة، سوقها فراء خلية تملو من ٢٠ إلى ٣٥ سم. أوراتها الجذبية مستطيلة. أوراتها سوقها وفروها أقصر من سلاحياتها، فاصلها ثلاثية العروق، بحرية اللون. أزهارها صغيرة القد، ودية، ملوالة الرقعة || يرغب، مع سائر ضرويه، في الآتية الرملية. أزهاره يستمر من حزيران إلى أيلول.

٢١٩٧٠ - قَرْنُفَل أَزْرَق

Dianthus caesius, D. gratianopolitanus (S). Œillet bleu (F).

نوع من القرنفل ساقه فراء مسطحة. أوراتها قصيرة بحرية اللون، نصلها سنن الخلفة، ثلاثي العروق. أزهاره حطرية العرف، بتلاتها ودية اللون، مسنة الخبار الحاربي، قطرها يتفرج من ٢٠ إلى ٢٥ سم. || أزهاره يستمر من أيار إلى تموز.

٢١٩٧١ - قَرْنُفَل أَصْفَر

Dianthus ferrugineus (S). Œillet ferrugineux (F).

نوع من القرنفل مهدد إيطاليا. ساقه منتصبه فراء تملو من ٣٠ إلى ٤٠ سم. أوراتها الجذبية ضيقة. أوراتها الساقية واللغزية أقصر من السلاحيات؛ نصلها حاقب الخطار البحري || أزهاره صغيرة القد، بتلاتها ثلاثية التفتعيس، ثلاثية التسنين، صفر الصفحات الحاربية، سمر السلاحيات، سلع المراج || أزهاره يستمر من تموز إلى أيلول.

٢١٩٧٢ - قَرْنُفَل الْبَلْكَان ، قَرْنُفَل بَلْسَمِي

Dianthus Pancei (S). Œillet de Pancei (F).

نوع من القرنفل مهدد البلقان. ساقه فراء تملو من ٣٠ إلى ٤٠ سم. أوراتها غليظة، ضيقة؛ نصلها مالى البشرة، سيمك الصفحة، بحري اللون. أزهاره صغيرة القد، مستطيلة الكأس، أرجوانية اللون، سمر المراج. أزهاره يستمر من حزيران إلى آب.

٢١٩٧٣ - قَرْنُفَل الرَّمَال

Dianthus arenarius (S). Œillet des sables (F).

نوع من القرنفل منته الرمال. ساقه قليلة الفرور تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. أوراتها قصيرة النصل اللين الأخضر. أزهاره فردية التجميع، متوسطة القد، بتلاتها إلى البياض الناصع تملو شمة وسطى خضراء || أزهاره يستمر من حزيران إلى آب.

٢١٩٧٤ - قَرْنُفَل الزَّهَّارِينَ *

Dianthus caryophyllus (S). Œillet des fleuristes, O. flamand, O. remontant, O. perpétuel, O. fantaisie (F). Carnation, Clove pink, Picotee (E). Gartennelke, Gartennelken gefüllte, Nelke (D). Garofano dei fioristi, G. scempro (I).

نوع من القرنفل الزينة المشهور. ضرويه وإسمره كثيرة العدد. سوقها فراء. أوراتها بحرية، نصلها جانبد الصفحة. أزهارها مكعبة، فواحة العرف الحطري،



قَرْنُفِل



قَرْنُفِل أَحْمَر زَهَّارِي



قَرْنُفِل أُرِيَرِيَّة



قَرْنُفِل أَزْهَارِي

٢١٩٨١ - قُرْتُلُ صِينِي *

Dianthus chinensis (S). *Œillet de Chine*, O. *régence* (F). *China pink*, *Indian pink* (E). *Chinesische Nelke*, *Indisch-nelke* (D). *Garofano della Cina*, *G. della reggenza* (I).

نوع من القُرْتُل المحول. مهدد الصين. ضروب عديدة سيقها فراء تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. أوراقها مستطيلة تعرض نحو ٢ سم. نصلها شديدة الخضار الجري. أزهارها بسيطة أو مكببة، بتلاتها مهدبة الحار. ألوانها مختلفة منها السوية والبلاء والموشة والموشة || أزهارها يستمر طوال الصيف.

٢١٩٨٢ - قُرْتُلُ مُنْقَبِص *

Dianthus strictus (S). *Œillet dressé* (F).

نوع من القُرْتُل ساقه منتبسة، قليلة الفروع، مستطيلة السليبات النعيلة، تملو من ١٥ إلى ٢٥ سم. أوراقها ضيقة النصل، بحرية اللين. أزهار فردية أو ثنائية التجميع، مستطيلة المائل، عاتقة البرق. بتلاتها بيضاء اللين متفصلة الانتشاب مقرصة الأطراف. أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز.

٢١٩٨٣ - قُرْتُلِيَّات

Caryophyllaceae (S). *Caryophyllées*, *Caryothées* (F). *Caryophyllaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلظتين عديدة القائلات. اجناسها وانواعها كثيرة العدد تجسمها ثلاثة أسباط: السليانيات والفلقليات والسليانيات. جميعها عشبية، معظمها معمر وبعضها محول وسوي. ومنها أيضاً البرية والبطية والصناعية والزينية.

٢١٩٨٤ - قُرْتُلُوس *

Eugenia aromatica, *E. caryophyllata*, *Caryophyllus aromaticus* (S). *Girofler*, *Gérofler* (F). *Clove tree* (E). *Gewürznelken* (D). *Garofano*, *G. aromatico*, *Eugenia aromatica*, *E. coriifolide*, *Chiodo flore* (I).

جنبة معمرة من فصيلة الأسباط. مهددا البلاد الحارة ساقها وأغصانها سوسة. أوراقها متعابلة، نصلها جامدة، ريشية العروق. أزهارها صغيرة القد، كلوسها رباعية التفصيص، بتلاتها ثمانية، أسديتها كثيرة العدد، مبيض مفتحة ثنائي الحياء المندهم، ثمارها نورية متوتجة، يزورها قفلة. تزود لأزهارها البطرية الشائعة الاستعمال المعروفة باسم «كيش القُرْتُلوس».

٢١٩٨٥ - قُرْتُوس *

Chorinus (S). *Chorine* (F). *Chorinus* (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات مشاريات الأبريل قصيرات الليل وفصيلة الميجيات. أنواعها المعروفة ستة، اصطلاحاً بحار البلاد الحارة || أجسامها صغيرة شبه رباعية الشكل. حناكها تنتهي بزوائد. قرنية المادة، جالسة الانتشاب. قوائمها الاسمية ملقطة الأطراف، لامتناهية الطول والخاصة. ألوانها متباينة الألوان تكثر فيها الألوان والسمرة الحديدية المولج.

٢١٩٨٦ - قُرْتُوس * ، قُرْتَايَا

Cornus (S). *Cornouiller* (F). *Cornel-tree* (E).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة القُرْتُوسيات. أنواعها المعروفة نحو ٢٥ منها الأشجار والشجيرات وألجبات والأشباب. أوراقها كاملة مabile. أزهارها

كبيرة القد، قطرها يبلغ من ٦ إلى ١٢ سم. ألوانها عديدة تغلب فيها السوية.

٢١٩٨٧ - قُرْتُلُ الشَّاعِر * ، قُرْتُلُ مُنْقَبِص

Dianthus barbatus (S). *Œillet barbu*, O. *de poète*, *Bouquet paraisit*, *Jalousie*, *Tête de chat* (F). *London tuft*, *Sweet William* (E). *Bartnelke*, *Samtelke* (D). *Garofano barbuto*, *G. poeta*, *Mazzetto perfetto* (I).

نوع من القُرْتُل، ساقه منتبسة فراء، دقيقة السليبات المستطيلة، تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها سانية النصل تعرض نحو ١٠ سم. لونها إلى الخضار الباق، أزهارها كبيرة العدد، بتلاتها طول نحو ٢ سم. وهي مستعرضة الطرف المنح. ألوانها مختلفة متناحلة عديدة || أزهارها يستمر من أيار إلى آب.

٢١٩٨٨ - قُرْتُلُ الصُّخُور

Dianthus petraeus (S). *Œillet des rochers* (F).

نوع من القُرْتُل البري يعيش بين الصخور وفي الجرويل. ساقه دقيقة نحيلة قليلة الفروع تملو من ٢٠ إلى ٣٠ سم. أوراقها لسة نصلها ثلاثي العروق، أخضر اللين، مدبب المقصبة الشاككة. أزهارها وردية، صغيرة القد، فردية التجميع، حادسة البرق. يوجد منه في لبنان || أزهارها يستمر من أيار إلى تموز.

٢١٩٨٩ - قُرْتُلُ الهِنْد Tagetes touffu (F).

هو الخشبية الجليية، أطالها.

٢١٩٩٠ - قُرْتُلُ بَرِّي Dianthus sylvestris (S).

Œillet sauvage (E). *Wood pink* (E). *Steinnelke*, *Wilde Nelke* (D). *Garofano salvatico* (I).

نوع من القُرْتُل، ساقه فراء تملو من ١٥ إلى ٣٥ سم. أوراقها جامدة النصل الأخضر المدبب الطرف، أزهارها حادسة العروق، فردية التجميع، بتلاتها مسفة الحار الحاربي، وردية اللين أو حمراء. يوجد منه في لبنان حتى ارتفاع ٧٠٠ م.

٢١٩٩١ - قُرْتُلُ بَيِّي *

Dianthus superbus (S). *Œillet superbo*, O. *frangé* (F). *Fringed pink* (E). *Prachtnelke* (D). *Garofano frangato*, *G. superbo* (I).

نوع من القُرْتُل، ضروبها عديدة سيقها فراء تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها كليل من ٤ إلى ٧ سم. وتعرض من ١٠ إلى ١٥ سم. نصلها ثلاثي العروق، أخضر المقصبة. أزهارها عديدة، متوتجة القد، فواحة العروق و قطرها يبلغ من ٢٥ إلى ٤٠ سم. ألوانها سوية مختلفة منها الأبيض والبيكي والوردي والاحمر والبنفسجي || أزهارها يستمر من أيار إلى أيلول.

٢١٩٩٢ - قُرْتُلُ رِيْشِي * ، قُرْتُلُ عَطْرِي

Dianthus plumarius (S). *Œillet mignardise*, O. *musqué* (F). *Feathered pink*, *Garden pink* (E). *Feder-nelke* (D). *Garofano a plumino*, *G. pennino*, *Garofanino* (I).

نوع من القُرْتُل ساقه منتبسة فراء تملو من ١٥ إلى ٣٠ سم. أوراقها لسة طول نحو ٥ سم. نصلها جامد الصفحة مدبب المقصبة، يامت الخضار الجري. أزهارها فواحة العروق البطرية قطرها نحو ٥ سم. بتلاتها مستطيلة التثريم مختلفة الألوان السوية || أزهارها يستمر من أيار إلى آب.



قُرْتُلُ الشَّاعِر



قُرْتُلُ بَرِّي



قُرْتُلُ صِينِي



قُرْتُلُوس



قُرْتُوس

٢١٩٩٣ - قُرْنُوسٌ كَبِيرُ الرَّقِيقِ

Cornus macrophylla, *C. brachypoda* (S). Cornouiller à grandes feuilles (F).

شجرة سبروتية تملو من ١٠ إلى ١٥ م. انتشارها وأغصانها رباعية التضلع. أوراقها متعاقبة تطول نحو ١٦ سم. وتعرض نحو ٨ م. نصلها مثلث البصرة على صفحته. حروفه مداسية أو ثنائية الأزواج. أزهارها بيض. ثمارها إلى السواد الأزرق المالح.

٢١٩٩٤ - قُرْنُوسٌ كَتْدَا (S). *Cornus canadensis* (F). Cornouiller du Canada (F).

حشبة سبروتية عمرة تملو من ١٢ إلى ١٦ م. أوراقها السفل لاطفة متعاقبة أما العليا فمضية ثلاثية. أزهارها نورية التجميع، بيض اللون، خضر المالح. ثمارها شولية الشكل، حامزة الطعم، مأكولة. انتشارها يستمر من حزيران إلى آب.

٢١٩٩٥ - قُرْنُوسٌ مُجْبَر

Cornus controversa (S). Cornouiller discuté (F). شجرة فناء تملو من ١٠ إلى ١٥ م. انتشارها وأغصانها زياض. أوراقها متعاقبة مستديرة القامة، نصلها يطول نحو ١٥ سم. ويعرض ٨ م. حروفه شامية مداسية أو ثنائية الأزواج. أزهارها بيضاء اللون. ثمارها زينية الشكل واللون، سوداء اللون، زرقاء المالح، حامزة الطعم، مأكولة. أحشائها شديدة الصلابة، ناعمة الزمرة، ذائقة الصنف.

٢١٩٩٦ - قُرْنُوسِيَّاتٌ، قُرْنُوسِيَّاتٌ

Cornaceae (S). Cornacées (F). Cornaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة العائلات، أجناسها وأنواعها عديدة جميعها نباتات معمرة منها الإصباح والبنج والبنج والبنج. أوراقها بسيطة لكنها لا تقياسية الأرتكاز منها المتعاقبة والمتعاقبة. أزهارها عشوية، صوبانية أو عشوية التجميع. ثمارها نورية صلبة القند مأكولة. أحشائها شديدة الصلابة، صناعية، مرغوبة فيها.

٢١٩٩٧ - قُرْنُونٌ هو الشوكة الصفراء، أطلس.

٢١٩٩٨ - قُرْنُونِيَّ (F). *Carstoid* (F). Carstoid (F). تمت تعريفي بوصف به ما كان شكله كالقرن.

٢١٩٩٩ - قُرْنُونِيَّاتٌ، قُرْنُونِيَّاتٌ

Leguminosae (S). Légumineuses (F). Leguminosae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة العائلات، أجناسها وأنواعها كثيرة المند تجمعها ثلاثة أسباط: القرناطيات والتمسنيات والتمسنيات. نباتاتها مخلفة الأشكال والأحجام فيها الإصباح والبنجيات والأشجار. أوراقها مركبة لا قياسية الأرتكاز. أزهارها عشوية. انتشارها عشوية. يهي تشغل المديد من النباتات الزراعية الغذائية والعلفية أشهرها الفول والحمص واللوبيا والبرسيم والفول والبيقية والتيل والسند.

٢٢٠٠٠ - قُرْنُونِيَّة (F). *Cornu* (E). الجزء الخاربي الشفاف من العين.

٢٢٠٠١ - قُرْهَب (F). *Taureau corpuent* (F). *Stout bull* (E).

الثور السن الضخم. ويقل الثور الكبير الضخم.

٢٢٠٠٢ - قُرْهَد ولد البطل ج. قرايد.

عشوية، رباعية التركيب، صغيرة القند، صوبانية التجميع. ثمارها نورية مستطيلة مأكولة. يزورها دعنية يستخرج منها زيت حاد يستعمل في صناعة الصابون أحشائها شديدة الصلابة، صناعية. أشهر أنواعها ما يتبع.

٢١٩٩٧ - قُرْنُوسٌ أَجْيَسُ

Cornus alba (S). Cornouiller blanc (F). جنبة سبروتية تملو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ م. انتشارها رباعية اللون أو صفراء. أوراقها بيضية، تطول نحو ١٠ سم. وتعرض ٧ م. نصلها خلي الصفحة السفلى، حروفه خمسية أو صوبانية الأزواج. أزهارها غبراء اللون. ثمارها حامية القند والشكل، بيضاء اللون، حامزة الطعم، مأكولة.

٢١٩٩٨ - قُرْنُوسٌ السُّوَيْدِ

Cornus suecica (S). Cornouiller de Suède (F). حشبة عمرة تملو نحو ١٥ م. أوراقها لاطفة متعاقبة. أزهارها نورية التجميع، جوية اللون تحضبا أربع قنابات بيض. ثمارها مشيرة القند حامزة الطعم مأكولة. انتشارها يستمر طوال شهر حزيران.

٢١٩٩٩ - قُرْنُوسٌ ذَكْرٌ، قُرْنُوسٌ مَبْدُولٌ

Cornus mas (S). Cornouiller mâle, C. commun, Courgeiller (F). Common cornel tree, Cornelian cherry (E). Kirschenhartriegel, Kornelkirsche, Kornelbaum (D). Corniolo, Corniale, Cornio (I).

شجرة سبروتية مبدولة تملو من مترين إلى خمسة أمتار. أغصانها سطحية السواد مبدولة الزغب. أوراقها متعاقبة، صلبة القند، مائفة البصرة، خمسية أو صوبانية العروق المزدوجة. أزهارها صفر التبرجات، خضر القنابات. ثمارها حامزة مأكولة، رقيقة الشكل تطول نحو ١٥ م. لونها إلى الحمرة.

٢١٩٩٠ - قُرْنُوسٌ عَشْقُودِي

Cornus racemosa (S). Cornouiller à grappes (F). جنبة تملو من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ م. انتشارها وأغصانها سطحية اللون، سرسة. أوراقها متعاقبة تطول نحو ١٠ سم. وتعرض ٣ م. نصلها خلي الصفحة السفلى، حروفه رباعية الأزواج. أزهارها عشوية هري. أزهارها وثمارها بيض.

٢١٩٩١ - قُرْنُوسٌ فُلُورِيدَا، قُرْنُوسٌ كَبِيرُ الزَّهَرِ

Cornus florida (S). Cornouiller de Floride, C. à grandes fleurs (F). Dog-wood, Flowering dog-wood (E). Blümen Hartriegel, Hartriegel (D). Corniolo florido (I).

شجرة سبروتية تملو من ٥ إلى ١٢ م. أوراقها متعاقبة تطول نحو ١٦ سم. وتعرض ٨ م. نصلها ذات الزايم الأخير، مدبب القصعة، خلي الصفحة السفلى، مداسية أو مبسطة العروق المزدوجة. أزهارها وردية اللون، كبيرة القنابات الحامزة. ثمارها زينية القند والشكل، جوية اللون، حامزة مأكولة.

٢١٩٩٢ - قُرْنُوسٌ قَلِيلُ الْعُرُقِ

Cornus paucinervis (S). Cornouiller paucinerve (F). جنبة صلبة تملو نحو ٢٠٠ م. انتشارها رباعية التضلع، زياض اللحم. أوراقها متعاقبة، صلبة، ضيقة، نصلها يطول نحو ٥ سم. حروفه ثنائية أو ثلاثية الأزواج، حلية البصرة من الجهة السفلى. أزهارها بيضاء اللون. ثمارها رقيقة الشكل حامية القند، حراء القشرة والياباب، حامزة الطعم، مرة المذاق.



قُرْنُون

٢٢٠١٤ - قُرَيْش هي الصابونية ، اطلمها .

٢٢٠١٥ - قُرَيْشَات

هي الصابونيات ، فصيلة اسماك بحرية ، اطلمها .

٢٢٠١٦ - قُرَيْش Ortie (F).
هو القراص ، اطلمه .

٢٢٠١٧ - قُرَيْش أَحْمَر Lamier pourpre (F).
هو التلاميذ الأرجواني ، اطلمه .

٢٢٠١٨ - قُرَيْش الْحَبْزُز Ortie brûlante (F).
هو القراص المحرق ، اطلمه .

٢٢٠١٩ - قُرَيْش رُؤْمَانِي Ortie à pilules (F).
هو القراص الكروي ، اطلمه .

٢٢٠٢٠ - قُرَيْش * ، يُونَيْتَا Urena (S).
Urena, Herbe aux paniers (F). Indian mallow (E).
Urena (D). Urena (I).
جلس نباتات جنينية ليفية من فصيلة الحبابيات . اعطائها بلاد الشرق . انواعها المروزة اريدية ، سطوها منتصبة . اوراقها مصفحة متعاقبة ، نصلها مستعرض الشكل ، خنسي الفصوص . جامد الصلصة . ازهارها فردية التجميع ، ابطية الارتكاز ، خنسية التركيب || زرع لانياتها الخشنة المتينة الشاملة الاستعمال الصناعي .

٢٢٠٢١ - قُرَيْش Coryphaena (S).
Coryphène (F). Dolphin, Dorado (E).
جلس اسماك بحرية من الاسمريات شالكات الزعانف . انواعها المروزة نحو ١٥ اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . جميعها من الاسماك اليمية || اجسامها اهلجية الشكل ، كبيرة القد ، تقطر من ٨٠ الى ١٦٠ سم . انوعها متداخلة الالوان المتباينة تكثر فيها الريدة الفضية المنشة بالانخضر والاصفر الذهبي . زعانفها الظهرية قاطبة ، الذيلية فائقة او معيدة الفلقة || لحمها جيدة الصنف مرغوب فيه .

٢٢٠٢٢ - قُرَيْش مُوَاكِب *

Coryphaena pomplius (S). Coryphène pompile, Lampuge, Sourcil d'or (F). Pompl (E).
نوع من القُرَيْش . سمكة بحرية بيوض . اعطائها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي والهادي || جسمها اهلجي الشكل يطول من ٨٠ الى ١٠٠ سم . ثوبها الى الشبهة الزيتية المنشة بالانخضر والاصفر الذهبي . ظهرها الى الخضر الالبي الاسف الملاج . رأسها ممدد الجرم ، قصير الخطم المستدير . ميتاها كيرتان . حاجباها مذهبان . زعنفتها الظهرية قاطبة . الشرجية مستطيلة ومضيفة . الذيلية فائقة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٢٠٢٣ - قُرَيْش Cornicule (F). Cornicle (E).
هو السرك ، اطلمه .

٢٢٠٢٤ - قُرَيْشَاء Ambrevade (F).
هي الكنجوس الهندي ، اطلمه .

٢٢٠٢٥ - قُرَيْشَة هي المارلية الزراعية ، اطلمها .

٢٢٠٠٣ - قُرُوح

الخنقة للملء الطويلة التي انجد كرجاج . قراولج .

٢٢٠٠٤ - قُرُوحَة الْمَلْفُوف * ، فَيْتُ الْمَلْفُوف

Plasmiodiophora brassicae (S). Hernie du chou, H. des crucifères, Maladie digitale, Gros pied (F). Clubroot of cabbages (E). Kohlhernie, Kohlkropf (D).
وصم ظهري يترى معظم الصليبيات واعصمها الملفوف . شته مركب من الجذور فيسب فتق اللج وارتقاعها . العوامل التي تنشط انتشاره وبثته : تربة متدهية وحرارة معتدلة ورطوبة تفوق ٩٠ ٪ || يكالنج بظهور الفلادر والرتبة ويستبدال الازتية المتدهية والمواقع الرطبة بغيرها اقل انساجاً ورطوبة .

٢٢٠٠٥ - قُرُود دَيْبِيَّة ، أَلُرَام الْقُرُود

Hapalidae (S). Arccopithèques, Hapalides (F). Arccopitheci, Hapalidae (E). Krallenaffen (D).
فصيلة قرد من الحياتيات موطنها امريكة الوسطى والجنوبية . انوعها المروزة ٢٨ تنضم الى جسين : الميادس والهيال . اجسامها صفيرة القدر ريمة . اذنانها جنتة مستطيلة . اثلوها سوية الالوان ، وافرقة الشعر الوثير المستطيل . تعيش حياة التنساج . جامعاتها كبيرة العدد . قوتها اثار والخرشات اثنائها تنفع من جرو الى جروين وربما ثلاثة .

٢٢٠٠٦ - قُرُود دَيْبَالَة ، قُرُود مَدْتَبَة

Cercopithicidae, Cercopithèques (F). Cercopithe-
cidae, Cercopithacus, Tailed apes (E). Meer-
kassen (D).
هي المجرسيات فصيلة قرد من سفليات المنخرين تشل ستة اجناس : المجرس والحودل والمالكاك والنديم والقشة والقردوح .

٢٢٠٠٧ - قُرُوس Bar (F).
هي القاروس سمكة مأكولة من القريشيات .

٢٢٠٠٨ - قُرُوس مَبْدُول Loubine vulgaire (F).
سمكة بحرية تدعى قاروس مبدول ، اطلمها .

٢٢٠٠٩ - قُرُومَة التَمَل Fourmillière (F). Ant-hill (E).
هي جرثومة التمل حيث يبنت ويتكاثر ويخزن الغذاء . وتسمى ايضاً التربة والمنشلة .

٢٢٠١٠ - قُرَيْث Anguille (F).
هو الانقليس ، اطلمه .

٢٢٠١١ - قُرَيْثِي الشَكَل Anguilliforme (F).
Anguilliform (E).
نمت تعريفي يطلق عل كل حيوان مائي او قارب شكله كالقُرَيْث أي الانقليس .

٢٢٠١٢ - قُرَيْدَمِي Crevettes (F).
هو الاربيان ، اطلمه .

٢٢٠١٣ - قُرَيْدِ سِيَّات Carididae (S).
Caridides (F). Carididae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من القشريات المشاريات الاقدام . اجناسها وانوعها كثيرة العدد . اعطائها بحار المدام . جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، منمققة المؤخر .



قرد الملفوف



قريش



قُرَيْش مُوَاكِب

٢٢٠٢٦ - قَرِينَة ، شَبَهَة

Adminicule, Présomption, Contexta (F). Presumption, Context (E).
عنصر من عناصر الاثبات قد لا تقوم به الحجة تماماً ولكنه يساعد .

٢٢٠٢٧ - قَرِينَة عَدَم التَّمْيِيز

Présomption de non-discrimination (F). Presumption of not discernment (E).

قَرِينَة قَانُونِيَّة يَسْتَلْ بِهَا مَا إِذَا كَانَ الْقَاصِرُ الَّذِي اقْتَرَفَ جُرْماً يَمْنَى أَوْ لَا يَمْنَى مُؤَلِّفُ جُرْمِهِ . وَفِي الْقَانُونِ الْقَبْلَانِي إِذَا لَمْ تَتَجَاوَزْ مِنَ الْقَاصِرِ الْحَرَمِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً عَقِبَ بِتَادِيْبِهِ وَرَقَابَتِهِ .

٢٢٠٢٨ - قَرُوح

مرض يصيب النَّمَّ لِيَهْرَأَ وَيَهْلِكُ بِأَهْرَآ .

٢٢٠٢٩ - قَرُوسِيَّة

Iridescent (F). Iridescent (E).
لَمَتْ تَعْرِيفِي يوصف به الشيء الذي يعكس ألوان قوس قزح .

٢٢٠٣٠ - قَرُوسِيَّة ، نَسْطَانِيَّة

Iris (F). Iridescent, Irid (E).
لَمَتْ تَعْرِيفِي يَظْهَرُ عَلَى مَا كَانَ لَوْنُهُ كَأَلْوَانِ قَوْسِ قَزَح .

٢٢٠٣١ - قَرُوسِيَّة

Iris (F).
رَاجِعْ حَلْقَة .

٢٢٠٣٢ - قَرُوس

Alto-cumulus
نُورٌ مِنَ السَّحَابِ الْمُجِذِبِ الْجَمِيدِ الارتفاع . وَهُوَ مِنَ الْغُيُومِ الْمَاطِرَةِ . الْقَطْعَةُ مِنَ قَرُوس .

٢٢٠٣٣ - قَرُوس

Dovera (S). Dovera (F).
جَنَسُ نَبَاتَاتٍ شَتِيَّةٍ مَعْمُورَةٍ بِرِيَّةٍ مِنْ فَصِيلَةِ أَخَسِيَّاتٍ . أَنْوَاعُهُ الْمَعْرُوفَةُ قَلِيلَةٌ الْعَدَدُ جَمِيعُهَا مِنْ نَبَاتٍ بَعْضُ مَوَاسِلِ الْبَيْسَرِ الْأَبْيَضِ الْمُتَوَسِّطِ || سَوَاقُهَا فِرْعَاوُ قَلِيلَةُ الْأَوْرَاقِ أَوْ عَادَتُهَا . وَالْأَوْرَاقُ عَتِدَةٌ وَبَسِيحَةٌ ، فِي بَعْضِ الْأَنْوَاءِ تَكُونُ تَتَالُفِيَّةً ، مَرَكَبَةٌ دِشِيَّةٌ التَّفْصِيلُ . أَزْهَارُهَا عِيَوِيَّةٌ التَّجْمِيعُ . أَزْهَارُهَا شَتِيَّةٌ الْأَلْوَانُ سَبَا الْأَبْيَضِ وَالْأَتْنِي وَالْأَصْفَرُ وَالْأَخْضَرُ الْأَصْفَرُ . تَنْوِيرُهَا دِيْبِي .

٢٢٠٣٤ - قَرُوس

Polypier de Corail (F). Polypary of Coral (E).
الْقَرُوسُ دَكْرِيَّةُ الْبَيْسَدِ ، أَيْ الْمَرْجَانِ ، حَيْثُ تَنْشَبُ الْمَدِيَّةُ .

٢٢٠٣٥ - قَرُوسِيَّة

Séricicole (F). Silk-producing (E).
لَمَتْ تَعْرِيفِي يَظْهَرُ عَلَى مَا هُوَ خُصَّصَ بِتَرْيِيدِ دَوْدِ الْقَرُوسِ .

٢٢٠٣٦ - قَرُوسِيَّات

Bombycidae, Liparidae (S). Bombycidae, Liparidae (E).
فَصِيلَةُ حَشَرَاتٍ مِنْ حَرَفِيَّاتِ الْأَجْنِيَّةِ اجْتِنَاسُهَا وَأَنْوَاغُهَا كَثِيرَةٌ الْعَدَدُ . فَرَاشَاتُهَا مُتَوَسِّطَةُ الْحَجْمِ ، خَلِيْقَةُ الْجَسْمِ ، عَدِيمَةُ الْحُطْمِ ، مُصَغَّرَةُ الْحَيَاةِ ، لَا تَنْتَلِي . اجْتِنَاسُهَا كَثِيفَةُ الْمَرَاشِفِ الزَّيَادِ . وَرَأْسُهَا إِلَى الْبَيَاضِ الْأَخْضَرِ مُتَلَوِّةٌ رَفِيقَةً سَمَاءَ خَفِيَّةٍ . قَرُونُهَا لِاسْتِشْعَارِيَّةٍ شَطِيَّةٍ مُزْدَوِيَّةٍ || مَكْنَبُهَا كَرْدِي الشَّكْلِ ، فَرْدِي الْمَنْعِ ، وَرَقَاتُهَا كَبِيرَةٌ لَقَدْ مَلَأَتْ الْجُلُودَ وَحِيدَةَ الْقَرْنِ الشَّرْجِي . خَادِيَاتُهَا تَقْتَلِفُ بِشَرَفَاتٍ حَرِيرِيَّةٍ الْحَيْطُ || أَشْهُرُ اجْتِنَاسِ الْقَرِينَةِ .

٢٢٠٣٧ - قَرِينَة ، بُمْبِيكِيكس

Bombyx
جَنَسُ حَشَرَاتٍ قَرَانِيَّةٍ مِنْ فَصِيلَةِ الْقَرِينَاتِ . أَنْوَاغُهَا عَدِيدَةٌ مُنْطَلِقُهَا شَارٌّ وَبَعْضُهَا اقْتِصَادِيٌّ نَاقِعٌ كَمِدَّةُ الْقَرُوسِ . أَشْهُرُ أَنْوَاغُهَا مَا يَلِي .

٢٢٠٣٨ - قَرِينَة الْحَرِيرِ * ، قَرِينَة النَّوْتِ

Bombyx mori, Sericaria mori (S). Bombyx du mûrier, Ver à soie (F). Silk-moth, Silk-moth worm (E).
قَرَانِيَّةٌ مِنَ الْقَرِينَاتِ مُتَوَسِّطَةُ الْقَدِّ لَا قَدْرَةَ لَهَا عَلَى الطَّرْفَانِ تَعْمِشُ نَحْوَ عَشْرَةِ أَيَّامٍ . تَسْلَفُهُ بِعَدِّ الْيَوْمِ الرَّابِعِ . أَنْثَاهَا تَبْشُرُ بِعَدِّ السَّاعَاتِ بِنَحْوِ ٢٤ سَاعَةٍ . زَيْنُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ يَوْمَيْنِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ . عَدَمُ مَكْنَبِهَا لَا يَقِلُّ عَنْ ٥٠٠ يَمِزُّ عَنْهُ الْمَرْيَيْنُ (بِالْبَالُورِ) || جَسْمُهَا نَحْنِي حَرَشِي . طَوِيلُهَا نَحْوُ ٣ سَم . وَيَسْتَلْقِيهَا ٤ سَم . زَيْنَانُهَا مُشَطَّةٌ مُزْدَوِيَّةٌ . ثَوْبُهَا إِلَى الْبَيَاضِ الْأَخْضَرِ تَلَوُّوُ مَاجِيَّةً سَفَرَاءَ . تَحْمَلُ عَلَى الْجَنْبَيْنِ الْأَمَامِيِّينَ بَعْضُ الْطُفُولِ الْمُتَفَرِّغَةِ السَّمَاءَ الْوَيْثُ . لَا فَارَقَ خَارِجِيٍّ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْإُنْثَى سِوَى الْحَجْمِ فَالْإُنْثَى أَكْبَرُ وَأَهْلَطُ مِنَ الذَّكَرِ . مَكْنَبُهَا كَرْدِي الشَّكْلِ يَبْشُرُ أَصْفَرَ الْوَيْثُ . عَنْدَ مَتْنِهَا ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى الْبَسْرَةِ وَيَبْشُرُ قَبِيلَ الثَّلَاثِ || الْبَرِيَّةُ تَعْرِفُ بِبَدْوَةِ الْحَرِيرِ ، أَطْلُبُهَا ، يَرَاوِحُ طَوِيلًا عَنْدَ تَمَامِ انْتِزَاعِهَا مِنَ ٧ إِلَى ٩ سَم . جَسْمُهَا مَالِسُ الْبَشَرَةِ . وَأَسْفَلُهَا خَفِيرٌ لَقَدْ أَسْوَدَ الْوَيْثُ . قَرُونُهَا الشَّرْجِي دَقِيقٌ وَمُجَدَّبٌ . ثَوْبُهَا إِلَى الْبَيَاضِ الْأَخْضَرِ . يَطْلُو حَلَقَاتٍ جَسْمُهَا مِنْ جَانِبَيْهَا سَمَاتٌ سِدٌّ تَعْمِي سَامَ التَّجْمِيعِ وَيَطْلُوهَا التَّجْمِيعُ || ضَرْبُهَا عَدِيدَةٌ فَوَارِقُهَا الْحَجْمِ وَالْقَوِيَّةُ وَكَلَرُ الشَّرِيقَةِ وَلَوْنُهَا وَشَكْلُهَا .

٢٢٠٣٩ - قَرِينَة الْخَرُوعِ ، بُمْبِيكِيكس الْخَرُوعِ ، دَوْدَةُ حَرِيرِ أَرِيَا

Bombyx ricini, B. arrindia, Attacus arrindia (S). Bombyx du ricin (F).
مَوْطُهَا الْبِلَادُ الْحَارَةُ اخْصَصُهَا الْأَسِيرِيَّةُ . تَرِي عَلَى رَوَقِ الْخَرُوعِ . صَلْبَتُهَا مُتَوَسِّطَةُ الْحَجْمِ وَالْمَنْعُ . حَرِيرُهَا أَتْنِي الْأَرْنِ .

٢٢٠٤٠ - قَرِينَة الْخَرُوعِ ، بُمْبِيكِيكس الْخَرُوعِ

Bombyx cecropia, Saturnia cecropia (S). Bombyx du prunier, Ver à sole du prunier (F).
مَوْطُهَا بِلَادُ أَمْرِيكَا الْجَنُوبِيَّةِ . تَرِي عَلَى رَوَقِ الْخَرُوعِ وَالْزَيْتُونِ . صَلْبَتُهَا مُتَوَسِّطَةُ الْحَجْمِ ، حَرِيرُهَا قَوِي الْحَيْطُ ، غَلِيظٌ ، أَسْوَدَ الْوَيْثُ .

٢٢٠٤١ - قَرِينَة السِّنْدِيَان * ، قَرِينَة الْبَيْتَلُوطِ ، بُمْبِيكِيكس السِّنْدِيَان

Bombyx mylitta, Securnia mylitta (S). Bombyx du chêne, Ver à sole du chêne (F).
مَوْطُهَا الْمُدُنُ . تَرِي عَلَى رَوَقِ السِّنْدِيَانِ . صَلْبَتُهَا صَغِيرَةٌ لَقَدْ مُسْتَطَلَّةٌ . حَرِيرُهَا بَرَقَ الْخَيْطُ مُتَوَسِّطُ الصَّنْتِ .

٢٢٠٤٢ - قَرِينَة السِّنْدِيَان الْجَرَارَة * ، بُمْبِيكِيكس السِّنْدِيَان الْجَرَارَة

Cnethocampa processionnea (S). Bombyx processionnaire du chêne (F). Oak processionary caterpillar (E). Eichen-Processionsspinner (D).
حَشْرَةٌ مَهْلُوءَةٌ تَقْوِيْدُ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ الْمَطْلُوعَةِ الْحَارَةِ . رَقَاتُهَا سَمَاءَ الْوَيْثُ . كَثِيفَةُ الْحَلْبِ . لَسْمَا يَبْشُرُ الْجَلَّةُ كَالْقَرُوسِ . تَرْكَبُ أَوْرَاقَ السِّنْدِيَانِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاغِهِ فَعَرَضُهَا يَتَوَقَّضُ .



قَرِينَة الْحَرِيرِ



قَرِينَة الْخَرُوعِ



قَرِينَة السِّنْدِيَان



قَرِينَة السِّنْدِيَان الْجَرَارَة

المائل || البرقة تطول من ٣٢ إلى ٣٨ م. جسمها شبه اسطواني الشكل ، كثيف الملب القصير ، مبهر الملب الطويل القوي التجميع . الحمل اللون ، اربد الموج ، يملو خط ليجي ابيض وشطان جانبيان اسمران وشطان متعلقات اسمران . رأسها جوزي اللون . مدنها ورواجها الى السورة || طول الاكسال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلبة تحببها على النبات المائل .

٢٢٠٤٧ - قُرْبَةِ الْكَزْرِ * ، بُمْبِيكْس الْكَزْرِ

Porthesia similis (S). *Bombyx cul doré* (F). *Gold-tailed moth* (E). *Schwan* (D).

حشرة من القزليات يرقتها نمة تركب اوراق الكرز والتفاح فتفرضها وقد تقضي عليها .

٢٢٠٤٨ - قُرْبَةِ شَارِدَةِ * ، بُمْبِيكْس شَارِدَةِ

Liparis dispar, *Lymantria dispar* (S). *Bombyx disparata*, *Spongieus* (F). *Gipsy moth*, *Gypsy moth* (E). *Schwammspanner* (D).

حشرة من القزليات يرقتها نمة تركب اوراق الاجنار الحرجية وللشجرة اعصها السديان والصفصاف والتفاح .

٢٢٠٤٩ - قُرْبَةِ مُبْرَقَةِ * ، بُمْبِيكْس مُبْرَقَةِ

Liparis monacha (S). *Bombyx nonne*, *Nonne*, *Bombyx moine* (F). *Nun moth*, *Black arches moth* (E). *Nonne*, *Fichtenspanner* (D).

حشرة مفردة موطنها البلاد المعتدلة الحارة . يرقتها نمة تركب اوراق عدة نباتات اعصها اجنار الفصيلة الصنوبرية

٢٢٠٥٠ - قُرْبَةِ يَمَامَايَ * ، بُمْبِيكْس يَمَامَايَ

Bombyx yamamai (S). *Bombyx yamamai* (F).

حشرة من القزليات موطنها الصين . تربى على ورق السديان ، صليبتها متوسطة القد ، حررها جيد الصنف نجح الخيط .

٢٢٠٥١ - قُسَابَةِ * ، رَدِي التسر .

٢٢٠٥٢ - قَسَاحَةِ * ، رَتْرَاكْتِيلِيَّةُ (F).

Retractility (E). القساسة قابلية الانقباض .

٢٢٠٥٣ - قُسْبَارِيَّاتُ (F).

سبط من فصيلة السبائيات . اجناته اقلها مدهبة جميعها اجنار وبنيات . اصطناعها البلاد الحارة اعصها امريكا الجنوبية . بعض انواعها طلي دافع للحيات .

٢٢٠٥٤ - قُسْبَارِيَّةُ الْخَمْسِي * ، قُسْبَارِيَّةُ قَسْرُوِيَا

Cusparia febrifuga (S). *Cusparia* (F). *Cusparia* (E). *Cusparbaum* (D). *Cusparia* (I).

شجرة من القسباريات . ساقها متصبية فروعها تملو من ٧ الى ١٥ م . اوراقها حاملة ، منقطة ، متعاقبة ، مركبة ، ثلاثية الوريقات . ازهارها عنقودية التجميع ، يضاء اللون ، خامية البلات ، حيلة الشكل ، مستحبة اللف . بزورها سود اسادية || لحاء الشجرة عطري الرائحة غزير المركبات الفعالة ينتشرج منه مادة القسبارين التي تعتبر من المقويات المرموقة ومن دوائج الحميات المشهورة .

٢٢٠٥٥ - قُسْتُ * ، قُسْتُسُ

Costus (S). *Costus* (F). *Costus*, *Kust-root* (E). *Kostuspflanze* (D). *Costo* (I).

جنس نباتات جذمورية عشوية برة وزراعية من فصيلة الزنجبيليات . انواعها المعروفة ١٥ منهاها المناطق الحارة .

٢٢٠٤٣ - قُرْبَةِ الصَّنَوْبَرِ الْجَرَارَةِ * ، بُمْبِيكْس الصَّنَوْبَرِ الْجَرَارِ

Cnethocampa piteocampa (S). *Bombyx processionnaire du pin* (F). *Pine processionary caterpillar* (E). *Pinien-Prozessionsspinner* (D).

حشرة شديدة الاذى . يرقتها كثيفة الملب تركب بتناق واهداب الصنوبر تقضي عليها .



قُرْبَةِ الصَّنَوْبَرِ الْجَرَارَةِ



قُرْبَةِ الصَّنَوْبَرِ



قُرْبَةِ الْكَزْرِ



قُرْبَةِ شَارِدَةِ



قُرْبَةِ مِبْرَقَةِ



قُسْبَارِيَّةُ الْخَمْسِي



قُسْتُ

٢٢٠٤٤ - قُرْبَةِ الصَّنَوْبَرِ * ، بُمْبِيكْس الصَّنَوْبَرِ

Euproctis phaeorrhæa, *Porthesia chrysorrhæa* (S). *Bombyx chrysorrhæa*, *Cul brun* (F). *Browntail moth* (E). *Braunschwänzigler goldafter* (D).

حشرة من القزليات يرقتها نمة تركب معظم الاجنار الشمرية وتغريها من الورق .

٢٢٠٤٥ - قُرْبَةِ الصَّنَوْبَرِ السَّمَرَاءِ * ، بُمْبِيكْس السَّمَرَاءِ

Euproctis phaeorrhæa, *E. chrysorrhæa*, *Nymgia phaeorrhæa* (S). *Bombyx chrysorrhæa*, *Cul brun* (F). *Browntail moth* (E). *Braunschwänzigler Goldafter* (D).

حشرة من القزليات حرشفات الاجنحة . موطنها يشمل بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط واروبة المعتدلة الحارة . فراشتها عيفة تعيش على غزورها الاماني . سرقتها تعيش على اوراق الاجنار الشمرية والحرجية اعصها الزعرور والبلوط والتفاح والسديان والقطب || جسمها متوسط القد يطول من ١٢ الى ١٥ م . بسطها تراوح من ٣٤ الى ٤٠ م . رأسها ابيض . عيناها كبيرتان . زباناها مشطيان مزدويان جوشها ابيض . بطنها ابيض الثلث الاول ، جوزي اللون في الثلثين الاخيرين || رواشتها ، عند التفتين ، صلبة الحجم ، يضاء اللون ، تبتلية الزنزين ، متراكبة الحراشف الدقيقة || لها جيل واحد في الحول . تظهر القزاشة في تموز . تسرح في الليل . تماطل بعد ظهورها باردة ايام وتبريق المكان لطفا واحدة على فصل النبات المائل || البرقة تطول من ٣٠ الى ٣٥ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، كثيف الملب اللين القصير مبهر الملب الطويل . اكعب اللون يملو غطان ابيضان من جانبي الظهر يتوصلها خط ليجي احمر . رأسها الى الجلوة . مدنها ورواجها الى السورة القاتمة || طول الاكسال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلبة تحببها البرقة بين اوراق الاراق والافان .

٢٢٠٤٦ - قُرْبَةِ الصَّنَوْبَرِ الْمُدْهَةِ الْكَدْبِ *

Porthesia chrysorrhæa, *P. similis*, *P. auriflua* (S). *Bombyx cul-doré* (F). *Gold-tailed moth* (E). *Schwan* (D).

حشرة من القزليات حرشفات الاجنحة . موطنها المناطق المعتدلة الحارة من الشرق الاطل واوربية وافريقية للشمالية . فراشتها تعيش على غزورها الاماني . سرقتها تعيش على اوراق الاجنار الشمرية والحرجية || جسمها متوسط القد يطول من ١٣ الى ١٦ م . بسطها تراوح من ٣٦ الى ٤٢ م . رأسها ابيض . عيناها كبيرتان . زباناها مشطيان مزدويان . جوشها ابيض . بطنها مشطى اللون مذهب الموج || رواشتها عند التفتين يضاء اللون ، تبتلية الزنزين يملو في الزوج الامامي بقعة طرية عسيلة اللون || لها جيل واحد في الحول . تظهر القزاشة في تموز . تسرح في الليل . تماطل بعد ظهورها بنحو اربعة ايام وتتبع المكان مساديا على المسحات السفلى من نصال اوراق النبات

اوراقها لحمية ، لاطئة ، متعاقبة . ازهارها كبيرة اللد ، ناجية الاذكان ، لا قياسية التجميع منها الثورية ولسنلية . جلديها عتيبة ، كانت ولا تزال تستعمل في الترياق .

٢٢٠٥٦ - قُسُوس
Ciste (F).
هو اللادن ، اطلبه .

٢٢٠٥٧ - قُسُوس لاذي
Ciste ladanifère (F).
هو اللادن الاساني ، اطلبه .

٢٢٠٥٨ - قُسُوس بَرِي
Sisymbre (F).
هو البارة ، اطلبه .

٢٢٠٥٩ - قُسُوس شامي
Année grande (F).
هو الرأس الشبي ، اطلبه .

٢٢٠٦٠ - قُسُوسان ، قُوس قُرح

Arc-en-ciel (F). Rainbow (E).
ويسمى أيضاً قوس السحاب . ظاهرة جوية تشاهد في أثناء سقوط المطر أو تسحب الجو بقطرات الماء . ذلك ان اشعة الشمس عند مرورها خلال هذه القطرات تنكسر كما ينكسر الشعاع الضوئي النافذ الى منشور زجاجي ويتحمل الى اللون الطيف فيشاهد في السماء قوس يتكون من الالوان البرتقالي والاصفر والاحمر والازرق والنيلي والبنفسجي . ويشاهد القسطن أيضاً في بعض الليالي القليلة السبب نفسه .

٢٢٠٦١ - قُسُوساني
Irisé (F).
راجع قزحي .

٢٢٠٦٢ - قُسُوسَان
Bétoine (F).
هو البطريقا ، اطلبه .

٢٢٠٦٣ - قُسُوس
Châtaignier (F).
هو الكستنة ، اطلبه .

٢٢٠٦٤ - قُسُوس الأرضي
Jacinthe orientale (F).
هو الجوز الشري ، اطلبه .

٢٢٠٦٥ - قُسُوس الماء
Macre (F).
هو السكر ، اطلبه .

٢٢٠٦٦ - قُسُوس هندي
Marroonnier commun (F).
هو القندل البيلول ، اطلبه .

٢٢٠٦٧ - قُسُوسَة
Châtaigne (F).
هي الكستنة شجرة الكستنة .

٢٢٠٦٨ - قُسُوسُورَة ، قُسُوسُورُوم ، قُسُوسُورُون
Castardum (F).
هو الجنة بادستر ، اطلبه .

٢٢٠٦٩ - قُسُوس
Ciste (F).
هو اللادن ، اطلبه .

٢٢٠٧٠ - قُسُوس اُقرِيطي
Ciste de Crète (F).
هو اللادن الاكريقي ، اطلبه .

٢٢٠٧١ - قُسُوسَة *
Echiostoma (S).
Echiostome (F). Echiostoma (E).

جنس اسماء بحرية من مفتوحات للمناخ وفضيلة للزراعات . انواعها المرفقة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة . سرحتها الاغوار البعيدة والجميع . تتميز بجهازها

الفسفوري المضيء || اجسامها مستطيلة الشكل ، قريبة القبة بالزراع طول من ٢٠ الى ٣٥ سم . رؤوسها خليطة ، مقطوعة الاضلاع ، كبيرة الاشدان ، سفة الفكين . اسنانها مستطيلة ذرية . فكوكها السفلى وحيدة الدابة . عيونها جاحظة . قشورها مائل الصفحة . زعانفها الظهرية وصيدة ، صغيرة الحجم ، خلفية الاركان ، تقابل الشريفة ومماثلها مستطيلة . زعانفها الخلفية صغيرة فارقة . اذنيها الى السرة السوداء يطولها موج اسفح .

٢٢٠٧٢ - قُسُوسَة * ، مَهْرُ الْجَنَّة

Iris oratoria (S). Iris orateur (F).
حشرة خاضعة من مستطيلات الاجنحة فضيلة السرغويات اعطائها المناطق الحارة من الشرق الاوسط والاندلس واربوة الغربية واغريقية النالية . تألف للبراري والمرتفعات الدغلة || جسمها مستطيل نحيل يطول نحو ٤ سم . ثوبه الى السرة الخضر المواج . رأسها صغير مستعرض . عينها جاحظتان . زباناها حديقان مستطيلتان . قوائمها مستطيلة ، الزوج الامامي مستعرض غليظ . اجنحتها متدلة الطول قسطانية الالوان الزاهية الجميلة ، تلتصق الجناح عند الذكر ولا تلتصق عند الانثى . الانثى اكبر قدماً من الذكر وابت لوفاً منه ، تترز مكنها في الثدية قرب جلوع الثبات .

٢٢٠٧٣ - قُسُوس

نبت كالكرش اخضر خيش الريح ينبت في سبل الماء له زهرة بيضاء .

٢٢٠٧٤ - قُسُوس
Tétanos (F).
هو الكزاز ، مرض خبيث ، اطلبه .

٢٢٠٧٥ - قُسُوس
Division, Embranchement (F).
Division (E).

يأتي القسم في التصنيف العام بعد المملكة وهو يتألف من صفوف والفصول من طوائف والاولاف من سبب والسبب من طبقات والطبقات من رتب والرتب من مراتب والمرتبات من فصائل من اسباط والاسباط من عمارات والعمارات من اجناس والاجناس من انواع والانواع من ضروب والضرروب من اصرام وسلالات يصروح .

٢٢٠٧٦ - قُسُوس ، قُسُوس
Lotir (F).
To divide into lots (E).
جزأ الملك الى عدة عقارات تسهيل ليه .

٢٢٠٧٧ - قُسُوسَة
Division

٢٢٠٧٨ - قُسُوسَة
Partage (F). Sharing (E).
عملية يقرر بها ملاكو اموال كل الشيوع ازالة حالة الشاع وتخصيص حصة مميزة لكل ملك بنسبة ما كان يملكه في عموم الاموال المقتضية || وهذه القسمة قد تكون وقتية او نهائية وودية او قضائية .

٢٢٠٧٩ - قُسُوس * ، زِينَة
Cosmos
جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة المركبات الشمسية . انواعها عديدة جميعها زراعية تربيتية . اوراقها متعاقبة ثنائية التفلج الريشي ، تحورت ازهارها مزينة بالاطياب الحرفي الملون || اشهر انواعها الثلاثة التالية .



قُسُوسَة



قُسُوس

٢٢٠٩٢ - قَشَاب * Toxicifère, Toxicophore (F). Toxiciferous (E).

نمت قشربني يطلق عل كل حيوان أو مَكَّة أو طائر يأكل مواد سامة فلا تؤذيها أما تؤذي الإنسان أن أكل من لحمه .

٢٢٠٩٣ - قَشَار Pellicule, Tégument (F). Pellicle, Tegument (E).

بشرة جلد الحية ومائل الزخافات التي تسلك مرة كل عام .

٢٢٠٩٤ - قَشَامَة Relief هي التواء الذي يبدو عل الأجسام المنبسطة .

٢٢٠٩٥ - قَشَب ، قَشِين ، ذِفْشَان Toxine (F). Toxin (E).

كل مادة سامة ، مها كانت عناصرها ، تفترزها الميكروبات أو البكتيريات .

٢٢٠٩٦ - قَشَب Kerria (S). Kerrie, Corète (F). جنس نباتات برية وزراعية تريينية من فصيلة الورديات مهددا الشرق الأقصى . أوراقها متعاقبة ، معتقة . أزهارها انبواسية التجميع ، كبيرة القد ، جميلة الشكل || أشهر أنواعها التريينية قشَب اليابان .

٢٢٠٩٧ - قَشَب اليابَان Kerria japonica (S). Kerrie du Japon, Corète du Japon, Spirée du Japon, Corchorus (F). Jew's-mallow, Summer-rose (E). Japanischer Ranunkelstrauch (D). Kerria japonica (J). نوع من القشَب وهو جنبة معمرة صغيرة القد تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . جلورها مدادة ، فروصها جالسة ، متنبسية ، سرسعة ، لامة البشرة الخضراء . أوراقها متعاقبة ، نصلها يطول نحو ١٥ سم . ويمرض ه وهو لامع البشرة ، جميل الخضار الخزامي . أزهارها فردية التجميع ، ذهبية اللون ، تحرقها نصل وريقة الشكل فسقية الخضار || أزهاره يستمر من نيسان الى أيار .

٢٢٠٩٨ - قَشَبَة * Ashbia gossypii, Nemastopora coryll, Spermophthora gossypii, Eramothelium ashbyii (S). Stigmatomycose (F).

وصم يصيب ثمار القطن والبريقال والأترج واليوسني والبنوترة والفاصوليا والصويجه سبه لطر مجهرى من الفطريات يتدخل نسيج الثمار عل أثر ويتر بعض الحشرات فيمتطها ويعضها .

٢٢٠٩٩ - قِشَة Guenuche (F). Young she-monkey (E).

هي السمية الصغيرة أي القردة الآفنة الفتية .

٢٢١٠٠ - قِشَة * Cynopithecus niger (S). Cynopithecus niger, Singe à toupet (F).

قرد وسيد الجنس والنوع من فصيلة المجرسيات . مركزه بين الماكاك والقردودج . جسمه يطول نحو ٦٥ سم . ويرتفع ٥٠ سم . ذنبه جملة طولا ٢٠ سم . ثوبه الى السواد القاتم . شمره قصير ، نام ، أجسد . وجهه مجزوى اللون . راسه مكمل بشعفة متنبسية هدنية الشعر || قوته الثار والحرب والجلود والحشرات . انشاء تقعج جروا واسدا ترشعه نحو ٦ شهور .

٢٢١٠١ - قِشْدَة ، قِشْطَة ، قِشَا ، قِشْدَة ، كَدَاكَة Crème (F). Cream (E). مادة سميّة في الحليب تسلك عنه بالفرز الحلي (الميكانيكي)

٢٢٠٨٠ - قُسْنَسُ جُؤُوي ، أَسَالِيَا كُسْمُوس Cosmos atrosanguineus (S). Cosmos rouge-brun, Dahlia zimapani (F).

حشبة تريينية سرؤوية معمرة تملو نحو ٦٥ سم . جلورها جنبي غليظ ، ساقها متنبسية فراءه . أوراقها فردية التشرم . أزهارها حشكوية التجميع ، تحترها الزهرية جؤوية الطباب . أزهاره يستمر من تموز الى تشرين .

٢٢٠٨١ - قُسْنَسُ كِبْرِيّ Cosmos sulphureus (S). Cosmos jaune soufre (F). جملة تريينية سرؤوية معمرة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها فراءه زباه . أوراقها سنانية التشرم مهدبة . أزهارها فردية متنبسية . تحترها الزهرية كبريية الطباب واللبنات . أزهاره يستمر من آب الى تشرين الاول .

٢٢٠٨٢ - قُسْنَسُ مُزْدَوِج الرِيش Cosmos bipinnatus (S). حشبة تريينية سرؤوية حولية تملو من ٤٠ الى ١٢٠ سم . ساقها متنبسية فراءه ناه . أوراقها مزدوجة التشرم الريشي . أزهارها فردية التجميع . تحترها الزهرية صفر الطباب ، وردية اللبسات قشرا نحو ٦ سم . || أزهاره يستمر من تموز الى ايلول .

٢٢٠٨٣ - قُسْبَل Lionceau (F). Young lion (E). ولد الأسد لم يبلغ الامل .

٢٢٠٨٤ - قُسُور * Chasmanthère (F). جنس نباتات برية طيبة عارشة من فصيلة القرميرات . انواعه عديدة اصلها البلاد الاستوائية والحارة . سيقها متسلقة تطول من ٣ الى ٧ امار . أوراقها معتقة ، كفية ، خاسية التفتيمص . أزهارها خشوية سداسية التركيب . جلورها طيبة يستخلص منها بعد التجفيف والسحق مادة الكولين ومادة البرين . واسدته قسورة .

٢٢٠٨٥ - قُسُورِيس Iris à l'ail (F). هو السوس المنن ، اطلبه .

٢٢٠٨٦ - قُسُوس هو شاي المروج ، اطلبه .

٢٢٠٨٧ - قُسُوس مُسَلَق Lierre commun (F). هو الشقة المبولة ، اطلبه .

٢٢٠٨٨ - قُسُوج Rétractile (F). Retractable (E). نمت ترمفي توصف به الاعضاء القابلة الانتشار والانقباض .

٢٢٠٨٩ - قُسِينَة هَامِيَة هي سند الخزن ، اطلبه .

٢٢٠٩٠ - قَشْ Paille (F). Straw (E). هو قصب الزرع اليابس الذي يصبح تبتا بعد دوصه .

٢٢٠٩١ - قَشْ السَّت Glut (F). Straw for thatching (E).

هو قصب السلت اليابس يستعمل كرياضا . وقد يستعمل في تفتيت قناني الخمر وما اشبه لفظها من الطيب عند الصدم .



قُور



قَشَب اليابان



قِشَة



قِشَة

وقشورها مدينة المنافع والفوائد الصحية || انواعها
الزراعية المأكولة البار نحو ١٢ أشهرها ما يتبع :



نشطة

٢٢١١٦ - قَشَّة سَهْلِيَّة * قَشَّة مَكْمُونَا

Anona squamosa (S). Attier, Anone caillieuse, Pomme-cannelle (F). Custard-apple, Sugar-apple, Sweet-sop (E). Honigapfel, Zuckerapfel (D). Anona scallosa, Pomo cannella, Mala cannella (I).

نوع من القشقة، تصنيه يأتي بعد الشريوليا. ثمرته تشبه التفاح شكلاً وقالباً وهي تملو نحو أربعة أمتار. اوراقها بيضية النصل مستطيلة، أزهارها مفتحة اللون. ثمارها كأكواز الصنوبر، لبها أبيض اللادة غزير العصارة السكرية. يزورها سود كبيرة.

٢٢١١٧ - قَشَّة شَاكَّة *

Anona muricata (S). Corossoller, Anone hérissée, Corosol épineux (F). Sour-sop, Prickly custard-apple (E). Seurosobbe, Sorer bissen (D). Anona spinosa, Caslmentaria (I).

نوع من القشقة، ثمرته متوسطة الحجم. اوراقها مستطيلة، مساه، لامعة، شديدة الخضار، فواصة اللرف. أزهارها قصيرة القد، غليظة الشكل. ثمارها كبيرة مستطيلة، شكلها شكل كوز الصنوبر جرهاته ناشرة مرفوعة شاككة. أما طول الثمرة فيراوح من ٢٥ إلى ٣٠ سم. وودنها من ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ غرام. قشورها سمكة، راتنجية العرف، حامزة المذاق، لبها أبيض اللون، حلو الطعم لا يخلو من الحموضة المستحبة.

٢٢١١٨ - قَشَّة شَبَكِيَّة *

Anona reticulata (S). Anone cœur de bœuf, Cachimau (F). Bullock's heart, Common custard-apple (E). Gustardapfel, Rahmapfel (D). Anona cuore di bus (I).

نوع من القشقة، تصنيه يأتي بعد السكامورا. ثمرته كبيرة الحجم تملو نحو ثمانية أمتار. اوراقها مستطيلة زغبية الصفة السفل. أزهارها كبيرة، بيضاء اللون يشوبها شيء من الخضار. ثمارها كبيرة القد، قلبية الشكل. قشورها إلى الصفار الناري. لها جامد اللادة، متوسط الصنف، أبيض اللون أو أحمر.

قشقة شاككة

٢٢١١٩ - قَشَّة شَرْمِيَّة *

Anona cherimolla (S). Chérimoller, Chirimoyer (F). Chirimoya, Purple-apple (E). Chirimoya, Purpurapfel (D). Anona cherimolla (I).

لوع من القشقة وهو أجودها صفتاً، ثمرته صغرة القد تملو نحو حبة أمتار. اوراقها بيضية فضاء، زباب، جميلة الخضار. أزهارها عمورية متدلية، بتلاتها مستطيلة الشكل بيض الصفة العليا الداعية، خضر السفلى الماراجية. ثمارها رداء اللون حميتها حبيز البرتقال. لبها عاجي اللادة، غزير العصارة، حذب اللذاق، لذيق الطعم، فواح العرف المستحب.

قشقة شبكية

٢٢١٢٠ - قَشَّة مُنْجِيَّة

Anona palustris (S). Corossoler des marais, Corosol des marais (F). Alligator apple, Cork wood (E). Alligatorapfel, Wasseraepfel (D). Anona di stagno (I). نوع من القشقة يجود في الاماكن الرطبة. ثمارها صغرة القد قلبية الشكل، عادية الصنف، غبراء الياض النزر العصاره المعتدلة الحلاوة.

قشقة شريوليا

نظراً لغلتها التسمية. وهي دسمة، لليلة الطعم، بيضاء اللون. ومما تستخرج الزبدة بعد غسها.

٢٢١١٢ - قَشَّة هِنْدِي Cavequi (F). هي البرساء الهندي، أغلبها.

٢٢١١٣ - قَشِّيَّات Annonacées (F). هي القشقيات فصيلة نباتية، أغلبها.

٢٢١١٤ - قَشْر Eboasge (F). هو قشور الحبوب لاسياً البرزور.

٢٢١١٥ - قَشْر، حِلَاء، قِرْق، قَلْب Ecorces (F). Barks (E). هو في النبات الجزء الخارجي الذي يلف الخشب من الجلود والسوق والاغصان والافئان.

٢٢١١٦ - قَشْر Lacs (F). جيش اسماء تهرية تسمى لاس.

٢٢١١٧ - قَشْر عَشْر Cascarille (F). هو الكركن العشري، أغلبه.

٢٢١١٨ - قَشْرَان Alles de sauterelles (F). Wings of the locust (E). جناح الحماردة الزرقان كالقشاة الشفاف.

٢٢١١٩ - قَشْرَك Pellicule (F). Pellicia (E). قشاة التي، حلاقة أو حرساً، ج قشر وقشور.

٢٢١٢٠ - قَشْرِي Cortical نعمت تمرني يطلق من كل ما له صلة بالقشور أو يشبهها.

٢٢١٢١ - قَشْرِيَّات Crustacea (S). Crustacés (F). Crustacea (E). صف حيوانات مفصلية مائية عديدة الرتب والمصائل والجناس، التي تنضم إلى طائفتين: حشريات الصدف ولبات الصدف.

٢٢١٢٢ - قَشْرِيَّات دُنْيَا Crustacés inférieurs (F). Inferior Crustacea (E). طائفة من القشريات كانت تسمى في التصنيف السابق «حشريات الصدف».

٢٢١٢٣ - قَشْرِيَّات عُليا Crustacés supérieurs (F). Superior crustacea (E). طائفة من القشريات كانت تسمى في التصنيف السابق «لبات الصدف».

٢٢١٢٤ - قَشَّة Crème (F). Cream (E). هي القشدة، اللادة السنية في الحليب.

٢٢١٢٥ - قَشَّة * قَشْدَك Anona (S). Annona, Anone (F). جنس نباتات بوية وزراعية من فصيلة القشقيات. انواعه نحو ٥ جميعها اثمار وطيخيات وجينات. اوراقها متعاقبة، مدقة، بيضية أو اهليلجية. نصلها جامد الصفة، بارز العروق. أزهارها فردية عمورية أو جاعية ناجية. ثمارها كوزية لحمية || معظم انواعها البرية طلي. اوراقها

تركب جلود وسوق النجيليات اغصانها الشير والشوفان والنشن والأذرة .

٢٢١٢١ - قُشْبِيَّات ، قُشْدِيَّات

Anonaceae (S), Annonacées, Annonacées (F), Annonaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القملات . اجناسها المروفة ٩٠ أنواعها نحو ٣٢٠ . اصلها البلاد الحارة . منها الاجنار والشجيرات والنباتات . اوراقها معتقة ، متعاقبة ، بسيطة . اثمارها ثلاثية التركيب او سداسية . ثمارها اكواز خضبة . يزورها دعتية .



قشام ارش

٢٢١٢٢ - قُشْتَام ، قُشْبَان

Gyps
جلس طير من الكواسر وفصيلة التريبات . انواعه ثلاثة جميعها كبيرة القد . رؤسها مستطيلة غفيرة . محاسرها صلح . صيها سود اللق ، صفر الاحداق . مناسرها قصيرة ، خليطة ، متعقبة البهر . اعناقها مستطيلة غفيرة . سواقلها كبيرة شارفة . اذنانها قصيرة || ولقشام شرس الاخلاق قوي الشكبة جسور يسطو على جميع انواع الطيور التي تنابه وتغناه . طيراته معتدل القوي يفوق بصرته سرعة جميع الطيور لكنه لا يجاري اعدائهم . يألف الحياة الحامية ، سره يبد من ١٠ الى ٥٠ قوته الجيف . مأواه الجبال النائية .



قشام اكلف

٢٢١٢٣ - قُشْتَام ارش * قُشْتَا

Gyps rupellii (S), Gyps de Ruppell, Vautour 4-perrier (F).

طائر من القشام طول نحو ١٥٠ سم . يسطه نحو ٢٧٥ سم . نوبه الى السرة الزاهية . حنقه اصعب . طوق جريئو طويل الزنب اغير اللون ، ظهره ويطع وباطن سقطيه ونضديه الى السرة . ظاهر سقطيه الى الرقعة الموشة يعلوها تجذيع ابيض متفرس || موطنه البلاد الافريقية . يذبح وكره في اوتاب الصقور الفسحة . الانثى تبيض رفته واحدة تحضنها بمناوبة الذكر نحو خمسة اسابيع . سره يبد من ٤٠ الى ٥٠ .

٢٢١٢٤ - قُشْتَام اكلف * عَقَق

Gyps fulvus (S), Gyps fauve, Vautour fauve, Griffon (F), Griffon-vulture (E).

طائر من القشام طول نحو ١٢٠ سم . يسطه نحو ٢٧٠ سم . نوبه الى الكتفة البهراء ترحو في الظهر وتبقى في البطن . سقطه راقل كبير تفرسه خطوط بيض || اعطانه فسيحة الارباء تمتد من اشد الى الاربوة وافريقية الشالية والشرقية || يذبح وكره في صنوع الصقور الشائعة الموشة . الانثى تبيض رفته واحدة تحضنها بمناوبة الذكر نحو خمسة اسابيع . سره يبد من ٣٠ الى ٥٠ وهو من الطيور القواطم .



قشام هندي

٢٢١٢٥ - قُشْتَام هندي * هَوَزَب

Gyps indicus (S), Gyps des Indes (F).

طائر من القشام طول نحو ١١٠ سم . يسطه نحو ٢٥٠ سم . نوبه الى السرة القاتمة . حنقه اصعب . سقطه جلعان بالخليط ويعلوها خط ابيض متفرس . ذنبه مجذع بالابيض . موطنه جبال الهند وجوارها . انثاء تبيض رفته واحدة . سره يبد نحو ٢٠ .



قشبان

٢٢١٢٦ - قُشْبَان * Dascillus (S), Dascille (F).

جلس حشرات من فصيلة القشبانيات انواعها ١٢ اجسامها اهليجية الشكل مفلطحة ، قرونها الاستشعارية خيطية ، مسنة ، مركبة من ١١ مفاصل . منافعها ضيقة . يلوها خماسية الاقسام . الزوايا سوية الالوان يكثر فيها الالوان الرمادي . اتحادها مخددة خلية || خنافسها ورقاته



قشروش

٢٢١٢٧ - قُشْبَان ارش

Dascillus pubescens (S), Dascille pubescent (F), Dascillus pubescens (E).

حشرة واشمة غامضة من فصيلة القشبانيات رتبة مغمدات الاجنحة . تألف الموائل القريبة من الماء . خنافسها تبيض على اثمار الصبوانيات . يرقاتها تركب جلود النباتات التي تنمو في الاراضي الرطبة || جسمها صغير القد يطول من ١٠ الى ١٢ سم . نوبها الى الرقعة الخنطية المواج . رأسها صغير الجرم . فكهاا ضليمان . عيناها صغيرتان زباناها خيطيان ، مستطيلان . ظلوها مستدير الطرف اللامع ، بين التعديف الهندى القاطب . ارساغها خاسية المل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار تضاف بهد ظلوها بنشر حتى اسابيع . تمتع المكان تحت الجفلة والعليل وبين اشطاء الاصاب الحولية || البرقة عند بلوغها الادراك الجسوري تطول من ١٦ الى ١٩ سم . جسمها مردي الشكل ، سداسي الروارب القصيرة ، اغير اللون اصفر المواج ، اسمر الرأس ، صلح التأثير الفكية || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوما ينقضي في التربة تحت الجفلة او تحت اريومات النباتات المثنية .

٢٢١٢٨ - قُشْبَانِيَّات

Dascillidae (S), Dascillides (F), Dascillidae (E).
فصيلة حشرات من فدهيات الاجنح اجناسها وانواعها عديدة جميعها ست عوارات . اعطائها العالم جميعها تاربة خاسلة . اجسامها مستطيلة الشكل ، متوسطة القد او صغيرة .

٢٢١٢٩ - قُشْمَر

Concombre serpent (F).

هو القشاة ، اظله .

٢٢١٣٠ - قُشْقُوش * ، حُصَّاس المَوْسُط ،

هَيْفَةُ المَوْسُط ، تَرِيك

Atherina hepsetus (S), Athérine de la Méditerranée, Saucet (F), Silverside, Sand smelt (E).

سمكة بحرية يبيض من فصيلة الهسائيات شاكلتات الزعانف اعطائها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تتغير من امكان التفت . مسرعاها اتحاد السوط || جسمها شبه وشي الشكل يطول من ١٠ الى ١٥ سم . نوبها الى الشبه يعلوها في جانبيها تمشيع ازيق مواج فضي يسمر في الظهر ويغير ويبيض في البطن || رأسها معتدل الجرم ، يرمي الشكل . فكها السفلي يتقدم العلوي بعض الشيء . عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، جاحضتان . زعانفها نظامية الترتيب . زعنفتها الالية فارقة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٢١٣١ - قُشْبَلْب

Cladanthus (S), Cladanth (F).
جلس نباتات عشبية سولية من فصيلة المركبات الانبوية الزهر . سوقها فراء تملو من ٣٠ الى ٩٠ سم . قرونها متعاقبة فرقة . اوراقها مفردة خلية النصل على فصحيه . ازهارها رؤوسية ، عطرية العرف ، صفر الطياب والصبغات الالوانية الصف || اشهر انواعه قشلب الجزيرة .

٢٢١٣٢ - قَصَبُ الْجَزِيرَةِ ، أَلْحُوَانُ الْجَزِيرَةِ

Cladanthus arabicus, *Anthemis arabica*, *A. prolifera* (S). *Cladanthus d'Arable* (F).

نوع من القصب الحولي يملو نحو ٧٠ سم. ساقه كثيرة الفروع المتفائلة الفرقة . أوراقه لسنة التفرير. خلية النصل . أزهاره عديدة ، صفراء اللون ، فواصة العرف . أزهاره يستمر من حزيران إلى أيلول .

٢٢١٣٣ - قَصَبُ

Lic d'un ruisseau (F).

Brook bed, *Stream bed* (E).

القصب مجرى النهر ومنهم من قال مسيله .

٢٢١٣٤ - قَصَبُ الشَّيْزَةِ

Chloroë endive (F).

واسدة القشيز ، بقلة مشهورة تُعرف بالحنجب ، اطليه .

٢٢١٣٥ - قَصَبُ

Légume sec (F).

Dried vegetable (E).

القصب ج ثُفَّ في البقول الناضفة . القصب منها كالبايما أو الحبي كالفلو والعدس والحمص والفاصوليا .

٢٢١٣٧ - قَصَبُ ، قَصَصُ

Sturnum

هو في الطير عظم مقدم الصدر الذي يرتكز عليه هيكلك القصب الجفشي .

٢٢١٣٨ - قَصَابَةُ

Boucherie (F).

هي صنعة القصاب أي الجزار .

٢٢١٣٩ - قَصَابَةُ

Tubicoles (F).

Tube-worm (E).

اسم يطلق على الحليقات الملازمة لخلات ألقابها والتي تعيش ضمن قصبات كلسية المادة أو رملية أو فضائية .

٢٢١٤٠ - قَصَابُ الْأَفْخَادِ

Brachilytres (F).

Brachelytron (E).

اسم يطلق على كل حشرة من حشرات الجناح أحمادها لتلحف جزءاً من بطنها فقط .

٢٢١٤١ - قَصَابُ الْأَلْسِنَةِ

Brevilingues (F).

Brevilingual (E).

رؤية من العظائيات أجناسها وأنواعها عديدة تجتمع بالأسا فصيلتين السقنورويات والصفرجات . دويباتها تتميز بقصر السنبا وصغر قوائمها وقرب شهبها من الحيات .

٢٢١٤٢ - قَصَابُ الدَّلِيلِ

Brachyours (F).

Brachyurous (E).

رؤية من القشريات المشاريات الارجل ، أشهر أجناسها السرطان .

٢٢١٤٣ - قَصَابُ السَّوَالِقِ

Brachyptères (F).

Brachyptera (E).

رؤية من الطير تتميز بقصر سواقطها مما يجعلها عاجزة عن الطيران ولذا فيضع طيورها مائة قوتها الأسماك . أشهرها الطريق والطرير والطناس والطناس ...

٢٢١٤٤ - قَصَابُ الْقُرُونِ

Brachycères (F).

اطلب قصبات القرون .

٢٢١٤٥ - قَصَاصُ ، قَصَاصُ

هو القصة الشجرة ، اطلبا . البوادة قصاصة وهو نبات مثثري تجرسه النمل فيقال لسلها عسل قصاص .

٢٢١٤٦ - قَصَاعَةُ

Epinastie (F). *Epinasty* (E).

حالة كل عضو نباتي ينمو الجزء الباطني من على حساب الجزء الظاهري كالورقة المقعرة الصفحة العليا المتعدية السفل .

٢٢١٤٧ - قَصَاعَةُ

Coniocybe (S).

جنس تطور مجهرية من الرطوبات وفصيلة الحشاريات . يتميز بنكهة القفسوية التي تملو الرينة . تكاته مستطيلة يوفها قرصي الشكل ثنائي الخلية . تكاته غطيلة مفصيلة تشابع التكاثر || له نوع واحد مؤ يدعى قصاصة الكرمة .

٢٢١٤٨ - قَصَاعَةُ الْكُرْمَةِ

Coniocybe pallida, *Pilacre pallida*, *Rosleria hypogaea*, *Coniocybe nives* (S).

فطر مجهرية يصيب جلود الكرمة وقد يصيب عرساً وفي ظروف بيئية خاصة جلود الاجناس وتنتقل والدرايف وألغوب والورد والقشيب ولعلث || ظهوره الخارجي على الكرمة في اصنافها الطولية ، تجمش شامل يمينه وقوف في النمو وتجمع في الاوراق . وهو في الجلود طين خفي ناشف اصعب اللون يلحم الجردة ليسب تمزيقها وتفجير طريقتها المكافئة || لم يكلف حتى الآن لان فوته وانتشاره شوطان بدلة عوامل بيئية منها الطوبوية المرضية ، ومنهم القوية ، وتركيب التربة وقصاصها .. لذلك فالاحمال الحرثية والعناية بالترية هي ارفع علاج له .

٢٢١٤٩ - قَصَابَةُ

Aphélie (F). *Aphelion* (E).

القصابية البعد الاقصى لسيارة عن الشمس . الكرة الارضية تكون في قصابيتها في اول شهر تموز من كل عام .

٢٢١٥٠ - قَصَبُ ، تَرْبِيعُ ، قَصَبُ

Equarrissage (F). *Squaring* (E).

هو قطع الشيء وتقسيمه وترعيه كالحجارة وجلود الاجزاء الخ .

٢٢١٥١ - قَصَبُ ، بُوَصُ

Arundo phragmites (S). *Roseau*, *R. commun*, *R. à balais* (F). *Common reed*, *Ditch reed* (E). *Deckrohr*, *Taichrohr* (D). *Canna*, *C. a spazzola*, *Spazzole* (I). ويلى غاب وقصب الكاناس . نبات كمبروي من فصيلة النجيليات ، ساقه قصبة ، جاملة ، متخابة السلاحيات الجوفاء . أوراقه صفية كبيرة اللد مشددة متداقبة . أزهاره مجمعة عنائله حامية ترتكز على سراج واسع . يكثر في المنابع وعلى ضفاف الماء . يستعمل الحواجز وفي صناعات السلال والكاناس .

٢٢١٥٢ - قَصَبُ الدَّرِيرَةِ

هو عيد الوج ، اطلبه .

٢٢١٥٣ - قَصَبُ الرِّمَالِ

Arundo arenaria (S). *Arunde*, *Gourbet* (F). *Cane*, *Reed grass* (E). *Pfahbrohr*, *Rohr* (D). *Cannuccia marina* (I).

نبات كمبروي من فصيلة النجيليات . اعطانه البلاد الحارة والمتعالة . يكثر ويبروه في الرمال الرطبة وفي المنابع . ساقه تستعمل في عدة صناعات زراعية اعصها البواوير .



قَصَاةُ الْكُرْمَةِ



قَصَبُ



قَصَبُ الرِّمَالِ

٢٢١٥٤ - قَصَب الرَّمْل * ، غُرَّار

Calamagrostis (S). Calamagrostide (F). Small reed, Sea sand-reed (E). Schilf, Rohrgras (D). Calamagrostis (I).

جسمن نباتات كمبودية قصبة من فصيلة النجيليات . انولاه نحو ٨٠ اصطفاها البلاد الحارة والمعتدلة . ترفع في الاراضي الوالية ولا تنحش المناطق البحرية . بعضها يستعمل في تثبيت رمال الكليات القاحلة لانه لا ينحش الطش .

قصب يوردين ، قصب اوتايتي
Canne de Bourbon, C. d'Otaïti (F).
ساقه كبيرة مستطيلة غضراء اللون غزيرة العصارة السكرية .
والقصب يحد في جميع الارابة المروية الغنية بالمواد العضوية
والناصرم الغدائية غرض ان لا تقتصر الى الكلس وان لا
تكون كثيرة الانقسام || اما كية السكر الممكن
استخراجها من عود القصب فتراوح من ١٠ الى ١٥ ٪
من وزن العود .

٢٢١٥٦ - قَصَب التَّيْل
Roseau canne (F).
هو القصب الروبي ، اطليه .

٢٢١٥٧ - قَصَب بَلَكْدِي
Canne de Provence (F).
هو القصب الروبي ، اطليه .

٢٢١٥٨ - قَصَب دَرَاكُو
Jong de l'Inde (F).
هو اسل الهند ، اطليه .

٢٢١٥٩ - قَصَب ذَهَبِي
Lysimaque commune (F).
هو السراجية ، اطليه .

٢٢١٦٠ - قَصَب رُومِي * ، قَصَب بَلَكْدِي ، قَصَب
التَّيْل
Arundo donax (S).

Canne, Canne de Provence, Roseau canne (F). Giant reed-cane (E). Echtespflrohr Grosses-schiff (D). Canna comune, Canna di giardino (I).

نوع من القصب الكبير المستطيل يكثر وبيده في المناطق المعتدلة وإحارة وفي الاماكن الرطبة اغصانها ضفاف الأنهر حيث يغلظ ويحيد تماماً || يستعمل كاشرا انواع القصب.

٢٢١٦١ - قَصَب قَارِسِي * ، بُوْش قَارِسِي
Arundo isica (S). Canne de Perse (F). Persian cane (E). Persische Pflrohr (D). Canna di Persia (I).

نوع من القصب الكبير القند . يكثر في المناطق رملية ضفاف الأنهر والجداول الرطبة || يستعمل في مختلف الصناعات القصبية .

٢٢١٦٢ - قَصَب مُرّ هو السمرويا ، اطليه .

٢٢١٦٣ - قَصَبَات
Bronches (F). Bronchia (E).
هي مجموعة الشعب الرئيسية والثانوية التي تزين الاتصال بين الحويصلات الرئوية والرقاضي فتضيق الجبال لتسهيل الهواء وشروبه .

٢٢١٦٤ - قَصَبَة
Bronche (F). Bronchi (E).
اسم تعريفي يطلق على جزء من الجهاز الانبوبي التنفسي الذي يوصل الرضام اي قصبة ارقبة بالحويصلات الرئوية .

٢٢١٦٥ - قَصَبَة
Paspale (F).
هي ابو يئيش ، اطليه .

٢٢١٦٦ - قَصَبَة
Roseau (F). Reed (E).
واسدة القصب .

٢٢١٦٧ - قَصَبَة ، قَلَم
Chaume (F). Thatch (E).
ساق النجيليات كالخطة والشيبر والشوات والذرة وغيرها . وهي مجوفة مركبة من عدة سلاحيات وعقد ينشأ عليها المصف اي الورق .

٢٢١٦٨ - قَصَبَة الْأَنْف
Chanfrein (F).
Forehead (E).
جزء من رأس الدابة يمتد من بين عينها الى منخرها .

٢٢١٥٥ - قَصَب السُّكَّر * ، مَصَّان ، بَرَسُوم
Saccharum officinarum (S). Canne à sucre, Cannamelie (F). Common sugar cane (E). Zuckerrohr (D). Canna da zucchero, Cannamelio (I).

نبات زراعي من فصيلة النجيليات مهدد بالاندثار الحارة وبها انتقل وقش في ثلاثة اقطار العالم الباقية لانه كان حتى عام ١٨٥٠ النبات الوحيد الذي يستعمل عصائره في صناعة السكر . اما الاقاليم الفالحة لزراعته فهي مبدئيا اقاليم البرتغال التي لا يقل متوسط حرارتها الوسطى عن ٢٣° مع وائي لا ينخفض متوسط حرارتها الدنيا عن ١٠° مع . ساقه منتصبه مسقوفة تعلو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . سلاحياتها تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم . وقطرها يراوح من ٢ الى ٨ سم . اليافها الخارجية خشية التركيب جامدة تغلفها مادة شمعية ينفذ اللون . اما الالياف الداخلية فاستمنية النسيج غزيرة العصارة السكرية . اوراثه متعاقبة ، عضفية الشكل ، حافسة . تصلها بطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . وهي جامدة الصلابة منس الحافة . ازهاره حنقودي التجميع ، حامي الارتكاز . ازهاره صغيرة الحجم ، فضة اللون ، ثنائية ، متعاقبة ، كتيبة الزئبق للمستطيل || ثماره برّ نجيل دقيق || ضروب القصب الزراعي عديدة اشهرها واعها ما يلي :

قصب ازررق ، قصب جماليك
Canne bleue, C. Jamaïque (F).
ضروب سروري قوي المنفعة يستعمل الطش وهو متوسط القند والانتاج السكري .
قصب اسود
Canne noire (F).
ساقه صلبة جزورية اللون سمره كالأرجح متوسطة العصارة السكرية . تكثر زراعتها في ملقا وجزيرة موريس .
قصب اصفر ، قصب صيني
Canne chinoise, C. de Pénang (F).
متوسط القند ، اصفر اللون ، اغصن المزلج ، كثيف المادة الصمغية غزير العصارة السكرية تكثر زراعتها في الصين وفوردونا وجزر انداج .
قصب الصين
Canne de Chine (F).
صغير القند ، متطلي اللون ، اصفر المزلج متوسط العصارة السكرية لكنه سروري وقوي المنفعة ضد الاوصام الفطرية . تكثر زراعتها في الصين واهلند والصينية .
قصب الكوشنشين
Canne de Cochinchine (F).
ساقه خفيفة غضراء اللون متوسطة العصارة السكرية .
قصب الهند
Canne guinghan (F).
كبير القند بطول نحو ٦ امتار . ينهل التربة ويستزف حناصرها انفاثية . ساقه غزيرة المادة السكرية ، صفراء اللون مجعدة بالبنسجي .
قصب بتافيا
Canne de Batavia (F).
اصرامه عديدة موتها كبيرة القند ، مجعدة بالالوان الداكنة والفاضة ، غزيرة العصارة السكرية .



قصب الرمل



قصب السكر



قصب رومى

٦٠ سم. اوراته حليلية قليلة القائمة تصلها خشن
المس ازغب البشرة. أزهاره وردية اللون زرق الملاج .
ثمارة قفاحية الشكل حقة التركيب .

Frangible (F). **قَصِيف** ٢٢١٨١
Frangible, Breakable (E).
تمت تعريفه يطلق على ما كان سهل الانكسار أو
الانغلاق .



قصة الماء

٢٢١٨٢ - **قَصِف** هو الياض ، اطليا .
Brize (F). **قَصِفَة** ٢٢١٨٣
هي البريزة ، اطليا .
Conceptacle (F). **قَصَفَة** ٢٢١٨٤
حق يحضن اعضاء التمثيل في بعض اجناس الفطور .
ج قسم .

Osteoclaste (F). **قَصِيل** ٢٢١٨٥
Osteochary (E).
وعن يصيب العظم في الحيوانات انحصها اطرية قشوي ويسهل
انصاعها وكسرها .

Cirsium (S). **قُصْرَان** ٢٢١٨٦
Cirse (F). Horsethistle (E).
جنس نباتات شائكة مبلولة برية من فصيلة المركبات .
انواعها عديدة منها الحلوية والمحلوة والمعمرة . سوقها اسطوانية
تعمل من ٥٠ الى ٣٠٠ سم. اوراتها ساعدة شائكة .
ورديساتها كبيرة اللذ . ازهارها انبوية . قناياتها مهدبة
الاطراف . بزورها مغلطة مستطيلة || اعرف انواعها
واشهرها ما يتبع :

Cirsium afrum (S). **قُصْرَانُ افريقي**
Cirse d'Afrique (F).

C. arvense (S). Cirse des champs (F). **قُصْرَانُ الحقل**
C. oleraceum (S). Cirse potager (F). **قُصْرَانُ المَنَاجِ**
C. lanceolatus (S). Cirse lanceolé (F). **قُصْرَانُ سنائي**
C. ferox (S). Cirse féroce (F). **قُصْرَانُ فُكس**
C. spinosissimum (S). **قُصْرَانُ كَثِيرُ الشوك**
C. très épineux (F). **قُصْرَانُ لِيَانِي**
C. libanotifum (S). Cirse du Liban (F). **قُصْرَانُ مَصُوف**
C. eriophorum (S). Cirse laineux (F).

٢٢١٨٧ - **قُصْرَانُ الْجِيَالِ** هو الملاج ، اطليا .

Textor (S). **قُصُوص** ٢٢١٨٨
Alecto (F). Textor (E).
جنس طائر من فصيلة التوتويات . انواعه المعروفة قليلة
العدد موطنها بعض مناطق افريقية الوسط والجنوبية .
تألف المراسي والاحراج البصرة الانهار . ملجئها الحياتي
جاني افواحيها قليلة البدن || اجناسها متوسطة اللذ تعليل
من ٢٦ الى ٣٦ سم. مثاقيلها كبيرة عرطية الشكل .
اجنحتها مستطيلة . اذناها مغلطة الاطراف او مستديرة ||
قوتها الحشرات والديدان وبعض البذور البرية || اعرف
انواعها واشهرها قصوص اخر المنقاد .

٢٢١٨٩ - **قُصُوصُ أَخْطَرِ الْوَيْقَادِ**

Textor erythrorhynchus (S).
Alecto à bec rouge (F).
طائر من القصوص . موطنه يمتد من افريقية الجنوبية الى

٢٢١٩٠ - **قَصَبَةُ الرِّقَّة ، وَخَامِي**

Trachée-artère (F). Trachea, Windpipe (E).
النضو في الجسم الذي يوصل الحنجرة بشعبي القصبة .
وهي التي يمر منها الهواء الى الرئة ان داخل او خارجا .

Tubiforme (F). **قَصْبِي** ٢٢١٩٠
Tubiform, Tubular (E).
ما كان شكله كالقصبة او الابوب .

Trachéates (F). Tracheates (E). **قَصْبِيَّات** ٢٢١٩١
هي المصفليات التي تتحلل بمجهر تنفسي انبوي يقابله جهاز
تنفسي شعبي .

Petite centauree (F). **قَصَّةُ الْحَيَّة** ٢٢١٩٢
هي مرارة الحفش ، اطليا .

Ronce (F). **قَصْد** ٢٢١٩٣
القصد الموج . وقصد الموج فروعه اثنائية .

Etain (F). Tin (E). **قَصْدِير** ٢٢١٩٤
معدن معروف منذ زمن الفينيقيين الذين نقلوه الى مصر
قبل عهد موسى . لونه الى البياض الفضي الازرق الملاج .
يصهر في ٢٢٨ °سغ ويبل في ١٢٠٠ °سغ. ريزه (Sn-ق)
وزنه الانبوي ١١٨,٧ غرقه النروي ٧,٢٩ ايصاليه
الكهربائية في ٢١ / ٢ °سغ. تبلغ في ١١,٤٥ || وهو اطرى
من الزنك واشد صلابة من الرصاص كما انه لا يتأثر
بالخواصض النباتية والاصفات العضوية || يوجد في الطبيعة
على هيئة اكسيد القصدير = قصديريت Cassitérite
Oxyde d'étain .

Base du cou (F). **قَصِيرَة ، ذَسِيع** ٢٢١٩٥
قائمة العنق او ملزق العنق في الكاهل .

Gemmule (F). **قَصِيرَة** ٢٢١٩٦
هي البادرة ، اطليا .

Cerastes cornutus (S). **قَصْرِي** ٢٢١٩٧
القصرى والقصرى نوع من القرزاة صغيرة اللذ خبيثة
تندس في الرمال .

٢٢١٩٨ - **قَصْبَةُ الْمَاء ، سَرَّةُ الْبَحْرِ ، هَيْدْرُوكَيْتِل**
Hydrocotyle (S). Hydrocotyle, Ecuelle d'eau (F).
Marsh pennywort, Sheep-bane, White-rot (E).
Nabel Necke, Wassernabel (D). Idrocotile, Scodella
d'acqua (I).

جلس نباتات عشبية برية مائية من فصيلة الحلييات تكثر
في المناطق وفي المواق المستدبة الرطاب . انواعها عديدة.
سوقها مدادة . اوراتها ثنائية الانتشاب ، مستطيلة الزناد،
ذرية النصل المستدير المادام الانقسام . ازهارها صغيرة
خامسة البتلات .

٢٢١٩٩ - **قُصْل ، قُصْلُ** ٢٢١٩٩
هو القرب . وقيل ولدا .

٢٢١٩٠ - **قَصْمِين** ٢٢١٩٠
Salvia pommifera (S).
Sauge pommifère (F). Sage apple (E). Salbeispfel (D).
Salvia baccifera, S. Spirea (I).
نوع من القوصية . يقال ان منافعه الصسية عديدة . يكثر
في الاراضي البرية الملساة . ساقه فروع تعمل من ٣٠ الى



قُصْرَان

٢٢٢٠١ - قُصْبِيَّةٌ ثبوت ينبت في أصول الكفاة (أ. م).

Pygidium ٢٢٢٠٢ - قُصْبِيَّةٌ هي آخر مفصل بطني من جسم الحشرة .

Tardif (F). ٢٢٢٠٣ - قُصْبِيَّةٌ ، لَقْبِسٌ ، مِثْخَارٌ هو ما كان بطني التبو او ما طاك زين نحو أن في الحيوان ام في النبات . م. قُصْبِيَّةٌ .

Epinaste (F). ٢٢٢٠٤ - قُصْبِيَّةٌ * نمت تمريني يطلق على كل نبات أو جزء منه أصابته التضاعف .

Biscutella (S). ٢٢٢٠٥ - قُصْبِيَّةٌ * Biscutella (F). Biscutella (E).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الصليبيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد . منها ما ينبت في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط || منها ما ينبت في مناطق متناحية . ومنها ما ينبت في مناطق جبلية ، مغلوبة ، مستطيلة النصال ، مسننة الختار . أزهارها طرفي . أزهارها صفراء اللون . ثمارها قُصْبِيَّةٌ الشكل .

أعرف أنواعها وأشهرها :

٢٢٢٠٦ - قُصْبِيَّةٌ العمود ، قُصْبِيَّةٌ جَبَلِيَّةٌ طَارِقِيَّةٌ

Biscutella columnae (S). Biscutella de Gibraltar (F). أزهارها الجذعية ملقحية الشكل ، مستطيلة النصال ، متبادلة التسنين . اما الساقية والفرعية فرعية الشكل متقاربة التسنين . تنويرها ربيعي .

٢٢٢٠٧ - قُصْبِيَّةٌ حَبْلِيَّةٌ

Biscutella genuina (S). Biscutella vraie (F). منها ما ينبت في المناطق الجافة من لبنان وسوريه . أزهارها الجذعية متراكبة ، اما الساقية والفرعية فقليلة العدد متبادلة التسنين . تنويرها ربيعي .

٢٢٢٠٨ - قُصْبِيَّةٌ مُسَنَّنةٌ

Biscutella dentata (S). Biscutella dentée (F). منها ما ينبت في المناطق الجبلية . تتميز بكثرة عدد أزهارها الساقية والفرعية وبكبر أسنانها الحادة الشائكة . تنويرها ربيعي .

Patella (S). ٢٢٢٠٩ - قُصْبِيَّةٌ * Patella (F). Patella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الأرجل الأسماك الخياشيم الجذعية وفصيلة القُصْبِيَّات . أنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم . تعيش على الصخور الغنورة || أصلها جلونية أو صابجية أو مقلية أو أهليلجية . جميعها رسيمة المصارع ، مألوفة للشعاع الغلزي المألوفة ، غنودة الشعاع الخارجي المتين الالوان ، مسننة الختار || أجسامها متباينة الاحجام التي تراوح من ٣ الى ١٠ سم . أزهارها رسيمة فضفاضة . رؤوسها صغيرة ثنائية القواس الميونة القواعد الخارجية . غشاها مبيوت متساوية الترتيب تفلطح الجسم تحت الرداء || جميع أنواعها مأكولة مستحبة الطعم .

الشرقية . يالفت المراعي وفضلات مجاري الماء حيث تكثر فطان البحر الرسيطي والظباء . ملجته الحيواني جماعي ، فوجيه يبد من ١٠ الى ٣٠ زوجاً || جسمه مستطيل القد يطول نحو ٢٥ سم . ثوبه الى السواد القلبي . قوائم جناحه بيض المعاط الخارجية . متفاد مرجاني اللون . حدة عينه كستنية . رشاء الى السرة الخلفية || قوته انخسرات واليدان واليدور ويلتقط القراد والطلح من على ظهور الظباء والانتار || يدث عشه في السط المشوك . عشه شارب الرجعية والكبير ، قطره نحو ١٢٠ سم . شكله كالصانع يدلو طوق يرتفع نحو ١٥ سم . الاثني تضع من ٥ الى ٧ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً .

٢٢١٩٠ - قُصُوعٌ ، إِذْبَاسٌ Levée (F). Gathering (E). يخرج الزرد من الارض او ظهور بواحد البزور على سطح التربة .

٢٢١٩١ - قُصْبِيَّةٌ * Phragmites (S). Phragmites, Canne à balais (F). Reed (E).

نبات جلومري من مصر من فصيلة النجيليات . ساقه قُصْبِيَّةٌ ، متناحية السلاحيات والكماير ، تطلو نحو ٣ امتار . أوراقه غنوية ، حاشية ، صفيرة النصل الجامة ، المسن الخلفية ، البحري اللون || أزهاره علمي الاوتكاز ، يشكل مجموعة من السنايل المتناحية . أزهاره بنفسجية اللون || منتجة جميع الامتاع المتدلة الحرازة من العالم القديم . يكثر بيده في المراتق الرطبة ومل غضايف مجاري الماء || ويدعى في مصر واليونان « الخُصْبِيَّة » .

٢٢١٩٢ - قُصْبِيَّةٌ Tube هي في بعض النباتات البذوية الزهرة التي ترتكز حليها البتلات . ج. تصالب .

٢٢١٩٣ - قُصْبِيَّةٌ الجَذْعُ Brévicaque (F). Brévicaque (E).

٢٢١٩٤ - قُصْبِيَّةٌ الجِنَاحُ Brévipenne (F). Brévipennate (E).

٢٢١٩٥ - قُصْبِيَّةٌ الرُوسُ Court-jointé (F). Short-patterned (E). من كان رسنه دون المعدل الوسط وهو من عيوب الخيل .

٢٢١٩٦ - قُصْبِيَّةٌ العُمرُ Brachybiote (F). نمت تمريني يطلق على كل حيوان قصير العمر من أي جنس كان .

٢٢١٩٧ - قُصْبِيَّةٌ القَدَمُ Brépède (F). Brépède (E).

٢٢١٩٨ - قُصْبِيَّةٌ المِنْفَارُ Brévirostre (F). Brévirostrate (E).

٢٢١٩٩ - قُصْبِيَّاتُ التَرْتُونُ Brachycera (S). Brachycères (F). Brachycera (E). لمة حشرات من ذوات الجناسين فصائلها وأجناسها وأنواعها نحو ٢٥٠٠٠٠ أصنافها جميع اصناف العالم || أشهر فصائلها : اللبابيات والتمريات والتمريات والتبريات والمحببات .

٢٢٢٠٠ - قُصْبِيَّةٌ القَلَمُ Brachystyle (F). نمت تمريني يطلق على كل زهرة قصيرة قلم السمة .



قُصْبِيَّةٌ



قُصْبِيَّةٌ



قُصْبِيَّةٌ



قَصَب أَحْمَر لِلدَّاءِ

٢٢٢١٧ - **قَصَب لُبَانِي** (S).
 Vinca libanotica (S).
 Pervenche libanaise (F). Lebanon Periwinkle (E).
 نوع من القصاب. عشية طيبة معمرة. منبهاً يمتد من السواحل اللبنانية حتى ارتفاع ٢٠٠٠ متر من سطح البحر. ساقها مسطحة لا مجاذرة. أوراقها متفائلة، حاشية، مستطيلة الاثنان، نصالها شبه قلبية الشكل، جملة الخصار، جرداء البشرة. ازهارها محورية الاكثار، معنقة، خماسية البتلات، زرقاء اللون، وقد تكون بيضاء في بعض المواقع || أوقافها الخضر والجملة لا تخلو من المنافع الطبية **اصحها** في السيلان وانتفاع الطبخ. وقد تحوي بعض الفيتامينات الكثيرة النفع.

٢٢٢١٨ - **قَصَب مُسَطَّح** (S).
 Vinca herbacea (S).
 Pervenche herbacée (F).
 عشية برية معمرة تابل وتذوي في الشتاء. ساقها مسطحة تطول من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها احليجية مهدبة الختار. ازهارها الى الزرقا البنفسجية || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

٢٢٢١٩ - **قَصَب وَرْدِي** (S).
 Vinca rosea (S).
 Pervenche rose, P. de Madagascar (F).
 نوع من القصاب المر وقد يزرع كزهر في البلاد المتقدمة الحارة. ساقه مستقيمة تطلو من ٣٠ إلى ٤٠ سم. أوراقها احليجية مقنطرة القامة. ازهاره متوسطة القد، وردية اللون || ازهاره يستمر من الربيع الى الخريف.

٢٢٢٢٠ - **قَصَابَة** (F).
 Volls (F). Lop and top (E).
 الاغصان والاغصان المفصلة من الشجرة.

٢٢٢٢١ - **قَصَابَة، قَصَب المَاء، قَصَبُ** (S).
 Lutra (S). Loutre (F). Otter (E).
 جنس حيوانات لبونة من السرمويات ورتبة الارسم. انواعه ثمانية موطنها ضفاف ويرث بعض الانهار الاسيوية والاروية والارمكية. جميعها قازية. قوتها الاسماك. اجسامها مستطيلة، وروبيها حريضة، قوائمها قصيرة، حطب اصابعها متميها هل الباسية. اذنانها طويلة. اؤلهاها كيفية الورير القصير. الوالها الى الجؤرة مواجها يختلف باختلاف الانواع.

٢٢٢٢٢ - **قَصَابَة، هَيْج** (F).
 Etiollement (F).
 Etiolation, Sickness (E).
 اصفرار النبات ونحوه من جراء فقدان الخصب سببه الظل أو الطمر أي قلة النور أو انعدامه.

٢٢٢٢٣ - **قَصَاب** (S).
 ثبت من الحشيش وقيل هو الطحاة.

٢٢٢٢٤ - **قَصَابِي** (F).
 Judiciaire (F). Judiciary (E).
 كل ما هو مختص بالقضاء.

٢٢٢٢٥ - **قَصَب** (F).
 Luzerne (F).
 هو القصة. الحلبا.

٢٢٢٢٦ - **قَصَب** (F).
 Recéper (F).
 To cut down close (E).
 قصب الزكرم. قطع اغصانه ايام الربيع.

٢٢٢٢٧ - **قَصَبَة** (S).
 Dendrochalcidion (S).
 Dendrochalcidion (F).
 جنس طير من الجروام مشروبات المناقير وفضيلة السباتيات. انواعه المعروفة خمسة. اطالها تمتد من الهند الى جزر

٢٢٢١٠ - **قَصَبِيَّات** (S).
 Patellidés (F). Patellidae (E).
 فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مملوكة الاربل امابيات الخياشيم الحليجية. اجناسها قليلة العدد اما انواعها لكثيرة منتشرة في جميع بحار العالم. تعيش على الصخور المغورة قرب الشطوط || اعرف اجناسها واشهرها الصنعية والشكلوة.

٢٢٢١١ - **قَصِيل** (S).
 زرع الشمر يمز اغصن لعلف الدواب.

٢٢٢١٢ - **قَص، قَصَص، قَصَة** (F).
 Gravier pour béton (F). Gravel of concrete (E).
 حصى صلبة القد متساوية الحجم حادة المكسر تستعمل في الباطون.

٢٢٢١٣ - **قَصَب أَحْمَرِ الْمَنَادَة، أُرُ قَصَاب** (S).
 Xiphorhynchus procurvus (S).
 Falcirostre à bec en sabre (F).
 طائر من القصاب. موطنه بعض مناطق امريكة الجنوبية واغصها الفريان. يألف الاجراع الجبلية حيث يكثر الرقل والوقل || جسمه مستدل القد بطول نحو ٢٥ سم. بما فيه الشفاذ الذي يبلغ ٧ سم. يتميز بقلاده المستطيل الاحمر كالحسام العربي وبذيله المستطيل المستدير الطرف. ثوبه متداخل الالوان. رذائل وبطه الى السمر الزيتية المولاج. زوره ابيض. رأسه وفتحه وصدرة الى الياض الاصفر يملوه تشويش مستطيل احمر. جناحاه وذيله الى الجؤرة. حدة عينه كسنية اللون. منقاده وساقه الى الفضة السمر || طارانه خفيف الحركة. قصير الشوط. قوته البندان واسارع الخشرات يتلصصا انما كانت بواسطة منقاده المستطيل || يدن منه في تجاريف الاجارح. الاثا تقع من يفضين الى ثلاث يضاف تحفصا بجناوة الاكر نحو ١٥ يومًا.

٢٢٢١٤ - **قَصَب، عَنَابِيَّة، وَلَكَا** (S).
 Vinca (S). Pervenche (F). Periwinkle (E). Sinngrün (D). Pervinka (I).
 جنس نباتات عشية وعشوية من فصيلة الدفليات. انواعه ١٢ مستطير بري وبعضها زراعي زُرعي. أوراقها متفائلة معنقة كاملة. ازهارها ابيلية فردية طويلة الزناد قيمة الكأس خماسية البتلات، يكثر فيها اللون الازرق. اشهر انواعها ما يتبع:

٢٢٢١٥ - **قَصَب صَغِير *، قَصَب مِصْرِي** (S).
 Vinca minor (S). Petite pervenche, Violette des serpents (F).
 نوع من القصاب للممر غروب حديد. ساقها عشوية فرعاء تملو من ١٥ الى ٢٠ سم. أوراقها منجبة بالابيض أو بالاصفر. ازهارها حادية أو مكسبة منها الابيض والازرق والبنفسجي والوردي والاخر || ازهارها يستمر من شباط الى حزيران.

٢٢٢١٦ - **قَصَب كَبِير *، قَصَب صَغِير** (S).
 Vinca major (S).
 Grande pervenche, Violette des sorciers (F).
 نوع من القصاب للممر. ساقه عشوية فرعاء تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. أوراقه صلبة القد، نصلها ستاني الشكل، قلبي القامة، مسنج الصلصة أو مطوق الختار بالاصفر. ازهاره كبيرة القد قطرها نحو ٥ سم. لوها الى الزرقا الجبلية || ازهاره يستمر من اذار الى حزيران.



قَصَاب صَغِير



قَصَاب كَبِير



قَصَابَة

S. sempervirens (S). قصب الذهب الدائم الخضار
Verge d'or toujours vert (F).

S. latifolia (S). قصب الذهب العريض الورق
Verge d'or à larges feuilles (F).

S. graminifolia (S). قصب الذهب العصي الورق
Verge d'or à feuilles de graminées (F).

S. multiflora (S). قصب الذهب الكبير الزهر
Verge d'or multiflore (F).

S. canadensis (S). قصب الذهب الكندي
Verge d'or du Canada, Gerbe d'or (F).

S. serotina (S). قصب الذهب المتخار
Verge d'or sardive (F).

S. virga-aurea (S). قصب الذهب المبلول
Verge d'or commune (F).

S. nutans (S). قصب الذهب المنحني
Verge d'or penchée (F).

Bactériacées (F). قصبية
Bacteriaceae (E).

فصيلة من البكتيريا تتميز بشكلها القضيبي . خلاياها
أسطوانية مستقيمة تنقسم حودياً باتجاه واحد . أجناسها
ثلاثة : البكتيريوم والبسيلوس والثرزوف . أما الأنواع
فمليئة بحي مذكورة في مواضع التسلسلية .

Procès (F). Law-Suit (E). قصبية
في النزاع الذي يعرض حل المحكمة .

Affaire en état (F). قصبية معدة للحكم
في القضية التي استقرت فيها المرافعات .

Chat (F). قط - قطة
هو السنور ، أظله .

Serval (F). قط - سكير
هو البج ، أظله .

Gangas, Ptérocles (F). قطة
Pterocles, Sandgrouse (E).

جنس طير من فصيلة الجوليات وأجناسه قطاة وقطاط . أنواعه
مدينة جميعها قريبة الشبه من الحمام تتميز باستطالة ردة
وريشتين من أفنيكها تكنتان الذهب . وهي سريرة
الطيران تظهر مسافات شاسعة في طلب القوت والمساء .
تألف الثنائي ، قوتها الجيوب والبرور ونواحي بعض
النباتات . تعيش أسراباً كبيرة . تنف في أفضوس ترصعه
بالقش والأبر . ألتها تحضن أربع بيضات صغيرة القد
مرقطة || وقوصف القطا بالهدأة والعرب تضرب بها المثل
في ذلك . ومن قول الشاعر :

والناس اهدى في القبيح من القطا
واهدل في الحسن من الغربان

ويقول في وصفها :

أما القطاة فاني سوف انتها
نعتاً يوافق معنى بعض ما فيها

سكاك مخفورية في ريشها طرف

سود قوامها صهب غوائها

أعرف أنواعه وأشهرها ما يتبع .

أنواع وبعض الأقاليم الأفريقية || أجناسها صغيرة تطير
من ٢٠ إلى ٢٢ سم . أجناسها ضيقة مستطيلة . أذناها
فاقة . رافعا بالفة الطول . أذناها إلى السواد الأسف يملو
مراج أخضر أو بنمسي . حاسرها غططة بالأبيض .
صدورها وبطنها إلى الأبيض الأغر || ملاحظها الحياتية
جارية . تكثر عشاتها في قم الأتجار الباسقة . الأثي
تحضن من بيضة إلى بيشتين ثلاث مرات في الحول .

٢٢٢٢٨ - قصبية ، سرج ، طرير
Cadaba (S). Cadaba (F). Esel-wood (E). Ezelbaum
(D). Cadaba (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة الكبريات . أنواعه قليلة .
جميعها مجبريات ونباتات سرحة أو شائكة . أوراقها كاملة
متشابة ، متصلها جامة النسيج ، مجري اللون . أزهارها
فردية ، محورية وتاجية . ثمارها قرنية أسطوانية ، لونها
إلى الخضار البصري ، لبها جامة المكر غزير العصاره
الحامزة المرة || يقال أن صارتها تلم الجرح وتطرد
الديدان المعوية .

٢٢٢٢٩ - قصبية
نبات من الحنط ينبت في السهل . ج قصب .

Terrain peu caillouteux (F). قصبية
Pebbley ground (E).
هي التربة القليلة الحصى . أما التربة الكثيرة الحصى
فتسمى حصية .

Pépins de raisin sec (F). قصب
هو زرع الزبيب الذي لم ينبت الجلف .

Pénis (F). Penis (E). قصب
اسم شامل يطلق على ذكر كل حيوان .

Branche (F). Branch, Bough (E). قصب
كل نبات من الأضمان يقصب . ج قصب وقصبان .

Ente (F). قصبية التطعيم
Graft, Branch bearing a graft (E).

قصبية أو غصن دقيق له من زيمة واحدة إلى ثلاث زيمات
وهو يصلح للتطعيم وقد يستعمل لعملاً لشجرة .

٢٢٢٣٥ - قصب الحمثل
Courson, Coursonne (F). Shoe cut down to three-
or four eyes (E).
كل قصب قلم وقط عليه من ثلاث إلى أربع براعم ثمرية .

٢٢٢٣٦ - قصبية الذهب ، عصا الذهب
Solidago (S). Solidage, Verge d'or (F). Golden-rod,
G. wings (E). Goldrute (D). Solidago, Verga
aurea (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة المركبات الشامية الزهر .
أنواعه نحو ٩٠ معظمها عشبي وبعضها شجري . أوراقها
متشابهة رحيمة . أزهارها ضيقة شامية متتالية جيلة الشكل
صفراء اللون || أعراف أنواعه وأشهرها :

قصب الذهب الأرمود
S. glabra (S).
Verge d'or glabre (F).

قصبية الذهب الثنائي اللون
S. bicolor (S).
Verge d'or bilocore (F).

قصبية الذهب الجامد
S. rigida (S).
Verge d'or rigide (F).



نصب



قصب الذهب



قطاة كدرية

٢٢٢٥٢ - قُطَاس * ، قُوتَاش ، خُشْغَاء ، يَكْ

Poephagus (S). Yack (F). Yak (E).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة البقريات أنولاء المرققة
اثنان موطنها جبال التبت من ارتفاع ٢٤٠٠ الى ٥٥٠٠ م.
من سطح البحر || وقطاس حيوان كبير الخيل يملو
من ١٦٠ الى ١٨٠ سم. ويزن من ٥٠٠ الى ٦٠٠
كيلو. شكل جسمه يأخذ من البيسون والجاموس والثور.
رأسه كراس الثور إلا أنه محدد القحف ، مستطيل القرون
للمنتصبة . خنثيته متعامدتان ، عيناها كبيرتان ، اذناه
مستطيلتان . قوائمها قوية . ثوبه الى السرعة الماعقة السوية
تملؤها رشفة صهاده . خطمه وذعره وزبمة ذنبه بيض .
ذنبه يشبه ذنب الفرس وكان الترك يزبون فيه العلم . قوته
الاضطراب . سره كثير اللد . اثنان تقسم بقصوراً واحداً
في الحقل يسير وراء امه فور وضعه || أما نواها نهاراً :

P. metus (S). Yack mueet (F).

P. grunnius (S). Yack commun (F).

القطاس الخلعف
وهناك القطاس الناجين وهو ضرب من الخلعف يشمل
بعض الفروق . يستعمل في الجبل واقتل بالحرارة . حليب
اثناله غزير المادة السكرية ، مستحب العرف .

Sectaur, Domaine (F).

Sector, Domain (E).

Coupe (F). Cutting (E).

٢٢٢٥٣ - قُطَاع

٢٢٢٥٤ - قُطَاعَة

٢٢٢٥٥ - قُطَاف ، خِرَاف ، خِرَاف

Cueillette (F). Gathering (E).

اجتماع البشر او غلاته من الانتاج النباتي عند الادراك .

Vendange (F).

Vintage, Grape-gathering (E).

٢٢٢٥٦ - قُطَاف الكَرْمَة

اجتماع مناقيد العنب اوزن قطاف العنب .

Polyandrie (F).

Polyandry (E).

٢٢٢٥٧ - قُطَامَة *

القطامة تعدد الأزواج عند المرأة الواحدة .

Rostrhamus (S).

Rostrhame (F).

٢٢٢٥٨ - قُطَامِي * ، قُطَامِي
جنس طير من حارة الحناء وفصيلة الصقريات ، أنولاه
لثلاثة موطنها البلاد الحارة . وهو عزيز الرجين ، كبير
الجثة ، يمتد من اعظم الطيور التي يصاد بها || يألف
الحيوانات ويجاري الله . ينش عنه في الانجار القرية
من الماء . اثناه قبيضي وتحسن من رفعتين الى ثلاث وفئات
مستطيلة الشكل طلاء اللون .

Légumineuses (F).

Légumineuses (E).

٢٢٢٥٩ - قُطَانِيَّات

هي القرنيات فصيلة نباتية ، اطليها .

Henné (F).

Henné (E).

٢٢٢٦٠ - قُطَب

هو الحناء ، اطليها .

Pôle (F). Pole (E).

Pôle (E).

٢٢٢٦١ - قُطَب

القطبان ، جغرافياً ، هما طرفا محور الارض الذي يمر
بمركز الكرة الارضية ، وهما القطب الشمالي والقطب الجنوبي .
وتبلغ المسافة بين خط الاستواء وبين كل من القطبين نحو
 عشرة الاف كيلومتر . اما القطر القطبي للارض فهو



قطاي

Catapodium (S).

Catapode (F). Catapodium (E).

٢٢٢٦٢ - قُطَاب *
نبات عشبي بري مسمر من فصيلة النجيليات . يألف
البراري البحرية . ينبت من النباتات الطوعية في لبنان .

٢٢٢٦٣ - قُطَاة الرمال ، دَيْلَم

Pterocles arenarius (S). Ganga des sables (F).

اكثر انواع القطا . طولها نحو ٣٥ سم . ثوبها الى الصهبة
الحمراء يملو توشج يراعي واصفر . يملها هاتق اللون .
منقارها اسود . موطنها شاسع الاطراف يمتد من رمال آسية الى
ومال افريقية .

٢٢٢٦٤ - قُطَاة شَرْيَّة ، جُولِيَّة

Pterocles orientalis (S). Ganga oriental (F).

طائر من القطا . طولها نحو ٣٠ سم . ثوبه الى الصهبة
الحملة يملو توشج ابيض ابيض . صدره الى الجوزة الباهة ،
يعت الى السرة ، منقاره وبطن جناحيه وقوامه الى السواد .
موطنه فياني الشرق الاقصى .

٢٢٢٦٥ - قُطَاة كُتْرَاوِيَّة ، عَطَاط

Pterocles exustus (S). Ganga brûlée (F).

طائر من القطا . طولها نحو ٣٠ سم . ثوبه الى
الصهبة الحملة يملو رشفة الى الجوزة الفاتحة الزاهية .
صدره ويعت الى الصفرة الموشجة بالاسمر || سره متوسط
المد . موطنه الصحاري .

٢٢٢٦٦ - قُطَاة كُدرِيَّة * ، كُدرِيَّة

Pterocles sichts (S). Ganga cata (F). Large painted sandgrouse (E).

طائر من القطا ، طولها نحو ٢٧ سم . ثوبه الى البنية
ارقت الطهر والبطن . اسفر الخلق . اسود الحار .
موطنه فياني وصاري الشرق الاوسط وافريقية الشمالية
والغربية . اسراه كثيرة اللد .

٢٢٢٦٧ - قُطَاة مَرْقَلَة

Pterocles senegalus (S). Ganga du Sénégal (F). Spotted sandgrouse (E).

طائر من القطا . صغير القد طولها نحو ٢٥ سم . ثوبه الى
الصهبة المرقطة بالاسمر والاحمر || موطنه رمال السنغال
والصحراء الكبرى .

٢٢٢٦٨ - قُطَاة مُكَلَّلَة

Pterocles coronatus (S). Coronetted sandgrouse (E).

طائر من القطا . صغير القد طولها نحو ٢٦ سم . ثوبه الى
الصهبة الغبراء يملو رشفة حمراء . رأسه ناش بعض الريش
الذي يبدو كالكلاكل . سره متوسط اللد . موطنه المناطق
الاستوائية افريقية .

٢٢٢٦٩ - قُطَاة مَرْقَلَة ، دَلِيم

Pterocles lichtensteini (S). Ganga rayé (F). Close-barred sandgrouse (E).

طائر من القطا متوسط القد ، طولها نحو ٢٨ سم . ثوبه
الى الصهبة الغبراء يملو توشج اسمر يغلب البورقظ
والليل . صدره اطول ارقش . يملو وزمكا الى البياض
التي . سره متوسط اللد . موطنه افريقية الاستوائية .

٢٢٢٧٠ - قُطَارَة ، خُشْغَاء

Compta-gouttes (F). Drop-tube (E).

انبوب من قزاز مذهب الطرف المستطع يستطاع بواسطته
تنقيط المواد السائلة نقطة نقطة .

نشوية مأكولة. شراخها يعلو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. أزهارها عاجية البتلات، صفراء الاسدية. أوراقها قرصية الالتشاب، كبيرة، القذ، زلادها يعلو نحو المتر. أزهارها صيني.

٢٢٢٧٥ - قُطْبَة عَالِيَة ، سَهْمُ الْمَاءِ الْعَالِمِ

Sagittaria natans (S). *Sagittaire flottante* (F). عشية سبروتية ترينينية معمرة تعيش في الأكواريوم. شراخها يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها قرصية الالتشاب، طويلة الزناد، نصلها لا قياسي الشكل والحجم يوم على سطح الماء. أزهارها ضمية التجميع، بتلاتها يضاء اللون شفافا || أزهارها صيني.

٢٢٢٧٦ - قُطْبَة تَجِيلِيَّة ، سَهْمُ الْمَاءِ التَّجِيلِي

Sagittaria graminea (S). *Sagittaire graminée* (F). عشية ترينينية زهية. شراخها دقيق يحمل يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها قرصية فالقرصية مستطيلة الزناد، نصلها متوسط الحجم عايق الخصار اما الشراخية الهوائية فضيقة النصل اللاطي الباهت الخصار. أزهارها ملاقية، اسديتها كبيرة رافعة الجسم، حلقة البشيرة. أزهارها صيني.

٢٢٢٧٧ - قُطْبَة هَائِكَة ، سَهْمُ الْمَاءِ الْهَائِكَة

Sagittaria heterophylla (S). *Sagittaire hétérophylle* (F). عشية جادسة معمرة مهدا أمريكية الشالية. شراخها يعلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. أزهارها السفل لاطفة مرم، أزهارها العليا متفكة مجدية. أوراقها قرصية الالتشاب، مستطيلة الزناد. نصلها هالك الشكل والحجم والون. أزهارها صيني.

٢٢٢٧٨ - قِطْرَاس

Catabrosa aquatica (S). *Catabrosa aquatique* (F). نبات عشبي يري حوالي من فصيلة النجيليات. منته ضفاف مجاري الماء. يصير من النباتات الطوعية في لبنان.

٢٢٢٧٩ - قِطْرِي

نبات يصنع منه حبل مرم وهو غير من الكبار (السان)

٢٢٢٨٠ - قُطْبِي

نمت تعري يطل على كل ما له صلة بالقطب.

٢٢٢٨١ - قُطْبِيَّة

خاصة اتجاه الايرة المنقطة الى القطب.

٢٢٢٨٢ - قِطَّة

للثقيقة من ألبليخ وبيره. تقول حات قطة من البليخ.

٢٢٢٨٣ - قِطْر

خط مستقيم يمر بمركز الدائرة وينتهي عند طرفها المتقابلين فيقسمها الى قسمين متساويين. وهو في مساحته ثلث المحيط. وقطر المربع والمستطيل والمعين والشبه بالمعين هو الخط المستقيم الواصل بين الزاويتين المتقابلتين من هذه الاشكال.

٢٢٢٨٤ - قِطْرَاس حَقْلِي

Lycotocoris campestris (S). *Lycotocoris champêtre* (F). حشرة مقنرة من فصيلة القترسيات. جسمها صغير القد

اتصر من طرفها الاسرائلي بنحو ٤٣ كيلومتراً. والقطبان منطليسيا يتجاذبان اذا كانا مختلفين، موجب وسالب، ويتنافران اذا تشابه.

٢٢٢٨٥ - قُطْب جَنُوبِي

Pôle sud (F). *South pole* (E).

٢٢٢٨٦ - قُطْب حَيَوَانِي

Pôle animal (F). *Animal pole* (E). *Cathode* (F). *Negative pole* (E). هو المحيط، اطلية.

٢٢٢٨٧ - قُطْب كَهَلِي

Pôle nord (F). *North pole* (E).

٢٢٢٨٨ - ثَلْب مَتَوَكَّد

Pôle conséquent (F). *Consequent pole* (E).

٢٢٢٨٩ - قُطْب مَنَظْمِي

Pôle magnétique (F). *Magnetic pole* (E). *Anode* (F). *Positive pole* (E). هو للصد، اطلية.

٢٢٢٩٠ - قُطْب نَبَاتِي

Pôle végétal (F). *Vegetal pole* (E).

٢٢٢٩١ - قُطْبَان

Brachypodium (S). *Brachypodium*, *Brome chiendent* (F). *False brome grass* (E). *Kurzstamm*, *Zwenke* (D). *Paleo*, *Pennacchi* (I). نبات عشبي يري من فصيلة النجيليات قريب الشبه من المكروش يكثر في البور وفي الاراضي المساحة برما المال ويسمن عليه. وهو اذا كثر بين القزروب وفي الاراضي المزروعة استوجب الإبادَة.

٢٢٢٩٢ - قُطْبَة

هي الخوزن، طائر من البلييات.

٢٢٢٩٣ - قُطْبَة ، سَهْمُ الْمَاءِ

Sagittaria (S). *Sagittaire*, *Fléchiera* (F). *Adder's tongue*, *Arrow-head* (E). *Pfeilkraut* (D). *Sagittaria*, *Barba silvana* (I).

جنس نباتات عشبية، جلمورية، مائية، معمرة، من فصيلة الزمرايات. أنواعه ١٧ جميعها من نباتات البلاد الحارة والمعتدلة أوراقها سمية الشكل، مستطيلة الزناد قرصية الالتشاب. أزهارها ثلاثية الترتيب والتجميع يلب لها اللون الأبيض ثم الأحمر || أشهر أنواعه ما يلي.

٢٢٢٩٤ - قُطْبَة شَائِكَة ، سَهْمُ الْمَاءِ الشَائِك

Sagittaria sagittifolia (S). *Sagittaire commune*, *Sagittaire*, *Flèche d'eau* (F).

عشية ترينينية سبروتية معمرة مبلولة في المناق والاسواض. تملو من ٤٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقها قرصية وشراخية فالقرصية طويلة الزناد كبيرة القذ مستعرضة اما الشراخية الهوائية فضيقة الشان حادة الزناد. أزهارها ضمية، ثلاثية او خاسية التجميع. بتلاتها شفافا للتسج، يضاء اللون، وودية الخمار || أزهارها يصير من ايار الى آب.

٢٢٢٩٥ - قُطْبَة صِيْنِيَّة ، سَهْمُ الْمَاءِ الصِيْنِي

Sagittaria sinensis (S). *Sagittaire de Chine* (F). عشية ترينينية سبروتية معمرة مهدا الصين. جذامها



قطبان



قُطْبَة

Lagocle (F).

٢٢٢٩٠ - قُطْرِب

نبات عشبي بري ، طيب ، من السكيات يدهن لغشياً ،
اطلبها .

٢٢٢٩١ - قُطْرِب

القطرب ، ويدعى أرطيقون ، نبات شائك الازهار ،
ينشب بين يمر به . راجع أرطيقون .

Clibanarius (S).

٢٢٢٩٢ - قُطْرِبَة

Clibanarius (F). Clibanarius (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات عشاريات الارجل
طوال الليل وفصلية الباغوريات . انواعها المعروفة حديثة
منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة || تعيش في الانوار
قرب الشواطئ . ملحيها الحلياني جماعي ، جاماتها متوتعة
البدن || اجسامها تظلم من ٤ الى ٦ سم . انوثها زاهية
الالوان الجميلة وبعضها يجلع .

Alkalurops

٢٢٢٩٣ - قُطْرِبُوس

النطربوس نجم من كوكبة العواء مركزه على رأس البقار
اي العواء .

Diomedes (S).

٢٢٢٩٤ - قُطْرَس *

Albatros (F). Albatross, Diomedes (E).

جنس طيور بحرية من كليات القدم . موطنها البحار
الجنوبية من جميع خط الاستواء . انواعها سبعة جميعها
كبيرة الجثة ، عظيمة القدة ، طولها يراوح من ١٦٠ الى
١٨٠ سم . ويستعملها تراجيح من ٣٠٠ الى ٤٠٠ سم .
وي طير فضلك وتقوم قنسر وتسرع وتقتس لتجديد ذلك .
انوثها الى البيض الناصع يلمسناها اجنحتها السوداء اللون
او الضلعاء . مناتها كبيرة القدة ، متنفقة المنسر ،
حتلية اللون ، صفر المولج || قوتها الاساك والقشريات
والجف البحرية . تكتن في افسوس ترسمه بالقتش .
حلتها بيضة واحدة ترخمها نحو حبة اسابع .

٢٢٢٩٥ - قُطْرَس مَرْتِيَك *

Anthocoris confusus (S). Anthocoris confus (F).

حشرة مفترسة من فصيلة القطرييات . جسمها صغير القدة ،
يطول نحو ٤ سم . رأسها صغير الجرم ، اسود . غطها
ممتد الطول . عيناها صغيرتان . زبانا دقيقتان ، مبرتا
كوسلها اسود وحجبتها كلك . ظهرها لاسن
يتجاوز البين بزائين . يظنها الى السرة السوداء . قوتها
الى الشقة السوداء || تألف المواق التي يكثر فيها الحور
والصفصاف . تعيش تحت القشور . قوتها ما تقتنه
من حشرات .

Anthocoridés (S).

٢٢٢٩٦ - قُطْرَسِيَّات *

Anthocoridés (F). Anthocoridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة خنثافات الاجنحة وطيفة نصليات
الجنح . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة البدن منتشرة
في معظم اصقاع البلاد الحارة والمعتدلة الحارة والباردة ||
اجسامها صغيرة ، معتدلة التبطيط ، ملونة . رؤوسها
صغيرة . اعطائها نشطة ، ثلاثية الاجزاء . عيناها جانبية ،
ناشرة . قوتها الاستشعارية رباعية الفصل . كوسلها
معدية . حباتها صغيرة . ظهرها وروافها لائحة في
منظر الاتزان . حناجب ظهرها لائسية ، تكثر فيها
الاستطالة . قوتها صغيرة || الحشرة الجميلة مفترسة في

يطول نحو ٤ سم . رأسها محرم ، جزوي اللون . غطها
ممتد الطول . عيناها صغيرتان ، ناشرتان . زبانا
دقيقتان ، مهابان . كوسلها بني اللون ، جزوي المولج .
حجبتها صغيرة . ظهرها لا يلمس كامل البطن ،
حتيبها بدون الكوسل يطولها كتييج حنلي وغمة سمراء .
يظنها الى الجورة الباهتة . قوتها حنطية || تألف الثابات .
قوتها الحشرات الصغيرة والحوام .

Goudron, Poix (F).

٢٢٢٩٥ - قُطْرَان ، قِير

Tar, Pitch (E).

مادة راتنجية تستخرج بالقطر من اعشاب الصنوبر
والتنوب والسرو وغيرهما . ومن القوم الجبري .

Goudron de bois

قطران الخشب

Goudron de houille, Coaltar

قطران الفحم الحجري

يحمى في الهواء ويستعمل لطلاء جروح الشجر .

Sapin gracieux (F).

٢٢٢٩٦ - قُطْرَانِي

هو التنوب الجليل ، اطليه .

Sapin de Cilicie (F).

٢٢٢٩٧ - قُطْرَانِي اَمْصَر

هو التنوب الاناضولي . اطليه .

٢٢٢٩٨ - قُطْرِب

جاء في كتاب الجلساط : || القطرب طائر يحول الليل
كله لا ينام . وقالوا اجول من قطرب واسهر من قطرب .

Colobus (S).

٢٢٢٩٩ - قُطْرِب * ، قُطْرِب

Colobe (F).

جنس قرد من فصيلة الحباريات . انواعها المعروفة ١٢
جميعها افريقية تألف غابات واحراج المناطق الاستوائية
وما جاورها || اجسامها رقيقة القوام تظلم من ١٠
الى ٨٠ سم . تتميز بانعدام اهام ايها . انوثها جثة
الشعر . الرأيا تختلط باختلاف الانواع فيها الاسود
والابلق والاسمر والاصهب . انثاها تظلم من ٥٠ الى
٩٠ سم . || قوتها الثمار والحبوب والجلود . تعيش
جماعات كبيرة يراوح عددها من ٤٠ الى ١٥٠ .
انثاها تضع جرأ واحدة ترسمه نحو شهر || اما
انواع القطارب فهي :

C. peliatus (S).

قطرب ابيض المناكيب

C. à épaules blanches (F).

C. angolensis (S). C. d'Angola (F).

قطرب انكولا

C. ferrugineus (S).

قطرب حديدي اللون

C. ferrugineux (F).

C. ursinus (S). C. ourson (F).

قطرب دلي

C. kirk (S). C. de Zanzibar (F).

قطرب زنجبار

C. Satanas (S). C. satan (F).

قطرب ساتان

C. guereza (S). C. guérza (F).

قطرب فروزه

C. vellerosus (S). C. à fourre (F).

قطرب فروي

C. foal (S). C. de Foa (F).

قطرب فوا

C. cristatus (S). C. à huppe (F).

قطرب تنبراني

C. fuliginosus (S). C. fuligineux (F).

قطرب كتي

C. polycomus (S). C. à camail (F).

قطرب مردن



قطرب



قطرس

قليلة العدد . تألف الاغوار والمناقع وضفاف مجاري المياه العذبة || اجسامها مستطيلة ، اسطوانية الشكل او قرصية . رؤوسها مبطة الجرم ، شبه غروبية الشوذن . جميعها رطابية التوائم والاصابع || اعرف اجناسها واشهرها القنطروس والتقطور .

٢٢٣٠٣ - قَطَرُوف * Chotorhea (S).

Chotorhé (F). Chotorhea (E).
طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الثعالبات . موطنه يمتد من الهند الى جزر الزايج . يألف الرياض والحراج القريبة من مجاري الماء || جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٧ سم . يتميز بظهر مفادع الصليح اللبنة غروبية الشكل وباستطالة سباله التي تمتد حتى الزور . جناحه معتدلا الطول . ذنبه عشاري الزغال ، مستدير الطرف . ثوبه العلوي الى الخضار الالصى . واسفله احمى . محمر الى الزرق . عيناه كبرتان ، مطوقتان بالافخر . حذقة عينه ذهبية اللون . منقعه وامل صدره الى الزرق المرققة بالافخر . يطلع وافيخه الى الخضار الاصفر الملوحي . مفادعه ورصاة واصابعه الى الطحلة السبارة || قوته الحشرات من صغيرها الى كبيرها وبعض البآر اعصها العنينة وبعض البادر || يذئن افعوصه في حشر يحفره في التربة . الاثني تبض ٣ الى ٤ بيضات تحضها متوادة الذكر نحو ١٣ يوما .

٢٢٣٠٤ - قَطَرُوي Diametral (F).

Diametrical (E). **قَطَرُوي**
ما كان ثابتا قطر كوكوك خط قطري .

٢٢٣٠٥ - قَطَع ، قَطْل Abatte, Coupe (F).

Falling (E).
فصل الاشجار عن اربابها وطرحها على الارض .

٢٢٣٠٦ - قَطَع الودج Jugulation

اسدى طرائق جزر الماشية .

٢٢٣٠٧ - قَطَع طولي Section longitudinale (F).

Longitudinal section (E).

٢٢٣٠٨ - قَطَع مخروطي Section conique (F).

Conic section (E).

٢٢٣٠٩ - قَطَع ناليس Ellipse

٢٢٣١٠ - قَطَعاتوك هي عديمات الارجل ، اطلبها .

٢٢٣١١ - قَطِعة Parcels (F).

Parcel, Portion (E). **قَطِعة**
هي القطعة من الارض التي تولدت في مفهوم المساحة وحدة مقارئة .

٢٢٣١٢ - قَطِعة الفرس ، قَرس صغير Petit cheval (F).

Equulus (E).
قطعة الفرس او الفرس الصغير كوكبة نجوم شامية الموضع مركزها بالقرب من كوكبة الفرس الاطغر || نجمرها قتلبة العدد منها اربعة مزدوجة ونجما مثلثان . اشهرها ونثر قطعة الفرس .

٢٢٣١٣ - قَطَف ، قَطَفَ ، قَطَفَ ، قَطَفَ Cueilir (F).

جَتَى
To gather, To cull, To pluck (E).

انقطع الانتاج من مصدره كالثآليل من الاجمار والاعذار من السوق والاخصان والاوراق من الثبات ، الخ .

جمع الانواع . اما البرقة فانما تموت على الثبات وتحت لطمات الاجمار حيث تقترن ما تستطيع من حشرات ودوريات .

٢٢٣١٧ - قَطَرَم Nepeta (S).

Népète, Cataire, Chataire (F).
جنس نباتات عشبية عطرية برية ممرسة من فصيلة الشفويات . انواعه نحو ١٠٠ معظمها الغربي الملبث يكثر في البراري الرطبة . سوقها مستقيمة فراء . اوراقها متقابلة متعقة بيضية الشكل ، نصلها سنن الحافة ، خلى الصفحة السفلى . ازهارها عقديدي التجميع . اعذارها فولية العرف الاخاذ لونها الى الزرق المتباينة الملوحي || اعرفها واشهرها ما يتبع .

٢٢٣١٨ - قَطَرَم الهير * ، حَشِيَشَة الهير ، قالدنج جبلي Nepeta cataria (S).

Népète cataire, Herbe aux chats (F). Catmint, Catnip, Nep (E). Echts Katzenkraut, Nept (D). Cataris comune, Erba gattaia, Gattaia (I).
نوع من القنطرم الملبث يعيش في الموائع الرطبة . ساقه منتصبه فراء تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراقه عطرية الرائحة ، زياء النصل . عقايد لهدة . اعذاره صيرة القد ، يبيض اللون زرقا الملوحي || ازهاره يستمر من ايار الى آب .

٢٢٣١٩ - قَطَرَم بنفسجي * ، زهر مريم Nepeta mussini (S). Cataire violet, C. de Mussini (F). Violet catmint (E). Nepepflanze (D). Cataria violacea (I).
نوع من القنطرم . ساقه مسطحة تقو نحو ٤٠ سم . فروعها منتصبه تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . جميعها خلية الماء ، طحلاء اللون . اوراقه بيضية الشكل ، قليلة القامة . نصلها غشغش اللبس اعصر الصفحة العليا ، خلى السفلى الغبار اللون . عقايد ازهار رطبة . ازهاره بنفسجية . ازهاره يستمر من ايار الى آب .

٢٢٣٢٠ - قَطَرَم كبير الزهر Nepeta grandiflora (S).

Cataire à grandes fleurs (F).
نوع من القنطرم ساقه منتصبه تملو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه كبيرة القد مزعجة النصل . عقايد رطبة . ازهاره كبيرة زرقا اللون فولية العرف || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٢٢٣٢١ - قَطَرُوس Proteus anguinus (S).

Protée anguillard (F).
حيوان قارب وحيد الجنس والنوع من فصيلة القنطروسيات ورتبة السرفويات . موطنه بعض اغوار يوفولافيه واعصها حلامية || جسمه قرني الشكل ، رباعي القوائم ، يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . رأسه مبطة الجرم ، شبه غروبية الشكل . عيناه شديتا الصغر لذلك يبدو كأنه اكة . ثوبه الى البياض القوي الباهت ، خصله الخيشوية حراء اللون || قوته الكبدان والذويبات الصغيرة .

٢٢٣٢٢ - قَطَرُوسيات Protéides (S).

Protéides (F).
فصيلة حورانات قلازية من الضفديات ورتبة السرفويات وفئة مستقرات الخيلام . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة



قنطرم الهير



قنطرم بنفسجي



لقنطروس



قطن



قطن شائع



قطن



قطن

٢٢٣٢٤ - قُطْلَبْ مَنْزِيَسْ

Arbutus menziesi (S). Arbousier de Menzies (F). نوع من القُطْلَب، منه البُلبُ الأمريكي. ثمرته تملو من ١٥ إلى ٣٠ م. أوراقها كبيرة اللد. أزهارها عشقودي النسيج. أزهارها بيض. ثمارها وردية طولها نحو ٣ سم.

٢٢٣٢٥ - قُطْلَبْ ، مَلْعَلِيَّةٌ *

Cattleya (S). Cattleya (F). Cattleya (E). جنس نباتات محلية من البرازيليات. أنواعها المبرقة عديدة، منها أمريكية الاستوائية || أوراقها مستطيلة النصال المتساكنة المقرعة كالأصناف. نصلها جولة الخضر البحري. أزهارها كبيرة البتلات القفازة المتجمعة || تزدهر في الأماكن لكنها تحب البرد.

٢٢٣٢٦ - قُطْمٌ

Orgasme (F). Orgasm (E). حالة الشبق أي الانعاط المطلق التي تعقب الفرج وتسبق الرجز.

٢٢٣٢٧ - قُطْلَارٌ

Hile (F). Hilum (E). هو الفوق التي في الثمرة وهي نكتة بيضاء مقفرة الألبات.

٢٢٣٢٨ - قُطْمِيرٌ

Tégmen, Tégumen (F). Tegumen (E). هو السيرة أي الشراع الباطني الذي يغلف البويضة والبزرة.

٢٢٣٢٩ - قُتْنٌ

Croupion (F). Parson's nose (E). هو منبت ذنب الطائر راجع نيك. ج أفتان.

٢٢٣٣٠ - قُتْنٌ ، حَكْوٌ

Lombes (F). Lumbar (E). قُتْنٌ ، قُطْرُ ، عُظْبٌ ، كُوسُفٌ

Gossypium (S). Cottonier (F). Cotton plant (E). Baumwolle (D). Cotone (I).

جنس نباتات زراعية صناعية من فصيلة البقوليات. أنواعها عديدة منها شجرية معمرة تعيش عدة أعوام ومنها سولية تعيش بعض السهور إلى أن تم دورتها الحياتية وتبيض.

تعريفه - اللتان الزراعي، يوجه عام، يتصف بالتحلية التالية - جنبة فنوا ترتفع من ٨٠ إلى ٢٠٠ سم. ترتكز على جنث مستقيم تملو ساق ليفية ثم خشبية التركيب تنفرع منها الفروع والأفنان || أوراقها معتقة كلبية مقصصة بأزواج عدد قصورها من ٣ إلى ٩ || أزهارها فردية ، كبيرة اللد ، جرسية الشكل ترتكز على ساقين محورية . الأوراق متباينة اعمها الأصفر والآخر والأبيض . والخزعة كاملة التركيب ، عسوية ، خشبية المقالات والبتلات ، عديدة الاسدية واللغات. خضراء بحري من ثلاثة إلى خمسة مضارب يتألف منها المبيض الثلاثي أو الخماسي الشكل || ثمارها أرجوانية اللون تسمى قفازة ثم كسج . والمطازة يمد تكوين بزورها وبذاتها التالية تنتج عن ثلاثة أو خمسة أزواج ملوية بالتالي يحمل كل منها من خمس إلى عشر بزور ونية الشكل سيد الثلاث ينشأها الزغب اللاصق بها . لما نسبة البتلات إلى البزور فتراوح من ٢٦ إلى ٤٢ ٪ . والتالية حله هي للمادة الصناعية الخام التي تصعب بد غزها ونسجها تلك الألفنة القطنية المشهورة التي تبلغ نسبة استعمالها في العالم نحو ٧٠ ٪ في حين أن سائر الألفنة الأخرى من حريرية وصفوية وغيرها لا يزيد استعمالها عن ٣ ٪

٢٢٣٣١ - قُطْفٌ ، إِعْثَرَاكٌ ، جَنْبِي

Cuellage, Cuellalson (F). Gathering, Gathering-time (E).

هو اقتطاع الثمار من الأشجار وهو أيضاً إغراق القطف والصمر وأجزاء أي وقت القطف .

Grappo (F). Bunch (E).

العنقود ساقه يقطف .

٢٢٣٣٢ - قُطْرٌ *

Commiphora katal, Balsamodendron katal (S). Baumi de Katal (F). Balsam of Katal (E). Katal Myrrhenbaum (D). Balsamo di Katal (I).

نوع من البلسان ينتمي إلى فصيلة البخوريات . ثمرته متوسطة اللد راتنجية العصاره يستخرج منها صمغ وادخان عطرية شائعة الاستعمال . انشائها متينة ، صناعية .

٢٢٣٣٣ - قُطْنٌ

Arroche (F). هو السمق ، أطلسه . الواحدة قطفة . يسه الأبيض والبحري .

٢٢٣٣٤ - قُطْلَارٌ

Pluvian (F). هو الثوروم ، طائر يدخل في التسلح يأكل ما فيه من البود .

٢٢٣٣٥ - قُطْلَبْ ، صَوْتُ الْقَطَا

٢٢٣٣٦ - قُطْلٌ

Blanc étoc, Blanc estoc (F). Felling clear (E).

قلع شجر الحرجية من أصلا قلعاً كاملاً .

٢٢٣٣٧ - قُطْلَبٌ ، قُطْلَبٌ ، بَسْجٌ ، قَاتِلُ أَبِيهِ

Arbutus (S). Arbousier (F). Arbuta (E).

جنس نباتات حرجية من فصيلة الخلجيات، أنواعها عديدة منها الأشجار والشجيرات . سويقها منتصبه فراء . أزهارها أبدة ، شبه بيضيه ، مستطيلة ، سلتة الحلقه ؛ نصلها مائل البشرة ، لاصق الصفيحة العليا الخضراء اللون ، لحمل السفل . وأزهارها حله تصلح للبلابة لأنها خضرة المادة العاصفة . أزهارها جليدية الشكل . ثمارها صلبة ناعقة وهي بطيئة النضج حاملة المذاق ، للبلدة الطعم || أشهر أنواعه ما يتبع .

٢٢٣٣٨ - قُطْلَبٌ شَائِعٌ * ، عَصِيرُ الدُّبِّ ، جِينَةُ أَجْزَرِ

Arbutus unedo (S).

Arbousier commun, Arbre aux fraises (F). Arbuta, Strawberry, Cane apple (E). Echter Erberbaum, Laudbeere (D). Albato, Corbezzolo, Brichello (I). نوع من القُطْلَب للبلول في الإسراج البنيانية . ثمرته تملو من ٣ إلى ١٠ أمتار . ساقها ولغصانها حمر اللحاء . أوراقها متناقبة معتقة ، نصلها جامد الصفيحة للامسة المستط الإطراف . أزهارها عشقودية النسيج وردية اللون . ثمارها شكلية الشكل أرجوانية طولها نحو ٢ سم . لبانها ناضج للمادة .

٢٢٣٣٩ - قُطْلَبٌ عُكْوِيٌّ

Arbutus andrachne (S). Arbousier paniculé (F).

نوع من القُطْلَب ، مهدد الشرق الأوسط . ثمرته تملو من ٥ إلى ١٢ م . ساقها ولغصانها جوية اللحاء . أوراقها بيضيه الشكل ، قلبية القاعدة ، جامدة النصل . أزهارها عشقودية النسيج . أزهارها فسقية اللون . ثماره قرنبية .

تنتمي الى ثلاثة عناصر رئيسية هي: الازوت والفسفور والبوتاس . افضلها لقطن تلك التي تركيبتها يشمل ما يحتاج اليه القطن دون نقص او زيادة || ولما كانت الحاجة تختلف باختلاف مقتضيات التربة والنبات لذلك فلا بد من احتياذ صيغة وسطية وميزونها للتنبيل وفقاً لحالة الزراعة . والصيغة الفضل الممكن احتياذاً تتركب من ١/٢/١ اي واحد ازوت واثنين فسفور وواحد بوتاس . وقد يميز تجوهرها اما بزيادة الازوت من واحد الى اثنين او بتخفيض البوتاس من واحد الى ثلاثة ارباع الواحد || اما الكمية اللازمة للدم الواحد فتراوح من ٢٥ الى ١٠٠ كيلو .

حراثة - يجب ان تكون الارض المعدة لزراعة القطن خالية من الاعشاب ، معدلة الرطوبة ذات تربة ناعمة لا تلغ فيها ولا مدر || ولكي تأتي الحراثة بالنتيجة المنشودة يجب القيام بها في الاوقات المناسبة وفقاً لحالة التربة والمواسم الجوية .

زراعتها - من مستلزمات زراعة القطن العناية المستمرة والسهو الدائم . ومن الواجب ان لا تكون كثيفة لان الكثافة تعوق النمو وتقتض الشوالب والاصوام وتسبب املاص الازهار والكناج .

مهاد الزراعة - ليس لزراعة القطن وقت معين كل من تقدمه او جاوزه كان نصيبه الاخفاق . ولكن لزراعة اي نوع كانت اوقات ملائمة لا يميز الاستعداد بها . وحيث ان القطن يتطلب الكثير من الحرارة للوصول الى كامل انتاجه ، وهو يخشى امطار الخريف وسقيته . لذلك يحسن مده باكراً للاستفادة من الاموال الجوية الموقوفة اطول فترة ممكنة . وانسب وقت لبدء زراعتها من ٢٥ آذار الى ٢٠ نيسان || وان يذر باكراً في العقد الاول من آذار وكانت زراعته تقرأ لا بد من قطفية البذور بالرمل منماً لبسك التربة

تحديد المسافات - لتحديد المسافات شروط عديدة اولها الصرم المستحب ثم طريقة البذر ان آلية او يدوية ثم حالة التربة وظروفها الخاصة ثم الاقليم ومواسمه المناخية ثم الموقع والمعرض ثم نوع الزراعة ان مروية او عذبة || لذلك فانسب المسافات تلك التي تراوح مساحتها من ٥٠ الى ٧٠ سم . ولا تقل مساحتها البينية في الخط الواحد من ٤٠ سم .

البذر - يبذر القطن اما نثراً او لقطاً او نثراً فالبذر نثراً لا يلائم اقليم البلاد العربية ومواسمه الجوية وطرق دحا وظروف زراعتها || اما لقطه حل فرصة التلم او بواسطة المبادر الآلية فهو عملية شائعة مبرمجة لكنها تستلزم الكثير من البذار وتسبب هتاية خاصة تامة قلما يقوم بها المزارع || اما طريقة البذر نثراً فبسه التخطيط فهي الاحسن اما يجب ان تكون التفر اما في فلق التلم ان كانت الزراعة يدوية او في اربع الاخير من سقمه اذا كانت الزراعة نصف مروية او حل غارب التلم اذا كانت مروية || وكيفية كانت الطريقة المثبتة فلا بد من الانتباه الكلي لوضع البذرة في التربة في الوقت المناسب لانباتها ونشيتها لان البذرة البسيطة تكثر الرطوبة عليها ويقل عنها الهواء ويقل فيها الغذاء فتضيق من الغفن . والبذرة الطائفة يحف عليها الغطاء ويكثر حولها الهواء ويحف عنها الرطوبة فيزيد بعد الاثناس لا تنبت اصلاً || اما البذرة التي صار عليها حل العلق الانسب وهو نحو ٤ سم . فانها تكون في محيطها الطبيعي الواجب بميدة من تأثيرات العوامل الجوية الفعالة ومن الطيور التي تلتقطها والرطوبة الزائدة التي تهللكها .

تاريخه - من المؤرخين من قال ان القطن ائمن من التاريخ . ومنهم من يقول انه قدم العهد غير ان قلته لا يتضح احتباب المصور الفرمونية . والدليل على ذلك علم استعماله في اقلية القراصة بينما كانوا يستعملون الكتان والقنب || لكن سققوا او مورا فاختاروا الفرس عرقوه فزروه واستعملوه وكذلك العرب منذ ان استعملوا ما بين البحرين . والعرب هم الذين نقلوه الى سورية لفسر فاجازوا صقلية فالاندلس . ومن الذين عرقوه بجميع شجوب شواطئ البحر المتوسط . فادخله الاوروبيين لتأتهم المختلفة بلطفه العربي (قطن cotton) دون تحريف .

القيمة - ينمو القطن في جميع الاقاليم التي لا يقل متوسط حرارتها مدة نمو الخصري وادراك ثماره من ١٨ او ٢٠ درجة سغ . بشرط ان لا تكون فوارق الحرارتين القصوى والحدية كبيرة وعلباته . وهو يخشى الصقيع في نيسان وايار وجاب الخريف الجارد المساطر . وكل زراعة تخرج من نطاق هذه الفترس المتناحية تنصير من المغامرات الخطرة هذا ان لم يتوصل العلم الى الآلي القريب الى استنباط مهاد جديدة سريعة النمو الخصري والقدرة الحياتية تتفوق بتكثيرها وادراكها الاصرام المعروفة حالياً .

زهره - يميز القطن في الآرية الطبيعية الزولية والرملية الطبيعية التي لا تقتصر الى الكلس والتي يريو غورها من ١٠٠ سم . لان معظم جهور القطن وشرشه يلقح هذا القاع || وقد تلازمه ايضاً كل تربة عيفة الغفور قليلة الاندماج بشرط ان لا تنقل منها الرطوبة بسرعة || وحيث انه من النباتات المفروص فيها سرعة النمو والادراك ، لا يستحسن زهره في الآرية المتجمعة المتأسكة خوفاً من تاخير نموه واستطالة دورته الحياتية || اما الاراضي الرملية والفسلانة التي لا تحتفظ برطوبة الري اكثر من ستة ايام فانها لا تصلح ابداً لزراعة القطن وكذلك الآرية الكثرية المحصى لان المحصى تمتع التربة من استعاب كامل مقهورها من الحرارة الفرمونية .

لسمده - يعتبر القطن من النباتات الفسرة التي تجهد التربة وتستنزف خواصها . فتكرار زراعته في التربة حينها يفقد هذه التربة جزءاً من عناصرها الاولى والثانوية . لذلك لا بد من البحث عن انجح طرق الاغصاب واتباع افضلها حفاظاً على التربة وزراعتها || وحيث ان الدورة الزراعية والتسميد هما اللذان الاساسيان اللذان يرتكز عليهما محور الحصب . فنقول في الدورة الزراعية انها ضرورية جداً بشرط ان لا تكون ثنائية لانها تصبح قليلة الفائدة . اما الدورة الثلاثية التي تلجح التربة في الوقت اللازم لتعزير نشاط جراثيمها وتجنب بعض ما فقدته من العناصر . فانها اصلح الدورات || اما التسميد والغاية منه اعادة العناصر التي صدرتها التربة مع محاصيلها فهو على شكلين متضوي ومعتني .

١ - **الاصمدة العضوية** : الاصمدة العضوية اشهر من ان تعرف وهي شائعة الاستعمال اهمها غني البقر والجاموس فروع الخيل وصائر الدواب فيبر القطن والاعجاز || والتي التي يعتبر من الاصمدة الباردة يستعمل في الآرية القليلة الانتاج لانه يخفف من مقدور استيعابها الحرارة ويقوي فيها خاصة الانتاج وينشط على الجرائم المفيدة ورسب . البيئة الدبالية اللازمة للحصب فضلاً عما يتركه من غذاء متصري للنبات || اما الروث فيستعمل في الآرية المتدعة لانه يعدها بحرارة ويخفف من انفساجها ورطوبتها بعد ان يمتها في القيام بجميع اعمالها الجوفية والكبوية .

ب - **الاصمدة المعدنية** كما هو معروف

تربية - تظهر عادة بوادر القطن بعد القطف أو التفرع بنحو عشرة أيام. ويصعد إلى التفرع بعد ظهور البوادر بيومين ولا يجوز تأخير هذه العملية خوفاً من اتساع فارق النمو بين النباتات الأولى ونباتات التفرع فتأتي هذه الأخيرة سقيمة ضعيفة وقد لا تسلم من شر الحشرات والأمراض.

حقل - الخلف أو التقدير عملية لا بد منها من أجل لزاج النباتات على الغذاء وتشطيط النمو والانتاج. وقد تم على مرحلتين في الأول فلتحط بعد ظهور البوادر بنحو ٢٥ يوماً ينزع من النقرة كل ما هو ضعيف ويزيد من الثلاثة وفي المرحلة الثانية وذلك بعد الأولى بمسرة أيام تنزع النباتات الضعيفة ولا يترك في النقرة الواحدة إلا نبات واحد || ولا يجوز تأخير الخلف عن الزمن المعلن خوفاً من الزراعة المتأخرة من الضعف والسقم || وإذا كانت الزراعة تليقاً فلا موجب لخلفها على مرتين بل يباشر تقريدها متتالياً بمراس ارتفاع ارتفاعها من ١٢ إلى ١٥ سم.

ري - ليس الري مواعيد مقررة ثابتة لانه مرتبط بحالة جفاف التربة والجفاف يبين عليه شئ العوامل الجوية من رياح وحرارة وتغير وطقية جوية نسبية وضغ وضوء... ومن المستحسن ري القطن بمعدل يدر بنحو ٢٠ يوماً في حالة التفرع || وقد يتطلب القطن مبدئياً ثلثي ريات. الري الأول بعد البذر بنحو ٢٠ يوماً ومن ثم كل أسبوعين مرة حتى أواسط شهر آب حيث يجب توقيف الري خوفاً من تعجيد النمو الضعيف الذي يؤثر الإدراك ويهدس التواهي الخفيفة إلى فتك المودة التفرغلية التي تكثر في هذه الأونة || أما إذا كانت الزراعة بحاجة ماسة إلى الماء ولا خوف عليها من المودة التفرغلية فلا مانع من ريةا من جديد.

٢ - مهاد الجني : يستمر الجني عادة من أواسط آب إلى أواسط تشرين الأول وهو منوط بمعدل كيفية وموسمية تسير عليها عناصر المناخ || وفي سبيل التذكير نقول انه لا يجوز أبداً جني الكتان قبل أسوداد زهورها لان الاطمان التي يتخللها زر آخر يتم من عدم اكتمال نضجها لا يمكن احتياؤها من الاصابات الجذابة المدمرة للثوابت.

٣ - طرق الجني : جني القطن إما باليد أو آلياً بواسطة الشطانات. لذلك طرق جني تختلف مع البلاد المنتجة لانها منوطه بإمكانات اليد العاملة وسهولة النقل والجمع والحفظ.

١ - طريقة الجني الشامل : انما لا شك اهم الطرق استعمالاً في البلاد العربية، تقوم على ترك الملقطة حتى اكتمال نضج جميع ثمارها فيفسد اذا ذلك الى جني وجمع كل ما تفتح من الكتان وما سقط منها على الارض فتضل الى مكان الفرز حيث تنظف من القشور والأوراق والقصوص المبرومة. جيوب هذه الطريقة مهدية لان كثرة تقليب القطن في أثناء مختلف عمليات الفرز لاترعب الفصوص المبرومة والقشور والافطار بسبب التفتت الفصوص الجيدة وتلوثرها بجراثيم الففن الاسود الموجد في الفصوص المبرومة تنشط من ذلك رتبة القطن فيفسد معه وتقل التالفة.

ب - طريقة الجني المتتابع : قوامها جني الكتان تباهاً. وهي عملية موفقة تزيد من وزن المحصول لانها تبع التيلة من أشعة الشمس اللاذعة ومن مقابيل السدى والذئب المضرة فتصفونها من انحطاط صفاتها الرئيسية : اللون واللثانة ، وتحمل دون سقط الكتان على الارض.

ج - طريقة الجني الآلي - عملية اقتصادية تقوم بها الشطانات الآلية لكنها تقع بالمعاذير عنها الى ذكرناها في طريقة الجني الشامل.

د - جمع القطن وفرزه : يجمع القطن بعد جنيه في المكان المده لفرزه وهذا المكان قد يكون اما ثاباً ويبنى المستودع او نقلاً ويبنى المحطة. والمحلة كالستودع يجب ان تكون نظيفة مفرقة بالغيش ومن ثلوث القطن يبقى الافطار. يتبنى عملية الفرز حدة وصول القطن الى المحطة الا اذا كان القطن من جني الصالح اليكبر ولا يزال رطباً من الندى فمتحدا يقتضي نشره بعض الوقت ريةاً بحيث تم يفرز || يفرز القطن عادة اما باليد او بواسطة.

هذه - ان كانت رطوبة التربة تحجب النباتات فزرق التربة الذي ينظفها من الاعشاب الضارة ويحافظ على رطوبتها عمل واجب لجلب النفع || ينزع القطن عادة في ثلاث مرات. المرة الأولى بعد الخلف وقبل الري الثانية. من الضروري ان تكون سطحية ، طائفة ما يمكن ، خوفاً من اقتلاع النباتات الفتية أو قطع شروشها الدقيقة || والمرة الثانية ثم عادة بعد الري الرابعة. الغاية منها اقتلاع الاعشاب الضارة وتفكيك التربة ورويتها وتصلحها لخطوط ومجاري الماء وتحسين النباتات اذا كان ذلك واجباً || اما المرة الثالثة المعروفة بالسقم فنورها يأتي بعد الري السادسة. قوامها ركش التربة لتجديد عزم الجذرات المتأخرة ثم كس التبات وضغطه بالقرب لتقوى على استحالة صف الرياح || وإذا كانت الزراعة حديثة فن الواجب ايضاً حرثها وكسها في الاوقات التالية : يباشر بالمرقة الأولى بعد الخلف بأسبوع وليس أكثر خوفاً من تقفد التربة الكثير من رطوبتها. ومن الأفضل ان تكون هذه المرة خفيفة سطحية || اما المرة الثانية والتسعين فيباشران بعد المرة الأولى بنحو ثلاثين يوماً ومن الواجب ان يكون الفرق حقيقاً لتفريغ كل ما أمكن من انابيب استهلاك الرطوبة.

١ - معلومات عامة : القطن كما ذكرنا جنية فانه يستمر ازدهارها نحو ثلاثة اشهر. وهي تبشر عند استيعابها نحو ٢٠٠٠ مسرة وقد يتم ذلك في غضون ثلاثة اشهر. ومن التمييز الى اكتمال البرعمة الزهرية وانبلاجها عن زهرة كاملة يلام نحو ٥٥٠ مسرة التي يمكن الحصول عليها بمدة ٢٥ يوماً. وتستمر الزهرة نضرة زاهية نحو ٤٨ ساعة الى ان يتم تلوثرها فيحمر لونها وتبدل ببعض ساعات

٢٢٣٣٨ - فُطْن مُشَجَّر

Gossypium arboreum (S). *Cotonnier en arbre* (F). *Tree cotton* (E). *Baumwollbaum* (D). *Cotone arbusto*, *C. dipietra* (I).

نوع من الفُطْن المعمّرة المتدّية. شجرته تعلو من ٤ الى ٦ أمتار. أوراقه ثلاثية أو خماسية التعميص. كنانته كبيرة قلبية القاعدة، خالية الصفحة السفلى. كنانته كبيرة القد، قصيرة التيلة، ناعمة اليباس، محدودة الاستعمال الصناعي.

٢٢٣٣٩ - فُطْنَجِيَّة ٥
Ampelis (S). *Cotinga* (F). *Cotinga* (E).

جنس طير من فصيلة الفُطْنَجِيَّات ورّبة الجوارم سنّيات المناقير. أنواعه المروفة نحو ٢٥ موطنها غابات ومنتقع أمريكا الوسطى والجنوبية. أجسامها صغيرة القد تعلو من ١٤ الى ١٨ سم. ألوانها ساطعة الألوان الجميلة. مناقيرها صغيرة مستعرضة القواعد. قوتها الثار البانمة وأحشرات الصغيرة والنمل. أشهر أنواعها الفُطْنَجِيَّة الزرقاء القلادة.

٢٢٣٤٠ - فُطْنَجِيَّة زُرْقَاء القلادة ٥

Ampelis cincta (S). *Cotinga cordon-bleu* (F).

طائر من الفُطْنَجِيَّة. موطنها بعض مناطق أمريكا الجنوبية. تألف الغابات والحدائق القريبة من الأماكن الأكلة. جسمها صغير، ممثل الرشاقة يطول نحو ١٦ سم. ثوبها العلوي إلى الزرقاء البحرية السفاه الماراج. ثوبها السفلي إلى الخضار البنفسجي الماراج تملو في الصدر قلادة من لون الظهر يطرقها الأحمر. حلقاها مشيرة بالأحمر. قة رأسها وأطراف جناحيها ورّبة موشة بالأسود الاسف. طيراتها غريفة الحركة طويل الشوط. قوتها الثار البانمة وأحشرات الصغيرة والنمل. تدنّ شعثها في كل مجرة فناء قليلة الارتفاع. الاثني تقص من ٤ الى ٥ يمشات حل مرتين في الحول. الترحيم يستمر نحو ١٥ يوماً تقوم به الأنثى بمناوبة الذكر.

٢٢٣٤١ - فُطْنَجِيَّات ٥
Cotingidae (S).

Cotingidae, *Ampelidae* (F). *Cotingidae* (E).

فصيلة طير من الجوارم سنّيات المناقير. أجسامها وأنواعها المروفة عديدة. موطنها القارة الأمريكية أخصها أمريكا الجنوبية والوسطى. تألف غابات المناطق الحارة. ملجئها الحياتي زوجي باستثناء بعض الأنواع الجامعية. أجسامها مستوية القد أو كبيرة. تعميم برصابة أهدائها وبالونها الجميلة الألوان السفاء اللامعة. أعرف أجناسها وأشهرها الفُطْنَجِيَّة والطُرْعَب.

٢٢٣٤٢ - فُطْنِيّ، حَقْوَرِيّ
Lombaire (F). *Lombar* (E).

٢٢٣٤٣ - فُطْنُوب ٥
Catops (S). *Catops* (F). *Catops* (E).

جنس حشرات من فصيلة الفُطْنُوبِيَّات ورّبة غديات الإجنسة. أنواعه المروفة نحو ١٠٥ منتشرة في جميع مناطق البلاد المعتدلة الحارة والمشمّرة نحو الباردة. أجسامها صغيرة القد، أهليجية الشكل، تعلو من ٤ الى ٨ سم. رؤوسها مستعرضة. عيونها صغيرة، مائحة. تأثيرها وكوكها نظامية. سلامها مستطيلة. قرونها الاستعارة خيطية. كواسلها مستعرضة. عذبة. اغداها معدة، لاسفة. قوتها مستطيلة. ألوانها تراوح

الزراوات أو الترابيل الفارزة وعلى حال القز ان يتبؤا جيداً لتنافسة الفُطْن وتختلف مراتبه لانها أساس المشرى وطلي التحويل. وبعد فرز الفُطْن وتقسيمه إلى الرّيب والدريجات المطلوبة يصار إلى تعميته ضمن أكياس خاصة نظيفة ثم ينقل إلى حابر المالح حيث يفرز من جديد قبل تقديمه إلى الماكنت الحاملة التي تفصل التيلة من البذور.

٢٢٣٣٢ - فُطْن آزَب، فُطْن أَمْرِيكِي

Gossypium hirsutum (S). *Cotonnier américain*, *Coton à courte sole*, *C. velu* (F). *Upland cotton plant* (E). *Amerikanische Baumwolle*, *Kurze Baumwolle* (D). *Coton peloso* (I).

نوع من الفُطْن الأمريكي المنبت. ساقه وقروبه وأوراقه مزينة. ضرابه وأصرامه وحالجه كثيرة العدد معظمها زراعي وافر الانتاج الجيد. تيلته متوسطة القد مشكورة الصنف.

٢٢٣٣٣ - فُطْن البَرْبَادِيّ، فُطْن مِصْرِيّ، فُطْن جَزِيرَةِ البَحْر

Gossypium barbadense (S). *Cotonnier égyptien*, *Coton à longue sole*, *C. d'Egypte* (F). *Egyptian cotton*, *Sea Island cotton* (E). *Agypische Wollpflanze* (D). *Cotone egiziano* (I).

نوع من الفُطْن الشرقي تبلي في مصر وأقص بمخصاص يزرع منها استمالة التيلة واستمالة البورة الحياتية وكثرة الانتاج. ضرابه وأصرامه وحالجه عديدة لكنّها محدودة الانتشار نظراً لطول مدة بقائها في التربة.

٢٢٣٣٤ - فُطْن البِيرُو

Gossypium peruvianum (S). *Cotonnier péruvien* (F). *Peruvian cotton plant* (E). *Peruvian Baumwolle* (D). *Cotone peruviano* (I).

نوع من الفُطْن، متوسط التيلة جيد الانتاج، مهدد أمريكا الجنوبية. ضرابه وأصرامه عديدة معظمها وافر الانتاج لكنه مستطيل البورة الحياتية.

٢٢٣٣٥ - فُطْن الهند

Gossypium indicum (S). *Cotonnier indien* (F). *Indian cotton plant* (E). *Indische Baumwolle* (D). *Cotone indiano* (I).

نوع من الفُطْن الزراعي الجيد الانتاج المتوسط البورة الحياتية. أصرامه عديدة منها الهند وأهند الصيلة.

٢٢٣٣٦ - فُطْن حَمَشِيّ، فُطْن الشَّرْقِيّ، فُطْن مَلْتَب

Gossypium herbaceum (S). *Cotonnier d'Asie* (F). *Levant cotton plant* (E). *Kurze Georgia Baumwolle* (D). *Cotone erbacea*, *C. annua*, *Bambagia* (I).

نوع من الفُطْن الشرقي الفاخر الصنف القليل الانتاج. كنانته كبيرة القد قليلة العدد. تيلته مستطيلة ناعمة ويتينة. ضرابه وأصرامه لا تحصى لانه دخل في جميع منط اقلان العالم أخصها الاطمان المصرية والأمريكية.

٢٢٣٣٧ - فُطْن شَرَقِيّ

Gossypium obtusifolium (S). *Cotonnier oriental* (F). *Oriental cotton plant* (E). *Nanking Baumwolle* (D). *Cotone orientale* (I).

نوع من الفُطْن الصناعي للمثل الانتاج والجودة. مهدد البلاد الآسيوية تكثر زراعته في الصين والنام، تيلته متوسطة القد يضاء اللون.



فُطْنَجِيَّة زُرْقَاء القلادة



فُطْنُوب

٨٠ الى ١٠٠ سم. هيتها هرية الشكل. اوراقها ثلاثية الالوان للتباينة. ازهارها سنبل التجميع مثل الاطراف .

٢٢٣٥٣ - **قُطَيْبَة جَسِيكَة *** ، **دَلَّاق** ، **رُعَاف**
Amarantus retroflexus (S). Amarante réfléchi (F). Wild beet (E). Gemüsamaranth (D). Fior belloso (I).
نوع من القطيفة التريينية. ساقها منتصبه تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. هيتها هرية الشكل. اوراقها ملونة. ازهارها عقدي التجميع منتطف الطرف. ازهارها الى الحمرة المختلة المزاج.

٢٢٣٥٤ - **قُطَيْبَة حَسْبِيَة *** ، **قُطَيْبَة ذَيْل الْعَتَب** ، **فَنَقُورُ الْجَنْدِي**
Amarantus caudatus (S). Amarante d'Abyssinie, A. queue de renard, Discipline de religieuse (F). Love-les-bleeding, Prince's feather (E). Fuchschwanz, Flormour (D). Amaranto codato, Bito maggiore, Staffle (I).

نوع من القطيفة التريينية. ساقها منتصبه تملو من ٩٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها متباينة الالوان المابقة. ازهارها شكلو التجميع، مستطيل القد، شديد التحسين والالتواء.

٢٢٣٥٥ - **قُطَيْبَة عَصْفَرَاء** ، **شَدَخ هِنْدِي**
Amarantus oleraceus (S). Amarante oléracée, Brède de l'Inde (F). Edible amaranth, Pot amaranth (E). Kohlamaranth (D). Amaranto oleraceo, Spinacio marrone (I).

نوع من القطيفة التريينية. ساقها منتصبه تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم. اوراقها زاهية الخضار الجليل. ازهارها عقدي التجميع، مردني الشكل، محبين الطرف، ازهارها فستقية اللون، اربوانية المزاج.

٢٢٣٥٦ - **قُطَيْبَة بَالَعَة** ، **شَدَخ** ، **بَلَعَة عَرَبِيَة**
Amarantus blitum (S). Amarante blette, A. suvage (F). Blite, Wild amaranth (E). Gemeiner Erdmarant (D). Amaranto salvatico, Bledire, Bito (I).
نوع من القطيفة الزراعية البقلة. ساقها منتصبه تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقها كبيرة القد مأكولة. ازهارها عقدي التجميع، هري الشكل.

٢٢٣٥٧ - **قُطَيْبَات**
Amarantaceae (S). Amarantacées (F). Amarantaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين، اجناسها وانواعها قليلة المدد معظمها عشبي وبعضها جنبي. سوقها لينة. اوراقها بسيطة متعاقبة. ازهارها لاقحامي التجميع والارتكاز. ازهارها غشوية او وسيدة او ثنائية المسكن. اكثر نباتاتها برية صالحة نائمة تقيد للمعدة والامعاء.

٢٢٣٥٨ - **قُطِيم ***
Polysandra (F). Polyandrous (E).
لقطيم بين الاثبات من تزواج اكثر من ذكر. والقطيم من النبات كانت ازهاره كثيرة الاسدية.

٢٢٣٥٩ - **قُطَيْبَة ***
Eriocrania (S). Eriocranie (F). Eriocrania (E).
حشرة من فصيلة القشبيات ورقية شريقات الاجنحة. اصطناعها فسيحة الاربعاء تشعل معظم مناطق البلاد المحذلة الحمرارة || جسمها صغير، نحيل، مردني الشكل. بسطها نحو ١٤ سم. راسها مغطى الجرم. عيناها صغيرتان، بارزتان. خطها وملساعها شديدة القصر. زباناها

من المختلي الاسمر المزاج الى الاسود || تعيش في المزاب والدردي التباي.

٢٢٣٤٤ - **قُطُورِيَّات ***
Catopidae (S). Catopidés (F). Catopidae (E).

فصيلة حشرات من غديبات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع اقطار العالم وانحصها المناطق الباردة والمختلة الحمرارة || اجسامها صغيرة، الحليجية، تملو من ٣ الى ٨ سم. رؤوسها شبه مكورة. عينها صغيرة، بارزة. تكثيرها وفكوكها نظافية. قرونها الاستشعارية عيطية، مستطيلة الاطراف، مركبة من ١٦ فصلة. كواسلها عمدة. المهادها لاحقة. قرونها نشطة || تعيش في المزاب والدردي ويحاصر الثدييات الصغيرة واكثر الطير وعشاشها || اشهر اجناسها القُطُورب.

٢٢٣٤٥ - **قُطُورَاء**
Cotula (S). Cotule (F).
جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة المركبات انواعها عديدة اصطناعها البلاد الحارة والمختلة. سوقها منتصبه او مسطحة، اوراقها مفصصة او مفروشة. نصالها خلية البشرة مبشرة القد. ازهارها رؤسية فردية صغيرة القد صفراء اللون. بزورها تحيلة مستطيلة عادمة الجناح والافرة.

٢٢٣٤٦ - **قُطُوش**
Nonette de Calcutta (F).
طائر من الصافير الصغيرة يدمي دسوم مكبر، اطلبه.

٢٢٣٤٧ - **قُطَيْب**
Astragalus drusus (S).
هو الاسطرافالوس الدرزي، اطلبه.

٢٢٣٤٨ - **قُطِيع**
Troupeau (F). Flock, Herd, Drove (E).
الطائفة من النعم كالابل والبقر والتم. ج قطاع وقطان.

٢٢٣٤٩ - **قُطَيْبَة** ، **أُمْلَاك**
Domaine (F). Domain, Property (E).
اراض زراعية واسعة يملكها شخص واحد.

٢٢٣٥٠ - **قُطَيْبَة** ، **سَالَفُ الْعُرُوس**
Amarantus (S). Amarante (F).
جنس نباتات عشبية حولية برية وريينية من فصيلة القطيفيات. انواعها عديدة. سوقها منتصبه. اوراقها بسيطة متعاقبة. ازهارها صغيرة القد، لا قياسية التجميع. احرف انواعها واشهرها ما يتبع.

٢٢٣٥١ - **قُطَيْبَة بَسْمَاء**
Amarantus albus (S). Amarante blanche, Fleur de jalousie (F). White cockcomb, Tumbleweed (E). Waise Amarant (D). Amaranto alba, Erba di gelosia (I).

نوع من القطيفة التريينية. ساقها منتصبه تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها شديدة الخضار القاتم. ازهارها حذوكي التجميع. ازهارها بيض. حذوكها مستطيل الشكل محبين.

٢٢٣٥٢ - **قُطَيْبَة لِّلَالِيَةِ الْاَلْوَان** ، **دِجَة الْأَمِير**
Amarantus tricolor (S). Amarante tricolore (F). Amarant, Joseph's coat (E). Fuchschwanz Tricolor (D). Amaranto a tre colori, Pappaglio (I).
نوع من القطيفة التريينية. ساقها منتصبه تملو من



قُطَيْبَة جَسِيكَة



قُطَيْبَة حَسْبِيَة



قُطِيم

منها البرية التي تنابت الكمة في الربيع تجي يبيضها قشوي وتبيض فتوكل . ومنها الزيبية الشامة الاستمال || سرقها فراءه || اوراقها سنائية ورويساتها الزهرية كبيرة القند مستعرضة . بزورها غرزية الشكل ، ثنائية الجناح ، عادمة الاغرة || اشهر انواعها الزيبية ما يلي .

٢٢٣٧١ - فُتَيْيَل المَطَر

Dimorphotheca pluvialis (S). *Dimorphothèque pluviale*, Souci pluvial, Souci hygrométrique (F).
نوع من الفتيول الزيبية الحولي . ساقه متصببة كثيرة التفرع تملو نحو ٤٠ سم. اوراقه سنائية الشكل ، مسنة الحافة ؛ فصلها خلي البشرة دبق الملمس . رويساتها الزهرية كبيرة القند قطرها نحو ٦ سم . طبانها اصفر اللون ، لسيناتها يرض الصفحة العليا حر السفل . لتليل وزهر في النهار في الساحة السابعة صباحا الى الخامسة بعد الظهر وتنكش في الليل وفي الايام الماطرة || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٢٢٣٧٢ - فُتَيْيَل بَرُوكَلِي

Dimorphotheca suranica (S). *Dimorphothèque orangée* (F).
نوع من الفتيول الزيبية . ساقه متصببة فراء تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. اوراقه السفلى كبيرة القند مغطوية الاطراف قليلة الزغب . اوراقه العليا سنائية صغيرة . رويساتها الزهرية كبيرة القند قطرها نحو ٥ سم . طبانها اصفر اللون ، لسيناتها برقالية || ازهارها يستمر طوال فصل الربيع .

٢٢٣٧٣ - قُتَيْيَان اَزْرَق* ، قُتَيْيَان بَنَكْسَجِي*

Xylocopa violacea (S). *Xylocope violet*, *Abelle charpentière* (F).
حشرة عاشية من فصيلة القتيانيات قريبة الشبه من النحل طولا يراوح من ٢٠ الى ٢٥ سم . لونها الى الازرقه يملوها مولج اسود || تشيد غليانياتها في الاخشاب التي تحفرها وته شاعدها موراا في خشب البهون المصنوع والازدينت والازان .

٢٢٣٧٤ - قُتَيْيَان مُسَجَس* ، قُتَيْيَان

Xylocopa aestuans (S). *مَسَجِيق**
Xylocope agité (F).
حشرة عاشية من القتيانيات طولا نحو ٢٢ سم . تركيب الاخشاب المصنوعة والاعمدة تحفرها وتشيد فيها غليانياتها . الاثنى اكبر قدما من الذكر ، فورها الى السرة السوداء يملوها مولج ازرق . جيشها كثيف الحلب اصفر اللون . الذكر صغير القند اصفر اللون احضر المولج . اجنته معتدلة الطول عابقة الزرقه السراء .

٢٢٣٧٥ - قُتَيْيَانِيَات*

Xylocopidae (S). *قُتَيْيَانِيَات**
Xylocopidae (F). *Xylocopidae* (E).
فصيلة حشرات عاشية من رتبة غشائيات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة معظمها متوسط القند قريب الشبه من النحل . اجناسها بكيفية الحلب . بطونها غليظة . تأثرها قوية مدنية تحيكها من قنب وغفر الاخشاب اليابسة اعصها المصنوعة والاعمدة تحفر فيها الانفاق المستطيلة والسراريب المنزوعة .

٢٢٣٧٦ - قَعَد

القعد : النخل الصنار . وقعدت الفسيلة وهي قاعد :

يعطيان . اجنتها ضيقة . مستعرضة التهديب المختاري . كوسلها ويطبها كثيفا الخمل اللطيف الناعم . فورها الى السرة || الاثنى اميز قدما من الذكر واجت ثوبا منه || السرة لائحة تنبش عل وثن النصال . تركيب الكثير من الثبات اعصها البندق والسنديان .

٢٢٣٧٦ - قُتَيْيَانِيَات*

Eriocranilidae (S). *Eriocranilidae* (E).
فصيلة حشرات من رتبة حشرغيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، نحو ٣٥ منتشرة في معظم الاصقاع المعتدلة الحرارة من الشرق الاقصى واوروبا وامريكا || اجناسها صغيرة ، نحيلة . رؤوسها مستعرضة ، حيزها بارزة . اعطالها وملاسها شديدة القصر . قرونها الاستفارية غليظة . اجنتها ضيقة ، شبه سنائية الشكل مهدبة الخار . بطونها وشية الشكل ، متكاثفة الخمل . اثوابها ملوثة || اساربعها دقيقة ، عادمة الراداجب . تلف الاوراق وتنبش في وثن النصال || اشهر اجناسها القطعية .

٢٢٣٧٦ - قَعَا

Couvrier (F).
To couple with, To serve (E).
قما القمل الاثنى وقما عليها : اربل نفسه عليها .

٢٢٣٧٢ - قُعَاد

Immobilité (F). *Immobility* (E).
داه يصيب الخمل فينشدها عن العمل اذ يجمل بعض حركاتها متدراا احيانا . وقد يعتبر من الصوب الميطة للبع .

٢٢٣٧٣ - قُعَاص* ، قُعَاث

Chavelée (F).
هو جديري القنان ، اطليه .

٢٢٣٧٤ - قُعَاعَة*

Sauvage (F). *Salt-making* (E).
القناعاة استخلاص الملح من مياه البحر ، وتصنيع الملح والمعالجة به .

٢٢٣٧٥ - قُعَاعِي*

Halophyte
هو النبات الذي ينمو في الارربة الملحية او التي تخضع لتاثير مياه الملحية .

٢٢٣٧٦ - قُعَاكَة

Pétale (F).
هي البتلة ، اطليه .

٢٢٣٧٧ - قُعَالِب* ، قُعَتَب

Renard mille (F).
هو الثعلب الذكر

٢٢٣٧٨ - قُعَيَارُون*

هو السليبي الاسود ، اطليه .

٢٢٣٧٩ - قُعَيْرِل*

Actinomma (F). *Actinomma* (E).
جنس شعاعيات بحرية تتميز ببيكلها الصواني التركيب المثلث من ثلاث كرات شبكية الشكل متلاحقة ترتكز على مناسخ شعاعية مخروطية تجمع بين الكرات || انواعه عديدة يكثر ويوجدوا في البحر الابيض المتوسط .

٢٢٣٧٠ - قُعَيْرِل* (زهرة اللؤلؤ الافريقية)

Dimorphotheca (S). *Dimorphothèque* (F). *African orange daisy* (E). *Regenblume*, *Kapkröbchen* (D). *Dimorfofeca* (I).
جنس نباتات حولية من فصيلة المركبات . انواعه عديدة



فيل



فيلول



قتيان ازرق



قتيان مسجس

٢٢٤١٦ - قَفَصَص Case (F). Bird-cage (E).
عجس الطير وقد شاع استعماله للصانير البيتية .

٢٢٤١٧ - قَفِط ، قَبِط Couvrir (F). To cover (E).
قطف وقط الطائر أثناء : قفطها . وقطف الماعز : نزا .

٢٢٤١٨ - قَفِصَاء
حشية غولرة ثمارها قرون دقيقة تستدير كالحلق دون أن
تلتقي أطرافها . وهي من أسرار البقل (القنان) .

٢٢٤١٩ - قَفِش Claveau (F). Arch-stone (E).
كل من الحجارة الواقعة بين القلق والحجرين الأسفلين في
العتد .

٢٢٤٢٠ - قَفِش Balsamodendron kafal (S).
Baumier de Kafal (F). Balm of Kafal (E). Kafalischer
Balsambaum (D). Balsamo di Kafal (I).

نوع من اللبان ، شجرته صغيرة القد فروعها غارشة . أوراقه
مركبة . ازهاره غليظ التجميع . ازهاره صغيرة القد بيضاء
اللون فواحة العرف البطري . اخشابها مجفورية الرائحة .
يستخرج من سوقها بالحز عصارة رائحتها بخورية طيبة
الاستعمال .

٢٢٤٢١ - قَفَلَة ، قَفَلَة Arbre desséché (F).
Dried tree (E).

هي الشجرة اليابسة وقد كثر اسنادها الى الشجرة الحرجية
اليابسة .

٢٢٤٢٢ - قَفْلُوط ٢٢٤٢٢
هو الكراث الالدهي ، اطلبه .

٢٢٤٢٣ - قَفْن Occiput
الجزء الخلفي للأسفل من رأس الحيوان يعرف عنه بالقحف
في الحشرات .

٢٢٤٢٤ - قَفَنِي Occipital
كل ما له صلة بالقحف .

٢٢٤٢٥ - قَفُور ، قَفُورِيَّة Fontanesia (S).
Fontansie (F).

قَفُور هو الاسم العربي ، اما العلمي فقود التعريف على
اسم العلامة « Desfontaines » . جنس جنات وشجيرات
برية وزراعية صابغية وتزيينية من فصيلة القفوريات ||
انواعها المعروفة قليلة العدد ، مهددة بحد من الشرق الاذن
الى الصين || سيقانها فروعها تلون من مَرَّين الى اربعة امتار .
شكلها قريب الشبه بالياسم . اوراقها نجيلية متعديلة . اوراقها
متعديلة ، متناوبة التصال اللرية . ازهارها صغيرة ، رباعية
الثلاث الضيقة ، عاجية اللون . طلاء سيقانها وروعها
صباغية ، صباغها الى الصفار الكبريتي الجميل || تنويرها
يستمر من حزيران الى آب .

٢٢٤٢٦ - قَفُورِيَّات Desfontainacées (F).
Desfontainaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متصلة العائلات مرتقمة
المبيض . اجناسها وانواعها قليلة العدد . اعطائها تمتد من
الشرق الاذن الى الاقصى || جميع نباتاتها شجيرات وشجيات
برية . سيقانها فروعها . اخشابها متينة او متعدية . اوراقها
متعديلة ، قصيرة الاعتناق ، متناوبة التصال . ازهارها
رباعية الثلاث ، صغيرة القد ، عاجية اللون او تفتية ||
اشهر اجناسها القفوز .

القند . وروسياتها الزهرية صفراء اللون ، عادمة السينات .
تورجاتها فاخرة استغنية التسنج . يزورها مضلة عادمة
الجنح والافرة .

٢٢٤٠٤ - قَفَالَة * Mys (S). Mys (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم
وفصيلة القفاليات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد
جميعها من سطح عمار المناطق الشالية || اصداؤها بيضاء
اللون ، شبه بيضوية الشكل تملوها تنوعات صغيرة ||
اجسامها مستطيلة الخائض المزجونة التجميع . مصاريها
لامتسارية القد ، منفصلة الاطراف || تعيش في الرمال
والاسمال المنصورة . لحومها مأكولة .

٢٢٤٠٥ - قَفَالِيَّات Myidae (S).

Myidae (F). Myidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم .
اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في سطح
بحار العالم || اصداؤها لاقامية الشكل والقند ، قليلة
الاحتداد ، مائلة السطح . تتميز بمصاريها
اللامتسارية المنفصلة الاطراف || احرف اجناسها واشهرها
القنالة والقبب والكربولة .

٢٢٤٠٦ - قَفْة Couffe, Couffin, Cabas (F).

٢٢٤٠٦ - قَفْة Hamperfrail, Basket (E).
وعاء ثنائي القطع من الاسل او القنب او القلف او
الكروشوك يستعمل في نقل الاشياء .

٢٢٤٠٧ - قَفَر ٢٢٤٠٧
راسع يادية .

٢٢٤٠٨ - قَفَر اليهود ٢٢٤٠٨
كَفَر اليهود

Bitume de Judée (F). Bitumen of Judaea (E).
نوع من الحجر جيد الصنف يكثر في البحر الميت .

٢٢٤٠٩ - قَفَرِي * Xérophyte (F). Xerophyte (E).
نمت تربتي يطلق على كل نبات يستطيع مقاومة الجفاف .

٢٢٤١٠ - قَفَرَات الطيَاء ٢٢٤١٠
قفزات الطياء كوكبة من ستة النجم وتسمى قفزات للنزلات
ايضا .

٢٢٤١١ - قَفَرَة اولى ٢٢٤١١
القفرزة الاولى نجم ثير من كوكبة الذب الاكبر .

٢٢٤١٢ - قَفَرَة ثالثة ٢٢٤١٢
القفرزة الثالثة نجم ثير من كوكبة الذب الاكبر .

٢٢٤١٣ - قَفَرَة ثالثة ٢٢٤١٣
القفرزة الثانية نجم ثير من كوكبة الذب الاكبر .

٢٢٤١٤ - قَفَرِي * Salsatoire (F). Salsatory (E).

نمت تعريفية يطلق على كل عضو من اعضاء القفرز او
صالح القفرز عند الحشرات .

٢٢٤١٥ - قَفَسَاء Estomac des ruminants (F).

Stomach of the ruminants (E).

معدة الحيوانات الهضبة تشمل الكرش والقلسية وام التلائف
والجلوت .



قفالة

٢٢٤٣٥ - قُفُول هو الهم، الطبع .

Blettissement, Blettissure (F).
Becoming over-ripe or sleepy (E).

القُفُول كالقُيُوب والثرارة أو تمام نضج الثمر .

٢٢٤٣٨ - قُفَيْر * ، حَمَلِيَّة ، حِمَاكَة

Ruche à cadres (F). Frame hive (E).

هو مأوى النحل صنع من الخشب ويجهز بالنعائات والاقراص الشمعية .

٢٢٤٣٩ - قُفِيل *

Haplophyllum (S).

Haplophyll (F).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الباذلييات .
أنواعه المعروفة عديدة منها حصاب ونجاد الشرق الاوسط
وبعض الاصناف الاروبية || سيقانها متصلة فروعها
متنصبة . اوراقها بسيطة او ثلاثية التخريم . ازهارها
ملئي التجميع ، طرفي الايتكاز . ازهارها متباينة الاجسام
والالوان || اعرف انواعه واشهرها الخمسة التالية .

٢٢٤٤٠ - قُفِيل حَرَجِيّ

Haplophyllum sylvaticum (S).

Haplophyllie de Syrie (F).

نوع من القُفِيل . منته ارجاع المناطق الجبلية ، ساقه
فروع مائلة . اوراقه رقيقة اتصال الحادة الاطراف ،
ازهاره صغيرة القد ، يضاء اللون . تنموه صيني .

٢٢٤٤١ - قُفِيل سُورِيّ

Haplophyllum syriacum (S).

Haplophyllie de Syrie (F).

نوع من القُفِيل . منته معظم الاصناف السورية باستثناء
الملقب البحرى . ساقه متنصبة فروعها تملو نحو ٦٠ سم .
اوراقه شبه بيضبة الشكل ، ملوكة . اما العليا فثلاثية
التخريم . ازهاره صفراء اللون . تنموه يحد من الربيع الى
اوائل الصيف .

٢٢٤٤٢ - قُفِيل مُسْتَطِيل الْوَرْق *

Haplophyllum longifolium (S).

Haplophyllie à feuilles longues (F).

نوع من القُفِيل . ساقه مزينة الادوية . ساقه فروع متباينة
الشد الخضراء المزرقة . اوراقه سنانية اتصال الضيقة
تطلى من ٤ الى ٥ سم . ازهاره صغيرة متكاثفة ، لونها الى
الحمرة المرجانية . تنموه ربيعي .

٢٢٤٤٣ - قُفِيل مُهْدَب *

Haplophyllum villosus (S) Haplophyllie velu (F).

نوع من القُفِيل . ساقه مزينة الحاء فروع . اوراقه السفلى
اعليجية اتصال اما الوسطى والعليا فثلاثية التخريم .
ازهاره مهدبة الكورس ، وديدة اللون ، معتدلة الحجم .
تنموه في اوائل الصيف .

٢٢٤٤٤ - قُفِيل تَجَمِيّ *

Haplophyllum fruticosum (S).

Haplophyllie branchu (F).

نوع من القُفِيل . منته الحصاب والنجاد . ساقه كثيرة
الفروع المتراكبة . اوراقه السفلى بيضبة للشكل اما العليا
فرمجة . ازهاره صغيرة القد لونها الى الياض الاصفر
المواج . تنموه صيني .

Caldia (F).

٢٢٤٣٦ - قُفِيل

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة السليبيات .
اصنافها الشطوط الرملية .

Muretta (F). Small wall (E).

٢٢٤٣٧ - قُفْل

هو الحائط القليل الارتفاع .

Zygophyllum (S). Zygophyll (F).

جنس نباتات جنينية من فصيلة الفرقدليات . انواعه نحو
٦٠ معظما بري وبعضها زرعيني . سيقانها فروع جالسة .
اوراقها متقابلة مركبة ريشية . ازهارها نظامية خماسية
التركيب . ثمارها حنطة || اشهر انواعه الازرقية قُفْل
القرم .

Zygophyllum fabago (S). قُفْل الْقُرْم

Zygophyllie de Crimée, Fabagelle, Faux caprier (F).
Syrian bean caper (E). Bohnenkapersn (D). Fabaria,
Favaggina (I).

نوع من القُفْل وهو جنبة زرعينة شائعة الاستعمال .
موطنها بلاد القرم وقد عمت زراعتها الزرعينية جميع البلاد
المعتدة الحرارة . ازهارها كبيرة القد جميلة الشكل ارجوانية
اللون .

٢٢٤٤٥ - قُفْلَاكَة

القفلادة ستة كواكب يمررن بالقوس .

Moniliforme (F). ٢٢٤٤٦ - قُفْلَاكِيّ ، صُحْبِيّ

Moniliform (E).

شكل من الزباني فواصله كمحب القفلادة او السبعة .

Figue (F). Fig (E).

٢٢٤٤٧ - قُفْلَر

فرب من التين ابيض اذا جف اصفر لونه وهو اجود
من الطيار .

Merycote (F).

٢٢٤٤٨ - قُفْلَس

القفلس من استعمال القلس للثدي .

Muguet, Stomatitis (F).

٢٢٤٤٩ - قُفْلَع

Stomatitis (E).

القفلع مرض معد يمرض بالتهاب غشاء الفم . يصيب البشر
والثمن . سببه فطر مجهري شديد الاذى . مظهره الخارجي
يقع يبيض تركب اللسان وداخل الخد .

Brunella (S). Brunella (F).

٢٢٤٥٠ - قُفْلَاع

Self-heal, Sikle-wort (E). Brunella (D). Brunella (I).

جنس نباتات عشبية برية عطرية معمرة من فصيلة الشفويات .
انواعه عديدة جميعها صغيرة القد . سيقانها فروع . اوراقها
متقابلة منتقاة كاملة . ازهارها سليل التجميع طرفي
الارتكاز . ازهارها عطرية متوسطة الحجم خطفة الالوان
سبها الاحمر والازرق والبنفسجي والابيض || اعرف
انواعه واشهرها ما يلي .

Brunella hyssopifolia (S). Brunella à feuilles d'hy-

sop (F).

نوع من القُفْلَاع البري الزرعيني ساقه فروع تملو نحو ٤
سم . اوراقه ضيقة كاملة تشبه اوراق اللوزة . سبله



قُفِيل

Cambium

٢٢٤٥٥ - قَلْب، كَسْبُوم

الطبقة المولدة في النبات. ج. قلوب .

٢٢٤٥٦ - قَلْب، جُمَارَة ، شَحْمَة

Bourgeon terminal du dattier (F). Terminal bud of date-tree (E).

البرعمة الحامية الطرفية في النخلة وهي شطبة يشاهد رصعة طيبة العلم تكون في أصل جلع النخلة. وقد سمي قلباً لبياضه. ج. قلية .

٢٢٤٥٧ - قَلْبُ الْأَسَد

قلب الأسد نجم ثير من كوكبة الأسد الاصفر .

٢٢٤٥٨ - قَلْبُ الْأَسَدِ الْمَلِكِيِّ

قلب الأسد الملكي نجم ثير من برج الأسد وهو أنور النجم الجبهة .

٢٢٤٥٩ - قَلْبُ الشُّجَاع

قلب الشجاع نجم ثير من الرقبة الثانية ينتمي الى كوكبة الشجاع الاثني .

٢٢٤٦٠ - قَلْبُ الْعَقْرَب

Antares, Cœur du Scorpion (F). Antares (E).

قلب العقرب أو القلب منزل من منازل القمر البهائية . وهو نجم ثير آخر الصور من كوكبة برج العقرب . مركزي في أواصل الدين وراء الأكليل بين كوكبين يقال لها النياط . رقيب القلب يدعى الذبران || وقلب العقرب يبعد عن الأرض نحو ٤٠٠ سنة ضوئية وهو من النجوم المجاورة التي يترى حجمها ٧٠ مليون مرة حجم الشمس .

Plebeus (S).

٢٢٤٦١ - قَلْبُوس

جنس حشرات فراشية من فصيلة القنليات. أنواعه عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم . حجمها صغيرة الذئ طويلاً يراوح من ٢٥ إلى ٢٨ سم . أجسامها سمره اللون رواشها مخملية الألوان المتداخلة يكثر فيها الأزرق والبنفسجي والأصفر الموشق والمنقط بالأسود والأحمر || أناثها أكبر قدماً من ذكورها وإلتم لونها وإلتم ريشة ونوشها || رقاتها تركب أوراق نباتات الفصيلة القرنية .

٢٢٤٦٢ - قَلْبُوسُ الفَلاَنِيَّاتِ *

Plebeus idas (S). Argus bleu des légumineuses (F). Plebeus idas (E).

حشرة من فصيلة القنليات وريقة حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا وأفريقية الشمالية . فراشها راضعة قوتها مشر الأذهار . سرشها غاصلة قوتها أوراق الفلانيات || جسمها صغير الذئ طويلاً نحو ١٠ سم . يسحبها نحو ٢٧ سم . رأسها صغير الحجم . عينها كبيرتان . زباناها مستطيلان ، شبه صرطانيان . جوشها أزرق اللون أحمل الموج عند الذكر ، كسني اللون عند الانثى . بطنها اريد اللون عند الذكر ، كسني اللون عند الانثى عند الغاتم من الاثى || رواشها عند الذكر الى الزرققة البنفسجية وطبقها احمر اسود ينتهي بهامش ضيق ابيض . وهي عند الاثى الى الكسني الاصفر يوسع اطرافها تحيل ابيض تنفذهه نقط حر رسود || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجبل الاولي في ايار وتظهر فراشة الجبل الثاني في آب . تسرح في النهار . تماثل بدء ظهورها بحسبة أسابيع وتجمع

الزهرية متوصلة القد تحمل ست زهرات || ازهارها يستمر من ايار الى آب .

٢٢٤٦٧ - قَلْع شَائِع *

Brunella vulgaris (S). Brunelle commune (F).

نوع من القلاع البربروتي الملبول . ساقه متصببة فراءه تملو نحو ٣٠ سم . أوراقه احليلجية الشكل . سبلته الزهرية قصيرة . ازهارها صغيرة بنفسجية اللون || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٢٢٤٦٨ - قَلْع كَبِيرُ الزَّهَر

Brunella grandiflora (S). Brunelle à grandes fleurs (F).

نوع من القلاع البري الزبني ريش في الاربة الكلسية ساقه فراءه تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . أوراقه يفضية الشكل مسننة الحافة . سبلته الزهرية مسطيلة . ازهارها كبيرة اللد ، متعاقبة ، ابيضوانية اللون || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٢٢٤٦٩ - قَلْعَة

Aphtho (F). Aphtho (E).

بثرة صغيرة يضاء اللون تظهر في لم الحولان للمريض .

٢٢٤٥٠ - قَلْعَة

هي الخفاة . اطلبها .

٢٢٤٥١ - قَلْعَة

Involucre

مجموع القنليات حول قاعدة الخيمة الزهرية أو الرئيس الزهري .

٢٢٤٥٢ - قَلَال

Palisade (F). Palisade (E).

أعمدة من البائلون أو الخشب تنصب عليها الاسلاك لتعرض التربة ودهنها عن الارض .

٢٢٤٥٣ - قَلَام

Conandron (S). Conandre (F).

جنس نباتات جلدومورية عشية مسرة من فصيلة الجسبريات . أنواعه قليلة . أوراقها قرصية التجميع ، خضية . نصالها سنانية عديدة وسننة الحار . ازهارها نورية التجميع ليلية اللون ، خاسية القبتح الوردي || ازهاره يستمر طول فصل الصيف .

٢٢٤٥٤ - قَلْب

Cœur (F). Heart (E).


عضو عضل اجوف . وهو العضو الرئسي في الجهاز التنفسي لان مل عمله تتوقف حياة الانسجة والجسم . مركزة عند الانسان والحيوان في تجويف الصدر بين الرئتين من اليسار والقلب مركب من تيزئين : ايمن ، يسوي الدم القاسد واليسر ، يسوي الدم النقي ويتكون كل جزء من تجويفين يفران بالاذين والبطين . ويتصل الاذين بالبطين الذي يقابله بقنصة حماية . ويتصل الاذين الايمن بالوردين الايمنين السفلي والعلوي . ويتصل البطين الايمن بالشريان الرئوي الذي ينخر الى فروع اصفر فاضر تعرف بالشعيرات الدموية . ويتصل الاذين اليسر بالوردين الايمنين السفلي والعلوي . ويتصل البطين اليسر بالشريان الاخر . اما الدورة الدموية التي تستغرق نحو ثمانية اشعار الثانية فتجري حل الشكل التالي : يرد الدم الى القلب بواسطة الوردين الايمنين الى الاذين الايمن ثم ينتقل الى البطين الايمن ومنه يخرج عن طريق الشريان الرئوي الى الشعيرات الرئوية التي تتجمع في فروع اوسع فتكون الاوردة الرئوية التي تحمل الدم المتأكسد ونصبه في الاذين اليسر ومنه ينتقل الى البطين اليسر ثم ينتقل الى الاخر الذي يترى وصوله الى جميع الشعيرات الدموية المنتشرة في الجسم .



قَلْع شَائِع



قَلْبُوس



قَلْبُوسُ الفَلاَنِيَّاتِ

٢٢٤٧٢ - فُلْبُوسَات

Mallophages

رتبة حشرات قارضة من طبقة القمليات. فصائلها عديدة جميعها عادمة الجناح. أجسامها صغيرة ملفحة. رؤوسها كبيرة وخرشفية. تأكلها قوّة، قربها الاستثنائية قصيرة || تميش طفيلية على البعير وبعض الحيوانات البرية تقتصر الريش والصوف والوبر وبشرة الجلد والدم الجاف. منها وبشي الشكل غير اللون تلصق حيث تمسح إن بالريش أو بالصوف أو بالشر فيفتق عن حوريات تنسلح عدة مرات قبل اكتمال طورها || أشهر فصائلها القمليات والمفرنجات والنمانيات .



فلبوس الرزال

٢٢٤٧٣ - فُلْبُز

Alrain (F). Brass (E).

سبيكة من معدّات مختلفة اغصها النحاس والقصدير .

٢٢٤٧٤ - فُلْبُس

Régurgitation (F).

Regurgitation (E).

القلس طريقة تغذية خاصة ببعض الحشرات اغصها النمل. راجع النقام .

٢٢٤٧٥ - فُلْبُس

Drainage (F).

هي عملية تصريف المياه من الآفة الربطة .

٢٢٤٧٦ - فُلْبَسَاة ، فُلْبُسُوْة ، فُلْبُسُوْة

Calotte (F).

هي الاقراص ، اطليا .

٢٢٤٧٧ - فُلْبُسُون

Calotte (F).

جاء في اللسان : نبات يكون منه اللادّن .

٢٢٤٧٨ - فُلْبُسُون

Cyon dukhunensis (F).

Colsun (F). Colsun (E).

نوع من الكلاب المرسعة المقرّعة . ومنهم من جملة نوما من الضلّ . موته غابات غفلات المحتوس وودية حلايا وكشير وأصام . جماعته تعد من ٧ الى ١٢ ذوباً يرأسها ذكر سن . يقتصر الايل الاقلط وايل المسك وادوية الشرق وجميع الحيوانات الضعيفة || جسمه منقسم التقاطيع ، اهيف اللد ، يطول نحو ١٠٥ سم . ذنبه نحو ٥٠ سم . وازرقاه ٥٠ سم . اذنه ٨ سم . ثوبه الى القشعة الصنابية تسمر بعض التي ، بطة تني اللون . سياه اسود الملب . ذنبه جزئ الوبر الكثيف ، منخفض الطرف || يسرح في النهار ويبيت في الليل .

٢٢٤٧٩ - فُلْبُوسُ أَسَدُ الرِّاسِ

Malathus melanocephalus (S). Malathus melanocephalus (F). Malathus melanocephalus (E).

حشرة دامة من فصيلة البقوسيات ورتبة غدييات الاجنحة. موطنها بعض اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الاذن ولادوية . تألف الاراضي المساحة والبراري الكثيرة الصفور حيث تترك المواد النباتية من اوراق وجمل نقش ونظام ... || جسمها صغير اللد يطول من ٦ الى ٨ م . رأسها اسود اللون ، قصير اللحم . زباناها خيطيان مستطيلان . عينها كيرتات جاسطتان . كيرتوها مخروطي السطح ، احمر اللون . ظهورها جزوي اللون ، معتدل الاحدياد ، مستدير الطرف الاضمت ، ثنائي التعزيز التمدي القناب . ارساغها خامية الغفل || الانثى اصفر قدماً من الذكر وابيت ثوباً منه وتقتصر زبانا || لها جيل



فلبوس أسود الرأس

المكن مبيادياً على الصفحات السفلى من تصال اوراق النبات المائل || البرقة تطول نحو ٢٢ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، خلي القشار . ثوبها اخضر يطلو جميع منفرس اصفر . رأسها كسني اللون . مدبها ورواجبها الى الطلة الخضره || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلبة تحببها البرقة على النبات المائل حيث تتدل .

٢٢٤٨٠ - فُلْبُوسُ الرِّزَالِ

Piebleius argus (S).

Argus bleu des genets (F). Piebleius argus (E).

حشرة من القمليات ورتبة حورشفيات الاجنحة . موطنها بعض المناطق المعتدلة الحرارة من الشرق الاذن وادوية . فراشها واسعة قربها رحيق الازهار . سرعتها تميش على اوراق الرزال واقتصروا والشيع والقتول || جسمها صغير اللد يطول نحو ٩ م . جسمها نحو ٢٥ م . رأسها صغير الجرم . منها كيرتات . زباناها مستطيلان شبه صويلانيات . حورشاها وبطنها الى الزرقة يطلوها مواج ابر عنه الذكر والى السرة الكسنية عند الانثى || رواش الذكر الى الزرقة البنفسجية يطلوها حشار اسود وتهيب ابيض . رواش الانثى الى السرة الكسنية يطلوها تهيب حطلي ويطلوها في الزوج الامامي ثلاث فقط صناعية || لها جيل واحد في الخول . تظهر الفراشة في حزيران . ترحب في النهار . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتحت المكن مبيادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || البرقة تطول نحو ٢٢ م . جسمها يضي الشكل ، كثيف اللحم القصير ، اخضر اللون اصفر المواج تملو خمسة خطوط سود . رأسها اسود . مدبها ورواجبها الى السرة القاتمة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي معلقاً في النبات حيث تتدل البرقة .

٢٢٤٨١ - فُلْبُوسِي

Cordiforme (F).

Cordiform, Heart-shaped (E).

نمت تعريتي يوصف به الشكل الذي يشبه القلب .

٢٢٤٨٢ - فُلْبُوسِيَات

هي فصيلة البقوسيات ، اطليا .

٢٢٤٨٣ - فُلْبُس

Salière (F). Eye-pit (E).

الفرقة فوق عين القرس .

٢٢٤٨٤ - فُلْبُس

هو الحجر ، اطليا .

٢٢٤٨٥ - فُلْبُس

Ano âgé (F). Aged ass (E).

القلح : اخار السن .

٢٢٤٨٦ - فُلْبُس

Irriguer (F). To irrigate (E).

قلد الزرع : سقا .

٢٢٤٨٧ - فُلْبُس

Arrosage, Part d'eau (F).

Watering, Share of water (E).

القلد هو البتي ويوم البتي ويقال : ما بين القلدين ظرم . وعر النصيب من الماء . يقال اخذ قلده اي نصيبه من الماء . ج قلد واقلد .

* ٢٢٤٨٨ - قَلْقُوسَةٌ هَلَالِيَّةٌ *

Calophasia lunata (S). *Calophasia à croissant* (F).
Calophasia lunata (E).

حشرة من فصيلة النسيقات ورَبَّة حورثيات الاجنحة . موطنها المناطق المعتدلة الحارة من العالم القديم . فراشها واسعة قوتها رقيق الازهار . سرقها تعيش على اوراق نباتات الفصيلة الخنازيرية || جسمها متوسط القند يطول نحو ١٢ م . بطنها نحو ٣١ م . رأسها حطلي اللون . حينها كيرتان . زباناها خيطيان . جوشها وبطنها الى الحطلي الاسمر المواج || ورشها الاسمايين ، عند الشقين ، الى الحطلي يملو حلال ابيض ويقيح اسمر ويجليح بني . ورشها الخلفيان الى الحطلي يملو مواج اسمر عند الذكر || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان . وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . تسرح في الليل . تعاظم بعد ظهورها باسبوعين وتمتص المكن لطحاً على الصنمحات السفلى من نصال الاوراق || السرعة تطول نحو ٣٠ م . جسمها اسطواني الشكل ، ماس القشار ، ثوبها الى الزبداء السوداء ملوكة خمسة خطوط مزدوجة قاطبة جزوية . اسها الى الحيرة المرجانية . مدها ورواجها الى السرعة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي في التربة حيث تلتحف بجلباب من اللبن .

* ٢٢٤٨٩ - قَلْقُوسَةٌ *

وما تقرر من اسفل مياه السيول متشققة بعد لصبها . والقلفة : قشرة الارض التي ترتفع عن الكماء فتدل عليها (السان) .

Colophane (F). *Colophany* (E).

* ٢٢٤٩٠ - قَلْقُوسَةٌ ، قَلْقَاسَةٌ *

هو صمغ البطم .

* ٢٢٤٩١ - قَلْقَاسٌ *

Colocasia antiquorum, *C. esculenta*, *Arum esculenta* (S). *Colocase*, *Colocasie*, *Arum colocasia*, *A. d'Egypte*, *Taro*, *Mon*, *Sonje*, *Madère* (F). *Colocasia*, *C. estable arum*, *Egyptian arum*, *Egyptian colocasia*, *Taro* (E). *Echte Blattwarz*, *Ägyptisches Arum*, *Colocasia* (D). *Colocasia*, *Aro egiziano*, *Gichero* (I).

نبات صفولي زراعي ممر من فصيلة القلقاسيات . اصطناعه البلاد الحارة . ساقه ارضية عقربية غليظة . اوراقه قرصية التجميع تقوم على مائلين مسطيلة منصبة تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم . وهي كبيرة القد ، قلبية الشكل ، نصلها جامد الصفعة المتواجبة قائم الخضار يطول من ٥٠ الى ٧٠ سم . ويمرض من ٣٠ الى ٤٠ م . ضروبه الزراعية عديدة جميعها ترضف في التربة الدبالية الرطبة . زراحت تستقيم في التربة من ٧ الى ١٤ شهراً . محصيله وافر الانتاج . لباب صائلك يتركز بعد طبخه او نقه بالماء لزوال ما فيه من مواد قارسة كاثوية . ولبابه هذا يحوي نحو :

٢٣٦٥ ٪ من المواد الازوتية .

٥٦ ٪ من المواد الدهنية .

١٦٨٢ ٪ من المواد الميحدركوبوية .

* ٢٢٤٩٢ - قَلْقَاسٌ رُومِي *

هو عباد الشمس السفولي ، اطله .

واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في الليل وتبيت في النهار . قوتها المواد النباتية المنحلة والصارفة نحو الانخلال || البرقة عند بلوغها الادراك الجسوري تطول من ١٢ الى ١٦ م . جسمها شبه اسطواني الشكل . رأسها وصدها وتظهر سكمها وشريحها الى السرة الكسنتية القائمة . بقعها الظفورية تنقيح وتضهر تدريجياً من سكة الى سكة مع ابتعادها من الرأس . مدها ورواجها اقل سمة من رأسها . دروتها بجهاز باستان حادة . فكاهها ضليمان || طور الاكمال الذي ينتهي بظهور الحشرة في اوائل نيسان يستمر نحو اربعة اسابيع وينتهي في هجير البرقة طليقاً من كل غلاف .

Arracher (F). *To pull* (E).

* ٢٢٤٩٠ - قَلْعٌ *

قلع النبات : استخرجه من التربة .

Arrachage (F). *إِحْطِفَاةٌ* ، *حَكِي* ، *قَلْعٌ* ، *قَلْعٌ* (E).
Pulling up (E). استفرج النبات من التراب .

Phitom

* ٢٢٤٩٢ - قَلْفٌ *

الثلث هو أجزء الداخل من لحاء الشجر يتميز برسود الاممية القريبة الملتصق التي تنقل اللصغ الغذائي الكامل .

Ecorcer (F). *To bark*, *To strip* (E). *قَلْفٌ* ، *قَلْفٌ* : زرع منها لحاء .

* ٢٢٤٩٤ - قَلْقَاسٌ *

Calophasia (S). *Calophasie* (F). *Calophasia* (E).

جنس نباتات بحلية مسمرة من فصيلة النسيقات . موطنها يمتد من الشرق الاذن الى اواسط القباقي الروسية . سوطها قرماء تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها مركبة وثرية البند . ازهارها صفراء اللون ، عقنودية التجميع || انواعه الحرة قلبية البند ، اشهرها التالية :

* ٢٢٤٩٥ - قَلْقَاسٌ السُّوَلْكَ *

Calophasia Wolgerica (S). *Calophasie de la Volga* (F).

نوع من القلقاس . موطنه القباقي الروسية . ساقه تملو نحو ١٠٠ سم . افئاده منبسطة الاعتداد ، الحولية سها حلية اللحاء ، مبشرة اللند الدهنية . اوراقها مركبة وثرية البند الذي يراوح من ١١ الى ١٩ . وريقاتها صغيرة ، حلية النصال . ازهارها صفراء اللون ، تطول نحو ٣ سم . || تنويره يستمر من ايار الى حزيران .

* ٢٢٤٩٦ - قَلْقَاسٌ كَبِيرُ الزُّهْرِ *

Calophasia grandiflora (S). *Calophasie à grandes fleurs* (F).

نوع من القلقاس . موطنه يمتد من جبال تركية الى ايران وافغان . ساقه تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . افئاده جرداء اللحاء ، عادمة اللند الدهنية . اوراقها مركبة وثرية البند الذي يراوح من ٢١ الى ٢٧ . ازهاره صفراء اللون ، تطول نحو ٣ سم . || تنويره يستمر من حزيران الى تموز .

* ٢٢٤٩٧ - قَلْفَةٌ *

نبات اخضر له ثمرة صغيرة وللال عليها حريس (السان) .



فلقة هلالية



قلقاس

٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها تشبه ورق الزلاب. ازهارها صغيرة لثقل صويالية التجميع || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف.

٢٢٥٠٢ - فُلَسِيَّة مَلَسِيَّة

Minuartia laricifolia (S). *Aisne à feuilles de mélèze* (F).

نوع من الفللسية منبها الاربية. ساقها تملو من ١٢ الى ٢٠ سم. اوراقها ملسية الشكل صلبة النضج. ازهارها صغالية الانكاز على الساق، كبيرة القند مستطيلة البتلات || ازهارها يستمر من تموز الى آب.



فللة

Aisnéas (F).

٢٢٥٠٣ - فُلَسِيَّات

سبط من فصيلة الفللسيات.

Geotropes (S). *Géotrupe* (F). **فُلُفُلِيَّة**

جنس شجرات من الجلسيات. انواعه عديدة جميعها راسية نائلة تسرح في الليل وتعيش على البراز وتضلف المواد العضوية المنحلة || اشهر انواعها فللقلوة البراز.

٢٢٥٠٥ - فُلُفُلِيَّة الْبِرَكَل

Geotropes stercorarius (S). *Géotrupe stercorale* (F). نوع من الفلقلولة طويلا يراوح من ١٨ الى ٢٥ سم. جسمها يضيء بشكل مفلطح الجرم صفحت العليا الى اسود الاخضر المواجه صفحت السفلى الى الزرقاء الخضراء المواجه تسرح من غروب الشمس الى اواسط او اواخر المربع الثاني من الليل. قوتها البراز اصعب روث العوالب. يحبرها سدادب يفور من التربة ترسف في كامل مكها بعد ان تلتفه بملامح تخجن من الروث بمدة الحرارة الاذنية حتى التفت ثم القوت الفرووية حتى الانسلاخ.

٢٢٥٠٦ - قَلَم، قَلَم السِمْ، حَكِيل السِمْ

Style

احد اجزاء مقلق الزهرة وهو غيط اجوف يحمل السمة ويوصلها بالمبيض.

Greffon (F). *Graft* (E).

٢٢٥٠٧ - قَلَم

هو العلم.

Bouture (F). *Slip* (E).

٢٢٥٠٨ - قَلَم

القلم والمقلقة والفلسه قصب او جزء من قصب يفضل من النباتات ويغرس. راجع قفلة.

٢٢٥٠٩ - قَلَمَتَت

هو نمع البر، اعليه.

Averrhoa

٢٢٥١٠ - قَلَمَتَان، رَشْدِيَّة

جنس اشجار مشرة من فصيلة الحماسيات. انواعها المعروفة اثنان منبها البلاد الحارة اصعبها الهند. سويها متصبية. اضعاها دائمة منفرجة. اوراقها صغالية مركبة ريشية. وريقاتها اعليجية شخية. ازهارها حقوية التجميع، محورية الانكاز، طرفية. ثمارها يضيء مستطيلة، لياها حامز العلم مستحب النكهة يؤكل رطبا ودرجا. وهو من النباتات البشروية التي تجود في جميع الاروبة القليلة والمتوسطة الانسلاخ || يتكاثر بالبزر. اشجاره زهر وتثمر طوال السنة.



قلقلوة البراز

٢٢٤٩٣ - فُلَسِيَّات

Araceae, Aroidaceae (S). *Aracées, Aroïdées, Aroïdées* (F). *Araceae, Aroidaceae* (E).

فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة. اجناسها وانواعها كثيرة الاعدد تجتمع الى ثلاثة اسباط: الرسيات والرنسيات والوجيات. نباتاتها صموية او صقلية صمرة. معظمها بري وبضها زراعي وزيبي || حساقلها لا تتخلو من المواد الكاوية السامة التي يعضل مفعيها بعد البذر او الضع بالماء او التعصيص على النار.

٢٢٤٩٤ - فُلُفُلَانِي كُؤَبَة

Starnas cyanoccephala (S). *Colombi-perdrix cyanocéphale* (F).

طائر من الفللسانيات وفصيلة الحمايات. طوله نحو ٢٠ سم. قمة راسه وصاصية اللون زرقاء المواجه، محاسره وقفته وزوره سود. ثوبه خطي اللون المايق يعلو مخرج جوي. صدره الى الجذوة اخضرية. منقاره احمر الانتشاب ازرق القاراط. ارجله حمراء. يالفت الاسراج والمناطق الصخرية. اسرابها صغيرة يراوح عدد افرادها من ١٢ الى ٤٠. قوته الثار والطير والبلور. يش في الجينات والاشجار القليلة الارتفاع. اناته تبيض يبيضين.

٢٢٤٩٥ - فُلُفُلَانِيَّات

Colombi-perdrix (F). جنس صير من فصيلة الحمايات. انواعه قليلة تتميز بشكلها الذي يشبه شكل الحجل. مناقيرها قوية مهدية. اجنسها قصيرة شبه مستديرة، اذناها حريضة مستديرة. اوساقلها طويلة، اصابعها قصيرة، مغالبها قوية || لشهر انواعها تقلق كروية.

Vitriol vers (F).

٢٢٤٩٦ - قَلَمَدِيس

هو ازراج الاخضر، اعليه.

Vitriol vert calciné, Calcitis (F). **قَلَمَدِيس**

هو ازراج الاخضر المكلس.

٢٢٤٩٨ - قَلَم، قَلَم

هو السنا البري. شجرة تقارب القوام تحمل حيا اسود مستديرا في سيم الفلفل او اكبر صيرا املس فيه لزوجية صلاوة حسن الشم ورق هذا الشجر الملائم.

Minuartia, Aisnéas (S).

٢٢٤٩٩ - قَلَمَة

Aisne (F). *Aislin* (E). *Scainmíre* (D). *Aisne, Centocchio* (I).

جنس نباتات شخية برية صمرة من فصيلة الفللسيات. انواعها المعروفة نحو ١٢ منبها الشرق الاذلى واوروبية الجنوبية. جميعها صغيرة القند قليلة الفروع. اوراقها متعاقبة نصفا محززة او حدية الشكل. ازهارها صغيرة الحجم يبيض اللون || اصرفها ما يتبع:

Minuartia liniflora (S).

Minuartia liniflora (S).

نوع من الفللسية، منبها الاربية الكلسية. ساقها تملو من ١٥ الى ٢٠ سم. اوراقها متصبية جامدة مهدية. ازهارها صغيرة القند متعاقبة تشبه زهر الكتان. ازهارها يستمر من تموز الى ايلول.

٢٢٥٠١ - فُلَسِيَّة لَزَابِيَّة

Minuartia juniperina (S). *Aisne à feuilles de genévrier* (F).

نوع من الفللسية، منبها الحضاب والجبال. ساقها تملو من

٢٢٥١١ - قَلْبَق لَدِيد *

Averrhoa carambola (S). *Averrhoa carambola*, *Carambolier* (F). *Caramba*, *Carambola* (E). *Karimbolabaum*, *Karambole* (D). *Averroa carambola*, *A. ascellare* (I).

نوع من القلنباق. شجرته صغيرة القند تملو نحو ٤ أمتار. أوراقها حالية. وريقاتها ثلاثية أو خماسية الأضلاع. ثمرها مائل البشرة، قائم الخضار. أزهارها صغيرة القند، بيضاء اللون أو وردية. ثمارها الحليلية الشكل، خماسية التضخيد، صفراء اللون، غصراء المذاق. لها باها غزير العصارة، ذكي العرق، مأكول.

٢٢٥١٢ - قَلْبَقُوءَة

Bonnet, Réseau (F). *Placus* (E). قسم من اقسام عدة الحشرات صغير الحجم يتصل بالكرش من جهة وبألم التلافيف من الجهة الثانية. راجع عدة.

٢٢٥١٣ - قَلْبَقُوءَة

هي الارسوة، اطلبها.

٢٢٥١٤ - قَلْبَقُوءَة

Collinsia (S). *Collinsie* (F). جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الحنازيريات. انواعها عديدة منها البرية والزراعية الصياغة والزيينية. منها البلاد الامريكية. أوراقها كاملة متفائلة. أزهارها زاهية الالوان فضية التجميع متتالية || تتكاثر بالبذر. ترضب في التربة الحلوة الغارقة المواد الغذائية. احرف انواعها واشهرها ما يلي :

٢٢٥١٥ - قَلْبَقُوءَة ثنائية اللون

Collinsia bicolor (S). *Collinsia bicolor* (F). عشبة زينة زياء قتل من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها معتقة ثعلبات متاني الصفعة، سنن الحافة، قلبى القاعدة. أزهارها ثنائية اللون فيها البنفسجى والاييض. أزهارها يستمر من ايار الى تموز.

٢٢٥١٦ - قَلْبَقُوءَة ربيعية

Collinsia verna (S). *Collinsie printanière* (F). عشبة زينة مزهجرة. ساقها منتصبه فرعاء تملو نحو ٤٠ سم. أوراقها معتقة ثعلبات ثعلبات خلى البشرة سنن الحافة. أزهارها الى الزرق. اطراف بتلاتها ييض وهي متوسطة القند مستطيلة الامن || أزهارها يستمر من نيسان الى حزيران.

٢٢٥١٧ - قَلْبَقُوءَة صياغية

Collinsia tinctoria (S). *Collinsia tinctoriale* (F). عشبة صناعية زياء. ساقها منتصبه تملو نحو ٣٠ سم. أوراقها لائقة، الحليلية، ثعلبات غدي الصفعة الزرقية. أزهارها الى البياض الاصفر المذاج يملو تضيح ارجواني. أزهارها صيني.

٢٢٥١٨ - قَلْبَقُوءَة كبريرة الزهر

Collinsia grandiflora (S). *Collinsie à grandes fleurs* (F).

عشبة زينة سرسة. ساقها تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. أوراقها الحليلية سمكة النصل المادم التنين. أزهارها الى الزرق المزعجة بالوردى. بتلاتها كبيرة مستطيلة مجتحة. أزهارها يستمر من ايار الى تموز.

٢٢٥١٩ - قَلْبَقُوءَة

Styldium (S). *Styldie, Styldier* (F). جنس نباتات عشبية معمرة برية وتزيينية من فصيلة القلنباقيات. انواعها المعروفة ثلاثة جميعها زينة تزود



قلنباق كنيد

في المراكن وفي المواقع الرطبة شرط الا تتعرض للصقيع في فصل الشتاء. أوراقها متباينة الاشكال وبها المصفية. أزهارها حيلة ملونة.

٢٢٥٢٠ - قَلْبَقُوءَة

Styldiaceae (S). *Styldiaceae* (F), *Styldiaceae* (E). فصيلة نباتية من ذوات القلنبتين متحدة القملات منخفضة المبيض. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد جميعها نباتات عشبية وعشوية ترطب في المواقع الرطبة والمناطق اشهر اجناسها القلنبة.

٢٢٥٢١ - قَلْبَقُوءَة

هي القنصور، نبات بري طبي معمر. *Outardeau* (F). *Young bustard* (E).

٢٢٥٢٣ - قَلْبَقُوءَة

Chamelle jeune (F). *Young she-camel* (E). قال الجلاط : ه الشاة من النبق. وهي اول ما يركب من اناث الابل الى ان تلي فاذا انثت فهي ناقة.

٢٢٥٢٤ - قَلْبَقُوءَة، قَلْبَقُوءَة

Alcalin (F). *Alkaline* (E). نسبة الى القلي. يقال تربة قلوية وسائل قلوي وملاح قلوية.

٢٢٥٢٥ - قَلْبَقُوءَة، قَلْبَقُوءَة، تاشق

Alcalinité (F). *Alkalinity* (E). خاصية المواد القلوية. وهي ايجاد مقدار المذلف، في محلول ما او محيط ما، من رقم الاحتمال المئين وقدره سبعة الى ما فوق ذلك الرقم. راجع دالف.

٢٢٥٢٦ - قَلْبَقُوءَة، شبيه قَلْبَقُوءَة

Alcalotde (F). *Alkaloid* (E). مادة عضوية تتميز بنوعها المشابه لخواص القلي.

٢٢٥٢٧ - قَلْبَقُوءَة

هو اثنان القلي او الحرس، اطلبها.

٢٢٥٢٨ - قَلْبَقُوءَة، قَلْبَقُوءَة

Alkali (F). *Alkali* (E). مواد مركبة من معدن واكسجين كالكلس والبوتاس والصودا والمنيزيا.

٢٢٥٢٩ - قَلْبَقُوءَة

Päurin commun (F). هو تف البر، اطلبه.

٢٢٥٣٠ - قَلْبَقُوءَة عَظْمَاء، قَلْبَقُوءَة الزَرَع

Aelia rostrata (S). *Aellie rostré, Punaise des céréales* (F).

حشرة مؤذية من فصيلة القاصيات، جسمها مفلطح، احليلي الشوزن، يطول نحو ١٢ مم. قوتها الى الخفسار الاصفر المذاج يملو تضر امر يمتد من الرأس الى الكوسل فالخلفة فالخمين. رأسها مخروطي. عظمها مستطيل. عيناها صغيرتان. زباناها مصطيلتان. كوسلها قصي الشوزن. سمها وحسبها سنانة الاطراف، متقاربة الطول، قشراتها شفافة. يعلها وقوتها الى الخفسار الاصفر الاسمر المذاج || مرتها النباتات النجيلية وبها الزروع || راحتها كرية.

وأجناسها وأنواعها قليلة العدد جميعها غشوية . انتمثل
بم الأجناس على البقل واست الواحد في قم الآخر في الشهر
فصلها الخرطونيات .

Callanthemum (S).

٢٢٥٣٩ - قَلْبَت

Callanthème (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الشفويات . أنواعها
المعروفة قليلة جميعها عاشبات جبلية برية تعيش في المناطق
التي يراوح ارتفاعها من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ م . جلدها
جلدية يتصلها شراخ يملأ حسب الأنواع من ١٠ الى ٣٠
سم . وينتهي بزهرة متوسطة القند ينفذ اللون او وردية
أزوح عدد بتلاتها من ٦ الى ١٦ . اولها جلدية
الانتشاب مستطيلة الزناد مشرمة وبضفة . احرف انواعها

C. rutae-folium (S).

للبنيت سدالي الورق

C. corlandrifolium (S).

للبنيت كزري الورق

Saillir (F). To serve (E).

٢٢٥٤٠ - قَم

قم واقم النمل الايل : اشتغل عليها وفرضها كلها .

٢٢٥٤١ - قِمَاء

القِمَاء : الاماكن التي لا تصيبها الشمس . الواحدة قَاءة .

Ectopistes

٢٢٥٤٢ - قِمَارِي

جنس طير وحيد النوع من فصيلة الحمايات . يتميز
بامتداده جناحيه واكتفيه . مقاروه دقيق البنية . ريشه
قصير وسودك . غلبه الاوسط بين الانعقاد . واحده
قري اطلية .

Reproduction des oiseaux (F).

٢٢٥٤٣ - قِمَاط

Reproduction of the birds (E).

القِمَاط : سفاد الطير . وقيل زين راصع الطير .

Ascidia (F). Ascidium (E).

٢٢٥٤٤ - قِمَاعَة

عارض جسموي يكثر في المالح ، يشو اوراق انبات
يزيداته النضلة التي تشبه القمع او البرق او الاناء .

Polycarpon (S).

٢٢٥٤٥ - قِمَاعَة

Polycarpon (F). Polycarpon (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة التوتليات .
انواعها المعروفة ستة منها بعض اصناف اليلاد الحارة
والمعتدلة الحارة من العالم القديم في سواها فراءه ، مظنها
متنصب وبضها مستطيل . اولها متعاقبة ، فصالحا
لحمية ، سنانية الشكل ، مخنجة ، خلية البشرة . ازهارها
لاقياسية التجميع ، منها الفردية والثنائية والثلاثية والارباعية .
الوانها تراوح بين الودي والودي الغامق او الارباعي
المواج .

٢٢٥٤٦ - قِمَام

ايام من آخر ايلول بقدر شهر السنة يستدل منها فيما قيل
عن ساحة الهواء في كل شهر من السنة القابلة .

٢٢٥٤٧ - قِمَام

هو الاس الملبق الورق ، اطلية .

Vaccinium (S).

٢٢٥٤٨ - قِمَام

Airelle, Vaccinier (F).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الخلجيات انواعها
نحو ٤٠ فيها الشجيرات والنباتات والجنات . سواها
فراءه . اولها متعاقبة متباينة . ازهارها وريه التجميع ،

Kellya (S).

٢٢٥٣١ - قَلْبَة

Kellya (F). Kellya (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم
وفصيلة البرصيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في
معظم بحار العالم . اجسامها صغيرة . اصدانها قبابية شبه
صويالية الشكل . تعيش لاصقة بالصخور . ليفها خفيف
المادة .

٢٢٥٣٢ - قَلْبِس

ما يترك من النسل عند اشتياؤه او ما تحبه النمل من النسل
في ظروف معينة .

٢٢٥٣٣ - قَلْبَسَة مُبَكِّجَة

Callistus lunatus (S). Calliste orné (F).

Callistus lunatus (E).

حشرة رانجة قانصة من فصيلة القليسيات ورتبة غمديات
الاجنحة . تألف الاراضي الكلسية في التهام والغضاب
البحرية المرص || جسمها صغير القند يطول من ٦ الى ٧
م . رأسها قصير الخيط ازرق اللون فكها ضلحيان .
زبانها خطيان ، مستطيلان . حينها صغيرتان . كسلها
احمر اللون . ظفرها الى الحفرة الزاوية تملو اربع بقع
كبيرة وبقيتان صغيرتان لونها الى السواد الازرق المواج ||
ها جيل واحد في الحول . تسرح في التبار وتبيت في الليل ||
يرتقيا لظول من ١٥ الى ١١ م . جسمها مربع السكر ،
احمر اللون اسير اللب ، اسود الرأس والشرج ، ضلع
التكثير الحادة . قوتها المواد المضوية تسمى لها بدون
انقطاع لانها شديدة البهم || طور الاكمال يستمر نحو
خسة اسابيع .

Callistidae (S).

٢٢٥٣٤ - قَلْبِسِيَّات

Callistidae (F). Callistidae (E).

فصيلة حشرات لاحة وقانصة من رتبة غمديات الاجنحة .
اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في جميع اصناف
العالم واصحاب اليلاد الحارة || جميعها صغيرة القند او
متوسطة الطول الذي قلما يتجاوز ٢٥ م . اجسامها خلية
القشار ، جميلة الالوان الزاوية الاحاء . رؤوسها شبه
اسطوانية الجرم ، ناشرة العينين ، مستطيلة الزبال ،
معتدلة الكواهل اللاباقية الشكل ، لاحقة الانحاد التساعية
الاعاديبة الخنوزية || تسرح في التبار وتبيت في الليل .
تسمى بسرعة وريشة وتعتبر بطة || قوتها المواد المضوية
المختلفة المصاد ولا تست في فريسة تستطيع اليها سيد ||
اشهر اجناسها القليلة والشلونوس .

٢٢٥٣٥ - قَلْبِسِي

هو ابلق القلق ، صفور من الجوامث صغير القند ابلق الثوب
يكثر من الزوف مل الصفور ولذا سمي قَلْبِسِي .

Fruits desséchés (F).

٢٢٥٣٦ - قَلْبِف

Dried fruits (E).

هي الثمار المجففة الموضبة .

٢٢٥٣٧ - قَلْبِسْلَة

هي السبرغولة ، اطلية .

Oligochaeta (F).

٢٢٥٣٨ - قَلْبِلَات الْهَلَب

Oligochaeta (E).

رتبة من الحليقات المفرديات تتميز بخلوها من الوباس
والاويل وانجاسيم . اما حلها فشدق القصر ، قليل العدد
اذ لا يتجاوز اربعة ازواج في كل فصلة || فصائلها



قَلْبَة



قَلْبَة مَبَكَّة

اوراقه ابيدة مخيلة ملتفة الاطراف تطول نحو ١٠ سم. ازهاره الى الخمرة الفاتحة. ثماره وردية اللون مأكولة ويستعمل منها مشروب كمعولي لذيذ الطعم. اوراقه ولفاته وجذوره عاصفة تستعمل في الدبابة.

٢٢٥٥٥ - قِيَامُ كَبِيرِ الثَمَرِ

Vaccinium macrocarpum, Oxycoccus macrocarpa (S). *Airelle à gros fruits, Canneberge à gros fruits* (F). نوع من القِيَامِ، جنسه ممتدة تطول نحو ١٠٠ سم. اوراقه ابيدة سنانية تطول نحو ٣ سم. نصلها جامد الصفحة ملتصق الحنار. ازهاره لائيمية التجميع فيها الاحادية والثلاثية والخناسية والسباعية والتناسية. ثماره مأكولة قشرها نحو ٢ سم.

Vaccinium arboreum (S). *قِيَامُ شَجَرٍ*. *Airelle en arbre* (F).

نوع من القِيَامِ، شجرته تملو من ٤ الى ٨ امتار. فروعها واقفاها خالية البعاد. اوراقها عابطة سنانية تطول نحو ٦ سم. وتعرض نحو ٣ سم. نصلها جامد التسنج، مالن الصفحة العليا الائمة الخطار، خلي السفل البحرية اللون. ازهارها الى البياض الودي. ثمارها سود حامزة عاصفة لا تترك.

Ordures des villes (F). *Ordures de city* (E).

بقايا الماطبخ وكناسة البيوت والشوارع تستعمل في تسميد التربة وهي من الاسمدة العضوية.

Vacciniées (F).

سبط من فصيلة الخنسيات يشمل بعض الاجناس والاشواخ. معظمها من نباتات جبال البلاد الممتدة الحارة. اشهر اجناسه القِيَامِ.

Nanisms (F). *Nanism* (E). *قَمَاقِة*، *قَمَاقِة*.

خاصة في بعض النباتات والحيوانات ثمنها من اتخاذ حجمها المألوف فتلث صغرة. من اسبابها الرئيسية في النبات فقر التربة ببعض العناصر الغذائية.

Vertex

قمة الرأس هي التافوخ، اعلاه.

Triticum (S).

Blé, Froment (F). *Wheat* (E). *Weizen* (D). *Fromento* (I).

جنس نباتات عشبية زراعية حولية من فصيلة النجيليات جلوبوها جرة دقيقة، سوقها شطاه، قصبية، اسطوانية، مستقيمة، فارغة، سلاية التركيب، مصمتة البعد والاطراف التي تنتهي بالسنايل. سنايلها بحورية مركبة من حدة سفيلت متتالية. اما الاشطاء فانها ترسية الانتشاب وهي على فتيين امهات ونباتات غالامها تلك التي سوقها وسنايلها تطول قدر البصلة الرئيسية اما البليات فتلك التي تتأخر من الامهات وقد تكون سنايلها عادمة البر. اوراقها متعاقبة مستطيلة مركبة من قسمين، غمد طويل ملتصق يرتكز على البعدة ويخفف السلاي ونصل ضيق مستطيل يدهي المصغرة يرتكز عند قاعدة اتفصاله عن البعد على لسن مسن الحنار وعلى اذنتين تكتنن الساق || اما ثمارها فيايسة لا منفردة تدعى البر. الواحدة ردة. تاويغ - راجعه في كلمة حنطة.

بحورية الانتكاز. ثمارها عتية الشكل، حامزة الطعم. مأكولة || احرف انواعه واطرها ما يلي.

٢٢٥٤٩ - قِيَامُ أَحْمَرِ *

Vaccinium vitis-idaea (S). *Airelle rouge, Myrtille ponctuée, Vigne de l'ida* (F). *Cow-berry, Whim-berry* (E). *Preiselheldebeere* (D). *Bacéri vite idea, Mortella punteggiata, Vigna d'orso* (I).

نوع من القِيَامِ جنسه نبات البلاد الممتدة الحارة. جنسه تطول من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقه سنانية صغرة تطول نحو ٣ سم. نصلها بحري اللون على صفحته. ثماره الى الحمرة القرمزية يستخرج منها بعد تصغيرها وتقطيعها مشروب كمعولي لذيذ الطعم.

٢٢٥٥٠ - قِيَامُ آسِي *

Vaccinium myrtillus (S). *Airelle myrtille, Abrader, Myrtille* (F). *Bilberry, Blackberry, Whortle-berry* (E). *Echte Heidelbeere* (D). *Bacéri mirtillo, Mirtillo, Uva ursina* (I).

نوع من القِيَامِ. جنسه فناء تطول من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها صغرة القدة آسية الشكل، نصلها جامد التسنج احمر الصفحة. ازهارها وردية، خناسية المفصوص، عشارية الاسدية. ثمارها خرة اللون مأكولة ويستعمل منها كحول لذيذ الطعم || جلدوره واثانه واوراقه تستعمل في الدبابة.

٢٢٥٥١ - قِيَامُ الْمَتَاعِ *

Vaccinium uliginosum (S). *Airelle des marais, Canneberge* (F). *Crauberry, Moss-berry* (E). *Mosshel-debeere* (D). *Mortella di palude, Mortellina di lago, Scopa fructifera* (I).

نوع من القِيَامِ الجبلول يكثر في المناطق الرطبة، ساه فراء تطول نحو ٨٠ سم. اوراقه عابطة صغرة، القدة، نصلها سناني الشكل يطول نحو ٣ سم. صفحته بحرية اللون. ازهاره احادية او ثلاثية التجميع. ثماره سكرية الطعم مأكولة وصالحة للتقطير.

٢٢٥٥٢ - قِيَامُ جَبَكِي *

Vaccinium arctostaphylos (S). *Airelle de Cappadoce, Thé de Trébizonde* (F). *Oriental whortle-berry, Trebizond tea* (E). *Broussatee* (D). *Tà di Brousse, Vaccinio di Cappadochia* (I).

نوع من القِيَامِ يكثر في بعض مناطق البلاد التركية. اوراقه ابيدة، نصلها جامد الصفحة الضيقة المسنة الاطراف. ازهاره قصبية الشكل بياض اللون احادية او ثلاثية التجميع. ثماره حامزة عاصفة حراء اللون || اوراقه صعبة تستعمل استعمال الشاي.

٢٢٥٥٣ - قِيَامُ عَشْكَوْنِي *

Vaccinium corymbosum (S). *Airelle à corymbes* (F). نوع من القِيَامِ جنسه تملو من ١٥٠ الى ٤٠٠ سم. ساقها وفروعها واقفاها سرسة. اوراقها عابطة تطول نحو ٧ سم. نصلها متند الصفحة، قليل اللمعة. ازهارها وردية اللون، خنسية او سباعية التجميع، عشكولية الترتيب. ثمارها الى الزرقة السوداء وهي مأكولة وصناعية كمعولية.

٢٢٥٥٤ - قِيَامُ صَغِيرِ *

Vaccinium oxycoccus, Oxycoccus palustris (S). *Airelle commune, A. à maurets, Canneberge commune, Brimbelle* (F). *Small cranberry, Bog-berry, Feu-berry* (E). *Moosebeere* (D). *Bacéri canneberg, Vaccinio dei paduli* (I).

نوع من القِيَامِ، ساهه مسطحة تطول من ٢٠ الى ٨٠ سم.



قام احمر



قام آسي



قام المتاع



قام جبلي



قام صغير

٢٢٥٦٧ - قَمْحُ صَبْ ، قَمْحُ قَسِر

Triticum durum (S). Blé dur (F).
من الأنواع الجرد تكثر زراعته في بلاد حوض البحر المتوسط. خروبه وأصرامه كثيرة العدد. سقته مسنة أو جوفاء. سنابلها مقوية. برء مستطيل الشكل صلب المكسر.

٢٢٥٦٨ - قَمْحُ تِسْ

Triticum sativum (S).
Blé tendre (F). Common wheat (E). Saatweizen (D). Fromento comune, Frumento, Blada, Grano (I).
من الأنواع الجرد تكثر زراعته في البلاد الأوروبية والأمريكية خروبه كثيرة العدد وأصرامه أيضاً. سقته جوفاء سنابلها كبيرة اللد منها البقوية واللافقوية. برء لاقسي الشكل واللون. لين المكسر اللينقي.

٢٢٥٦٩ - قَمْحُ تَشْوِي

Triticum dicoccum, *T. amyleum* (S). Blé de Jérusalem, Amidonnier (F). Two grained wheat, Emmer wheat (E). Emmer, Emmerweizen, Emmekorn (D). Fromento di Gerusalemme (I).

من الأنواع المكسية. زراعته محصورة ببعض جبال أروبة الوسطى والشرق الأدنى. خروبه وأصرامه قليلة. سقته فارغة. سنابلها كثيفة سفوية. برء حنطي اللون، أبيض المكسر، غزير المادة النشوية.

٢٢٥٧٠ - قَمْحُ وَحِيدُ الحَبَّةِ

Triticum monococcum (S). Blé local, Engrain, Petit épeautre (F). One grained wheat, Small spelt (E). Einkorn, Einkornweizen (D). Fromento locale, Piccola spelta (I).

من الأنواع المكسية. زراعته ممرقة في ألمانيا وبناريا وروسيا. ساقه فارغة. سليلات مستطيلة سفوية. سليلاته وسيدة الحبة. برء حنطي اللون اسمر المواج.

٢٢٥٧١ - قَمْر

Lune (F). Moon (E).
جرم سماوي كروي الشكل يستند فحواه من الشمس ويكسح حل الأرض. وهو أقرب الأجرام إليها قمره يبلغ نحو ٣٥٠٠ كلم. وحجمه نحو ثلث من حجم الأرض وهو يتدور حولها في ذلك المحيطي بعد أوجه منها، وهو المسافة القمرية، يبلغ نحو ٣٥٤٥٨٠ كلم. ويعدد كميته، وهو المسافة البعيدة، يبلغ نحو ٤٠٧٥٥٠ كلم || يقتر ثلاث حركات، البديية واليالية والصمودية وهو يتنجز دورته حول الشمس في أربعة أسابيع. والحركة الصمودية هي التي يستند عليها في حساب السنة القمرية التي يبلغ عدد أيامها ٣٥٤ يوماً أي أنها تقصص ٥٢٨ دقيقة من السنة الشمسية || أما الشهر القمري فعدته ٢٩ يوماً و١٢ ساعة و١٤ دقيقة.

٢٢٥٧٢ - قَمْر

Caranx luna (S).
نوع من الشيم. وهو سمكة بحرية مأكولة كبيرة اللد تفلون نحو ٦٥ سم. أعطانها مياه بحار البلاد المطلة لتوجد في المتوسط. تكثر في مناطقه الشمالية.

٢٢٥٧٣ - قَمْرُ التُّفَّاح

Echadure lenticulara (F). Lenticel spotting, Apple scald (E).
عارض يصيب ثمار التفاح والأجاص الآفونة في البراد منه يجمع بعض الفنازات الناتجة من تنفس الثمار في أثناء تخزينها || مظهره الخارجي بقع صغيرة بيضاء اللون تعلو سطح البشرة ثم تنتشر رويداً رويداً إلى أن تغطيها بكاملها فتتسبب عندئذ صلب الآليات على عمق يراوح من ٢ إلى

القلية - يحتاج القمح في دورته الحياتية القائمة بين انتاكه واستحصاده إلى كمية من السرعات الحرارية يراوح قديها بالقية إلى مختلف خروبه وأصرامه من ١٧٠٠ إلى ٢٢٠٠ سرعة. ولا يحصل انتاك إذا كانت الحرارة دون قلت دجيات سخ. أو فوق ٤٥ دجية سخ. أما أصح حرارة لانيته فهي التي يراوح مدداها من ٢٢ إلى ٢٨ دجية سخ. فلذلك يمكن القول أن أقليم الحطة يشمل العالم باستثناء المناطق القطبية والجبالية العالية ومناطق عطف الاستواء التي يراوح ارتفاعها عن سطح البحر من صفر إلى ٢٠٠٠ م. تربته - ينبت القمح في مختلف الأربة التي ألها بالزراعة المتتالية لكنه يرغب في الأربة العميقة القور المنسوبة التركيب الحكي المتوسطة الانساج التي تتسحب الاطمار وتحافظ على الرطوبة لا يجرى في الأربة الكلسية والربية لأنها تجف سريعاً وهو يخشى الأربة الطينية المنتجة لانه يتضرر من تماسكها بين مفاصل فيغيبها الرطوبة المقرطة والجفاف الزائد.

اقواحه - أنواحه الزراعية سبعة أما خروبه وأصرامه فثلاثة العدد. وأنواحه الرئيسية هذه تقسم إلى قسمين : الأنواع الجرد ومددا أربعة والأنواع المكسية ومددا ثلاثة. فالأنواع الجرد التي ينصل فيها البر من صيفاته والتي تتميز بلين قمار سنابلها ولدانها وعدم انفصالها، أروبة : القمح الصلب والقمح الأبيض والقمح البيلوني والقمح الثمين. أما الأنواع المكسية التي لا ينصل برها من صيفاته والتي يسهل انقسام سنابلها وقسمها فهي : القمح الربوي والقمح التشوي والقمح الوحيد الحبة.

٢٢٥٦٢ - قَمْحُ الْبَرْ

Sarrasin ménager, *Bucal* (F).
هو السرازان المعروف، عطله.

٢٢٥٦٣ - قَمْحُ الْبَرْ الهندي

هو السرازان التري، عطله.

٢٢٥٦٤ - قَمْحُ بُولُونِي

Blé de Tartarie (F).
Triticum polonicum (S). Blé de Pologne, Froment de Pologne (F). Polish wheat (E). Polnischer Weizen (D). Fromento di Polonia (I).

من الأنواع الجرد تكثر زراعته في بعض مناطق أروبة وأفريقية الشمالية. خروبه وأصرامه عديدة. برء شديد الاستطالة، جامد المكسر الصلب.

٢٢٥٦٥ - قَمْحُ نَحْنِجْ ، قَمْحُ عَرَبِي

Triticum turgidum, *T. vulgare* (S). Blé renflé, Froment renflé, Poulard, Gros blé (F). Humpy grained wheat, Turgid wheat, River wheat (E). Englisches Weizen (D). Fromento turgido, Grani grossi (I).

من الأنواع الجرد. تكثر زراعته في الشرق العربي لكنه يرغب في الأربة الحارة الوفيرة المواد الغذائية. ساقه مسنة في أصلها. سليلته مربعة الاصلع، كثيرة البر. برء غليظة عدبة، صلبة المكسر.

٢٢٥٦٦ - قَمْحُ رُونِي، قَمْحُ مَكْتَسِر، عَتَسْ، خَتَدُ رُونِ

Triticum spelta (S). Blé vètu, Epeautre, Grand épeautre (F). Spelt wheat, Dinkel wheat (E). Spelzweizen (D). Spelta, Marzolo, Fromento rosso (I).
من الأنواع المكسية. زراعته محصورة بالأقاليم الباردة والجبالية. خروبه وأصرامه معقودة. سقته عالية فارغة. سنابلها فرقة، مستطيلة، سفوية، لونها يختلف باختلاف الخروب منها الأبيض والآخر والاسمر.



نح

٢٢٥٨٠ - قمرية * هو الاربيان ، اطلبه .

٢٢٥٨١ - قمرية رشيق (F). *Gnatophylla elegante*

دورية من القشريات وفصيلة القرينيات مشهورة باسم قمر . اطلبه .

٢٢٥٨٢ - قمرية (F). *Lunaire* (F). *Lunar* (E).

٢٢٥٨٣ - قمرية (F). *Lunifforme*, *Lunulaire* (F). *Lunifirm* (E).

نمت تمرني يوصف به ما كان شكله شكل القمر .

٢٢٥٨٤ - قمرية * *Ectopistes migratoris* (S).

Ectopistes migrateur (F).
طائر من التباري وفصيلة الحماميات كنيته ابو ذكري
واير طلحة . الانثى قريه والجمع قاري وقرى ^١ يروى
ان عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق لما طلق زوجته مائكة ،
زولوا عنه ربة ابيه ، كان يشد :

احاتك لا انسك ما ذر شارق

وسا نوح ارق الحمام المظوق

ولم ار مثلي طلق ايوم مثلي

ولا مثلي من غير جرم يطلق

احاتك قلبي كل يوم ولى

ايك بما تحتي الثوبس معلق

ها خلق جزل وراي وينصب

وشاق سوي في الحياة وينطق

فرق له ابوه وامره ان يربحها ^٢ والقري طائر طوله
نحو ٤٠ سم . ظهره الى الزرقه الرصاصية متفح بنفسجي
المزاج . صدره ورطبه الى الصبغة الصفائيه . زيكاه ابيض
الريش . افيكه رصاصي الانتشاب اريد الطرف متمزعه
يقع سود . جناحه اسود الوسط يرمادي الاطوار والحافة .
مقارعه اسود . حياها برتقاليان ، جفونها حر . الانثى اصفر
قدماً من الذكر وادكن قوياً واقل مائجة ^٣ موطنه فسح
الارباء يم جميع البلاد . وهو من الطيور القواض التي
تجوب البلاد سمياً وراء الرزق وليس في سبيل الميوه ^٤ الى
والشئ . اسرايه كليله يراوح عدد افرادها من ٥٠ الى
١٠٠٠٠ وأكثر . قوته الحبيب واليدور . يدن حته في
الاجبار . اناته تبيض من المرتين الى الثلاث مرات في السنة .

٢٢٥٨٥ - قمرية (S). *Menispermaceae*

Menispermaceae (F). *Menispermaceae* (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اسباطها ^١ اجناسها
٣٠ وانواعها ١٠٠ . اصطلحها البلاد الاسيوية والامريكية
تكثر في المناطق رمل شفاف الانهار . معظمها من اجنابت
المرشاة . اوراقها متناحية منقطة . ازهارها صغيرة القند ،
معدوية التجميع ، محورية الارتكاز . ثمارها نووية
صغيرة الحبيب .

٢٢٥٨٦ - قمرية * هي حشيشة القمر ، اطلبه .

٢٢٥٨٧ - قمرية * ، حب اللبال ، سم الحوت

Menispermum (S). *Ménisperme* (F). *Moonseed* (E).
Mondsand (D). *Menispermum* (I).

جنس نباتات عارشة من فصيلة القمريات . انواعها عديدة
معظمها بري وبضها ترابي . اوراقها متناحية منقطة
كاملة او مفصصة . ازهارها صغيرة القند ، ثنائية المسكن ،
معدوية التجميع ، ثمارها نووية لا تظل من المواد الحذرة
تستعمل في صيد السمك ^٢ اشهر انواعها ما يا :

٥ م . ^١ يمكن اجتنابه : ^٢ بالتبريد المنظم والتجوية
المناسبة . ^٣ يعلم الافراط في ري الاشجار قبل ثمن
الجن . ^٤ يجني الثمار حته بد ادراكها حيث تكون نسبة
المواد الاثيرية المختلفة على احسن حال .

٢٢٥٨٨ - قمر الليل * (S). *Citharinus Geoffroyi*

Citharine du Nil (F). *Citharinus* (E).

قر الليل هو الاسم المصري . سمكة نهريه ييوس من
مفتوحات المائنة وفصيلة السمكيات . موطنها النيل من
منتهه الى مصبه . تعيش في الاسماك والاورحال ^١ جسمها
كبير القند ، مبط الجرم ، بطول نحو ٥٠ سم . عرضها ،
من حافة بطها الى قاعدة زعنفتها الظهرية الاول ، نحو
٢٥ سم . رأسها صغير الحجم ، شبه اسفني الشكل .
شدقها قليل الانفراج . اسنانها صغيرة حادة على صف
واحد . زعنفتها الظهرية الاول كبيرة القند شبه هريبة
الشكل ، اما الثانية صغيرة . زعانفها الصدرية والحوضية
صغيرة الجرم . زعنفتها الشرجية مستطيلة نائكة المقدم .
زعنفها الذيلية فائقة ، راحة الانفراج ^٢ لونها الى الشبهة
الفضية مما الى تسميتها بقمر الليل ^٣ لحمها متوسط
الصنف ، مأكول .

٢٢٥٨٩ - قمرية (F). *Fauvette des Jardins*

القمرية طائر من الدعاخيل يدعى دخلة البساتين ، اطلبه .

٢٢٥٩٠ - قمرية * (S). *Glomeris*

Glomeris (E).
جنس دوريات من فصيلة القمريات انواعها عديدة
جسمها شبه اسطوانية الشكل طولها يراوح من ١٢ الى
٢٠ م . اجسامها مركبة من ١٢ سلقه . جرانها ٣٤ .
انثيا الى البسة . تعيش تحت الحجارة . قوتها المواد النباتية
المتحللة تسرح في الليل وتتكور في النهار .

٢٢٥٩١ - قمرية مهدب * (S). *Glomeris marginata*

Glomeris marginata (S). *Glomeris marginé*,
Glomeris bordé (F). *Margined glomeris* (E).

دورية دامت من فصيلة القمريات ورتبة الدعاخيات
شغويات الاحتكاك ^١ جسمها صغير القند ، محدد السطح
الملوي ، منبسط الملب . الذكر اصفر قدماً من الانثى
يطول نحو ١٢ م . والانثى تطول نحو ٢٠ م . ^٢ رأسها
مستعرض الشكل ، قليل التنوع . حياها زعنجان . منكما
قارض قارض . زباناها صغيران مخلجان . جرانها قصيرة
تعد ١٧ زوجاً حته الذكر و١٩ زوجاً حته الانثى . ثوبها
اسود البين ، اسفل الحمل الكثيف . مدبها الى البقلة
النراء ^٣ تعيش تحت الحجارة وفي المواقف المعتدلة الرطوية
وفي الاودية والساكن الارضية . تسرح في الليل وتتكور
في النهار . قوتها المواد النباتية المتحللة ^٤ تعتبر من
الدوريات اللاذوية .

٢٢٥٩٢ - قمرية (S). *Glomeridae*

Glomeridae (F). *Glomeridae* (E).

فصيلة دوريات من الدعاخيات الشغويات الاحتكاك .
اجناسها وانواعها عديدة اشهرها واعها القمريات .

٢٢٥٩٣ - قمرية (F). *Amande dure*

Hard almond (E).

هو اللوز الصلب الذي يوجب الكسر .



قر الليل



لروش



لروش مهدب



قري



قريه

٢٢٥٨٨ - قَمْوَنَةُ الصَّيْن

Menispermum dauricum (S). Ménisperme de Daourie, M. de Chine (F).

جنية زُرْبِينَة عارضة تملو نحو ٤ أمتار . اوراقها مستطيلة المثلث ، أحليجية الشكل ، خماسية التفرص ، نصلها مالم البشرة اللامعة على سطحته . ثمارها إلى الجوزة القاتلة || انزعاجها يستمر من حزيران إلى تموز .

٢٢٥٨٩ - قَمْوَنَةُ كَنْدَا

Menispermum canadense (S). Ménisperme du Canada (F).

جنية زُرْبِينَة عارضة تملو نحو ٤ أمتار . اوراقها قلبية الشكل ، خماسية أو سباعية التفرص ، نصلها مالم الصفحة العليا ، خلي المروق على السفلى . ثمارها إلى السواد اللامع || انزعاجها يستمر من حزيران إلى تموز .

٢٢٥٩٠ - قَمْصُ أُسْوَد

Tipula nigra (S). *Tipula nigra* (F). Black tipule (E).

حشرة من فصيلة القمصيات . جسمها أسطواني الشكل ، مستدل للقد ، يطول من ١١ إلى ١٥ سم . || ثوبها إلى السواد الأسبق . ورشاتها إلى السرة العابقة . زباناها خيطيان ، مهدبان || الأني أكبر قدماً من الذكر وأصغر ورشاً منه || تظهر الحشرة الجملانة في حزيران وتبقى حتى أيلول . تألف المئات والمئات الظليلة || تمتع الأنثى مكها في التربة فينتف من يرقات تعيش على المواد النباتية والمضوية المنحلة .

٢٢٥٩١ - قَمْصُ الْبُقُولِ *

Tipula clivacea (S). *Tipula potagère* (F). Lasterhacket (E). Wissent-schnake (D).

حشرة من القمصيات طويلاً بأروح من ١٥ إلى ٢٣ سم . جسمها وأجنحتها وأرجلها مستطيلة . لوناً إلى الحليطي تشوبه صفرة زرقية . ذكرها أصفر حبساً من أنثاه . والأنثى تمتع مكها في أمان الربيع على سوق الزروع وغفلت نباتات المراهي والمروج فينتف من يرقات صفرة نهمة تلهم الجلود وقد تركب الأوراق وتؤذيها . وهي تسرح في الليل وتبيت في النهار . لها جيلان في الحول ، الأول في الربيع والثاني في الصيف .

٢٢٥٩٢ - قَمْصُ كَبِير

Tipula maxima (S). *Tipula inaximale* (F). Major tipule (E).

حشرة لامؤذية من فصيلة القمصيات . جسمها مستطيل كبير ، يطول من ٢٧ إلى ٤٠ سم . || ثوبها إلى الحليطي الأسمر . ورشاتها مهدبان بالأبيض والوردي الباهت || زباناها مرغيفان ، مهدبان . تتميز بكبر الفتحة وبامتدالة للقرنم || الذكر أصغر قدماً من الأنثى . تظهر الحشرة الجملانة من أيار إلى تشرين الثاني . تألف الإناث مكها في التربة . يرقاتها تعيش على المواد المضوية والنباتية المنحلة .

٢٢٥٩٣ - قَمْصَة

Sauterelle à l'éclotion (F).

الجرادة عند نلقها . ج . قص .

Tipulidae (S). *Tipulidae* (F). *Tipulidae*, Crane flies (E). Schnaken, Riesen-schnaken (D).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . أجناسها وأنواعها

عديدة لا تقل عن ٥٠٠ معظمها من الحشرات النافعة أو القليلة الضرر . تعيش على ريق الأضمار وأوراق الأوراق . تكثر في الأماكن الرطبة الظليلة وعلى ضفاف الأنهار . يرقاتها تعيش في الماء أو قرب الماء في التربة والريال على مختلف المواد المضوية والنباتية المضرة .

٢٢٥٩٥ - قَمْطُول

Antedon (S). *Antedon, Comatule* (F). *Comatule* (E).

جلس حيوانات بحرية من زنايق البحر وفصيلة القمطوليات . أنواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || جميعها شارية الأصابع القابلة للانطواء والتحصين . أحادية الساق النحيلة المنفصصة عند الإدراك || تسبح بواسطة أصابعها . يكثر وجودها حيث يكثر الخث والطوح || اعرف أنواعها القمطول الآخر والقمطول الوردي .

٢٢٥٩٦ - قَمْطُولِيَّات

Comatulidae (S). *Comatulidae* (F). *Comatulidae* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من زنايق البحر . أجناسها وأنواعها المعاصرة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || جميع أنواعها ثابته مستقرة حتى نهاية زين قمتها ثم تتحول إلى متفلة بجولة تقوم وتلتصق بالأشياء بواسطة زوائده هدية || أشهر أجناسها القمطول .

٢٢٥٩٧ - قَنْع

Entonnoir (F). *Funnel* (E).

جهاز يوضع على فم الأناة فيسبب فيه الماء وفيه . ج . أناع .

٢٢٥٩٨ - قَنْع ، قَنْع

Cupule كأس صغيرة قلبية خشبية التركيب تحيط بجوار بعض الأشجار كالليرط والبنند .

٢٢٥٩٩ - قَمْعَة

ذباب يركب الأيل والقطا إذا اشتد الحر . ج . قمعع وق (السان) .

٢٢٦٠٠ - قَمْصَل

Bourgeonner (F). *To bud* (E).

قل النبات : خرجت قاصيله أي براعمه .

٢٢٦٠١ - قَمْصَلَة

Bourgeonnement (F). *Budding, Sprouting* (E).

هي نمو قاصيل النبات وزمعا . وهي مجموعة المناشع التي تنشع تكوين البراعم وزمعا .

٢٢٦٠٢ - قَمْوَنَةُ حَمْرَاء *

Catocala nupta (S). *Lichénée rouge, Mariée* (F). *Catocala nupta* (E).

حشرة من النشريات مرشفات الأجنسة . موطنها يمتد من الشرق الأوسط إلى أروبة . فراشها واسعة قوتها رقيق الانزعار . سرقتها تعيش على أوراق الحور والقمصيات || جسمها كبير القد يطول نحو ٢١ سم . بسطها تراوح من ٧٤ إلى ٧٨ سم . رأسها كسني اللون . صياها كسنيان . زباناها خيطيان . جوشها ويطها إلى الكسني الأكلت || ورشاتها الاماميان إلى الريدة السمره يطويها زراكنش وتزويق خلفه الألوان فيها البني والكسني والازرق الاطحل . حناها الخاريجي متتابع الاقواس الحلاقية السمره . ورشاتها الخلفيان إلى الحمرة القرمزية يطويها طرق مجزوي ودية

وسلى من اللون نفسه || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى أيلول . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنمو سمة أصابع وتمتص الحنك مبادياً



قص البقول



قَمْوَنَةُ حَمْرَاء



قُمُورَةُ زَرْقَاءَ



قُمُيَةُ التَّيْنِ



قُمُورَةُ

في شقوق لحاء السرق والأصنان || السرقه تطول نحو ٧٠ سم . جسمها فيه اسطواني الشكل . ثوبا الى الطلحة الخضراء . يطولوا تمشيش دقيق أسود ونقط جانبية فردية حراء اللون . رأسها الى الجلاوة . مدها وروايجها الى الطلحة السوداء || طرد الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع ويتقضي ضمن صلبة تحبها السرقه بين الاوراق التي تجسمها الى بعضها بعض .

٢٢٦٠٣ - قُمُورَةُ زَرْقَاءَ *

Catocala fraxini (S). Lichénée bleue, Likanée bleue (F). Catocala fraxini (E).

حشرة من التسميات مرشحات الاجنحة . موطنها يمتد الى الشرق الاقصى الى اوروبا وافريقية الشالية . فرانسيا واحة قوتها مفر الاضرار . سرقها تمشيش على نصال الاوراق || جسمها كبير القند بطول نحو ٣٥ سم . يسقطها تراوح من ٩٢ الى ٩٦ م . رأسها كسني اللون اسمر الملوخ . صياها كيرتان . واناها غميان . جوشها وبطنها الى الكسني الاسمر تملو ماجة غبراء || روشاها الاماميان الى الطلحة السوداء يملو ستة صفوف من الزراكش الكسنية اللون . روشاها الخلفيان الى الكسني الكلف تملو جدة مقوية قاطبة زرقاء اللون || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع وتتمتع الممكن مباحدا في شقوق لحاء السرق والأصنان || السرقه تطول نحو ٨٠ سم . جسمها فيه اسطواني الشكل . ثوبا الى الطلحة تملوها نمة زرقاء ونقط سود جانبية . رأسها الى الطلحة . مدها الى السرة . عليها دقيق اشقر || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتقضي ضمن صلبة تحبها السرقه بين طيات القشور او تحت اللحاء .

٢٢٦٠٤ - قُمُورَةُ ، قُمُورَةُ دُوبِيَّةُ (السان) .

٢٢٦٠٥ - قُمُورَةُ Bourgeois à feuille (F). هي البرعمة الورقية . ج قاحيل . Leafy bud (E).

٢٢٦٠٦ - قُمُيَةُ Infundibuliforme (F). Infundibular, Infundibuliform (E).

نمت ترمي ي يطلق على ما كان شكله كالقبع . ويطلق في علم النبات على الترمجات و متصلة القملات و القمية الشكل .

٢٢٦٠٧ - قُمُيَةُ التَّيْنِ * ، حَشْرَةُ التَّيْنِ

التَّيْنَجَانِيَّةُ ، كُوشِيلُ التَّيْنِ Asterolecanium (F). sambuci (S). Cochenille du figuier (F). حشرة صغيرة من القرميزات . جسمها مستدير الشكل قطره نحو ٢ سم . لونها الى الصفرة الخضراء الملوخ . تركيب في التين الانسيب اللبني قصب حيث تمل تجاوبف صغيرة يزداد ارتفاع ساقها مع طول اقامة الحشرة .

٢٢٦٠٨ - قُمُيَاتِيَّاتُ Anaplores

رؤية حشرات من طبقة التسميات . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة ، زهاء ٢٠٠ منها ٢٤ نوعا يركب الانسان والحيوانات البنية الماجة . اما الانواع القليلة ضئري الحيوانات البرية من القردة الى القردان || والقسميات حشرات مادمة للتطور والاجنحة ، جسمها صغير القند مغليط الشكل . رأسها وتدي . متكها ثاقب ماص . قرقضا

الاستشعاري مركب من ٥ فواصل صغيرة . رسلها وسيد المقله ينتهي بمقل حد قروي || تمشيش طفيلية حسل الانسان والحيوان البين . تحسس الدماء وتسبب الامراض التي تنقلها || اشهر فصائلها القرميات والقرميات .

٢٢٦٠٩ - قُمُيُومُ Flacon (F). Case-bottle (E). انا من نحاس او زجاج يحكم السد يحفظ فيه السائل

٢٢٦١٠ - قُمُيُومُ الجُبْنِ راجع سكية الجبن .

٢٢٦١١ - قُمُيُومُ الحَيْتَانِ Cyane (F).

هو القنتر ، دوبيية بحرية من القشريات ، اطلية .

٢٢٦١٢ - قُمُيُومُ الرُّؤَسِ هو القرقرة ، اطلية .

٢٢٦١٣ - قُمُيُومُ الصَّالَةِ هو الطبور ، اطلية .

٢٢٦١٤ - قُمُيُومُ الكُتُبِ هو ناسم الكتب ، اطلية .

٢٢٦١٥ - قُمُيُومُ هي اللدة ، اطلية .

٢٢٦١٦ - قُمُيُومُ البُرُكْتَالِ السُّودَّاءِ هي قرمزية البرققال السوداء ، اطلية .

٢٢٦١٧ - قُمُيُومُ الصُّفْحِ هي روية التلاح ، اطلية .

٢٢٦١٨ - قُمُيُومُ التُّوتِ هي قرمزية التوت ، اطلية .

٢٢٦١٩ - قُمُيُومُ النَّبَاتِ هي القرمزية ، اطلية .

٢٢٦٢٠ - قُمُيُومُ الزُّودِ هي قرمزية الزود ، اطلية .

٢٢٦٢١ - قُمُيُومُ سَالْحُورَةِ هي القرمزية الفتاكة ، اطلية .

٢٢٦٢٢ - قُمُيَاتِيَّاتُ

Psocopteroïdes (F). Psocopteroïdes (E).

طبقة حشرات صغيرة القد ثاقبة ماصة وقارضة من شعبة النليات . تطورها تدريجي . لا ملامس شرجية لها . قوتها المواد العضوية والنباتات الفطرية || رتبها ثلاث القهليات والقهليات والقسميات .

٢٢٦٢٣ - قُمُيَاتِيَّاتُ الحَاءِ Hydrachnidae (S).

Hydrachnidae (F). Hydrachnidae (E).

فصيلة حشرات صغيرة القند من رتبة القهليات اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها مائية معظمها طفيلي .

٢٢٦٢٤ - قُمُيَاتِيَّةُ Tique (petite) (F).

Tick (small) (E).

القرادة اولى ما تكون صغيرة ثم تصير خنثاة ثم قرادة .

٢٢٦٢٥ - قُمُيُومَةُ *

Calceola (S).

Calcolea (F). Calcolea (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل وعضلية التسميات . انزاعها المعروفة قليلة العدد معظمها من متصبرات الاحساب الاول والطبقة الباشيرية ، وبعضها يعيش على الصخور المنقورة البعيدة القور في بحار البلاد المعتدلة الحارة || اصداها قميصة ، شبه غروطية الشوزن ، للولوية الغشاء الداخلي .

٢٢٦٢٦ - قُمُيُومُ Bruant proyer (F).

عصفور من الدرس يدعى الاكمل اطلية .

٢٢٦٣٧ - **فَيْس** Kounis, Koumys (F). Légumes secs (F). Pulses (E).

هي البقول الجافة من أي نوع كانت .

٢٢٦٣٨ - **قَنْ** هو ألم ، البتيت المد الدجاج .

٢٢٦٣٩ - **قَنَا** Canna (S). Canna, Balisier (F). Flowering reed (E). Blumenrohr, Krebsblume (D). Canna, Cannacoro (I).

جنس نباتات عشبية جلمودية معمرة من فصيلة القنويات. أنواعها عديدة منها البرية والزرينية والبنفسجية . بعضها متسببة . أوراقها متعاقبة كبيرة . نصلها جامدة . أزهارها منبيلة تتجمع هامة الارتكاز || أمرف أنواعها وأشهرها ما يلي .

٢٢٦٤٠ - **قَنَا الهند ، مَارْزُون** Canna Indica (S). Canna d'Inde, Balisier d'Inde (F).

نوع من القنا ضروب وأصرامه وبعته عديدة جميعها زُرينية . بعضها خضراء تملو من ١٠٠ إلى ١٨٠ سم . أوراقها طويلة نحو ٥٠ سم . وتعرض من ٢٠ إلى ٢٥ سم . أزهارها حراء اللون أو وردية يملوها شمع أصفر متفاوت الاتساع || أزهارها يستمر طوال الصيف .

٢٢٦٤١ - **قَنَا رَهْل ، قَنَا سَحْلِي** Canna flaccida (S). Canna à fleurs d'orchidées, Balisier flasque (F).

نوع من القنا الزرني . ضروب وأصرامه وبعته عديدة . ساقه فسقية اللون تملو من ٨٠ إلى ١٦٠ سم . أوراقه بيضية الزام الأول ثم سنائية تطول من ٣٠ إلى ٦٠ سم . أزهاره تشبه أزهار السحاب ، لونها إلى الصفار الكبير . وهي كبيرة الشريبات المستقيمة المتسببة الوحيدة . أزهارها يستمر طوال السنة .

٢٢٦٤٢ - **قَنَا زَنْكِي** Canna filiflora (S). Canna à fleurs de lys, Balisier à fleurs de lis (F).

نوع من القنا الزرني . الرقة القرف . ضروب وأصرامه كثيرة العدد . ساقه خضراء اللون غليظة تملو نحو ٢٠٠ سم . أوراقها كبيرة اللد تطول من ٩٠ إلى ١٢٠ سم . وتعرض من ٤٠ إلى ٥٠ سم . أزهاره زنبقية الشكل ، ساجية اللون ، قواسم العرف البطري ، كبيرة اللد تطول نحو ١٥ سم . أزهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٢٦٤٣ - **قَنَا سَوَسِي** Canna Iridiflora (S). Canna à fleurs d'iris, Balisier à fleurs d'iris (F).

نوع من القنا الزرني . ضروب وأصرامه وبعته عديدة . ساقه حراء اللون عشية تملو نحو ٢٠٠ سم . أوراقها كبيرة اللد ، سنائية الشكل ، نصلها خلي الصفعة السفلى . أزهاره قرمزية تطول نحو ١٦ سم . شرباتها ثنائية التخصيص . أزهارها يستمر طوال فصل الربيع .

٢٢٦٤٤ - **قَنَا مَأْكُول** Canna comestible (S). Canna comestible, Balisier comestible (F).

نوع من القنا الزراني . ساقه كبيرة اللد ، لونها لشوي المادة شائع الاستعمال الغذائي . ساقه حراء اللون مستطيلة تملو من ١٢٠ إلى ٢٠٠ سم . أوراقه حراء الاغداد . سنائية النصل الذي يطول نحو ١٠ سم . ويمرض نحو ١٨ . أزهاره متوسطة الحجم تطول نحو ٨ سم . لونها إلى الحمرة السابقة ، باطنها يرتقالي || أزهاره يستمر من حزيران إلى تشرين الأول .

٢٢٦٤٧ - **فَيْس ، فَيْس** Kounis, Koumys (F). Kounis, Koumis (E).

مشروب يستخرج من لبن الخيل الحضر وهو شائع الاستعمال في بعض الأقطار الآسيوية .

٢٢٦٤٨ - **قَمِيص ، جَلْبَاب** Cape قطعة من نعل ورقة التبغ ألياف تصلح لتغليف السيكار ، اطلب كاب .

٢٢٦٤٩ - **قَمِيص يَثُث الملك** اطلب على ليل .

٢٢٦٥٠ - **قَمِيص** Scyphus (F). Scyphus (E). جزء من مشرة بعض أنواع الحزاز قمي الشكل متسبب الارتكاز .

٢٢٦٥١ - **قَمِيصَة** نعت تعريفي يطلق على الأوراق المصابة بمرض الفها .

٢٢٦٥٢ - **قَمِيصَة** Strobilanthes (S). Strobilanthes (F). Strobilanthes (E).

الاسم العلمي من البراني بمعنى « القمع » . جنس نباتات عشبية أو ليلية مخشوشة معمرة من فصيلة الاقتيات . سوطها تملو من ٣٠ إلى ١٥٠ سم . أوراقها متعاقبة . أزهارها قمية الشكل ، زرقاء اللون أو بنفسجية || تزود الزرين في الأماكن والحدائق . أنواعها المرفقة ستة أشهرها الثلاثة التالية .

٢٢٦٥٣ - **قَمِيصَة لَامْسَاوية الورق** Strobilanthes anisophyllus (S).

نوع من القمية . جنبة معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم . ساقها خضراء كثيرة الافاد . أوراقها مركبة ، وريقاتها سنائية النصل ولامسأوية الطول والمرص بين الأزواج المتضاربة . أزهارها أل الزقة اليلكية الملوحة ، قطرها نحو ٣ سم . || تنويرها يستمر من الصيف إلى الخريف .

٢٢٦٥٤ - **قَمِيصَة مَسَاوية الورق** Strobilanthes isophyllus (S).

نوع من القمية . جنبة معمرة تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم . ساقها خضراء . أوراقها مركبة ، سنائية ، تطول من ٦ إلى ١٢ سم . وتعرض من ٣ إلى ٤ سم . نصلها مشابة باير دقيقة بلورية . وريقاتها متساوية الأبعاد . أزهارها زرقاء اللون ، قطرها نحو ٢٥ سم . || تنويرها يستمر من الصيف إلى الخريف .

٢٢٦٥٥ - **قَمِيصَة مَطْلَحَة** Strobilanthes maculatus (S).

نوع من القمية . جنبة معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٢٥ سم . ساقها خضراء مجتمرة الافاد . أوراقها بيضية الشكل ، تطول من ١٢ إلى ٢٠ سم . وتعرض من ٦ إلى ١٠ سم . نصلها إلى الخضراء اللامس يملو تلطيخ فني . أزهارها بنفسجية اللون ، قطرها نحو ٤ سم . || تنويرها يستمر من الصيف إلى الخريف .

٢٢٦٥٦ - **قَمِيصَة الغنم ، مِيْشُونَج الغنم** Melopagus ovinus (S). Mèlophage du mouton, Pou du mouton (F).

حشرة عادمة الجناح من فصيلة الشراويات . صغيرة القد مبطلة سمراء اللون تبيض على جلد الغنم تحت الصوف .



قَنَا



قَبْلَة النمر



قَنَا

Connaraceae (S).

٢٢٦٥٦ - قناريات *

Connaracées (F). Connaraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين . مركزها التصنيفي يأتي بين الورديات والقطانيات . اجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة العدد ، أصلها معظم المناطق الحارة من العالم . القديم والجديد باستثناء أستراليا || نباتاتها جذبات شائكة . أوراقها صغيرة ، متقابلة تصالفا سنانية الشكل ، مجرية الخضار . أزهارها محورية ، صغيرة ، منعقة || أشهر اجناسها القنارة .

Pimelia (S).

٢٢٦٥٧ - قنار *

Pimélie (F). Pimelia (E).

الواحدة قنارة . جنس حشرات من غديات الاجنحة مختلفات الاجزاء وفصيلة البشيات . أنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم القديم || اجسامها مختلفة الاحجام يكثر فيها الاعتدال ويقلب فيها الشكل الاهليبي رؤوسها صغيرة . قرونها الاستشعارية معتدلة الطول . كوتلسها غرورية . الحماض لاسعة ، منها المخذة ومنها المخرقة . جرابها بين المحدثلة والمستطيلة . انبوبها تراوح من السرة القائمة الى السواد الامفر .

Pimélie géante (F).

٢٢٦٥٨ - قنارة جيتارة *

هي الدحلول حشرة من غديات الاجنحة ، اطلبها .

Rhinopterus (S).

٢٢٦٥٩ - قناسة *

Rhinoptère (F). Rhinopterus (E).

جنس اسماك بحرية من السنغيات وفصيلة الشفنجيات البحرية . أنواعها المعروفة ستة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة . جميعها كبيرة القد . اجسامها شبيهة باجسام المورينة . رؤوسها اسطوانية يملؤها ميزاب قليل العمق يقسمها الى شطرين متساويين . اذانها مسطيلة كالسياط تحميا عند قواضها متناصين اغشارية مشاربة التركيب قاعدتها الزنفة الشرجية . قوتها الاسماك . تألف المهادج الصفرة حيث تكمن للانقضاض على فرائسها || غروبها كاعة الصف ، قل من يرغب في اكلها .

Masque (F). Mask (E).

٢٢٦٦٠ - قناع

جهاز يوضع على الرأس لوقاية سواه أو بعضها .

Radiæthéiste (F).

٢٢٦٦١ - قناني

Dowser (E).

من عالج اشعاع التفتنت الكهربى يعرف بروجود الماء والامدان في جوف الارض .

٢٢٦٦٢ - قناب ، قناب (F). To ease (E). Alléger (F).

قنب الكرمية : قلمها وقطع عنها ما يؤذي حملها .

٢٢٦٦٣ - قناب (F). Fourreau (F). Sheath, Cover (E).

جراب قنصيب الدابة ، وقيل وعاء قنصيب كل ذي حافر . كقنق قناب الحمار : وعاء جردانه . وقناب الجمل : وعاء ثيله .

Epanouir (s) (F).

٢٢٦٦٤ - قناب *

To blow, To expand, To open (E).

قنب الزهر : خرج عن اكامه .

Cannabis sativa (S).

٢٢٦٦٥ - قناب *

Chanvre commun, Chanvrier, Pantagruélion (F).

٢٢٦٦٥ - قنابة ، قنابة (F). Bractée (E).

كل ورقة شلتت في شكلها او تركيبها لويدها قرب الزهرة كالكانفور في البتل والمصيفة في القمح . الخ .

Bractéaire, Bractéal (F).

٢٢٦٦٦ - قناني

Bractéal (E).

نمت تعريفى يطلق على كل ما له صلة بالقنابة .

Ostrya (S).

٢٢٦٦٧ - قنابية ، يستورية

Ostryer, Iron-dur (F). Lever-wood, (E).

Hopfenbaum (D). Ostrya, Legnoferro (I).

جنس اشجار حرجية وريزية من فصيلة السوليات . انواعها قليلة العدد هيكلها وأوراقها وأزهارها تشبه الشرم (الخربزينة) . سوطها تملو من ١٥ الى ٢٠ م . اغشائها شديدة الصلابة ، ثقيلة الوزن اللسي . أوراقها عابطة متناوبة تطول من ٦ الى ١٣ سم . وتعرض من ٣ الى ٦ سم . فصلها مزنب الصفة ، متقارب المروق المتقابلة الي رابرح بعدها من ١١ الى ١٧ . ثمارها كوزية الشكل كثار الجنجل . بذورها حلقة الطرف البلقن || اعرف انواعها وأشهرها :

Ostrya japonica (S).

قنابة اليابان

Ostryer du japon (F).

Ostrya carpinifolia (S).

قنابة شرمية الورق

Ostryer à feuilles de charme (F).

Ostrya virginiana (S).

قنابة فيرجينية

Ostryer de Virginie (F).

Dalot (F). Scupper (E).

٢٢٦٦٨ - قنقة

جرى ماء من صنع الانسان يستعمل لنقل وتوزيع مياه الري .

Canal azygos (F).

٢٢٦٦٩ - قنقة الزكبة *

Azygous canal (E).

جرى انبوي شعري ينقل زكبه ذكور الحشرات من تلافيسها الى قنصباتها .

٢٢٦٧٠ - قنقة المبيض (F). Oviduct (E).

جرى انبوي ينقل البيض من المبيض الى خارج الجسم الحيواني .

Canal cystique (F).

٢٢٦٧١ - قنقة المرارة

Cystic canal, Cystic duct (E).

هي قنقة المرصلة الصفراوية .

Canal marginal (F).

٢٢٦٧٢ - قنقة حافية

Marginal canal (E).

Canal rachidien (F).

٢٢٦٧٣ - قنقة فقرية

Rachidian canal (E).

هي القنقة التي يمر بها الفقار الرشدي .

٢٢٦٧٤ - قنادة

القنادة او القنيدة هي زهرة المرجان ، اطلبها .

Connarus (S).

٢٢٦٧٥ - قناركة *

Connaret (F). Connarus (E).

جنس نباتات جنينة ، بريمة ، معمرة ، من فصيلة القناريات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة || سوطها وفروعها شائكة . أوراقها متقابلة . أزهارها منعقة ، صغيرة ، جميلة الشكل ، يكثر فيها اللون الاصفر . ومنها انواع زرقاء الزهار او ليلكية .



قنار



قناسة

٢٢٦٧٧ - قُنْبَر - *Chênevis* (F). *Hemp-seed* (E).

هو بذر القنب ويصنع شلجان يأكله الطير ويستخرج منه زيت صناعي بنسبة تراوح من ٢٠ إلى ٢٤ ٪ كسبه يستعمل في تلييل التربة .

٢٢٦٧٨ - قُنْبَكَة - *Glumella* (F). *Glumella* (E).

القنبكة قنبية تحيط برؤس الثجليات وطليها بقش السفا وما قنبتان لكل زهرة من زهور السليفة .

٢٢٦٧٩ - قُنْبَل * - *Pavonia* (S).

Pavonie (F). *Scarlet mallow* (E). *Pavonia* (D). *Pavonia* (I).

جنس اشجار ونباتات برية وتربيتين من فصيلة الملبازيات. انواعه قليلة العدد، اعطائها البلاد الحارة، جميعها معمرة فراءه فنلاء. اوراقها ايلدة منتقة ، يضيئة او رخيصة النصل، عطرية العرف عند اللس . ازهارها لا قابلية التجميع والازتكاز، طويلة الزناد مخفلة الالوان . ثمارها رباعية الفلق . يزورها مزفة القشور || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٢٦٨٠ - قُنْبَل دَائِم الزَّهَر

Pavonia semperflorens (S). *Pavonia couljours fleurie* (F).

شجرة تربيتية فراءه تملو نحو عشرة امتار ، اوراقها سائبة الشكل ، نصلها جامدة الصلصة سنن الزام الاخير . ازهارها متدلية ، كبيرة القند ، عاصمة الكيم ، ناشرة الاسدية ، لونها الى الحمرة الفاتحة || ازهاره يستمر طوال السنة .

٢٢٦٨١ - قُنْبَل كبير الزَّهَر

Pavonia multiflora (S). *Pavonie multiflora* (F).

جنية تربيتية سرورية تملو من ٢٠ الى ٣٠٠ سم. ساقها فراءه فناء . اوراقها سائبة النصل ، عشائرية الحافة، طولها من ١٥ الى ٢٠ سم. وتبرس نحو ٦ سم. ازهارها محكونية التجميع ، تاجية الازتكاز ، ابروانية اللون و كيم ازهارها كثيف الورديات الصلصة الخلية || ازهاره يستمر طوال شهر ايلول .

٢٢٦٨٢ - قُنْبَل مَكْرَانَا - *Pavonia mackoyana* (S).

Pavonie de Mackoy (F).

جنية تربيتية سرورية تملو من ٦٠ الى ١٧٥ سم. ساقها خليطة فنراء . اوراقها كاملة مائسة سائبة النصل خلية المتق . ازهارها خسية التجميع ، تاجية الازتكاز ، قرمزية اللون . كيم ازهارها خامي الورديات القلبية الشكل. ازهاره يستمر من ايار الى آب .

٢٢٦٨٣ - قُنْبَل مُصَيَّر - *Pavonia speciosa* (S).

Pavonie spacieuse (F).

جنية تربيتية زاهة تملو نحو ٢٠٠ سم. ساقها فراءه فناء . اوراقها يضيئة الشكل ، قلبية الفاتحة؛ نصلها سنن الحافة ، مزغب الصفحة السفلى الثراء اللون . ازهارها يتجميس الفاخر حر الباطن . قطرها نحو ٥ سم. فصلها تعد من ٧ الى ٩ يكتسها كيم يحمل ذات العدد || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٢٦٨٤ - قُنْبِيَّات - *Cannabinaceae* (S).

Cannabinacées (F). *Cannabinaceae* (E).

منهم من جعلها فصيلة نباتية مستقلة وبهم من قال انها بسيط من فصيلة القرعيات || اشهر اجناسها القنب والجنبل .

٢٢٦٨٥ - قُنَيْط - هو التربيظ ، اطلبه .

Common hemp (E). *Echter Hanf*, *Riesenh Hanf* (D). *Canapa*, *Canspe* (I).

نبات عشبي حولي زراعي لبني صناعي من فصيلة القنليات. وهو نبات وحيد الجنس والنوع عديد الشروب اشهرها الهندي والجنبل . ساقه منصبة تملو من ١٥٠ الى ٣٥٠ سم. اوراقه كلية مركبة ومعتقة. السفل منها متقابلة والعليا متعاقبة . جميعها خاسية او سباجية الورديات الصلصة اللدبية . نصلها عشق المللس، ازغب الصفحة المتشارية الحافة . ازهاره ثنائية المسكن، للذكورية منها عقودية التجميع اما الانثوية فضمية || ثماره فقيرة متنوعة لكلى القنبر والشهدانج وهي مأكلة بعض المصافير ويستخرج منها زيت صناعي لا باس به ليقل نسيته نحو ٢٢ ٪ || يزرع القنب لاستخراج الاياب سواه التي تستعمل خاصة في صناعة الاكياس والجنبل .

٢٢٦٦٦ - قُنْب النَّعْنَاع هو البتولا المتعوية، اطلبه .

٢٢٦٦٧ - قُنْب جَبَّار

Cannabis sativa gigantea (S). *Chanvre géant* (F).

فرب من القنب منته الحد . ساقه فراءه تملو من ٣ الى ٥ امتار . فروها افقية فارشة مستطيلة تحمل قطر دوسة النبات اطول من ارتفاع || الاياب ساقه وفروها صناعية تستعمل في جدل حبال القنب .

٢٢٦٦٨ - قُنْب سِيَّام هو الرامي ، اطلبه .

٢٢٦٦٩ - قُنْب كَنْكَوَنَة هو الجوت ، اطلبه .

٢٢٦٧٠ - قُنْب مَيْتِيَا هو الابن ، اطلبه .

٢٢٦٧١ - قُنْب هندي * ، حشيشة الكيف

Cannabis sativa indica (S). *Chanvre indien*, *Hachisch* (F). *Indian hemp* (E). *Indischer Hanf* (D). *Canapa indica* (I).

فرب من القنب ساقه تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. يزرع لاستخراج ما تفرزه النباتات الاالي من مادة وراثسية تكثر في حناقيها الزهرية واوراقها الملها يصنع منها والحشيشه او « الحشيشة » او « الكيف » الذي يستعمل تخدينا فيفسد اعصاب مدمنيه ويهلك عقولهم || زراعته محظورة في لبنان .

٢٢٦٧٢ - قُنْبَر هو القبرية ، اطلبه .

٢٢٦٧٣ - قُنْبَرَة ، قُنْرَة ، كَشَة ، طُرَة

Huppe (F). *Crest* (E).

هي فضل ريش قائم . اطلب قنرَة .

٢٢٦٧٤ - قُنْبَرَة ، قُنْبَرَة هي القبرة ، راجبها .

٢٢٦٧٥ - قُنْبَرَة الماء *

Arenaria incarpres, *Strepelis incarpres* (S). *Tourne-pierre incarpré*, *T. vulgaire* (F).

طائر من طوائف القرطاع . صير القند طوله نحو ٢٢ سم. لونه ابيض اللون كثير البياض والازعازف المتداخلة المركبة من الاسود والاحمر || يأنف الشطوط البحرية ، قوته القشر يات واليدان يلتفتها بين الحصى . يدن انموصه في الكليات . حصفته تراوح من ٣ الى ٤ يبيضات .

٢٢٦٧٦ - قُنْبَرَو هو ابو متقار ، اطلبه .



قنب



قنب هندي



قنبر الماء



قنبل

أثوابها تراوح من السمرة الجلوية الى السمرة السوداء ،
جميعها سقاء الموج || تتبر من الحشرات النافعة لانها
والجدة تقضي حل الكثير من الدويبات الضارة .

٢٢٦٩٣ - قَنْع **Arquer (F). To band, To arch (E).**
قنع العيد : سلقه حتى يصير كالخبين .

٢٢٦٩٤ - قَنْدَاش **Candasc (S).**
Candace (F). Candacus (E).
جنس دويبات بحرية من القشريات مجذانيات الارجل
وفصيلة الكلنوسيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في
معظم بحار البلاد الاستوائية والحرارة والمعتدلة الحرارة .

٢٢٦٩٥ - قَنْدَق **Sucre candie (F).**
هي الابلوج ، اطليه .

٢٢٦٩٦ - قَنْدَكَا **Potologie (F). Potology (E).**
القدندة علم يبيث في المشروبات الروحية وفي تراكيبها .

٢٢٦٩٧ - قَنْدُر **Castor (F).**
هو الحارود ، اطليه .

٢٢٦٩٨ - قَنْدُرُوس **Chondrus (S).**
Chondra (F). Chondrus (E).
جنس نباتات بحرية من الخليات الحمر . انواعها المعروفة
نحو ٣٠ منتشرة في معظم بحار العالم || اعرف انواعها
واشهرها القندروس المنقبض **Chondrus crispus (S).**
Chondrus crispus (S). الذي يستعمل طبياً في معالجة بعض
الامراض الصدرية .

٢٢٦٩٩ - قَنْدُس **Loutre commune (F).**
هو القندوس ، حيوان من البرصويبات .

٢٢٧٠٠ - قَنْدُكِي **Aesculus (S).**
Marronnier (F). Horse-chestnut-tree (E).
جنس نباتات مسرة من فصيلة القندليات . انواعها نحو ١٥
جميعها اثمار وشجيرات ونباتات غارسة ، غضة ، حيلة
الشكل . اوراقها عابلة ، متقابلة ، منقطة ، مركبة ،
كفية خماسية او سباعية او تساعية الوريقات ، اثمارها
عقودية التجميع او علقية ، مديدة اللونان منها الاصفر
والنيري والوردي والاحمر || اشهر انواعها ما يلي :

٢٢٧٠١ - قَنْدُكِي حَنْزُوسِي **Aesculus turbinata (S).**
Marronnier à fruit turbiné (F).

شجرة دائمة غارسة مهددة اليابان تملو من ٢٠ الى ٣٠ م .
اوراقها خماسية او سباعية التركيب وريقاتها كبيرة القد ،
نصلها خلي الصفحة السفلى ، سنن الحافة . اثمارها كبيرة
القد ، لونها الى البياض الاخير تملو رقة حراء . ثمارها
اجاسية الشكل حلزونية ، قشرها مثاقلة شائكة ، لبها
حظلي اللون .

٢٢٧٠٢ - قَنْدُكِي مَبْدُول **Aesculus hippocastanum (S). Marronnier commun (F).**
Common horse-chestnut-tree (E).

شجرة مبدولة دائمة غارسة تملو من ٢٠ الى ٣٥ م .
خماسية او سباعية التركيب . وريقاتها لا متساوية الطول
والعرض ، نصلها حابق الحصار . اثمارها كبيرة القد لونها
الى البياض الناصع تملو رقة حراء او صفراء . ثمارها
كستنية الشكل والقد قشرها شائكة ، لبها اسمر .

٢٢٦٩٦ - قَنْبِيل * **وَرَس مَلَوَن**
Mallotus (S). Rottlère, Rottlérie (F). Kamala tree (E).
Kamalabaum (D). Kamala (I).
جنس شجيرات برية من فصيلة البتوسيات . منها المناطق
الاستوائية الايبوية . انواعها قليلة جميعها متوسطة القد .
يستخرج من ثمارها صباغ اخر قريدي مرغوب فيه .

٢٢٦٩٧ - قَنْب **Cime (F). Cyme, Summit (E).**
القنة : شمع يقع من رأس الجبل واصل ما يكون في
الشجرة . ج قن وقنان وقنات .

٢٢٦٩٨ - قَنْبَة مَبْدُولَة * **كَنْخ**
Ferula communis (S). Férule commun, Pameller, Grand fenouil (F). Giant fennel (E). Gemelnes Steckeukraut (D). Ferula comune, Ferola, Fregola (I).
نوع من الالندان وهو نبات عشبي بري معمر مبدول .
ساقه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه كثيرة التفرع
والغريض نصلها اخضر العليا بحري السفلى .
جلودها قليلة يستخرج منها بعض العناصر الطبية الصحية
النافعة . ويستخرج من سوقه صمغ يدعى الحلتيت لكنه دون
الحلتيت الاصل خواصاً ونفعاً .

٢٢٦٩٩ - قَنْبَة مَهْجُونَة * **بَزْدَد ، قَنْسَا وَتَقِي**
Ferula ferulago, F. galbanifera (S).

Férule bitarde, Galbanum (F). Galbanum plant (E). Galbanpflanze, Galbenkraut (D). Galbano (I).
نوع من الالندان وهو نبات عشبي طيب برى معمر .
ساقه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . تستخرج من ساقه
مسامة صفمية لزجة تدعى البازد وتشارش وتعرف عند
الطيارين بالزق تستعمل في الاعراض الصدرية وخلجانها
وهي مضادة للتشنج .

٢٢٦٩٠ - قَنْسَر * **قَنْسَل الحَيْتَان**

Cyamis (S). Cyame, Cyamide (F). Cyamis (E).
جنس دويبات بحرية من القشريات العليا وفصيلة
القشريات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها طافية
تقتب في جلود الحيتان وفي طيات رؤوسها وثنايا زانافها ||
اجسامها متباينة الاحجام يذلب فيها الصفر ، جميعها
مسطحة . قوائمها الصدرية خماسية الازواج ، نشطة ،
تنتهي بمخاط ذرية . قرونها الاستشعارية ثلاثية الفصل .
لواصها رباعية الازواج متفاوتة الطول ، شبه انبوية
الشكل . اثوابها الى الشبه او الشقعة .

٢٢٦٩١ - قَنْسَرِيَّات **Cyamidae (S).**
Cyamidés (F). Cyamidæ (E).

فصيلة دويبات بحرية من القشريات العليا مزدوجات
الاربجل . اجسامها وانواعها المعروفة قليلة العدد . جميعها
طافية تركب الحيتان || تتميز باجسامها المبططة
وبلواصها او قوائمها المتفاوتة الطول والحجم . قوائمها
الصدرية مجهزة بمخاط محببة ذرية || اشهر اجناسها
القنسر .

٢٢٦٩٢ - قَنْسُجُول * **Abacetis (S).**

Abacete, Astigis (F). Abacetis (E).
جنس حشرات من فصيلة السلكوتيات ورثة ممدعات
الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٤٠ اعطائها بعض مناطق
البلاد الحارة من العالم القديم اعضها افرقية الثاللية
وبعض الانواع يعيش في الشرق الاذن وفي ادوية الجنوبية ||



قنبيل



قنة مبدولة



قنة مهجونة



قنر



قنسرل



قندروس



فندلي ميلول

٢٢٧١٠ - **فَنْزَعُ** * ، **مِفْخَال** *Machetas* (S).
Combatant (F). *Ruff* (E).
 طائر وسيد الجلس والنوع من عمارة الطوليات، وعضلة
 دجاجيات الأرض. طوله نحو ٣٠ سم. يسلطه من ٦٠
 إلى ٧٠ سم. ثوبه إلى الصهبة الرمادية، تعلوها رقعة حنطية
 يحرقها إطار أبيض. الذكر قشري الرأس مطوق المنق،
 فوطه مستطيل الريش يتصبب عند القتال والبارزة.
 مبارزة الذكور تدوم نحو ثمانية أسابيع تبتدئ مع زين
 الصفاد وتستمر حتى نهاية الخريف || الآن تبيض نحو زين
 بيضات تحضنها من ١٧ إلى ١٩ يوما. تثنى مشها في
 المنافع بين الاشباق || قوته الخشرات والديدان والرخويات.



فندوس

٢٢٧١١ - **فَنْزَعُ** * ، **فَنْزَعُ** *Astragale* (F). *Astragalus* (E).
 هي رصع القدم وعلف الكلب .

٢٢٧١٢ - **فَنْزَعُ** * ، **فَنْزَعُ** * ، **فَنْزَعُ** *Algetta*
 ريش قائم مجتمع على رأس بعض الطيور .

٢٢٧١٣ - **فَنْس** * *Norme* (F). *Norm* (E).
 القنس ج قنوس . مبدأ يتخذ كقاعدة ، أو غلط قياس
 يتخذ كقاعدة .

٢٢٧١٤ - **فَنْس** * *Aunée* (F).
 جلس لبالات عشية بيرة معمرة مشهورة باسم رائق ،
 اطلبا .



فندول

٢٢٧١٥ - **فَنْسِيْطُ أَبْيَسْ** *Aesculus parviflora*, *Pavia alba* (S). *Pavie blanc* (F).
 جنبة زرقية غضة من فصيلة الفندليات تملو من متر
 إلى خمسة أمتار . اوراقها خالصة التركيب ، وورقاتها
 تطول نحو ١٩ سم . ويغرس ٧ سم . فصلها بحري اللون ، على
 الصفعة السفلى . ازهارها سنبلية تتجمع لونها إلى البياض
 الاخير . ثمارها كستنية الشكل ولقده مالة القشور .



فنزاع

٢٢٧١٦ - **فَنْسِيْطُ أَحْمَرُ** *Aesculus pavia*, *Pavia rubra* (S). *Pavie rouge* (F).
 شجرة زرقية سبروتية من فصيلة الفندليات تملو من مترين
 إلى ستة أمتار . اوراقها خالصة التركيب . وورقاتها
 سنائية ، مسنة الحافة . فصلها جامد الصفعة يطول نحو
 ١٥ سم . ويغرس ٦ سم . ازهارها متفوية تتجمع ، بتلاتها
 حراء اللون ، مهدبة الاطراف . ثمارها كستنية صندرة
 مالة القشور .

٢٢٧١٧ - **فَنْسِيْطُ أَصْفَرُ** *Aesculus octandra*, *Pavia lutes* (S). *Pavie jaune* (F).
 شجرة كبيرة دائمة من فصيلة الفندليات تملو من ٢٠ إلى ٢٥
 م . اوراقها خالصة التركيب . وورقاتها سنائية داكنة
 فصلها ازغب الصفعة السفلى ، مسنة الحافة . ازهارها
 متفوية تتجمع ، بتلاتها مهدبة ، صفراء اللون . ثمارها
 كستنية الشكل كبيرة اللد مالة القشور .

٢٢٧١٨ - **فَنْسُوس** *Ciste ladanifère* (F).
 هو اللادن الإسباني ، اطلبا .

٢٢٧١٩ - **فَنْشِيلُ** * ، **لَرْهُولُ** *Tragus* (S).
Tragus (F). *Tragus* (E).
 جنس حيوانات لبونة بجرة . انواعها خمسة جميعها صندرة
 اللد ، وشيقة القروام ، فيها من الايل والماعز والارانب .
 طولها من ٥٠ إلى ٧٠ سم . علوها من ٢٥ إلى ٣٢ سم .



فنديل

٢٢٧١٩ - **فَنْدَلِكِيْ هِنْدِيْ** *Aesculus indica* (S).
Marronnier de l'Indus (F). *Indian horse-chestnut* (E).

شجرة هرمية الشكل مملها الممتلئ تملو من ٢٠ إلى ٢٥ م .
 اوراقها لايامية التركيب منها الخالصة والسباعية
 والسباعية . وورقاتها مستطيلة ، فصلها جامد الصفعة ،
 مسنة الحافة . ازهارها كبيرة اللد . عناقبها هرمية الشكل ،
 تطول نحو ٥ سم . بتلاتها لا متساوية اللد لونها إلى الازرق
 المرقوش بالاصفر او الورد . ثمارها زرقية ، قشورها
 لؤلؤية صامدة الشوك .

٢٢٧٢٠ - **فَنْدُكِيَات** *Aesculaceae*, *Hippocastanaceae* (S). *Aesculacées*,
Hippocastanacées (F). *Aesculaceae*, *Hippocastanaceae* (E).

فصيلة نباتية وسيدة الجلس ، عديدة الانواع . نباتاتها
 اشجار وشجيرات ونبات برية وزرقية . اوراقها مركبة
 متعاقبة . ازهارها غشوية خالصة التركيب والاقسام ، صافية
 الالدية ، متفوية تتجمع او علقية او سبلية .

٢٢٧٢٥ - **فَنْدُوسُ** * *Coedus* (S).
Coedous, *Synchère*, *Orico*, *Couly* (F).

جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الشحميات ، انواعها
 ١٣ موطنها امريكا الجنوبية || اجسامها غضة مستطيلة
 براوح طولها من ٥٠ إلى ٧٠ سم . واذاها من ٢٥ إلى ٥٠ سم .
 رؤوسها غليظة . مقاضها قصيرة مقلية .
 عناقبها حريضة . حيوها واذاها صغيرة . جرامزها متدلة
 اللد . اظفارها قوية صادة . اذاها طويلة اعادة . شمرها
 هليبي هندي غزاز يتخلله شوك قصير كالسائل تنفضه لفتح
 عن النفس فينلده ويطلب حيث يفرز || تألف القنابات
 والاحراج . تسرح في الليل . تتسلق الاشجار وتستن
 بالذليل للانتقال من ضمن الى ضمن || قوتها القمار
 والزيمات والاوراق والازهار والجذور ولباء الاشجار .

٢٢٧٢٦ - **فَنْدُولِيْ** * ، **دَارُ شَيْشَعَانْ** ، **عُودُ البَرْقِ** *Spartium spinosum*, *Cytisus spinosus*, *Calycotome*
spinosa (S). *Cytise épineux*, *Genêt épineux*, *Caly-*
cotome épineux, *Aspalot* (F). *Spiny broom*, *Spiny*
cytisus (E). *Stacheliger Ginster* (D). *Citiso spinoso* (I).

جنبة برية معمرة شالكة من فصيلة القريزيات . اوراقها
 صندرة مركبة . ازهارها صفراء اللون عطرة . يكثر وجودها
 في وعر الجبال اللبنانية السورية .

٢٢٧٢٧ - **فَنْدِيلُ يَدُ** ، **بَذَاقُ** *Eau-de-vie* (F).
Brandy (E).

سائل كحول يحصل من تقطير الثآليل بعد تقصيرها وهو
 يحمر من الكحول ما يراوح حياره من ٤٥ إلى ٨٥ درجة
 مئوية وهذا القارق الشاسع بالنسبة يهود الى نوع المشروب
 وما يقتضيه من حيار خفيف او متوسط او ثقيل .

٢٢٧٢٨ - **فَنْدِيلُ يَدِيْ** * *Potologique* (F).
Potological (E).

نعت تمريني يطلق على كل ما له صلة مباشرة بالقدرة .

٢٢٧٢٩ - **فَنْدِيلُ الْبَحْرِ** *Cryssore* (F).
Sea nettle (E).
 نوع من المنوس ، يكثر في البحر الاحمر وعلى جرف شواطئ
 المتوسط . راجع مدوس .

٢٢٧٢٥ - قَنْصُور صَغِير الْوَرَق

Colutea halepica, C. *istria* (S). *Baguenaudier microphylla* (F).

جنية برية سربوتية مهددة الشرق الاوسط ويكثر ويجودها من حلب الى سيناء. تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. وريقاتها دقيقة تمد من ٩ الى ١٣ نصلها يطول نحو ١٠ سم. وهو يجري اللون ابيض الصفحة السفلى. ازهارها رقتالية كبيرة اللد. سفاتها صغيرة جرابية مطيعة. ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

٢٢٧٢٦ - قَنْطَار

Quintal (F). القنطار العربي العالمي وزن مئة رطل اي الف وبنو اوقية او ما يماثلها من الوزن المتري وقدره ٢٥٦ كيلو. اما القنطار المتري فوزنه ١٠٠ كيلوغرام.

٢٢٧٢٧ - قَنْطَر

Goura couronné (F). هو اللبني المتريج، الحلبه.

٢٢٧٢٨ - قَنْطَرُون ، قَنْطَارُون

Centaurea (S). *Centauree* (F). *Centaury* (E).

جلس نباتات عشبية غشوشية من فصيلة المركبات. انواعه زهاء ٤٠٠ منها الحولية والمحلوة والمصرمة معظمها بري وبعضها زينة. اوراقها متعاقبة لا نظامية. قناياتها لا قياسية. ازهارها رؤسية. بزورها عادمة الاخرة مختلفة الاشكال والاحجام || احرف انواعه واشهرها ما يلي :

٢٢٧٢٩ - قَنْطَرُونِ اسْمَر * ، وَاَسِ الدَّوْرِي

Centaurea jacea (S). *Centauree jacee*, *Jacée des prés*, *Chevalon*, *Malon*, *Tête de moineau* (F). *Black century*, *Brown rayed*, *Knapweed* (E). *Weissenfloekenblume* (D). *Glacée*, *G. dei prati*, *Erba della ferita* (I).

نوع من القنطريون البري الحمر. ساهه زياه فرهاد تملو من ٣٠ الى ٨٠ سم. رؤسياته الزهرية عديدة، صغيرة اللد ليلكية اللون ، قناياتها الى السرة || يكثر في المراعي والزرور فيصبح من النباتات الضارة || جطره غليظة غزيرة المادة الطبية التي تستعمل في علاجات امراض الفم والحلقوم.

٢٢٧٣٠ - قَنْطَرُونِ الْقَفَاس

Centaurea depressa (S). *Bleuet du Caucase* (F). عشبة سربوتية حولية زيبينة ساقها مرهنة منتصبه تملو من ٤٠ الى ٥٠ سم. اوراقها امليلية الشكل خلية البهشة. رؤسياتها الزهرية عادمة العرف لونها الى الزرقه الزاويه تتصلها الحمره ، قناياتها مالهه الصفحة ، مهدبه الحنار. اهدابها فضية || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

٢٢٧٣١ - قَنْطَرُونِ امْرِيكي

Centaurea americana (S). *Centauree américaine* (F). عشبة زيبينة سربوتية حولية. ساقها مرهنة منتصبه قليلة الفروع تملو من ٦٠ الى ١٨٠ سم. اوراقها سنانية النصل مسننة قليله من ٥ الى ١٣ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٥ سم. رؤسياتها الزهرية فردية التجميع عادمة العرف قطرها يراوح من ٥ الى ١٠ سم. لونها الى الزرقه او الحمره. قناياتها مهدبه الحنار || ازهارها يستمر من زيار الى آب.

٢٢٧٣٢ - قَنْطَرُونِ بَابِل

Centaurea babylonica (S). *Centauree de Babylone* (F). عشبة زيبينة سربوتية محله. ساقها مجنحة تملو من ٢٠٠

رؤوسها مستطيله جهه. اذانها قصيرة عريضة منتصبه. قناياتها دقيقه. اغلافها اربعة. اذانها مرتفعه كالذئاب للامز. سفيها خل نام للمسس. اثوابها الى الصبغة الخفيفة المشعة والمواج || مهدا فصح الاجزاء يمد من سرتديب والهند الى الصين. تألف الثبايت امليلية الرطبة قوتها الاشباب. تمشي جامعات قليلة المدد. إجلها يتألف من ٤ او ٥ اثاث يقودها ذكر واحد.

٢٢٧٣٠ - قَنْصُور * ، قَنْتَر

Colutea (S). *Baguenaudier*, *Colutea*, *Faux séné* (F). *Bladder-senna tree* (E). *Baumartiger blasenstrauch*, *Gewöhnlicher blasenstrauch* (D). *Colutea*, *Cantamaggio*, *Saluno*, *Sena falsa* (I).

جلس نباتات برية طيبة معمرة من فصيلة القرقيات القرشيه. انواعه عديدة، جميعها جنبايت صغيرة أو متوسطة اللد. اوراقها متعاقبة مركبة تشبه اوراق السن. ازهارها عقودية التجميع و محورية الاينكاز، صفراء اللون. ثمارها سننات منتصبة ثنائية الشكل || احرف انواعه واشهرها ما يلي.

٢٢٧٣١ - قَنْصُور اسود الكيم

Colutea melanocalyx (S). *Baguenaudier à calice noir* (F).

جنية سربوتية مبلولة تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها مركبة كبيرة وثرية المدد مؤلفة من ٩ او ١١ وريقة بيضيه الشكل، نصلها خل الصفحة السفلى. ازهارها صفراء اللون صغيرة اللد قطرها نحو ٢ سم. اكادها زياه البهشة زفها اسود اللون. سفاتها متوسطة اللد تطول نحو ٦ سم. وتعرض نحو ٣ || ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

٢٢٧٣٢ - قَنْصُورِ الشَّرْقِي

Colutea orientalis (S). *قَنْصُورِ الشَّرْقِي* (F). *Baguenaudier d'Orient* (F). جنية سربوتية مبلولة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها سباعية أو تساعية الوريقات. نصلها بيضيه الشكل، يجري اللون يطول من ١٠ الى ١٥ سم. وتعرض من ٧ الى ١١. ازهارها الى الجلاوة يطولها تجميع اصفر. سفاتها تطول نحو ٤ سم. لونها الى الخضار المشع بالبنفسجي. ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

٢٢٧٣٣ - قَنْصُورِ الحَمَم

Colutea persica (S). *قَنْصُورِ الحَمَم* (F). *Baguenaudier de Perse* (F). جنية سربوتية تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. وريقاتها صغيرة اللد ، عادمة العرف ، خلية الصفحة السفلى. ازهارها الى الصفرة الزاوية يطولها تجميع اسمر. سفاتها متوسطة اللد مشلقة الطرف || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٢٧٣٤ - قَنْصُورِ شَالِك

Colutea arborescens (S). *Baguenaudier commun*, *Arbre à vessies*, *Balandier* (F).

جنية سربوتية مبلولة تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها وثرية الترتيب مركبة من ٧ الى ٩ وريقة امليلية الشكل تطول من ٢٠ الى ٤٠ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٥. نصلها يجري الصفحة السفلى متلائق معروق. ازهارها الى الصفرة البرتقالية. سفاتها متلية مطيعة تطول نحو ٨ سم. وتعرض نحو ٣ || ازهارها يستمر من ايار الى تموز.



قَنْصُور



قَنْطَرُونِ اسْمَر

Blue-bottle, Corn-flower (E). Kornblume, Kornflockenblume (D). Clano, Battesegola, Fioraliso, Fioralino (I).

عشبة سرولية حولية برية طيبة وتزيينية. ساقها منتصبة فروعها زبده تملو من ٣٠ إلى ٩٠ سم. أوراقها الجذعية خضراء. ورؤسها الزهرية زرقاء اللون عديمة البرق. قناباتها عناكية تتصلل سمر الحقل || كانوا يمترونه نفاً مضي من اتفق عجلجات البين والبصر. انزهاره يستمر من أيار إلى أيلول.



قَطْرُونٌ صَغير

Centaurea fenzli (S). قَطْرُونٌ قَنْزَل (F).
Centaurea de Fenzl (F).

عشبة تزيينية سرولية معولة. ساقها قليلة الفروع تملو من ٨٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقها بيضيه الشكل، قليلة القاطعة، مجتمعة المتق، ورؤسها الزهرية فردية التجميع، كبيرة اللقد، صفراء اللون، عديمة البرق. قناباتها إلى الأبيض الناصع || انزهاره يستمر طوال الصيف.

٢٢٧٤٠ - قَطْرُونٌ قَيْجَمِي الرَّقِي

Centaurea rutaeifolia (S). Centauree à feuilles de rue (F).

بجلة برية وتزيينية معمرة. ساقها فروع منتصبة تملو نحو ٩٠ سم. أوراقها كبيرة اللقد فيجبت الشكل بالغة التفريغ. ورؤسها الزهرية كثيرة العدد صغيرة اللقد وديدة اللون. قناباتها مهدبة الخطار. احداها سود قاسية || انزهاره يستمر طوال فصل الصيف.



قَطْرُونٌ عَبري

٢٢٧٤١ - قَطْرُونٌ قَصِيرُ السَّاقِ

Centaurea scutell (S). Centauree scutell (F).
Centaurea (F). Flockenblume (D). Centaurea (I).

نوع من القَطْرُونِ البري وهو نجمة جندة الساق القرملة تملو من ١٠ إلى ٢٠ سم. أوراقها قرصية طرقة الارتكاز، صغيرة اللقد، سنائية تتصلل الحقل البثرة. ورؤسها الزهرية فردية، زرقاء اللون، قناباتها حطية || يكثر في المراعي والبرر يقال أن صفراء جلوره نافعة تنبه المعدة وتنشط الدم.



قَطْرُونٌ كَبر

٢٢٧٤٢ - قَطْرُونٌ كَبِيرٌ * عَرُطَب

Centaurea centaurium (S). Centauree officinale, C. commune, Grande centauree (F). Great centaury (E). Grosse Flockenblume, Tausendgüldenkraut (D). Centaurea maggiore, C. comune, Fiele di terra (I).

نوع من القَطْرُونِ الطبي البري الممرس. ساقه فروع تملو من ٨٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقها كبيرة سنائية سفتة. ورؤسها الزهرية عديدة خضطة اللقد زرقاء اللون || يكثر في الأراضي الجبلية المنخفضة. جلوره حطرية، حارة الطعم، مرة اللذاق، عديدة الفلوات الصمغية المغوية المنبهة المعدة الأثر الرجي.

٢٢٧٤٣ - قَطْرُونٌ سِكِّي

Centaurea moschata (S). Centauree ambrette, Ambrette, Barbeu musqué (F).

نبات تزييني سرولي حولي. فروجه وأصفره عديدة. ساقه فروع تملو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقها سنائية الشكل صغيرة اللقد. ورؤسها الزهرية ذكية البرق النطري، كبيرة اللقد، عديمة اللؤلؤ التي تختلف مع للصبوب والأصرام || انزهاره يستمر من حزيران إلى تشرين الأول.

إلى ٣٠٠ سم. أوراقها الجذعية منقطة رجمية. تصلها جامد الصفحة. أوراقها العليا رباعية صغيرة اللقد عناكية الصفحة السفلى، ورؤسها الزهرية كثيرة العدد، كبريتية اللون، عديمة البرق. قناباتها نخيلة مهدبة بالاسمر || انزهارها يستمر من تموز إلى أيلول.

٢٢٧٤٤ - قَطْرُونٌ بَهْمَن * بَهْمَنُ أَيْفَس

Centaurea behen (S). Centauree blanche, Béhen blanc, Rhapsodic blanc (F). White behen, White rhapsodic (E). Weiss Behen (D). Behen bianco (I).

عشبة حولية برية طيبة تكثر في الحقل وفي الأراضي المنحاة. ساقها زبده منتصبة فروعها تملو نحو ٧٠ سم. أوراقها مزغرة البثرة على صفحتها، زغبها لبد التجميع أبيض اللون. رؤسها الزهرية قرصية اللون صفر الملاج. قناباتها خضيفة مستطيلة، عديدة الملاحق || يقال أن فوائده الصحية جليلة أعصها التنشيط لانه مغر ناض وقد يستعمل في التوابل.

٢٢٧٤٥ - قَطْرُونٌ دَلْمَاسِي

Centaurea ragusis (S). Centauree de Dalmatie (F).

بجلة تزيينية معمرة. ساقها منتصبة سرقة عديمة الفروع تملو من ٥٠ إلى ٧٠ سم. أوراقها ريشية فضية اللون. رؤسها الزهرية قليلة العدد ملحية اللون سمر الملاج. قناباتها بيضيه الشكل ماله الصفحة مهدبة الاطراف. انزهارها يستمر من حزيران إلى تموز.

٢٢٧٤٦ - قَطْرُونٌ رَيْشِي

Centaurea phrygia (S). Centauree plumose (F).

بجلة تزيينية معمرة ساقها تملو نحو ٧٥ سم. أوراقها أهليجية تتصلل، حارة منشاري التسنين. رؤسها الزهرية صغيرة اللقد قطرها نحو ٣ سم. نفاً إلى الحمرة البنفسجية المراج، قناباتها ريشية التفريغ، حطية اللون، سود الملاحق || انزهارها يستمر من تموز إلى آب.

٢٢٧٤٧ - قَطْرُونٌ شَرُوبِي

Centaurea cineraria (S). Centauree cinénaire (F).

جندة سرولية تزيينية معمرة صروباً وأصفرها عديدة. ساقها فروع تملو من ٩٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقها كثيرة التفريغ والتفريغ، خلية البثرة، فضية اللون. رؤسها الزهرية حطية وسطية العدد والحجم لوناً إلى الصفار المذهب. قناباتها حطية اللون والحداد المذهب || انزهارها يستمر من تموز إلى آب.

٢٢٧٤٨ - قَطْرُونٌ صَبَرِي * هَرَاةُ الْحَشَشِ

Erythraea centaurium, Chirona centaurium, Gentiana centaurium (S). Erythraea centaurée, Petite centauree, Herbe à la fièvre (F). Earth-gall, Feverwort (E). Echtes Tausendgüldenkraut (D). Centaurea minore, Biondella, Caccia-febbre (I).

نبات عشبي طبي ممر من فصيلة الجلبليات. يكثر في البرر. ساقه قصيرة فروع تملو من ١٠ إلى ٣٠ سم. أوراقها لاطئة متقاطعة رجمية تتصلل. انزهاره عنكورية التجميع عديمة الارتكاز وديدة اللون || يستعمل في الطب لملاج بعض الحلمات ولطرد الديدان المعوية.

٢٢٧٤٩ - قَطْرُونٌ عَبْرِي * لُرُنْشَاه

Centaurea cyanus (S). Bleuet, Bluet, Aubifoin, Barbeu bleu, Casse-lunettes (F). Bachelor button,

٢٢٧٤٤ - قَنْطَرُونٌ مُعَمَّرٌ *

Pycho (S).

Pycho (F). Pytho (E).

جنس حشرات من فصيلة القنطريانيات ورتبة غديات الاجنحة . انواعها المرفوعة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق الصنوبريات || اجسامها مستطيلة الشكل ، مبططة ، تطلو من ٨ الى ١٠ م . رؤوسها معتدلة الجرم . عينها بارزة . تكثيرها وبلاستها ضليمة . قرونها الاستشعارية غويطة . كواسلها محصورة . احمادها لاسفة . قواها نشيطة . اوائها ملونة يكثر فيها البنفسجي الاسود المواج || يكثر وجودها تحت لحاء السرو والشرين حيث تخفي فصل الشتاء .

Centaurea montana (S). Centaurée vivace, Bleuet vivace, Barbeau vivace (F).

نبات لبني ترابي صمر شكل . ضروب و اسرامه عديدة ساقه فراء زيا ، تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقه سنائية ، نصلها سرج الصلصة العليا عناكيه السلسل . رؤسياته الزهرية كبيرة القند ، حايفة الزرق . قناياتها سود الالهاب || انزهاره يستمر من ايار الى آب .

٢٢٧٤٥ - قَنْطَرُونٌ تَجْمِي * و حَرَكَ

Centaurea calcitrapa, C. stellata (S). Centaurea étoilée, Chausse-trape, Chardon étoilé (F). Caltrop, Mouse-thorn, Star thistle (E). Calcirops, Sternflockenblume (D). Calcatrappa, Calcatrappola, Cardo stellato (I).

حبة برية محولة تكثر في البرر والمراعي وعلى حافة الطرقات ، جلوسها مأكولة نافعة طعمها كطعم الارضي شوكي .

٢٢٧٤٦ - قَنْطَرُونٌ وَحِيدُ الزَهْرَةِ

Centaurea uniflora (S). Centaurée uniflora (F). جملة برية ورتبية مسمرة . ساقها فردية زيا تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقها حاضرة سنائية الشكل ، مستديرة التقاعدة ، ثنائية الاذنيات . رؤسيتها الزهرية وحيدة قطرا نحو ٣ م . لها الى الحرة القروية . قناياتها مرفوعة حنطية اللون || انزهاره يستمر من محز الى آب .

٢٢٧٤٧ - قَنْطَرُونِيَّة

Centaureide (F).

جنس نباتات برية ورتبية من المركبات تدعى قنطورة ، اطلبا .

٢٢٧٤٨ - قَنْطَرُوكَة *

Cantua (S).

Cantua, Bronnie (F).

٢٢٧٤٩ - قَنْطَرُوكَة اِحْصَايِيَّةُ الْوَرَقِ *

Cantua pyrifolia (S).

Cantua à feuilles de poirier (F).

نوع من القنطورة تزود قنزين . ساقها كثيرة القروع المنتصبه ، تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقها كاوراق الاجاص . نصلها جملة اخضر الاسفر المواج . انزهارها عتيق التجميع اليب . انزهارها معتقة ، يضاء اللون ، صفراء المواج . عصبة التريجات مستطيلة الاسدية البالغة التثوز || تنويرها يستمر من آذار الى حزيران .

٢٢٧٥٠ - قَنْطَرُوكَة بَقْسِيَّةُ الْوَرَقِ *

Cantua buxifolia (S). Cantua à feuilles de buis (F).

نوع من القنطورة ، تزود قنزين . ساقها فراء تملو من ١٢ مترين . اوراقها كاوراق البقس . نصلها جملة اخضر الاسفر . انزهارها عتيق التجميع . انزهارها معتقة معتدلة حراء اللون ، صفراء التريج تطلو نحو ٦ م . || تنويرها يستمر طولا شهر نيسان .



قَنْطَرُونٌ مُعَمَّرٌ



قَنْطَرُونٌ تَجْمِي



قَنْطَرُونٌ

٢٢٧٥١ - قَنْطَرُوت *

Pythidee (S).

Pythides (F). Pythidae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المرفوعة قليلة العدد منتشرة في بعض حراج البلاد الباردة والمتدلة الحارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، مبططة ، تطلو من ٨ الى ١٠ م . رؤوسها معتدلة الجرم . عينها بارزة . تكثيرها وبلاستها ضليمة . قرونها الاستشعارية غويطة مركبة من ١١ فصلة . كواسلها محصورة . احمادها لاسفة . قواها نشيطة . اراسها لحاسية العقل باستثناء الزوج الخلفي الرباعي العقل . اوائها ملونة || تعيش تحت لحاء الصنوبريات اخصها السرو والشرين || اشهر اجناسها القنطروت .

٢٢٧٥٢ - قَنْطَرُوكَة ، قَنْطَرُونِيَّة

Centaureidum (S). Centauride, Xanthisme (F). Centauridum (E).

الاسم العلمي من اليوناني بمعنى شبيه بالقنطرون . جنس نباتات حولية ومحولة . برية وزراعية تزيينية من فصيلة المركبات الشاعية . منبتها بعض اصقاع امريكا الشمالية . ضروبها التزيينية شائعة الاستعمال الحدائقى || ساقها غفاية ، فراء . اوراقها متعاقبة ، ضيقة النصال . انزهارها طرفي الاذنكان . انزهارها شاعية ، فردية ، كبيرة القند ، بنفسجية اللون او صمنجنوية . عطرية العرف المحمود .

٢٢٧٥٣ - قَنْطَرُوس

le Centaure (F).

the Centaur (E).

كوكبة نجوم جنوبية الموضع مركزها تحت برج الدرة . وهي تمثل صورة حيوان خرافي مقدم انسان من رأس الى آخر ظهره . اما مؤخره ، من منشأ الظهر الى الذنب ، فؤخر فرس . ويجه الى المشرق وذنبه الى المغرب . ويده شراخان وقد قبض بيده الاخرى على يد السبع || عدد نجومها ٣٧ بعضها من المرتبة الاولى والثانية والثالثة . والمرب تسمى النير الذي على بطن قنطروس « بطن » . والنير الذي على حافر يده اليسى « حصار » . والنير الذي على يده الاخرى « الون » . والحصار والون هما اللذان يسميان « الخليلين » .

٢٢٧٥٤ - قَنْطَرُسِيَّات *

Xanthusidae (S).

Xanthusidés (F). Xanthusidae (E).

فصيلة حيوانات زساق من رتبة النطاقيات قابيات الانسان . اجناسها المرفوعة ثلاثة وانواعها خمسة . موطنها بعض مناطق امريكا الوسطى وكليفورنيا || اجسامها تطلو من ٨ الى ٢٥ م . رؤوسها شبه حرملة الشكل . اسنانها صغيرة كثيرة

البند. ألتها قصيرة منها المائلة ومنها المستقيمة. عورتها صغيرة، عرجائها لامتحركة. قوائمها متدلة الطول. رؤوسها وبطنها حرشية القشار. ظهورها مغطاة. أنثاها إلى الركة السراء.

٢٢٧٥٦ - قُتْعَاب العظيم من الوريل.

٢٢٧٥٧ - قُتْعَالَة شُكْرَاء

(F). *Physocaphala rufes* (S). *Physocaphala rous* (F). حشرة من فصيلة القنصيات. جسمها متوسط القد، يطول من ٨ إلى ١٢ سم. رأسها مستطير، أصفر اللون. جبينها وعرجاها مغطاة بالأسود. عظمها معتدل القد. عيناها كبيرتان، مرجانيتان. زباناها مستطيلان، أصفران. رؤسها مستطيلان، ضيقان، تملؤها مشعة صناعية في الشطر الأمامي. صدرها قدسي الشكل، أصفر اللون، حشلي الموج. بطنها قطني الشكل، أشعث اللون، مغطى بالأسود. قوائمها على الشفة السراء. قوتها المفتر ترشفه من أزهار فصيلة المركبات. تمتع الأنثى مكها حل بطون اللتان والقنصان فيقتف من يرقات تقف بطون الموائ وتدخلها وتعيش فيها حتى الأكامل.

٢٢٧٥٨ - قُتْعَاك *

(F). *Tragelaphus gratus* (S). *Tragelaphus des maris* (F). نوع من الجبل كبير الجلة قنرة قدر القنص لكنه أصغر قرنا وأصغر لوباً وأصغر أعلاماً. يتميز باستطالة وأوسع أطرافه التي تحول دون غوصه في أمال وريال المتناحس. مدونه فسح الأرياء بمنع من الكابرون إلى الثابون. يعيش قرب الماء يرتاد المتناح في الليل وألأار.

٢٢٧٥٩ - قُتْعَاك

(F). *Regard* (F). *Look* (E). الكوة في الحائط.

٢٢٧٦٠ - قُتْعَاك مَذْهَبَة *

(F). *Conops flavipes* (S). *Conops doré* (F). حشرة من فصيلة القنصيات. جسمها متوسط القد، يطول نحو ١٠ سم. رأسها كبير، شبه هرمي الشوزن، ملهب اللون، يطو في النافوخ والجبهة زركشة سوداء. عظمها معتدل الحجم، مرتقي الشكل. عيناها كبيرتان، مستقيتان. زباناها مستطيلان، أشعثان. رؤسها مستطيلان، ضيقان، تملؤها مشعة صناعية في الشطر الأمامي. صدرها قدسي الشكل، تملؤها نقطتان حاديتان الأركان. ذنبها اللون مطوق ضيق مغيب. بطنها إلى الجلوة الرصاصية الموج تملؤها ثلاثة أطواق ذهبية الخضاب. قوائمها إلى الشفة. أشعثها مطوقة الأطراف بالأسود. تمتع الأنثى مكها حل بطون اللتان والعداس والزابور فيقتف المكان من يرقات تقف بطون الموائ وتدخلها وتعيش فيها حتى الأكامل.

٢٢٧٦١ - قُتْعَاك مَرْزُوكَة *

(F). *Conops quadrifasciatus* (S). *Conops bandé* (F). حشرة من فصيلة القنصيات. جسمها يطول نحو ١٢ سم. رأسها كبير، شبه هرمي الشوزن، أصفر اللون أسود الجبهة. عظمها مرتقي مستطيل. عيناها كبيرتان مستقيتان. زباناها مستطيلان أصفران. رؤسها ضيقان. صدرها قدسي الشكل، حديدي اللون، يطو زيوجان من القنص الأصفر والبني. بطنها إلى الصفرة الصناعية الموج تملؤها أربعة أطواق سود. قوائمها إلى

السرة المايقة. قوتها رقيق الأزار. الأنثى أكبر قدًا من الذكر. تمتع المكان حل بطون الزنابير والجنادب.

٢٢٧٦٢ - قُتْعِيَّات *

(S). *Conopidae* (F). *Conopidae* (E). فصيلة حشرات من ذوات الأجناسين. أجناسها وأنواعها عديدة منتشرة في معظم أقطار العالم. جميعها مقترية. قوتها رقيق الأزار. أجناسها ضبابية الجسم، تطول من ٣ م إلى ٣٠ م. رؤوسها مغطاة، نافرة الأوتاف. أعطامها مرتقية. عورتها كبيرة. قوتها الاستعمارية لاقية الطول وعدد الفصل. رؤسها مستطيلة، ضيقة. صدرها معتدلة. بطنها مستطيلة. أجناسها مريالة أو حلقة القشار، حلها شديد الفقة والقصر. أنثاها أكبر قدًا من ذكورها. مكها شديد الصغر مستطيل الشكل، يمتع الإناث حل بطون الزنابير والنسوح والجراد والجنادب فيقتف من يرقات دقيقة تقف قشار بطن المائل فتدخله وتمش كامل حياتها البرية التي تنتهي مع حياة المائل. أشهر أنواعها القنصة المذبة والمزرة والشفراء.

٢٢٧٦٣ - قُتْعُر *

القنتر: شجر مثل الكبر إلا أنها أغلظ شوكة ووداً وثمرتها ككثرة ولا ينبت في الصخر. سكا أبو حيفة.

٢٢٧٦٤ - قُتْعَاشَة *

(S). *Cryptos* جنس دويبات من فصيلة القنصيات. أنواعها المروفة ٦ أجناسها مركبة من ٢١ حلقة تحمل ٢١ زوجاً من الجرامز. ج قنص.

٢٢٧٦٥ - قُتْعَاشِيَّات *

(F). *Scolopendridae* (S). *Scolopendridae* (F). فصيلة دويبات من البعداعيات الشقوبات الأريل. أجناسها وأنواعها كثيرة البد أشهرها القنصاة وأم أربع وأربعين (الحريش).

٢٢٧٦٦ - قُتْعُج *

(S). *Dioclis maritima*, *D. candidissima* (S). *Dioclis argentea*, *Herbe blanche* (F). *Cotton weed*, *Sea cud-weed* (E). *Silberzwelehr* (D). *Santolina maritima* (I). نباتات شجيرة بري معمر وسيد الجسر والنوع من فصيلة المركبات. منته السوسل البحرية. ساقه فراء زبد تلو من ١٠ إلى ٥٠ سم. رؤسها مستطيل القد قطبي الشكل. أودقه متطابقة لاطفة، تملؤها أعليبي الصفرة. مقوم القامدة، خلل البشرة. رؤسها الزهرية عديدة صفراء اللون، قنابا جريسي الشكل، ترمجها اسفنجي التسج. بزورها مضطمة عادية الجناح والأعرة. أنثراها يستمر من حزيران إلى أيلول.

٢٢٧٦٧ - قُفْد * ، كُتْبَاكَة الشوك ، أنشد

حسيكة ، ذلج ، ذرام ، كُتْكَب ، كُتْكَب الشوك ، لُتْكَة ، مديج .

(E). *Erlinaceus* (S). *Hérissou* (F). *Hedge hog*, *Urchin* (E). *Igel* (D).

كنية أبو صفيان وأبو الشوك والأنثى لم دلال ج قنافة ويقال لها الصامس. جنس حيوانات لبونة ناعمة من آكلات الحشرات صغيرة القد طولها يراوح من ١٦ إلى ٣٠ سم. طولها من ٧ إلى ١٢ م. أجناسها ملحوة بغطاء من الشوك يكتنفها بكاملها دون الرأس والمق والبط والجرامز. قوتها الحشرات والقنار والجراد والسفاه والحيات



قُتَاب



قُتَاشَة



قُفْد

٢٢٧٧٨ - **فُتْدَةُ الْبَحْرِ *** ، **شَيْتَمُ بَحْرِي**
 Diodon (S), Hérissin de mer (F), Sea-urchin (E).
 جنس اسماك بحرية شائكة من فصيلة الفهقيات وربة
 لمحميات الفكوك. أنواعه نحو ٤٠ معظمها من اسماك حار
 البلاد الحارة . مقدمها يشبه مقدم الفند || قوتها
 الحشرات والمرجان . لحمها مؤذية وقد تكون سامة .

٢٢٧٧٩ - **فُتْدِيَّات**
 Erinaceidae (S), Erinacéidés (F), Erinacidae (E).
 فصيلة القناذف من الحيوانات البرية وربة الحشرات اي
 آكلات الحشرات .

٢٢٧٨٠ - **فُتْدِيَّة** هي الآخرة ، اطلمها ، ج قناظ .

٢٢٧٨١ - **فُتْدُ ***
 Acornys
 جنس دويبات لبونة قاضية من فصيلة الفأريات. أنواعه
 ١٦ موطنها افريقية الشرقية والجزيرة العربية وفلسطين .
 اجسامها صغيرة اللد مستطيلة تحمل في مؤخر ظهورها
 خيطوطا من الحب الغليظ الشائك ، تألف القفر . قوتها
 الحشرات والوزغ والحويبر والجملور || احرف أنواعه
 واشهرها فتندة القاهرة والفتندة المصرية .

٢٢٧٨٢ - **فُتْدَةُ الْقَاهِرَةِ**
 Acornys cahirinus (S), Acornys du Caire (F).
 موطنها مصر السفلى . حجمها حجم الفأرة . ثوبها بلون
 الرمل . بطنها ابيض . ذنبها قصير . اذناها كيرتان .

٢٢٧٨٣ - **فُتْدَةُ مِصْرِيَّة**
 Acornys dimidiatus (S), Acornys de l'Egypte (F), Spiny mouse (E).
 موطنها مصر وفلسطين والجزيرة العربية . ثوبها بلون الرمل
 يمتد عند الظهر ويبيض عند الصدر والبطن . طولا نحو ١٢
 سم . وذنبها ٨ سم . اذناها كيرتان || تألف القفار
 والقباني .

٢٢٧٨٤ - **فُتْدُل**
 Chèvre (F), Goat (E).
 المعز السينة الفسخة .

٢٢٧٨٥ - **فُتْدُوس ***
 Gomphosus (S), Gomphose (F).
 جنس اسماك بحرية من شالكات الزمانف وفصيلة الكيدسيات.
 أنواعه المعروفة اربعة اصلها المحيط الهندي || اجسامها
 احليجية الشكل ، مستتلة التبط ، تعطين من ١٧ الى
 ٢٣ سم . اثنائها تراوح بين السمرة والجودة الزرقية الموج .
 بطونها ابيض كثيرا من ظهورها . زعانفها مبطلة بالاصفر
 والاسود . رؤوسها حشرية ، غروبية الشكل ، مستطيلة
 الخاطم . عيونها ماصة . زعانفها الظهرية مستطيلة . زعانفها
 الذيلية مستعرجة ، محدودة الاطراف العليا والسفلى يتماخض
 غضروفية لينة || غوبها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٢٢٧٨٦ - **فُتْدُول**
 Canavalia (S), Canavale (F).
 جنس نباتات برية وزراعية ، حارشة اومدادة ، من فصيلة
 القرقيات . أنواعه المعروفة نحو ٢٠ جميعها من نباتات
 المناطق الحارة والاستوائية الاسيوية والافريقية . اوراقها
 مركبة ثلاثية تشبه اوراق الفاصوليا . ازهارها عقدوية
 التجميع ، محورية الارتكاز . ثمارها قرين كبيرة اللد ،
 حليقة الحب ، ثنائية الجناح الدرزي || اشهر أنواعه
 الزراعية ما يلي .

وهي مولة بالهام الانثافي لا تثار بسها . تسرح في
 الليل وترقد في النهار وهي في رقادها تنقبض وتتكور فتبدو
 ككرة من الطيك . الاثن اكبر حجما من الذكر تنبع
 من ٣ الى ٨ جراه تبصر النور بعد وضعها باربعة اسابيع .

٢٢٧٨٨ - **فُتْدُ آذَن**
 Erinaceus auritus (S), Hérissin oreillard (F).
 موطنه العراق والاناضول وسورية ولبنان ، جسمه يطول
 نحو ٢٦ سم . ويعلو نحو ١٢ سم . اذناه كيرتان .
 خطمه وجراحه مستطيلة ، شوكه ابيض القاعدة اسمر الجرم
 اصفر الطرف يطول نحو ٣ سم .

٢٢٧٨٩ - **فُتْدُ أَرْوِي**
 Erinaceus europaeus (S), Hérissin d'Europe, Echinos (F).
 موطنه اوروبية ، جسمه يطول نحو ٣٠ سم . ويعلو ١٠ سم .
 خطمه يشبه فطيسية الخنزير . عتقه قصير . اذناه صغيرتان .
 شوكه اسمر الجرم ابيض الطرف يطول نحو ٣ سم .

٢٢٧٩٠ - **فُتْدُ الْمَغْرِب**
 Erinaceus algirus (S), Hérissin algérien (F).
 موطنه افريقية الشمالية من مراکش الى طرابلس اقرب .
 جسمه يطول نحو ٢٢ سم . بطة حشلي اللون . شوكه لضي
 القاعدة ، احمل الجرم ، اسود الطرف ، يطول نحو ٢٥ سم .

٢٢٧٩١ - **فُتْدُ التَّمَل**
 Echidné (F).
 هو التماسن ، اطلمه .

٢٢٧٩٢ - **فُتْدُ حَبِيَّي**
 Erinaceus sechlopius (S), Hérissin abyssin (F).
 موطنه الحبشة وجوراجا . جسمه يطول نحو ١٨ سم .
 بطنه اسمر اللون . شوكه ابيض القاعدة مضلع الجرم
 الاسمر ، اغبر الطرف ، يطول نحو ٢٥ سم .

٢٢٧٩٣ - **فُتْدُ شَقَارِي**
 Erinaceus megalotis (S), Hérissin à longues oreilles (F).
 موطنه الافغان ، جسمه كبير اللد يطول نحو ٣٠ سم .
 اذناه كيرتان وذنبه كلك . شوكه اسمر اللون يطول نحو
 ٣ سم .

٢٢٧٩٤ - **فُتْدُ طَوِيل الشَّوْكَة**
 Erinaceus macrocanthus (S), Hérissin à longs pi-
 quants (F).
 موطنه العرب والافغان والكرديستان . جسمه متوسط اللد يطول
 نحو ٢٤ سم . اذناه كيرتان ذلقتان . شوكه ابيض الجرم ،
 اصعب الطرف ، يطول نحو ٤ سم .

٢٢٧٩٥ - **فُتْدُ مِطْنَن**
 Erinaceus albiventris (S), Hérissin à ventre blanc (F).
 موطنه افريقية الشرقية والجنوبية من مصر والسودان وسائر
 الى الموزنيك . جسمه يطول نحو ٢٥ سم . بطنه ابيض
 اللون . شوكه الى الصبهة يطول نحو ٢٧ سم .

٢٢٧٩٦ - **فُتْدُ مَطَوَّق**
 Erinaceus collaris (S), Hérissin à collier (F).
 موطنه الهند والسند والتباج . يرغب في القبان والصحاري
 الرملية . جسمه اسمر اللون يطول نحو ١٨ سم . عتقه مطوق
 بالابيض . شوكه اسمر الجرم ، اغبر الطرف ، يطول نحو
 ٢٨ سم .

٢٢٧٩٧ - **فُتْدَةُ**
 Hérissonne (F), She-hedgehog (E).
 اثن الفند .



فندة البحر



فندع



فندوس

٢٢٧٨٧ - قُفُولٌ بَايَر ، قُفُولٌ هِنْدِي

Canavalia gladiata (S). Canavalle en glaive, Pois d'Inde (F). Jamaica horse-bean (E). Kanavalbohne (D). Dolico Indiana (I).

نوع من القنقول الزراعي. منته البلاء الاستوائية والحارة وهو قريب الشبه من النوع السنّي. يتميز بانحاره المسور وقرونه الجمالة كصعل الحلووم وحبه الخنطى القون الاسمر المالح. خواصه لا تختلف عن خواص السنّي وهو مأكول مثله.

٢٢٧٨٨ - قُفُولٌ سَبِيّ ، قُفُولٌ سَبِيّ

Canavalia ensiformis (S). Canavalle ensiforme, Haricot-sabre, Pois-sabre (F). Sword-bean, Jack-bean (E). Kanavalbohne (D). Canavalia (I).

نوع من القنقول وهو نبات زراعي مأكول البأر كالقرواء والقول. منته البلاء الحارة. يعيش من ٣ الى ٥ سنوات. ساقه حارفة ملتفة. اوراقها كبيرة. وريقاتها بيضيه ذلقة، تصلها جلدي الصلبة. ازهاره جزؤية اللون. عقوديه التجميع. مستطيلة المالحق. ثمارها قرون متدلية، مقوسة كالسيف طول نحو ٣٠ سم. وقمرض ٣ سم. تنفث من ٨ الى ١٢ حبة كبيرة اللد مفلطحة الشكل يبيض اللون او وردية. قرونه الخضراء تستعمل استعمال القرواء وهي لليلة الطعم جيدة الصنف. حيويه مأكولة، غزرة المواد الغذائية، تحوي ما تحريفه وقدره:

مواد ازولية	٢٥,٦٢ %
مواد دهنية	٢,٣٢ %
مواد هيدروكربونية	٤٧,٩٤ %

٢٢٧٨٩ - قُفُورٌ *

Macropus (S).

Kangourou, Kangaroo (F). Kangaroo (E).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة القنقريات ونبوة الجرابيات، انواعه ستة، موطنها استرالية، قوتها الاضباب. تتميز بقصر اليدين واستطالة الرجلين والذنب، تألف القنابات والزوج تمشي جماعات صغيرة يقودها فصل سن.

٢٢٧٩٠ - قُفُورٌ مَسْكُونٌ *

Dendrolagus (S).

Dendrolagus (F).

جنس حيوانات لبونة جرابية من فصيلة طوالب الاربيل. انواعه المعروفة اربعة موطنها استرالية وغينيا الجديدة. اجسامها شبيهة باجسام القنقير الا ان قوائمها الامامية اطول من قوائمها الخلفية القص. رؤوسها صغيرة. اذنانها مستطيلة. تنسلق الاجزاء بشفة وتسير على الخفصين وتقفز بدو خلافا لما يفعله القنقير. لحوها سكية المرف قل من يرب فيها.

٢٢٧٩١ - قُفُورِيَّاتٌ

Kangourous (F).

Kangaroo (E).

فصيلة حيوانات لبونة حاشية من الجرابيات طوالبات الاربيل. انواعها المعروفة نحو ٢٥ تنضم الى ثلاثة اجناس القنقير والفولاب والثلثاب. اجسامها متباينة الاحجام التي تراوح من قد الارنب الى قد البعلاة. رؤوسها شبه مخروطية الشكل. اذنانها كبيرة منتصبة. اعناقها واذنانها مستطيلة. قوائمها الخلفية بالغة الطول. اناثها رباعية الاخلاص. موطنها استرالية ونيانغيا وغينيا الجديدة والجزر المجاورة.

٢٢٧٩٢ - قُفُورِيَّانٌ صَدَفٌ بَحْرِي.

٢٢٧٩٣ - قُفُورِيَّةٌ *

Trigonia (S).

Trigone (F). Trigona (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة القنقليات. انواعها المعاصرة المعروفة حسة اعطائها تمتد من البحر الاحمر الى الهند واسترالية. اصدانها ثنائية الصاريح الاستوائية الاصلع، غنقة السطح الخارجية، مالة الداخلة القزلية التركيب الجميلة الاروان القسطنطينية.

٢٢٧٩٤ - قُفُورِيَّاتٌ

Trigonidae (S).

Trigonidae (F). Trigonidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم عمار العالم. اصدانها ثنائية الصاريح، متباينة الاحجام، شبه مخروطية الشكل، غنقة الصلحات مخززة في الشهر اجناسها القنقة والجمبة.

٢٢٧٩٥ - قُفُورِيَّةٌ

Ranchisement (F). Rancidity (E).

فساد اللحم او الزيت رنخيت رنخيا.

٢٢٧٩٦ - قُفُورٌ

Thyrsa

شكل من اشكال الانزهار المدفوي تكون فيه الاجزاء الوسطى اطول من السفل والمليا.

٢٢٧٩٧ - قُفُورٌ ، قُفُورٌ ، قُفُورٌ ، قُفُورٌ

Régime de dattes (F). Cluster (E).

هو الطاق الذي يعمل ثمار النخل وهو كالمتنوع من السنب ج اثناء وقتان وقنات.

٢٢٧٩٨ - قُفُورٌ

Sourgeons à fleurs (F).

Blossoms buds (E).

هي أين النبات او اكنة زهرة فلا بدت قيل بدت اكتب.

٢٢٧٩٩ - قُفُورٌ التَغْدِيَّةُ

Normes d'alimentation (F). Feeding norms (E).

ما يجب احتياجه في تيمين مقادير العناصر الغذائية اللازمة لكل حيوان او فئة من الحيوان بالنسبة الى مسه ووزنه وجيرمه وعمله.

٢٢٨٠٠ - قُفُورٌ

Chanos salmoné (F).

سمكة بحرية من الصابوغيات تدعى شنوص، اطلبها.

٢٢٨٠١ - قُفُورٌ

Mormyrus (S). Mormyre (F).

جنس اسماك نهريه من فصيلة القنقريات. انواعه نحو ١٨ منطها من اسماك المياه الافريقية اعصها النيل والنيجر. اشهر انواعه القنقوة الخلفاء وقنوة النيل والقشيرة.

٢٢٨٠٢ - قُفُورٌ الخيل

Mormyrus caschive (S).

Mormyre rume (F).

سمكة مستطيلة الجسم، لينة الزمانت، صغيرة القم، مستطيلة الخطم الطويل. يتكرر وجودها في النيل. كانت من الاسماك المكرمة عند قدماء المصريين.

٢٢٨٠٣ - قُفُورٌ خَطْمَاءٌ ، اَبُو يُونُز

Mormyrus oxyrhynchus (S). Mormyre à bec (F).

نوع من القنوم وهي سمكة لينة الزمانت، مودية الخلم، تتكرر في النيل والنيجر.



قنر



قنر شنان



قنفة



قنوم

22820 - قَتَبِيَّة **Ductule**
قناة جهازية دقيقة تكون في الحشرات والحشرات الدنيا .
22821 - قَتَبِيَّة **Ductule**
كل حشرة تنتمي الى القتبليات .

22822 - قَتَبِيَّة **Ductule**
كل حشرة تنتمي الى فصيلة القتبليات .

22823 - قَتَبِيَّات **Psocidae (S), Psocids (F), Psocidae (E).**
فصيلة حشرات من رتبة القتبليات اجناسها وانواعها عديدة
جميعها صغيرة اقل طويلا يراوح من ١ الى ٣ م . اثنائها
الى الرتبة السراة يطولها موج اسفح || قوتها ما ينمو
على النبات من الفطور .

22824 - قَتَبِيَّات **Corrodentia, Psocoptera (S), Psocoptères (F), Psocoptera (E).**
رتبة حشرات من طبقة القتبليات تشمل القتبليات
والناسيات .

22825 - قَتَبِيَّ **Perdrix robusta (F).**
هو الحجل البهامي ، اطلبه .

22826 - قَتَبِيَّ **Narcisse (F).**
هو الزجس ، اطلبه .

22827 - قَتَبِيَّ **Aubergine blanche (F).**
ضرب من الباذنجان ابيض الجار يستعمل كنبات زينة .

22828 - قَتَبِيَّ **Fibres du dattier (F).**
قشرة حمراء مسفرة الالياف الهبوكية تكون على لب النخلة .

22829 - قَتَبِيَّة **Perdrix robusta (F).**
صوت الدب .

22830 - قَتَبِيَّ **Anorexie (F), Loss of appetite (E).**
قلة الشهوة للطعام عند الحيوان .

22831 - قَتَبِيَّ **Perdrix robusta (F).**
هو الحجل البهامي ، اطلبه .

22832 - قَتَبِيَّ **Amphisbenus (S), Amphisbène (F).**
جنس عظام من فصيلة القهقريانيات انواعه ثلاثة طويلة
من ٣ الى ٥ سم . اجسامها اسطوانية . اثنائها
الى السرة السوداء يطولها تجذيع اخر . قوتها الحشرات .
تعيش في التربة وتكثر قرب النمل حيث تولد الفناء .

22833 - قَتَبِيَّ **Amphisbenidae (S), Amphisbénidés (F).**
فصيلة من العظائيات الديديمات الارجل والروح الجليدي .
اجناسها قليلة العدد . تعيش تحت الارض . جميعها من
الزحافات الناعمة .

22834 - قَوَائِم **Rémiges primaires, Flèches (F).**
ريش مقدم جناح الطائر وهي الاصغار والواشر .

22835 - قَوَائِم **Rongeurs (F), Rodentia (E).**
رتبة حيوانات من البوانات تتميز باجسامها الصغيرة القذ
وبشائنها المستطيلة الحادة الاطراف التي تمكها من القضم .

22836 - قَتَبِيَّات **Mormyridae (S), Mormyrids (F), Mormyridae (E).**
فصيلة اسماك نهريّة من مفتوحات المائدة اشهر اجناسها
القنوم .

22837 - قَتَبِيَّ ، وَعَايَ **Vasculaire (F), Vascular (E).**
نمت تعريفي يطلق على النباتات القنوية اي الوائية النسيج .

22838 - قَتَبِيَّ **Botryoides (F), Botryoid (E).**
نمت تعريفي يطلق على ما كان شكله كالقنوم .

22839 - قَتَبِيَّات **Botryoides (F), Botryoid (E).**
هي المارزوانييات ، اطلبها .

22840 - قَتَبِيَّ ، وَعَايَ **Vascularisation (F), Vascularization (E).**

القنوية ، جسموريا ، تكون اوعية جديدة في النسيج
المضوية . وهي ايضا النمط الذي تتخذه الاوعية في حالة
عضوية معينة .

22841 - قَتَبِيَّ **Nuque de l'éléphant (F), Nape of the elephant (E).**
رتبة الفيل حيث يجلس الفيل .

22842 - قَتَبِيَّ **Nuage épais (F), Thick cloud (E).**
سحاب متكاثف التجميع عائق الون .

22843 - قَتَبِيَّ **Involucrelle (F).**
قناة صغيرة القذ تملق قاعدة الرولية الزهرية .

22844 - قَتَبِيَّ **Bractéole (F), Bracteole (E).**
قناة صغيرة الحجم تملق قاعدة القتيب .

22845 - قَتَبِيَّ **Feuilles mortes de pins (F).**
اوراق الصنوبر اليابسة تلتصق الارض .

22846 - قَتَبِيَّ **Glumellule (F).**
هذه شغافة صغيرة القذ تحت العنيفة ملاصقة الزهرة . وهما
قبتين لكل زهرة من زهرات السنبلية .

22847 - قَتَبِيَّ **Phénotype (F), Phenotype (E).**
هو من النبات الذي يتحل بالصفات الشوزبية المنسوبة
الى صكوره .

22848 - قَتَبِيَّ **Phénotype (F), Phenotype (E).**
رابع صيد .

22849 - قَتَبِيَّ **Phénotype (F), Phenotype (E).**
رابع أناسكلوس .

22850 - قَتَبِيَّ **Verticilliosis (S).**
جنس فطور مجهرية من الفتيخيات وفصيلة الوطحيات .

22851 - قَتَبِيَّ **Verticilliosis (S).**
جره الكتيبة منتصبة ، فروعه ريشة الشكل ، قاعدة
الارتكاز . كتائده شمعية التجميع ، يضيء للشكل شغافة
انواعه قليلة العدد والاذى تبو في تكاثرها ككتل من العفن
الايض تركب المواد النباتية واللصوية المنحلة .

22852 - قَتَبِيَّ **Fiote (F), Phil (E).**
قزم زجاجي مادة صلب القذ محكم السد .



قَتَبِيَّ

Malandre (F).

Malandre, Rotten Knot (E).

٢٢٨٤٣ - قُوَيْمَةُ الرُكْبَةِ

مرض جلدي يُمَرِّى رُكْبَةَ القُرْس .

Dartrose de la vigne (F).

Dartros of the vine (E).

وصم نباتي مظهره الخارجي قروح وطفوح في اصول وسروع الكرم . سببه حائل مختلفة اصحابها الفسومية .

٢٢٨٤٥ - قُوَيْمَةُ رَطْبَةٍ ، اَكْرِيْمَا رَطْبَةٍ

Impétigo, Eczéma humide (F). Impetigo, Eczéma damp (E).

٢٢٨٤٦ - قُوَيْمَةُ رُكْبَةٍ

Alouette cochevis (F).

في القبرة المنصبة ، اطليا .

Sternite (F).

في الاسرلة مفصل من مفصلات بدن الحشرة . ج قوب .

Coque d'oeuf (F). Shell (E).

قشرة البيض بعد انفلاتها عن القرح . ج قوب وقواب .

Bergeronnette pristinrière (F).

راجع ذرة الربيع .

٢٢٨٥٠ - قُوَيْمَةُ الارضي شوكي

Depressaria subpropinqua (S). Teigne de l'artichaut (F).

حشرة من القيرميات فراشتها صغيرة اللد ، حنطية اللون ، يسطها نحو ١٠ م . يرتقا غبار اللون ثلاثية الخطوط القلابة . تركب الارضي شوكي .

٢٢٨٥١ - قُوَيْمَةُ الازالية ، قُوَيْمَةُ الجُرْلسَان

Gracilaria azulella, G. azulella (S). Teigne de l'azalea (F). Azalea leaf miner (E). Azalea-motte (D).

حشرة من القيرميات يسطها نحو ١٠ م . رواشتها غشقة حنطية اللون فضية الملوأ . يرتقا دقيقة الجسم غبار القوب تلثم الادرأق وتكثتها .

٢٢٨٥٢ - قُوَيْمَةُ الأشجار المثمرة

Teigne des arbres fruitiers (F).

في الشبكية الصنيرة ، اطليا .

٢٢٨٥٣ - قُوَيْمَةُ البراكهم

Teigne des bourgeons (F).

في الشبكية الصنيرة ، اطليا .

٢٢٨٥٤ - قُوَيْمَةُ التفاح

Teigne des pommiers (F).

في غرطيف التفاح ، اطليه .

٢٢٨٥٥ - قُوَيْمَةُ التين ، لاهمة التين

Simsechis nemorana (S). Mineuse du figuier, Teigne du figuier (F). Fig moth (E). Felgenblaze-motte (D).

حشرة من القيرميات فراشتها سمراء اللون تطول نحو ١٠ م . يسطها تراوح من ١٥ الى ١٨ م . رواشتها مستعرضة حنطية يعلوها تبيج اسف الملوأ || لما جيلان في السنة . يرتقا صغيرة دقيقة تركب في جيلها الاول السطح العلوي من الورقة وتركب في جيلها الثاني الورقة والشرة حبا .

فصائلها ١٤ تنتمي الى ٤ مراتب : السنجابيات الشوزب ، والقرقنديات الشوزب ، والشجميات الشوزب ، والبيكيات الشوزب || اما اجناسها وانواعها فكثيرة المتد .

Migrateurs (F). Migratory (E).

الطيور التي تنهب من بلاد الى بلاد وهي ضد الازاياد .

٢٢٨٣٧ - قُوَيْمَةُ ، اُرْتَب يَمَرِّى ، اُرْتَب وَحْشِي

Lepus (S). Lièvre (F). Hare (E).

جنس حيوانات لبونة تنافس من فصيلة الارنيبات . انواعه ٦٩ موطنها العالم . اجسامها مستطيلة متسجدة . طولها الكامل ، من برطانها الى طرف ذنبها ، لا يقل من ٦٠ سم . ولا يفوق ٧٥ سم . اذنانها مستطيلة غشقة متصبية . عيناها كبيرة . براطمها مفلوكة . جرابها الامامية قصيرة اللد .

خاوية الاصابع ، اما الخلفية لمسطلة ورياحية الاصابع . اظفارها قوية سادة . اقلها سوية اللون منها الاكهب والاسمر والاصهب والابيض اتج ... || تألف البحر والجبال والقبائل والاحراج والغضاب والسهول . ترحل في الليل . اجسرتها رداء مستطيلة الشكل تغلظها على اعماق غشقة تراوح من ٤٠ الى ٧٠ م . ملخلها وخرجها نفق واحد مستقيم || قوتها النبات والمجرب . اناها ثفوة

تقسم من ٣ الى ٥ مرات في السنة وكل مرة من الفيرمين الى الخمسة تخلف باصرة كاسية ترحل برفقة امهاها بعد وضعها باسبرع . واثي القروأ تدعى درامة . وقوامة || احرف انواعه واشهرها :

قروأ ابيض ، قروأ جعول

Lepus timidus (S).

Lièvre timide, L. blanc (F).

قروأ اوروبي

Lepus europaeus (S).

Lièvre européen, L. commun (F).

قروأ التبت

Lepus tolai (S). Lièvre du Thibet (F).

قروأ الشمال

Lepus arcticus (S). Lièvre arctique (F).

قروأ القطب

Lepus capensis (S). Lièvre du Cap (F).

قروأ المتوسط

Lepus mediterraneus (S).

Lièvre méditerranéen (F).

قروأ المراحي

Lepus campestris (S).

Lièvre des prairies (F).

قروأ امريكي

Lepus americanus (S).

Lièvre américain (F).

قروأ مصري

Lepus aegyptius (S).

Lièvre d'Egypte (F).

قروأ مقلد

Lepus nigricollis (S).

Lièvre mosel, L. à cou noir (F).

٢٢٨٣٨ - قُوَيْمَةُ

Eudynamis orientalis (F).

القوأل طائر معروف باسم عديس شرقي ، اطليه .

٢٢٨٣٩ - قُوَيْمَةُ

في الولاية ، اطليا .

٢٢٨١٠ - قُوَيْمَةُ

Members (F). Limbe (E).

اجزاء الحيوان كالكاين والرجلين التي توتن انتقال الجسم .

٢٢٨٤١ - قُوَيْمَةُ

Poussin (F).

هو الصغور والكتكتوت . ج اقواب .

٢٢٨٤٢ - قُوَيْمَةُ

Eczéma (F).

في الاكريميا ، اطليا .



قروأ



قوبعة الارضي شوكي



قوبعة الازالية



قوبعة التين

٢٢٨٦٥ - قُبُوعَةُ الشَّحْمِ

Aglossa pinguinalis (S). Teigne de la graisse (F).
حشرة من القربويات. ريقها صغيرة دقيقة وردية اللون تعيش
على اللحم الجاف.

٢٢٨٦٦ - قُبُوعَةُ الشُّوَدَرِ ، لَيْتَةِ

Lica ocellatella (S). Teigne de la betterave (F).
حشرة من القربويات. يسقطها تراوح من ١٠ إلى ١٢ م.
نوبها إلى العطلة الباقية. ريقها خضراء اللون حمراء الحواف
تلفم جلود الشندر وتقع بها أشد الأذى.

٢٢٨٦٧ - قُبُوعَةُ الصَّكْبِيَّاتِ

Teigne du coiza هي القزمية المائية، أظلمها.

٢٢٨٦٨ - قُبُوعَةُ الصُّوفِ * ، سَعْفَةُ الصُّوفِ

Tineola bisellialis (S). Teigne de la laine. Mite des vêtements (F). Webbing clothes moth (E).
Kleidermotte (D).

حشرة من القربويات ريقها صغيرة دقيقة زبداء اللون تركب
جميع الانسجة الصوفية بما فيها السجاد.

٢٢٨٦٩ - قُبُوعَةُ الْفِرَاكِ * ، سَعْفَةُ الْفِرَاكِ

Trichophaga tapetzelia, *Tinea tapetzelia* (S). Teigne des fourrures, Mite des fourrures, Mite des tapis (F). Carpet moth (E). Tapetanmotte (D).

حشرة من القربويات ريقها صغيرة اللون حمراء اللون تركب
الفراء وتقرضها.

٢٢٨٧٠ - قُبُوعَةُ الْفَلِينِ ، سَعْفَةُ الْفَلِينِ

Aenophilia flavum (S). Teigne du liège (F).
حشرة من القربويات ريقها صغيرة اللون حمراء اللون
حشيتية المروج تلفم الفلين المصنوع لتعطله.

٢٢٨٧١ - قُبُوعَةُ الْكُرَاتِ

Acrolepis assectella (S). Teigne du poireau (F).
Leak moth (E). Lauchmotte (D).

حشرة من القربويات صغيرة اللون يسقطها نحو ١٢ م.
نوبها إلى العطلة السمراء رواشها منشقة بالأسود. ريقها
دقيقة حشيتية اللون تلفم الكرات بأوراقه وقص ساقه.

٢٢٨٧٢ - قُبُوعَةُ الْكَرَزِ *

Argyresthia ephippella (S). Teigne du cerisier (F).
Cherry fruit moth (E). Kirschblütenmotte (D).

حشرة من القربويات. يسقطها تراوح من ١٠ إلى ١٢ م.
وروشها الامانيان إلى الرمادي يطولها تعريج أسود.
وروشها الخلفيان إلى السمرة الخطية السوية يرقها أظفار
من الخمل إلى الأصعب الثامم. ريقها تركب أظفار وتغار
الاجار المشرة اصغها الكرز.

٢٢٨٧٣ - قُبُوعَةُ الْكَيْشِيشِ

Incurvaria capitella (S). Teigne du grosellier (F).
حشرة من القربويات يسقطها نحو ١٥ م. رواشها جذرية
اللون يعلوها تبيج اصفر مثلث الزوايا. ريقها نهد حمراء
اللون في أول عهدها ثم خضراء زاهية فقاومة وهي تقرض
براعم وتغار الكشمش.

٢٢٨٧٤ - قُبُوعَةُ النَّبَاتِ * ، سَعْفَةُ النَّبَاتِ

Tinea pellionella (S). Teigne des vêtements (F).
Pelt moth (E). Pelzmotte (D).

حشرة من القربويات. ريقها صغيرة دقيقة تعيش على
النسيج الصوفية. احيائها الحولية من ٣ إلى ٥. فبالج
عادتها غدية الشكل متينة النواص.

٢٢٨٥٧ - قُبُوعَةُ الْجَزْرِ

Depressaria nervosa (S). Teigne de la carotte (F).
Carrot moth (E). Kümelmotte, Möhrenschebe (D).

حشرة من القربويات. ريقها صغيرة غبراء اللون تعيش على
أزهار الجزر وغيره من نباتات الفصيلة الخيمية تنفضي
على الاثمار وقد لا تنف من البذور.

٢٢٨٥٨ - قُبُوعَةُ الْحَبُوبِ * ، حَنْطَلُ الْحَبُوبِ

Tinea granella (S). Teigne des grains (F).
European grain moth (E). Kornmotte, Weisser
Kornwurm (D).

حشرة من القربويات. يسقطها تراوح من ١٠ إلى ١٤ م.
رواشها إلى البياض الاخير يطولها تبيج حشيتي ومجاة نصية.
ريقها وسيدة الجليل الحولي، صغيرة اللون، تركب جميع انواع
المواد الغذائية المخزونة ولا تنف من الحنطة والشعير.

٢٢٨٥٩ - قُبُوعَةُ الْحُمْصِيَّاتِ *

Prays citri (S). Teigne du citronnier (F).

حشرة من القربويات. صغيرة اللون يسقطها نحو ١٠ م.
نوبها إلى العطلة. رواشها مرقشة. ثلاثية الاجيال الحولية.
ريقها صغيرة اللون، تركب اثمار وتغار الحمصيات.

٢٢٨٦٠ - قُبُوعَةُ الْخَشَبِ

Teigne du bois mort (F).

هي الحريقلة النيككة، أظلمها.

٢٢٨٦١ - قُبُوعَةُ الدَّرَّاقِنِ ، سَرَسَتْوَم *

Cerostoma persicella (S). Cérostome du pêcher (F).
حشرة من القربويات كبيرة اللون يسقطها نحو ٢٥ م.
وروشها الامانيان إلى الصفار الكبريتي والخلفيان إلى
الطحلة. ريقها وسيدة الجليل الحولي تركب أوراق الدراقن
والوزر.

٢٢٨٦٢ - قُبُوعَةُ الدَّرَّاقِنِ الصَّغِيرَةِ * ، أُنْرَسِيَا *

Anarsia lineatella (S). Petite mineuse du pêcher (F).
Peach twig borer (E). Pfirsichmotte (D).

حشرة من القربويات. يسقطها تراوح من ١٤ إلى ١٦ م.
رواشها ضيقة حطالة اللون. لها جيلان في الحول. تركب
رقعة الجليل الاول الاثنان الثانية تفلنهما وتحول دون نموها.
اما رقات الجيل الثاني فتتركب الجبار وتنغرمها.

٢٢٨٦٣ - قُبُوعَةُ الزُّعُرُورِ

Teigne de l'aubépine (F).

هي النيككة الصغيرة، أظلمها.

٢٢٨٦٤ - قُبُوعَةُ الزَّيْتُونِ *

Prays oleella (S). Teigne de l'olive (F). Olive moth (E). Oliven-
motte (D).

حشرة من القربويات. صغيرة اللون يسقطها نحو ١٠ م.
نوبها رمادي اللون نضي المروج. احيائها الحولية ثلاثة.
ريقها صغيرة اللون حشيتية اللون ثلاثية الخطوط السمرة القاطية
تركب الارواق تفلنهما ولا تضرع تقسيم اكلها ولا تبار
فتنخرها وتعلبها.



قُبُوعَةُ النَّبَاتِ



قُبُوعَةُ الْحَبُوبِ



قُبُوعَةُ الْحُمْصِيَّاتِ



قُبُوعَةُ الدَّرَّاقِنِ الصَّغِيرَةِ



قُبُوعَةُ الزَّيْتُونِ



قُبُوعَةُ الصُّوفِ



قُبُوعَةُ الْفِرَاكِ



قُبُوعَةُ الْكَرَزِ

مكثا ذري القد مستدير الشكل لاقياي التجميع . ورقاتها صغيرة ملونة تلغ الاوراق والاعاز . غادراتها تحلج ضمن نبالج احبها نولس ليد متين .

٢٧٨٨٤ - قُوبُوعَةُ الْبَلَك

Gracilaria syringella, Xanthoplaspteryx syringella (S). Taigne du lilas (F). Lilac leaf miner (E). Fleddermotte (D).

حشرة من القربويات صغيرة القد بسطها تراوح من ٩ الى ١٠ سم. ثوبها حنطي اللون. ورقها تلغ لثم الاوراق المكثا وتقتل اطرافها فتصطبها.

٢٧٨٨٥ - قُوبُوعَةُ الْمَضَافِ

Hyponomeuta cognatella, H. evonymella (S). Hyponomeute du fusain (F).

حشرة من القربويات فراشها صغيرة القد وبداء الثوب . ورقها فبراء اللون تلثم ورق المضاف بعد ان تجلبه بشاشة من النواس العنكبوتي تمشي في داخلها حتى اكبال تطورها .

٢٧٨٧٦ - قُوبُوعَةُ التَّجِيلِيَّاتِ * ، اُكَيْسَه

لُغِيَّة

Elachiste argentella (S). Elachiste argentée (F).

حشرة مؤذية من القربويات . فراشها صغيرة القد ، بسطها تراوح من ١٢ الى ١٥ سم. ورشها الاماميان الى الطحلة القفصية . ورشها الخلفيان الى الصهبة يحجبها اطار من الحبل المهدب الصنابي اللون || ورقها صغيرة دقيقة حنطية اللون تركب مصفت التجليات فتلمج التنصل بين بشرته || تظهر الغرافة في ايار وتبقى حتى اواخر حزيران . لها جيل واحد في الحبل . تنشط اليرقة وتظهر دها ليرعا في النصلان في شهر نيسان .

٢٧٨٧٧ - قُوبُوعَةُ الْهَلْبِ ، سَعْمَةُ الْهَلْبِ

Tinea crinita (S). Taigne des crins (F).

حشرة من القربويات ورقها صغيرة القد سمراء اللون تركب الهلب وتقرعه .

٢٧٨٧٨ - قُوبُوعَةُ مَاسِيَّةٌ * ، قُوبُوعَةُ الصَّلْبِيَّاتِ

Plutella maculipennis (S). Taigne du colza, Taigne des crucifères (F). Diamond back moth (E). Kohlschabe, Kohlmoete, Schleirmotte (D).

حشرة من القربويات . بسطها تراوح من ١١ الى ١٢ سم. ورشها حنطية اللون تغتصبا صفرة تملو الحبل المستطيل فتلمج كالناس . ورقها زباء، ثوبها الى الخضار اللاتج تطلو نحو ١٢ سم. تركب نباتات الفصيلة الصليبية اصحابا السلم فتقرض الازهار والبزور .

٢٧٨٧٩ - قُوبُوعَةُ نَاسِيَّةٌ *

Hyponomeuta padella, H. malinella (S). Hyponomeute, Chenille fleuse (F).

حشرة من القربويات ، تحيلة الجسم ضيقة القرواشن، بسطها تراوح من ١٦ الى ٢٠ سم. جيلها الحولي واحد . ورقها تركب التفاح والخوخ والبزور فتتج على الاوراق جلباباً مزياً من النواس تمشي في داخله .

٢٧٨٨٠ - قُوبُوعِيَّاتٌ ، سَعْمِيَّاتٌ

Tineidae (S). Tineides (F). Clothes moths (E). Echte motten (D).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجتة . اجناسها وانواعها زهاء ١٤٠٠٠ مظهرها من الحشرات الناصة، صغيرة القد ضيقة القرواشن المهديدة الاطراف . ملاصقا للشرفة صغيرة مدية. قروها الاستعمارية عيطة حررية.

٢٧٨٨٢ - قُوبُوعَةُ

Cobaea (S). Cobée, Cobée (F). Cobécacés (E). فصيلة نباتية وسيدة الجنس، نباتاتها عارضة مدها امريكة الاستوائية . ومن النباتين من قال انها عارة من القبيسات ومنهم من اعتبرها عمارة من البغنيات .

٢٧٨٨٣ - قُوبُوعَةُ عَارِشَةٍ *

Cobaea scandens (S). Cobée grimpante (F). Cups and saucers, Cathedral bells (E). Klettertulpen, Glockenrebe (D). Cobaea (I).

نوع من القربوية ساقها ليفية عارضة تطلو نحو ١٨ م. اوراقها مركبة وريقاتها يفضية التنصل تطلو من ١٥ الى ٢٢ سم. ازهارها كبيرة القد تطلو نحو ٨ سم. اكلمها بنفسجة مضطمة . ثوبها جري الشكل ، اخضر اللون ، بنفسجي الموالج || ازهارها يستمر من ايار الى تشرين الاول .

٢٧٨٨٤ - قُوبُوعِيَّانٌ ، حُوتُ الْجِنِّ *

Gobius (S). Gobie (F). Goby (E).

جنس اسماك بحرية بصرية ترطب في المياه الرائكة . اجسامها صغيرة . رؤوسها كبيرة ، اشداها واسمة ، انزاعها عديدة . جميعها من الاسماك اللثائية التي تتغذى فوق الماء . مظهرها في الاسماك السامة وبعضها مأكول . انزاعها للامة كثر في البحر الاحمر والخليج الفارسي وبحر الهند .

٢٧٨٨٥ - قُوبُوعِيَّانٌ اسود * ، كُرُوجُ اسود

Gobius niger (S). Gobie noir, Bouleroir noir (F). Black goby, Rock-fish (E).

سمكة بحرية يبيض من فصيلة القوبيونيات ورتبة شالكات الزعانف . اصالتها منط الاقاليم البحر الابيض المتوسط . تغتر من اسماك الشفاف والجراح . تمشي بين الصخور وفي الارواح || جسمها مستطيل الشكل ، مستدلل التسطيط ، يطول نحو ٢٠ سم. ثوبها الى الكعبة السراء يطولها تتجج اسود في الظهر وتنقبط اسود في الجانبين تتخلله بفض اللطخ الصف . رأسها كبير الحجم ، يرمي الشكل ، قصير الخطم . شفتها مستدل الانفراج ، فكها متعادلان . اسنانها صغيرة ، ذرية ثنائية الصف . عينها يبيضان ، ولديها الانكاز . زعانفها ثنائية التركيب والاشكال . زعنفتها الذيلية رعية الشكل || لها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٧٨٨٦ - قُوبُوعِيَّانٌ مَدَنِي * ، كُرُوجُ مَدَنِي

Gobius cruentatus (S). Gobie sanglant (F). Bloody goby, Sea-gudgeon (E).

سمكة بحرية يبيض من فصيلة القوبيونيات . اصالتها منط الاقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المتوسط الاطلسي || تغتر من اسماك الشفاف والجراح . جسمها مستدل القد ، شبه احليجي الشكل ، يطول من ٢٠ الى



قوبعة ماسية



قوبعة ناسجة



قوبعة عارشة



قوبيون اسود



قوبيون مدني

٢٢٨٩١ - **قُوَّةُ الْإِنْتِاشِ** (F). Pouvoir germinatif (F).
Germinal power (E).
من المعلوم ان لكل نوع من النبات مدة فصل من الزمن تستغلها البذور الى ان يتم انتاشها || قُوَّةُ الْإِنْتِاشِ قياس نسبي نوي يقدر بواسطته نسبة البذور الجيدة والسريعة الانبات .

٢٢٨٩٢ - **قُوَّةُ جَذَابِيَّة** (F). Force centripète (F).
Centripetal force (E).
هي القوة التي تدفع الشيء نحو المركز .

٢٢٨٩٣ - **قُوَّةُ حَامِيَّة** ، **قُوَّةُ حَمِيَّة** (E). Force marémotrice (F). Tide-moving force (E).
هي القوة التي تكثفها أمواج البحر الطافية النامية في مدحا وقد توصلوا في فرنسا الى استخدامها لتوليد الحركة الانتلاعية .

٢٢٨٩٤ - **قُوَّةُ نَائِيَّة** ، **قُوَّةُ طَارِدَة** ، **قُوَّةُ مَبْعِدَة** (F). Force centrifuge (F).
Centrifugal force (E).
هي القوة التي تدفع الشيء للابتعاد عن المركز .

٢٢٨٩٥ - **قُوَّتَانِ** (F). Yack (F).
هو القطاس ، اطلبه .

٢٢٨٩٦ - **قُوِّيَّة** (F). Bromatologie (F).
Bromatology (E).
التقنية علم يبحث في الاختفاء مع وصف الاغذية وتراكيبها وموادها العنصرية .

٢٢٨٩٧ - **قُوْرَع** هو الظلم ذكر النعام .

٢٢٨٩٨ - **قُوْرَس** (F). Arc (F). Arch (E).

٢٢٨٩٩ - **قُوْرَس** (F). Cintre (F). Curve of an arch (E).
٢٢٩٠٠ - **قُوْرَس**
القوس مجسمة من ستة كواكب تدعى الثلاثة .

٢٢٩٠١ - **قُوْرَس قُوْرَح** (F). Arc-en-ciel (F).
هو القسطن ، اطلبه .

٢٢٩٠٢ - **قُوْرَسِيَّات** (F). Arctotées, Arctotidées (F).
سبط من فصيلة المركبات الميثرينات .

٢٢٩٠٣ - **قُوْرَصَة** (F). Pot (F).
هي المكن زرع فيه الزهور . ج قواصر .

٢٢٩٠٤ - **قُوْرَطَة**
كلمة عامة تشمل دلالة على الثمر وعلى البندورة .

٢٢٩٠٥ - **قُوْرَطِي** ، **قُوْرَوَة** (F). Nasus (S). Coast (F).
جنس حيوانات لينة من فصيلة الرتليات . انواعه المعروفة خمسة وبهم من قال انها نوبان وثلاثة غروب . جميعها امريكية الموطن ، صغيرة القد ، جميلة الشكل ، مستندرة الاذن ، كثيفة الصوف الناعم ، مستطيلة الذيل الجلل . اناتها تصنع من ٣ الى ٥ جوار . تألف الغابات الكثيفة . قوتها الحار والموبيات والحشرات .

٣٠ سم . حراشها صغيرة ، جامدة . ثوبها الى الوردية والفترة الحمار يطيرها في رأسها ظهرها ويطيرها يتبع عابن الجيرة كالم . زعانفها الظهرية والصدية والذيلية مرفوعة بالاص والاحمر || رأسها كبير الجرم مستعرض الخيط والقطم . شدتها واسع الانفراج فكها الاسفل يتقدم الاسفل قليلا . اسناتها صغيرة ذرية ، ثنائية النصف . عيناها كبرتان ، مستديرتان ، ناشرتان ، رفيتا الارتكاز . زعنفتها الظهرية الاولى مستطيلة المنحاس . زعنفتها الذيلية مستديرة الطرف || الاثني تسرا في فلق من الصدفة الكبير بعد تنظفها من الرمال والاصال وتتقلب مع الذكر على حراسة السرة حتى التقف || لها جبه الصف ، مرغوب فيه .

٢٢٨٩٧ - **قُوْبِيُونِ مُضْب** ، **قُوْرُوْج أَهْمَر**
Gobius nebulosus (S). Gobie nébuleux (F).
Gobius nebulosus (E).

سمكة بحرية بيوض من القويون . اصطناعها تمتد من الخليج الى البحر الاحمر فالبحر الابيض المتوسط عبر قناة السويس || تعتبر من اسماك النفاق والملاحج . جسمها صغير الحجم ، مستطيل الشكل ، متدل التليط ، يطير من ١٢ الى ١٥ سم . حراشها معيئة جامدة . ثوبها ابيض اللين ويعلو من الخيط الجاني الى الظهر تمسح اغير متفاوت الكثافة يبدو كالفياض . اما القسم السفلي فغضى المزاج . زعانفها الظهرية والشرجية شفاقة . الصدريه والحوضي الى الخفصار البحري ويعلو الحوضية موج اسمر . الذيلية شفاقة مطوقة بحداس اسود || رأسها كبير الحجم ، خلوي في الشكل ، قصير الخيط الذقن . اسناتها صغيرة ، متراصة . عيناها صيرتان ، مستديرتان ، ناشرتان ، رفيتا الارتكاز || زعانفها الظهرية اثنتان تميز باستقامة الشمام الثاني من الظهرية الاولى الذي يبدو كسلك دقيق ، مستطيل اسود اللين . زعنفتها الحوضيتان متلاصقتان || لها جبه الصف ، مرغوب فيه .

٢٢٨٩٨ - **قُوْبِيُونِيَّات** (S). Goblidae (S).
Goblidae (F). Goblidae (E).

فصيلة اسماك بيوض من شاكات الزعانف . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، معظمها بحري وبعضها نهري والبحري يكثر وجوده عند الاغوار . اصطناعها مياه البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد او صغيرة . رؤوسها كبيرة . اشداقها معدلة الانفراج . عيناها مستديرة ، ناشرة . زعانفها الظهرية الاولى منخية الاطراف || شهر اجناسها القويون .

٢٢٨٩٩ - **قُوَّة** (F). Force (F).
هي صفة الاتزامية المفروضة وهي تشمل في الصيغ التالية :
قوة الاتبات (F). Force probante (F).

قوة الاتزام الخاص (F). Force d'obligation privée (F).
قوة القانون (F). Force de loi (F).
قوة المحكوم به (F). Force de chose jugée (F).
قوة تنفيذية (F). Force exécutoire, Exécution parée (F).
قوة قاهرة (F). Force majeure (F).

٢٢٨٩٠ - **قُوَّةُ الْإِتْمَاعِص** ، **قُوَّةُ الْمَصْ**
Pouvoir absorbant (F). Absorptive power (E).
خاصة التراب التي تحمكه من الاحتفاظ بين ذراته بعض العناصر الغذائية القابلة للوبان .



قويون مضب



قُوطِي مَعْرُوف



قُوطِحَان



قُوطِحَان الحَقْل



قُوطِحَان دَهْرِي



قُوطِحَان مِثْيَات

قُوطِحَان غَزْرِي

والبر. ساقه قزواء تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم. اوراقها صفيرة
فضيلة زياه النصل. ورويساته الزهرية فردية التجميع
لقنوسية الشكل، صفراء اللون.

٢٢٩١٧ - قُوطِحَان المُرُوج * ، كَرِيْتَم البَر ، مُتَدِيلِه

Chrysanthemum coronarium (S). *Chrysanthème à carène*, *C. des jardins*, *Marguerite des champs* (F). *Crown daisy*, *C. marigold*, *Garden chrysanthemum* (E). *Kronenwucherblume* (D). *Crisantemo da mazzi*, *Bambagelle*, *Margherita gialla* (I).

عشبة سولية برية وريتيية. ساقها قزواء متعقبة تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها قديمة التفريش. ورويساتها الزهرية متوسطة القد قطرها نحو ٤ سم. طباجها اصفر اللون اغصن المروج. لسيناتها ال صفراء القزاي || انزهاره يستمر من حزيران الى ايلول.

٢٢٩١٨ - قُوطِحَان دَهْرِي * ، لُؤْبَا ، كَرِيْتَم مُغْصَل

Chrysanthemum segetum (S). *Chrysanthème des blés*, *Marguerite dorée*, *M. jaune* (F). *Corn chrysanthemum*, *C. marigold*, *Yellow corn-flower* (E). *Echte Wucherblume*, *Kornringelblume* (D). *Margherita dorata*, *M. delle massi*, *Crisantemo* (I).

عشبة سولية برية وريتيية ساقها قليلة الفروع تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها قديمة التفريش، بحرية اللون، تحية النصل، متعقبة التنين. ورويساتها الزهرية دهرية اللون، متوسطة القد، قطرها نحو ٤ سم. طباجها متضخمة حية الشكل || انزهاره يستمر من حزيران الى آب.

٢٢٩١٩ - قُوطِحَان كَبِير *

Chrysanthemum leucanthemum, *Leucanthemum vulgare* (S). *Chrysanthème grande marguerite*, *Elle du bœuf* (F). *Ox-eye daisy*, *White-weed*, *Dog daisy* (E). *Gänsewucherblume*, *Riesenmargherita*, *Goldsblume* (D). *Margherita grande*, *M. dei prati*, *Margheritone* (I).

عشبة برية مبلولة معمرة ساقها قزواء تملو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها لاقياسية الشكل والقد، ورويساتها الزهرية كبيرة الحجم قطرها يراوح من ٦ الى ٨ سم. لسيناتها رفيعة مستطيلة. انزهارها يستمر من ايار الى تشرين الثاني.

٢٢٩٢٠ - قُوطِحَان مَعْرُوف * ، زَيْدَكَة ، سُمُي

Calendula officinalis (S). *Souci officinal*, *S. des jardins*, *S. à bouquet*, *S. double*, *Mirliton* (F). *Hen and chickens*, *Pot marigold* (E). *Ringelblume*, *Gartenringelblume* (D). *Calendula*, *Calta dei giardini* (I).

نبات عشبي حولي ويحول من فصيلة المركبات. غزوهو الزراعية عديدة سوقها تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها سنائية متعاقبة. ورويساتها الزهرية كبيرة القد قطرها نحو ٥ سم. لونها ال الصفرة اللحية المائلة.

٢٢٩٢١ - قُوطِحَان مِثْيَات * ، شَجَرَة مَرْتَم ، كَرْكاش

Chrysanthemum parthenium (S). *Chrysanthème-Matricaire*, *Grande camomille* (F). *Feverfew chrysanthemum* (E). *Golddfederwucherblume*, *Grosse Kamillen* (D). *Amarella*, *Matricale*, *Morella*, *Partenio* (I).

عشبة برية معمرة فواحة اللرب. ساقها حيداء قزواء تملو من ٧٠ الى ٢٠ سم. اوراقها ولقة لاقياسية للترسيم تطويل

Nasua rufa (S).

Costi roux (F).

نوع من القوطي. جسمه يطول نحو ٤٨ سم. وذنبه ٤٢ اما ارتفاعه فنحو ١٩ سم. ثوبه ال الجلوة الزاهية يمتد عند الظهر. رأسه ويصره ال السرة الرمشاء. ذنبه اصعب اللون مطرق بالاسود || اعطانه شامة الحفيد تم جمع بلاد امريكا الجنوبية.

٢٢٩٠٧ - قُوطِي مَعْرُوف * ، قُوطِي مَسْجَابِي * Nasua narica (S). Costi aridore (F).

نوع من القوطي. جسمه يطول نحو ٥٥ سم. وذنبه ٤٢ اما ارتفاعه فنحو ٢٥ سم. ثوبه ال السرة السوداء المراج. يطنه ال الصفرة. خطمه ابيض الطرف. جزاره قصيرة وقوية، عذابه حادة خاسية || اعطانه فسيحة الارواء تشمل المكسيك وغواتمالا وهندوراس وكوستاريكا.

٢٢٩٠٨ - قُوط ، مَسْكَارَة ، صِيَوَان Pavillon de l'oreille (F). Pavillon, Auricle (E).

قُوط الاذن وعارة الاذن وصيوان الاذن، ثلاثة اسماء لسمي واحد.

٢٢٩٠٩ - قُوطَا Sillex mauilier, Pierre moulière (F). Millstone grit (E).

حجر اسود اسنحي شديد الصلابة تعمل منه الرسى.

٢٢٩١٠ - قُوطِي هَر البَج ، اَطْلِب .

٢٢٩١١ - قُوطَا Caquet (F). Cackle (E).

صوت اللدجاجة على البيض وصوت الاوز.

٢٢٩١٢ - قُوطَا Pyrola (S). Pyrole (F).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة القزواحيات انواعها المعروفة نحو ١٢ اصلها بلاد الاقاليم المتحدة. جلدورها لينة. سوقها متدونة. اوراقها متعاقبة متضخمة بيضية. شعارها الزهرية متضخمة. لظواهرها سلبية التجميع يبيضه اللون.

٢٢٩١٣ - قُوطَا حِيَات Pyrolaceae (S).

Pyrolacées (F). Pyrolacées (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القلعات. اصلها وانواعها عديدة جميعها برية لا تقع فيها. اشهرها القزواح.

٢٢٩١٤ - قُوطَا طَائِر يَأْتِف الخربة من الاماكن

٢٢٩١٥ - قُوطِحَان Chrysanthemum (S).

Chrysanthème (F).
جنس نباتات عشبية سولية ومغولة ومعمرة من فصيلة المركبات. انواعها متدونة منها البرية والريتيية والبطية. سوقها قزواء. اوراقها متعاقبة معرصة. لظواهرها رؤسية صفراء اللون او يضاء || اشهر انواعها ما يتبع.

٢٢٩١٦ - قُوطِحَان الحَقْل *

Calendula arvensis (S). *Souci des champs*, *Fleur de tous les mois* (F). *Field marigold*, *Gools* (E). *Feldringelblume*, *Wilde Ringelblume* (D). *Calendula*, *Calta dei campi*, *Fiorancio* (I).

نبات عشبي بري من فصيلة المركبات يكثر في الحقول

٢٢٩٣٠ - **قَوْسِيَّاتٌ** *
 Delphinapteridae (S).
 Delphinapteridae (F). Delphinapteridae (E).
 فصيلة حيوانات بحرية لينة من مرتبة مثالثات الإنسان
 ورتبة الحفويات || أنواعها المعروفة قليلة تتميز بصغر
 الحمار وبانعدام الزعانف الظهرية || أشهر أنواعها
 وأحمرها القوي والباليوغة .

٢٢٩٣١ - **قَوْسِيَسٌ** *
 Otocoris (S).
 Otocoris, Alouette de montagne (F). Otocoris (E).
 جنس طير من فصيلة القديرات أنواعه قليلة جميعها قاطعة
 تجوب جبال البلاد الآسيوية والأوروبية . تتميز بغزوها
 الرأسية المفارقة التي تبدو كقرنين صغرين || أنواعها متباينة
 الألوان ، ظهرها إلى الريدة الحمراء الخواج يعطيها تميز
 اسمر . بطونها إلى الكهية البدراء . رؤوسها وانحائها موشحة
 بالأسفر || قوتها الحشرات والبزور البرية .

٢٢٩٣٢ - **قَوْلَانٌ**
 Koulan
 هو فرس الهند ، نوع من جنس الوش ، أحليه .

٢٢٩٣٣ - **قَوْلَدٌ زَعْفَرَانِيٌّ** * ، **قَوْلَدٌ زَعْفَرَانِيٌّ**
 Colias croceus (S). Coliade safran, le Souci (F).
 Colias croceus (E).
 حشرة من فصيلة الكرنيبات عرشفيات الاجنحة . موطنها
 المناطق المعتدلة الحارة من العالم القديم . فراشها واثمة
 قوتها عش الزنبار . سرقها تعيش على أوراق فصيلة
 القرنيات القرشاية || جسمها متوسط القد بطول نحو ١٩ م .
 بسطها نحو ٤٨ م . رأسها اسفر اللون . صيها كيرتان .
 زباناها صولجانان . جوشها برتقالي الحلقة الصدرية
 الايل ، اريد الثانية والثالثة . بطنها احمر اللون ، اسمر
 الماوج عند الذكر ، المسع عند الانثى || رؤشها الاماميان
 الى الصغار الزعفراني تملو نقطة سوداء وحيدة كستنية عند
 الذكر ، سوداء اللون عند الانثى . رؤشها الخلفيان الى
 الصغار الزعفراني تتوسطه بقعة حمراء بطولها اطار اسفر
 عند الذكر ، اسمر عند الانثى || لها جيلان في الحبل .
 تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل
 الثاني في آب . تسرح في النهار . تماثل بقعة ظهورها
 بستة اسابيع وتتمتع المكان مباحداً على نصال الاوراق ||
 السرعة تطلي نحو ٤٢ م . جسمها اسطواني الشكل . قوتها
 الى الخضار الاسفر يملو خطان جانبيان اخضران قاطبان
 وعشرة اطواق كستنية وتقطيع شياهد اسود واسفر . رأسها
 اسود . مدنها ورواجبها الى السمرة || طور الاكمال الذي
 يستمر في الجيل الاول نحو ثلاثة اسابيع ، يستمر في
 الجيل الثاني نحو ٢٢ اسبوعاً .

٢٢٩٣٤ - **قَوْلَسٌ** العلم الثاني بين اذني الغرب .

٢٢٩٣٥ - **قَوْسِيَّةٌ** ، **قَوْسِيَّةٌ** ، **قَوْسِيَّةٌ** *
 Salvia (S). Sage (F). Sage (E).
 جنس نباتات برية ورتبينة من فصيلة الشفويات || أنواعه
 نحو ٥٥٠ مظهرها مجلي وبعضها جنبي . منها الحولي
 والحول والمعمر . سوقها خشبية فروعاً سريعة الانقصاص
 اوراقها متقابلة معتقة . ازهارها متباينة الاشكال والاحجام
 والالوان . لاتيامة التجميع والارتكاز || احرف وأشهر
 انواعها البرية والعلبية والرتبينة ما يتبع .

نحو ٨ م . وتعرض نحو ٥ م . رؤسها الزهرية صغيرة
 القد قطرها نحو ٢ م . لسانها متساوية الطول والبرش .
 ضرره عديدة منها الاصفر والابيض . والنجي والبحري .

٢٢٩٣٦ - **قَوْشٌ**
 Milvago (S).
 جنس طير من فصيلة الاثيوريات ورتبة الجوارح - جسمه
 ربع القد ، طوله نحو ٤٠ م . رأسه مستطيل الشكل .
 سقله ضيق مستطيل يذنبه كذلك وهو سرول الفرع ،
 دقيق الخطب || موطنه البلاد الآسيوية والامريكية .
 أشهر أنواعه قوش شيشيا .

٢٢٩٣٧ - **قَوْشٌ شِيْمِيْمَا**
 Milvago chimachima (S). Chimachima (F).
 طائر من القوش ، طوله نحو ٤٠ م . ثوبه الى الصمبة
 الداكنة . قوائم سقله موشة بالابيض . مسمره ازرق
 اللون . رجلاه الى الخضار البحري . مخالبه دقيقة || موطنه
 امريكا الجنوبية . يكثر في البرازيل والشيلى يعيش منفرداً
 الا في زمن الرصد والحضانة || قوته الجيف والزناجات
 والانامي والحشرات على اختلاف اجناسها . اثناء تحضن
 من ٥ الى ٦ بيضات .

٢٢٩٣٨ - **قَوْشٌ**
 Helix (S). Escargot (F).
 هو الحلزون ، أحليه .

٢٢٩٣٩ - **قَوْشٌ**
 Cantharellus (S). Chanterelle (F).
 جنس فطر من فصيلة الفاريفويات . أنواعه قليلة تتميز
 بأطرافها الخارجية اتحاداً المنتظمة التي تكتنف كامل
 المسقلان || احرف أنواعه وأشهرها الاصفر والبرتقالي .

٢٢٩٤٠ - **قَوْشٌ أَصْفَرٌ** *
 Cantharellus cibarius (S). Chanterelle comestible.
 Girolle, G. comestible (F).
 فطر مأكول كبير القد ، يوتي الشكل ، عني الصفار ،
 تحين الصلصة . يتواجد الاطراس .

٢٢٩٤١ - **قَوْشٌ بُرْتَقَالِيٌّ** *
 Cantharellus coronilla (S). Chanterelle orange.
 Girolle orangée, Fausse girolle (F).
 فطر مأكول يكثر ساقاً في بعض الاحيان . مسقلانه
 لتل تجوفاً من مسقلان القويح الاصفر ، لونه الى البرتقالي .
 اطراسه متقاربة الارتكاز حادة الاطراف .

٢٢٩٤٢ - **قَوْشٌ**
 Tetragallus (S).
 Tétragalle, T. du Caucase, T. Caspien (F).
 Tetragallus (E).
 طائر وحيد الجنس والنوع من عمارة الحجلليات وفصيلة
 البليويديات . كبير الجفنة طوله نحو ٦٠ م . ثوبه الى
 الطحلة الريداء الموشة بالاسود والاصهب . متقار اسدب
 اسين . عنقه مطوق الزور ، قوائمه يفيض القواعد سود
 الاطراف ، اتيهك كتيث الريش المستطيل الميضم بالصمبة
 والسود . رصفه ومخالب الى الريدة || موطنه الجبال الريفية
 المنخفضة الاشجار . قوته الاضباب والحروب والسناقل والجفور .
 اثناء تبيض من ١٢ الى ١٦ بيضة تحضنها وحدها .

٢٢٩٤٣ - **قَوْسِيٌّ**
 Narval (F).
 هو حريش البحر ، أحليه .



قوش اصفر



قوش برتقالي



قويس



فرد زعفراني

وارومها خلية زياء. أوراتها يرضية الشكل، نصلها مذهب الطرف سنن الحافة. أزهارها كبيرة القند مستطيلة لونها إلى الحمرة المائلة. توجعها تربر حل أكلمها نحو ست مرات || أزهارها يستمر طوال الصيف.

٢٢٩٤٣ - قُوَيْسَةُ سَمَائِيَّةٌ *
Salvia azurea (S).
Sauge azurée (F).
جنية تريينية سرورية معمرة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقها فراء خلية القند. أوراتها سائبة مقطوعة، نصلها سنن الحافة اخضر اللون يطول من ٦ إلى ٨ سم. أزهارها سليلية التجميع، كبيرة، القند سمجينة اللون. أكلمها لا لياقية الشكل ولقند لونها إلى الخضر المشرب الزرقاء || أزهارها يستمر من تموز إلى تشرين الأول.

٢٢٩٤٤ - قُوَيْسَةُ صِينِيَّةٌ *
Salvia flava (S).
Sauge chinoise (F).
جنية سرورية معمرة فراء تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. أطرافها الصين. أزهارها جندوية التجميع، مشعبة، كبيرة القند، تطول من ٦ إلى ٧ سم. أكلمها إلى أصفر الكبريتي يملو توضيح ابريول || أزهارها يستمر من أيار إلى أيلول.

٢٢٩٤٥ - قُوَيْسَةُ شَمِيَّةٌ *
Salvia verticillata (S).
Sauge verticillée (F). Whorled blue flowered sage
(E). *Quiralsalvei* (D). *Salvia verticillata* (I).
جنية تريينية معمرة. ساقها فراء تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم. أوراتها قليلة الشكل نصلها جامد الصفحة الخشنة الأزراء. أزهارها سنبل التجميع. أزهارها ضيقة متعاقبة مستطيلة القند زرقاء اللون || أزهارها يستمر طوال الصيف.

٢٢٩٤٦ - قُوَيْسَةُ شَيْكَةِ الزَّرَقِ *
Salvia angustifolia (S). *Sauge à feuilles étroites* (F).
جنية تريينية سرورية معمرة. ساقها فراء تملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. أوراتها ضيقة النصل مدية الاطراف تطول من ٤ إلى ٨ سم. وتعرض من ٢ إلى ٤ أزهارها سليلية التجميع، زرقاء اللون، صغيرة القند || أزهارها يستمر من حزيران إلى تشرين الأول.

٢٢٩٤٧ - قُوَيْسَةُ فِصِيَّةٌ *
Salvia argentea (S).
Sauge argentée (F).
جنية تريينية محولة. ساقها فراء مزرية الحاد تملو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. أوراتها كبيرة القند نصلها خلي البشرة على صفحتي يملو كأنه مطلي بالفضة. أزهارها متوسطة الحجم تطول نحو ٤ سم. لونها إلى البياض العاجي يملو مزيج وردي. أكلمها غدية دقيقة || أزهارها يستمر من أيار إلى تموز.

٢٢٩٤٨ - قُوَيْسَةُ قَاسِيَّةٌ * وَ كَثَّةُ الدَّبِ *
Salvia sclarea (S). *Sauge sclérée*, *Sclérée*, *Toutte-bonne*, *Orvale* (F). *Clary* (E). *Mutkatsalvei* (D).
Salvia sclarea, *Matrisalvia*, *Tuttasana* (I).
جنية برية مبدولة معمرة مسكية العرف القواح. ساقها فراء تملو من ٤٠ إلى ١٢٠ سم. أوراتها بسيطة يرضية الشكل، نصلها يطول من ٧ إلى ١٨ سم. ويوحلي البشرة على صفحتي. أزهارها وردية اللون، ليكية المزاج. أكلمها مسنة شاذكة قليلة الخمل || أزهارها يستمر من أيار إلى أيلول.

٢٢٩٤٩ - قُوَيْسَةُ كَثِيرَةُ الزَّهَرِ *
Salvia patens (S). *Sauge à grandes fleurs* (F).
جنية تريينية معمرة. تملو من ٥٠ إلى ٨٠ سم. ساقها

Salvia sylvestris (S).
Salvia de montagne (F). *Wild sage*, *Wood sage* (E). *Waldsalvei*, *Wilde Salvei* (D). *Salvia montana*, *S. salvatica* (I).

جنية برية طيبة مبدولة معمرة. ساقها زياء فراء تملو من ١٥ إلى ٤٠ سم. أوراتها اخليلية نيفة، نصلها جامد الصفحة المسنة اخليلة البشرة. أزهارها جندوية التجميع زرقاء اللون بتسجيم الموج || تكثر في الاراضي الجبلية المخاضة مائلها الصلبة المئوية عديدة ويقال أنها تستعمل في علاجات الفالج.

٢٢٩٣٧ - قُوَيْسَةُ المَرْوَجِ *
Salvia pratensis (S).
Sauge des prés (F).
جنية برية مبدولة معمرة. ساقها فراء زياء دقة تملو من ٥٠ إلى ٩٠ سم. أوراتها يرضية الشكل، قلية القمامة. نصلها متجعج الصفحة، سنن الحافة يطول من ١٢ إلى ١٧ سم. أزهارها جندوية التجميع، زرقاء اللون، بتسجيم الموج، متوسطة القند || أزهارها يحصل حل دفعتين الاول من أيار إلى حزيران والثانية طوال الحريف.

٢٢٩٣٨ - قُوَيْسَةُ بَهِيَّةٌ *
Salvia splendens (S).
Sauge éclatante (F).
جنية تريينية معمرة ترعب في المواقع القليلة الرطبة. ساقها فراء تملو من ٥٠ إلى ١٧٥ سم. أوراتها يرضية مدية نصلها رمل التسجيم الناعم، سنن الحافة، مائل البشرة على صفحتي. أزهارها سليلية التجميع، ياتقوتة اللون تطول من ٥ إلى ٧ سم. || أزهارها يحصل حل دفعتين الاول في الصيف والثانية في الشتاء.

٢٢٩٣٩ - قُوَيْسَةُ ثَلَاثِيَّةُ اللَوْنِ *
Salvia bicolor (S). *Sauge bicolor* (F).
جنية تريينية معمرة فراء تملو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. أوراتها مفردة، مزرية، دقة. أزهارها ثنائية اللون. أقسامها العليا إلى الزرقاة البنفسجية المسنة بالاصفر اللدحي، أقسامها السفلى إلى البياض السوي. أكلمها متوسطة القند، خدية النصل. جندويدا الزهري يطول من ٥٠ إلى ٦٠ سم. || أزهارها يستمر من أيار إلى تموز.

٢٢٩٤٠ - قُوَيْسَةُ حَبَشِيَّةٌ وَ اَيْثْيُوسُ *
Salvia aethiops (S). *Sauge d'Ethiophe*, *Ethiopiennae*.
(F). *Ethiopian sage* (E). *Unгарische Salvei* (D). *Salvia di Candia*, *S. lanata* (I).

جنية برية طيبة معمرة. ساقها فراء زياء تملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. وهي كثيفة الخمل والزغب الصوفي الشكل. أوراتها متوسطة الطول. نصلها خلي الصفحة. أزهارها صندرة القند يفضاء اللون. أكلمها مزرية حادة التنديق. توجعها يطول نحو ٢ سم. || أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز.

٢٢٩٤١ - قُوَيْسَةُ دَيَّاقِيَّةٌ *
Salvia glutinosa (S).
Sauge glutineuse (F).
جنية مبدولة معمرة تكثر في الجبال. ساقها فراء تملو نحو ١٠٠ سم. أوراتها السفلى كبيرة القند تطول من ١٨ إلى ٢٠ سم. نصلها غدي الصفحة. أزهارها تطول نحو ٤ سم. لونها إلى الصفرة الجبلية. أكلمها انبوية الشكل غدية البشرة || أزهارها يستمر من حزيران إلى أيلول.

٢٢٩٤٢ - قُوَيْسَةُ رُضِيَّةٌ *
Salvia elegans (S).
Sauge élégante (F).
جنية تريينية معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. ساقها



قُوَيْسَةُ الْجَبَل



قُوَيْسَةُ المَرْوَجِ



قُوَيْسَةُ صَمِيَّة



قُوَيْسَةُ قَاسِيَّة

٢٢٩٥٧ - **قياس ، تقطيع ، إشتقاق** Grasserie مرض يصيب دودة القز في طورها النهائي أي قبل الصمود على الشجر فينتفخ جسمها ويسفر لوها ويصبح جلدها شفافاً فيفرز مائلاً قروباً يلوث الورق فتضمحل أجسامها الداخلية وتموت . ويمكن لقود المصاب بهذا المرض أن ينسج سلجته ويتحول فيها إلى خادرة ولكنه لا يلدث إن يموت فيصبح مادة فاسدة مائة تعطب الفيلجة .

٢٢٩٥٨ - **قياس** Jockey هو الجركي ، اطلبه .

٢٢٩٥٩ - **قياس** Mesure

٢٢٩٦٠ - **قياس الإرتفاع ، تكديس** Nivellement (F). Levelling (E).
تعيين الارتفاع النسبي لمتخلف أجزاء الشيء .

٢٢٩٦١ - **قياس الأضعة** Actinométrie (F).
Actinometry (E). هو قياس قوة الاضعة .

٢٢٩٦٢ - **قياس التحليل** Acétimétrie (F).
Acetimetry (E). قياس درجة تحليل الخلل أي حوضته .

٢٢٩٦٣ - **قياس الحموضة** Acidimétrie (F).
Acidimetry (E). قياس الحامض مجردة عن مائها .

٢٢٩٦٤ - **قياس الرطوبة ، رزاحة** Hygrométrie (F).
Hygrometry (E). قياس كمية بخار الماء في الجو .

٢٢٩٦٥ - **قياس السكر** Saccharimétrie (F).
Saccharimetry (E). طريقة تعيين مقدار السكر في السوائل والصبغات السكرية

٢٢٩٦٦ - **قياس القلبي** Alcalimétrie (F).
Alkalimetry (E). مرققة مقدار القلي الحقيقي في البوتاس وفسيره .

٢٢٩٦٧ - **قياس الكحول** Alcooolométrie, Alcométrie (F).
Alcoholometry (E). مجموعة الاساليب او الطرائق المتصلة لتحديد مقادير الكحول الموجودة في السوائل او المشروبات الروحية .

٢٢٩٦٨ - **قياس أملاح الماء** Hydrotimétrie (F).
Hydrotimetry (E). قياس مقدار الاملاح الجصية الموجودة في الماء .

٢٢٩٦٩ - **قياسك** Mensuration (F).
Measurement (E). وسيلة استقصاء تستعمل في الطب وفي علم البائع والخبز لتحديد بعض القياسات وتقدير مواقع وأحجام بعض الاعضاء .

٢٢٩٧٠ - **قياسي ، تناسقي** Symétrique (F).
Symmetrical (E). نمت تعريفي يطلق على ما كان منقسم التركيب منسوبه .

٢٢٩٧١ - **قياسية الشكل** Actinomorphe (F).

فرعاه زيا . اوراقها رحيمة الشكل ، نصلها خشن الملس متعرج الختار . ازهارها كبيرة القند زرقاء اللون . اكمامها تطول نحو ٢ سم . وهي خلية البشرة || ازهارها يستمر من آب الى تشرين .

٢٢٩٥٠ - **قُوْسَة كَرْدِيْنَالِيَّة** Salvia cardinalis, S. fulgens (S).
Sauge cardinale (F). جنبة زرقائية معمرة . ساقها متصبغة فرعاه تملو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها بيضيه الشكل قلبية القاعدة تطول نحو ١٢ سم . نصلها جاهد الصفحة خلي البشرة المغل مدب الطرف . ازهارها كبيرة القند ارجوانية اللون سنبلية التجميع تتعاقب على ابعاد متساوية قدرها نحو ٣ سم . ازهارها يستمر من ايار الى تشرين الاول .

٢٢٩٥١ - **قُوْسَة متقابلية الأزهار** Salvia oppositiflora (S).
Sauge à fleurs opposées (F). جنبة برية وزرقائية معمرة تملو من ٣٠ الى ٨٠ سم . اوراقها بيضيه مغنطون تطول من ٢٠ الى ٥٠ سم . وتعرض من ١٥ الى ٤٠ سم . نصلها تحدد الصفحة ، يارز المروق . ازهارها سنبلية التجميع ، متقبالة ، برتقالية اللون . ازهارها يستمر طوال الخريف .

٢٢٩٥٢ - **قُوْسَة مخزلية ، مَرْتِيَّة ،** **أستاس** Salvia officinalis (S).

Sauge officinale, Herbe sacrée, Thé de France, Thé de Grèce (F). Common sage, Garden sage (E). Echta Salbei, Garten Salbei, Salbey (D). Salvia officinale, S. grande, S. cultivata (I). جنبة برية طيبة مهدلة معمرة . ساقها فرعاه زيا تملو من ٢٠ الى ٧٠ سم . اوراقها كاملة ، امليلجية ، اذينية القاعدة . نصلها خلي البشرة على صفحته . ازهارها بتفصية اللون تطول نحو ٣ سم . اكمامها ملونة خلية || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز . وهي تستعمل استهلاك الشاي . نائلها الصعية حديثة .

٢٢٩٥٣ - **قُوْسَة مشدولة** Salvia hians (S).
Sauge béante (F).

جنبة برية جليلة معمرة . ساقها فرعاه خضية لزجة تملو من ٦٠ الى ٩٠ سم . اوراقها لا قياسية الشكل منها البيضية والقلبية والرحمية ، جميعها مستطيلة الاثناك المملانية التي يبلغ طولها نحو ٣٥ سم . نصلها تطول من ١٣ الى ١٥ سم . وهي سبعة الحانة خلية البشرة . ازهارها الى الزرقعة الزاهية ، تومجها بطول نحو ٤ سم . قسما الملوي منقبط الى الخارج يبرز كأنه مشقوق الشفة || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٢٢٩٥٤ - **قُوْسَة مهيبة** هي المردكوش الآخر ، اطلبه .

٢٢٩٥٥ - **قُوْسَة يَابَانِيَّة** Salvia nipponica (S).
Sauge japonaise (F). بجلة بمرقوية فرعاه تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اطلها اليابان . ساقها وفروصيا زيا ، الماء . اوراقها صغيرة القند خلية النصل . ازهارها اسمية الاثناك ، صفودية التجميع ، مستطيلة الشكل ، صفراء اللون . اكمامها رطلة نضفاضة خلية البشرة || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٢٩٥٦ - **قُوْسَة ، قُوْسَة** Sauge (F).
هي القوسية . راجعها .



قُوْسَة مخزلية

ورقق قدر الفروع ونوريتها كثرة البعج يستوق بهوها
وطية . - الواحدة قيسية (السان) .

٢٢٩٨٤ - قيسون * ، قيصوم أنثى ، عيشة
مقدسة

Santolina Chamaecyparissus (S). Santolina, Petit
cypress, Aune femelle (F). Lavender
cotton, Ground cypress (E). Zypressenhellgen-
pflanze, Zypressenkraut (D). Santolina, Abrotano
femina, Crespolina (I).

نبات جنوبي عطري بري معمر من فصيلة المركبات *
ساقه فرماة تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. أوراقه صغيرة
القد ، ضيقة النصل للسنة المزرب البهيرة . ورياساته
الزهري فردية التجميع صغيرة اللقد صفراء اللون || انزهاره
يستمر من تموز الى ايلول .

٢٢٩٨٥ - قيسانة
Lampiris
جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسقمريات . انواعها عديدة
جميعها كبيرة القد ، بيضية الشكل ، صغيرة اللحم والخطم ،
عذبة الاستان ، زرقاء القلوب ، وردية الموانج ، فضية الشبج .
زماقتها الى الحرة القائلة * اطباها بحار البلاد المعتدلة
الحارة . اشهرها قيسانة البدر .

٢٢٩٨٦ - قيسانة البدر *
Lamprie luna (S).
Lampiris luna, Poisson lune, Chrysotos (F). Moon-
fish, Opah (E).

نوع من القيسانة وهي سمكة بحرية حريرة الزيت
المتوسط طولها نحو ١٠٠ سم. ثوبها الى الزرقاء الوردية
الموانج . جانباها مضيان بالفضة .

٢٢٩٨٧ - قيسل *
Pinna (S).
Pinne (F). Pinna (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صليحيات الخياشيم
وصلية الميديات . انواعها المعروفة متوسطة الممد ، بعضها
من سمجيرات الاراضي الجورية والياشيرية والبعض الآخر
متشكر في مطر بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة *
اصداها كبيرة تعلو من ٥٠ الى ٧٠ سم. وهي غروية
الشكل متساوية المصاريع البالغة التحديد الطولي تعلوها
زركشة وزعاويف وخطوط متفرقة متباينة الالوان . داخلها
للؤلؤ المادة وكثيرا ما يوجد في تجويفها لؤلؤ وردية
اللون فاحرة الصفات ثمينة . ينفذها غزير المادة يستعمل
في صناعة القنازات والجوارب وغيرها ، لونه الى الاصفر
المذهب ، ليسج ناعم الخط متينه * تعيش لاسقة
بالصخور على اعماق تراوح من ٤ الى ١٢ م. ثلثها
الحياتي جماعي . مجموعاتها تزد من ٥٠ زويا الى اكثر
من مئتين .

٢٢٩٨٨ - قيصوم
Verge du taureau (F).
Penis of a bull (E).

قصب الثور .
٢٢٩٨٩ - قيصوم * ، ابروفوشون ، ربحان
الارض ، مسك الجين

Artemisia abrotanum, Abrotanum (S). Aune, C
tronnelle (F). Abrotanum, Southern wood, Old
man (E). Ebertraute, Ctronkraut (D). Abrotano,
Ctronnelle (I).

جنبية عطرية طيبة برية معمرة من فصيلة المركبات الانثوية
الزهر . حريفها فواح مستحب . انماها ابيطة الارتكان
عشوية التجميع ذكية اللون عطرية العرف . انزهارها

٢٢٩٧٢ - قيسية ، قيس ، مقايضة

Troc (F). Truck (E).
هي الاستمالة ، من الاعمال الاقتصادية التجارية . تركب
على مبادلة شيء بشي .

٢٢٩٧٣ - قيساط
القياط من الزرع ما زرع في الخريف قبل المطر .

٢٢٩٧٤ - قيسكة
Bathymétrie (F).
Bathymetry (E).

٢٢٩٧٥ - قيسانة
Morphologie (F).
Morphology (E).

القيانة علم هيئة الاجسام الحية وتركيبها . وقد ترجمها
بكلمة مرفولوجية .

٢٢٩٧٦ - قيسالة
Despotisme (F).
Despotism (E).

القائلة الحكم المطلق المستبد النافذ الارادة .

٢٢٩٧٧ - قيسكاره ، سلياتي ، سلتحكة
Lyra, Tortus, Testudo (F). Lyra, Testudo (E).

القيارة والسليات والسلحفاة ثلاثة اسماء لكوكبة نجوم
شامية الميخ . مركزها بين الدجاجة والجاوي . وقد تسموا
بالسلحفاة نظرا لشدته بطء حركتها || حدد نجميها ٢١
منها * والنسر الواقع * الذي يعتبر من المراتب الاولى وقد
شبهه العرب بنسر ضم جناحيه الى نفسه كانه واقع على
شيء . وقدم النسر الواقع نجم صغير تسميه العرب * الاقمار *
علم الفلك يقولون ان النظام الشمسي يتجلب ببطء نحو
النسر الواقع .

٢٢٩٧٨ - قيسد ، كقييد
Inscription (F).
Inscription, Registry (E).

٢٢٩٧٩ - قيسر
Polx (F).
هو القطارن ، اطله .

٢٢٩٨٠ - قيسر كاط
Carat
حصة توازي واحداً من اربعة وعشرين . وهو في بعض
المعادن الثمينة اخمصها للذهب يبر من مقدار الذهب
الصف . فالذهب حيار ٢٤ هو الذهب الخالص من كل
جرم غريب وللذهب حيار ١٨ مثلاً هو ما شغل ١٨ جزءاً
من الذهب الخمر وستة اجزاء من غير الذهب || والقيراط
يساري في وزن الحبارة الكريمة كاللأس ما قدر :

في فرنسة ٥,٢٠٥٩ غرام
في انكلترا والمانيا ٥,٢٠٥٥ غرام
في البرازيل ٥,١٩٢٢ غرام

٢٢٩٨١ - قيسراط
Quirat
هو نصف دانق . كان وزن حبة غروب . والدرج

الثنا حشرة حية . وهو في الحجاز ربع مس ديتار وفي
البراق نصف حشرة || وقد استعمله في المسألة في مرض
الاصبح || وقد جعلوه دستوراً في الحساب فقسوا التجزئات
الى اربعة وعشرين قيسراطاً .

٢٢٩٨٢ - قيسانة
Muscar botryoides (F).


هي الخليل الجليل ، اطله .
٢٢٩٨٣ - قيسب
نجر من الخمس . وهو شميرة تلبت خيوطاً من اصل واحد



قيسون



قيسانة البدر



قيسل



قيصوم

المائة . يلاصقها عادة الحاطم القرنية والأستان الشفوية . لكنها مزودة بلولاس مستطيلة تملو زوايا الاتحاد || فيها أنواع تموش وتتكاثر في الأكواريوم ، أحصاها قيطم لغيس (Xenopus laevis) .

٢٢٩٩٨ - قَيْبَم هو السنور .

٢٢٩٩٩ - قَيْبَمِين Cheilanthes (S). Chéilanthe (F). جنس سراخس من البسباجيات . أنواعه نحو ٣٠ أصلها مختلف مناطق العالم أحصاها الاستوائية وألحارة .

٢٣٠٠٠ - قَيْبَكَتْس Céphalanthé (F). هو الرأسية ، أطلها .

٢٣٠٠١ - قَيْبَاوُس Cephé (F). Cephus (E). كوكبة نجوم شمالية الموقع . مركزها بين الدجاجة والتنين وذات الكبري . عدد نجومها ٢١ || والعرب تسمي النجم الذي على الصدر « النثرة » والذي على الكتف الأيمن « الفرقة » . والنثرة التي تحصل من نجوم ذراعها وما هو خارج ضبا « القدر » . والذي على الرجل اليسرى يدعى « الراعي » . والنجوم الصغار الموجودة بين الرجلين تدعى « الأغانم » .

٢٣٠٠٢ - قَيْبَه Physionomie (F). Physiognomy (E). هي مجموعة التقاطح والملامح والقبسات الفارقة التي تميز بين شيء وشي .

٢٣٠٠٣ - قَيْبُوع نبتة ذات ثمرة في قرون وهي ذات ورق وفصنة تثبت بكل مكان (السان) .

٢٣٠٠٤ - قَيْبِي * ، زُرِّيَاب Garrulus lanceolatus (S) Gesi lanceolé (F). Jay (E). طائر من الزرياب وفصيلة الغرابيات . يألف القفص فيقتبس الأصوات ويردها . وهو طائر مؤلف غار . شكله كالبومة ، جسمه يطول نحو ٢٥ سم . أصدا الثوب . اسود الرأس . أزرق الزنكي . مجزج الجناحين والذنب بخطوط متراكبة السوداء والزرق والبيضا || قوته الحبوب والآثار البانعة ويختلف أنواع الصائير الصغيرة ويضيها وفراخها والمظا والحشرات الكبيرة والصغيرة || يدن في الأشجار الحرجية اللظيلة ، أثناء تقع من ٤ إلى ٦ بيضات تحضنها ١٦ يوما .

٢٣٠٠٥ - قَيْبَب هو القوقا ، أطلها .

٢٣٠٠٦ - قَيْبَب ، أَسْفَنْدَان Acer (S). Erable (F). Maple-tree (E). جنس اشجار حرجية وزرئية من فصيلة القيتيات . أنواعه نحو ١٨٠ منها الكبيرة القد والصغيرة . جميعها حسنة المهيكل والقالب . سكرية الصمارة . أوراقها متعاقبة ، لا قياسية الشكل ، مسطحة حایل وبضها أيد . أزوارها مختلفة التجميع والألوان ، غزيرة الريح ، يحرمها التحل . ثمارها جناسية مركبة من جناسيتين ملتصقتين || أعرف أنواعه أشدها ١٠ تنه

يدوم من تموز إلى آب . ثمارها لينة صغيرة تشبه حب الآس ، طعمها مر ، وأمتها ذكية . يقال أنها مضادة للحيمات وثلاثة تحفظ أوجاع الصدر وضيق النفس والمفاصل . ويمن من قال أنها من اللقويات وقد تستعمل أيضا كطاردة للديدان || أما اسم مك الجبل فيطلق على عدة نباتات أحصاها القيصوم والشفرور والزريرج والورام وحشيشة الريح .

٢٢٩٩٠ - قَيْصُوم أَنْثَى Santoline (F). هو القيصون ، أطلها .

٢٢٩٩١ - قَيْصُوم جَيْبَكِي Achillée suave (F). هو الإغاليا المنشرة ، أطلها .

٢٢٩٩٢ - قَيْصُوم طَبِي Armoise antonique (F). هو الشج الخراساني ، أطلها .

٢٢٩٩٣ - قَيْصُوم كَانُفُورِي * ، مُسِيَكَة Artemisia camphorata (S). Armoise camphrée, A. dorée (F). Gold wormwood, Rock wormwood (E). Wermut (D). Assenzio salvatico (I). نبات عشبي طبي يرمي من المركبات الانبوية الزهر . ساه فراع تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم . أوراقه متفكة صغيرة الله ، خدية النصل . رويحاته الزهرية خلية القناب ، ذهنية اللون ، عشقودية التجميع ، كافورية البرم المستحب . انثراره يستمر من تموز إلى آب .

٢٢٩٩٤ - قَيْش Coquille d'oeuf (F). Egg-shell (E). القشرة العليا أي الخارجية البايسة على البيضة أما القشرة الداخلية فتسمى الفرو .

٢٢٩٩٥ - قَيْشَايَا Noisetier de Turquie (F). هي البندق التركي ، أطلها .

٢٢٩٩٦ - قَيْشَس ، قَيْشُوس Baleine (F). Cetus (E).

كوكبة نجوم جنوبية كثر على خط الاستواء وتمتد جنوبي برج الحمل وبرج الحوت . وهي على صورة حيوان بحري مقدمه في ناحية المشرق ويؤخره في ناحية المغرب || عدد نجومها ١٠٢ والعرب تسمي الكواكب التي في الرأس « الكفك الجلاء » ومنها ثدي يدعى « المنقب » . وتسمى الخمسة التي في اواسط الثدى « الثمامات » . والتي على اصل الذنب « النظام » . والتي على الشعبة الجنوبية من الذنب « الضفدع الثاني » . والتي على الشعبة الشمالية « ذنب قيطس الشمالي » . وفي حق قيطس نجم يدعى « الاصورية » أو « اصورية قيطس » لان جسمه يتحول في أثناء مداره من المرتبة الثانية الى الثالثة ولان لونه يتحول ايضا من الاحمر الى الاصفر .

٢٢٩٩٧ - قَيْطَم * Xenopus (S). Dactylète (F). Xenopus (E).

جنس سفادون من فصيلة الليليات عاداته اللسان . أنواعه المعروفة قليلة العدد مهدا بعض المياه الافريقية أحصاها مياه المناطق الاستوائية || أجسامها صغيرة تطول ٧ إلى ١٠ سم . رؤوسها مستطيلة . عيونها عادية الاجفان . كوكبها العليا عادية الانسان . اصابع قوائمها الالامية عادية الخطاب اما الخلفية تكاملة الخطاب والثلاث الداخلية منها مفردة الاطراف بالاعاد قرنية المادة تهر كاتال . انثاء ١٠ سم ٧٠٠ حصلة تلعقها مائعات



قيصوم كانفوري



قيطم



قيت

صفحة ثلاثية العروق ، بحرية اللون ، زيتية الملمح .
أزهارها خضراء اللون . تنور في شهر شباط .

٢٣٠١٣ - قَيْبٌ تَقَرِي Acer tataricum (S). Erable de Tartarie (F).

شجرة حرجية سبروتية تملو نحو ٨ أمتار . مهادها آسية الصغرى ، أوراقها عابلة منقطة . نصلها بيضي الشكل ، قلبي للقلعة ، مدب الطرف ، مسن الحافة ، أزغب الصفحة السفلى ، باهت الخضار . أزهارها عذقية التجميع ، خاسية البتلات البيض جناسياتها متوازية المشافر . تنور في أيار .



قَيْبٌ حَبَرِي

٢٣٠١٤ - قَيْبٌ ثَلَاثِي الْأَجْزَاءِ Acer trifidum (S). Erable trifide (F).

شجرة حرجية وريدينية جادسة تملو نحو ٥ أمتار . مهادها اليابان . أوراقها عابلة منقطة ثلاثية التفتصيص . نصلها اسفيني الشكل لامع الصفحة الخضراء . أزهارها عذقية التجميع ، فستقية اللون ، جناسياتها متصالبة المشافر . تنور في أيار .

٢٣٠١٥ - قَيْبٌ جَمِيزِي * و جَمْرَمَشَقِي Acer pseudoplatanus (S). Erable sycomore, Faux platane, Grand érable (F). Graat maple, Sycamore maple, Mock-plane (E). Bergahorn, Falscher platane (D). Acero ilicco, A. slcomoro, A. fico, Mollacero (I).

شجرة حرجية جبلية مبدولة تملو من ١٥ إلى ٤٠ م . أوراقها عابلة منقطة ، ثلاثية أو خماسية التفتصيص ، تقوّل وتقرس من ١٠ إلى ١٥ سم . نصلها مائل البشرة على صفحته وهو أخضر العليا بحري للسفل ينشع ثم يحسر في الخريف أو أزهارها عذقية التجميع متدلية . جناسياتها متبادعة المشافر ، حادة الزوايا . تنور من نيسان إلى أيار .



قَيْبٌ مَقَلِي

٢٣٠١٦ - قَيْبٌ حَقَلِي * و شَجَرَةُ التَّرْبِ Acer campestre (S). Erable champêtre, Auzerole (F). Bird's tongue, Dog oak, Maple tree, Master tree (E). Angerbinbaum, Feldahorn, Maszholder (D). Acero campestre, Averiello, Ceppolo (I).

شجرة سبروتية مبدولة تملو من ١٥ إلى ٢٠ م . ساقها مغلقة اللحم . أوراقها عابلة منقطة صغيرة اللد ، ثلاثية أو خماسية التفتصيص . نصلها جابد الصفحة ، مبسر الحمل ، أخضر اللون . أزهارها عذقية التجميع خضراء اللون . جناسياتها أفقية المشافر . تنور من نيسان إلى أيار .

٢٣٠١٧ - قَيْبٌ دَلْبِي * Acer platanoides (S).

Erable plane, E. platane, Plane (F). Norway maple (E). Spitzahorn, Norwegischer ahorn (D). Acero platano, Amliacero, Acero riccio (I).

شجرة حرجية مبدولة تملو من ١٥ إلى ٣٠ م . أقطابها البلاد الباردة . ساقها ملساء ، صانارتها لبينة . أوراقها ثلاثية التفتصيص تقوّل من ٨ إلى ١٨ سم . وتقرس من ٩ إلى ٢٥ سم . نصلها مائل البشرة مدب الطرف . أزهارها عذقية التجميع صفراء اللون . جناسياتها أفقية المشافر . تنور من نيسان إلى أيار .



قَيْبٌ دَلْبِي

٢٣٠١٨ - قَيْبٌ رَاحِي Acer palmatum,

A. polymorphum (S). Erable palmé (F). شجرة حرجية وريدينية تنفر من الأربة الكلسية . مهادها الصين واليابان . تملو من ٥ إلى ١٥ م . أوراقها عابلة ،

٢٣٠٠٧ - قَيْبٌ أَنْيَضُ Acer saccharinum, A. dasycarpum (S). Erable blanc,

E. tendre (F). Silver leaved maple, White maple (E). Silber-ahorn, Weissler Ahorn (D). Acero blanco (I). شجرة سبروتية حرجية وريدينية تملو من ١٠ إلى ٣٠ م . أوراقها عابلة منقطة ثلاثية أو خماسية التفتصيص . نصلها يعطو من ٦ إلى ١٥ سم . ويرعس من ١٤ إلى ١٤ صفته العليا باهتة الخضار ، صفته السفلى خلية البشرة ، غبراء اللون ، بيضاء الملمح . أزهارها عذقية التجميع ، صفراء اللون ، عادمة البتلات . جناسياتها كبيرة اللد متبادعة المشافر طولها يراوح من ٥ إلى ٧ سم . تنور من شباط إلى نيسان .

٢٣٠٠٨ - قَيْبٌ أَحْمَرُ Acer rubrum (S).

Erable rouge, E. femelle (F). Red flowered maple, Swamp maple (E). Roter ahorn, Virginischer ahorn (D). Acero rosso (I).

شجرة سبروتية حرجية وريدينية ، مهادها أمريكية الشمالية . تملو من ١٠ إلى ٢٥ م . أوراقها عابلة منقطة ثلاثية أو خماسية التفتصيص . نصلها يطوّل ويرعس من ٥ إلى ١٥ سم . صفته العليا مائلة البشرة ، زاهية الخضار ، صفته السفلى خلية البشرة ، أزهارها عذقية التجميع حراء اللون ، جناسياتها حر الأهن ، متبادعة المشافر . تنور من آذار إلى نيسان .

٢٣٠٠٩ - قَيْبٌ لَوْدِي Acer griseum (S).

Erable gris (F). شجرة حرجية وريدينية مهادها الصين . تملو من ١٠ إلى ١٧ م . أوراقها مركبة ثلاثية الوردقات . نصلها بيضي الشكل ، ذرب الطرف يعطو من ٥ إلى ٦ سم . وهو مسن الحافة ، خلي الصفحة السفلى . أزهارها متدلية ثلاثية أو خماسية التجميع ، مهدبة التجمعات والبتلات . جناسياتها خلية البشرة متبادعة المشافر . تنور في أيار .

٢٣٠١٠ - قَيْبٌ الْيَابَانُ Acer japonicum (S).

Erable du Japon (F). شجرة وريدينية سبروتية مهادها اليابان . تملو نحو ٥ أمتار . ساقها ملساء اللحم ، فروعها مستطيلة ، مستنقة ، جيوية اللون . أوراقها عابلة منقطة خاسية أو سباعية أو تساعية التفتصيص . نصلها مسن الحافة ، مائل البشرة ، أخضر اللون ، مذهب الملمح ، يحسر في الخريف . أزهارها عذقية التجميع حراء اللون . جناسياتها متوازية المشافر . تنور في أيار .

٢٣٠١١ - قَيْبٌ أَمْرَطُ Acer glabrum (S).

Erable glabre (F). شجرة حرجية جادسة تملو من ٧ إلى ١٣ م . أوراقها عابلة منقطة ثلاثية التفتصيص ، عنها جيوي اللون ، نصلها يطوّل ويرعس نحو ٧ سم . صفته العليا لامة البشرة شديدة الخضار ، صفته السفلى خلية غبراء . أزهارها عذقية التجميع . جناسياتها متبادعة المشافر . تنور في أيار .

٢٣٠١٢ - قَيْبٌ إِمْلِيَجِي الرَّقِ Acer oblongum (S). Erable à feuilles oblongues (F).

شجرة حرجية سبروتية تملو نحو ١٨ م . مهادها الصين . أوراقها عابلة منقطة . نصلها حاد التفتصيص ، إمليجي الشكل يعطو من ١٥ إلى ٢٠ سم . ويرعس من ٥ إلى ٦ سم .

ويمرض من ٩ إلى ١٢ سم. وهو مسن الحافة، خلى الصفحة السفلى، يصفر ويحمر في الخريف. جناحياتها مستطيلة الاذن متوازية المشافر. تنور في نيسان.

٢٣٠٢٥ - قَبْ كَبِير الرَوَّك

Acer macrophyllum (S). Erable à grandes feuilles (F).

شجرة حرجية جاذبة تملو من ١٨ إلى ٢٥ م. أوراقها عابطة متفخة خاسية أو سباعية التفصيص تطول نحو ٣٥ سم. وتعرض نحو ٢٥ نصلها لامع الصفحة العليا الخضراء اللون، أزغب السفلى. أزهارها عنقودية التجميع، متدلية، فصلها وادنها خلية البشرة. جناحياتها متوازية المشافر الزباء. تنور من نيسان إلى أيار.

٢٣٠٢٦ - قَبْ عُرَالِي الرَوَّك

Acer negundo, *Negundo fraxinifolium* (S). Erable à feuilles de frêne (F).

شجرة حرجية وزينية مهدا امريكة الثنائية تملو من ١٥ إلى ١٥ م. أوراقها مركبة زرية التجميع. وريقاتها خمس اوسع، نصلها لا قياسية الشكل تطول من ٥ إلى ١٣ سم. لونها ال الخضار الجميل اللامع يملو توضيح اصفر ابيض. أزهارها عنائقة مستطيلة متدلية. جناحياتها متساوية المشافر الدقيقة المستعرضة. تنور في نيسان.

٢٣٠٢٧ - قَبْ عُسْدِير الرَوَّك

Acer circinnatum (S). Erable à feuilles rondes (F).

شجرة حرجية وزينية تملو من ٨ إلى ١٢ م. فروعها وفانها الى الجورة. أوراقها عابطة، مسنقة، ثلاثية التفصيص. نصلها مستدير الشكل قطره نحو ١٠ سم. صفحته خضراء اللون، خلية العروق، مسنقة الحافة، تحمر في الخريف. أزهارها حلقية التجميع، متدلية. فصلها الى الحفرة. بتلاتها الى البياض. جناحياتها صغيرة اللد شبه مستديرة. تنور في أيار.

٢٣٠٢٨ - قَبْ مِلْوان

Acer opalus (S). Erable opale, Duret, Aysle (F).

شجرة سريرية مبدولة تملو من ٨ إلى ٢٥ م. أوراقها عابطة ثلاثية التفصيص. نصلها بيضي الشكل، مستدير الطرف، مسن الحافة، بارز العروق المتتامة. أزهارها حلقية التجميع. جناحياتها متبادلة المشافر. تنور من نيسان الى أيار.

٢٣٠٢٩ - قَبْ مِيَاي

Acer mizabel (S). Erable de Miyabe (F).

شجرة حرجية تملو نحو ١٢ م. مهدا اليابان. ساقها مغلقة الحما. أوراقها عابطة ثلاثية التفصيص. نصلها بيضي الشكل، مستدير الطرف، مسن الحافة، بارز العروق المتتامة. أزهارها حلقية التجميع. جناحياتها خلية البشرة. تنور من أيار الى حزيران.

٢٣٠٣٠ - قَبَيَات، أَسْدَات كَبِيرَات

Aceraceae (S). *Acéracées*, *Acérinées* (F). *Aceraceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة التمثالات. اجناسها وانواعها عديدة اشهرها القريب || جميع نباتاتها شجرية. اغصانها صناعية مروقة يكثر فيها اللون الاحمر.

متفخة، خاسية أو سباعية التفصيص. نصلها جامد الصفحة، راسي الشكل، اخضر اللون، ملعب الملاج. أزهارها حلقية التجميع حراء اللون. تنور في أيار.

٢٣٠١٩ - قَبْ رُبَاعِي الأجزاء

Acer tetramerum (S). Erable tétramère (F).

شجرة حرجية سريرية تملو من ٥ إلى ٨ امتار. مهدا الصين. أوراقها عابطة متفخة بيضية الشكل. نصلها يطول من ٥ إلى ٨ سم. ويمرض من ٣ الى ٥ صفحته السفلى خلية البشرة، خاسية العروق البارزة، حثاره مزدوج التسنين. أزهارها حلقية التجميع، رباعية الاجزاء والبتلات الخضر. تنور في أيار.

٢٣٠٢٠ - قَبْ زُرْغُورِي الرَوَّك

Acer crataegifolium (S). Erable à feuilles d'aubépine (F).

شجرة حرجية تملو نحو ٨ امتار. مهدا اليابان. أوراقها عابطة متفخة، نصلها ثلاثي التفصيص مسن الحافة يطول من ٤ الى ٨ سم. ويمرض من ٣ الى ٦ سم. وهو اخضر الصفحة العليا، بحري السفلى، يحمر في الخريف. أزهارها حلقية التجميع لونها الى الخضار القسقي. جناحياتها مستقيمة الزوايا. تنور في أيار.

٢٣٠٢١ - قَبْ سَكْرِي

Acer saccharum, *A. barbatum* (S). Erable à sucre, E. dur (F). Hard-maple, Rock-maple, Sugar-maple (E). Zuckernhorn, Zucker massholder (D). *Acer* *zuccherino*, *A. del Canadie* (I).

شجرة سريرية داتحة تملو من ٣٥ الى ٤٥ م. ساقها ملساء، عصارتها غزيرة للمادة السكرية. أوراقها عابطة، متفخة، ثلاثية التفصيص، تطول من ١١ الى ١٥ سم. وتعرض من ١١ الى ١٦. نصلها مائل البشرة، ملعب الطرف، اخضر الصفحة العليا، بحري السفلى، يحمر في الخريف. أزهارها حلقية التجميع، غبراء اللون. جناحياتها أفقية المشافر. تنور من نيسان الى أيار.

٢٣٠٢٢ - قَبْ سَكْمِي الرَوَّك

Acer distifolium (S). Erable à feuilles de cissus (F).

شجرة سريرية زينية مهدا اليابان تملو من ١٥٥ الى ٣٠٠ م. أوراقها مركبة، زرية التجميع، لاقياسية الحد. وريقاتها غريبة الشكل تطول نحو ٨ سم. نصلها مائل البشرة على صفحته، مسن الحافة. أزهارها خلية رباعية الفصل والبتلات. جناحياتها صغيرة اللد، متبادلة المشافر. تنور في أيار.

٢٣٠٢٣ - قَبْ شَرْمِي الرَوَّك

Acer caprinifolium (S). Erable à feuilles de charme (F).

شجرة حرجية سريرية تملو من ٥ الى ٨ امتار. مهدا اليابان. أوراقها عابطة متفخة. نصلها لامع الصفحة المحبوة المسنقة الحافة، بارز العروق التي يراوح حددها من ١٦ الى ٢٥ زوايا. أزهارها عنقودية التجميع متدلية، رباعية البتلات الخضر. جناحياتها مستقيمة المشافر. تنور في أيار.

٢٣٠٢٤ - قَبْ شَطَانِي

Acer diabolicum (S). Erable diabolique (F).

شجرة جاذبة مهدا اليابان تملو من ٦ الى ١٥ امتار. أوراقها عابطة، مسنقة، ثلاثية التفصيص. نصلها يطول

Hématocèle (F).

Haematocèle (E).

ورم يسببه ارتشاح الدم في بعض أجزاء الجسم .

Despotique (F). Despotie (E).

تمت تعريفي يطلق على كل ما هو استبدادي أو تصفي .
كقولك سلطة قبلية أو حاكم قبلي .

Curateur (F).

Guardian, Trustee (E).

هو الذي يمين لإدارة ماله المحجور عليه أو لإدارة شؤون القاصر .

Valeur (F). Value (E).

هي من الشيء أو قدره أي ما يقوم مقامه . ج قيم ، والقيمة تستعمل في تمايز مدينة . أشهر صيغها ما يلي :

Valeur locative (F).

Valeur déclarée (F).

Valeur vénale (F).

Valeur agréée (F).

Valeur fournie (F).

Valeur mobilière (F).

٢٣٠٣٦ - قِيَمَة دَمَوِيَّة

٢٣٠٣٧ - قِيَمِيَّة

٢٣٠٣٨ - قِيَم

٢٣٠٣٩ - قِيَمَة

قيمة مصرحة ، قيمة مينة

قيمة تتعامل بها

قيمة معتمدة

قيمة مقدمة

قيمة متوقلة

Coquillière (F). Conchiferous (E). قِيَمَة

قشرة اليفعة الرقيقة الداخلية تغلف البياض تحت القيش ج قيق .

Tson des bœufs (F). Ox-fly (E). قِيَمِيَّة

ذباب مؤذية من التهرات . أضافها تلص البقر ولا تمت من الخليل والحخير ، وأرجع نمرة البقر .

٢٣٠٣٣ - قِيَمِيَّات

Cuculidæ (S).

Cuculidæ, Cuculés (F). Cuculidæ (E).

نصيلة طير من رتبة القشقات . اجناسها وأزواجها مدينة تجمع إلى ثمان صائر ، أشهرها البوقريات . أصلها العالم . تألفت الإحراج الكثيفة . معظمها من القواطع التي تجوب البلاد في طلب الحصيد والمشي . قرتها الحشرات والذويات وهي لا تحسن بيضها ولا تترك فراغها .

٢٣٠٣٤ - قِيَمِل

Despote (F). Despot (E).

الذي له الحكم المطلق التصرف المستبد .

٢٣٠٣٥ - قِيَمَة

Hydrocèle (F).

هي الأذرة ، أظها .

جدول ١

القيمة الغذائية في لتر واحد من الحمار المدروجة ادناه

قيمة غذائية

النوع	خلاصة جافة	حماض ^(١)	سكر منحل	سكروز	بروتين	سرعة
	غ	غ	غ	غ	٦,٢٥ × ن	(وحدة حرارية)
اجاص	١٧٢	٢,٧	٩٠	١٣	٣,٥	٥٦٧
اناس	١٦٠	٦,٧	٣٥	٧٥	٤,٣	٥٩٥
برتقال	١٥٧	١٣,٥	٦٠	٢٥	٤,٨	٥٨٠
فراخ	١٦١	٦,٥	٨٣	١٦	٤,١	٥٧٠
تين	٢١٥	٠	١٥٨	٠	٧,١	٧٤٥
عنوج	١٩٦	٩,٥	٧٥	١٨	٥,٦	٧١٨
عنوج زكلود	١٨١	١٢,٥	٦٥	٣٦	٦,٥	٧٠٤
دراق	١٧٣	٨,١	٣٥	٤٢	٥,٨	٦٠٨
سفرجل	١٨١	٩,٣	٦٧	٦	٤,٨	٥٨٥
شمشون توت	١٥٠	٨,٦	٥٥	٤,٧	٥,٠	٤١١
شيك (فراولة)	١٤٦	١٨,٤	٥١	٧	٧,٤	٤٣٣
عنب	٢٠٩	٧,٧	١٥٠	٠	٤,٨	٥٥٧
فام احمر	١٦٣	١٩,٨	٨٢	٥,٣	٧,٦	٥٦٠
فام أصي	١٦٤	٨,٥	٥٤	٢,٢	٣,٧	٥٢٧
كرز	١٨٣	٦,٨	١٠١	٥,٧	٤,٩	٦٨١
كشمش شاك	١٤٥	١٩,٠	٥٥	٤,٨	٤,٩	٤٤٥
كشمش هنودي	١٦٢	٢٣,٠	٥٠	٢,٤	٦,٦	٤٤٠
ليمون حامض	١٧٤	٥٤,٠	٣٠	٣٠,٠	٥,٦	٥٧٥
شمش	١٤٨	١٢,٧	٣١	٣٦,٠	٦,٧	٥١٦
موز	٢٦٢	٣,٨	١٠٨	٨٩,٠	٨,٩	٩٧٠

(١) الحماض التي تدل على تركيب الحمار مدينة . لا مجال للكروما الفركية . انشها انشاسي ثم القبطي ثم الطرزي الموجود في العنب .

جدول ٢
القيمة الغذائية في أشهر البقول وفي بعض اثمار الجافة^(١)

النوع	ماء %	مواد معدنية %	بروتين %	مواد دسمة %	خلوصيد %	عدد السعرات في كيلوغرام واحد
باريل غصراء	٧٨	٠,٨٠	٤,٧٠	٠,٣٠	١٠,٤٠	٦٥٠
بصل	٨٨	٠,٦٠	٠,٦٠	٠,٠٧	٦,٢٠	٢٨٩
بطاطا	٧٥	١,٠٠	١,٥٢	٠,٠٧	٢٠,٧٠	٩١٨
بندورة	٩٣	٠,٥٠	٠,٧٠	٠	٢,٢٠	٢١١
ثوم	٦٤	١,٤٠	٣,٤٠	٠,٠٣	١٧,٤٠	٨٥٤
جزر	٨٨	٠,٧٠	٠,٧٧	٠,١٣	٦,٩٠	٣٢٥
حمص (جافة)	١٤	٢,٨٠	١٦,٣٠	٠,٦٠	٤٤,٧٠	٢٥٦٠
خرشوف	٨٦	١,٣٠	١,٣٠	٠,٠٥	٥,٥٠	٢٨١
شعير	٩٢	١,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٧	٣,٠٠	١٨٩
عيار	٩٥	٠,٤٠	٠,٤٥	٠,١٠	٠,٧٠	٥٩
دبق زراعي	٨٠	١,٠٠	٠,٥٠	٠,٢٠	٩,٨٠	٤٤٥
سبانخ	٩٣	١,٩٠	١,١٠	٠,١٠	١,١٠	١٠٧
سرفل لقي	٦٥	١,٧٠	١,٩٥	٠,١٦	١٨,٤٠	٨٣٨
سلق	٩٢	١,٦٠	١,٢٠	٠,٢٠	١,٩٠	١٤٧
شمام	٩١	٠,٥٠	٠,٦٠	٠,٠٨	٥,٣٠	٢٥٠
شندر سكري	٨٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,١٠	١٥,٤٠	٦٧٩
سوجا (جافة)	١٠,٢٠	٥,٢٠	٢٣,٦٠	١٧,٢٠	٢٣,٠٠	٣٥١٤
عسل (جافة)	١٢,١٠	٣,٠٠	١٨,١٠	٤٤,٦٠	٢١,٣٠	٢١٣٠
فاصوليا (جافة)	١٤	٣,١٠	١٨,٠٠	٠,٥٠	٤٠,٢٠	٢٤٣٠
فجل	٩٣	٠,٧٠	٠,٩٠	٠,١٠	٣,٢٠	١٧٦
لست عبيد	٧,٥٠	٢,٤٠	١٩,٣٠	٤٠,٠٠	١٣,٢٠	٥٠٦٠
فول أخضر	٨٢	٠,٨٠	٤,٣٠	٠,٢٠	٧,٤٠	٥٠٢
قرع	٩٠	٠,٧٠	٠,٥٠	٠,٠٧	٤,٢٠	٢٠٢
قرنيط	٩٤	٠,٨٠	١,٢٠	٠,١٧	٣,٠٠	١٨٩
كرات أندلسي	٧٥	٠,٥٠	١,٣٠	٠,٠٥	١٧,٠٠	٧٥٥
كرات معروف	٨٨	١,٢٠	١,٤٠	٠,١٥	٤,٣٠	٢٤٩
كرنس	٩٠	١,٤٠	٠,٥٠	٠,١٧	٤,٣٠	٢١٠
كرب	٩٠	٠,٧٠	٠,٦٠	٠,١٠	٤,٠٠	٢٠٠
لفت	٨٩	٠,٧٠	٠,٧٠	٠,١٠	٤,٩٠	٢٣٦
لوبيا غصراء	٨٩	٠,٧٠	١,٣٠	٠,١٠	٤,٢٠	٢٣٤
ملفوف	٨٠	١,٥٠	٢,٤٠	٠,٤٥	٦,٨٠	٤٢٠
هليون	٩٤	٠,٦٠	١,٠٠	٠,٠٧	١,٦٠	١١٠
هدب (طرخشقون)	٨٥	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٢٠	٦,٣٠	٢٥٠
بنادق	٧,١٠	٢,٥٠	١٢,٢٠	٥٦,٣٠	٦,١٠	٦٠٢٦
جوز	٧,٢٠	١,٦٠	١١,٧٠	٥٢,٦٠	١١,٠٠	٥٨٢٤
فستق	٧,٠٠	٢,٠٠	١٣,٥٠	٥٠,٢٠	١٠,٥٠	١٠٠٦٠
لوز	٦,٣٠	٢,٣٠	١٥,٠٠	٤٧,٨٠	١١,٢٠	٥٥٢٠
كستناء	٤٧,٥٠	٢,٠٠	٤,٣٠	٣,٧٠	٣٣,٥٠	١٩٠٠

(١) القيم الغذائية المدونة في الجدولين ١ و ٢ هي قيم مرجعية لا تعمل نيا كقشور والبلود.

مستطيلة ذرية . ألوانها متراكبة الاولان || تألف الغابات ويجاري الماء . قوتها العطاء والحشرات اخصها الجراد . تنم في تجاويف الاشجار . انثاها تضع من ٣ الى ٤ بيضات مستديرة الشكل تحضنها بمناوبة الذكر .

٢٣٠٤٦ - **كيون الجبل** (F). Cuon de montagne
حيوان مفترس يهوى شغل التلال ، اطلقه .

٢٣٠٤٧ - **كيون الغاب * كيون إزميرلي**
Halcyon smyrnensis (S). Halcyon de Smyrna (F).
Halcyon (E).

طائر من المازوريات . موطنه يمتد من الشرق الاوسط الى الهند وسيام وجزر التاييب . اعطاه اليناثية تشدل بعض الرياض وصفات الانهر في فصل الخريف || جسمه متوسط القد ، منكش الشكل . طوله نحو ٢٢ سم . وبسطه نحو ٢٨ سم . ثوبه متراكب الالوان . رأسه وصفته وخوشاء ويصل الى الكتفاني الداكن . زوره وأصل صدره الى البيضاء . رذاه وظهوره وصغره الى الزرقاء الخضراء . جناحه متراكب الازرق والاخضر والاسود والكتفاني والابيض . قوائمه الى الزرقاء الخضراء . كلاله الى السمرة القاتمة . اياهره الى السمرة المنطية . مناجبه مجذعة بالابيض عيشه كبيرتان . حقة عيشه صناعية . متقاده كبير الجرم . مستطيل الشكل ، محذوب الفك الاسفل ، احمر اللون . ساقاه الى الجلوة وصفه قصيرة سردة القشار || تألف الغابات والرياض ويجاري الماء . قوته العطاء والحشرات اخصها السحالي والجنادب والجراد || يدن عيشه في تجاويف الاشجار . الانثى تضع من ٣ الى ٤ بيضات كروية الشكل ، حاجية الكيون تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٨ يوماً . يعتبر من الطيور النافعة .



كيون الغاب

٢٣٠٤٨ - **قيمة غذائية** (F). Valeur alimentaire (F).
Alimentary value (E).

القيمة الغذائية هي ما يحويه الغذاء من عناصر تتحول في الجسم بعد الانضمام والتشيل الى طاقة ومواد استهلاكية لا حياة الجسم بدونها || وقد وضعنا في الجدول الاول ما تيسر لنا من القيم الغذائية المعتمدة لبعض الطائر المشهورة . اما الجدول الثاني فللقول وبعض الطائر الجافة .

٢٣٠٤٩ - **قيمة مريئية**
Valeur atilible (F).
Nutritive value (E).

هي نسبة ما تحويه كل مادة من عناصر غذائية قابلة التشيل والانسقام .

٢٣٠٤٧ - **قيتس**
Tragelaphus angasi (S).
Tragélapho d'Angas (F).

نوع من الجبهل وهو اكبر جفة من البرع واصغر من الغلب . ثوبه احمر اللون يملو موج اصفر ويتجدع ابيض . موطنه جنوبي شرقي افريقية .

٢٣٠٤٣ - **قيش** ، **قيشلة**
Face (F).
وجه الشبه كقروك قبيل البناء ...

٢٣٠٤٤ - **قيشكي**
Facial (F).
نعت تعريبي يطلق على ما له صلة بالقيش .

٢٣٠٤٥ - **كيون** ، **هيك البحر**
Halcyon (F). Halcyon, Kingfisher (E).

جنس طير من المازوريات . انواعه قليلة العدد اعطاهها البلاد الافريقية واسرالية . اجسامها متوسطة القد . مناليرها



نحو ١٥ يومًا يتغذى ضمن صلبة تحببها السرة بين شقوق الحاء .

٢٣٠٥١ - **كأبوك** * ، **كأبوق** ، **دعس**

Eriodendron (S). Capouquier, Kapouquier, Ouater, Cottonnier soyeux (F). Cotton grass, C. sedge, Silk cotton tree (E). Kapokbaum, Silk Windeuderwoltbaum (D). Capoc (I).

جنس اشجار كبيرة القذ ضخمة الساق دائمة من فصيلة الخيازيات . انزاهه المعروفة ثمانية اصنافها الاستوائية الاسيوية والافريقية والامريكية . ثمارها برتقالية الحميم ، يضيء او كروية الشكل ، محشوة بالزغب الدقيق ، الناعم ، اللامع ، القصير التيلة الذي يحرق البخور من كل صوب . استعماله ينحصر بالصناعة الخشبية لانه لا يصلح للزلز .

٢٣٠٥٢ - **كأبوك**
زغب ثمار الكابوك

٢٣٠٥٣ - **كأبياء** * ، **خنزير الماء**

Hydrochaeris capybara (S). Cabiais, Carpincho, Capybara, Cochon d'eau (F). Capybara, Cavy, Guinea-pig (E)

حيوان لبون قاضم وسيد الجنس والزوج . موطنه امريكة الجنوبية من الفويان الى البلاتا وبوليفيا . يعيش جماعات كثيرة العدد ولكل ذكر ثلاث اناث || وهو اكبر القوارض جثة ، طوله ١١٥ سم . وارتفاعه ٥٠ اما وزنه فلا يقل عن ٥٠ كيلو . جسمه ضخم ثقيل . رأسه غليظ الشكل ، كبير القذ ، انفص المقص . اذناه صغيرتان . ذنبه جذعة . قوائمه قوية قصيرة . ثوبه غشش ناعم الملمس لونه الى البصرة والصهية والصفرة || يائف ضفارت الابهر والنافع والبسيرات . يسبح في النهر . سيره بطيء للغاية . قوية جميع النباتات المائية والارز والقدرة وتختلف الفريعات . الابن تقصع من ٣ الى ٨ ادراس ترحب بعد وضعها بضع ساعات .

Cape (F). **كأب** ، **قبيص** ، **جذباب** .
Wrappier, Outer-leaf (E).

تقطع من نعل التبع الجاف تصلع لتتلف السيكار . لذلك يجب ان تكون جيدة الرقة ، ناعمة الملمس ، مسقولة السج اللدن ، سوية اللون البني المائى او الجوزي الفاتح .

٢٣٠٤٩ - **كأبيح** *
inhilanz (F). inhilanz (E).

نعت تعريفي يطلق على كل مادة من شأنها إيقاف الحركة الطبيعية في أي عضو كان اما كلياً او بعض الوقت .

٢٣٠٥٠ - **كأبيكة الحور** *
Cabers trilineata (S). Cabère du peuplier (F). Cabera trilineata (E).

حشرة من الافريات حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اودية المعتدلة الحرارة . فراشها جارية قوتها رقيق الانزهار . سرقها تعيش على اوراق الحور والصنصفا || جسمها متوسط القذ يطول نحو ١٣ م . بطنها نحو ٣٦ م . رأسها مستد الجرم . صيغها صغيرتان . زباناها مشطيان مزدوجان عند الذكر ، غيطيان عند الانثى . مرشفها مستد الجرم . جوشها ويطلعها الى البياض الاخير المواجه || وراشها عند الشقين الى البياض الاخير تملو في الزوج الاسامي ثلاثة خطوط معتزفة وحادية . ويملو في الزوج الخلفي خطان معتزضان ، مقصان ، اشبهان . اهداها الى القبرة الفضية || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز . ترحب من الغرب الى فصحة الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد المكان مبيحاً في شقوق الحاء . البقرة تطول من ٢٤ الى ٢٨ م . جسمها استوائي الشكل ، مائل انتشار . ثوبها الى اللعلة الكدره مملو ترقيط حنطي ورققة سمراء تمانت المحيط . رأسها الى السمرة السوداء منها الى الشبهة الغبراء || طور الاكمال الذي يستمر



كأبيكة الحور



كأبوك



كأبياء

٢٣٠٥٤ - **كاتب عدل** (F). Notary (E).
مأمور قضائي منوط به ان يحضر في دائرة اختصاصه جميع
المعقد التي يرغب اصحابها اثبات صحتها الرسمية .

٢٣٠٥٥ - **كاتب** (F). Garrot du cheval (F).
Withers of a horse (E).
الكاتب والكتابة هو مجتمع كتي القرس المعروف بالخاروك.
ج. كوابل .

٢٣٠٥٦ - **كاجشو ، حبّ البيلادر** (F). Noix d'acajou (F). Cashew-nut (E).
هي ثمار البيلادر الشرقي والغربي . وهي مأكولة ويستخلص
من صلباتها بعد تجفيفها وتقطيعها مشروب كحولي
مستحب العلم .

٢٣٠٥٧ - **كاجيبوت** (F). Cajepucier (F).
هي بلفاء كاجيبوت ، اطلية .

٢٣٠٥٨ - **كاج ، كيج** (F). Versant de montagne (F).
Side of a mountain (E).
الكاج والكيج ، سفح الجبل . ج. اكيج وكيج .

٢٣٠٥٩ - **كاد** (F). Cadie (F).

الاسم الفرنسي من المريج . جنبة برية وزراعية تزيينية
من فصيلة القرنيات وسبط المتنبسات . مهددا بعض مناطق
افريقية الشمالية || سالتها صلبة كثيرة الفروع الدقيقة .
اوراقها متعاقبة مركبة وقرية التجميع . وريقاتها صغيرة
مقابلة . ازهارها فردية ، ابطية الايتكاز ، شبه جرسية
الشكل ، وريدة اللون ، خافتة اللون المسحب .

٢٣٠٦٠ - **كاد هندي** (F). Cachoutier (F).
هو وسط كاشو ، اطلية .

٢٣٠٦١ - **كادل** (F). Cadelle (F).
هي رقة اسطوانة البر ، تعيش على الحبوب المكسورة او
المكسرة من الحشرات فزيد في عطيها واذاها .

٢٣٠٦٢ - **كادية** (F). Tondeuse de gazon (F).
Lawn-mower (E).
الكادية والمكسمة : مجز آلي يستعمل لقطع الاعشاب
اغصبا الخضر .

٢٣٠٦٣ - **كاد بينين** (F). Cadinène (F).
هيدروكربون راتنجي سائل يستخلص من زيت الكاد
ورائج الالبسيه والصنوبر والايست والكافور والحلتيت
والبنشور . فله التلبي عند ٢٠ °م = ٦٨ °ف . يغلي
عند ٢٧٤ / ٢٧٥ °م .

٢٣٠٦٤ - **كاذة** (F).
الكاذة هي ما حول الحياء من ظاهر الخنثين .

٢٣٠٦٥ - **كاذي** (F). Pandanus (S).
Pandanus, Baquois, Vaquols (F). Pandang oil plant.
Screw pine (E). Pandanuspalme (D). Pandano (I).
جلس نباتات ليغية معمرة من فصيلة الكاذيات، ازهاره
عديدة متنبها البلاد الحارة . سوقها جذعية متصببة او مشلقة
عامة الاغصان تملون بتر واحد الى ٢٠ م . جلوهها
تريه وهوائية متدلية لافطة . او راقها عصفية الشكل قرصية

التجميع هامة الايتكاز . ازهارها ثنائية المسكن، مسطيلة
القبة والزائد . ثمارها اكواز اسطوانية فوية التركيب .
زورها ثشوية المادة || اكثر ازهاره برية وتزيينية ونها
الزراعية الصناعية والمأكولة الجار . لشهرها ما يتبع .

٢٣٠٦٦ - **كاذي العرف** (F). Pandanus odoratissimus (S). Pandanus parfumé (F).
نوع من الكاذي الزراعي ساقه متصببة تملون ٢٠٠ الى
٤٠٠ سم . اوراقه صفيحة ، ذرية ، عذبة الزام الاخير ،
تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . نصلها سرج البشورة ،
مهذب الصلع والحافة ، بحري الخشبار . ثماره مأكولة ،
سكرية الطعم ، صطرية العرف ، حواء اللون ، تطلون من
١٠ الى ١٥ م .

٢٣٠٦٧ - **كاذي مدعسكر** (F). Pandanus utilis (S). Pandanus utile (F).
نوع من الكاذي الزراعي الصناعي . منته جزيرة مدعسكر .
ساقه متصببة مسطلة ثنائية او ثلاثية الجلولج ، تملون
من ١٥ الى ٢٠ م . اوراقه صفيحة مسطلة ، نصلها جامد
الصفحة ، شالك الحافة ، عابق الخشبار البحري . ثماره
لا تتركز ، زورها ثشوية المادة || يزروع لاوراقه
الصناعية ، اليانها نسيجية تستعمل في حياكة الاكياس
والبيسط والاطناب .

٢٣٠٦٨ - **كاذيات** (F). Pandaceae (S).
Pandacées, Pandanées (F). Pandaceae (E).
فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة قليلة الاجناس والازواج .
نباتاتها معمرة ليغية السوق منها المتصببة المستقيمة ومنها
للتسلقة . ثمارها عتية كوزية التجميع . زورها ثشوية
المادة . اشهر اجناسها الكاذي .

٢٣٠٦٩ - **كاريوكيس** (F). Horte à disques, Pulvérisateur (F).
هي المسط القشحي او مسط ذو صنوج يستعمل لتفتيت
مدر التربة وتفتيم سطحها .

٢٣٠٧٠ - **كاريوكيس ، دودة الثمار** (F). Carpacaps, Laspayresia, Cydia (S). Crapocaps,
Ver des fruits (F).

جلس حشرات من فصيلة القناتلات ورتبة سرشنيات
الاجنسة . ازهاره عديدة طولها يراوح من ٥ الى ٨ م .
وبسطها من ١٠ الى ٢٠ م . وراثها حقلية يعلوها تنظيط
وتقيح وزراكن مختلفة الالوان || يراقها صغيرة اللد
دقيقة الجسم تطلون من ١٢ الى ١٧ م . تنقف فيضاه
اللون ثم تغبر وتسر وتستر على الجلاوة او الحفرة .
وروسها بقية او سود . مهدبات الى السمر . مكها ذري
اللد ، عسي الشكل ، اسير اللون يتقف بعد منه بنحو
٢٠٠ ساعة || ايجالها الحولية تراوح من اثنين الى ثلاثة .
اناثها تمتع المكن في كورس الازهار يتقف عن يرقات
نخيلة تنقف الثمار في طلب الغذاء فتدخلها برساديب تخمرها
بالتجاه الزور ثم تخرج منها بعد انصلاحها الاخير فتفزل
صلبهاها حيث تتحول الى غادرات بين شقوق الجاه او
تحتها . وبعد انقضاء نحو ٥٠٠ ساعة تنشر الصلبيات
عن فراشات تطير لتقوم ثم تسر على الثمار فتأثر ايجالها
الثانية وتعيد سيرها الاول . اما اضرار يرقات ايجال
الثانية فلا تقل عن اضرار جنسيتها من ايجال السابقة
لانها تتركب الثمار فتتخرها وتعيش في داخلها وقت تقضي
عليها وتنب سقولها || اغصن مزالها التفاح والاصاص
والسفرجل والدراق والمشمش والخوخ والجز والكمسكتا ...



كاد



كاذي

Infusible

٢٣٠٧٦ - كَارُوج

غير قابل الانصهار .

٢٣٠٧٧ - كَارُوجَة النخلة التي حل المادج كارهات.

٢٣٠٧٨ - كَارُوجَة ، حَصِيْفَة الْجَمِيل

Calochortus (S). Calochorte, Tulpe des Mormons (F). Globe tulip, Hair-bell (E). Grasschöne, Mormonentulpe (D). Calocorto (I).

جنس نباتات بصلية تربيتية من فصيلة الزليقيات . انواعه المعروفة نحو ١٢ . سوقها شرابية تنتهي بالازهار . اوراقها قرصية الانتشاب، تصلها جامد الصلصة الصفقة المستطيلة . ازهارها متقوية او مظلية التجميع ، جميلة الشكل . كلوس كاثما ثلاثية الفصل السنانية القذرية الخضراء اللون . قروبياتها ثلاثية البلات المستعرضة الزاوية الاولان || اعرف ازهارها واشهرها ما يلي .

٢٣٠٧٩ - كَارُوجَة بَهِيْجَة

Calochortus venustus (S). Calochorte superba (F). نوع من الكارفة . شرابها الزهري يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . ازهارها عقدية التجميع متدلية كبيرة الحجم ، قطرها نحو ٤ سم . بتلاتها بيض الصلصة الداخلية حمر الخارجية || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢٣٠٨٠ - كَارُوجَة بَهِيْجَة

Calochortus albus (S). Calochorte blanc (F). نوع من الكارفة . شرابها يعلو من ٨٠ الى ١٠٠ سم . ازهارها مظلية التجميع ، متدلية ، كبيرة القد ، تطول وتعرض نحو ٤ سم . بتلاتها حمر القويود والقرقود ، بيض التصلب المظلية المهذبة الاطراف || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٣٠٨١ - كَارُوجَة طَرِيْقَة

Calochortus pulchellus (S). Calochorte gracieux (F). نوع من الكارفة . شرابها الزهري يعلو من ٤٠ الى ٩٠ سم . ازهارها مظلية التجميع متدلية متوسطة الحجم تطول وتعرض نحو ٣ سم . بتلاتها الى الصفار الكبير في الزاهي . اطرافها مهدبة ، قيوذا وقواعدا وكامل زانها الاول الى الحمرة القرمزية || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢٣٠٨٢ - كَارُوجَة لَيْلَكِيَّة

Calochortus illacius (S). Calochorte lilas (F). نوع من الكارفة . شرابها الزهري يعلو من ١٥ الى ٢٠ سم . ازهارها عقدية التجميع ، متدلية ، كبيرة الحجم ، قطرها نحو ٤ سم . وطولها نحو ٢ سم . بتلاتها ليلكية اللون ، خلية البشرة || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢٣٠٨٣ - كَارُوتِين

Carotène (F). Carotin (E). هو الخصب الاحمر في اوراق النبات وهو ما يصبغ الخصب . والكاروتين يتحول الى فيتامين «ا» وهو كثير في الجزر والبنطورة .

٢٣٠٨٤ - كَارُوج

Icterus (S). Carouge (F). Icterus (E).

جنس طير من فصيلة الكاربوكيات . انواعه المعروفة خمسة اعطاهما تمتد من البرازيل الى كوريا وتحتيا . تألف القافيات والحراج الكثيفة . نغلمها الحياطي جماعي . اسرارها متوسطة العدد || اجسامها متوسطة القد تطول من ٢٤ الى

تكتف باستمال زريجات الرصاص او غيرها من الحواشير الفعالة الحبرية الكثيرة العدد .

٢٣٠٧١ - كَارُوبُوكِيسُ التَّفَاحِ ، دُوْدَة التَّفَاحِ

Carpocapsa pomonella, Laspeyresia pomonella, Cydia pomonella (S). Carposape des pommers, Ver des pommers (F). Codling moth (E). Apfelwickler, Obstmad (D).

فراشة من الكاربوكيس بسطها تراوح من ١٥ الى ٢٠ سم . رواشها الى السرة الحظية ، الاساميان عذبان تدرسها خطوط رسية وتلمرها بقع ملعبة عند طرف كل ريش . الخلفيان موحان بالسنبالي || البقرة تنقف ببيضه اللون ثم تتعرف الى البقرة وتستقر على الوردي . اجيالها الحولية اثنان ، جيلها الاول يبيض في الربيع حيث تمتع مكها افراديا حل الجار بعد انعقادها .

٢٣٠٧٢ - كَارُوبُوكِيسُ الخَوْخِ

Laspeyresia funebrena, Opodia funebrena (S). Carposape des prunes (F). Red plum maggot (E). Pflaumenwickler (D).

فراشة صغيرة القد بسطها تراوح من ١٠ الى ١٢ سم . رواشها الى السرة العاقبة يلموها قيقج اخير || جيلها الحولي واحد . ريقها تمشي حتى اسلاخها الاخيرة داخل الشرة لتصلها || تكتف بعد الانزهار على اثر سقوط التريجات الزهرية . ويتصح بعدم استمال الزريجات .

٢٣٠٧٣ - كَارُوبُوكِيسُ الدَّرَاقِيْنِ ، قَابِلَة شَرِكِيَّة

Laspeyresia molesta, Cydia molesta (S). Tordseuse orientale du pacher (F). Oriental peach moth (E). Pfirsichtriebsbohrer (D).

فراشة صغيرة القد بسطها تراوح من ١٢ الى ١٤ سم . رواشها الاساميان الى الكهبة العاقبة يلموها نعيم ابيض . رواشها الخلفيان الى الكهبة الحظية الموالج || اجيالها الحولية اثنان . ريقات الجيل الاول تلغ القنومي الناشئة فتصمها وتحيها . اما ريقات الجيل الثاني فتعيش داخل الثار التي تمطيها وتنبب تلفها || تكتف باستمال بعض الحواشير الفعالة الحبرية وذلك بعد انزاع وصرق جميع القنومي اليابسة .

٢٣٠٧٤ - كَارُوبُوكِيسُ الشَّكِيْر ، دُوْدَة الشَّكِيْر

Laspeyresia woerberiana, Semasia woerberiana, Grapholitha woerberiana, Tortrix woerberiana (S). Carposape de l'aulubier (F). Rindenwickler (D).

فراشة صغيرة القد بسطها تراوح من ١٤ الى ١٦ سم . فوها حطلي اللون ، رواشها الى الريدة السراء يلموها تنيش اخير واسود . ريقاتها تركب لحاء الاشجار المشربة وغير المشربة تقسدها حتى الشكير حيث تستقر الى ان يتم اسلاخها وتطويها البري فتخرج ثم تنسج صلبتها وتخلد فيها حتى الربيع .

٢٣٠٧٥ - كَارُوبُوكِيسُ الكَسْتَنِ

Laspeyresia splendana (S). Carposape des châtagnes, Ver des châtagnes (F). European codling moth (E). Kastenlenwickler, Eichelwickler (D).

فراشة صغيرة القد بسطها تراوح من ١٠ الى ١٣ سم . رواشها الاساميان الى الكهبة الحظية بخطوط سود ، رواشها الخلفيان الى السرة الحظية لسرة || جيلها الحولي واحد . ريقها تنخر ثمرة الكستنا وتعيش في داخلها وقد تسبب املاسها او سقوطها قبل الادراك وعنده .



كاربوكيس التفاح



كاربوكيس الخوخ



كاربوكيس الدراقين



كاربوكيس الكستنا



كارفة

- كأس ليايسة Calice régulier (F). Regular calyx (E).
 كأس لالاييسة Calice irrégulier (F).
 Irregular calyx (E).
 كأس متحدة الفصائل Calice gamosépale (F).
 Gamosépale calyx (E).
 كأس منفصلة الفصائل Calice dialysépale (F).
 Dialysépale calyx (E).



كاروج جَمِيكَا

- ٢٣٠٩٠ - كاسير Tacteur (F). Tector (E).
 كل ما يلحف الجلد عند الطير كالريش، وما يلحف بشرة الارواق والعماء عند النبات.
 ٢٣٠٩١ - كاسيح Envahissant (F). Invading (E).
 تمت تعريفي بطلق على كل نبات بري يتسلط على النبات المزروع ويحق نمو.
 ٢٣٠٩٢ - كاسير Réfringent (F). Refracting (E).

- ٢٣٠٩٣ - كاسير الجوز، كاسير اللوز، غاربان الجوز، غاربان البندق، قيس Sitza (S). Sittelle (F). Nuthatch (E).
 جنس طير من الجوارثم منيات المتأخرات القويقات المتأخرات. أنواعه عديدة جميعها صغيرة القند طولها يراوح من ١٢ الى ١٦ سم. أنثاها ملوكة، اجنتها متحدة القند، اذناها قصيرة وسمرة. متاقيرها مخروطية قوية. السنتها قصيرة مزبوجة قابضة. ارساغها حلقية. غالبا دقيقة. تألف الذناب والاجام والجليل والقرع. قوتها الحشرات ويزور النباتات البرية والزراعية. تفر في تجاويف الاشجار وفي اوقاف الصنوبر واعشاش اللقار والحطاف. اذناها تقص من ٩ الى ٩ يضايت تحفها وحدا من ١٣ الى ١٤ ييض.

- ٢٣٠٩٤ - كاسير الجوز الأوروبي، ثيس لورسي Kasser europaea (S). Sittelle d'Europe (F).
 طائر من كواسر الجوز طول نحو ١٤ سم. قوته ثوب كاسر الجوز الازرق الا انه ام يباحث وائل حرة في بطنه وظاهر جناحه ملونه اربعة الشرة والثالية، يالف القنابات والاحراج.



كاسر الجوز الازرق

- ٢٣٠٩٥ - كاسير الجوز الأزرق، ثيس لوزي Sitza coasis (S). Sittelle torche-pot, S. bleue, Torche-pot, Pic bleu, Pic maçon (F).
 طائر من كواسر الجوز طول نحو ١٣ سم. رأسه وظهوره واثنين الى الرادي الازرق المواج. جناحه الى السمرة يملو حشارها تجذيع ايض. محمره وزوره وسعدو الى الياض الناصع، بطنه الى الصبغة البفساء. متقار صماحي اللون ملونه الشرق الاذني واروية الجنوبية والغربية.

- ٢٣٠٩٦ - كاسير الجوز السرياني، ثيس سرياني Sitza syriaca (S). Sittelle syriacque (F).

- نوع من كواسر الجوز طول نحو ١٦ سم. رأسه وظهوره واثنين الى الرية الزرقاء المواج. جناحه الى السمرة المخنطية، اياهمه ييض الاطراف. محمره وزوره وسعدو والقسم الاكبر من بطنه الى الياض الناصع. متقار حنطي اللون ملونه الشرق الاذني، يالف المناطق الجبلية الصخرية.

٢٧ جم. متاقيرها متحدة الحميم، مخروطية الشكل، حادة الشفاه، مدية الإبرة. رؤوسها متبوعة بقنازع تمتد من المنشق الى القنن. اجنتها متحدة الحميم والطنلي اذناها منقطعة، مستديرة الاطراف، وتاجية ارفال الجانبية. اثنائها مختلفة الانوان || قوتها الحشرات والحبوب والثمار المخنطية ومنها البرققال والحوز || اعرف انواعه واشهرها كاروج جَمِيكَا.

٢٣٠٩٥ - كاروج جَمِيكَا

Icterus lamacali (S). Carouge lamacali (F).
 طائر من الكاروج. يكثر وجوده في البروازيل والغيويان. يالف القنابات والاحراج الكثيفة. سره يراوح بين ٢٠٠ و ٣٠٠ زوج || جسمه متصل القند يطول نحو ٢٧ سم. رأسه وقنزته ومنقعه وظهوره وذنبه الى السواد الاسفع المواج. صدره وبطنه وزمكا الى الصفار البرتقالي. جناحه الى السواد الاسم الاسفع يمتزجها حزامان اسفرا. الزام الاخير من ذنبه الى الصفرة البرتقالية. عيناه كبيرتان مكملتان بالاسود ويطنقها حشار اسفر. حلقه حمر صفراء اللون. متقار اسود، زنده اخضر. رساه الى السمرة المخنطية || من ميزاته انه يحسن التفريد ويقتبس الحان غيره من الطير. قوته الحشرات والحبوب والثمار المختلفة. يالف حياة الاسر ويكاثري في القفص شربا ان يكون فسحا || يدثر عشه في الاشجار المتدلة الارتفاع من سطح التربة. عشه شبه كروي الشكل، كبير الحجم، جانبي المنسل، يحبكها بالخشيش والاياف والقص الناعم. الاثني تقص من ٤ الى ٦ يضايت تحفها وحدا نحو ١٧ يوا يينا الذكر يلين لها الفداء.

٢٣٠٩٦ - كاروجيات

Icteridae (S). Icteridae (E).
 فصيلة طير من الجوارثم منيات المتأخرات تشمل فصيلة الزردرويات في القارة الامريكية. اجناسها وانواعها كثيرة العدد. تألف القنابات والحراج والمخاطي. نظامها الحياتي جامي. ارساها وافرقة اللند || اجسامها تراوح بين الوسطى والصغيرة. متاقيرها متفردة الاجسام. اثنائها تختلف مع الانواع، منها الساطع الاسفع المواج ومنها الباهت. بعضها يلفد الحان والاصوات التي يسمها فيرددها. منظر انواعها يعيش اكثر من نصف حياته على الارض || اعرف اجناسها واشهرها الكاروج والبطيوس والفاصان والكسك والكسكال والمطروس.

- ٢٣٠٩٧ - كازيركاز Casés (F).
 هو الجيناز، الحلب.

- ٢٣٠٩٨ - كازيرين Caséine (F).
 هي الجينين، الحلبا.

٢٣٠٩٩ - كاسيس

Calice (F). Calyx (E).
 جراع الفصل او الفصا او الفصلا التي تؤلف يوق الزهرة او لفافها الخارجية. وكثيرا النبات مختلفة الاشكال والتركيب لذلك فهي قد تكون:

- كاس دائمة Calice persistant (F).
 Persistant calyx (E).
 كاس عابثة Calice caduc (F).
 Deciduous calyx (E).
 كاس عديمة الفصائل Calice asépale (F).
 Asepal calyx (E).

* ٢٣١١٠ - كافور

Cinnamomum camphora, *Laurus camphora*, *Camphora officinarum* (S). *Camphrier*, C. de Chine, *Laurier du Japon* (F). *Camphor tree*, *Common camphor of China* (E). *Japanischer Kamferbaum* (D). *Lauro canfora* (I).

شجرة عطرية كبيرة القداحة من القرفيات وفصيلة اللاربات. مهداة الأصل، حيث ثبتت طويلاً، يمتد من جزيرة فرموزا وخليج طونك إلى جزر الزابج. ساقها تلو من ٢٠ إلى ٥٠ م. قطر جذعها يراوح من متر إلى مترين. أغصانها كبيرة فارشة. أوراقها أبيض، معتمة، أحليلية، مستطيلة، ونصلها جانب الصفحة، اللامعة بهامى العروق القاعدية الانتساب. ثمارها زيتونية نوية بيضية الشكل سوداء اللون بنفسجية الموالج || زراعتها الصناعية تكثر في اليابان والصين والهند. يستخرج من أغصانها بمسد قلها وتقصيلها وتقطيرها بماء نحر ٣٪ من الكافور الحر. وقد يستخرج من أوراقها وبالتقطير أيضاً، إذا قلقت عند ازديادها، ما قدره ١٢٪ || إشتار الأوراق يتثنى بعد الفرس بنحس سنوات أما الخشب فلا يستعمل إلا بعد الفرس بشرين سنة وبهم من جعل المدة ٣٠ سنة كلاً في الحال في فرموزا أما أغصان فرموزا تقطر نحر ٥٪

٢٣١١١ - كافورات
Camphorate ملح الحامض الكافوري.

٢٣١١٢ - كافوري
Camphoriques (E).
Camphoric (E).
نعت ترميني يطلق على كل حاض مصدره الكافور.

٢٣١١٣ - كافوريّة
Pyrèchre (F).
في القديس، أطلبه.

٢٣١١٤ - كاكائو * ، تَبْرُومَة الكاكائو ، لوزّ الألبه
Theobroma cacao (S).
Cacaotier, Cacaoyer, Théobrome cacao (F). Cacao tree (E). Cacaobaum, Kakaobaum (D). Cacao, Theobroma (I).

نوع من التبروم، ضروبه وأصرامه الزراعية عديدة، جيمها شجيرات وأشجار فرعاء تملو من ٤ إلى ١٠ أمتار. أوراقها معتمة متعاقبة بيضية الشكل، نصلها كفة الصفحة المتعدية، بارز العروق، مذهب المعتمة. أزهارها خشوية نظامية خماسية التركيب. ثمارها مخروطية، مضلفة، لخاسية الفلق وكل فلفة تحوي من ٥ إلى ١٢ لوزة أو حبة || يتكاثر بالبذر. شجركته تنمر بمر أربع سنوات ويحوي حل مرتين في العام وقد يكون حملها جيداً بمر ٧ سنوات وتبلغ الأوج بمر ١٢ سنة ويستمر غصبا وأقبالها من ٢٥ إلى ٣٠ سنة || يرغب في الأترية المبيقة النور، المتوسطة الانساج، المرتكزة على عصري الطين والرمل || وجبة الكاكائو عند ادراكها وفصلها عن النشرة تكون حلقية المذاق تضمر بطريقة خاصة، تراوح ممتها من ١٠ إلى ١٢ يوماً، تقفي حل القسم الأكبر من المراتة ثم تفصل ويغفم وتقمم || وجبة الكاكائو هذه تحوي ما قدره :

- ٥٠٪ من المواد الدهنية
- ٢٠٪ من المواد لزالية
- ١٠٪ من المواد النشوية

٢٣٠٩٧ - كاسير الحَجَر

هو الشجار الخزني، أطلبه.

٢٣٠٩٨ - كاسير العظم
Gypsète (F).
هو البلج، أطلبه.

٢٣٠٩٩ - كاسية
Tectrica كاسية. ج. كولس. الریش الصغير الذي يسلق قاعدة جناح وذنب الطائر.

٢٣١٠٠ - كاسية * ، مختصّب حر
Quassia amara (S). Quassia, Quassier (F). Quassia, Bitter ash (E). Bitterholz, Echser Quassiaabum (D). Quassia, Legno amaro (I).

شجرة وصية الجلس والنوع من فصيلة السذابيات السمرويات موطنها الفونان. ساقها متعصبة فرعاء تملو من ٣ إلى ٥ أمتار. أوراقها متعاقبة مركبة ثلاثية أو خماسية الورديات الإحليلية الشكل. أزهارها خشوية، حراء، عشوية التجميع، تاجية الارتكاز. أغصانها طيبة تدهي خشب سورينام (bois de surinam) يستخرج منها مادة مرة تدهي كاسين شائلة الاستعمال الطبي.

٢٣١٠١ - كاسيتريت
Castedrite (F).
Cassiterite (E).

اسم يطلق على أكسيد القصدير الطبيعي الذي يستخرج منه القصدير الصناعي المعروف || نقله النوبي ١٩٩٦ وصلايته تراوح من ٦ إلى ٧ || لونه إلى السمرة تملو مايبات غنظلة أكثرها الأسود.

٢٣١٠٢ - كاشيف
Réactif (F).
Reactive, Reagent (E).

٢٣١٠٣ - كاشم ، كاشم رؤمي
Livrèche (F).
هو الإنجيدان الروسي، أطلبه.

٢٣١٠٤ - كاشن
Livèche (F).
هو الإنجيدان الروسي، أطلبه.

٢٣١٠٥ - كاشو
Cachou (F).
Cachou, Catechu (E).
مادة طعنة مضطحة تقيده الملمدة تستخرج من كؤول الكاشو وبعض أنواع السط.

٢٣١٠٦ - كاع ، كؤع
Radius
هو الزنك الاعل.

٢٣١٠٧ - كاعين
Médiocre (F). Mediocre (E).
الكاف من النبي، ما كان دون المستوى الاوسط.

٢٣١٠٨ - كافور
Spetho
الكافور والكثري ثنابة عطرية تحيط ببعض اشكال الانزهار كالطلعة مثلاً.

٢٣١٠٩ - كافور
Camphre (F). Camphor (E).
مادة عطرية بياض اللون متبلورة تستخرج من أوراق وأغصان شجر الكافور وتستعمل ضد التشنج والباله والألام الموضعية.



كاسية



كافور



كاشو



كاسي

٢٣١٢٤ - **كانثوفيلم** (S).
Calophyllum bF. Calophyllum (E).
جنس اشجار حرجية وزراعية من فصيلة الكلوزيات .
انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم المناطق الاستوائية
من القارتين القديمة والجديدة || اشجارها باسقة . اوراقها
متعاقبة ، اهلجية اتصال الجملية الخصار || اشهر
انواعها الثلاثة التالية .

٢٣١٢٥ - **كانثوفيلم إنوفيلم**
Calophyllum inophyllum (S).
نوع من الكالوفيلم . شجرة كبيرة دائمة . منبتها يمتد من
الهند الى ماليزيا . يستخرج من ثمارها مادة دهنية شائعة
الاستعمال الصناعي . صهارها مطهرة وقد تقضي على
الامراض الجلدية .

٢٣١٢٦ - **كانثوفيلم كالايا**
Calophyllum calaba (S).
نوع من الكالوفيلم . شجرة باسقة منبتها بعض مناطق
امريكية الاستوائية || يستخرج من ساقها بالخز مصارة
وراثية لزينة شائعة الاستعمال الطبي وتقع الجروح .
تقبح لحاء الساق والاغصان يندر البيل .

٢٣١٢٧ - **كانثوفيلم ماريانا**
Calophyllum Mariae (S).
نوع من الكالوفيلم . شجرة باسقة منبتها جزر الاتيل .
يستخرج من ساقها بالخز مصارة وراثية تدعى « دهن
ماري » تلغ الجروح وتدلها .

٢٣١٢٨ - **كامكا** (S).
Chama (S). Chama (F). Chama (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صليبيات الخياشم
وفصيلة الكانيات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة
في معظم بحار البلاد الحارة || اصنافها متباينة الاشكال
والحجوم والزاخرف . بمجزة فضلات شديدة . صداريها
لامتناهية وقد تكون لا متناهية ومنها المدرجة والهرمة
والشائكة || بعضها يعيش لاصفاً بصخور الحشاش
وبعض الآخر يعيش في الرمال والاسمال المتوسطة اللور .

٢٣١٢٩ - **كامكا**
Bois de cam (F).
هي البانيه ، اهلها .

٢٣١٣٠ - **كانيات الرؤوس**
Holocéphales (F). Holocéphales (E)
رثية اسماك من غضروفيات الزعانف تشمل بعض الفصائل
والاجناس والانواع . اشهر فصائلها الخرافيات .

٢٣١٣١ - **كانيات القُدب**
Holotriches
رثية حيوانات دثيا من التقييمات الحديثة .

٢٣١٣٢ - **كانيات**
Camellia (F).
Camellia (S).
Camellia (F).
Camellia (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ازواعها زهاء ٢٥٠ تجمع
الى بضعة اجناس فيها الاشجار والشجيرات والنباتات .
اوراقها متعاقبة ، نصالها اهلجية الشكل ، بسطة

٤ ٪ من المواد المعدنية
٢ ٪ من مادة التيوبرومين (جوز الكاكاو)
٢ ٪ من السيلولوز

اما مسحوق الكاكاو التجاري المشهور الذي يستعمل
لرحله او في صناعة الشوكولاته وغيرها . فهو دقيق تلك
الجوز التي صار تخميرها وفصلها وتفتيتها وتقسيمها ثم
تحميصها وطحنها || وقد يستخرج من حبه ايضاً زيت
طبي جزيل النفع يستعمل في الصيلة .

٢٣١٣٥ - **كانثوس**
Cactus (F).
هو الصبرة ، اهلها .
٢٣١٣٦ - **كانثوس شوكي**
هو الصبار القنفذي ، اهلها .

٢٣١٣٧ - **كانكج**
Alkékango (F).
نبات عشبي معمر يعرف بالحوية الكاكنية .

٢٣١٣٨ - **كانكج أصفر**
Alkékango jaune (F).
هو الحوية الزياء ، اهلها .

٢٣١٣٩ - **كانكو**
Kakau (F).
هو الزيك ، قرد من المباريات ، اهلها .

٢٣١٤٠ - **كانكي * دسيروس كاني**
مشمش اليابان ، يطلع طرايزين

Diospyros kaki (S). Diospyre kaki, Kaki, Plaque-
minier kaki, P. du Japon, Persimmon kaki (F). Kaki,
Persimmon tree, Japanese persimmon (E). Kaki-
baum, Dattelpflaume (D). Diospiro, Kaki, Fico de
Giappone (I).

نوع من البسيسيس مهدد الصين واليابان . ضروبها واصرامه
الزراعية زهاء ٨٠٠ وقد عمت زراعتها معظم البلاد الحارة .
اشجارها متوسطة القد تطلو من ٤ الى ٨ أمتار . جلورها
وتدية . سوقها منتصبة فراءه . اوراقها بيضية مدبة الزام
الانخير . نصلها جامد الصلصة ، شديدة الخصار .
ازهارها بيضاء اللون رباعية التركيب . ثمارها لا تقياسية
الشكل والحجم تكثر فيها الاستدارة وهي رباعية الفلق .
تفورها غشائية ، ناعمة ، حلينة اللون التي تراوح من
الاصفر الى الاحمر المجزوي . لبها يرتقلى اللون ، للذي
الطعم ، سكري اللماق ، يستحب العرف يحوي ما قدره
نحر ٢٤ ٪ من الفلوكوز و ٢ ٪ من البروتين وسما
لا يستهان به من العناصر الحديد والقيتين و ث || يتكاثر
بالبذر ويوجد في جميع الاثرية المنسوبة التركيب الحكمي ،
المتوسطة الاندماج ، الحبيقة اللور .

٢٣١٤١ - **كالك**
الكال والكالة والكلولة ان شذرتي او تبيع ديثا لك حل
رجل بديله له حل آخر .

٢٣١٤٢ - **كالامين**
Calamine (F).
هو حبر التوتيا ، اهلها .

٢٣١٤٣ - **كالود تدرن** ، شجرة البهاء
Calodendron (F).
شجرة متوسطة القد فراءه من فصيلة السليانيات . منبتها
بلاد رأس الرجاء الصالح . تستعمل للزئين لانها جميلة
الشكل والخصار والازهار .



كاسه

Contidiphore

٢٣١٤١ - **كاتب**

جهاز تكاثري يتميز به بعض الفطور الخفية . قوامه سوط نواصي التركيب ، قاعدة ارتكازه المشيج ، طرفه صفي الشكل ، ينتهي بشقيرة أو بشماغ أو بشفاط يحمل الكائنات المرصوفة المتتابعة كحبيب السحبة .

Décembre (F).

٢٣١٤٢ - **كانون الأول**

December (E).

يعرف أيضاً بـ ديسمبر . الشهر الثاني عشر من السنة الشمسية وهو من شهور الخريف والشتاء . مدته واحد وثلاثون يوماً . في اليوم الرابع عشر منه يتبدئ الاياميات . وفي الواحد والعشرين ينتهي فصل الخريف ويكون الانقلاب الشتوي وهو ما يمتد به عرج النور من حد نقصان الى حد الزيادة . وفي الثاني والعشرين يتبدئ فصل الشتاء فتخرج الشمس من برج الرامي لتدخل في برج الجوز . **تقويمه الزراعي** - احص اعماله الزراعية ما يتبع :

١ - في الزراعات العامة الموسمية . متابعة واهاء بدر الفول والعدس والبقية وسائر النباتات العطرية . متابعة توصيب وزرع اوراق التبغ الجافة . تحضير مشاتل التبغ وتوزيع الاسمدة العضوية على الاكراد .

٢ - في الاشجار المثمرة ، متابعة اعمال المكافحة الشتوية والتقسيد الكيوي في المناطق السهلية والوحي . ابتداء بالتقليم مع الانتهاء الى وجوب جمع كل ما قطع من الاشجار وحرقه بويماً . المباشرة بفرس النصب في المناطق التي لا تحضى الثلج والاعتناء بالنسابة بعد الفرس لتأمين البتة للفصل العمورية . اتخاذ الحيطه اللازمة لمنع ركود المياه في تربة البساتين . متابعة تشذيب وقصيد وحرق الكرمه والزيوت . وتوزيع الاسمدة العضوية على الموز . وتقليم كياكه اي طروحه لوقايتها من البرد والصقيع . انجاز تقصيد البزور ثم تقطيعها في المشاتل الخاصة بها او في مستورها . اقتلاع النصب المدة لفرس قبل طفر البرام .

٣ - في الحفصيات : متابعة قطف البرتقال وتوزيع الاسمدة الكاملة والخاصة وفرس نصب التانوع (ابو صفر) في البساتين المستحدثة وتقليم نصب المشاتل .

٤ - في الاشجار المختلفة : فرس نصب الاشجار الحربية والزيوتية وتقليم وتشذيب وتقليم معظم اشجار الحدائق والطرقات .

٥ - في البقول والزهور . متابعة العناية بالتربة والنبات ومشاتل البنورة والخس والباذنجان وباكراد الزبيب والبرسيم والسون .

٢٣١٤٣ - **كانون الثاني**

Janvier (F). January (E). يعرف أيضاً بـ يناير . الشهر الاول من السنة الشمسية وهو من شهور الشتاء الخفيفة الامطار . مدته واحد وثلاثون يوماً . في اليوم الثاني والعشرين منه تقضي الاياميات . **تقويمه الزراعي** - احص اعماله الزراعية ما يتبع :

١ - في الزراعات العامة الموسمية . تفقد زروع المنفلة واستطاعتها بالاسمدة الازوتية النتراتية اذا كانت متخمة او سقيمة . حرق التربة المدة لزراعة التبغ اذا كان حراً لم يتيسر في الشهر المنصرم . اعداد مشاتل التبغ وتحضير الاكراد والمباشرة بقت البزور .

٢ - في الاشجار المثمرة : متابعة فرس الاشجار المثمرة والمكافحة الشتوية والتقسيد والتقليم . المباشرة بتعليق فساتل السرفيل والربان والتفاح ايسر مولين والكرمه والزيوت . متابعة تقليم كبائس الفوز .

التركيب ، مسلة الاطراف . ازهارها فردية او عقدية التجميع كبيرة القند يفسد اللون او حمره || اشهر اجناسها الشاي والكانبيا .

Camelline (F).

٢٣١٣٣ - **كاميلية**

هي النصار ، اطلبه .

Camellines (F).

٢٣١٣٤ - **كاميليات**

هي النصاريات سبط من فصيلة الصليديات .

Latent (F). Latent, Hidden (E).

٢٣١٣٥ - **كامين**

ما هو مقدور الوحيد الخفي .

Chamides (S).

٢٣١٣٦ - **كاميات**

Chamides, Camacés, Chamacés (F). Chamidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم . اجناسها وزايعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الاراضي الجورية والطياشيرية . انواعها المعاصرة منتشرة في معظم بحار البلاد الاستوائية والحرارة || اصنافها متفارة الاشكال والوجوه . ثنائية المضاربع الانظامية للامتساوية جميعها عديمة المناسب . مستقلة الاصيل || اعرف اجناسها واشهرها الكامة والظفير .

Camellia (S).

٢٣١٣٧ - **كاميليا**

Camellia, Camelia (F). Camellia (E).

جنس اشجار وشجيرات وشجيات برية وتربوية من فصيلة الكملليات . انواعه نحو ١٤ سبطاً متخمة فراء . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، متقنة ، كاملة ، نصالها جامدة الصفحة جميلة الخضار الزاهي . ازهارها ابيطة او تاجية الارتكاز ، كبيرة القند ، خالية او مسابية الفص وخاسية او مسابية او تسامية البتلات المندمجة القواعد || اعرف انواعها واطهرها ما يلي .

٢٣١٣٨ - **كاميلية سرديّة**

Camellia reticulata (S). Camellia réticulé (F).

نوع من الكاميليا الفاخر الصف . جنسه جاذبة متوسطة القند فراء تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها سرديّة عابطة الخضار . ازهارها عديمة العرف ، كبيرة القند ، قطرها يراوح من ١٣ الى ١٥ سم . لونها الى الحمرة الكرزية ازهارها يستمر من آذار الى نيسان .

٢٣١٣٩ - **كاميليا سسنگا**

Camellia sasangua (S). Camellia sasangua (F).

نوع من الكاميليا وهي جنس سرديّة فراء تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها سطوية القاعدية مسنة الحافسة . ازهارها مكسبة قطرها يراوح من ٦ الى ٨ سم . لونها الى البياض المسامي || ازهارها يستمر من شباط الى حزيران .

٢٣١٤٠ - **كاميليا يابانية**

Camellia japonica (S). Camellia du Japon, Rose du Japon (F). Camellia, Japan rose, Rose of the world (E). Japansche Kamellie, Japansche Rose (D). Camellia, Rosa del Giappone (I).

نوع من الكاميليا الشائع الزراعة . ضرره او اصراجه نحو ١٥٠٠ جميعها هريبة الشكل تملو من ٤ الى ٨ امتار . اوراقها ماسلة ، لامة ، جميلة الخضار . ازهارها عادية او مكسبة ، كبيرة القند ، عديمة العرف ، يفسد اللون او حمره .



كاميليا

Cédrat (F). ٢٣١٥٨ - كِيدَاكَة *

في الآرتة، ثمرة الإترج ، اطلبها .

Lasius (S).

Lasius (F). Lasius (E).

جلس نمل من فصيلة المبرويات يتميز باستطالة القوائم وبضخامة البطن || اتواحه المعروفة عديدة اعطاهها البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم . بعضها حربي يألف القنابات والبعض الآخر يعيش في الخنادق قرب المنازل المسكونة وفي الحرات || معظم اتواحه يتغذى ثرية الإرق اما في زرائب قراه او على النباتات الطبيعية والرائجة والاشجار المثمرة .

Clprier (F).

٢٣١٦٠ - كِيدَل

هو الكبر ، اطلبه .

Capparidées (F).

٢٣١٦١ - كِيدَارِيَات

سبط من الكبريات أشهر اجناسه الكبر .

Epoque de fructification (F).

٢٣١٦٢ - كِيدَاس

Epoch of fructification (E).
الكباس هو الزين الذي يتبقى لتفتح اكام الاشجار عن ازليها وقد يشمل ايضاً زين الانزهار والقلعة .

Régime de dattes, R. de bananes (F).

Bunch, Cluster, Stem (E).

هي القنات والقنر وهي من النخل كمثوق العنب من الكرية . وهي في الموز مجموعة امشاط الطرح الشري . ج. كباس

Plantain triomphé (F).

٢٣١٦٤ - كِيدَاش

هو لفة النجمة ، اطلبها .

٢٣١٦٥ - كِيدَان

داه يصيب الايل ينتفضش ثم تسكن كالي اعياما الصب .

Belayures des étables et routes ٢٣١٦٦ - كِيدِيَة

كثافة المزارب والطرقات وهي من الاسمدة العضوية الناعمة . ج. كيون .

Cirsium spectabile (S).

٢٣١٦٧ - كِيدِيَة *

Chardon spectaculaire (F).

نوع من القيصان المحول، اوراقه خلية الفصيل على صفحتيه وهو نبات من الحنص يصلح ورقه لاذباب الخيل يمتصها ويطيها وله كدوب وشوك مثل السلق ينبت فيا رة من الارض سهل . ج. كب .

Liberticide (F). Liberticide (E).

٢٣١٦٨ - كِيدِيَة ٥

الكبكية تقويض الحرية .

Fois (F). Liver (E).

٢٣١٦٩ - كِيد ، كِيدِيَة ، كِيدِيَة

الكبد والكبد والكبد . ج. اكباد وكبد هي احد اعضاء الجهاز الهضمي في الجسم . وهي غدة كبيرة اللد شبه هرمية الشكل تفرز الصفراء . مركزها وراء الحجاب الحاجز ، في الكشح الامين من التجويف الباطني . وهي تحضن حوصلة الصفراء المغروطة الشكل التي تخزن اللددة للمزاري . وفصل عن وظيفتها في اخزان الصفراء فالكبد تحول كل ما زاد من حابة الجسم من السكر الى نشا سيريني . تدهرو الحابة حيث تحولها حة الانتفاخ الى سكر نافله مائل . ويعرف من حالة عجز الكبد عن القيام بهذه المهمة بمرض السكري .

٣ - في الحنصيات : متابة اعمال كائون الاول الحاصة بانقظات وتوزيع الاسمدة وفرس التصويب وتقليم المراق...

٤ - في الانجار الحنظلة : غرس نصوب الانجار الايدة الارواك من حرجية وترتيبها يضاف اليها الاركاكيتيس والصفصاف واليموزا والكتروورينا والشكنيس والورد ...

٥ - في البقول والزهور : متابة اعمال الشجر المنصرم والمناية بالملفوف والتفتيب والخس والاسبانغ والتمر والتفجل والجزر والكركس واللفت والبقدرس والشونس والهلين والاراضي شوكة والقريةا والبازيلا والشيلك ... تهده زراعات ويشال الزهور على اختلاف انواعها والمناية بمختلف اوضاعها الخاصة واستمرار مكافحة اوسامها وشراها .

Caniche (F). Poodle (E).

٢٣١٤٤ - كَانِيَشِي
سلالة من الكلاب الصغيرة اللقد تتميز بصوفها الجملي وبقرط حرسها على اصحابها .

Caustique (F). Caustic (E).

٢٣١٤٥ - كَاوِي

Bourrache officinale (F).

٢٣١٤٦ - كَاوَزُون
هو الحنص الحزني ، اطلبه .

٢٣١٤٧ - كَاوَشِير ، كَاوَشِير ، سيفسارون بَرِي

Opopanax (S). Opopanax, Panals sauvage (F). Opopanax, All heal (E). Gummiplastinsk, Pastinake (D). Opopanax, Panaces (I).

جنس نباتات برية طيبة معمرة من فصيلة الحنصيات . اتواحه ثلاثة جذورها حنطية غليظة . سوقها متصبة دقيقة صلبة . اوراقها مركبة ريشية . ازهارها خيمية التجميع ، صفراء اللون ، صغيرة اللقد . يستخرج منها صمغ والتنجي يستعمل في الطارة والطب .

Caiman (F).

٢٣١٤٨ - كَايْمَان ، كَيْمَان

هو تمساح كيان ، اطلبه .

Fosse à fumier (F).

٢٣١٤٩ - كَبَا ، كَبِي

المزيلة . ج. اكباب .

Dunghill (E).

٢٣١٥٠ - كَبَايَة

هي فلفل كبابة ، اطلبه .

Hérison (F).

٢٣١٥١ - كَبَابِيَة الشوك

هي القنطذ ، اطلبه .

Sahadore (fruit) (F).

٢٣١٥٢ - كَبَات

نفسج ثمر الارواك واحده كبات . والبري ما لم ينضج من الكبات .

Inhibition ٢٣١٥٣ - كَبَا ، كَبِي ، منع

٢٣١٥٤ - كَبَا ، كَبَا ، كَبَا ، قَرْمَل

Frein (F). Brake (E).

٢٣١٥٥ - كَبَا ، كَبِي

Inhibiteur, inhibitif (F). Inhibitory (E).

نعت تعريفي يوصف به كل عامل يحول دون سير الحركة الطبيعية فيقولها او يوقظها كلياً .

Hépatite (F). Hepatitis (E).

٢٣١٥٦ - كَبَد

التهاب الكبد ، ويكون حاداً او مزمنياً .

Cédratier (F).

٢٣١٥٧ - كِيدَا

هو الإترج ، اطلبه .



كاشير



كباد



كبار



كبة

Câpre (F). Caper (E).

٢٣١٧٧ - كَبَرَّة

ثمرة الكبر. ج. اكبار وكبار :

Coproah (F). Coco-nut (E).

٢٣١٧٨ - كَبْرَة

هي لب النارييل ، اطلبه .

Soufrage (F). Sulphuring (E).

٢٣١٧٩ - كَبْرِيَّة

هو التغير بالكبريت أي ذر مسحوق الكبريت على النباتات لوقايتها من بعض الاوصام الفطرية أو لمكافحة تلك الاوصام .

Coléoptère mâle (F).

٢٣١٨٠ - كَبْرُكَل

He-coleopter (E).

ذكر الخنفساء ، وهو ايضاً جحر الجمل المقدس .

Capromys (S).

٢٣١٨١ - كَبْرُفَيْس * ٥

Capromys, Houtia, Chemi (F). Capromys (E).

جنس حيوانات لينة قاضية من فصيلة الداجيات . انواعه عديدة قريبة الشبه من الخردان . اجسامها رمية خضمة تطول من ٤٥ الى ٥٥ سم. وذناها من ١٥ الى ٢٧ سم. روثها مستطيلة . مقاضها مقعولة . اذناها مستعرجة معتدلة الخصر . عيونها كبيرة . برابطها العليا ملفوفة . اصابعها قصيرة غليظة . جريزها الامامية رباعية الاصابع اما الخلفية فخاصية . اطرافها طويلة مقوسة سادة . اذناها حشرقية الجلد يكسوها حلب مستطيل دقيق . موطنها فريزيا ومنتوراس وكوبا والجايك ... نالت الغابات والاحراج والادغال . تتسلق الاشجار بصفة ونسب على الارض ببطء . || قوتها الاوراق والتأثر والسماء .

Capros (S).

٢٣١٨٢ - كَبْرُوس * ٥

Capros (F). Capros (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الكبريات شاكات الزعانف . انواعه المعروفة عديدة . اعطانا بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . سارحها حشاش المجاهد في الاعماق التي يراوح فيها من ١٠ الى ٣٠ م. || اجسامها صغيرة القد ، مستعرجة الجسم ، مستطيلة الرأس والخطم ، كبيرة العين . زعانفها الظهرية الامامية تساعية المناسخ الحادة الاطراف || اعرف انواعه واشهرها الكبروس الخنزيري .

Capros aper (S). ٢٣١٨٣ - كَبْرُوس خنزيري * ٥

Capros sanglier, Sanglier (F). Boar-fish (E).

سمكة بحرية من الكبروس . اعطانا البحر الابيض المتوسط ، جسمها صغير القد ، بيضي اللون ، مبط الجرم ، يطول نحو ١٥ سم. رأسها متنفخ الارتكاز ، مخروطي الخطم المستدق الطرف كمنقبضة الخنزير . عيناها كبيرتان . زعنفتها الظهرية الامامية تساعية المناسخ الحادة . سفنها مهدب الصفعة انفضت . قوتها الى الحجرة القفصية المواجه لسمها كاعن الصف ، مستهجن الرائحة ، قل من يأكله .

Caproidae (S).

٢٣١٨٤ - كَبْرُوسِيَّات * ٥

Caproidae (F). Caproidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شاكات الزعانف . اجناسها وانواعها عديدة . اعطانا بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . اجسامها صغيرة مستعرجة . اعطائها ذلفة . عيونها كبيرة . زعانفها الظهرية كثيرة المناسخ الحادة حراشفها خشنة || اشهر اجناسها الكبروس .

Hépatiques (F). Liverwort (E). ٢٣١٧٠ - كَبَرِيَّة

صنف من قسم الطحليات .

Capparis (S).

٢٣١٧١ - كَبَر ، كَبَار

Câprier (F). Caper-tree (E).

جنس نباتات معمرة من فصيلة الكبريات . انواعه زهاء ١٢٥ مظهرها نباتات المناطق الحارة ، منها الاشجار والشجيرات والجنات ومنها الشائكة والرسعة . اوراقها منقطة متناوبة ينضج النسل . ازهارها فردية التجميع ، ابطية الارتكاز ، طويلة الزناد ، بحيلة الشكل ، كبيرة القد ، مستطيلة الاسدية المدينة للتلوة || اعرف انواعه واشهرها الكبر الشائك .

٢٣١٧٢ - كَبَر شَالِك * ، كَبَار شَالِك ، اصْف ،

صَف ، كَبَار

Capparis spinosa (S). Câprier commun, C. épineux (F). Caper tree, Common caper-bush (E). Kapparnstrauch, Echter Kapparnstrauch, Kapper (D). Cappero, C. spinosa (I).

نوع من الكبر وهو جنبة قراء فناء شائكة تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ م. منها القلم البحر التمشيط . فروعها دقيقة منبسطة ، اشواكها حجة . ازهارها وردية اللون كبيرة الحجم قطرها يراوح من ٤ الى ٦ سم. ثمارها كالتين شكا وقالبا لكنها لا تطول أكثر من ٥ سم. || ازهارها وثمارها تستعمل في المخلات . جلودها طيبة يقال انها نافعة وسطمة ومدرية البول .

Coccinia (S).

٢٣١٧٣ - كَبَر هِنْدِي

Coccinie, Céphalandre (F). Scarlet fruited gourd (E). Scharlachranke (D). Cefalandro (I).

جنس نباتات برية وزراعية معمرة من فصيلة القرعيات . انواعه المعروفة قليلة اعطانا البلاد الحارة . جلودها صقولية . سوقها مدادة از عارشة . اوراقها مفصصة او مثلثة الزوايا . ازهارها كبيرة القد ، بيضاء اللون او صفراء . ثمارها رقيقة الشكل ، صغيرة الحجم ، جامدة الياب . يزورها الى السواد المرط بالابيض || اعرف انواعه ما يلي .

٢٣١٧٤ - كَبَر هِنْدِي لثبي الورقي

Coccinia cordifolia (S). Coccinie à feuilles en coeur (F).

نوع من الكبر الهندي وهو نبات زراعي مداد يطول نحو ٢٠٠ سم. اوراقه صغيرة القد ، خماسية التخصيص ، قليلة الشكل ، تطول نحو ١٠ سم. فصلها لامع البشرة على صفحتي . حوائطه بسيطة . ازهاره الى الياض المائي ، قطرها يراوح من ٢ الى ٤ سم. ثماره رقيقة تطول نحو ٥ سم. لونها الى الخضرة ، لهاها جامد المادة ارجواني الخضاب . ثماره وصقله مأكولة .

٢٣١٧٥ - كَبَر هِنْدِي كَفِي الورقي

Coccinia palmata (S). Coccinie à feuilles palmées (F).

نوع من الكبر الهندي وهو نبات تتسلق يطول من ٦ الى ٨ امتار . اوراقه كثة الشكل طويلا يراوح من ٨ الى ١٠ سم. حوائطه فارقة . ازهاره الكرية عقدية التجميع صفراء اللون . ثماره بيضيه الشكل والحجم ، حقيقة اللون ، لهاها جامد المادة الصفراء || ثماره وصقله مأكولة .

٢٣١٧٦ - كَبْرُون

Sulfurer (F). To sulphurate (E).

استعمل الكبريت .



كبر شالك



كبريس



كبريس خنزيري

٢٣١٨٥ - كَبْرُوفِيلْس مُحرّز

Coprothila strié (F).

هو الطروب المحرز ، اطلبه .

٢٣١٨٦ - كَبْرُوفِيلْس (F). Coprolitha (F). Coprolitha (E).
سماد الغائط المتحجر . وقد يجتر من التفتات الطبيعية .٢٣١٨٧ - كَبْرُوفِيَّة (F). Coprosma (S). Coprosma (F).
جس نباتات معمرة بخرّة من فصيلة القرويات ، اناؤها للممررة قليلة ، مهددا بلاد زيلندا الجديدة . سيقها تملو من ٣٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها مستديرة الشكل ، ومقلوبة القاعده ، نصلها يطول ويمرض من ٢ الى ٨ سم . صفحت جميلة الخضار الزاهي تملو حثارتها زرقشة صفراء ، والكبروية تستعمل في الحدائق استعمل المضاف الياباني .٢٣١٨٨ - كَبْرِيَّات (S). Capparidaceae (S).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ، اجناسها واناؤها كثيرة العدد جميعها أربعة اسباط : البانيات والزيريات والكلياريات والميرويات . نباتاتها مختلفة الاشكال والاجسام منها

الاشجار والشجيرات والجنات ومنها الاعشاب الحولية والمعمرة . اوراقها متناوبة ، معتقة ، اذليّة . اثمارها حيلة القالب فردية او مستديرة التجميع . ثمارها حبة ثنائية الفلق || معظمها من نباتات المناطق الحارة وهي تحوي بعض الزيوت الطيارة الطبية وبعض العناصر المختلفة انحصها الصحية والشابة والسامة .

٢٣١٨٩ - كَبْرِيَّت (F). Soufre (F).

Sulphur, Brimstone (E).
جسم صلب اصفر اللون قابل الكسر يزنه (كـ - ٨) . وزنه الاناثي ٣٢٠٦٦ يتحصر في ١١٢ سم . ويتقد في ٢٥٠ سم . حبة استقراته زرقاء اللون ساطعة خائفة . وهو رديء الاصل الحرارة والكهرباء يلوي في الاثير والبيزيت والزيوت ولا يلوي في الماء || عرفه الانسان واستخدمه منذ قدم الزمان وهو يوجد في الطبيعة اما نقيا واما مزوجا ينيره من العناصر كالحديد والنحاس والزرصاص . يستهلك منه العالم سنويا ملايين الاطنان في صناعة الاسمدة والاصباغ واللقاب والبارود والادوية الطبية الجلدية والادوية الزراعية ... من اناؤه النقية التي تستعمل في الزراعة ضد الاوصام الفطرية :

الكبريت الميكروني (F). Soufre micronisé (F).

الكبريت الزهرا (F). Soufre sublimé, Fleur de soufre (F).

الكبريت المسحق (F). Soufre trituré (F).

الكبريت المبلور ، الكبريت الممدود (F). Soufre cristallisé (F).

٢٣١٩٠ - كَبْرِيَّت الرصاص (E). Galène (F). Galène (E).
مركب معدني يسمي نحو ٨٦,٥٠ ٪ من الرصاص و ١٣,٥ ٪ من الكبريت وبعض الشيء من الزر من الفضة او الخلد او الزنك او الالمنيوم . وهو رصاصي اللون ، ازرق المثلج ، اسفح البريق ، سريع الكسر . ثقله النسبي يراوح من ٧,٤ الى ٧,٦ وهو شائع الاستعمال الصناعي يستخدم خاصة في طلي الآلية الخزفية مناسا لانتصافه الماء .

٢٣١٩١ - كَبْرِيَّات (F). Sulfate (F).

راجع سلفات .

٢٣١٩٢ - كَبْرِيَّات البوتاسيوم

Sulfate de potasse (F).
راجع سلفات البوتاس .

٢٣١٩٣ - كَبْرِيَّات الحديد

Couperose verte, Mélanterie (F). Green vitriol (F).
مركب معدني طبيعي اخضر اللون يوجد في بعض الكنان .

٢٣١٩٤ - كَبْرِيَّات الزنك

Couperose blanche, Goslarite (F). White vitriol (E).
مركب معدني طبيعي ابيض اللون ، سهل الكسر واللوان ، طعم الحام ، قليل الزرور .٢٣١٩٥ - كَبْرِيَّات الصوديوم (F). Sulfate de soude
راجع سلفات الصود يوم .٢٣١٩٦ - كَبْرِيَّات الكلس (F). Sulfate de calcium
راجع سلفات الكلسيوم .

٢٣١٩٧ - كَبْرِيَّات النحاس

Couperose bleue, Cyanose, Chalcanthite (F). Blue vitriol (E).
مركب معدني ازرق اللون ، زجاجي الحمر ، طعم

الطعم ، يلوي في الماء . يوجد في مناطق النحاس .

٢٣١٩٨ - كَبْرِيَّات الأمونيوم

Sulfate d'ammoniaque (F).
راجع سلفات الأمونيوم .٢٣١٩٩ - كَبْرِيَّت الحديد (F). Pyrite (F).
هو البيريت ، مركب من كبريت ومعدن . Pyrites (E).٢٣٢٠٠ - كَبْرِيَّتُ الكربون ، سُلْفُورُ الكربون (E). Sulfure de carbone (F).
مائع ثن الرائحة شديدة القاطية لا لون له يستعمل في الزراعة لقتل حشرات الخضر وتطهير التربة من بعض الاوصام الفطرية المستعصية .

٢٣٢٠١ - كَبْرِيَّتِي (E). Sulfureux (F). Sulphureux (E).

٢٣٢٠٢ - كَبْشَة ، لَوْرَة الالهة (F). Cabosse (F).
ثمرة الكاكو ، رابع كاكو . Bump (E).٢٣٢٠٣ - كَبْسُودُ الزعرور (F). Caprodes flavomarginatus (S).
Caprodes de l'aubépine (F).

شجرة خاضلة من فصيلة السبجيات . جسمها صغير يطول نحو ٨ سم . وأساها محرم ، اسهب اللون . خطيبها شديد السمرة . حينها يارتقان . زياناها مستطيلان ، اسمران . كسلبها اسهب يملو موج اسمر . حطبها صغرة ، صناعية . ظهرها لاسف ، حنجبها الى الشبهة القبياء المواج ، يغطيها حار سيق اصفر ذهبي يتحول في الزمان الاخضر الى صناعي . بعلها شديد السمرة ، اخر الحار . ثمرها حيلة بالاسمر والاصفر || تألف الحراج والمواقع التي يكثر فيها الزعرور .

٢٣٢٠٤ - كَبْش (F). Bâlier (F).
ذكر القبان يستطع السقاد . ج اكيش واكاش وكباش .٢٣٢٠٥ - كَبْش (F). Fascine (F).
اغصان واغصان واغصان توضع في سبيل الماء لتحويل قسم منه الى مجرى آخر .

البياض الفضي. اخاديد صدرها وصفائح حنكها الى السواد الباهت .

٢٣٢١٤ - كَبُوعَة مَلَوَانَة

Megaptera versabilis (S). *Mégaptère changeante* (F). موطنها شمالي المحيط الهادي طويلا براوح من ١٨ الى ٢٥ م. رأسها وظهورها الى الزبداء الصفراء الزرقاء الملوحة . يطها الى البياض الماسي تغلوه ماجة وردية . اخاديد صدرها وصفائح حنكها الى السرة القاتمة .

٢٣٢١٥ - كَبُوكَاب السَوْدَة
Hérissor (F). هو القغذ ، اطليا .

٢٣٢١٦ - كَبُول
Fourrure garnie (F). الكيل : الكثير الصوف من الغنم .

٢٣٢١٧ - كَبُوعَة
Cabomba (S). جنس نباتات مائية معمرة من فصيلة النيلوفرديات . انواعها المعروفة قليلة . سوقها شجيلة . جلورها كالشمر تشعاشها مادة لزجة . اوراقها متعاقبة صاجية النصل تركز على معاليق مستطيلة . ازهارها فردية التجميع ابضية الارتكاز سداسية البتلات . بتلاتها صفراء الانتشاب بيض الاطراف . اوراقها وازهارها تغلف على سطح الماء . وهي تعيش في الاكواريوم وتشتمل كرمي لاسماك المياه العذبة ا حروف انواعها ما يلي .

٢٣٢١٨ - كَبُوعَة كَرُولِيَّة

Cabomba caroliniana (S). *Cabomba de la Caroline* (F). نوع من الكبيمة المعمرة السبروتية الشاملة الاستعمال كرمي للاسماك . اوراقها صاجية طافية . ازهارها بيض الاطراف ، صفر الانتشاب والاقراس ا تنورها يستمر من ايار الى آب .

٢٣٢١٩ - كَبُوعَة مَالِيَّة

Cabomba aquatica (S). *Cabomba aquatique* (F). نوع من الكبيمة المعمرة السبروتية الشاملة الاستعمال كرمي للاسماك . اوراقها طافية بيضية النصل الاخضر الذي يطول من ١ الى ٣ سم . ازهارها صفراء اللون تشبه زهر الحيقان المائي ا تنورها يستمر من نيسان الى تموز .

٢٣٢٢٠ - كَبُونْد
Capnodium (S). هو التيج ، فطر مجهرى ، اطليا .

٢٣٢٢١ - كَبُول
Chabot, Chabotage (F). مرض جراثيمي يصيب الكرمة فينشطها على افراخ الجلودر المحاوية لشجيرة .

٢٣٢٢٢ - كَبُول
Copris lunaris (S). *Copris* (F).

حشرة من الجمليات يكثر وجودها في الربيع والصيف . طويلا براوح من ١٥ الى ٢٢ سم . ثوبها الى السواد اللامع . ذكرها مسلح بقرون مستطيل حاد . انتفاها سلسلة بشفرة ذرية عمودية الارتكاز . وهي من الحشرات العنصرية الثالثة التي تعيش على مختلف انواع البراز . محبرها سرداب فردية نسيجة تنبع فيها اكر الزبل التي تحفرها الانثى بلاشتراك مع الذكر ثم تمتع كل اكر بكثرة وتقوم على حراستها حتى اكمال التفك الذي يستمر اكثر من اسبوعين .

٢٣٢٢٠ - كَبَشُ الْجَبَل
Mouflon (F). *Mountain Sheep* (E). حيوان لبون يجتر يعرف بالاروية ، اطليا .

٢٣٢٢٧ - كَبَشُ الْقَرْفُول
Girofle, Clou de girofler (F). *Clova* (E). هو زهرة القرنفل المانعة . طمسها حريف ، والحنثا ذكية المرف فواحة . يستخرج منها زيت شائع الاستعمال الطبي وهو مضاد للآفة والتشنج يغير الاعصاب ويسكن ألم الانسان .

٢٣٢٢٨ - كَبَشِي الرَّاس
Criocéphale (F). *Criocéphalous* (E). نعت تعريفي يطلق على كل من كان رأسه كراس الكيش .

٢٣٢٢٩ - كَبُوع
Megaptera (S). *Mégaptère* (F). *Humpback whale* (E). الواحدة كبة . جنس حيتان عظيمة القدر مربية الشكل . انواعها المعروفة حثة تألف المحيطات . طويلا براوح من ١٢ الى ٣٥ م . تتميز زئفانها الصدرية المستطيلة الضيقة الرابضة الاسابع . رؤوسها ضخمة ، صفائح احناكها قصيرة مستعرضة مسطحة . صدرها عمدة متوازية التضخيد الطولي ا قوتها الاسماك الصغيرة . تجوب الاعماق والمياه السطحية والاقليمية في طلب الرزق . اناتها تقص من جرو الى جرون ترصمها بقصة شعور ا مرضها تفوق سرعة المراكب البخارية . صيدها خطر وشاق دهنها مرغوب فيه وقد براوح انتاج الكبيمة الواحدة من ٤ الى ٥ اطنان . اما انواعها الخمسة فهي ما يتبع .

٢٣٢٣٠ - كَبُوعَة الْجَنْتُب ، كَبُوعَة لَانْتَد

Megaptera islandi (S). *Mégaptère de l'Islande* (F). موطنها جنوبي المحيط الاطلسي . طويلا براوح من ٢٠ الى ٢٥ م . رأسها وظهورها الى السرة الزرقاء . يطها الى البياض الاخضر . صفائح حنكها الى السرة القاتمة .

٢٣٢٣١ - كَبُوعَة الْخَلِيج
Megaptera indica (S). *Mégaptère indienne* (F). موطنها الاقيايس الهندي تكثر في الخليج الفارسي . طويلا براوح من ١٢ الى ١٥ م . رأسها وظهورها الى الكبيمة الصفراء الصفراء الملوحة . يطها الى البياض الاخضر الكدر . اخاديد صدرها وصفائح حنكها الى السواد الباهت .

٢٣٢٣٢ - كَبُوعَة الْقَطْب ، كَبُول الْبَحْر

Megaptera Boops (S). *Mégaptère Boops, M. longimane, Baleine à bosse, Jubarte, Gibbar, Poisson de Jupiter, Képorak* (F). اكبر انواع الكبح وارضها جثة وطولها هيكل واغرها شكلها . طويلا براوح من ٣٠ الى ٣٦ م . تتميز بسلام كسام الجمل على شبح الظهر وريضة ظهريه متعرجة الشكل صغيرة القدر . رأسها وظهورها الى السواد اللامع . يطها الى البياض . اخاديد صدرها الى السرة القاتمة . صفائح حنكها سود ا موطنها شبح الاربعاء يشمل بحار القطب الشمالي والشمالي الاطلنسي .

٢٣٢٣٣ - كَبُوعَة كُوْزِيْزَا
Megaptera Kuzira (S). *Mégaptère Kuzira* (F). تكثر في مضيق بارين والبحار المحيطة . طويلا نحو ٢٠ م . رأسها وظهورها الى السواد الأزرق الملوحة . يطها الى



كبح



كبيمة كرولية



كَبُول (١)



كَبُول (٢) منظر جانبي

Swine-book - ٢٣٣٢٧ - **كِتَابُ الْخَنَازِيرِ**
يحمل تدوين فيه أنساب سلالات الخنازير .

Stud-book - ٢٣٣٢٨ - **كِتَابُ الْأَسَابِ الْخَيْلِ**
يحمل تدوين فيه أنساب سلالات الخيل .

Flock-book - ٢٣٣٢٩ - **كِتَابُ الْأَسَابِ الْفُضَانِ**
يحمل تدوين فيه أنساب سلالات الفُضَانِ .

Canis-book - ٢٣٣٤٠ - **كِتَابُ الْأَسَابِ الْكَلَابِ**
يحمل تدوين فيه أنساب سلالات الكلاب .

٢٣٣٤١ - **كِتَابُ** نبات كالجرير . (السان) .

Agglomérat, Conglomérat (F). - ٢٣٣٤٢ - **كِتَابُهُ**
Agglomerate, Conglomerate (E).
حالة تجميع طينية تكون عليها بعض المواد المختلفة . أحيانا طبقات الحصى والريال المتناسكة .

Imperméabilité (F). - ٢٣٣٤٣ - **كِتَامٌ ، كُتُومٌ**
Impermeability (E).
خاصة مسك الماء في بعض أنواع القرية . وفي من عرب القرية الزراعية لأنها تجعلها شديدة الصلابة والأندماج .

Linum (S). Lin (F). Flax (E). - ٢٣٣٤٤ - **كِتَانٌ**
يحمل نباتات برية وزراعية من فصيلة الكتانيات . أنواعها للمروقة زهاء ١٠٠ معظمها حولي وبعضها معمر . بعضها خشبية أو لينة متصفة غليظة . أوراقها لائقة متعاقبة سنانية النصل أو غليظة . أزهارها خالية التركيب متفوية التجميع مختلفة الألوان منها الأبيض والأصفر والوردي والأزرق والأحمر . ثمارها حقية ، وزورها بيضية صغيرة ملساء تستعمل في الطب ويستخرج منها زيت حار تستعمل في النحان والعلل . كما وأنه يستخرج من غلاف بعضها البغيةلياف صناعية نسجية تحمل المركز الثاني بعد القطن || أشهر أنواعها البرية والزراعية الصناعية والزينة ما يلي .

Linum suffruticosum (S). - ٢٣٣٤٥ - **كِتَانٌ أَبْيَضٌ**
Lin blanc (F). White flax (E).
نوع من الكتان البردي الزرني . وهو حشبة حولية تملو نحو ٣٠ سم . ساقها خشبية ، منتفلة ، معوية ، فراء ، خلية السعد . أوراقها غزوية الشكل ، جامدة النصل . أزهارها أبيض الناصع . حار . يتخللها إلى الحمرة البنفسجية الملوحة || أزهاره يستمر من أيار إلى آب .

٢٣٣٤٦ - **كِتَانُ الزَّهْرِ * ، كَتَانُ زَهْرِي ، كَتَانٌ كَبِيرُ الزَّهْرِ**
Linum grandiflorum (S).
Lin à grandes fleurs (F). Flowering flax (E).
Leinblume (D). Lino d'Africa (I).
نوع من الكتان وهو حشبة حولية زرينية تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم . ساقها فراء ، فروصها منتفجة متصفة . أوراقها سنانية ، فصلها بحري اللون . أزهارها كبيرة القند . حيلة الحمرة مهدبة النصل || أزهاره يستمر طوال شهر حزيران

٢٣٣٤٧ - **كِتَانُ الشَّرْقِ**
Lin orientale (S).
Lin d'Orient (F). Oriental flax (E).
نوع من الكتان الطبي البري المبلول ، منته الشرق الأوسط . حشبة معمرة تملو من ١٥ إلى ٢٠ سم . ساقها خشبية فراء . أوراقها صغيرة القند ، فصلها وسيد المرق

Productif (F). Productive (E). - ٢٣٣٢٣ - **كَبُوسٌ**
كثير الحمل . يقال فلانة كبوس رثلة كبوس .

Caprine (F). - ٢٣٣٢٤ - **كَبُوسِيْنٌ**
هي السلية ، نيسات حشبي زريني مأكول الأوراق والأزهار ، اطلبا .

Loche (F). - ٢٣٣٢٥ - **كَبِيْتٌ**
هو القمح من الإصمك البهرية ، اطلبا .

٢٣٣٢٦ - **كَبِيْتَةٌ * ، كَبِيْتِيَّةٌ**
Copaifera (S).
Copaier, Copahier, Copayer (F). Copaiba-tree (E).
جنس اشجار حرجية من فصيلة القرنيات . أنواعها المروقة نحو ٢٠ . أطاها البلاد الحارة الافريقية والاسيوية . بعضها اشجار كبيرة القند يرواح ارتفاعها من ١٥ إلى ٢٥ م . أغصانها منتفجة . أوراقها مركبة متعاقبة . أزهارها سلبية التجميع . ثمارها قرون صغيرة رقيقة وحيدة البزرة المستطيلة المبطلة || أغصانها جوفية اللون سلبية تستعمل في التجارة . يستخرج من ساقها سليل راتنجي المادة ، يلسي العرق يستعمل في الصيدلة .

Macrocarpe (F). - ٢٣٣٢٧ - **كَبِيرُ الْقَصْرِ**
Macrocarpus (E).
نعت ثمريني يطلق على كل نبات ينتج ثماراً كبيرة .

Mégalocephale (F). - ٢٣٣٢٨ - **كَبِيرُ الرَّاسِ**
Megalcephalus (E).
نعت ثمريني ووصني يطلق على الحيوانات الشاذة ببغامة رؤوسها .

Renoncule des fleuristes - ٢٣٣٢٩ - **كَبِيْكٌ**
هو الخوذة الاسيوي ، نبات قصير الساق ، كره الرائحة ، اطلب .

Blométrie (F). - ٢٣٣٣٠ - **كَتَتْ ، بِيَوْمَتِيَا**
Biometry (E).
بحث بيولوجي يطبق القواعد الاحصائية وحساب الاحالات على حياة الكائنات الحية .

٢٣٣٣١ - **كَتَاٌ**
الواحدة كتاة . نبات كالجرير يطبخ فيوكل (السان) .

Book - ٢٣٣٣٢ - **كِتَابٌ**
يحمل الانساب في الحيوانات الداجنة .

Lettre de crédit (F). - ٢٣٣٣٣ - **كِتَابُ الْإِعْتِمَادِ**
Letter of credit (E).
رسالة يبعث بها صاحب المصرف إلى وكلائه لكي يحتفظ مبلغاً من المال رهن تصرف شخص سمي .

Pedigree (F). - ٢٣٣٣٤ - **كِتَابُ الْأَسَابِ**
Pedigree (E).
يحمل تدوين فيه انساب سلالات الخيول العرب وحياد الرهان وسائر الحيوانات الموصلة .

Lettre de garantie (F). - ٢٣٣٣٥ - **كِتَابُ الضَّمَانِ**
Letter of guaranty (E).
كتاب يتعهد به شاحن البضائع وناتلها بإيصالها على الحالة المبينة في تذكرة الشحن .

Herd-book - ٢٣٣٣٦ - **كِتَابُ الْأَسَابِ الْبَقَرِ**
يحمل تدوين فيه أنساب سلالات البقر .



كَبِيْتَةٌ



كِتَانُ الزَّهْرِ

Linum viscosum (S).
Lin visqueux (F).

نوع من الكنان البري وهو عشبة معمرة تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. ساقها فراءة مزقية . أوراقها سنانية ثلاثية أو خماسية المروق . نصلها مبشر اللقد ، خلي البشرة على صفحتيه . أزهارها وردية اللون موشة بالبنيسي . أزهاره يستمر من أيار إلى تموز .

٢٣٢٥٣ - كَنَان مَسْهَل * ، قَرَق

Linum catharticum(S). Lin purgatif (F). Purgif flax, Fairy flax, Cathartic flax (E). Purgier-Lein, Purgier-Flachs (D). Lino a foglia purgative (I).
نوع من الكنان البري الطبي اللبلول وهو عشبة معمرة تملو من ١٠ إلى ٢٥ سم. ساقها غشقية فراءة . أوراقها طيبة مسهلة ، السفلى منها ضخمة الجميع ، سنانية النصل ، الوسطى والعليا متعاقبة غشقة . أزهارها كبيرة اللقد لونها إلى الصفار التيي || أزهاره يستمر طوال شهر تموز .

Linaceae (S).
Linacées (F). Linaceae (E).

نصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . أجناسها ١٤ تشمل ٢٣٠ نوعاً منها جميع الأصناف المعتدلة . معظمها عشبي حولي أو شجرى وبعضها شجري أو جنبي . أوراقها متعاقبة أو متقابلة . أزهارها تاجية الازتكاز ، لاقية الجميع منها الفردية والمتقوية والمشكولية . أشهر أجناسها الكنان والكوكا والرديولا .

Démographie (F).
Demography (E).

الكناية علم احصاء الجماعات البشرية .

٢٣٢٥٦ - كُتُبُ الْاِنْسَان

Livres généalogiques (F). Genealogical books (E).
مجلات تدون فيها الحيوانات بأسمائها وأشكالها مع اسماء وأشكال الآباء والامهات وصفاتها المميزة وما اشتهرت به النح .

٢٣٢٥٧ - كَعْد ، كَعْد ، كَعْد

الكند والكند هو اكل الكند وقيل هو الكامل وقيل هو ما بين الكامل الى النهر . ج اكاد وكند .

٢٣٢٥٨ - كَعْر ، كَعْر ، كَعْر ، كَعْر

Milieu d'une chose (F). Middle of one thing (E).
هو جواز كل شي ، اي اوسطه .

٢٣٢٥٩ - كَعْرِيش * ، جَمِيْلُ الشَّعْرِ

Callitriche (S). Callitriche, Callitriche (F). Wassersternwurz (E). Wasserstern, Sternkraut (D). Callitriche (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من نصيلة الكثرشييات . انواعه قليلة العدد ، اصطلها البلاد الحارة والمعتدلة تعيش في المياه العذبة || يستخرج منها عصارة لزجة ملينة تقيد الشعر وتحمده ملده وسهه .

Callitrichaceae (S).
Callitrichacées (F). Callitrichaceae (E).

نصيلة نباتية من ذوات الفلقتين أجناسها وانواعها قليلة العدد . جميعها مائية . اشهرها الكثرش .

يطول نحو ٦ م . ويعمر نحو ٢ م . قصته تنتهي بهلية دقيقة خرية . أزهارها برتقالية اللون ، غدية النصل الشفافة . أزهاره يستمر من نيسان إلى حزيران .

٢٣٢٥٨ - كَنَان بَرِّي * ، كَنَان هَبِّي الْوَرَق

Linum angustifolium (S).
Lin sauvage (F). Pale flowered flax (E). Wilder Lein (D). Lino salvatico (I).
نوع من الكنان البري اللبلول وهو عشبة معمرة تملو من ٢٠ إلى ٣٥ سم. ساقها غشقية قليلة الفروع المتصبة . أوراقها خفيفة ، نصلها غشقي الصفحة ، وسيد المرق . أزهارها قليلة العدد لونها إلى الزرقة الالكية المسلوخ . أزهاره يستمر من نيسان إلى حزيران .

٢٣٢٥٩ - كَنَان ذَهَبِي

Linum flavum (S).
Lin jaune d'or (F).
نوع من الكنان البري الذي هو عشبة معمرة تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. ساقها غشقة فراءة . أوراقها ملوكة الشكل ، نصلها يطول من ٢ إلى ٣ سم . ويعمر من ١٥ إلى ١٠ سم . وهو ثلاثي المروق ، بحري اللون . أزهارها فرقة ، كثيرة العدد ، خضبة اللون || أزهاره يستمر من حزيران إلى تموز .

٢٣٢٥٠ - كَنَان زَيْلَنْدَة

Lin de la Nouvelle Zélande (F).
هو الفريوم المتصلب ، أخليه .

٢٣٢٥١ - كَنَان شَايَع * ، مَلَسَج

Linum uscatissimum (S). Lin cutivé, Lin commun (F). Common flax (E). Echter Lein, Gemeiner Flachs (D). Lino usuale, Lino comune (I).
هو الكنان الزراعي الصناعي المشهور - خروب عذبة . جلوره وثنية متوسطة الانتصاب . ساقه منتصبه فراءة تملو من ٤٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقه سنانية النصل ، خضراء اللون . أزهاره إلى البيضاء أو الزرقة الباهتية . ثمار جرداء كروية مقطوعة الرأس والعلب ، عفاوية المصاريع وفي كل مصراع بذرة . البذرة مألقة ، لامعة ، حمراء اللون ، مغلطقة : تطوي من ٦ إلى ٦ م . ويعمر من ٢ إلى ٣ سم . لياها زهني الملقدة ينتج من ٢٢ إلى ٤٢ ٪ من الزيت . يقال انه من اقدم النباتات الصناعية لان زراعته وصنعة اليافه في بلاد ما بين النهرين في مصر تمتد إلى ابد من اربعة الاف سنة || زراعته الحالية خيسمة الارباع تشمل الولايات المتحدة والارجنتين وروسيا وبوليفيا ولتوانيا والمملكة الفرنسية وهولندا وبلجيكا وتركيا || وهو موجود في اقاليم المعتدلة ويفضل المناخات الرطبة على الجافة والايواء المنكدة البشيرة اليوم على الصافية الادم || وهو يرغب في الاربة الخصبه اذنية المنسوبة التركيب الحكي ، المتوسطة الاندماج ، لانه من النباتات الشجرة التي تستنزف كل ما وصل اليها من العناصر العضوية والمعدنية || يكثر عادة في ارازل الربيع ويقطع حنسا . تصفر سوه وقد يكون ذلك في ارازل الصيف . فيترك في الحقل بضعة ايام إلى ان يجف سوه ثم ينقل إلى المضارب حيث تفصل البذور من السوق . اما الالياف الصناعية النسيجية فتفصل من السوق اما بواسطة الحرارة في معامل خاصة مجهزة هذه الفاية واسا بواسطة الماء وهو ما يسمونه التطن وقد يتم بنقع حزم سوق الكنان بالماء ارا مدة من الزمن تقربها حرارة الموق كنديا صديقاً تراوح من اسبوع إلى اسبوعين .



كَنَان بَرِّي



كَنَان شَايَع



كَنَان سَهْل



كَثْرِيش

٢٣٢٧٠ - كَنْتَلْبَة صِيْبِيَّة

Catalpa bungei (S).
Catalpa de Bunge, Arbre puant (F).
 نوع من الكنتلبه وهذا الصين . ثمرتها صغيرة اللقد تملو
 من ٧ الى ١٢ م . اوراقها رعيه الشكل مقطوعة القاعدة .
 نصلها بطول نحو ٢٠ سم . ويعرض ١٤ وهو مائل البشره
 خلى المروق على الصفحة السفلى . ازهارها طول نحو
 ٤ سم . وتعرض ٥ سم . لونها الى البياض اللوح بالاصفر
 والجلوي . ثمارها مخروطية طول من ٢٥ الى ٤٠ سم .
 ازهارها يستمر طوال شهر سزيان .

٢٣٢٧١ - كَنْتَلْبَة ظَرْفِيَّة

Catalpa speciosa (S).
Catalpa elegant (F).
 نوع من الكنتلبه وهو شجرة سرية سرية تملو من
 ٢٠ الى ٣٠ م . مهدها أمريكية الشمالية . ساقها منتصبه
 فرعاء . اوراقها طول نحو ٣٠ سم . وتعرض ١٨ سم .
 نصلها ذوب المنقعه المستطيلة . ازهارها منفردة التجميع ،
 كبيرة اللقد طول نحو ٧ سم . وتعرض ٨ سم . لونها الى
 البياض المرقط بالاصفر . ثمارها طول نحو ٥٠ سم .
 ازهارها يستمر طوال شهر سزيان .

٢٣٢٧٢ - كَنْتَلْبَة يَابَانِيَّة

Catalpa ovata (S).
Catalpa du Japon (F).
 نوع من الكنتلبه السرية مهدها اليابان . ثمرتها صغيرة
 اللقد تملو من ٦ الى ١٠ امتار . اوراقها ثلاثية اوخاسية
 التفصيص البيضي الشكل . نصلها طول نحو ٢٠ سم .
 ويعرض ١٥ سم . ازهارها صغيرة اللقد ، صفراء اللون ،
 لمطخة بالبنفسجي . ثمارها مستطيلة دقيقة كالاصابع .
 ازهارها يستمر من سزيان الى تموز .

٢٣٢٧٣ - كَنْتَلْبَة صَفْرَاء

Immortelle des sables (F).
 هي الخالية الطالقة ، اطلمها .

٢٣٢٧٤ - كَنْتَلْبَة هَوَاء

Mass d'air (F).
Mass of wind (E).
 تعريف جيواي يدل على مجرى الهواء المتحرك في اتجاه
 معين .

٢٣٢٧٥ - كَنْم

و نبات جبلي ورثه كوروك الاس يشضب به مقيافا وله
 ثم كثر القفل ويسود اذا لفع رقه يمتصر منه
 دهن (ا . م) .

٢٣٢٧٦ - كَنْن

Tubercularia (S).
 جنس تطور مجهرية من عارة الوطنيات وفضيلة الكنتيات .
 جرابه الكندي كثير القروع البامدة الترتيب . كئلده
 وسيدة الخلية ، كروية او اسطوانية الشكل . وسادته
 بجنية تيمو عند انفلاقها خلية اللؤلؤ زاهرة اللون || انواعه
 قليلة . اعرفها الثلاثة التالية .

٢٣٢٧٧ - كَنْن الإِجَاص

Tubercularia piricola (S).
 نظر مجهري يركب الخار المغنشة . لفزونة اخصها
 الاجاص والفتاح || ينشط ويتكاثر في بيئة خاصة
 سوارتها تفرق الاربع درجات شتيفارد وروطها من
 ٨٠٪ / وسادته || مظهره الخارجي نندت خلى آخر اللون ،
 ايضخ للملوح ، يركب البشره فيطبعها ثم ينور في البب نيفته
 ويبره .

٢٣٢٧٨ - كَنْسُوس

Chatossus (S).
Chatossus (F). *Chatossus* (E).
 جنس اسماك بحرية زهرية من مفتوحات المثانة وفضيلة
 الصابوغيات . انواعه المعروفة عديدة معظمها نهرى وبعضها
 بحري . واليسري منها يلزم النهر في زمن الاسراء ||
 اجسامها اطليجية الشوزن ، طول من ٢٠ الى ٢٦ سم .
 رؤوسها صغيرة ، مثقلة الاسحاق . عينها ماصة . زانفتها
 الظهرية صغيرة ، شبه مزوانية . الصدرية والخروية
 صغيرة . الشرجية مستطيلة . الذيلية فارقة . اوراقها متقاربة
 تسمر في القسم الاعلى وتكثر في الاسفل || يكثر ويوجد
 في الهند والصين واليابان || لحوبها مأكولة وبعضها جيد
 الصنف .

٢٣٢٧٩ - كَنْشُول

Cedchol (F).
 بلورات ارية حامدة اللون براقه تستخلص من الكاشو
 والسمير والطلان الخ ... تفل عنه ١٧٧/١٧٥ سمغ .

٢٣٢٨٣ - كَنْمِد

Cernier (F).
 مكنة بحرية تدعى قباب ، اطلمها .

٢٣٢٨٤ - كَنْف ، عَانِق ، مَنَكِب

Epaula (F). *Shoulder* (E).
 الجزء العلوي من النسد .

٢٣٢٨٥ - كَنْشَان

الكشفان الجراد اول ما يطير . ويقال هو الجراد بعد
 اللغواء اوله السره ثم اللدب ثم اللغواء ثم الكشفان . الواحدة
 كشفانة .

٢٣٢٨٦ - كَنْكَوَت

Poussin (F).
 هو القروب والصومس .

٢٣٢٨٧ - كَنْكَاز

Catalase
 خيرة نباتية تهيم على انتاج واتزان هيدرات الاوكسجين
 في النبات .

٢٣٢٨٨ - كَنْتَلْبَة

Catalpa (S).
Catalpa (F). *Catalpa* (E). *Trompetenbaum*, *Trompetenstrauch* (D). *Catalpa* (I).
 جنس نباتات برية وجرينية من فصيلة البينونيات . انواعه
 المعروفة ٤ جميعها اشجار صغيرة او متوسطة اللقد . سقوها
 منتصبه . اغصانها فارشة . اوراقها بسيطة ، عابلة ،
 متغابلة . نصفانحة النصل . ازهارها جرسية الشكل .
 ثمارها جرد مستطيلة كالخيار || اعرف انواعه واشهرها
 ما يتبع .

٢٣٢٨٩ - كَنْتَلْبَة شَالَمَة

Catalpa bignonioides (S). *Catalpa commun*, *C. de la Caroline* (F).
 نوع من الكنتلبه الحرجية السرية المبالحة مهدها أمريكية
 الشمالية . ساقها تملو من ٥ الى ١٥ م . اوراقها كبيرة
 اللقد ، بيضاء الفصوص ؛ نصلها بطول نحو ٢٥ سم . ويعرض
 ٢٠ وهو ازغب المروق كربه الزائفة عند اللس . ازهارها
 منفردة التجميع طول نحو ٥ سم . وتعرض ٦ . لونها الى
 البياض المرقط بالاصفر والاحمر . ثمارها طول من ٢٠
 الى ٤٠ سم . وتعرض من ٦ الى ١٥ || ازهارها يستمر
 من حزيران الى آب .



كَنْتَلْبَة شَالَمَة

تميش على الصغور المشورة قرب الشطوط || اصداها داخلية رقيقة صغيرة . اجسامها لحمية ، بيضية الشكل او ايليجية تنملها الادية الفغفاضة . غياشها يمينية الاركاناز نظامية الترتيب الثنائي الصف . افواها غطبية الشكل . لواسها ثنائية انبوية مغلوجة السطوح الخارجية .

٢٣٢٨٧ - كَتِيْعِيَّات * Pleurobranchidae (S).
Pleurobranchidae (F). Pleurobranchidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || دويباتها تتميز باصداها الرقيقة الصغيرة التي تلتحف الظهر . غياشها هدية يمينية الاركاناز . افواها عظمية الشكل ، ثنائية اللواس الانبوية المغلوجة من الخارج || اعرف اجناسها واشهرها الكتيعة والغسوجة والتيدة .

٢٣٢٨٨ - كَتِيْعَة الكتيعة هي النخلة فالت اليه . ج كئائل .

٢٣٢٨٩ - كَتِيْن * ، كَتِيْعَة Catène (F).
Catena (E).
جموعة ترابية لاياسية التركيب الحكمي جتمها العوامل الطبيعية تتميزت برسختها للشكلية .

٢٣٢٩٠ - كَتِيْعَه Lotier corniculé (F).
هي القوس القرني ، اطليه .

٢٣٢٩١ - كَنَّا Brachycome (F).
هي البرايكم ، اطليه .

٢٣٢٩٢ - كَنَّا * ، زَقْرَاقِي النَحْص * Sarcophorus (S). Sarcophore, Vannieu à caroncule (F).

جنس طير من طوال الساق وفصيلة الزرقاقيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض الفلوات الافريقية القريبة من مجاري الماء . ملجنها الحياتي جماعي . قوتها الحشرات والذويات الصغيرة والذباب . تتميز بسرعة عدوها على الرمال || اجسامها صغيرة القد ، متراكبة الالوان الجميلة ، فيها الاخضر والاسود والجلوي والاشهب والابيض . رؤوسها صغيرة . مناقبها بسيطة الصفحات السفلى وتعلوها في قواعدها العليا لحص صغيرة لحمية المادة . اجنتها لاسحة . افخاذها شديدة الصغر . سيقانها دقيقة سمراء اللون كالتنقيط .

نوعها المعروفان :
٢٣٢٩٣ - كَنَّا Sarciophorus cectus (S).
Sarciophore du Sénégal (F).

٢٣٢٩٤ - كَنَّا Sarciophorus latifrons (S).
Sarciophore des Somalis (F).

٢٣٢٩٥ - كَنَّا Crème (F).
هي القشدة ، المادة السنية في الحليب .

٢٣٢٩٦ - كَنَّا Roquette (F).
هي الجرجير من اسرار البقول ، اطليه .

٢٣٢٩٥ - كَنَّا Densité (F). Density (E).
هي مقدار الشيء في وحدة معينة . كترك ١٠ شتول في المتر المربع .

٢٣٢٧٨ - كَنَّن البُيْس * Tubercularia versicolor (S).

فطر مجهري يعيش على اخصان البس اليابسة وقد شوه على لحاء المطاط في الاوغندا .

٢٣٢٧٩ - كَنَّن شَالَع * Tubercularia vulgaris (S).

فطر مجهري رمي يكثر في الخريف والشتاء . يركب لحاء الاخصان اليابسة في غلغل الاشجار الحرجية والمثمرة .

٢٣٢٨٠ - كَنَّنَة ، كَوْبَالِيَة Hymenaea verrucosa (S). Copalier, Hyménée ver-

ruqueuse (F). Gum copal tree (E). Henschreckenbaum (D). Imeneo (I).

شجرة حرجية من فصيلة القرنيات . مهدا افريقية الجنوبية ويدشكر . ساقها كثيرة الثمرل متوسطة الارتفاع تملو نحو ١٠ اثمار . غشها صلب المكسر احمر اللون مرغوب فيه . يستخرج من ساقها بالثقب صمارة صفية واثنية صمراء اللون فواحة العرف المستحب تدعى كوبال شائعة الاستعمال الصناعي .

٢٣٢٨١ - كَنَّنِيَّات * Tuberculariaceae (S).
Tuberculariaceae (F). Tuberculariaceae (E).
فصيلة تطور مجهرية من مرتبة الهيفاتيات ورتبة الزوييات . اجناسها وانواعها عديدة تجتمعا حمارتان : الطحائيات والطحائيات .

٢٣٢٨٢ - كَنَّنِيَة Tuberculina (S).
جلس فطور مجهرية من حمارة الطحائيات وفصيلة الكتلجات . جراهه الكندي بسيط التركيب قليل الفروع . كئائه وسيلة الخلية كروية او اسطوانية الشكل || انواعها قليلة العدد والاذى تركب اورقان بعض الصنوبريات والاجاص البري فتوشها بطور صغيرة القند لها الى الحمرة البنفسجية .

٢٣٢٨٣ - كَنُّوم Imperméabilité (F).
Impermeability (E).
الكوم والكتام هي خاصة سك الماء في بعض انواع التربة . وهي من هيوب القرية لزراعية لانها تجعلها شديدة الصلابة والانساج .

٢٣٢٨٤ - كَنُّوم ، كَتِيْم ، مَكَنَّم Imperméable (F). Impermeable (E).
نمت وصفة التربة التي تمسك الماء .

٢٣٢٨٥ - كَنَّنِيَكَة * Kitaibella (S).
Kitaibella (F).

جنية معمرة برية وفزينة من فصيلة الهيفاتيات معوية الترميز على اسم اليوناني الهناري بولس كئيل (١٧٥٧-١٨١٧) ساقها فراء تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . اورانها معاقبة خامية التفصيص . نصلها جيل الخضار . مسن الحافة . ازهارها ابطية الاركاناز . كبيرة القد . خامية البتلات ، يضاء اللون .

٢٣٢٨٦ - كَنَّنِيَكَة * Pleurobranchus (S).
Pleurobranche (F). Pleurobranchus (E).

جلس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم وفصيلة الكتيقيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتلة الحارة .



كَيَة



كَنَّا

Amphicoma (S).

٢٣٣١١ - كَحْفَص

Pomme (F). Apple (E).

٢٣٢٩٦ - كَلَّة

الكَلَّة : ثمرة التفاح . ج. كل .

Amphicome (F).

Pommé (F).

٢٣٢٩٧ - كَفَكِي ، كَفَاكِي

Grown to a round head (E).

ما كان شكله شكل التفاح .

جلس نباتات عشبية برية معمورة من فصيلة البذنيديات .
انواعها المروقة قليلة . سيقانها تملو من ٢٠ إلى ١٠٠ سم .
اوراقها متناقصة . ريشية وريية . ازهارها عتقودي النسيج ،
طرفي الاوتكار . ازهارها حمرية الشكل متدلية ، مستطيلة
الانابيب ، خلية البترة ، وريدية او برتقالية اللون . حب
ثمراها يشبه بين الجراد . جذورها لحية غليظة مستطيلة
يقال انها نافعة .

Corbeille de fleurs (F).

٢٣٢٩٨ - كُثَّة

Dune (F). Dune, Sand-hill (E).

٢٣٢٩٩ - كُتَيْب

رياح تسفروا الرياح لا تستقر على حالة . ج. أكبة
وكتيان .

Orcanetta tinctorialis (F).

٢٣٣١٢ - كَحْلَاد

Polyvalent (F).

٢٣٣٠٠ - كَثِير التَعَادُل

Sape marron, Rousseau (F).

٢٣٣١٣ - كَحْلَاد

Adragant (F).

٢٣٣٠١ - كُثَيْرَاه

في الجريدي ، سكة مشهورة ، اطباء .

راجع اسطرغالوس كثيره .

Alcool (F).

٢٣٣١٤ - كُحُول ، سَبِيرُون

Alcohol (E).

٢٣٣٠٢ - كُثَيْرَاه بِشْمَاه

Astragal gommifère (F).

راجع اسطرغالوس ديق .

كلمة عربية الأصل تطلق على طائفة من المركبات العضوية
السايلة المتطايرة المشابهة للخواص || حرف الانسان
الكحول منه زمن بعيد . وهي على انواع عديدة اشهرها
الكحول الايثيلي اي كحول النعنب والبار والواد السكرية
والنشوية والكحول الخشبية اي كحول الخشب || فالكحول
الايثيلي النقية سوائل عديمة اللون ، قليلة الرائحة التبريدية
لاذعة الطعم ، تحوي ٩٥ ٪ من الكحول و ٥ ٪ من الماء .
وهي تغل في ٧٨ ٪ سبغ . وتختلط بالماء بآية نسبة كانت
ومن خواصها انها تذيب اكثر المركبات العضوية
وبعض الاملاح المعدنية وهي تشتت في الهواء . تستعمل
كسروبات ودية وفي المركبات الطبية وفي صناعات
شئ || اما الكحول الخشبية فهي تستخرج من نشارة الخشب
بعد معالجتها بمحاض الكبريتيك المركز . وهي تستعمل
كوقود وفي مختلف الصناعات والطلاء والتصوير .

Polychètes (F).

٢٣٣٠٣ - كَثِيرَات الهَلَب

Polychaeta (E).

رتبة من الحلقيات المفردة . فضالها واجناسها وانواعها
عديدة . جميعها بحرية . تتميز بفتوحها الكثيرة الهلب
وبرؤوسها الراسمة الخدام ويوجد انحلش والارجل
والقواس . بعض انواعها يلرز مواد تسفورية قفوه في
الظلام . سلع انواعها منفصل الشق وبضها عتري ||
وهي تقسم الى قسمين : كثيرات الهلب الجوفية وكثيرات
الهلب الركينة . فالجوفية تجوب الشواطئ وتمتد على
الزلزل وبين الحصى والصخور والفوس والضرع ... اما
الركينة فتعيش ضمن انابيب كلسية المادة او في انفاق
تحفرها في رمال القاع وتطبخها بمادة كلسية ايضاً .

Alcool éthylique (F).

٢٣٣١٥ - كُحُول اَيْثِي

Ethylic alcohol, Ethyl alcohol (E).

Mille-pattes (F).

٢٣٣٠٤ - كَثِيرَةُ الْأَرْجُل

صف من الحيوانات الفصيلة يعرف بالصدخايات . راجعها

يوجد بكميات قليلة في بعض ثمار نباتات الفصيلة
الصلوانية وهو يتكون عاصه في اثناء التطير الكحولي
الذي يمين على المواد السكرية المختلفة .

Dense

٢٣٣٠٥ - كَثِيف

صفة ما كان ليد الشهي .

Alcool amylique (F).

٢٣٣١٦ - كُحُول اَمِيَلِي

Amyl alcohol (E).

٢٣٣٠٦ - كَثِيم ٥ Endophyte (F). Endophyte (E).

لعت تعريفي يطلق على كل حي يعيش داخل حي آخر
ان من الحيوان او النبات او من الاثنين معاً كالحشرة
التي تعيش داخل الزهرة او الثمرة .

كحول يستخرج من البطاطا والشوندر والبار والحليب بعد
تخميرها .

Calan (F).

٢٣٣٠٧ - كُجُونُوس

هو الكنجوس ، اطباء .

Alcool méthylique (F).

٢٣٣١٧ - كُحُول مَيْثِيلِي

Methyl alcohol (E).

Alcométrie (F).

٢٣٣٠٨ - كَحْلَانة ٥

هي قياس الكحول .

ويصلي روح الخشب كحول يستخرج من ابحاث الخشبية
والغنية المختلفة .

Alcool absolu (F).

٢٣٣١٨ - كُحُول مُطْلَق

Absolute alcohol (E).

هو الكحول الصرف جوار ٩٧ ٪ سبغ .

Vipérine rouge (F).

٢٣٣٠٩ - كَحْلَانِي

هي الاخيرن الحمرى ، اطباء .

Alcool dénaturé (F).

٢٣٣١٩ - كُحُول مُعَيَّب

Denatured alcohol (E).

Raisin vert (F).

٢٣٣١٠ - كَحْب

انواع من الكحول يجب القانون تخميبا بالهولن منما
لاستعمالها في المشروبات الروحية .

هو البروق اي الحمر من نهاية طور الحموضة . يقال
كحب الكرم واكعب اذا لوح عته . ولحدته كمية .

٢ الى ٤ سم. رؤوسها صغيرة ، ملحوظة . عيونها بارزة . تأثيرها وبلانها نظامية . قرونها الاستثمارية دبوسية الاطراف ، مركبة من ١١ فصلة . كوالسها نصف دائرية الشكل . اغادها لاسقة . قوائمها لثيطة . ارساها خاسية العقل . اثنائها ملونة || جميعها واشمة تعيش على الازهار وتغني بيئاتها الشترية تحت السماء . يرقاتها مؤذية تقضم تحوت الازهار والمبيض والجراهم تقتضي عليها || اشهر اجناسها الكحيصة .

Eternuement des bêtes (F). كذامس
Sneezing of beast (E). هو عطاس البهائم .

Moyette, Dizeau (F). كذامسة
Hay cock, Shock, Stook (E). مجموعة عمامات من الحصيد ترمم وتكسح وتحفظ وربما تُدرس .

٢٢٣٣١ - كذال مُتَوَجِّع *
Gubernatrix cristatella (S).
Commandeur huppé, Cardinal vert (F).

طائر من فصيلة التشرشوريات وربية الجواثم غرغريات المناقير . موطنه بعض مناطق امريكا الوسطى ومنها البرازيل . يألف الغابات والاحراج القريبة من الماء . نظامه الهياتي جماعي الا في زمن الترسيم || جسمه صغير اللد ، يطوي من ١٨ الى ٢٠ سم . ثوب الذكر متراكب الانوار الجميلة . ظهره الى الشبهة انخضار المواج . صدره وبطنه ولواحف جناحيه واثنيكه الى الصفار الزاهي . قتيهه ورأسه وعتقه الى السواد الاسفع . متفاده حطلي القرن ورساه الى السرة السوداء . اما الانثى فصدرها الى الشبهة وبطنها الى الخضار الباهت . صدغها وصبرها الى البياض العاجي || قوته الحشرات والبلور . يألف حياة الاسر ويعيش ويتكاثر في القفص شرط ان يكون فسيحاً || يذئن عشه بين اثناد الاشجار القريبة من سطح الارض . الانثى تحضن حل مرتين في الحول . حفتنها من يفتين حل ثلاث يفتات تقوم برعيها دون الذكر الذي يفتن لها الغذاء .

Mouvement (F). كذامكة
Movement (E). الكذامة هي الحركة ، الطليان .

٢٢٣٣٢ - كذامكة *
Leptodactylus (S).
Leptodactyle (F). Leptodactylus (E).

جنس صفادح قازية من فصيلة الكذاميات . انواعه المعروفة ستة مهدا المناطق الاستوائية الامريكية || اجسامها صغيرة اللد تطول من ٦ الى ٨ سم . عته الذكور من ٧ الى ١٠ سم . عته الاناث . رؤوسها معتدلة الطول والعرض . عيونها مستديرة جاحطة . فكوكها السفلى عادمة الاسنان . اصابع قوائمها الخلفية نفسية الخطاب . جلودها مثالة دقيقة الثقل || اثنائها الى السرة انخضار الباقية اللامة تعلوها رقشة جزئية على الظهر . صفراء على البطن || تعيش قرب المائع ويجاري الماء اكثر من عشرة احوام . تسرح في الليل وتبيت في النهار بين اوراق النبات او في النائق . قوتها الحشرات والديدان || الانثى تسمأ نحو ٥٠٠ دعيلة في شلة تطرحها في مكان منتخب قليل العمق لا تتجاوز مساحته المتر المربع الواحد تطوقه بالسبال واخر والنباتات المائية المختلفة .

٢٢٣٣٠ - كحولاز ، زيمزاع

Alcoofase, Zymase (F). Alcohofase, Zymase (E).
خيرة كياوية تحول السكر على اختلاف اشكاله الى كحول وغاز كربوني .

Spiritueux (F). كحولبي
Spirit, Spirituous (E).
نمت تعريبي يطلق على السوائل التي تحوي بعض الكحول .

٢٢٣٣١ - كحبيبة *
Stilbella (S).
جنس فلور مجهرية من عارة الغنيات وفضيلة الكحييات . يتميز بكرمياته المستطيلة القصبان الدبوسية الرأس . يورثها كروية الشكل . صغيرة اللد || انواعه المؤذية قليلة اهرها كحيبة الشاي .

٢٢٣٣٢ - كحبيبة الشاي *
Stilbella theae (S).
فطر مجري يتطفل على اثناد الشاي . مظهره الخارجى يقع خلية زياه تشبه القنابر تركب لها الافناد . تيلو ودية الاقن ثم يضاء . مشيجه يسير في الاربعة وقد يستقر في قنم الانثان ليرقت نموجها ويسبب يباسها || يكاتب (١) باقتطاع الاغصاء الموصية وسرقها . (٢) يتطهر الجروح . (٣) يتطهير التربة لسرف المياه الزائدة التي تسبب هذا الرمس .

٢٢٣٣٤ - كحبيبات *
Stilbaceae (S).
Stilbaceae (F).
فصيلة فلور مجهرية من مرتبة الهيفاتيات وربية الزروعات تتميز بكتلتها الهيمية الى كرميات . هيفها لا نظامي الاثكاز مته المنتصب الخوازي ومنه المشابك اللاتيايى الترتيب . مشيجه فرعي الزلل . يورثها قلادية التتبع . اجناسها عديدة تجمعها عمارتان الغنيات والهيفاتيات .

٢٢٣٣٥ - كحبيبة *
Cryptae (F). Cryptae (E).
كحيبة ج كحيثات . الكحيثات - جسورياً ، اسم يطلق على شهاديات صغيرة او انابيب نحيلة ، غير نافذة ، تنشب في القناة الهضمية عته بعض الحشرات .

٢٢٣٣٦ - كحبيبيات
Fauvette orphée (F).
طائر من السنابل ، اطلب دخلة غريبة .

٢٢٣٣٧ - كحيصة *
Phalacrus (S).
Phalacre (F). Phalacrus (E).

جنس حشرات واشمة من فصيلة الكحيصيات وربية غديات الاجنحة . اثنائها المعروفة متوسطة اللد منتشرة في بعض المناطق الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، بيضية الشكل ، تطول نحو ٣ سم . رؤوسها غرغوية ، عيونها بارزة . تأثيرها وبلانها نظامية . قرونها الاستثمارية دبوسية الاطراف . كوالسها عمودية نصف دائرية الشكل . اغادها لاسقة يطولها تحفيد نحيل و قاطب . قوائمها لثيطة . اثنائها ملونة || جميعها واشمة تعيش على الازهار . يرقاتها تقضم تحوت الازهار ويبيضاتها .

٢٢٣٣٨ - كحيصيات *
Phalacridae (S).
Phalacridae (F). Phalacridae (E).

فصيلة حشرات واشمة من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة اللد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة ، بيضية اللون . تطول من



كحيبة الشاي



كحيصة



كُدُوَّة الارز

Lentur (F).

Slowness, Tardiness (E).

يقال كدت الارض اذا بطل نباتها . وربة كادة اي بطيئة الانبات .

Leptosphaeria (S).

٢٣٣٤٨ - كُدُوَّة ٥
جنس فطر مجهري من السخانيات وفصيلة المشويات . تتميز باصنافها الفاتحة في نسيج النبات للنسار وبيوضها الشدي الشكل الملون والسيد الرثاير للمرضة في انواعه عديدة اشهرها ما يتبع .

٢٣٣٤٩ - كُدُوَّة الارز ٥

Leptosphaeria salvinii, Helminthosporium sigmoideum, Sclerotium oryzae (S).

فطر مجهري يركب الارز في جميع اصنافه الحولية مديتها ويغطيها || مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة مديدة ، لون عموما الى الجوزي ثم يزداد اسودا مع اقترابه من الاواخر الهبطي ، تركب المصغ والسرور والسنايل || اغراضه تختلف باختلاف انتشاره واذا || يتكاثر بتطهير الشلب للمد الى البزار .

٢٣٣٥٠ - كُدُوَّة الحنطة ٥

Leptosphaeria tritici (S).

فطر مجهري يركب صف الفروع واصنافها الحنطة ثم الشير والبنون والشليم || مظهره الخارجي بقع صفر تنتشر على المصغ والاعاد تسبب جفافها الباكر . اغراضه تقوم على مدى نتائج انتشاره لانه يبق مع النبات ويعد من نشاطه .

٢٣٣٥١ - كُدُوَّة السكندر ٥

Leptosphaeria rusci (S).

فطر مجهري يصيب بعض انواع السكندر واصنافها السكندر الاربع || مظهره الخارجي نكت كثيفة لعلولية الشكل تكثف الانفاد تسبب ذبوا يطغىها || يتكاثر باستعمال سائل يورده ويغيره من السوائل السلفوكسية .

٢٣٣٥٢ - كُدُوَّة السلم ٥

Leptosphaeria napi, Pleospora napi, Alternaria excitosa, A. brassicae, A. herculea, Macrosporium brassicae, Sporodermium excitosum, S. brassicae (S).

فطر مجهري يصيب بعض النباتات الصليبية واصنافها السلم والقت والمقوف والقميل ... || مظهره الخارجي بقع شقر تملأ سطح اللدة الخضراء في السورق والارواق وتخريفيها تسبب يباس النسيج ويغلف اخريفياتها وتحييها وانفلاتها || ينهم من قال ان فطر جلدور القث يمد الى هذا الفطر الذي يتكاثر بسرعة ممتدة اذا لامست الموائل الجوية واصنافها الرطوبة || يتكاثر بتطهير البزار .

٢٣٣٥٣ - كُدُوَّة الشوفان ٥

Leptosphaeria avenaria, Septoria avenae (S) Maladie des taches sombres (F). Out leaf spot (E).

فطر مجهري يركب صف الشوفان فيقويه ويبيء الى نموه . مظهره الخارجي بقع صغيرة ممتدة على صفال المصغ ، تبدو اقل اخضرارا من النصل ثم تفسر بعد ان يملأها في وسطها نكات خلية بيضاء || اغراضه زريعة لانه قليل الاذن والاسادة .

٢٣٣٥٤ - كُدُوَّة الصَّجَمَان ٥

Leptosphaeria herpotrichoides, L. culmifraga, L. amphibola (S). Pétin-verse des céréales (F).

فطر مجهري يركب سوق الزروع اصنافها الشليم والحنطة

٢٣٣٢٤ - كُدَامِيَّات ٥ Leptodactylidae (S).

Leptodactylidae (F). Leptodactylidae (E).

فصيلة حيوانات ديدة قازية من الرقيات السويتاني وربة البتراوات اي عديدات الذئب || اجناسها وانواعها عديدة ، مدها امريكة الوسط واسراتية . منظر انواعها قازب وبها البري والمائي والشاجر والباس . جميعها سفة التفكير العليا ، عادمة الانسان في السفل . وقرة حيزها شبه غالية من التنوعات العظيمة الجانية || اشهر اجناسها واعرفها الكدامة والاوزيا والهيلود والسيراتيريس .

٢٣٣٢٥ - كُدَان (E). Schist, Slaty rock (E).

أرزة صفحية التركيب مرامسة ختالية صلبة المكسر .

٢٣٣٢٦ - كُدَر (E). Lie (F). Loes, Dregs (E).

كل مادة ترسب في قعر الارمية التي تحفظ فيها المشروبات الكحولية ويبرها كاخضر واخريت .

٢٣٣٢٧ - كُدُرِيَّة (E). Gangs case

طائر من النطا يعرف بقطة كدورية ومنهم من قد كدورية . الجبع كدري وكداري وكدر .

٢٣٣٢٨ - كُدَس ، كُدَسيس (E). Botteage (F).

تجميع الحشيش وامشاه الى اكادس .
Tying up in bundles (E).

٢٣٣٢٩ - كُدَس ، كُدَسيس (E). Entasser (F).

جعل الشيء كدسا بضمه على بعض .

٢٣٣٣٠ - كُدَم (E). Tondre le gazon (F).

كدم الحضر جزء بالكدامة او المكدمة .
To mow a grass (E).

٢٣٣٣١ - كُدَم (E).

نوع من الجراد سيد الاجسام غضر الرؤوس الواحدة كدمة .

٢٣٣٣٢ - كُدَمَة (E). Brebis grasses (F).

نجة سمنة غليظة .

٢٣٣٣٣ - كُدَمَة (E). Ecchymose (F). Ecchymosis (E).

أثر يفسخي او احمر اللون يظهر في الجله عقب جرح او رضه سببه انسكاب الدم تحت الجلد .

٢٣٣٣٤ - كُدَمِيَّوْم (E). Cadmium

معادن ثنائي الذرة ، ابيض اللون ، ازرق المالح ، لدن المادة ، قابل التصفيح ، شديد المتطرية ، اصلب من القصدير . ثقله النوعي براوح من ٨٦٠ الى ٨٦٩ ونزاه (ك-ك) وزنه الانبسي ١١٢,٤١ ينصهر تحت ٣٢٠ مس . ويبل في ٨٦٠ مس . بخاره ذائعي ، شديد الاذى ، يرتقال الى ، يتكثف بلورات ثمانية الارجح من المدن التي الحر . وهو ذويوب في بعض المحالوس منها الكبريتي والازوتي والكلوريدس يكي .

٢٣٣٣٥ - كُدَن (E). Frutescent (F). Greze (E).

نمت تمرين يدل على الاصول الصلبة في النباتات الجنية .

٢٣٣٣٦ - كُدَه (E). Talure (F).

عارض فيز يوليوي يترى غلاه الاجبار .



كُدُوَّة السلم



كُدُوَّة الشوفان

٢٣٣٦٣ - كُرَات ، كُرَاب ، كُرَاب Scarflage (F).
هو السلف أي الخرت السطحي بالمسلة يبيثر ذرات التراب ويفتت المدر ولا يقبلب التربة .

٢٣٣٦٤ - كُرَات
شجر كبار بجبال الطائف . الواحدة كرات (١ م) .

٢٣٣٦٥ - كُرَات البَرَّ ، طَيَّحَان

Allium vineale (S). All des vignes, Porreau sauvage, Porrette (F). Crow garlic, Crow onion (E). Hundslauch, Feldlauch (D). Aglio cipolla (I).

نوع من الكرات البري يكثر في الكروم . درفسته مستديرة مبطلة . أوراقه مستطيلة تعرض من ٨ إلى ١٥ سم . لونها إلى الخضار البهري المايق . شراخه الزهري يعلو نحو ٦٠ سم . ثورته صويانية كروية الشكل ، أزهارها إلى البياض الودي الملاج .

٢٣٣٦٦ - كُرَات الدَّبَّ ، Allium ursinum (S).

Ail des ours, Ail des bois (F). Bear's garlic, Ramsons, Wild-leek (E). Bärenlauch, Wilder Knoblauch (D). Aglio confoglio paduicola (I).

نوع من الكرات البري الليليل . أوراقه مستطيلة مستديرة . شراخه يعلو من ٤٠ إلى ٨٠ سم . ثورته صويانية كروية ، أزهارها غبراء اللون وريدة الملاج .

٢٣٣٦٧ - كُرَات الصُّلُور ، كُرَات إسبانيا

Allium scorodoprasmus (S). Ail rouge, Rocambole, Ail d'Espagne (F). Rocambole, Sand leek, Spanish garlic (E). Grasilauch, Rocambole (D). Aglio di Spagna, Scalogno di Spagna (I).

نوع من الكرات المعمر . شراخه الزهري ينتهي بنورة صويانية كروية تكتنفها الأوراق الزهرية والفصوص الخلفية الشكل . أزهارها إلى البياض الأخضر يعلو مراح آخر . زراعته شائعة في أروبة وهو أقل مادة حريفة ولعانة من الثوم . يتكاثر بالفصوص لأنها اصدق وأسرع من البزور . يحيد في جميع الأتربة غير أنه يفضل الدبالية .

٢٣٣٦٨ - كُرَات حَسَكَلُون ، كُرَات أندلسي
كُرَات أَبُو شَوْشَة ، قُفْلُوط

Allium ascalonicum (S). Echalotte (F). Ascalonian garlic, Shallot (E). Eschlauch, Schalotte (D). Cipollina, Scalogno (I).

نوع من الكرات الزراعي الشائع الاستعمال . زراعته من البزرة إلى النضجة تستلزم ثلاث سنوات . يحيد أيتها زرع ولا يخشى سوى الآفة الكلسية . يقال أنه طيب ويستعمل كطارد للديدان الموية .

٢٣٣٦٩ - كُرَات مَعْرُوف ، كُرَات رُومِيَّ

Allium porrum (S). Poireau, Porreau (F). Leek (E). Lauch, Porree, Porrei (D). Porro (I).

بقلة زراعية عمولة شائعة الزراعة والاستعمال . يصلها اهليلجية الشكل . أوراقها قرصية متتابعة حاشية ، فصلها مستطيل الصصفة حايق الخضار . شراخها الزهري يعلو نحو ٦٠ سم . ينتهي بنورة صويانية كروية الشكل أزهارها إلى المحمرة . يربط في الآتربة الدبالية للتوصلة الاندماج . يندر في أكراد خاصة وينقل إلى مستقره عندما يبلسغ ارتفاعه نحو ١٥ سم . تقطع أوراقه وتكدم جلوره ثم يصار إلى غرسه .

والشعير والثؤنان فيسبب قصفها في ايان تحبيب النسايل او قبل تمام الادراك . مظهره الخارجي بقعة سمراء مستطيلة تكتنف غدة الشرايف فاسلية الاولى حيث تملب جدار القصبة . ثم يعلو مع الزرع من غدة الى غدة بعد ان يدخل في التربة حتى مستوى الجلود الاولى فيمتلها بنشوة فعمية لبدة تعزل التبادل النسفي ان لم تقص عليه .

٢٣٣٥٥ - كُدْوَة الفَصَّة

Leptosphaeria circinans (S).

نظر مجهرى يصيب الفصبة فيؤذيها ويشلل نشاطها . مظهره الخارجي بقع خلية بنفسجية اللون لاقياسية الشكل والحجم تركب الجثث والجلود فتملها وتشل نشاطها وقد تسب ذبول النبات وموته . لم تنجح فيه معالجة حتى الآن .

٢٣٣٥٦ - كُدْوَة الموز

Leptosphaeria musarum (S).

نظر مجهرى ركب أوراق الموز فيؤذيها بعض الشيء . مظهره الخارجي لملح حنطية لاقياسية الشكل والحجم تركب نصل الأوراق وتسبب جفاف النسيج المنحار . أزهاره زبدية لانه قلما يهرق ويؤخر تبادل التنسج . يكافح باستعمال الفطائير غير المركزة على التناس .

٢٣٣٥٧ - كُدْوَة الورْد

Leptosphaeria coniothyrium, Coniothyrium Fuckelii, Septoria sarmenti (S).

نظر مجهرى واسع الانتشار يصيب الورْد والمليق والميسج والكشش والخضيات . مظهره الخارجي كلف باهت اللون لاقياسي الشكل والحجم يعلو الزواي فيسبب ذبولها كما في الورْد والميسج ، ويملو نصل الأوراق كما في الخضيات فيؤذيها ويؤخر نشاطها . ومن الملاء من قال انه يصيب النبات الضعيف دون غيره . يكافح بتسديد النباتات الضعيفة وباستعمال احد الادوية الفطورية اعطسها سائل بوردو وسائل سلفوكسليك .

٢٣٣٥٨ - كُدْيَس

Cystocarp (F).

Cystocarp (E).

اسم يطلق على كل مجموعة من البوغ او اكياس البوغ عند انضجيات الحمر .

٢٣٣٥٩ - كُدْيَس الزَبَاد هو دباح دقله ، اطليه .

٢٣٣٦٠ - كُدَّان ، لَيْسَكَة ، حَقَّان Ponce (F).

Pumice (E).

حجارة خفيفة نخرة يكثر وجودها عند مرى الموج .

٢٣٣٦١ - كُدْو ، كُورَبَرِيل

Hymenaea courbaril (S). Hyménée courbaril, Courbaril (F). Courbaril tree (E). Kourbaril (D). Courbaril (I).

شجرة حرجية كبيرة القد جملة الشكل من فصيلة القرنيات . مهدا البلاد الافريقية الحارة . ساقها منتصبه فرما تملو من ١٥ إلى ٢٥ م . خشبها صلب المكسر ، ناعم الرقة ، جزوي اللون ، صناعي الاستعمال ، مرغوب فيه . يستخرج من ساقها بالخز حليبان غزير المادة الراتنجية ، اصفر اللون ، منتصب المرق يلقى ككودرين . يستعمل ككلاء فاخر الصنف .

٢٣٣٦٢ - كِرَاء Louage (F).

رابع اجابة .



كُدْوَة الموز



كُدْوَة الورْد



كُدْو



كرات الدب

كرات البر



كرات الصخور



كرات معروف



كرات صفلون



كُرَات نَبْطِي



كُرَات وَرْدِي



كُرَاتَة الْحَرَج



كُرَاتَة الْفَرْخ



كُرَاتَة الْوَرْد



كُرَاتَة الشَّمْس



كُرَاتَة الْمَيْس الصَّغِيرَة



كُرَاتَة خَشَنَة

٢٣٣٧٨ - كُرَاتَة الْجَيْس *، سَكُولِيَت الْجَيْس
Scolytus scolytus (S). Grand scolyte de l'orme (F).
Larger European elm bark beetle (E). Großer
Ulmenstinkkäfer (D).

حشرة من الكرشيات. جسمها مفلطح الشكل مفلطح
الطرف. طولها نحو ٦ سم. رأسها وصدرها وكولها
السود الازرق المالح. غدها الى الجوزة المتأدية. تركيب
الميس وبض الانجار الزينية فتخلج الشكير وتقع به
اشد الاذى.

٢٣٣٧٩ - كُرَاتَة الْجَيْس الصَّغِيرَة *

Scolytus multistriatus (S). Petit scolyte de l'orme
(F). Lesser European elm bark beetle (E). Kleiner
Ulmenstinkkäfer (D).

حشرة من الكرشيات. جسمها مفلطح الشكل اسطواني
الحية يطول نحو ٤ م. رأسها اسود اللون. جسمها كسفي
اللوب. غدها سطحية التخذيد. تركيب الميس ولا تنف
من الانجار المثمرة فتخلج شكير الاضغان والافناد وتقع
به اشد الاذى.

٢٣٣٨٠ - كُرَاتَة خَشِينَة *، سَكُولِيَت خَشِين

Scolytus rugulosus (S). Scolyte rugueux, Petit
scolyte des arbres fruitiers (F). Fruit bark beetle,
Shot-hole borer (E). Ruzzeliger Obstbaumpin-
nkäfer (D).

حشرة من الكرشيات، طولها نحو ٣ م. كولها اسود اللون،
غدها الى الجوزة البنية. تركيب جميع الانجار المثمرة
انحصها الفتاح والكرز والخوخ فتخلج شكير الاضغان
وتقع به اشد الاذى. لها جيلان في الحول. بيئاتها الشتوي
يحصل في الطور البرقي.

٢٣٣٨١ - كُرَاتَة لَامْتَحَالِمَة

Xylébore disparata (F).
غشاه مؤذية تدعى كُرَاتَة الْحَرَج، اطالها.

٢٣٣٨٧ - كُرَاتِيَّات *، سَكُولِيَّات *

Scolytidae (S). Scolytidae (F). Scolytidae, Bark
beetles, Engraver beetles (E). Borkenkäfer (D).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة. اجناسها وانواعها
عديدة جميعها صغيرة اللد. اجناسها اسطواني: الزواجا
الى السوداء ومشتقاته والجوزي والبي والحلي. قربوا
الاستثمارية صغيرة، رفيقة او صليانية. ارباغها رداية.
تميش باكثرها تحت لحاء الانجار وفي الشكير فتخلجه
وتعطيه ثم تمتع مكثا الذي يتنف من رقات دقيقة تميش
على المواد النشوية والسكرية التي يفرزها اقلبات.

٢٣٣٨٣ - كِرَافِي *

Sperme des oiseaux (F).
Sperm of the birds (E).
هو افراز اللند التناسلية لذكورية منه الطير.

٢٣٣٨٤ - كُرَاع

الكرواع من اللد والبقير بمنزلة الوظيف من القوس وهو
مستند الساق. وقيل هو ما دون الكعب من البهائم. ج
أكرع وأكارع وكرومان.

٢٣٣٨٥ - كُرَّم

Vigneron, Viticulteur (F).
Vine-dresser, Viticulturist (E).
من تعاملي زراعة الكرمة لاستثمار العنب.

٢٣٣٧٠ - كُرَات نَبْطِي *، بَصَل الْعِفْرِيت،
لُوم الْفَرْق

Allium ampeloprasum (S). All d'Orient, A. à che-
val, Poireau sauvage, Pourrai, Pourrie (F). Blue-
leek, Vine-leek, Wild-leek (E). Perl Lauch, Wilder
Lauch (D). Porro salvatico, Porro bastardo (I).

نوع من الكرات البري البهلون. اوراقه مستطيلة،
مستقيمة، شديدة الخشاش. شراخه يملو من ٣٠
الى ٦٠ سم. ينتهي بنورة صيونية قلنسوة الشكل،
ازهارها الى البياض الاغبر.

٢٣٣٧١ - كُرَات وَرْدِي *، قُرْط

Allium roseum (S). Ait rose (F). Rosy-flowered garlic
(E). Rosen Lauch (D). Porro piccolo (I).

نوع من الكرات البري والزواجا المأكول. دوفسته يضيبة
الشكل سمراء اللون تحرقها فصوص خلية صغيرة اللد.
اوراقه مستطيلة مخددة تعرض من ٥ الى ١٢ سم. شراخه
الزهرى يملو نحو ٧٠ سم. ينتهي بنورة صيونية كروية،
ازهارها وردية اللون.

٢٣٣٧٢ - كُرَاتِي

Menon (F).
تيس أو كيش يقد القطيع.

٢٣٣٧٣ - كُرَاتِيَّات

Crassula (F).
هي الكركب، اطالها.

٢٣٣٧٤ - كُرَاتَة الْحَرَج *

Xylébore dispar, Anisandrus dispar (S). Xylé-
bore disparate (F). Shot hole borer (E). Ungleich, Holz-
bohrer (D).

حشرة من الكرشيات. ثوبها الى السمرة السوية. الذكر
اصغر قدماً من الانثى التي يراوح طولها من ٣ الى ٤ م.
تركب الانجار الخرجية على اختلاف فصائلها واجناسها
ولا تنف من الدراق والمشمش والجوز. تخلج الشكير
وتسربه على حدود الخشب حيث تمتع المكز.

٢٣٣٧٥ - كُرَاتَة الْخَوْخ *، سَكُولِيَت الْخَوْخ

Scolytus pruni (S). Scolyte du prunier, Grand sco-
lyte des arbres fruitiers (F).

حشرة من الكرشيات طولها نحو ٥ م. رأسها وكولها
وصدرها الى السوداء اللامع، غدها وبطنها الى البني
الزاهي. تركيب الخوخ وصائر الانجار المثمرة فتخلج
الشكير في السوق والاغصان. لها جيلان في الحول.
بيئاتها يتم في الطور البرقي.

٢٣٣٧٦ - كُرَاتَة الْوَرْد *، سَكُولِيَت الْوَرْد

Scolytus amygdali (S). Scolyte de l'amandier (F).

حشرة من الكرشيات طولها يراوح من ٢ الى ٣ سم. ثوبها
كسناي الى حلي المالح. تركيب معظم الانجار
الويزة انحصها الورز فتخلج الشكير وتعطيه.

٢٣٣٧٧ - كُرَاتَة الْمَشْمَش *

Xylébore saxeus, X. xylographus (S). Xylébore
de l'abricotier, X. xylographe (F). Flat-celled shot
borer (E). Borkenkäfer, Kleiner Holzbohrer (D).

حشرة من الكرشيات جسمها اسطواني الشكل، قصير اللد،
يطول نحو ٢ م. ثوبها الى الحلي المالح || تركيب
اغصان المشمش فتخلج الشكير وتعطيه.

Porcellio scaber (S).

* كَرَبَس ٢٣٣٩٤

Porcellion (F). Porcellio (E).

دودية من القشريات مساويات الأرجل من فصيلة القرومليات مبلولة في معظم مناطق البلاد الحارة والمرتدة الحارة || جسمها قليل الصلاة ، صغير القد ، سكي التركيب ، بطول نحو ٨ م. عند الذكر ونحو ١٤ م. عند الانثى. رأسها صغير الحجم. متنها قاصم قارض. قربنها الاستعمارية اربعة. جرابها صغيرة. شرجها ينحني بأربع زوايا لامتساوية القد. ثوبها الى الطحلة الرصاصية المزاج. مدنها ابيض || تألف الموائع الرطبة والواقية للسكان الارضية حيث تعيش بمجمعة حمار قبان ، وهي مثله بطيئة الحركة تسعى بهدوء وتتكرر عند الشعور بالخطر || تسرح في الليل وتبيت في النهار. قوتها المواد العضوية المنحلة وبعض اوراق البقول وسوقها وعسلها وجلودها .

Grape-fruit

٢٣٣٩٥ - كَرَبُوت

هو ليمون الجنة ، املبه .

٢٣٣٩٦ - كَرَبَل

هو الششش ، نوع من الاسماك ، املبه .

٢٣٣٩٧ - كَرَبَل

Kalmia (S).

(Kalmie (F). Calico-bush (E). Kalmie (D). Calmia (I). جلس نباتات معمرة من فصيلة الخلنجيات. انواعها عديدة جميعها سامة الاوراق والازهار. منها الاربية الزيتية. منها الانجبار والهجيرات والجبنيات والاعشاب. معظمها بري وبعضها زرعيني. اوراقها كاملة ابيدة لا قياسية النظام اللوري. انهارها لا قياسية التجميع والارتكاز ، خاصة البيلات الثنائية الفصن ، عشارية الاسدية ، جملة الشكل ، غشجلة اللوان || اشهر انواعها ما يلي .

٢٣٣٩٨ - كَرَبَل بَحْرِي الْوَرْقِ

Kalmia polifolia, K. glauca (S). Kalmie glauque (F). نوع من الكربل وهو جملة سبروتية معمرة تملن من ٥٠ الى ٧٠ سم. ساقها فراء فرونها مضطمة. اوراقها متقابلة متناحية الشكل، نصلها بطول نحو ٥ سم. ويعرض نحو ١ سم. صفحتها السفلى خلية البشرة بيضاء اللون ، صفحتها العليا الى الخضار البحري. ازهارها عطقية التجميع ، حسامية الارتكاز ، وردية اللون ، ليلكية المواج || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

٢٣٣٩٩ - كَرَبَل زَهْبِي الْوَرْقِ

Kalmia hirsuta (S). Kalmie velue (F). نوع من الكربل وهو عشية سبروتية معمرة. شكلها شكل الصنوبر. ساقها ليفية فروعها تفلن نحو ٥٠ سم. اوراقها متناحية لاطئة صغيرة القد. نصلها بطول نحو ١٠ م. ويعرض من ٢ الى ٣ م. وهو خلي البشرة على صفحتيه. ازهارها ابيلة ، فردية ، حراء اللون || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٣٤٠٠ - كَرَبَل صَيْقِ الْوَرْقِ

Kalmia angustifolia (S). Kalmie à feuilles étroites (F). نوع من الكربل وهو جملة سبروتية معمرة تملن من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقها خشوية فروعها. اوراقها متقابلة متناحية بطول نحو ٧ م. وتعرض نحو ٢ م. ازهارها عطفية التجميع ، تاجية الارتكاز ، وردية اللون || ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٣٣٩٦ - كَرَابُيَا * ، كَرَوَيْكَة ، كَمُونِ الْوَرْقِ

Carum carvi (S). Carvi, Cumini des prés, Kummel (F). Common caraway (E). Echter Kümmel, Kümmel (D). Carvi, Cumino tedesco, Kummel (I).

نبات من الغاوية وهي عشية حولية من فصيلة الخيميات. منها المروج والمرابي الجبلية وزرع بكثرة. جميع اجزاء النبات عطرية من الجذور الى الازهار والبروزر وهي تستعمل استعمال الانثوس وتدخل في قسطن الانجبار وسائر المأكلا || بزورها حامضة تقطع الشهية وتكدر العلب وتنشط العصائر المعوية وتفتح الشهية وحض الطعام وتعمل التفتيح وتطرد الرياح وتكدر البول. غير ان الاكثار من استعمالها. يضر بالكلى || ويستخرج من بزورها زيت طيار فاخر الصنف ذكي العرف .

٢٣٣٩٧ - كَرَب

اصول السنف الغلال الراش التي تقطع معها. الوالدة كربة .

Emblaver (F).

٢٣٣٩٨ - كَرَبَة ، رَهْم

سرح الارض وسعدا وبذرها. To sow with wheat (E).

٢٣٣٩٩ - كَرَبَاج

Enzelurus (S).

Enzelure (F). Enzelurus (E).

جلس ايملا بحرية من عسلويات الهياشم وفصيلة زمارات البحر. انواعها المعروفة قليلة العدد ، اصلها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط ، جميعها دقيقة الاجسام المستطيلة. اطولها تراوح من ٣٠ الى ٦٠ سم. ولونها خضبة الاعظام الحافورية اطرافها .

٢٣٣٩٠ - كَرَبَاجِيَّات

Flagellariaceae (S). Flagellariacées (F). Flagellariaceae (E).

فصيلة نباتية من سحيدات الفلقة قريبة الشبه من الاسليات. اشهر نباتاتها الكرابية .

٢٣٣٩١ - كَرَبَاجِيَّة *

Flagellaria (S). Flagellaira (F). Wild ratan (E). Wilder Ratan (D). Flagellaria (I).

جلس نباتات جذمية معمرة متسلقة من فصيلة الكرابيات. انواعها عديدة منها البلاد الحارة . تألف النائم ونضات الأنهار . اوراقها حاشية ، صفحية الشكل ، مستطيلة . نصلها سميك الصفعة ، بحري اللون ، ينتهي بجوارق حلزونية مزدوية .

٢٣٣٩٢ - كَرَبَة *

Carapa (S). Carapa.

Carapa, Bois de Crabe (F). Crab-wood tree, Carapa-oil tree (E). Carapa-Baum, Crabbaum (D). Carapa (I).

جلس اشجار حرجية وصناعية من فصيلة الازدردنيات. منها البلاد الاستوائية. تنبت قرب الشواطئ وعل صفات الانهار . اشجارها كبيرة القد دائمة يراوح ارتفاعها من ٢٠ الى ٣٠ م. ثمارها جراء ليفية التركيب تحضن بعض البذور المختلفة الاشكال والاحجام ، يستخرج من لبها مادة دهنية مرة الطعم صفراء اللون يستعملونها في افريقية لقاية من الحشرات فيعتنون بها اجسادهم واخشاب منازلهم. وقد يستعمل دهن الكربة في صناعة الصابون . اما لحاء الاشجار طافية ويستخرج منها مادة مرة تستعمل استعمال الكينا في مكافحة الحميات .

٢٣٣٩٣ - كَرَبَل

الكربز : الفناء الكبار الطوال .



كرابوينا



كرابية




كربة



كرس




كربل




الكرة الأرضية قبل تجزئتها وانفصالها

رسم ١



الكرة الأرضية كما كانت في الأياح الثاني

رسم ٢



رسم ٣
الكرة الأرضية بعد انقسامها وتجزئتها وتشكيل صلالح غلالها اي منذ ٦٠ او ٧٠ مليون سنة




رسم ٤
الكرة الأرضية في حالتها الحاضرة



الكرة الأرضية كما ستكون بعد مرور ٤٠ أو ٥٠ مليون سنة بعد الميلاد

رقم ٥



رقم ٦

شبكة صفائح الكرة الأرضية وما يحفّ بها من أسرار دنيّة

للساحل الجرفيّة والبحريّة.

هولوس بطائيّة - اعرضها حتى الآن الصدع الوسط -
المحلي الذي يمتدّ من رقم ١٠ إلى ٣٧.

الإشعاع الشمسي - المواقع المُرَصَّعة للشمع الاصطناعي
نوع في الأرقام ١ و ١٧ و ٤١.

الانفجار الانجمي - يتقاربون، بعد الاتبات العلمي،
أن انفجاراً نووياً وقع تلقائياً منذ ١٧٠٠ مليون سنة في
حدود الرقم ٤٠. أمّا سببه فيعود إلى الأورانيوم ٢٣٥.

المعادن - مناجم المعادن تختشد طوال الخطوط

التواليع الرهيبة - عشر مناطق، توزعها حول فكرة
الأرضيّة متناسق الخطوط، تتركز بنواحيها المدفئة.
يدخل في إطارها مثلاً البرمود. المناطق المشر تحمل
الأرقام ١٦، ١٨، ٢٠، ١٢، ١٤، ٤٧، ٤٩،
٤٣، ٤٥.

البراكين - معظمها واشتعال نشاطاً يقع على خطوط
التصادم صفائح الغلاف اليابس الذي يأتي مباشرة تحت
الغلاف الجفيري.

جويّات - مراكز الحصف محصورة في بعض عقد
الشبكة. ولقد بنجم عنها نزاع وأحاديث لاقبليّة
الضغط والسرعة تسير مع الخطوط كما هي الحال في

الشبكة الملتصقة بتدفق الصفائح الكردونيّة. أمّا مناجم
النفط لفتت التقاطع. والدليل على ذلك منجم
«ديومن» الذي يتوق كل حدّ.

تركيب التربة - الغضص المنصريّ في تركيب التربة
يسبب بعض الشدود والغرابات في تطور النبات كما
هي الحال في القرنين ٢ و ٤ إذ أن ٧٥٪ من الأنواع
الجفويّة والنباتيّة لا توجد إلا في حادين المتطابقين.
اختصها منطقة بحيرة بينكال.

نروجع الطير - أنواع الطيور القواطع التي تجوب البلاد
معدودة أشهرها تلك التي رجاعها محصور بمناطق معيّنة
لا تتخطاها وهي رقم ١٢ و ٢٠ و ٤١.

٢٣٤٠٨ - كَرِيكوسِيلاز Carboxylase

نوع من الأزيم الكبير الانتشار في معظم أعضاء النبات . نشاطه ينحصر بتأثيره في الحوافض .

٢٣٤٠٩ - كُرْبُولَة ° Corbula (S).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفحية الخياشيم وفضلية القفاليات . أنواعها المعروفة عديدة نحو ٧٠ ، قسم منها أي نحو ٢٥ من متحجرات الإراشيد الثانية والثالثة ، أما الباقى فتنتشر في جميع بحار العالم || أصدانها صميكة الصلصة ، بيضية الشكل ، لامتداوية المصارع المنفصلة الأطراف .



كربوس منقط

٢٣٤١٠ - كَرِيلِغاز Carbolligase

أزيم شذالة توجد في الحشرة وفي الفئاض وفي بعض أوراق النبات . جهدها يماكس جهد الأزيماز .

٢٣٤١١ - كَرْبُون Carbon (F). Carbone (E).

جسم بسيط رمزه (C) وزنه الذري ١٢.٠١ وهو من عناصر المركبات العضوية الأساسية إن نباتية أو حيوانية . ونظراً لكثرة وأهمية هذه المركبات الكربونية فقد جعلوا الكيمياء العضوية لدراستها || والكربون لا ينحصر وهو قابل للاحتراق ويحل ويبدد الانبعاث الحرارية والكهرية || يوجد في الطبيعة على أشكال مختلفة أصحها البلورة كالكالس والاسرب وغير البلورة كالصم واللباسج .

٢٣٤١٢ - كَرْبُونَات Carbonate

ملح الحامض الكربوني .

٢٣٤١٣ - كَرْبُونَات البُوتَاسِيُوم Potassium carbonate (F). Carbonate de potassium (E).

ملح أبيض سريع الذوبان في الماء يجمد من ٥° إلى ٦٢° من البزلس || يستعمل كصاب يظا .

٢٣٤١٤ - كَرْبُونَات الكَالْسِيُوم ، كَرْبُونَات الكِلْس Calcium carbonate (E).

ملح الكلسيوم الطبيعي الذي يؤلف معظم الطبقة السطحية من الكرة الأرضية .

٢٣٤١٥ - كَرْبُونِي Carbonifère (F).

نمت قتريني يطلق على الصخور والأتربة التي تحوي بعض الكربون أو الفحم الحجري || ويطلق خاصة على الحقبة الرابعة من الأجيال القدم وفي الطبقة الأرضية التي ترتكز على الديفونية . راجع مادة حياة .

٢٣٤١٦ - كَرْبُونِيل Carbonyl (F). Carbonyls (E).

مركب فساد تنفث يستعمل في صيانة الأخشاب .

٢٣٤١٧ - كَرْبُونِيلَاَز Carbohydase

هو العمل الذي تقوم به الأزيمات في مضاعفة المحلوسيد والمغروسيد .

٢٣٤١٨ - كَرْبُونِيَة ° Couroupita (S).

جنس الشجار برية وزراعية من فصيلة الآسيات . أنواعها المعروفة خمسة منها بعض أصناف أمريكا الجنوبية أصحها



كريته

٢٣٤٠١ - كُرْبِلْ عَرِيضُ الْوَرَقِ ، غُكَا سَمَاءَ ، كُرْبُولَة Kalmia latifolia (S).

Kalmia à feuilles larges, Laurier de montagne (F). Mountain laurel (E). Brechtblättrige Kalmia (D). Kalmia à foglie larghe, Lauro di montagna (I). نوع من الكربيل وهو شجرة جميلة الشكل تملو من ٧ إلى ١٢ م . أوراقها متعاقبة أو ضيقة للآلية . نسلها يطول نحو ١٢ سم . ويمرض ٤ سم . أزهارها متعاقبة للتجميع تنابية الانتكاز عديدة الألوان التي تختلف مع الضروب || أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

٢٣٤٠٢ - كَرْبُولَة Carpel (F).

هي البذبة ، الطليخ .

٢٣٤٠٣ - كَرْبُونِيَة Carbonylase (F).

المعالجة بالكربونيل وفي عملية تقوم على طلاء الأشياء الخشبية أو نطقها بالكربونيل لحفظها من التلف .

٢٣٤٠٤ - كَرْبُون Carbu (F). Carbide (E).

قسم ثنائي أو هيدروجيني .

٢٣٤٠٥ - كَرْبُونِس Pelodytes (S).

Pelodytes (F). Parsley-frog (E).

جنس ضفادع من فصيلة الحكرسيات . أنواعه المعروفة قليلة العدد مهدا بعض أصناف العالم القديم || أجسامها صغيرة القند تطلو من ٤ إلى ٦ سم . عيونها كبيرة ناشزة . حذقات عيونها صموية الانتكاز . جلدها مبشرة التبول والغدد || اتوا إلى الطبقة الخضراء تملوها زراكن متبانية الأشكال تختلف مع اختلاف النوع || من ميزات هذا الجنس رائحة الثوم الخفاصة التي تفوح منه واستمراره على التفرقة نحو تسعة أشهر من كل عام || أشهر أنواعه الكربون المنقط .

٢٣٤٠٦ - كَرْبُونِس مُنْقَط Pelodytes punctatus (S). Pelodytes punctatus (F).

Spotted Parsley-frog (E).

نوع من ضفادع الكربون وفصيلة الحكرسيات . أمانه تمتد من الشرق الأوسط إلى أطراف البلاد الإسبانية دين إن تتجاوز الأقاليم المعتدلة || جسمه صغير القند . الذكر يطول من ٤ إلى ٥ سم . والأنثى تطول من ٦ إلى ٧ سم . رأسه متوسط الحجم . خطمه مستدير الطرف . عيناه كبيرتان ناشزتان . حذقة عينه صموية الانتكاز . أصابع قوائم الخلفية قليلة الخطاط الذي يكتنف قواعدها فقط . جلده مثالي البشرة . ظهره مجهز ببض التبول والغدد المعتدلة الشوز تنفث الماددة اللبوية الرائحة التي يتميز بها || نوبه إلى الطبقة الخضراء تملوها نكت خضر عابقة || يعيش في المناطق وجاري الماء . يجمع نحو حشر سنوات . مسرعه دجوي يستمر من الضروب إلى الفجر . قوته الحشرات والديدان || الأنثى تقرأ خلال موسمها السنوي الذي يستمر نحو تسعة أشهر من ١٢٠٠ إلى ١٦٠٠ حذقة ضمن حبال مستطيلة تلفها على بعض النباتات المائية . التفق يتم بعد التفرقة بنحو ثلاثة أسابيع واللباط عند اكتمال طورها البلوغى تطول نحو ٦ سم .

٢٣٤٠٧ - كَرْبُونِيل حَنْطِي Carpopile brune (F).

هو الوضعة الخنثية ، الطليخ .



كريس

تسرب لحاء وشكير جلوح النباتات البرية || جسمها صغير القند يطول من ٨ إلى ١٢ سم. رأسها وكسولها وبطنها وجرايمها الى السواد الاسفع. ظهرها الى انفسار الازرق المواج. حيتاها كيرتات جاحظتان. زباباها دقيقان مستطيلون || غلظها مقطوع الطرف الاصح. غذاءها متباعدتا التخديد. ارساقها رباعية العغل الظاهرة || الاثن اثن قدأ من الذكر واغصم بطنأ منه واقصر زبابأ || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في نيسان وتميش حتى اواخر حزيران. تسرح في النهار || البرقة عند ادراكها الكيال الجسوري تطول نحو ١٨ سم. جسمها مستطيل المقدم والرأس، مستدق المؤخر، قليل الملب للمجر. فوها الى الخنطي الاسمر. رأسها وشريحها الى الصمر السواد.

الغويان || سقها معتدلة الارتفاع فراءه. فروصها فارشة. اوراقها مستطيلة، مسنقة، ستائية التصال الجامدة، تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم. ازهارها محوري الارتكاز، ستيلي التجميع. ازهارها جمليلة الشكل قبل الابلاج، متباينة الالوان، فواحة المرف الطري المستحب. ثمارها كروية الشكل، بحجم البرتقالة الكبيرة، مأكولة السوق والسليجات.

٢٣٤١٩ - كُرْبِيس * Corbis (S).

Corbis (F). Corbis (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحات الخياشيم وفعيلة القرينيات، انواعها المعروفة عديدة منها المعاصرة ومنها الغابرة المنحجرة التي تعود الى الحقبة السيلورية || اسدائها شبه بيضيه الشكل متساكنة، غمدية، عابقة الالوان، يكثر فيها الجوزي القاتم || اجسامها منوصطة الحبل او صغيرة || ثنائية التناوب المستطيلة الطويلة || اعطائها معظم بحار العالم. تميش منتفحة في الزوال المنصورة بالماء المعتدل القور.

٢٣٤٢٥ - كُرْد * Kard

هي الطبقة الطبائرية السطحية كُثرت فيها الإمات والكتل اللاقياسية الارتكاز والاجرام.

٢٣٤٢٦ - كُرْجُولَة * Corrigiola (S).

Corrigiola (F). Corrigiola (E).

جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة التوبانيات، انواعها المعروفة ستة منها الشرق الادنى واروية وبعض مناطق افريقية وامريكة الجنوبية || سقها تحيلة. اوراقها لحمية مستطيلة. ازهارها حامي فسي التجميع. ازهارها صغيرة خاسية البتلات والاسدية، ثنية اللون. تنويرها ربيعي || احرف انواعها واشهرها كُرْجُولَة السواحل.

٢٣٤٢٠ - كُرَّة * Sphère, Globe (F).

Sphère, Globe (E).

جسم مستدير الشكل يتميز بتساوي جميع خطوطه المستقيمة المنتهية من المركز الى السطح. تؤخذ مساحة الكرة بضرب مربع قايها بعدد ١٢,٥٦٦٤, ويؤخذ حجمها بضرب مكعب قايها بعدد ٤,١٨٨٨.

٢٣٤٢١ - كُرَّة اُرْبِيَّة * Globe terrestre (F).

Terrestrial globe (E).

الكرة الارضية كوكب سيار من النظام الشمسي. (راجع ارض) || كيف تكوئت ردت ٩ بحث يقودنا الى عدة نظريات لا مجال لرسدها جميعها، انما نذكر اشيعها واقربها لطقن || عند حصول الانفجار السديمي، اي منذ نحو ٧ مليارات سنة، تكوئت الفرج الرقيعي المعروف بالنظام الشمسي، لانه يتألف من الشمس وكواكبها ومنها الكرة الارضية التي بعد ان دارت حول الشمس مليارات السنين اصبحت ما نعرف عنها الآن : ارض متباينة التضاريس والقشامة تطلوها مياه البحر، حركة مستمرة لا يمكن ان تتوقف لان وقودها يعني الزوال. وسية تتبثق من كنه الخالق فتتجسد وتتنو ثم تلوي وتندثر. (راجع تاريخ الكرة الارضية) || اما الخواطر الاربع المدرجة تايما فاتها ثنين مدى التطورات العظيمة المفعلة التي حصلت عبر الازمنة السحيقة الغابرة، وما سيحصل في المستقبل البعيد بعد مرور ٤٠ او ٥٠ مليون سنة.



كردوم أسود الرأس

٢٣٤٢٧ - كُرْجُولَة السَّوَّاحِل * Corrigiola littoralis (S).

Corrigiola littoralis (F). نوع من الكرجولة. طوعية في بعض مناطق الساحل الليبي ومنها فوسلي يبروت || ساقها تحيلة مستطيلة. اوراقها رحيمة الشكل، مستطيلة التصال. ازهارها حامي. ازهارها الى الصفار الباهت. تنويرها ربيعي.

٢٣٤٢٨ - كُرْد * Base du cou (F).

Base of the neck (E). هو اصل العنق او قاعدة ارتكازه.

٢٣٤٢٩ - كُرْد * Fermo, Métairie (F).

Farm, Lease, Land (E).

الشارية من المزارع. ج. كرد.

٢٣٤٣٠ - كُرْد *، عَشِيَّة السَّيْح، دَقْنَة قَاتِلَة * Daphne cartonraira, Thymelaea cartonraira (S).

Daphné cartonraire, Tartonraire, Herbe terrible (F). Silver leaved daphne (E). Tartonraire (D). Laureola bianca, Salamandra (I). نوع من الدقنة البرية السامة منها المواتع الكسكية الرطبة. شكلها يشبه الخلنج. ساقها فراء تملو نحو ١٢٠ سم. اوراقها متقابلة عشيقة، لنصلها جامد الصلابة، باهت الخفسار. ازهارها سنبلية التجميع، هامة الارتكاز، صغيرة القند، يبيضه اللون.

٢٣٤٢٧ - كُرَّة الخَلْج * Boule de neige (F).

هي الافلوس الثلجي، اعطيه.

٢٣٤٢٣ - كُرَّة هَرَبِيَّة * Photosphère (F).

Photosphère (E).

سطح الشمس المضي.



كرد

٢٣٤٢٤ - كُرْدَتْلُوم اَسْوَد الرَأْس * Cartallum ebulinum (S).

Cartallum ebulinum (F). Cartallum ebulinum (E).

حشرة وائمة غاشلة من فصيلة القرينيات ورتبة ضفدعات الاجنحة. تألف البراري والجزواتين. خناقها تميش حل بتلات الازهار واغصنها ازهار الصوليوات. يرقاها همة

٢٣٤٣١ - كُرْدَة كَلَّة * Cordana (S).

جنس فطور مجهرية من عمار الزناخيات وفصيلة اللطحيات. جريه الكنديية اسطوانية قصيرة تعلوها كاتل صرلانية فنية التجميع قنائة الخلية || انواعه قليلة العدد والاذى، ارفها كردانة الموز.

٢٣٤٤٠ - كُرْدَهَانِ الْعَاقِب

Codonopsis silvestris (S). *Codonopsis* des bois (F).
نوع من الكردهان، ساقه فروعاً متسلقة ملتفة تملو نحو ١٥ سم. أوراقه متفحة قليلة الشكل، نصلها مبشر الزغب الجامد. أزهاره لا قياسية الإرتكاز، كثيرة العدد، صفراء اللون، فستيقية اللون || أزهاره يستمر من تموز إلى آب.



كردانة الموز

٢٣٤٤١ - كُرْدَهَانِ يَبْفِي الرِّقْ

Codonopsis ovata (S). *Codonopsis* à feuilles ovales (F).
نوع من الكردهان، ساقه متسلقة متسلقة تملو نحو ٨٠ سم. فروعها متعاقبة قليلة الاستطالة. أوراقه بيضفة الشكل، خلية البشرة، تطول من ٢ إلى ٣ سم. أزهاره تطول نحو ٣ سم. لونها إلى الزرقاء الباهتة يعلوها تزيين مابق || أزهاره يستمر طوال الصيف.



كردون

٢٣٤٤٢ - كُرْدَهَانِ مَرَعَانِي

Codonopsis dematidea (S). *Codonopsis*-clématite (F).
نوع من الكردهان، ساقه متسلقة متسلقة تملو نحو ١٢٠ سم. فروعها لا قياسية الإرتكاز. أوراقه متفحة كاملة، السطح منها متعاقبة واللبا متعاقبة، نصلها خلية البشرة، بيضفة الصفحة المبيدة عند زواياها الأخير. أزهاره الزرقاء الإرتكاز، بيضاء اللون، مفصصة بالازرق || أزهاره يستمر من تموز إلى آب.



كردلس

٢٣٤٤٣ - كُرْدُونُس

Epiphyse (F). *Epiphys* (E).
٢٣٤٤٤ - كُرْدُونِلَه
Cordylura (S). *Cordylura* (F).
جنس حشرات قانصة من فصيلة الطلواحيات ورتبة ذوات الأجنحة. أنواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم أقطار العالم || أجسامها هيفاء، تطول من ٨ إلى ١٢ سم. رؤوسها كبيرة، مستعرضة. عيونها فائضة، متباعدة عند الشقين. قرونها الاستشعارية شديدة القصر، تلتهم بنسيلة دقيقة، أعطائها حليلة، ملامسها صغيرة، بطنها صغية الشكل. كواسلها وبطنها ورؤوسها وقوائمها متكاثفة الملب. ورأسها ضيقة، ملونة. قوائمها نسيطة || الحشرة الجملانة قانصة، البرقة قلابة وأجبة.



كردون

٢٣٤٤٥ - كُرْدُونُم

Cardium (S). *Cardium*, *Bucarde* (F). *Cardium* (E).
جنس حيوانات نهرية وقماصية من الرغويات صفيحات أحيائهم وفصيلة الكردونيات. أنواعها المعروفة كثيرة العدد معظمها نهري وبضها قماصي يعيش في مياه الأنهار || أصدافها شبه قلبية الشكل، متساوية المصارع. أصدافها ملسة أو مخددة أو مفصصة، جميعها محززة ملونة عادية الالغشية. مفصلاتها رباعية الأسنان. مطاها ثنائية طليقة || تعيش منتشرة في الأسماك والقرماص.

٢٣٤٤٦ - كُرْدُونِيَّات

Cardilidae (S). *Cardilidae* (F). *Cardilidae* (E).
فصيلة حيوانات مائية من الرغويات صفيحات أحيائهم. أجسامها وأزناؤها المعروفة عديدة منها البرية التي تعيش في المياه العذبة ومنها البحرية ومنها القماصية التي تعيش عند مصبات الأنهار || أصدافها متباينة الأشكال والأحجام يكثر فيها الشكل القلبي. مصادرهم متساوية الفلق



كردوم

٢٣٤٣٢ - كُرْدَهَانَةُ المَوْز

Cordana musae (S).
فطر مجهري يركب أوراق الموز فيؤذيها بنفس الشيء. مظهره الخارجي زخفة عديمة الشكل تركب التنسل حل صفحته الخليل. تبرز سمر، اللون ثم تنحرف إلى الخلفي يحيطها حصار أشبه قاتم || أزهاره زبدية لا تشعني العنابة.

٢٣٤٣٣ - كُرْدَهَا

Kruberia (S). *Krubiera* (F).
جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة النجيليات. أنواعها المعروفة عديدة منها معظم مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط || سوقها مستضخمة، غضة، ملساء الملمس، فروعها، أوراقها مخزفة، متباينة التوصيل الريشي. أزهارها صيراني التجميع، طرفي الإرتكاز، لانسواوي الالغشية عددًا وطولًا. أزهارها صفراء، بيضاء اللون أو صفراء أو أرجوانية || تنموها ربيعي.

٢٣٤٣٤ - كُرْدُونُون

Cordulia
جنس حشرات من فصيلة البسوسيات، أنواعها المعروفة قليلة جميعها مفترسة تقضي على الحوام. طول أجسامها وأرجلها بسيطة اجنتها تراوح من ٦٠ إلى ٦٤ سم. ألوانها إلى الخضار الزرق. أناثها أعقب ثوبًا من ذكورها.

٢٣٤٣٥ - كُرْدَالِيَس

Corydalis (S). *Corydalis* (F). *Corydalis* (E).
جنس حشرات من فصيلة الكردونيات ورتبة سادات الالجنة. الأنواع المعروفة عديدة موطنها الأقطار الأمريكية || أجسامها مستطيلة، شبه أسطوانية الشكل. رؤوسها غليظة، مفصصة التصلب. عيونها صغيرة. قرونها الاستشعارية خيطية. تتميز بتأخرها المستطيلة خاصة عند الذكور. اجنتها غشائية، شبه متساوية. ألوانها تراوح من السمرة إلى الكهبة || يرقاتها مفترسة تعيش كالم طورها البري في الماء.

٢٣٤٣٦ - كُرْدَالِيَسِيَّات

Corydalidae (S). *Corydalidae* (F). *Corydalidae* (E).
فصيلة حشرات من رتبة سادات الالجنة. اجنتها وأنواعها المعروفة عديدة، منتشرة في معظم أقطار البلاد الأمريكية || أجسامها مستطيلة، شبه أسطوانية الشكل. رؤوسها مستطيلة يكثر فيها التصلب. قرونها الاستشعارية خيطية. عيونها صغيرة جانبية - اجنتها غشائية || مسرهم دجوي. يرقاتها مائية مفترسة.

٢٣٤٣٧ - كُرْدُونِين

Cordylina (F).
هو القلب، جنس نباتات زينة، أغلبه.

٢٣٤٣٨ - كُرْدَهَانَة

Garou (F).
نوع من الفلفة، أغلب مثان.

٢٣٤٣٩ - كُرْدَهَان

Codonopsis (S). *Codonopsis* (F).
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى يشبه الجرس. جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة البسوسيات. أنواعها عديدة ملسها بري وبضها ربيعي. أعطائها بلاد الشرق. جنورها خلية. سوقها متسلقة متسلقة أو ملتفة. أوراقها لا قياسية الشكل والإرتكاز يندب فيها التقابل. نصلها محززة اللون. أزهارها جبرسية متدللة || أشهر أنواعها ما يتبع.



كرديت



كردنال فيرجينية



كرز



كرز الطير



كرز حادي



كرز عنقودي

المفضلة والمسنة الاطراف المنقرجة . جميعا ثنائية المخاب
الطليقة || احرف اجناسها واشهرها الكروم .

٢٣٤٤٧ - كزيت *
Cardita (S).
Cardite (F). Cardite (E).

جلس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم
وفصيلة الكرديتات . انواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة
في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداها
شبه قلبية الشكل ، مسننة التثديد . مثابها ثنائية ،
طليقة || تعيش لاصقة بالصخور العمورة القليلة الغور .
ليفها غزير للمادة اللشبية .

٢٣٤٤٨ - كزيت *
Carditidae (S).
Carditidae (F). Carditidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم .
اجناسها وانواعها عديدة . الممارسة منها منتشرة في جميع
بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . اما القارية فن
متحجرات الاثرية الدقيقة || اصداها شبه قلبية الشكل ،
مدببة القن . خياشيمها لاشعورية القد ، خلفية الرباط .
صناديقها متساوية ، منقرجة الاطراف || احرف اجناسها
واشهرها الكرديت .

٢٣٤٤٩ - كزيت ينال
Cardinalis (S).
Cardinal (F). Cardinal (E).

جنس طير من فصيلة الشرشوريات . انواعه المعروفة اربعة
موطنها بعض مناطق امريكا الشمالية والوسطى . يأنف
الغابات . فوسه يراوح من ٢٠ الى ٧٠ زوجا || اجناسها
صغيرة القد . رزوها متوسعة بفنانع شباينة الاحجام .
اثوابها ملونة يكثر فيها الاحمر والجووي . تتميز بمناقيدها
الشبه مخروطية الشكل القصيرة والفلسية . اذنانها مستطيلة ،
مقرعة الاطراف او مستديرتها || طيراتها خفيفة الحركة ،
متعددة الشوط ، كثير التصيد والتبييط . تتنقل على الارض
خفية وعلى الاضغان برشاقة || قوتها الثار النضية والبلور
واخيرا لا تمتع من ثمار الفاكهة والحبوب والذرة ||
اشهر انواعه كردنال فيرجينية .

٢٣٤٥٠ - كزيت ينال فيرجينية *
Cardinalis virginianus (S). Cardinal de virginie (F).
Cardinal tanager (E).

طائر من الكردينال . موطنه بعض مناطق امريكا الشمالية
اعصابها فيرجينية . يأنف الغابات ويحب البلاد باستمرار
الا في زمن الترحيم . فوسه يعد من ٢٠ الى ٤٠ زوجا ||
جسمه صغير القد . ربع القامة ، يطول نحو ٢٢ سم . بما
فيه الذنب الذي يطول نحو ١١ سم . ثوبه الى الحمرية
القرمزية تبت في الظهر وتبين في الجناحين والذنب .
جبهته الى الخوخة وكشته كلك . زوره اسود . حذقة عينه
باقوتية اللون يطوقها حطار جووي || طيرانه خفيف
الحركة ، سريعها ، متدل الشوط || يدن عشه في
الادغال ربي الاشجار القليلة الارتفاع للفضة الانفاد
والانثان . الاثني تقسم من ٤ الى ٦ فضات تحضنها وسدا
نحو ١٣ يوما بينا الذكر يؤن لها الغذاء .

٢٣٤٥١ - كز
Cône, Strobile (F).
Cone, Pine-cone, Strobile (E).

ثمرة اشجار الفصيلة السنوبورية وغيرها من الثار مخروطية
او المخروطية الشكل .

٢٣٤٥٢ - كز *
Cerasus (S).

Carisier (F). Cherry tree (E).

جلس اشجار برية وزراعية شجرة من الفصيلة الوردية .
انواعه وفروبه كثيرة العدد تحفظ باحجامها وبياكلها
وارتكان اجناسها وقد ثمارها واشكالها . ورف هذا التباين
في الاصنام الجسورية فالصفات الشوزية الجينية
الرئيسية واسلة : جلور عمودية ثم حزبية ، سوق منتصبة .
الحامسة . غشب جزوي اللون . اوراق مسننة ، مسنة
الحافة ، ناصغا بيضيه الشكل او رمية . ازهار نوري
التجميع يشغل من ٣ الى ١٢ زهرة . ازهار بيض ، خاسية
البتلات ، عديدة الاسدية . ثمار لحمية ، مستطيلة الاذن ،
كروية الشكل ، ماسة القشور اللامعة ، للذلة اللباب
والشم ، مستديرة البزور الصلبة || وهو من الاشجار
التي تألف المناطق الباردة في الاقاليم المعتدلة لكنه ينش
المواقع المعرصة لرياح الموساء لانها تسبب اغلاص الازهار .
يجود في جميع الارربة من القفرية بالماء والذات الى الحصى
ومن الرمية الى الطينية غير انه لا يتصلل الارربة الشديدة
الانحماص ، المستحكمة الرطوبية . وهو يتكاثر بالبزور
والغسلات وبالترقيد والتغصم . امنع واجود مطعانه المقلب
والبري والشرية وسناليو .

٢٣٤٥٣ - كز الطير *
Cerasus avium (S).

Carisier des oiseaux, C. des bois, Mérizier (F). Gean
cherry, Hedge-berry, Sour-cherry (E). Südkirsche
(D). Ciliegio visciolo, Cilegiolo (I).

نوع من الكرز الزراعي المشر . اليه تنسب أكثر واشهر
الفروب الموصوفة المعروفة . اجناسها كبيرة القد تملو من
١٠ الى ٢٠ سم . سطها واغصانها منتصبة . ثمارها مستديرة ،
كروية ، صغيرة ، سكرية الطعم ، مستحبة المذاق ،
للذلة النكهة .

٢٣٤٥٤ - كز القدس *
Cerise des Juifs (F).

هو الحبة الكاكنجية ، اطلمها .

٢٣٤٥٥ - كز غادي * ، كز حامض

Cerasus vulgaris (S). Carisier acide, Griottier, Bir-
garreaulier (F). Cherry tree (E). Sauerkirsch, Sauer-
kirschen (D). Ciliegio agerotto, Cilegiolo (I).

نوع من الكرز الزراعي المشر العديد الفروب . ساقه
منتصبة تملو من ٦ الى ١٢ م . اغصانها منقرجة مسترسلة .
ثمار كروية ، قليلة الحمرية ، خيرة المادة ، للذلة الطعم ،
بينة النضية التي تغلوت نفسها مع الفروب وقد تكون
حامزة في الفروب المعروفة بالوشنة .

٢٣٤٥٦ - كز عنقودي *
Cerasus padus (S).

Carisier à grappes, Putier, Putlet (F). Bird-cherry,
Hach-berry, Hog-cherry (E). Gemeine Trauben-
kirsch (D). Pado, Ciliegio a grappolo (I).

نوع من الكرز البري المشر . ثمار صغيرة القد ، عنقودية
التجميع ، حامزة الطعم مأكولة . منته الاغصان والجبال
الصخرية . شجيرة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اغصانها
مسترسلة متدلية . اوراقها اعلمجية ذرية مسنة الحافة .

٢٣٤٥٧ - كز غاري * ، كز الغار

Prunus lauro-cerasus (S). Laurier-cerise (F). Cherry
laurel (E). Larbeer-kirsche (D). Lauro ceraso, l.
mandorlo (I).

جنس نباتات برية ورزيتين من فصيلة الورديات . انواعه
قليلة العدد منها الاشجار والشجيرات والجنيات . سوطها

٢٣٤٦٣ - كَرْسُومَة ذَرَكِيَّة

Botryodiplodia tubericola (S). Java black-rot (E).
فطر مجهرى يتطفل على ذرات البطاطا الحلوة فينبهها .
مظهره الخارجى يحول المحلول يصيب الثياب والقشور تسمر
وتسود وتسلخ ثم تتفتن ويعلو المغن || علاجه الرشيد
يقوم باجتناث الأزاحة في المناطق الرطبة وفي الأثرية
المؤبودة مع تلكاكة بضرورة تطوير البادار قبل الزرع .

٢٣٤٦٤ - كَرْسُوف ، كَرْسُوف
Coton (F).
هو التطن ، اطبله .



كرز غازي

٢٣٤٦٥ - كَرْسُفِيَّة ، عَنَقَل *Gnaphale* (F).
جنس نباتات برية طلية من فصيلة المركبات . أنواعها
عديدة منها المشية الحلوة والخشبية الممرة . سورها وأوراقها
زهاء ، زغبها أبيض اللون . أوراقها متعاقبة لاطئة كاملة
صغيرة اللد ستانية النصل . أزهارها رؤوسيات طرفية .
معظم أنواعها طَيَّ يستعمل غده الحمال ويضع للصدر .
أعرف أنواعها وأشهرها ما يلي .

٢٣٤٦٦ - كَرْسُفِيَّة جَبَلِيَّة * ، عَنَقَل جَبَلِي
Gnaphalium leontopodium (S). *Gnaphale pied-de-lion* (F). *Lion's paw cudweed*, *Everlasting* (E). *Ruhrkraut*, *Ruhrpflanze* (D). *Canapichia*, *Immortali* (I).
نوع من الكرسفية البرية الطلية منها الجبال العالية ،
زغبها له أغبر اللون . أزهارها ليلكية . تقيده الحمال .



كرسفية جبلية

٢٣٤٦٧ - كَرْسُفِيَّة حَمْرَاء * ، عَنَقَل أَحْمَر *Gnaphalium sanguineum* (S). *دم القراز*
Gnaphale rouge (F). *Red cudweed* (E). *Roter Ruhrkraut* (D). *Canapichia rossa* (I).

نوع من الكرسفية البرية الطلية المحلوة . تنبت في الأراضي
للحشاح من ارتفاع ٤٠٠ م إلى ١٢٠٠ م . من سطح البحر .
زغبها أبيض اللون برآق . أزهارها إلى الحمرة الجيلة . تقيده
الحمال والصدر .



كرسفية حراء

٢٣٤٦٨ - كَرْسُومَة *

Ervum ervilia, *Vicia ervilia* (S). *Ers*, *Erville*, *Lentille ervillière*, *Vesce noire*, *Faux orobe* (F). *Ers*, *Ervil*, *Bitter vesch* (E). *Stachelwicke* (D). *Ervo*, *Frageolini*, *Girio*, *Lero*, *Moco*, *Veggiolo* (I).

ليات عشبي حولي حلي من فصيلة البقوليات ، يزرع عليه
رثته . وهو يعطى فلفاً للبهائم أعصها البقر والتمن إلا أن
كثرتته مستشقة لذلك يحسن التزوي في استعماله || جلوه
سطحية متوسطة الانشباب . ساقه عروزة قليلة الفروع
تعلو من ٢٠ إلى ٤٠ سم . أوراقها متعاقبة ، مركبة ، شامية ،
مؤلفة من ١٠ أو ١٢ أو ١٤ زوجاً من الأوراق
الامتتاعلة ، فصلها يبيش الشكل ، أسس الصلصة .
أزهاره صغيرة اللد ، بنسجية اللون سطحية الزناد . ثماره
سنت صناد وكل سنف تحسن من حبيتين إلى ثلاث حبات
صغيرة القدر لا قياسية الشكل لونها إلى الصرة البنية .
زراعتها بعلية وهو يحمده به الحطة أو الشعير مع جميع
الآثرية الخفيفة والمتوسطة الانتاج ولا يخشى سوى المناطق
الرطبة || ينمو عادة في الكواكن لزوم الدثم يروح
من ١٠ إلى ١٢ كيلو .

٢٣٤٦٩ - كَرْسُومِيَّات *في البقيات* ، اطبلها .
٢٣٤٧٠ - كَرْسُومِي *Grégoire* (F).
Gregarious (E).

صفة النبات الذي يعيش ويكثر سباعياً متجانساً .



كرسنة

مناسبة ، أوراقها أبيدة ، احليجية ، ستالية ؛ نصلها
جامد الصلصة ، مشاري الحافة . أزهارها عثودية التجميع
ثمارها صغيرة اللد زيتونية الشكل ذربة القنب ، لونها إلى
الحمرة أو السوداء .

٢٣٤٥٨ - كَرْزِيَّة *Cerise*, *Gulgne* (F).
Cherry, *Sweet cherry*, *Heart cherry* (E).

هي ثمرة الكرز ، اشكالها وألوانها عديدة جميعها مستحبة
العلم المركب . لباب سوتها يحوي نحو :

٨٠,١٠ ٪	من الماء
١١,٩٠ ٪	من المواد السكرية
٣,٨٥ ٪	من المواد الاستخلاصية
١,٣٥ ٪	من المواد الازوتية
٠,٣٥ ٪	من المواد المعدنية
٢,٥٢ ٪	من السليور
٠,٤٣ ٪	من الرماد

وهو يحوي أيضاً بعض الحماض الضوئية أعصها الحماض
التفاسي وما لا يستأن به من العناصر المعدنية كالبراس
والفسفور والنتريدوم والكبريت والكلسيوم والنتريدوم
والحديد والنتاس واليود ... أخف إلى ذلك نحو ١٥ ٪
من الفيتامين و٥٥ وما لا يقل عن ٥٥٠ وحدة من الفيتامين
٥٤٠ .

٢٣٤٥٩ - كَرْزِي *Bacciforme* (F).
Bacciform, *Berry-shaped* (E).

ما كان شكله شكل حبة القنب أو الكرز .

٢٣٤٦٠ - كَرْسُوس ، صَاهُورَة ، صِرَاع *Chérarria* (F). *Gout-pen* (E).

ملأى المازز المني المشقوق . والكرس هو ما تلبه من
الهر والبرج . ج . اكراس ومرج ويصير .

٢٣٤٦١ - كَرْسُومَة *Botryodiplodia* (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفصليات . بكنيداته
غنية كيفية تجمعها ونسبة غليظة شارة . بونيات حطية
اللون ثنائية الخلية || أنواعه المؤدية قليلة ، يكثر وجودها
في البلاد الحارة ، أعرفها ما يتبع .

٢٣٤٦٢ - كَرْسُومَة الكَاكَا *Botryodiplodia theobromae*, *Lasiodiplodia theobromae* (S).

فطر مجهرى يصيب عدة نباتات مختلفة النصال أعصها
الككاو والشاي والبن والمخاط والتطن والموز || فهو على
الككاو آكلة تنخر الجذور فتدبل الأوراق بهد أن تمتلئ
السفن بمسحة من العفن الاسود وبد أن توشع لحاء الساق
بعض البقع المنخفضة السمراء اللون || وهو على الموز
مفن يركب قلب الآروية لونها إلى أصعب الطرح فيوش
الآثار بقمع قشرها وحققها نحو ٨ م . لونها إلى الأخضر
الزيتوني || وهو على المخاط ذبول على بقعة الشجرة يعقبه
استمرار واسوداد في لحاء الساق || ويصيب الشاي والبن
فيابل الإنسان والآناد ويولجها || وهو في القطن يوصم
يركب المغازة فيمنعها من النمو بهد أن يركم ثيلها ويتعصب
مشبهه الاسود || يكافح بالتصاق وحرق الأعضاء المؤبودة ،
بتطهير المروج ، وباستعمال أحد الفوطير الفعالة أما
نفساً على النبات أو تدفيراً على الآثرية والنبات .

قصيرة وغليظة ، جلورها عويدي . أوراقها لاطفة متناوبة مركبة . السبل منها قرصية الانتشابت مسطيلة الاعتناق الضلعية ، اما العليا فتنباعدة وكثيرة التفرع . ازهارها صولانية التجميع ، لونها الى الياض الاخضر || وهي من النباتات الطبية تدر البول وتفتك الصدر ويحلل الورم وتفتح الحصى || تتكاثر بالبذر وترب في الاربة الدبالية الحسنة .

* كُرْسِي الجَبَل ٢٣٤٨٢

Athamanta oreoselinum, Petroselinum oreoselinum (S). Ache de montagne (F). Mountain parsley (E). Augen Wurz (D). Appio di montana (I).

نبات عشبي بري طيب معمر من فصيلة الخيميات ، ينبت في الجبال الريفية . ساقه مخشوشة تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم . أوراقه مسطيلة الاعتناق كثيرة التفرع والتشريح . ازهارها صولانية التجميع صغيرة القذ وريدة اللون .

* كُرْسِي الماء ٢٣٤٨٣

Ache latifolium (S). Ache aquatique, A. d'eau, Berle (F). Water parsnip, Water parsley (E). Breiter Mark, Wasser Peterling (D). Erba crocans, Sedano d'acqua (I).

ومن اسمائه أَس التمس وبرجبر الماء وهو نبات عشبي طيب معمر ، من فصيلة الخيميات ، يتكاثر في المنابع والأراضي الرطبة . أوراقه وجلورها مضادة الحفر ويذرة البول . يزود منطقة الكبد وفي مهبجة لقوة الجنسية وقد تكون شائعة نظراً لما تحواه من الفسفور والكلسيوم . وإذا رعت الماشية من غم ومازغ وبقر كثير دواء وبياد صفته .

* كُرْسِي بَرِّي * ، سَمِيرَنُوم ٢٣٤٨٤

Smyrniolus olustrum (S). Maceron, Mac. potager, Ache large, Gros persil (F). Alexander's, Horse parsley, Wild celery (E). Gespenstgelbdoles, Smyrnerkraut (D). Macerone, Olosatro, Smirino (I).

نبات عشبي بري يغطي من فصيلة الخيميات ، ينبت في منظم الاصحاح المعتدلة الحرارة . قريب الشبه من البقدونس والكرفس . أوراقه مأكلة مستحبة العرف والطعم .

* كُرْسِي رُومِي ٢٣٤٨٥

Persil (F). هو البقدونس ، اطليه .

* كُرْسِي لَفِي ٢٣٤٨٦

Apium graveolens rapaceum (S). Céleri-rave, Céleri navet (F). Turnip rooted celery, Celeries (E). Kohl-rabstelleri, Selleriak, Knoll-Sellerie (D). Sedano rapa (I).

عُرب من الكرفس يزرع جلورها وأوراقه المأكولة . وهو نبات يحمل يندر في الأكلواد ثم ينتقل الى مستقره . يرغب في الآثرة الحوارة الحسنة .

* كُرْسِي ٢٣٤٨٧

Auchenoglanis (S). قال الفريق أمين الملوف : « الكرفس أو شال كرفس ، سمك سلوري ذكر منه بولونه يوصف في التيل » .

* كُرْسِي كُرُول ٢٣٤٨٨

Carvacrol سائل زيتي حاد اللون يستخلص من بطون الشفويات والسمبوليات ، انحصا بطور العصير والقيودج والندج . فقله النسبي حته ١٠ سمغ ٩٨٥٦ . وهو يغطي حته ٢٢٦ سمغ .

٢٣٤٧١ - كُرْسِي الجَزَاء

كربي الجزءا مججمة كواكب بالقرب من الجزءا .

٢٣٤٧٢ - كُرْسِي

Souchet à nattes (F). هو سم الحصر ، اطليه .

٢٣٤٧٣ - كُرْسِي

Panse, Rumen (F). Belly, Paunch, Rumen (E). اكبر اقسام معدة الميترات تتصل بالريء وتفتل ثلاثة ارباع الجوف .

٢٣٤٧٤ - كُرْسَاب ٥

Calyptra (F). Calyptra (E). سوط الجرائم الفطرية وأشباهاها .

٢٣٤٧٥ - كُرْسَب ٥

Calyptra محمد عشائي مركزه عند الزاوية الخلفية من قاعدة ظهوران الحشرة .

٢٣٤٧٦ - كُرْسُون * ، وأس الحشيش

Hertia cheirifolia, Othonna cheirifolia (S). Hertia, Othonna à feuilles de giroflée, Souci d'Afrique (F). Barbary ragwort (E). Schleierkraut (D). Fiorrancio d'Africa (I).

نبات عشبي سبروني معمر وسيد الجلس والنوع من فصيلة المركبات الميثرات . ضروبه التريينية عديدة . سيقها مخشوشة مسطحة ، فرونها منصبة . أوراقها عروة وي متناحية متشعبة للشكل واللون نصلها حيك السنج الشبه للحصى . ازهارها رويحية كبيرة القذ صفراء اللون . ازهاره يشتمل من نيسان الى حزيران .

٢٣٤٧٧ - كُرْسَان

Oursin melon هو التقياء ويحصى السور نوع من الاخيرين المأكول . يكثر . حل الطاوي السخري اللبنانية .

٢٣٤٧٨ - كُرْسَانِيَات ٥

Echinides, Oursins (F). Echinides, Sea-urchins (E). رتبة حيوانات بحرية شائعة الاحداث . فصائلها واجناسها وانواعها الحالية والمتنثرة عديدة ، معظمها شائع على الشواطئ البحرية في جميع اسواق العالم .

٢٣٤٧٩ - كُرْسَانِيَة ٥

Echinocystis (S). Echinocystis (F). Echinocystis (E).

بجلة معمرة عارشة من فصيلة القرقيات . مهدا بعض مناطق امريكا الشمالية . ساقها تعلو نحو ستة امتار . سواقلها ثلاثية الشعب . أوراقها كثيفة ، خاصة الفصوص . ازهارها بيضاء اللون ، نجمية الشكل ، المتكبة منها متعدية التجميع ، اللقية فردية . ثمارها بيضية الشكل ، لونها الى الخضار الاصفر ، تعلو نحو ٥ سم . وتعرض نحو ٤ سم . عليها تاله القليل كوكال مطبوخة .

٢٣٤٨٠ - كُرْف

كُرْف وكُرْف : تسم . يقال كُرْف الفحل أو الحار حتما يشم طرفه ثم يرفع رأسه ويقطب جفنيه .

٢٣٤٨١ - كُرْسِي * ، كُرْسِي تبطي

Apium graveolens (S). Ache, A. des marais, A. douce, Céleri (F). Celery, Marsh parsley, Smalage (E). Sellerie, Echter Sellerie (D). Accio, Appio, Sedano, Seleno (I).

نبته بقلية محولة من فصيلة الخيميات ، ساقها عشية



كُرْسُون



كُرْسَب



كُرْسِي الجبل



كُرْسِي الماء



كُرْسِي بَرِّي



كُرْسِي لَفِي



كرقة جيتا



كرقة ذوية



كرك



كركب



كركدن افريقي

صغيرة ، مخروطية الشكل ، ضيقة الاشداد . عريضا ماسحة . محاسرها متراكبة السهف . زانفانها الظهري ضيقة مستطيلة . الذيلية فاخرة || اثوابها فضية يعلوها تجمع ممتد من اسف ورفة ممراد تمتد من الرأس الى شبح الظهر والذنب || لحونها جيدة الصنف مغروب فيها .

٢٣٤٩٧ - كركش (F). *Chrysanthème matricaire*
هو قوقان منيات ، اطبخه .

٢٣٤٩٨ - كركب * ، كركسولا
Crassula (S). Crassula (F). Crassula, Thick-leaf (E). Dickblatt (D). Crassula (I).

جنس نباتات لحية معمرة من فصيلة الخلدات . انواعه زهاء ١٠٠ ، منها افرقية الجنوبية . معظمها بري وبعضها زينة . اشهر انواعه الكركب القرزي . زدهاره قرزية اللون ، لوزية التجميع ، جميلة الشكل ، فواحة الثمر الياسميني .

٢٣٤٩٩ - كركمة
Alambic (F).
في الامبيق ، اطبخه .

٢٣٥٠٠ - كركج
Sarcolla d'été (F).
هو الحلف الصيني ، اطبخه .

٢٣٥٠١ - كركدنة ، كركند ، مرميس
Rhinoceros (S). Rhinocéros (F). Rhinoceros (E).
جنس حيوانات لينة من الحافريات وفسيلة الكركدنات . انواعه خمسة ، موطنها البلاد الحارة ، منها ثلاثة اسبوية واثنان افريقيان . جنبها ضخمة الاجرام . قوائمها قصيرة لثابتة الاضلاع . رؤوسها غليظة وكبيرة ، اذنانها قصيرة مستديرة عريضا صغيرة . سفنها اعشن بالغ السك . تحمل قرنا او قرنان فوق انفها || وهي حية الطبع لكنها شرسة اذا هوجمت . تقيم قرب الماء . قوتها الحبوب والاعشاب والسرأس والاشباب الغليظة . تعيش اوزاجا ذكر وانثى .

٢٣٥٠٢ - كركدنة ابيض ، هيرميس
Rhinoceros simus (S). Rhinocéros camus (F).
اكبر واضخم أنواع الكركدن وهو من ذوات القرنين . سفنه الى البياض الاقبر . جلته تقوّل نحو ٢٧٠ سم . وتعلو ١٩٠ سم . ذنبه نحو ٧٠ سم . قرنه الكبير يطول من ١٢٥ الى ١٦٠ سم . والصغير من ١٨ الى ٢٢ سم . موطنه يمتد من الحبشة الى اواسط افريقية وصفان هير الأورنج .

٢٣٥٠٣ - كركدنة افرقي * ، عورويت
Rhinoceros bicornis (S). Rhinocéros bicorné (F).
كبير الجثة البليظة الضخمة . طوله نحو ٣٥٠ سم . وطوله ١٧٠ سم . ذنبه ٧٠ سم . سفنه الى السرة الخطية الداكنة . وهو من ذوات القرنين ، قرن كبير طوله زهاء ١٠٠ سم . وقرن صغير ممتد من القاعدة طوله نحو ٢٠ سم . موطنه يمتد من الحبشة الى القطب . يرغب في المنافع ورضفان البحيرات .

٢٣٥٠٤ - كركدنة البحر (F). *Licorne de mer*
هو حريش البحر ، اطبخه .

٢٣٥٠٥ - كركدنة السنند ، كندة
Rhinoceros sondaicus (S). Rhinocéros de la Sonde, R. de Java (F).
كركدن وحيد القرن كبير الجثة . جرمه يصغر جرم الهندي .

٢٣٤٩٩ - كركول ، كركون
Carvol, Carvone
سائل زيتي مادم اللين يستخلص من بطور الثمار والكروريا والكمون والبنج الجدي والصمغ . ثقله النسبي عند ١٧ سم^٣ = ٩٦٠ ، وهو يغلي عند ٢٢٥ سم^٣ .

٢٣٤٩٠ - كركفة
Coque d'œuf (F). Chell, Empty egg (E).
قشرة البيضة المليء اليابسة وتلقى القوة .

٢٣٤٩١ - كركفة
Corypha (S). Coryphe (F).
ج . كركف . جنس اشجار ريفية الجلع المنصب الجالس من فصيلة النخلات . منها المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية . اوراقها حامية الاوتكار ليفية التركيب ، يستخرج منها نسج الكرف الذي يستعمل في صناعة القبعات وبعض اللزائم المنزلية || وهي من الاشجار الزينة التي تعيش في بعض المواقف الخاصة من شواطئ المتوسط || اشهر انواعها الزينية ما يلي .

٢٣٤٩٢ - كركفة جيتا * ، كركفة مستديرة الورق
Corypha gebanga, Gebanga rotundifolia, Taliara gebanga (S). Coryphe à feuilles rondes, Talière (F).

نوع من الكرف . الزينة الشائع الاستعمال ، يجود في جميع الارابة واقلاها خصبا اما لا يتحمل الطلش الشديد والمعرض للباردة التي ينخفض فيها القلر الى خمس درجات سخ . فوق الصفر || تجرته تقوّل من ٤ الى ٦ امتار بمدة ٢٠ سنة . جنبها منسوب القوام ، مائل للسواء ، ينتهي بقسمة من الاوراق المستديرة المرسومة والمستطيلة الجريدة المشوكة .

٢٣٤٩٣ - كركفة ذوية * ، شلج
Corypha umbraculifera (S). Coryphe parasol, Tailpot de Ceylan (F). Great fan-palm, Tailpot palm (E). Tailpotbaum, Gros Schirmpalme (D). Palma corifa, Corifa del Malabar (I).

نوع من الكرف . جنبها اسطواني الشكل منسوب كالشمة يعلو نحو ١٠ امتار . قشرته ماسلة . الياف الخشبية شديدة الصلابة . اوراقها حامية كبيرة القد مستطيلة السف جيلة الخشار الاليس .

٢٣٤٩٤ - كركفيات *
Coryphinées (F).
سبط اشجار برية وزينة من فصيلة النخلات . اجناسه وانواعه المعروفة لا تتجاوز الشرة . منها الاقاليم الاستوائية . يكثر وجودها في بعض مناطق الهند وجاوا وجزر الزابج وسيلان || سفها منسوبة ريفية . اغشاش صلبة تستعمل في البناء . اوراقها حامية الاوتكار صناعية الاستعمال || اشهر اجناسها الكركفة .

٢٣٤٩٥ - كركة
وقف عن الي . يقال كركت الدجاجة وهي كركة اذا وقفت عن البيض .

٢٣٤٩٦ - كركة *
Charax (S). Charax (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفسيلة الاسبوريات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحارة || اجناسها مبططة ، شبه بيضية اللون ، تقوّل من ٢٥ الى ٣٥ سم . رؤوسها



كركند الهند

عينه جؤونيا اللون . متفاده اسمر القاعدة والجسم ، اسود البهرة . ساقه الى السرة السوداء || قوته كل ما استطاع اقتراسه من اسمائه . وصوبات وطيور وحشرات || يتبارد الزنج وبغيرها من طير الماء فينازعها ما تصطاد من سمك || يذئ عشه في اقموس يطنه بالخشيش والطحلب . الاثني تقص يمشان في اوائل شهر محوز . الحفن يستمر نحو اربعة اسابيع تقوم به الاثني متباردة الذكر . الفرغ يستقل بطيرانه ابتداء من اوائل ايلول .

٢٣٥١٣ - كركند * Carcharodus (S).

جنس حشرات من فصيلة المسيريات . انواعه الفسارة قليلة تركيب الخيازيات || فراشاته صغيرة القد طولها براوح من ٢٨ الى ٣٢ م . اجسامها غروبية الشكل ، كستنية اللون . وراشها بيضاء يعلوها تجلجيع وتبينع وزرا كش غظلفة الالوان || تظهر من حزيران الى ايلول . تمتج مكها على الاوراق فينقف رقات صغيرة القد مستطقة الجسم . رؤوسها سود ، انوارها الى الزرقة يعلوها تحطيط وتجلجيع اسمر .

٢٣٥١٤ - كركسة مدببة * Charaxes jasius (S).

Charaxes jasius (S). Charaxe jasni, Pacha à deux queues (F). Charaxes jasius (E). حشرة من فصيلة البشوريات عرشيات الاجنحة . موطنها معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها واسعة قوتها مثل الزهار . سرفها تمش على اوراق الخنثليات || جسمها كبير القد يطلي نحو ٢٢ م . بسطها نحو ٧٥ م . رأسها جؤوي اللون ، عينها كبيرتان . زبابان صولجياتان . سرفها دقيق الجرم . جوشها وبطنها الى الحرة الزبداء المولج || روشنا الاناميان الى السمرة الحطية تملوها بقع وتراويق فيها الازرق والاسود والبرتقالي والاصفر الصنابي والاحمر . روشنا الحفلاني الى السواد الازرق المتالي تملو بقع وتراويق كا في الزوج الامامي وقلات جدات الاولى بيضاء ، الثانية متراكبة الالوان ، الثالثة صفراء || ها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجبل الاولى في نيسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في آب . تسرح في النهار . تعامل بعد ظهورها بسنة اسابيع وتمتج الممكن لطعا على نصال اوراق النبات المائل || السرة تطلي نحو ٩٥ م . جسمها اسطواني الشكل ، مالمس القشار . فوها الى الخصار الاملح يعلوها من السمكتين الخاصة والسابعة بقتان مستطيرتان مركزهما اسود يحوقه الاصفر وطولها اطار اسفر . رأسها سداسي الزوائد القرنية الجؤوية اللون . سمكتها الشرجية مفلوقة الطرف الاخاذ || طور الاكمال الذي يستمر في الجبل الاولى نحو ثلاثة اسابيع يستمر في الجبل الثاني نحو ٢٢ اسبوعا .

٢٣٥١٥ - كركم * Curcuma

جنس نباتات جذبورية صفولية عشبية معمرة من فصيلة الزنجبليات . مهدا المناطق الاسيوية الحارة . انواعها قليلة اعرفها الكركم الاسود والكركم الزردار والكركم الصياغي || اوراقها منتصبه مستطيلة الزناد سنانة النصل للشارف . اعزها صفراء اللون مبلية التجميع تركع على شراخ قصير || يستخرج من حنقلها مادة تشوية ما كولة تدهى اذريت الهند ويستخرج من اعزها وسدائرها مادة صباغة صفراء اللون ومادة طيبة تدهى كركمين (Curcumine) .

طوله نحو ٢٨٠ سم . وارتفاعه ١٧٠ سم . اشاء جاء لا قرن لها . يقم في الغابات الكثيفة قرب جداول الماء على ارتفاع ٢٠٠ م . من سطح البحر . موطنه الهند وبرمانيا وبنجاو .

٢٣٥١٦ - كركند * Rhinoceros sumatrensis (S).

Rhinoceros sumatrensis (S). Rhinoceros Sumatra (F). اصغر انواع الكركند جرما وانفها غلاظة . جسسه تطول نحو ٢٤٠ سم . وتصلو ١٣٠ سم . ذنبه ٦٠ سم . اما وزنه فلا يقل عن ١٠٠٠ كيلو . قرنه غليظ القاعدة البطة . ذرب الطرف يطول نحو ٧٠ سم . || موطنه صومترا وسيام وملقة ...

٢٣٥١٧ - كركند هندي * Rhinoceros unicornis (S).

Rhinoceros unicornis, R. de l'Inde (F). اصغر انواع الكركند الاسيوية وسيدة القرن . وهو كبير الجثة الغليظة طولها نحو ٣٠١ سم . وطول ١٧٥ سم . اما ذنبه فنحو ٦٥ سم . وقرنه ٣٥ سم . وزنه براوح من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ كيلو || موطنه مستنقعات الهند وصفان نهر الكنج .



كركر

٢٣٥١٨ - كركنديات * Rhinocérus (F).

Rhinocérus (F). Rhinocérus (E). فصيلة حيوانات لبونة من الحافريات . اشهر اجناسها الكركند .

٢٣٥١٩ - كركنديات * Palnouridae (F).

Palnouridae (F). Palnouridae (E). فصيلة حيوانات بحرية من القشريات مشاريات الدريل ، طراول الليل . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || اعرف اجناسها واشهرها المقيوس والجراد البحري المعروف ايضا بالكركند او الكركند .

٢٣٥٢٠ - كركر * Fourreau (F).

Fourreau (F). Sheath (E). الكركر وعاء قصب للثور واليوس .

٢٣٥٢١ - كركر * Stercorarius (S).

Stercorarius (S). Stercoraire, Mouette pillarde (F). Jaeger, Skua (E). جنس طير بحرية من كليات القدم . انواعه ثلاثة تجوب البحار من النيك الى الجنوب . اجسامها خفاء القد ، حيلة الشكل ، بلقاء الثوب ، مستطيلة الاذنان . بسطة جونغها تراوح من ٨٠ الى ١٢٠ سم . متاقيرها طويلة منتفخة المتأله || تطارد زيج الماء والحفرنة فتنازعها ما يصيدان من سمك وقد ترجمها حل لفظه نلتنته .

٢٣٥٢٢ - كركر غاصب * Stercorarius catarractes (S).

Stercorarius catarractes (S). Stercoraire ravisseur, Labbe cataracte (F). Cataracte Skua (E). نوع من الكركر . طائر بحري من كليات القدم وفصيلة النورسات . اعطاه البحار القليلة . ملجته الحياتي فردي . لا تقرب الذكر من الاناث الا في زين الكوم والحفن || جسسه ابيض الشكل ، مستطيل الذنب والجانح . طوله نحو ٥٧ سم . وبسطة نحو ١٠٠ سم . فويه الى السرة المايقة المخلصة بالشعمة السعداء . بطنه الى السرة الرمادية .



كركسة مدببة



كركم



كركي



كركتة الزيتون



كركي رمادي



كركي مشعوبه

٢٣٥٢٥ - كُرْكُمِي ، وَهَو

Grus (S).

Grue (F). Crane (E).

جنس طيور كبار من فصيلة الكركييات ورتبة طيور الساق. كتيه أبو حريان وأبو حن وأبو البزار وأبو نعيم وأبو المصم ج. كراكي. ١٢ أنواعه. جميعها من القواطع. طويلة الدق والساق. قوية المنظر الغريبي المستطيل. أنوفها تختلف باختلاف أنواعها يكثر فيها الأبيض والرمادي. رؤوسها ملس أو ثنائية القنطرة || تألف المنطق وشطوط الأنهار. قوتها الأعشاب والحبوب والبر والديدان والخشرات والصفاد والرحايات من حنط. وناهي || تنف من الفصوص رتيه في الادخال السرحه او بين الأعشاب الرقيقة. الاث تقص من ٢ الى ٥ فيضات تحضها بتلوته الذكر || احرف أنواعه وأشهرها ما يلي.

٢٣٥٢٦ - كُرْكُمِي قَصَادِي *

Grus cinerea (S). Grue cendrée, G. commune (F). Common grey crane (E).

نوع من الكركي، كبير الجثة، طولها يراوح من ١٢٠ الى ١٤٠ سم. ثوبه أريد اللون. رأسه ويقدم عنقه الى السواد الأزرق المولج. مسراه وجانبها عنقه الى البياض الناصع. أباهر وأنيكه وساقه الى السمره القصية اللامه. منقاره اسود اللون اخضر المولج. ميناء جلوبتان مستديرتان. يآلف المناطق وأحواض الأنهر ويترجها. يحوب الماء في طلب الرزق ويعيش مع البرد الى مشناه الذي يمنه من السودان الى الهند.

٢٣٥٢٧ - كُرْكُمِي مَشْعُوبِي *

Grus viridirostris (S). Grue de Mandchourie (F). Demoiselle crane (E).

نوع من الكركي أكبرها جثة وإجلها ثوباً. طولها يراوح من ١٤٠ الى ١٥٠ سم. ثوبه الى البياض المصفر جيته الى الحسرة. ميناء كاليقوت. قاعدة منقاره ويقدم عنقه الى السواد الأزرق المولج. منقاره الى الخضرة الزيتية. أباهر وأنيكه الى السواد الباقين يطول مولج اخضر. ساقاه الى الخضار الاصفر || مشناه بعض الأقاليم الصينية. يكثر في مشعوبه. يآلف للشطوط النهرية والبحيرية.

٢٣٥٢٨ - كُرْكُمِيَات

Gruidae (S).

Gruidés (F). Gruidae (E).

فصيلة طير من رتبة طيور الساق. اجناسها وأنواعها قليلة العدد أشهرها الكركي والثرنوق.

٢٣٥٢٩ - كُرْكُمِيَش

Camomille odorante (F).

هو البابونج العطري، اطليه.

٢٣٥٣٠ - كُرْكُمِيَمَس

Crocus (F).

هو الزعفران، اطليه.

٢٣٥٣١ - كُرْكُلُومَة

Stapélia (F).

هي النلف، نبات من المتكليات، اطليه.

٢٣٥٣٢ - كَرَلِين *

Carlina (S). Carlina (F).

جنس نباتات عشبية برية طيبة معمرة من الحشريات وفصيلة المركبات. أنواعه عديدة تكثر في الاربة القاحلة وفي الأراضي المنحاة وبين الصخور. سيقانها قصيرة جفحة، ألوانها كبيرة، مسطحة، ملساء، شائكة. أزهارها روكسية ملونة، قطرها يراوح من ١٠ الى ١٤ سم. احرف أنواعه وأشهرها ما يلي.

٢٣٥١٦ - كُرْكُمِي أسود ، جَدُوَار أسود

Curcuma caesia (S). Curcuma vert, Zédoaire noir (F). Black zedoary (E). Schwarze Zedoarwurz (D). Zedoaria nera (I).

نوع من الكركم وهو نبات طبي صقولي معمر كثر زراعته في الهند وسائر بلاد الشرق الاقصى. مساقله تشويه غلافية مأكولة ويستخرج منها ومن الاثمار بعض المواد الطبية والعصبية.

٢٣٥١٧ - كُرْكُمِي زَدُوَار ، زَدُوَار ، جَدُوَار

عَقِيد ، سَطْوَال

Curcuma zedoaria (S). Curcuma zédoaire, Zédoaire (F). Zedoary, Setwall (E). Zedoarwurz, Zittwar-kurkuma (D). Zedoaria (I).

نوع من الكركم كثر زراعته في الشرق الاقصى ويستخرج من مساقله مادة تشويه غلافية تدعى أرويت الهند. أزهاره صباغية نعيمها منه ويغو.

٢٣٥١٨ - كُرْكُمِي صِيَاغِي ، هَرْد ، عَقِيد

هندي ، صاميران ، أصابع صفر

Curcuma longa, C. tinctoria (S). Curcuma long, Safran des Indes (F). Long rooted curcuma, Turmeric (E). Gilbar lngwer, Gilbwurzel (D). Curcuma longa, C. di Levante, Croco indiano (I).

نوع من الكركم وهو نبات طبي صقولي معمر. ينه المضم ويدور البويل ويكثر افراز المالب ويفتح الشبه. يزهر ويحفر في الهند ويباع تحت اسم « كاري ».

٢٣٥١٩ - كُرْكُمَان

Mallot-bieu (F).

هو الخنفوق الأزرق، اطليه.

٢٣٥٢٠ - كُرْكُمِيَس *

جنس حشرات من فصيلة اليمسويات أنواعه قليلة العدد جميعها مفترسة تقضي على الحوام. ذكروها حر، أنثاها الى الصفار الخطي. اجسامها تطول من ٣٥ الى ٤٠ سم. وبسطة اجنتها تراوح من ٢ الى ٦٠ سم.

٢٣٥٢١ - كُرْكُنْد

هو الكركند وهو أيضاً الجراد البصري، اطليها.

٢٣٥٢٢ - كُرْكُنْد الزَيْتُون *

Oryctes nasicornis (S). Rhinocéros de l'olivier (F). خنفساء كبيرة القد من الجمليات. طولها نحو ٤٠ سم. ثوبها الى الكستنائي يطولو مولج اسمر لامع. رأس الذكر مسلح بقرن منحنك الى الوراء. الاثى جاء لا قرن لها || يآلف الزيتون. يسرح من الغروب الى الشروق ويبعث في النهار. يعيش على الاثمار اليابسة وبين نشارة الخشب. يرثه كبيرة القد، غليظة الشكل، حلزونية الجسم مقوية، خبزها اللون، ممرار الرأس، تركب جلود الزيتون فتقضيها.

٢٣٥٢٣ - كُرْكُمِيَان

Amethystea (S).

Améthyste (F). Amethyst (E). Amethystpflanze (D).

Ametista (I).

نبات عشبي حولي زراعي زيتوني من فصيلة الشفويات. يزهر لونه الأزرق الجليل المستحب العرف. نبتة متيرة القد، نحلة الساق، قصيرة القروص المستنقة || يتكاثر بالبذر. ازهاره صيني.

٢٣٥٢٤ - كُرْكُلُومَة

Meinete (F).

طائر من الزرايزر يدهى مينات، اطليه.

٢٣٥٣٣ - كَرَلِين أَفْتِي الْوَرَقِ °

Carlina scanthifolia (S). *Carline à feuilles d'acanthé*, *Chardouse* (F).

نوع من الكرلين المبلول في الجبال. ساقه جذعة تملو من هـ ١٠ سم. أوراقه كبيرة القند أفتية الشكل. نصلها خيل البشرة على صفحتي السفلى. رؤوساتها قصيرة الزناد. قطرها يراوح من ١٢ إلى ١٤ سم. ثنائياتها صفراء اللون. أزهارها يستمر من تموز إلى أيلول.



كرلين ساق

٢٣٥٣٤ - كَرَلِين شَالَع °، زَيْد الْعَيْد

Carlina vulgaris (S). *Carline vulgaire* (F). *Carline thistlo* (E). *Kleine Eberwurz* (D). *Carlina vulgaris* (I).

نوع من الكرلين المبلول، يكثر في المراعي الجبلية وفي الأراضي المنبسطة. ساقه تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. أوراقه كبيرة القند، شديدة التفريط، خلية السطح السفلى رطاحا المائبة قبل الإزهار والهج. رؤوساته الزهرية ملونة، قطرها يراوح من ١٠ إلى ١٢ سم. ثنائياتها حطية اللون. يقال أنه من النباتات الطبية التي تلقي إضافة الحرف والارضي شوكي.



كرمينس المرابي

٢٣٥٣٥ - كَرَلِين عَدِيم السَّاقِ °، كَرَلِين تَجَسِي °

Carlina acaulis (S). *Carline aculea*, *Baromètre*, *Loque* (F). *Carline* (E). *Eberwurz* (D). *Carlina*, *Carlo pinto* (I).

نوع من الكرلين المبلول. ساقه جذعة تملو من هـ ١٢ سم. أوراقه كبيرة مستطيلة مفروعة، نصلها أخضر اللون، مائل البشرة على صفحتي. رؤوساتها كبيرة القند ملونة، قطرها يراوح من ١٠ إلى ١٣ سم. ثنائياتها قسبة. أزهارها يستمر من تموز إلى تشرين وهو ينكشف عند وجع الشم ويبلغ مع أشعة الشمس.

٢٣٥٣٦ - كَرَم °

Vignoble (F). *Vineyard* (E). *وين اسمائه الكرويس*. كل أرض مفروسة كرم.

٢٣٥٣٧ - كَرَم °

Cépage (F). *Vine-plant* (E). *للضرب المعروف المورسوف من الكرمية*.

٢٣٥٣٨ - كَرَم زَيْتُون، بَسْتَان زَيْتُون، زَوَايِين

Olivea, *Oliveraie*, *Oliveraie* (F). *Olive-plantation* (E). *كل أرض غرس فيها الزيتون*.



كرمينس النجيليات

٢٣٥٣٩ - كَرَمِيَّوسُ الْمَرَابِي °

Crambus pratensis (S). *Crambe des prairies*, *Taigne des prairies* (F). *Crambus pratensis* (E).

حشرة من فصيلة التاربات حرشيات الاجنحة. موطنها معظم اقاليم البلاد المختلفة الحراية من الشرق الاوسط واروبية. فراشها واضحة قوتها رقيق الانهار وظلمها. رشتها خاضعة تميش على اوراق النباتات المرصية. جسمها صغير قسبي يطول نحو ٨ م. بسطها نحو ٢٤ م. رأسها صغير الجسم. عيناها زهيتين صيرتتان. زباناها خيطيان. ملابسها دقيقة. رشتها متدل الطول. جوشها وبطنها الى الرمة. وروشتها الاماميان الى السرة الكستية يطولها زركضة متزمنة صفراء وبعدة مستطيلة يضاء. وروشتها الخلفيان الى السرة الكستية السوية. اهدابها الى التبي. الاثني اميز قدأ من الذكر واغلظ بطناً منه واطول رشتاً. لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في ايار. تسرح في النهار ويقيم في الليل. الاثني تلقى المنكن مبيداها على الصفحات السفلى من نصال الاوراق. الطور



كرمة العنب

الاسريوي يستمر نحو عشرة اشهر والسرة عند بلوطها الادراك تطول نحو ١١ م. جسمها اسطواني الشكل، واضح التقسيم السكي، اريد اللون يطلو تنقيط اخضر الس يتد من الكويل الى الشرج. رأسها اسود. مذهبها ورواجها الى السرة. طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع يتقضي ضمن صلجة تنسجها السرة في الجلالة او تحت قشور الانجار الحرجية القريبة من المراعي.

٢٣٥٤٠ - كَرَمِيَّوسُ النَجِيلِيَّاتِ °

Crambus parietalis (S). *Crambe perle*, *Taigne des graminées* (F). *Crambus parietalis* (E).

حشرة من فصيلة التاربات حرشيات الاجنحة. موطنها منظر الاقاليم المختلفة الحراية من الشرق الاوسط واروبية. فراشها واضحة قوتها رقيق الانهار وظلمها. رشتها خاضعة تميش على النجيليات البرية والزراعية. جسمها صغير يطول نحو ٩ م. بسطها تراوح من ٢٨ الى ٣٠ م. رأسها معتدل الجسم. عيناها زهيتان، بارزتان. زباناها خيطيان. ملابسها دقيقة. رشتها معتدل الطول. جوشها وبطنها الى الرمة القسبة المواج. وروشتها الاماميان الى الرمة القسبة يطولها تحشخ خفيف متداخل الاخضر والاخرق. وروشتها الخلفيان الى الرمة الصفراء المواج. اهدابها عاجية. الاثني اميز قدأ من الذكر واغلظ بطناً منه واطول رشتاً. لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في مطلع حزيران ويقيم حتى اواخر تموز. تسرح في النهار. الاثني تلقى المنكن مبيداها تغلفه مادة فورية تثبته على صفحتي النجيليات. الطور الاسريوي يستمر نحو عشرة اشهر. والسرة عند بلوطها الكال الجسوريي يتد تطول نحو ١٢ م. جسمها اسطواني الشكل، واضح التقسيم السكي، اريد اللون يطلو تنقيط جزوي يتد من الكويل الى الشرج. رأسها اسود اللون. مذهبها ورواجها الى الطحلة. طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع يتقضي ضمن صلجة تنسجها السرة بين فروع النجيليات او تحت اوراقها.

٢٣٥٤١ - كَرْمَة °

Vitis (S). *Vigne* (F). *Vine* (E). *جنس نباتات معمرة عارضة من فصيلة الكرديات*. انواعها عديدة، معظمها بري وزيتني وبعضها زراعي. اشهر انواعها واعها زراعة واكثرها شروبو واجزلا لغماً الكرمية النينية.

٢٣٥٤٢ - كَرْمَة الْعَيْب °، كَرْمَة عَيْبِيَّة °

Vitis vinifera (S). *Vigne commune*, *Vigne noble* (F). *Cultivated vine*, *Grape vine* (E). *Weinrebe* (D). *Vite* (I).

نوع من الكرمية شروها المعروفة زهاء ٢٥٠٠ مجيها زراعية شجرة. سوقها عارضة ليفية مخشوشة. جنورها حزنية منبسطة لا تضرب القور العميق. فروعها سروح عابلة تنمو على القند. نصلها كفي الشكل يكثر فيه التفصيص الخشبي وهو سنن الحافة، انقب البشرة على صفحتي او على السطح السفلي. حولها فارة حزنوية تنمو قبالة الاوراق. ازهارها متفويدي. ثنائياتها تكون على عقد سلاحيات الزجون الحولي ازاء الاوراق. ازهارها صغيرة القند خضراء اللون وهي مركبة من كأس خماسي الفصل وتوج خماسي البلات المندمجة التي تبدو كالمفرد من الاندية والمقددة. والاسدية خبي والمقددة ذات مفروق يحسن كل منها يوفهتان تصيحان بعد التأير والاصخاب

- ٢٣٥٤٨ - كُرْمِيس الزَيْتُون (F). *Kermès de l'olivier*
هي قزمية الزيتون المخططة ، أطلبا .
- ٢٣٥٤٩ - كُرْمِيس السِنْدِيَّان (F). *Kermès du chêne*
هي قزمية السنديان ، أطلبا .

- ٢٣٥٥٠ - كُرْمِيس الزُورْد (F). *Kermès du rosier*
هي قزمية الزورد ، أطلبا .

- ٢٣٥٥١ - كُرْمِيسِيَّات (F). *Coccidés*
فصيلة حشرات مشهورة باسم مقفرات ، أطلبا .

- ٢٣٥٥٢ - كُرْمِيَّي (F). *Vinicole, Viticole*
Wine-growing (E).
كل ما هو مختص بالكروية من زراعة وصناعة .

- ٢٣٥٥٣ - كُرْمِيَّات (S). *Ampelidaceae*
Ampélidacées (F). *Ampelidaceae* (F).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القممات سفلية الاسدية . اجناسها وانواعها عديدة أشهرها الكروية .

- ٢٣٥٥٤ - كُرْمَات (F). *Ampelidaceae*
اسم الكرم التي تبقى في جذع النخلة بعد قطع السعف .
الواحدة كزناقة . ج . كرايف .

- ٢٣٥٥٥ - كُرْمَب (S). *Brassica caulorapa*
Chou-rave, Colrave (F). *Hungarian turnip, Kohl-rabi*
(E). *Knollenkohl, Kaollikohl* (D). *Cavolo rapa* (I).
نوع من الملفوف الزراعي المأكول . ساقه خليطة مستديرة تنمو على سطح التربة || يجود في جميع الاربع الزراعية .
يلو في الاكواد ثم ينتقل الى مستقره حيث ينمو على ابدان تراوح من ٤٠ سم . الى ٥٠ سم . في السطر الواحد بين ٢٠ الى ٣٥ سم . بين السطر والسطر . وهو ينمو ويكس .
قيته الفلالية لا بأس بها لذلك يكثر استعماله كطعام البهائم اعصها البقر .

- ٢٣٥٥٦ - كُرْمَب الْجَمَل (F). *Morandie*
هو الخم ، أطلبا .

- ٢٣٥٥٧ - كُرْمَب الْمَاء (F). *Nénuphar bleu*
هو التيلور الازرق ، أطلبا .

- ٢٣٥٥٨ - كُرْمَب بَحْرِي (S). *Crambe maritima*
Crambe maritime, Crambè, Chou marin (F). *Sea cabbage, Sea kale* (E). *Echter Meerkohl, Seekohl* (D). *Crambe maritima, Cavolo marino* (I).
بقلة معمرة من فصيلة الصليبيات تثبت بريّة على الشواطئ البحرية وزرع في بعض البلاد اعصها اكثرًا حيث يأكلونها بكثرة . طعمها كالفتيق .

- ٢٣٥٥٩ - كُرْمَب عَمَلِي (F). *Rutabaga*
Swedish turnip, Swede (E).
نبات علفي يدهى وباعة ، أطلبا .

- ٢٣٥٦٠ - كُرْمِيَّات (F). *Pieridae* (S). *Pieridés* (F). *Pieridae, White butterflies, Sulfur butterflies* (E). *Weisslinge* (D).
فصيلة حشرات من حشرقيات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة منظها متوسط الحجم بعضها كبير وسمن . انواعها

يزود الثمرة . والثمرة عننية مختلفة الاشكال والاحجام والالوان مركبة من قشرة خارجية ولياب وزرور . لهايا يولفت من ٨٥ الى ٩٠ ٪ من الثمرة وما تبقى فيمعدن في القشرة والزرور . وهو يكون عند الادراك قليل الحموضة . كثير المادة السكرية ، لذلك الطعم ، مستحب النكهة والعرف ، متوسط تركيبة :

ماء ٧٥.٥٠ الى ٨٠.٥٠ ٪
سكر قابل الاستيعاب ١٨.٥٠ الى ٢٥.٥٠ ٪
سولفورماتية ثرثرينوفاتية ٠.٣ الى ٠.٤٥ ٪
بشر ترات البشور ٠.٥ الى ٠.٧ ٪
مواد ازوتية وبنيدية صلبة ٠.٢ الى ٠.٣ ٪
والكروية ترويب في الاقاليم المعتدلة التي توفّر لها الحرارة الكافية لادراك الثمار . هذا لا يعني انها لا تنضج في الاقاليم الباردة فهي تنضج وتتحلل القدر الشديد شرط ان تكون لها حرارة الصيف ما هي بحاجة اليه من السمات اللازمة لادراك الثمار . وهي تفضل السفوح والمضارب والمواقع المنخفضة على المنحدرات المنخفضة او المنخفضة . وهي تجود في جميع الاربع يستثنى منها الربيلة الصفراء والكلسية البحت والطينية المنسجة || اما نكاثرها فقد يتم على اربعة اشكال : بالزور والتعقيل والتزويد والتلصيص || فالزور يحصل عادة لمحصول على اسرام اوراقه جديدة . اما التعقيل فهو اشيع للفرق واسهلها واسلمها ، قوامه اسطفا المقلد من زرعين بلغ الحبل شرط ان لا تقل صفحا عن الاثنين . اما التزويد فيتركز على لي وطر بعض سرور الجفنة الى ان تشرش وتفصل . يبقى التعقيل وهو اشهر من ان يعرف وقد كثر استعماله في الاطيان الأمريكية التي لا تحشى الفيلوكسره .

- ٢٣٥٤٣ - كُرْمَة بَيْضَاء (F). *Bryonia alba*
هي الفاندا البيضاء ، أطلبا .

- ٢٣٥٤٤ - كُرْمَة كَان ، مَشَان (S). *Narthecium, Abnema*
نبات عشبي بري طلي معمر من فصيلة الزنبقيات . انواعه المعروفة اربعة . جذعها مدادة . اوراقها صفلية الشكل مستعرضة النصل الجانبد المتمد . شامخها الزهرية متصبغة مستطيلة طلعها اوراق صغيرة ذرية متعاقبة متباعدة . ازهارها عتقوي التجميع . ازهارها صغيرة القد سداسية البتلات . يستخرج من جميع اعضائها مادة جسمية فعالة شديدة النشاط .

- ٢٣٥٤٥ - كُرْمَة كَان مَتَقَبِي (S). *Narthecium ossifragum*
Narthécie des marais, Anthracé des marais (F). *Bastard asphodel, Bog asphodel* (E). *Echter Beinbrech, Beinbrechgras* (D). *Asphodille bastardo* (I).
نوع من الكردان وهو نبات عشبي طلي معمر يزود للزهرين . يتكاثر بالقلد والزرور . اوراقه صفلية متوسطة الاستطالة . نصلها جانبد المصنعة غائر التثديد . ازهارها صغيرة القد لونها الى الصفرة يعلوها مزاج اخضر . يستخرج من جميع اعضائه مادة جسمية فعالة يقال انها منشطة ومعيدة .

- ٢٣٥٤٦ - كُرْمِيس (F). *Kermès*
هي القزمية ، أطلبا .
- ٢٣٥٤٧ - كُرْمِيس التَفَاح (F). *Kermès virgule*
هي قزمية التفاح ، أطلبا .



كُرْمَب



كُرْمَب بحري

Cranchidae (S). **كِرْنِيَّاتٌ** ٢٣٥٦٦
Cranchiidae (F). Cranchiidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل مزدوجات الخيشوم. اجناسها وانواعها المماصرة المعروفة قليلة البدن اعطائها بحار البلاد الحارة || اجسامها صغيرة شبه اسطوانية الشكل. تتميز برابها العسل الذي يجمع بين الرأس والجسم. زعانفها شرجية الاركاناز، خاصة الاصلع. ميضا كبيرة جاحطة || اشهر اجناسها الكرنشة.

Carnallite (F). **كِرْنَلَيْتٌ** ٢٣٥٦٧
Carnallite (E). ملح معني يستخرج من الارض يستخلص منه البوتاس والمغنيزيوم.

Carnauba (F). **كِرْنُوبَةٌ** ٢٣٥٦٨
Carnauba palm (E).

كرنوبه هو الاتم البرازيلي. شجرة من التعلقات تدعى لبغوص تكثر زراعتها الصناعية في البرازيل. راجع نقوس.

Calebas (F). **كِرْبِي** ٢٣٥٦٩
هو القرع الطويل، اطليه.

Chernetidae (S). **كِرْنِيَّاتٌ** ٢٣٥٧٠
Chernétiidae (F). Chernetidae (E).

فصيلة دويبات من القربيات الكاذبة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة البدن، معظمها من دويبات المنطق الباردة || تتميز بصغر الجسم المغطى المغطى الطرف وشيائها المستطيلة المسلسلة بملاقط طرفية قريبة الشبه بملاقط العقارب || تعيش في الموائل المظلمة وتحت قشور الانجار وفي البيوت القديمة اعصها الحشيشة الصفوت || جميعها من الدويبات الثالثة تقضي على الحشرات الصغيرة المؤذية.

Numenius (S). **كِرْوَانٌ** ٢٣٥٧١
Courlis (F). Courlew (E).

جنس طير من الكروانيات القواطع. الاثنى كروانة والجمع كراوين وكروان. انواعه ١٠ تتميز باستطالة دفة مناقيرها وسيفانها. اجنحتها ذلقة. اذنانها مستديرة. اوراسها جعيفة الجهة الامامية، سرديفة الخلفية || تألف الماء وتعيش قرب الشاطئ والبيئات والانهار. قوتها الرخويات والديدان والحشرات والاسماك الصغيرة لتلتقطها عنده جزر البحر || اناثها تلتن في افانيس تنشد قمرها بالخيش وهي تنم من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها وسدما ٣ اسابيع. اعرف انواعها واشهرها ما يتبع.

٢٣٥٧٢ - **كِرْوَانُ أُرْمُدٌ** * **كِرْوَانُ الْغَيْطِ**
Numenius arquata (S). Courlis cendré, Grand courlis (F). Common curlew (E).

نوع من الكروان، كبير الجثة طوله نحو ٦٥ سم. وبسطه ١٣٠ سم. قويه الى الرينة الرمادية المرفقة. يطعم الى البيض. ميضا صليتان، منقاره اسمر. ساقاه الى الرصاصي. يألف مختلف مناطق حوض البحر المتوسط يحجبها مرتان في السنة.

٢٣٥٧٣ - **كِرْوَانُ اِفْرِيقِي** *
Numenius tenuirostris (S). Courlis à bec grêle (F).

نوع من الكروان، صغير الجثة طوله نحو ٤٠ سم. وبسطه

سوية الاولان يطولها تجنعب وتقيج || ريقاتها شبه ملساء. دبابل خادراتها يجمع اوراسها ويعنها من التنبلي.

٢٣٥٦١ - **كِرْنِيَّةُ الزُّعْرُور** * **قِرَاشَةُ الزُّعْرُور**
Aporia crataegi (S). Aporie de l'aubépine, le Gezzé (F). Black-veined white (E). Baumweibling (D). حشرة من الكرنليات وسيدة الجبل الحولي. بسطها تراوح من ٦٠ الى ٧٠ م. رواشها الى البياض العاجي، عروقها سود. ريقها براء اللون، غيره اللهب، تعيش على اوراق الزعرور وسائر الانجار المشمرة. بيضا الشتوي تقضيها داخل الاوراق التي تفتلها وتجمعها الى بعضها بخيوط من الحرير حطلة اللون.

٢٣٥٦٢ - **كِرْنِيَّةُ الْكُرْبِ** *
Pieris rapae (S). Piéride de la rave (F). Small garden-white (E). Kleiner Kohlweibling (D).

حشرة من الكرنليات، بسطها تراوح من ٤٠ الى ٥٠ م. م. ذكورها بيض الراش، سمر الزوايا الامامية والبقع الثلاثية. اناثها حادة الزوايا السمر، ثنائية البقع الصغيرة. لها في الحول من جيلين الى ثلاثة. ريقها تعيش منفردة على مختلف اوراق الصليبيات البرية والزراعية اعصها الكرب.

٢٣٥٦٣ - **كِرْنِيَّةُ الْفَت** * **قِرَاشَةُ الْفَت**
Pieris napi (S). Piéride du navet (F). Green-veined white (E). Rapsweibling (D).

حشرة من الكرنليات، بسطها تراوح من ٣٥ الى ٤٠ م. رواشها الى البياض الاثير يطول موج اخضر. ذكورها سمر الزوايا الامامية. اناثها وذكورها ثنائية البقع السود المستطيلة الاشكال || ريقها خضراء اللون تركب الفت وسائر الصليبيات. اذاها يتسمر من حزيران الى ايلول.

٢٣٥٦٤ - **كِرْنِيَّةُ الْمَلْفُوفِ** * **دُوْدَةُ الْكُرْبِ**، **قِرَاشَةُ الْمَلْفُوفِ**

Pieris brassicae (S). Piéride du chou (F). Large garden-white (E). Grober Kohlweibling (D).

حشرة من الكرنليات بسطها، تراوح من ٦٠ الى ٧٠ م. رواشها الى البياض الاثير، زواياها الامامية سودا اطراف. اناثها ثلاثية البقع السود || لها جيلان في الحول تمتع مكها على الصغمة السفلى من التنصل. مكها غزوي في الشكل، اصفر اللون، رزني التجميع، رزنته تدم من ٣٠ الى ٥٠ مكته || ريقها نمة مؤذية تلهم اوراق الملفوف وسائر الصليبيات البرية والزراعية ولا تركها منها سوى الصلوق والبروق. ثوبها الى الخضار الاكعب يطول تعيش اسود وثلاثة خطوط مستطيلة قاطية غيره اللون.

٢٣٥٦٥ - **كِرْنَشَةٌ** *
Cranchia (S). Cranchie (F). Cranchis (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل وفصيلة الكرنشيات. انواعها المماصرة المعروفة ثلاثة اعطائها بحار البلاد الحارة. ملجئها الحياتي جماعي. اسراجها وافرة البدن. جميعها يجمع لا تقرب الشطوط. سمرها دجوي || اجسامها اسطوانية الشكل، صغيرة القد. زعانفها صغيرة، خالية الاصلع، شرجية الاركاناز. ملاسها مستطمة معجمة الاطراف.



كِرْنِيَّةُ الزُّعْرُور



كِرْنِيَّةُ الْكُرْبِ



كِرْنِيَّةُ الْفَت



كِرْنِيَّةُ الْمَلْفُوفِ



كِرْوَانُ أُرْمُد



كِرْوَانُ اِفْرِيقِي

٢٣٥٨٢ - كروان مدسي - *Gobie sangant* (F).

هو القويون المدسي، سمكة بحرية، اطلبه.

٢٣٥٨٤ - كروان امونياك، كروان الامونياك، حريف

الشكادر

Crud ammoniac, Crude ammoniac (F).

سماد كبري ازوتي يستعمل كحاشور وعلفون. وهو من موائد صناعة غاز الانارة بحرق من ١٠ الى ١٥ ٪ من الازوت البليء الانفعال والنتيجة الذي يستعمل لتحويله الى التربة من ٤ الى ٥ شهور ٥ اما غواصه اللعانية ان على الحشرات والديدان او على الاعشاب فبرية المفعول على النتائج. وهو يستعمل في هذا السيلج بمعدل يراوح من ١٠٠ الى ٣٠٠ كيلو لدم الهلياء.

٢٣٥٨٥ - كروان البصل *

Lilioceris merdiger, Lilioceris brunnea (S).

Crioceris de l'oignon (F). Onion-beetle (E).

حشرة خاضعة مؤذية من النضاريات وربة مضدات الاجنة. تألف البراري والمزارع وحول البصل. غناصها ويرقاتها تعيش على اوراق البصل والكراث والثوم البري وزيتق الوادي ٥ جسمها صغير القليل من ٦ الى ٧ م. ثوبها العلوي الى الحشرة القرمزية الصانعة المروج. ثوبها السفلي الى السرة السوداء. رأسها مستعرض الجرم. عنانها صغيرتان. زباناها خيطان. ظهورها مستدير الطرف الاصح. غدها متباعدة التعزيز القاطب ٥ لها جيلان في الحيل. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل نيسان. تسرح في النهار. تضاف هذه ظهورها باربعة اسابيع وتمتع المكن على فصال الازراق ٥ البرقة عند ادراكها الكمال الجسوري تقطيل نحو ٨ م. ثوبها الى الخطي الاصفر المروج. رأسها ودواجبا سيد.

٢٣٥٨٦ - كروان الزرع *، اوليمبا الزرع

Ulema melanopus (S). *Crioceris des céréales* (F). *Cereal leaf beetle* (E). *Rothsalziges Getreidehähnchen* (D).

غناصه من فصيلة النضاريات طويلا يراوح من ٤ الى ٥ م. رأسها وغدها الى الزرقه اللامعة. كوسلها الى الحرة. تركب مع رقاتها صنف التجليات فتؤذي وتسي الى اللينات.

٢٣٥٨٧ - كروان الزئبق *

Crioceris lili, Lilioceris lili (S). *Crioceris de l'is* (F). *Lily beetle* (E). *Lillenhähnchen* (D).

غناصه من النضاريات طويلا يراوح من ٧ الى ٨ م. رأسها وقواها سيد. كوسلها وسار حمر. كسها ناري اللون وشعي الشكل يمتد الاثنى على اوراق الزئبق فينتفج من رقاتها تقطط الازراق وتقرصها.

٢٣٥٨٨ - كروان الهليون *

Crioceris asparagi (S). *Crioceris de l'asperge* (F). *Asparagus beetle* (E). *Spargelhähnchen* (D).

غناصه من فصيلة النضاريات طويلا يراوح من ٥ الى ٦ م. رأسها اسيد اللون، ازرق المروج. كوسلها الى الحرة يطو توشيع اسفج. غدها الى الزرقه اللامعة يحويها اطار اصهب ويتخللها تبيج نمشي متقابل اونه الى الصغار الاخير الخطي ٥ تركب المليون ويؤذي.



كروان الزيت



كروان البصل



كروان الزرع



كروان الزئبق



كروان الهليون

١٠٠ م. منقار دقيق نحيل. ثوبه الى الربية القنبر، المرقطة. بطنه وانتيكه وسار جناحه الدخالي الى البياض. مشتاة افرقية الاستوائية. مصيفه يمتد من مراکش الى الصعيد وقد شوهد مرارا في سقيلة.

Edicnème (F).

Stone curlew (E).

هو البرهني، طائر من دجاجيات الارض، اطله.

٢٣٥٩٥ - كروان الهنسن

Numenius hudsonicus (S). *Courlis du Hudson* (F). نوع من الكروان متوسط الجثة. طوله نحو ٥٥ سم. وبسطه ١١٠ م. ثوبه الى الربية المرقطة بالبياض والاسود. بطنه تبي اللون وصدره وانتيكه كذلك ٥ يحويب امريكية الشمالية لكنه يكثر الاقامة في مناطق الحسن انحصها انجليج.

Numenius (F).

كروانيات

عمارة من فصيلة دجاجيات الارض. اجناسها وانواعها عديدة تتميز بشكلها الزئبق الاهيف. مناقيرها مسطيلة، حلالية التفويص، ممددة الجرم. سيقانها دقيقة. اواسها ردية، اصحابها رباعية ٥ أشهر اجناسها الكروان.

Croton

كروان

جنس نباتات حرجية من فصيلة البترونيات. انواعه كثيرة العدد منها الاشجار والشجيرات والجنات والاعشاب. معظمها من نبات المناطق الاستوائية ٥ اورتها كاملة متعاقبة، مسقة، رحية، ازهارها حنقودي تاجي. ازهارها رسيحة للسكن. ثمارها جراه كروية او يغبية الشكل، يزورها نفعية منها هدنية طيبة وبها صنعية. ثور بعض انواعها طيبة ٥ اشهرها ما يتبع.

٢٣٥٩٨ - كروان الزيت *، حب السلاطين، خروان صيني

Croton tiglium (S). *Croton cathartique* (F). *Croton-oil plant, Purging croton, Tiglium* (E). *Purgierkroton, Tigilbaum* (D). *Croton, Tigilio drastico* (I).

نوع من الكروان، منته المناطق الاستوائية الاسوية والافريقية. يستخرج من بزوره مادة زقية غواصها خواص زيت الحروع وتستخدم استماله.

٢٣٥٩٩ - كروان عنبيري، قشر عنبيري

Croton eluteria, Cascarilla elutia (S). *Cascarille, Croton elueuthérie* (F). *Cascarilla-bark tree, Seaside balsam* (E). *Kaskarillenstrauch* (D). *Cascarilla, China aromatica* (I).

نوع من الكروان، منته البلاد الامريكية، يستخرج من لحائه مادة حنصرية مرة زكية العرف العنبري المستحب، تستعمل ضد الحيات.

Gobie (F).

كروان

جنس اسماك بحرية مشهورة باسم قويون، اطله.

Gobie noir (F).

كروان اسود

هو القويون الاسود، سمكة بحرية، اطله.

Gobie nébuleux (F).

كروان اغبير

هو القويون المشب، سمكة بحرية، اطله.

Sphérique (F). **كرويّة، كرويّ** ٢٣٦٠١
Spherical (E).
ما كان شكله كالكرة أو ما كان له صلة بالكرة .

Carvi ٢٣٦٠٢ **كروية**
هي الكراويا ، اطلبها .

Micrococceae (S). **كرويات** ٢٣٦٠٣
Micrococccés (F). Micrococceae (E).
فصيلة من البكتريات . اجناسها وانواعها التي هم الزراعة قليلة العدد تتميز باحجامها الذرية الكروية وبانقسامها التكاثري الذي يحصل في اتجاهات مختلفة يمكن حصرها بالاتجاه الفردي والاتجاه الثنائي والاتجاه الثلاثي || اصف انواعها المضرّة ما يتبع .

Micrococcus tritici (S). **كروية البرّ** ٢٣٦٠٤
Microcoque du blé, Maladie du blé rose (F).
مرض بكتيري من الكرويات ، نحازه شديد الوقوع والأثر على برّ الخنطة فيقبحه ويثخنه ويغيّبه ويشبهه بالخضاب الوردي اللون .

Micrococcus imperatoris (S). **كروية إمبراطورية** ٢٣٦٠٥
Microcoque impérial (F).
مرض بكتيري من الكرويات ، نحازه شديد الوقوع على درنات البطاطا المبروسة والمحفوفة في أماكن رطبة عادمة البهوية لانه يهريها ويسبب تلفها .

Micrococcus albidus (S). **كروية بيضاء** ٢٣٦٠٦
Microcoque blanc (F).
مرض بكتيري من الكرويات يمتري البطاطا والقلناس والبصل فيملنها ويهريها .

٢٣٦٠٧ **كروية ذهبية**
Micrococcus flavidus (S). Microcoque doré (F).
مرض بكتيري من الكرويات ، نحازه يمتش على عدة المحذوفة المحفوفة فيلسدا ويسبب تلفها .

٢٣٦٠٨ **كروية فضيئة**
Micrococcus pellucidus (S). Microcoque pellucide (F).
مرض بكتيري من الكرويات ، نحازه يمتش على عدة نباتات بصلية وبقصية وقد يركب البطاطا ويسبب لها الجرب الدرني .

٢٣٦٠٩ **كروية ينكورية**
Micrococcus phytophthorus (S). Microcoque noir, Maladie de la jambe noire (F).
مرض بكتيري من الكرويات ، نحازه شديد الوقوع على سوق البطاطا حيث يمس بعض اقسامها فيسبب اسودادها وتلفها . وقد يصيب الدرن فينبو كيقع سود تحوها

حالات سمر تجفف القشرة وتصلبها يتشقّقها ثم يهري القلب .

Curage (F). Cleansing (E). **كرويّ** ٢٣٦١٠
اغتراج الرجل والحساء والاعشاب من القنوات والحساري المائية

٢٣٦١١ **كرويات**
Corpuscules du sang, Globules (F). Blood corpuscles, Globules (E).
الوحدة كرويّة . والكريات مجمعة من الاجسام السائجة في الدم منها احمر والبيض ثم السلفية والمعادية او الخيولة .

Crossing-over ٢٣٥٨٩ **كروستين اوفر**
هو الحاصل الناتج عن تقابك وإتشاف القشب .

٢٣٥٩٠ **كرولا لزجواني الصدر**
Querula rubricollis (S). Plauhou de Cayenne (F).
طائر من الجروام سنيات المناقير وفضيلة القطنجيات . اصطناه بعض مناطق امريكا الاستوائية || جسمه متوسط القد ، يطول نحو ٢٥ سم . ثوبه الى السواد الاسفع . زوره وصدره ارجوانيا الابن عند الذكر || ملجته الحياتي جماعي الا في زمن الساقط والحفانة . يالف الغابات والحراج . قوته البذور والثمار اليابسة وبعض الحشرات اخصها النمل .

٢٣٥٩١ **كروم**
Chrome (F). Chromium (E).
معدن اكهب اللون شديد الصلابة ثقله النوعي يراوح من ٦ الى ٨ , نحصره ١٥٢٠ سم || ديزه (كرو-Or) وزنه الاتوني ٥٠,١ وهو لا يتأثر بالهواء الجوي ولا يتأكسد الا في درجات الحرارة العالية . يذوب في الحامض الكلوريديني والحامض الكبريتي || يوجد في الطبيعة مركبا مع بعض العناصر بسلب مختلفة . تحريره واستخلاصه من فقله يستوجب صهره في افران خاصة تتحمل الحرارة العالية || اشهر مركباته الطبيعية كرويات الرصاص . اما اشهر مركباته الصناعية فهي كرويات البيزنسيوم وكرويات الصوديوم التي تستعمل في ديق الجليد وصباغها .

٢٣٥٩٢ **كروماتيد**
Chromatide
هو من النشبة نصف شطرها الطولي وذلك عندما تكون في طور الميوزة .

٢٣٥٩٣ **كروماتيكي، صيغتي**
Chromatique (F). Chromatic (E).
نمت تعريفي توصف به الاعضاء الصلبة في الاجسام الحيوانية والنباتية .

٢٣٥٩٤ **كروماتين، كروستين**
Chromatine (F). Chromatin (E).
مركب آسي - حامضي - سفوري تتكون منه مادة القشب وقسم من الجلبة الخليفية .

٢٣٥٩٥ **كروستوبلاست**
Chromoplaste (F). Chromoplastid (E).
مادة الألفة الملونة .

٢٣٥٩٦ **كروموزوم**
Chromosome
هو النشبة ، اطلبها .

٢٣٥٩٧ **كروموليوت**
Chromoleucite
حبيبة المنصب في ذقن الخلايا النباتية .

٢٣٥٩٨ **كروستوسير**
Chromomère (F).
اصفر جزئيات تشغل بالشكل والمركز في شعاع البتين الكروماتيكي .

٢٣٥٩٩ **كرونية**
Coronille (F).
هو الامروس نبات من القرنريات ، اطلبه .

٢٣٦٠٠ **كرونومتر**
Chronomètre (F). Chronometer (E).
آلة تستعمل في قياس الوقت لا يفرقها عن الساعة العادية سوى دقة الاداء والضببط الفائق والتوقيف الحيازي .



كرولا ارجواني الصدر



كروية البر



كروية ينكورية

٢٣٦١٢ - كُرْبَات يَفِيْس

Globules blancs, Leucocytes (F). Leucocytes (E).
 حبيرات حيوانية متحركة وظفيتها الرئيسية لقتل
 الجُذُورِيَّات السَّاعِيَة في الدم || المَلِيْرُ المكب من الدم
 يحوي نحو ٧٠٠٠ كُرْبِيَة .

٢٣٦١٣ - كُرْبَات حَمْرُ

Globules rouges, Hématies, Erythrocytes (F). Erythrocytes (E).
 حبيرات حيوانية من ذوات النواة . وظفيتها الرئيسية حل
 الاكسجين من الرئة الى جميع اجزاء الجسم وهي تمشي
 بقضبة اسايح ثم تنقسم وتفتت . نسبته الى الكريات
 البيض نسبة ٥٠٠ الى ١ || المَلِيْرُ المكب من الدم
 يحوي ما يراوح قدره من ٤ الى ٥ ملايين من الكريات
 الحمر . اما لونها الاخر فينمى الى المادة الملونة الحمراء
 المعروفة بالهيموغلوبين (Hémoglobine) .

٢٣٦١٤ - كُرْبِيْب

Rhizome du roseau (F).
 Rhizome of reed (E).
 الكعب من القصب او القنا تعريفه العامي «سَلْمُوْد» .

٢٣٦١٥ - كُرْبِيْسِيْرِيُوْم

Cryptosporium (S).
 جنس فطور مجهرية رمية من فصيلة الرنفيات . انواعه
 قليلة العد ولاضرار . تركيب خلاء الاغصان والافناد اليابسة .
 وفيهت حبيبة او حبيبة الشكل ، ثلثا حبيبة ثم ترق .
 بويذاته شائعة ، بسيطة ، قوسية الشكل .

٢٣٦١٦ - كُرْبِيْرُوْك

Cryptorrhynchus (S).
 جنس حشرات متديرة القد من فصيلة السويات . انواعه
 المعروفة سبعة . اطولها تراوح من ٦ الى ١٠ سم . اولها
 حنطية او سمراء اللون تعلوها تراويق وزرا كثر سود . تمشي
 حل الحوز والصفاصف والبرتلا . يرقاتها تشرب
 الانجار الفتية والجُلُوع المنطوعة اليابسة وقد تنفخها حتى
 اقتلاها .

٢٣٦١٧ - كُرْبِيْرُوْك الصَفْصَف

Cryptorrhynchus lapathi (S). Cryptorrhynque
 des saules (F). Cryptorrhynchus lapathi (E).
 حشرة خاضعة غاشية مؤذية من فصيلة السويات ورتبة
 مصلدات الاجسمة . تألف المواق الرطبة والمناطق . خنافسها
 تمشي حل اوراق البت والحمض . يرقاتها غاشية تركيب
 الحوز والصفاصف والحوز تشرب الانجار الفتية والجُلُوع
 المنطوعة وقد تخلجها حتى اقتلاها || جسمها صغير القد ،
 يطول نحو ٨ سم . ثوبا ابر اللون تملو فلون مراكبة
 وتراويق وزرا كثر نها الاسود والخطي والكشي والاصهب
 والاشقق الصنابي . رأسها صغير الجرم . صيها صغيرتان
 زباناها صويغانيان ، مرفقيان . ظهورها مذهب المخضر
 اللامع . عدها متناهي التحريز الخفيف القاطب ||
 لها جيل واحد في الحول . تخرج الحشرة الجملانة من بيها
 الشتوي في اوائل نيسان وتبقى حتى اوائل الحول . تسرح
 في النهار تزد المكان مباحدا في تقرب تغلجها بينكها في
 ماء الجُلُوع || البرقة عند بلوغها الادراك تمام تطول نحو
 ١٢ سم . جسمها اهليجي الشكل ، مكور الرأس ، مذهب
 الطرف ، حنطي اللون اسود الرأس والشرج .

٢٣٦١٨ - كُرْبِيْرِيْسِي

Cryptolite
 هو نفاث السيرير الطبيعي ، يكثر وجوده في الاديث
 الاخضر .

٢٣٦١٩ - كُرْبِيْرِيْرِيَا

Cryptomérite (F).
 شجرة من الطقوسيات تعرف بالسوي ، اطبا .

٢٣٦٢٠ - كُرْبِيْسِيْس

Coreopsis (S).
 Coréopsis (F). Calliopsis, Tickseed (E). Schöngelch, Wauzenblum (D). Coreopsis (I).
 جنس نباتات عشية من فصيلة المركبات . انواعه عديدة ،
 نها البرية والزرينية . اوراقها لاقسيبة الشكل والاركانز .
 ازهارها زردية ، شمائية السينات الملونة . يزورها
 مستطيلة مستوية متدبة بسنتين او حكتين او سرفشتين .
 اشهر انواعه الكُرْبِيْسِيْس ما يابح .

٢٣٦٢١ - كُرْبِيْسِيْس اُنِيْسِي

Coreopsis elegans, C. tinctoria (S). Coréopsis élégant (F).
 نوع من الكُرْبِيْسِيْس ضرره عديدة ، اوراقها اولها ، جميعا
 اصباغ زرينية حلية تملو من ٣٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها
 متقابلة مفرصة . فروعها قدية الشكل ، لثاية او خاسية او
 سباحية البند . تصلها مائل البشر حايق الخضر .
 وريساتها الزهرية ملونة البلباب والبينات ، قطرها نحو ٤ سم .
 ازهارها يستمر طول فصل الصيف .

٢٣٦٢٢ - كُرْبِيْسِيْس بَحْرِي

Coreopsis maritima (S). Coréopsis côtier, C. maritime (F).
 نوع من الكُرْبِيْسِيْس وهو بجلة زرينية معمرة تملو نحو
 ٣٠ سم . تألف الشطوط البحرية الدافئة . ساقها غليظة
 قصيرة مشمية . اوراقها متقابلة قدية الكفريش الضيق .
 وريساتها الزهرية صفراء اللون كبيرة القد سباحية الشكل ،
 قطرها يراوح من ٨ الى ١٠ سم . || ازهارها يستمر طول
 فصل الخريف .

٢٣٦٢٣ - كُرْبِيْسِيْس كَبِيرُ الزَهْر

Coreopsis grandiflora (S). Coréopsis à grandes fleurs (F).
 نوع من الكُرْبِيْسِيْس وهو عشية زرينية معمرة تملو من ٣٠
 الى ١٢٠ سم . اوراقها متقابلة مفرصة . فروعها قدية
 الشكل لثاية او خاسية البند . تصلها مائل الصلحة العليا
 خلي السفلى . وريساتها الزهرية مكسبة قطرها نحو ٥ سم .
 لهاها الى الصفرة ، ليناتها رباعية التفصيص ذبعية اللون .
 ازهارها يستمر من ايار الى آب .

٢٣٦٢٤ - كُرْبِيْسِيْس مَحْزُج

Coreopsis coronata (S). Coréopsis couronné (F).
 نوع من الكُرْبِيْسِيْس وهو عشية زرينية حلية تملو من ٣٠
 الى ٥٠ سم . ساقها نحيلة مستقيمة . اوراقها متعاقبة كائلا ؛
 تصلها اهليجي الشكل ، مقطوع القاعدة ، وعل الصلحة
 المائلة . وريساتها الزهرية صفراء اللون . ليناتها
 رتقالية اللون حنطية الحار . قناياها سنائية مهدبة .
 ازهارها يستمر من تموز الى تشرين .

٢٣٦٢٥ - كُرْبِيْسِيْس نَجْمِي

Coreopsis stellata, C. major (S). Coréopsis étoilée (F).
 نوع من الكُرْبِيْسِيْس وهو بجلة زرينية معمرة تملو من ٦٠
 الى ٩٠ سم . ساقها وفروعها مزينة البعد . اوراقها ضمية
 الاركانز ، ثلاثية التفريش اللقي . تصلها خلي البشر .
 وريساتها الزهرية صفراء اللون كبيرة القد نجمة الشكل
 مستطيلة السينات الناضرة || ازهارها يستمر من تموز
 الى آب .



كُرْبِيْرُوْك



كُرْبِيْرُوْك الصفاصف



كُرْبِيْسِيْس اُنِيْسِي



كُرْبِيْسِيْس كَبِيرُ الزَهْر

المشوازية. ازهارها خاسية او مداسية التركيب. ثمارها غلظلة الاشكال تكثر فيها الاستدارة. سؤذها لباني المادة المأكولة || اشهر انواعه ما يتبع .

٢٣٦٣٥ - كرزوفيلم الإفريقي ٥

Chrysophyllum africanum (S). *Chrysophylla africana* (F).

نوع من الكرزوفيلم منته البلاد الافريقية الاستوائية. ثمرته تملو نحو ١٢ م. ثماره مأكولة بفضية الشكل مقعوبة القاعدة تحوي من ٣ الى ٥ حبات .

٢٣٦٣٦ - كرزوفيلم كيميتو ٥ * كيميت ٥

Chrysophyllum calmito (S). *Chrysophylla calmita*, *Calmitier* (F). Common star apple (E). *Echter Sumpfelbaum* (D). *Crissifolium calmito* (I).

اشهر انواع الكرزوفيلم واعمالها زراعة. ضروريه الشائعة. حبة. الثمارها تملو من ١٥ الى ١٥ م. سؤفها منتصبه، مشققة البهائم. اغصانها فارشة. قننها فروع قلنسوية الشكل. اوراقها متماثلة اهليلجية. نصلها جامد النسيج، اخضر الصفحة العليا، خمل السفلى، مذهب الخليل. ثمارها صغيرة، اللد، يبيض اللون، خماسية التركيب، مستطيلة الاذن. ثمارها كروية الشكل حجمها حجم التفاح. قشورها مالسة ملونة، لبانها جامد المادة متوسط العصاره السكرية الزجبة .

٢٣٦٣٧ - كرزوفيلم مكوكو ٥

Chrysophyllum macoucou, *Aublletia macoucou* (S). *Chrysophylla de Macoucou* (F).

نوع من الكرزوفيلم الزراعي. ثمرته تملو نحو ١٥ م. ثماره مأكولة اجناسية الشكل والقد، برتقالية اللون سداسية المبهات .

٢٣٦٣٨ - كرزوفيلم وحيد العجمة ٥

Chrysophyllum monopyrenum, *C. oliviforme* (S). *Chrysophylla monosperma* (F)

نوع من الكرزوفيلم الزراعي. ثمرته تملو نحو ٨ م. ثماره وحيدة العجمة بيضيه الشكل والحجم. لونها الى اليفسجي الباق. لبانها لذيذ الطعم عند الإدراك التام .

٢٣٦٣٩ - كرزوفيلم كيميتو ٥

Chrysosale, *Chrysoschalque* (F). *Pinchback* (E).

مزيج سيكي من النحاس والزنك والقصدير ذهبي اللون تستعمله الصائغة في تقليد الحل النغية .

٢٣٦٣٩ - كرزوفيلم كيميتو ٥

Chrysosale, *Chrysoschalque* (F). *Pinchback* (E).

مزيج سيكي من النحاس والزنك والقصدير ذهبي اللون تستعمله الصائغة في تقليد الحل النغية .

٢٣٦٣٦ - كرزوفيلم وودي ٥

Coreopsis rosea (S). *Coreopsis rose* (F).

نوع من الكريسيس وهو عشبة ترابية ممرمة تملو من ١٥ الى ٦٠ سم. اوراقها متعاقبة لاطلة. نصلها مائل البشرة وسيد البرق يطلو من ٣ الى ٧ سم. ويضرو من ١ الى ٣ م. وروصانها الزهرية صفو الطيب، يبيض السنينات قتلها نحو ٢ م. ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٢٣٦٣٧ - كرزوفيلم ٥

Butyrospermum parkii (S). *Karité*, *Si* (F).

شجرة مشعة من فصيلة الطلحيات . منتهيا البلاد الافريقية الاستوائية. تكثر في ساسب السودان وغينيا والشاطئ الماحي والدمبي والفوتيا والكمرون وتشاد والابيتي || ساقها غلظلة منتصبه تحية السماء الرطبة . اوراقها ضمية طرفية. نصلها سناني الشكل، مستطيل المنق، يارز المروق المدينة. ازهارها ضمية للتصميم، طرفية الارتكاز، عشوية. ثمارها برتقالية اللد مأكولة آلباب تخضص صمغتين لوزيتين لبها يحوي من ٤٠ الى ٥٠ ٪ من المواد الدهنية الجامدة المعروفة باسم الكريتي وتستخرج من الورز بعد تخميمه ونفشه .

٢٣٦٣٨ - كرزوفيلم ٥

Carriérre (F).

في النوار العربي، شجرة ترابية، اطليه .

٢٣٦٣٩ - كرزوفيلم ٥

Conus (S). *Cône* (F). *Conus* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل وفصيلة الكرزويات. انواعه المعروفة نحو ٥٥٠ منتشرة في معظم بحار العالم || اصداهاها غروية حلزونية قرنية اشبه باكرات الصنوبر. مرادها سنة. استانها نبال صديرة ذببة لسها ذراي مؤق .

٢٣٦٣٩ - كرزوفيلم ٥

Chrysanthème (F).

هو القزقان، اطليه .

٢٣٦٣٩ - كرزوفيلم ٥

Chrysanthème à carène (F).

هو قزقان المروج، اطليه .

٢٣٦٣٩ - كرزوفيلم ٥

Chrysanthème des bles

هو القزقان اللذي، اطليه .

٢٣٦٣٩ - كرزوفيلم ٥

Chrysanthème des bles

هو القزقان اللذي، اطليه .

٢٣٦٣٩ - كرزوفيلم ٥

Chrysanthème des bles



كرينه (١)



كرينه (٢)
(الشرة والبررة والزهره)



كرينه



كرينه



كرينه

٢٣٤٢ - كريزوميكه الأيسة

Chrysomya abietis (S). Rouille des aiguilles de l'épicéa (F). Needle rust of the spruce (E). Pichtennadelrost (D).

فطر مجهرى يتطفل على اعداب الابنية فينبها ويسبب سقوطها || مظهره الخارجي بقع منخفضة متناوبة متجانسة صفراء اللون تظهر في أواخر حزيران على ظهور ميازيب الاعداب ثم تتطور وترتفع وتصيب كل بقعة من البقع قاعدة طومكيتين مستطيلتين لونها ال صفرة الزاهية تقربان على جانبي ثيج الحطب || هو مركب الابنية في جميع المراتع اما يفضل الاشجار الفتية التي تراوح اعمارها من ١٠ من ٢٠ سنة.

٢٣٤٣ - كريزوميكه الفصّل

Chrysomyxa rhododendri, *Uredo rhododendri*, *Acidium sibiricum* (S). Rouille vésiculaire du rhododendron (F).

فطر مجهرى يتطفل على العسل في المناطق الجبلية التي تملو سطح البحر من ١٠٠٠ م. وما فوق || مظهره الخارجي يتور مستديرة او بيضيه الشكل تركب النصل على صفحة السفلى يقابلها على البهففة العليا يقع بنفس الحجم لونها الى الجؤوة ثم تتحرف الى الحنطلي وترتفع بشرة السنج وتغيرها وتسبب جفاف النصل وسقوط الورقة.

٢٣٤٤ - كزيميات

Conidæ (S). *Conidæ* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الارجل اماميات الخياشيم وحيدات الاجهزة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الطبقة الطليانية والبعض الآخر معاصر || اصداها حلزونة اسطوانية الشكل او غرؤوية. فروجها مستطيلة مفروسة الخار. اسنفلها قرنية المادة || احرف اجناسها واشهرها الكزيم والزناعة.

٢٣٤٥ - كزيميل

Crécyt (F). *Creasyt* (E). سائل مظهر غرؤولي اللون يستخرج من قطران القزم الحجري.

٢٣٤٦ - كزيمكة الحماقم

Astragalus peregrinus (S).

نبات يدهى اسطرغالوس رسال، اطلبه.

٢٣٤٧ - كزيملون

Pomelo, *Grasp-fruit*

هو ليمون الجنة، اطلبه.

٢٣٤٨ - كزيمكة

Carychium (S). *Carychium* (E).

جنس حيوانات برية من الرخويات مميزات الارجل وفصيلة الحفصليات. انواعها المعروفة عديدة، معظمها من متحجرات الاراضي الجؤرية والطيانية. انواعها المعاصرة منتشرة في جميع اصقاع العالم. تعيش في المراتع الرطبة وقرب مجاري الماء || اصداها شبه مردنية الشكل، حلزونة النصف الخلفي، مستطيلة الانحطاب.

٢٣٤٩ - كزيمكة

Carica جنس نباتات شجرية معمرة من فصيلة البانيات. مهادها البلاد الحارة الاستوائية. سوقها اسطوانية منتصبة حراطة تحمل في زناها الاخير ومنه قتها بعض الاوراق المزدنة الكبيرة النصل وبعض الثمار الكبيرة القند || ثمارها

ماكولة الباب نافعة تقيد المعدة وتنشط الحقم. اشهر اولها ما يتبع.

٢٣٥٠ - كزيمكة الالة

Carica candamarcensis (S). نوع من الكزيمكة، مهادها جبال الاند الامريكية اعصها الواقعة قرب خط الاستواء. ثمرتها تملو من ٤ الى ٦ امتار. ساقها غليظة. اوراقها مستطيلة الزناد. نصلها سباعي التفصيص، متباعد التفريض، بحري اللون، ازرق المايج، خلى الصفحة السفلى || ثمارها اهليجية الشكل، خاصة الصلوع، ناعمة الصرة الدنية. قشورها عند نضجها يرتقالية اللون لا تقل سماكتها من ١٠ سم. لبها رغو المادة، عادم اللون. بلورها بيضيه لشكل، سمراء اللون، حريفة الطعم، لاذعة. قشورها ولهاها توكلمانية ومطبوخة. تتكاثر بالبلور، ترب في الارربة الخلفية المتوسطة الاندماج. تعيش على الساحل اللبناني.

٢٣٥١ - كزيمكة بياها

هي البياض الزراعي، اطلبه.

٢٣٥٢ - كزيمكة بنتاغون، كزيمكة خماسية

Carica pentagona (S).

نوع من الكزيمكة السربوية الشائعة الزراعة. تجيد وتشر في معظم البلاد الحارة، لكنها تحض الصقيع ولا تنصل درجة الصفر اكثر من بضعة ايام. ساقها منتصبة نحلة حريادة تملو من ٣ الى ٤ امتار. اوراقها خاصة التفصيص، نصلها مالى البشرة على صفحتي، زانداها ثلاثي التصليع. ثمارها مقطوعة القاعدة، مدبة الطرف، ظهرا نحو ١٢ سم. وطولها يراوح من ٣٥ من ٣٠ سم. لبها حامض المذاق، ابيض اللون، مستحب العرف. ترب وتكلم مطبوخة ومصورة.

٢٣٥٣ - كزيمكة صفراء الحلات

Carica chrysopetala (S).

نوع من الكزيمكة، مهادها البلاد الامريكية الجاية. ساقها اسطوانية منتصبة تملو من ٣ الى ٦ امتار. اوراقها مستطيلة الزناد الثلاثي الاصلع. نصلها خلسي التفصيص، متقارب التفريض، بحري اللون، مالى البشرة. ثمارها اهليجية الشكل، مقطوعة القاعدة، ناعمة التمل، سباعية الصلوع تطل نحو ١٥ سم. لونها عند نضجها يراوح من البستي الى الاصفر المايق. لبها تاله اعظم مستحب العرف يترك مطبوخا.

٢٣٥٤ - كزيمكة متفافية الزهرة،

كزيمكة كزولوبا

Carica cestriflora, *Vasconcelia cestriflora* (S).

نوع من الكزيمكة، مهادها كزولوبا غرناطة الجديدة. ساقها تملو من ٣ الى ٥ امتار: اوراقها سباعية التفصيص خلية الصفحة السفلى، غليظة الزناد. ثمارها عطرية العرف، مستحبة المذاق، توكلم مع السكر. لبها اصفر اللون، بطيخي التركيب || تتكاثر بالبلور. ترب في الارربة الخلفية العميقة الغور. تعيش وتشر على الساحل اللبناني.

٢٣٥٥ - كزيم

Dicholopus (S). *Carlama* (F). جنس طير من طوايل الساق. انواعه المعروفة قليلة العدد تجمع بين التعلق والرو. اخلاقها اخلاق القتعيق المدم قريبة الشبه منه. موطنها امريكة الجنوبية. اجسامها



كزيمكة

كزيمكة (١)
(الورقة والزهرة)

كزيمكة (٢) (الورقة)

سفعه مركب الخوص المتقابلة . كافوره ايلي الارتفاع ، صغير القد ، ينشق من طلمة متدلية . ثمار جوزية الشكل ولقد . يستخرج من جارتها لباب كالمسحوق متوسط الصنف .

٢٣٦٦٢ - **كُرْبَمُوت**
Créosote (F).
Creasote, Creasotum, Creosote (E).

سائل مطهر كاو حدم اللون فواح الرائحة يستخرج من قطران خشب الزان . يستعمل في علاج مرض السل ولتسكين ألم الانسان .

٢٣٦٦٤ - **كُرْبُفِيلِين**
Caryophyllène (F).
Caryophyllin (E).
هيدروكربون سائل يستخلص من حطر القرنفل والدارسيني والكليبي . ثقله النسبي عند ١٥° سغ = ٠,٩٠٨٥ ، ويغل عند ٢٦٠/٢٥٨° سغ .

٢٣٦٦٥ - **كُرْبُوكَار**
Caryocar
جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة الكريوكاريات . انواعها المعروفة ثمانية منها البرية والزراعية والثرثريية . سيقانها مستقيمة ، رليمة ، فروعها ، اوراقها متقابلة . ثمارها جوزية الشكل ، بعضها مأكول والبعض الآخر دهن الالبوب يستخرج منه دهن نباتي يستعمل استعمال السمن او الزبدة || اشهر انواعها الكريوكار السني والخطمي .

٢٣٦٦٦ - **كُرْبُوكَار عَسْفِي**
Caryocar nucifère (F).

نوع من الكريوكار ، شجرة زراعية وثرثريية منها ارميكة الجنوبية وتعيش في المناطق المعتدلة الحارة . ساقها فروعها . اوراقها متقابلة . اثمارها ارجوانية سوداء الملوحة يطبخها حمار احمر زاهي ، احيانها عديدة مستطيلة ذمبية اللون . ثمارها عسفية اي جوزية مأكولة الصلحام .

٢٣٦٦٧ - **كُرْبُوكَار سَمِي**
Caryocar butyracé (F).

نوع من الكريوكار ، شجرة زراعية يستخرج من اليوب ثمارها الجوزية مادة دهنية دسمة شائعة الاستعمال كسمن نباتي .

٢٣٦٦٨ - **كُرْبُوكَارِيَّات**
Caryocaraceae (S).
Caryocaracées (F). Caryocaraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . منها سطم اصفاق ارميكة الحارة الاستوائية . نباتاتها اشجار وشجيرات مستقيمة القالب . اوراقها متقابلة . ثمارها جوزية الشكل والقشور ، مأكولة الالبوب الوافر المادة الدهنية || اشهر اجناسها الكريوكار .

٢٣٦٦٩ - **كُرْبُولِيَّات**
Caryolysae (F). Karyolysae (E).
الكربوليز اختلال نواة الخلية او الخلية .

٢٣٦٧٠ - **كُرْزَا ، كُرْزَا ، تَتَانُوس ، تَيْتَانُوس**
شوهار ، تَسَل
Tétanos (F). Tetanus (E).
مرض خبيث خطر تقتضي منه الضلوات وتشنج . سببه تسم المراكز الدماغية بتأثير ميكروب خاص يسمى قسيمة تيكلولايت تدخل الجسم من طريق الجرح .

٢٣٦٧١ - **كُرْب**
Nothoscordon (S).
Nothoscorde (F).
جنس نباتات بسلية معمرة من فصيلة الزنبقيات . انواعها

واعناقها مستطيلة ، وروئسها كثيرة متوجة الجياها بكثرة من الزئفر المنتصب الدقيق . متلبها قوية مذبة الملائق الهدية الحادة . اجنتها مزيلة . سيقانها وارباعها رقيقة . غالبها غالب الجوارح || اعرف انواعها واشهرها الكرم المتوج .

٢٣٦٥٦ - **كُرْبَم مُتَوَجَّ * ، لَتَلَقُ الْأَنَاسِي**
Dicholopus cristatus (S). Carriama huppé, Cigogne des serpents (F).

طائر من الكرم ، كبير القد ، طوله نحو ٨٥ سم . ثوبه الى الكهبة ، كل ريشة من جسمه ملوفا غليظ دقيقة متوجة شهاد اللون زاهية . ريش رأسه وصفه الى الربعة السوداء المروج . اقبينه ابيض الاطراف . حلقه عينه كبريتية الصفار . زفده ازرقي . منقاده ورسناه حمر || موطنه ارميكة الجنوبية . يألف الحفصاء النخلة والمواقيع الكثيرة الحب الرقيق . قوته الحشرات والنظام والاواني ويختلج انواع اللآر والجوزان || يمش في الاشجار القليلة الارتفاع . حشر مزيج من القضايا والحشائش الفمسية بالطين . اثناء تضع بيضان تحضنها نحو ثلاثة اسابيع || يألف حياة الاسر ويمش بسهولة مع سائر الطيور الدواجن .

٢٣٦٥٧ - **كُرْبَمَة**
Cordmia (F).

٢٣٦٥٨ - **كُرْبَمَت ، كُرْبَمَتَس**
Coryanthes (S).
Coryantha (F). Helmet orchid (E). Halmblums (D). Corianto (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة السحليات . انواعها عديدة منها البرية والثرثريية والزرع . اصنافها المناطق الاستوائية اصعبها الارميكية . اوراقها لحمية . اثمارها جميلة الشكل كرمبة الرائحة .

٢٣٦٥٩ - **كُرْبُوتَة**
Oosphère (F). Oosphere (E).
البويضة النباتية اللاقطة الى ان تمتد بالذكورية تصبح النواة . راجع خلية .

٢٣٦٦٠ - **كُرْبُوتَة * ، تَحْلَلَة الْجُوز**
Caryota (S). Caryote (F).

جنس نخل منه يمتد من الهند الى الكوشفشين وجزر الزايج . انواعها المعروفة تسمه اشهرها الكريوتة المنقودية وكريوتة مسطحة والششاع . جلعهها منصبة اسوق المستعمرة الحيد . جريها مستطيل القد ، غليظ الكرب . سمها ثنائي التركيب متقابل الخوص الاقواسي الشكل ، كالفورما مستطيل النتح صغير القد . اثمارها وحيدة المسكن في طلمة واحدة .

٢٣٦٦١ - **كُرْبُوتَة سَمَسَطَر**
Caryota rumphiana, Saguaster major (S). Caryote des Célèbes (F).

نوع من نخل الكريوتة مهدد جزر الزايج . جلعه منتصب الساق يعلى من ١٢ الى ١٥ م . سفعه مركب الخوص يطول من ٥ الى ٦ امتار . ثماره جوزية الشكل ، صغيرة القد ، صائرة اللحم ، حريفة . يزود لاستخراج جاز واستعمال جلعه الصلب .

٢٣٦٦٢ - **كُرْبُوتَة سَمُودِيَّة**
Caryota sobollifera (S). Caryota sobollifère (F). Fish-tail palm, Sage palm (E). Nusspalme, Brennpalme (D). Palma carlota (I).

نوع من نخل الكريوتة . مهدد حصاب ويرتفعات ملقة ومليزيه . جلعه منتصب الساق يعلى من ١٢ الى ١٤ م .



كرم متوج



كربوت

٢٣٦٧٨ - كزبرة مزروعة * ، نكدة

Coriandrum maculatum (S). *Coriandre cultivée* (F). *Coriander* (E). *Echter Korlander* (D). *Coriandro*, *Erba cimicina* (I).



كزبرة البر

نوع من الكزبرة وهو نبات عشبي يزرع لثماره الطبية والمستهلكة كأفراجه . ساقه دقيقة فراء . أوراقه متعاقبة مركبة ، وريقاته مفردة ، غليظة للتفرع . أزهاره خضراء التجميع ، صغيرة القد ، وريدة اللون ، حامية المراج . ثماره من كرية الشكل المستديرة ليل جفافها تصبح بعد الجفاف ذكية الرائحة المستحبة المرف .

Fruits du tamaris (F).

٢٣٦٧٩ - كزبرة

Fruits of the tamarisk (E).

هو ثمر الطوقاء . يقال انه طيب نقيه يقيد الصدر والاسهال.

٢٣٦٨٠ - كزبان ، فضبة

Cisticola (S).

Cisticole (F). Fan-tailed-warbler (E).

فضبة هو الاسم المصري . جنس طير من فصيلة الدفليات أنوعه المعروفة ٢٠ أصلها من الملم القديم . جميعها صغيرة القد ، ألوانها إلى الطلعة السرماء . ظهورها وأجنحتها مغطاة بالأسود . قوائمها بيضاء الأطراف أو رادية . غورها بيض . جوارشها ونحوها إلى الصفرة . مناقيرها وسيقانها إلى السرة || تألف المنافع والمراعي والحقول المزروعة . قوتها الحوام والذباب والاساربع الصغيرة . تدن في الادلان وفي الاغشاب التي تطلو سطح التربة أو للماء من ١٠ إلى ١٢ سم . حشها جراب يرمي الشكل . تحفن من مرتين إلى ثلاث مرات في السنة . حششتها بأرواح من ٤ إلى ٦ يعضات لنم إلى الياض الاغبر تطلو ماجة وريدة أو زرقاء اللون .



كزبرة البر الجبلية

٢٣٦٨١ - كزبان مبدل * ، شبيكة

Cisticola schanelsi (S). *Cisticola ordinaire* (F).

شبيكة هو الاسم اللبناني . طائر من الكزبان ، صغير القد ، طولها يراوح من ١٠ إلى ١١ سم . قوته يختلف من قوب جلده بالتشبيك الاسود الذي يعلو أوساط ريش الظهر فقط . أصلها حوض البحر المتوسط . يألف المنافع ورسفات الإثمار والمراعي والحقول المزروعة اغصها حقل القلب والقد الصفراء || الاثني تحفن أربع مرات في المام الواحد . حششتها أربع يعضات .



كزبرة مزروعة

Pupe (F). Pupa (E).

٢٣٦٨٢ - كزبة

علماء الحشرات من ذوات الجناسين وهي كالسادة الحرفيات والحورية للقمعيات .

Casor (F).

٢٣٦٨٣ - كزور

هو الشحم ، من الرواكن ، اطله .

٢٣٦٨٤ - كزورينة بهشية

Casuarina torulosa (S). *Casuarine torulose*, *Filao toruleux* (F).

نوع من الكزورينة ساقها تملو من ٢٠ إلى ٢٥ م . تقشرها غليظة صلبة كقشور البش . غراسيها دقيقة . حششتها تجمع من ٣ إلى ٥ بانثاق أسطوانية الهرم . خلية البشرة . أكرانها خلية الجراحات الناشئة || ترب ، كرفاتها ، في الأتربة الخفيفة الرطبة الساحلية وقد لا تتأذى من القتر العابر .



كزبان مبدل

قليلة ملتبها بشرط وهضاب حوض البحر المتوسط . يصلها صغير القد مستطيل . أوزانها قرصية الانتساب ؛ تصلها مستطيل الصفحة الخضبة المستوية . ثمرانها الزيري يملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم . ينتهي بيسوان من الزير الأبيض الموشع بالوردي || أزهاره يستمر من نيسان إلى حزيران .

٢٣٦٧٢ - كزبرة ، كزبرة ، كسبرة

Coriandrum (S). *Coriandre* (F). *Coriander* (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية وزراعية من فصيلة الخيميات . أنوعها ١٠ منها حوض البحر المتوسط . جميعها طيبة تستعمل في عدة تراكيب وعلاجات . وهي هاضمة ، مقوية ، مضادة للصداع والتشنج تنفع من ضغط الدم وتصلب الشرايين ، تمنع الملش والنفقان وتحمس البخار من الرأس . ويقال أن قلبها مع الساق يفيد الزطاري . سوقها دقيقة فراء . أوراقها مركبة متعاقبة ، أزهارها صغيرة القد ، خضبة التجميع || أشهر أنوعها الكزبرة للمروعة المزروعة .

٢٣٦٧٣ - كزبرة البير * ، شعر الجين ، شعر

الفل ، شعر الأرض ، وعيف ، برشاوشان

Adiantum capillus veneris (S). *Adiante capillaire*, *Cheveux de Vénus*, *Capillaire* (F). *Maiden hair*, *Venus's hair*, *Capillaire* (E). *Capillarkraut*, *Frauenhaar*, *Venus hair* (D). *Adianto*, *Capel-venero*, *Capovenera* (I).

نبات عشبي بري جلديوري معمر من السراخس البسياسيات . يكثر في المواقف الرطبة الظليلة . يقال أن منافعها الطيبة عديدة أما الخفق منها هو أنه مرقق وقايس . زياده يقوي الشعر ويطلو || أوراقها تملو من ٣٠ إلى ٤٥ سم . زانها أسود اللون ثنائي الانعقاب وكل شعبة منه تحمل أربعة فروع لأشياء الطول ، مروحية الترتيب ، كلوية الأوراق المتشعبة الأطراف .

٢٣٦٧٤ - كزبرة البير الجبلية *

Polytrichum commune (S). *Polytrichum commune*, *Capillaire doré* (F). *Bear moss*, *Golden maiden hair* (E). *Echter Widerton* (D). *Politrice* (I).

نبات عشبي بري معمر من السراخس يكثر في الأماكن الرطبة الظليلة . ساقه أسطوانية دقيقة مستقيمة . أوراقه عديدة شراكية جلدية الارتكاز . ثمرته جراب يوفي مالي يكمل الساق || وهو من النباتات الصمية يستعمل استعمال آشاي لكنه بحث حل النوم .

٢٣٦٧٥ - كزبرة البير المكسيكية

Adiantum tenerum (S). *Capillaire du Mexique* (F). *Brittle maiden hair* (E). *Capillär Kraut* (D). *Capel-venero de Mexico* (I).

نوع من كزبرة البير وهو نبات عشبي طيب بري معمر ينبت في المواقف الرطبة في ظل الصخور والأشجار . يقال أنه ينفع الأمراض الصدرية وضيق النفس . يستنصر منه شراب يستعمل ضد السعال .

٢٣٦٧٦ - كزبرة العقلب

Pimpinella sanguisorbe (F).

هي البلان الهضام ، اطله .

Pigamon jaune (F).

٢٣٦٧٧ - كزبرة الحبيشة

هي الثليب الاصفر ، اطله .

٢٣٦٨٥ - كزورينة كُنيائية *

Casuarina equisetifolia (S). *Casuarina à feuilles de prêle*, *Filao à feuilles de prêle* (F). *Beef-wood tree*, *She-oak*, *Swamp-oak* (E). *Kasurbaum* (D). *Casuarina* (I).

نوع من الكزورينة ساقها منتصبه تملو من ٣٠ إلى ٤٥ م. ،
بناتها دقيقة متدلية وباعية التضلع . غلف عقدها ماسلة
البرية وباعية التنسبن . منبها البلاد الحارة . تزرع لصد
الرياح والسياح . ترهب في الأرض الساحلية الرطبة وتيجو
قرب الشطوط البحرية .

٢٣٦٨٦ - كزورينة مُنتصبَة

Casuarina stricta (S). *Casuarina dressée*, *Filao dressé* (F).

نوع من الكزورينة . ساقها وأغصانها منتصبه تملو من
٩ إلى ١٠ أمتار . غراسيها غليظة ، فسبها تجمع من ١٠
إلى ١٢ بليقة . بناتها منتصبه غعدة . غلف عقدها
مسانية التسنبن والتغليد || تألف المناطق الساحلية الرطبة
الدافئة .



كزورينة كُنيائية

٢٣٦٨٧ - كزورِينِيَّات
Casuarinaceae (S). *Casuarinacées* (F).

فصيلة نباتية وسعيدة الجنس من ذوات الفلقتين . أنواعها
نحو ٢٠ جميعها أشجار منتصبه سريعة النمو عادمة الأوراق .
ترهب في المراتق الرطبة اغصانها الشطوط البحرية . غراسيها
وبناتها مسنونة الشكل والترتيب والانتظام . انزهارها
الذكري قدي التجميع ، مستطيل الحجم ، اسطواني
الشكل ، زهره وسيدة السادة . انزهارها الانثري قدي
التجميع ، صير الحجم ، كثيف الأزهار ، زهره وسيدة
المهبط والقلم القصير ، ثنائية السمة الحليمة المستطيلة .
ثمورها اكواز صغيرة رنية الشكل .

٢٣٦٨٨ - كزورِيوس

Xeromys (S). *Xéromys* (F).
جنس حيوانات لبونة قاسمة من فصيلة القاربات . أنواعها
قليلة موطنها بعض جزر المحيط الهادي . اجسامها مسطيلة .
طولها الكامل بأرجح من ٣٠ إلى ٤٠ سم . رؤوسها ذلقة .
اذناتها كبيرة . جرائرها قصيرة . اصابعها خاسية . اطافرها
سادة || تألف الادغال والحقول . قوتها المواد النباتية
هل اختلاف مصادرها والحشرات والنباتات .

٢٣٦٨٩ - كُتَالِي

Parasaeux (F).
هي النباتات ، اطليها .

٢٣٦٩٠ - كُسْب
Tourteau (F). *Cake*, *Oilcake* (E).
ما يبقى من ثفل بعد عصر البزور البدينة كالفلطن
والسهم والفتسق السوداني ولكن الخ .. منظم يستعمل
كغلف للبهائم . راجع جدول الغلف .

٢٣٦٩١ - كُسْبَرَة

هي الكزيرة ، اطليها .

٢٣٦٩٢ - كُستَناة ، كُستَناة ، أبوقرّوة ، قُسطَلَة

Châtaigne (F). *Chestnut* (E).
ثمرة الكستنة أو القسطل أو الشاميلوط وهي مأكولة مدنية ،
لبها يحوي نحو ٣٠ ٪ من الفيتامين هـ و نحو ٩٠
وسنة من الفيتامين ب و لمفرقة عناصرها الغذائية راجع
كستنة مبدولة .



كستنة مبدولة

٢٣٦٩٣ - كُستَنة
Castanea (S). *Châtaigner* (F). *Chestnut-tree* (E). *Kastanie* (D). *Castagno* (I).
جنس أشجار حرجية وزراعية من فصيلة السميليات .

أنواعها المعروفة ١٥ اقليمها البلاد المعتدلة الحارة . تنسبن
بضخامتة سيقانها واستطالة اعمارها التي تبلغ بضعة قرون .
اغصانها دافحة . أوراقها عابلة ، متعالية ، ممقطة ،
بسيطة . نصلها نافرة العروق المتوازية ، منشاري الحافة .
انزهارها وحيدة المسكن . انزهارها قدي التجميع ، شبارة
مستطيلة منتصبه ، كثيرة الاثمار الذكرية المتنامية ، قلبه
الانثوية السلفية الارتكاز ، الفردية أو الثنائية أو الثلاثية
التجميع التي تكنتها بعد التضلع والأغصان ثلاثة كيفية
القشوك اللبوق تحضن الثمرة أو الجار || ثمورها مأكولة الباب
التشوي المائدة .

٢٣٦٩٤ - كُستَنة أُمْرِيكِيَّة

Castanea dentata (S). *Châtaigner d'Amérique* (F).
نوع من الكستنة الحرجية والزراعية البريوتية . مهدها
امريكة الشمالية . تملو من ٢٠ إلى ٣٠ م . ساقها غليظة .
أوراقها تطول من ١٢ إلى ١٤ سم . وتعرض من ٤ إلى ٦
سم . نصلها منشاري الحافة ، المبط الصفعة العليا ، الزغب
الفل على غصليها وعرقيها || ثمورها صغيرة اللد مأكولة .

٢٣٦٩٥ - كُستَنة حَمْرَاء
Pavie (F).
هي القسطل الهندي ، اطليها .

٢٣٦٩٦ - كُستَنة صِيْنِيَّة
Castanea duclouxii (S). *Châtaigner de Ducloux*, *C. de Chine* (F).
نوع من الكستنة الحرجية والزراعية مهدها الصين . تملو
من ١٥ إلى ٢٠ م . ساقها غليظة متضعة الفصانة .
اغصانها فاشرة ، أوراقها متباعدة التسنبن المنشاري
المهدب ؛ نصلها ضميم الصفعة ، قليل العروق الغائرة ،
المبط البشرة حل صفحتيها || ثمورها صغيرة مبطنطة
مأكولة .

٢٣٦٩٧ - كُستَنة مَبْدُولَة * ، قُسطَل

قُسطَل ، شاميلوط ، أبوقرّوة

Castanea vulgaris, *C. sativa* (S). *Châtaigner commun*, *Marronnier* (F). *Sweet chestnut* (E). *Echte Kastanie*, *Kastanienbaum* (D). *Castagno domestico* (I).
نوع من الكستنة الحرجية والزراعية المبدولة . ضرورها
كثيرة المدد ، منبها الشرق الاوسط واروبة الجنوبية والغربية .
شجرتها تملو من ٢٠ إلى ٣٠ م . ساقها ضخمة عظيمة
اغصانها غليظة قائمة . فروعها جاسلة ، قتبها فاشرة .
أوراقها اقليمية مسنة الحافة تطول من ١٥ إلى ٢٥ سم .
وتعرض من ٧ إلى ٩ سم . نصلها قلبه القاسعة . ذرب الطرف .
بارز العروق المتساوية الابعاد ، لونه ال الخضر الاصفر .
اغصانها متناحية تفروق التسنبن صغراً وصلابة وعطناً .
ثمورها مأكولة غذائية . قشورها كستنية اللون لامة الصفعة
الخارجية خلية الداخلية لبها الى البياض التني . تحليلها
الكيميائي يفيد ان ١٠٠ غرام من لباب الكستنة المسلوقة
يملكه ، يحوي ٢٧,٧٦ ٪ من الرودات الغذائية المنهضة ،
تتمريها :

١٥٠٦ ٪ مواد ازوتية

١٥٧٢ ٪ مواد دهنية

٢٤,٤٨ ٪ مواد هيدروكربونية

وأن ١٠٠ غرام من لباب الكستنة المشوية يحوي ٥٦,٤٠ ٪

من الرودات الغذائية ، تتمريها :

٣,٤٩ ٪ مواد ازوتية

٢,٢٥ ٪ مواد دهنية

٤٩,٦٦ ٪ مواد هيدروكربونية

وان ١٠٠ غرام من دقيق لباب الكستنة الخفيف المسحوق يحوي ٨٨,٩٩٪ من الرضعات الغذائية، ترميفها :
٧,٥١٪ مراد ذنوبية
٥,٦١٪ مراد ذنوبية
٧,٥٨٧٪ مراد هيدروكربونية

Fraction - ٢٣٧٠٦ - كَسْكِر
كسر اللد. ج. كسور وكسورات .

Pampille - ٢٣٧٠٧ - كَسْكِر
الريش الأبيض المجمع تحت ذنب الطائر .

- ٢٣٧٠٨ - كَسْكِرَة الحِمَاكو هي الشاترج ، اطليه .

Qusquels (S). - ٢٣٧٠٩ - كَسْكَاك *
Qusquale (F). Creaper (E). Sonderling (D). Qusqualls (I).

جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة الاطيلجيات .
انواعه اربعة اصنافها بعض المناطق الحارة الاسيوية
والافريقية . جميعها شجيرات عارية طول من مترين الى
عشرة امتار . اوراقها منقطة متقابلة اطيلجية . انزهارها
عنفودية التجميع طرفي الازهار . انزهارها جميلة الشكل
مستطيلة الانابيب يكثر فيها الابيض والاحمر والوردي .
يزورها طيبة طاردة للود .

Couscous (F). - ٢٣٧١٠ - كَسْكُوس
الكسكوس حيوان لين من الجرابيات الشاجرات يدعى
كَسْكُوس ، اطليه .

- ٢٣٧١١ - كَسْكُوك * ، كَسْكُوك *
Cassculus (S). Cassicule (F). Cassiculus (E).

جنس طير من فصيلة الكاروبيات . انواعه المعروفة عشرة
جميعها من طيور اسريكة الوسطى والجنوبية . تألف
الغابات ولا تقترب من الاماكن الاطلة . نظامها الحياتي
جامعي . فوجها يد من ٢٥ الى ٥٠ زويبا || اجسامها
عشقة طول من ٤٠ الى ٥٠ سم . متاعها غموية ذرية .
رؤوسها متوجة بفتحة تتشب في الجاه وليس في قم
الرؤوس . اجنحتها معتدل الطول . اذناها مستطيلة ،
مستديرة الاطراف . القوائم تختلف مع الانواع إنما يكثر
فيها الاسود الخلف الاماكن || قوتها الحشرات حل اختلاف
فضائلها والثار والحبوب || اعرف انواعه واشهرها كسكول
المكسيك .

- ٢٣٧١٢ - كَسْكُوك المكسيك *
Cassculus melanictus (S).

Cassicule du Mexique (F).

نوع من الكسكول . يكثر بجموده في المكسيك . يألف
الغابات . ملجئه الحياتي جامعي . فوجه يد من ٢٠ الى
٣٠ زويبا || جسمه اخيف التشكل بطول نحو ٤٥ سم .
قويه الى السواد اللامع يعلوه مزاج اخضر . تقوته بحورية
الذين . هامش جناحه الى البنية . متفاده الى السمرة
الزيتية . قائمته ونحاله الى السمرة القاتمة || قوته الحشرات
على اختلاف فضائلها وانواعها والثار والحبوب والبنور ||
يدفن عشه في الاشجار الكبيرة الدائمة لان الفروج يكمله
يدفن في ذات الشجرة . الاثنى تحضن وسعها من يفتن
الى ثلاث بيضات بينا الاثنى يدفن في القاء .

Excacaria (S). - ٢٣٧١٣ - كَسْكِر *

Excacaire, Excacarie (F).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية تربينية من فصيلة

اقلبيها البلاد الجبلية المعتدلة الحرارة . وهي ترف في
الارضية الخفيفة العميقة الغور المشبعة بالعصر الربلي .
وقد تنمر وتفسد في الاربة الطينية المتوسطة الانساج
لكنها لا تنمر كثيرا فيها . وهي تحشى الاربة الكلسية
لان الكلس لا يوافق مزاجها الجسموري || تتكاثر
باليد وقد تزرع البذور اما في مستقروا مباشرة او في
الشتل اني ان يبلغ ارتفاع النصب نحو ٢٠٠ سم . وقد
يكون ذلك بمد اليد بسنتين تستغل اذ ذلك الى مستقروا .

- ٢٣٦٩٨ - كَسْكَنَة هَنْدِيَّة

الكستنة الهندية واو قرق الحضانة وتسلل القرس ،
ثلاثة اصناف لشجرة واحدة تعرف بالقندلي ، اطليه .

- ٢٣٦٩٩ - كَسْكَنَة بَابَانِيَّة *
Castanea crenata (S).

Châtaigner du Japon (F).

نوع من الكستنة الحرجية والزرارية . مهدا اليابان . تملو
من ١٥ الى ١٥ م . ساقها غليظة متوسطة الفصاحة .
اصنافها قائمة . اوراقها صغيرة القد ؛ نصلها مرتفع
الجانب كثير العروق النازحة الاطراف ، لونه الى الخضرة
الصفراف تملوها لمة سفراء || ثمارها متوسطة القد مأكولة .

- ٢٣٧٠٠ - كَسْكُوبِيَّة *
Xastobium (S).

Xastobie, Vrillette (F).

جنس حشرات صغيرة من فصيلة الغفريات . انواعه قليلة
العدد . رقاتها مؤذية تنخر الخشب وتعلب . اعرفها واعها
كستوبية الخشب .

- ٢٣٧٠١ - كَسْكُوبِيَّة الخشب * ، غِفْرِِيَّة

Xastobium rufovillosum, X. tessellatum (S). Xastobie brunâtre, Vrillette opiniâtre, Horloge de la mort, Vrillette damier (F). Death watch (E). Bunzwürfeliger Nagelkäfer (D).

نوع من الكستوبية طويلا براوح من ٦ الى ٩ م . فوجها
سحلي . نمشة كوسلها وظهورها صفراء اللون || رقاتها
مؤذية تنخر مظهر انواع الخشب اليابس والمصنوع ان في
الطبيعة او ضمن المنازل والمخازن .

- ٢٣٧٠٢ - كَسْكُور
Castor (F).

هو الحارود ، اطليه .

- ٢٣٧٠٣ - كَسْكُورَة
Porte-musc (F).

هي ايل المسك ، اطليه .

- ٢٣٧٠٤ - كَسْكُج *
Ravalement (F). Trimming (S).

قطع فروع الشجرة بنية تجديد شياها .

- ٢٣٧٠٥ - كَسْكُوكَة *
Cassidula (S).

Cassidule (F). Cassidula (E).

جنس حيوانات من الرخويات مهديات الارجل وقصيلة
الحضبيات . انواعها المعاصرة المعروفة متوسطة البد
اعطائها الهند ، بعضها قاذب بيض في المناطق التي تكثر
فيها احراج الشورى ، وبعضها بحري يعيش في رمال



كستوبية الخشب



كسكول



كسكول



كسكول المكسيك

الزيتية الطبية الناعمة. وريقاتها حشوية الشكل والتركيب، متتابعة الإرتكاز، تبينة اللون. أزهارها هامة، سلبية التجميع، قصيرة السبلة، يضاء اللون أو وردية || جميع أنواعها طفيلية، عوائلها جلور الصنوبر والسرو والمائل والسديان.

٢٣٧٢٢ - كسويبات
Monotropaceae (S).
Monotropacées (F). **Monotropaceae (E).**
فضيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القلمات، أجناسها ٤ وأنواعها ٢٠ منها البلاد المعتدلة المنشرة نحو الحارة. معظمها طفيلي يعيش على جلور الصنوبريات والسوليات. جميعها حشوية. بعضها فردية الانتساب عادية الفروع. وريقاتها حشوية النصل. أزهارها سلبية هامة.

٢٣٧٢٣ - كسوف
Eclipse
ظاهرة طبيعية تتميز باحتجاب ضوء الشمس عن الأرض وقد تحدث عندما يتوسط القمر بين الأرض وقمر الشمس. ولا تحدث الكسوف إلا إذا كان القمر في الحوز وقد يكون كلياً أو جزئياً. فالكل يكتن عند احتجاب كامل قرص الشمس عن البصر والجزئي يكون عند احتجاب بعض قرص الشمس.

٢٣٧٢٤ - كسيكة ، كسوك ، كسوك
Polder (F)
Polder (E).
اسم يطلق على الأراضي المنخفضة الممتدة من سواحل بلجيكية إلى هولندية وبولندية وقد صار استعمالها بعد تخصيصها بالمحاجر وزعزاع من مساوي مياه البحر.

٢٣٧٢٥ - كسيد أخضر ، كسيد الحرفش
Cassida deflorata, C. viridis (S). **Casside de l'artichaut, C. vates (F).** **Tortoise beetle (E).** **Artschokanschildkäfer, Grüner schildkäfer (D).**
حشرة صغيرة القند من فصيلة النشاريات، جسمها يضيء الشكل مفلطح، طولها يراوح من ٧ إلى ٨ سم. نوبها أخضر اللون اسطع المزاج، مدنها أسود. لها جيلان في الحول. ريقاتها مستقيمة مستطيلة القرون الشرجية المنكفة على الظهر. تركيب هي وريقاتها أوراق الارضي شوكي وجميع أنواع الحرفش تضغط البشرة وتمشي على خلايا السنج.

٢٣٧٢٦ - كسيد الشوذر
Cassida nebulosa (S). **Casside nébuleuse, C. de la betterave (F).** **Clouded tortoise beetle (E).** **Nebiger schildkäfer (D).**
حشرة صغيرة مبطن من فصيلة النشاريات طولها يراوح من ٧ إلى ٨ سم. نوبها إلى الصفرة الخطية الباهتة. غمدتها متقطعة بالاسمر والاسود. لها جيلان في الحول وفي تركيب مع ريقاتها أوراق الشوذر فتتخرها وتعيش عليها.

٢٣٧٢٧ - كسيد نبيل ، كسيد السرمقيات
Cassida nobilis (S). **Casside noble, C. des saisoacées (F).** **Cassida nobilis (E).**
فروع من الكسيد، حشرة خاضعة مؤذية. موطنها يمتد من الشرق الاوسط إلى اوروبية وافريقية الشمالية. تألف المزارع التي تكثر فيها السرمقيات. خنافسها وريقاتها تعيش على نصال الارواق || جسمها صغير القند، يضيء الشوزن، عذوبود الصفحة العليا، يطول من ٦ إلى ٨ سم. نوبها الملوي إلى الخضار الاصفر يطولو في منطقة درز الظهران

الفريسيات. انواعه المعروفة نحو ١٢٠ منها المناطق الاستوائية الاسيوية والامريكية || سقها مالة بحرية اللون. اوراقها متعاقبة معقنة. نصالها يرمية الشوزن. ازهارها سبلي التجميع || يستخرج من لحائها بالجز عصارة لينة يختلف تركيبها ويغوصها مع اختلاف الانواع. منها تيج البشر وتؤذي العين ان احابها ومنها طيبة تنقي الدم والاعلاط ومنها المشادة لداء السفلس ومنها الصناعية التي يستخرج من ثمارها مادة معينة يضاء اللون شائمة الاستعمال المنزلي || اشهر انواعها الخمسة التالية :

***Ex. sebifera (S).** كسيد الدهن
Ex. syriatica (S). كسيد حربي
Ex. spinosa (S). كسيد شالك
Ex. hibernica (S). كسيد فتوي
Ex. agallocha (S). كسيد يغشي البصر

٢٣٧٢٨ - كستان
Bradype, Al, Paresseux (F).
هو الداب، اطلبه.

٢٣٧٢٩ - كسم
Habitus (F).
هو الامبود والطلالة، اطلبه.

٢٣٧٢٦ - كسمولوجية
Cosmologie (F).
Cosmology (E).
الكسمولوجية علم قواميس العالم عامة أي فلسفة معقولات العالم المجردة.

٢٣٧٢٧ - كستوريزا ، كستوريزا ، كستوريزا
Xanthorrhiza (F).
جنس جنبات برية وزيتية من فصيلة الشقيقيات. انواعه قليلة. سقها فرماة تطول من ٧٠ إلى ٢٥٠ سم. اوراقها زنانبية، متعاقبة، مركبة، ثلاثية نحو حشوية اللوريات المفردة الصفراء اللوزية. ازهارها عنقودية التجميع، اطية الارتكاز، صغيرة القند، تبينة اللون، حشوية البتلات الصغيرة السانية الشكل || ازهارها يستمر طول فصل الصيف.

٢٣٧٢٨ - كستوريزا ، كستوريزا ، كستوريزا
Xanthocera (S). **Xanthocera (F).**
جنس اشجار وشجيرات برية وزيتية من فصيلة السبنتيات. مهدا الصين، تتميز بالذلة قرنية الشكل مغرية الرضوي تصطب بتلات الزهر. انواعه المعروفة قليلة العدد. سقها تطول من ٢ إلى ٨ اطار. اوراقها عابلة متعاقبة وزية التركيب. ازهارها عنقودية التجميع. ازهارها متراكبة الالوان، كبيرة القند، نظامية، حشوية الفصص والبتلات، ثمانية الاسدية. ثمارها تفاحية الشكل واللذ غير مأكولة.

٢٣٧٢٩ - كستنج
جنس من الكماء ينبت في الربال للذيد جداً (السان).

٢٣٧٢٠ - كسو هو الشار ، اطلبه
Couso

٢٣٧٢١ - كسوب
Monotrop (S). **Monotrope (F).** **Fichtenpargel, Monotrope (E).** **Fichtenpargel, Monotrope (D).** **Monotrop, Erba da cera (I).**
جنس نباتات حشوية برية قلبية من فصيلة الكسويبات. منها نباتات المعتدلة الحارة. انواعها نحو ٨ سقها فردية لينة. لها دماغ، صارت عادية اللون تجف بعض المواد



أنواعه المعروفة سبعة موطنها بعض مناطق استرالية . تألف الحراج والبراري . ملجئها الحياتي جماعي . فوجها يد من ١٠ الى ٢٠ زوجاً || أجسامها متوسطة الحجم ، قريبة الشبه بالصدر وبالزنازع . مناقبها كبيرة ضلّيلة . أثوابها الى السمرة القاتمة يتخللها يتبع ابيض || قوتها الحشرات والزروع والنظام والفئران والاصناف الصغيرة . طماها شرس كالصرد . تتميز بالجمارة والشراسة ومن عادتها انها تسفد قصتها في اشراك الانجار لصيد البيا حيتا يطلب لها || اعرف انواعه واشهرها الكسيكان الغرب .

٢٣٧٢٢ - كُسيكان مُعَرَّب * Cracticus torquatus (S), Cassican destructeur (F).

نوع من الكسيكان . موطنه شمالي استرالية . فوجها يد نحو عشرة ازواج . يألف الادغال والحراج المبيشة الاجبار . يستمر اقرس انواع الكسيكان وانهماء || جسمه معتدل الحجم يطول نحو ٢٧ سم . رأسه مستقيم الشكل . منقاده كبير وضلع . ذنبه متوسط الطول ، مقطوم الطرف ، مستدير الزوايا . فؤاها ابيض اللون ، رأسه وظهوره وجناحاه وذنبه الى السواد القصي . عنقه وصدره وانتيكه الى البياض الاخر . قوائمها الى السمرة القاتمة || يقطن عته في الاجبار الرقيقة . الاثني تحضن من ٤ الى ٥ بيضات بينا الذكر يؤن لها الغذاء .

٢٣٧٢٣ - كُسيول Xylote (F).

هو الخشوز ، اطله .

٢٣٧٢٤ - كُسيوية * Cassiope (S), Cassiopele (F).

نبات معقود التعريف على اسم الملكة لفرافية كسيوية . جنس نباتات نجمية معمرة من فصيلة النخلجات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من ثوبت البلاد الحارة || سوطها قصيرة فراءه تملو من ١٥ الى ٢٥ سم . اوراقها ابيضاء ضفيرة ، سنائية اتصال الجالدة الخلية البشرة . ازهارها فردية ، متعديلة ، جلجلية الشكل ، يضاء اللون او وردية || تنويرها يستمر من نيسان الى تموز .

٢٣٧٢٥ - كُسيوة * Vestiture (F).

الكسيوة مجموعة الاعضاء الثانوية كازناب والشوك والمناعس التي تلتصق بقشور النبات او جلود الحيوانات وبذيلها .

٢٣٧٢٦ - كُش * Androcée (F).

هو جهاز التذكير في النبات ، راجع جش .

٢٣٧٢٧ - كُشة * Défaut apparent (F), Visible défaut (E).

هو السيب الظاهر .

٢٣٧٢٨ - كُشاح * Empreinte du fer rouge (F).

سمة بالنار في موضع الكشع وقد تطلق على كل سمة بالنار في اي موضع كان من الجسم .

٢٣٧٢٩ - كُشت * Pueraria (S), Puérarie (F), Pueraris (E), Knollengrische (D).

جنس نباتات ليلية عارشة معمرة من فصيلة القرنيات القفراشية . انواعها ١٠ مهدبا الشرق الاقصى من الهند الى اليابان . جلدها غليظة درنية . سوطها تطول من متر الى ١٠ أمتار . اوراقها حليلة ، مركبة ، ثلاثية الورقيات الكبيرة .



كُشك قنبراني

كُشك قنبراني

جدة قاطبة لؤلؤة اللون تنشأها ماجة ذعبية . ثوبها السفل وبذنها الى السمرة || لها جيل واحد في الحول . تنلهر الحشرة الجملانة في اواسط نيسان . تسرح في النهار . تباشر الاثني مع الملكن بعد ظهورها باسبوع . وينتفح الملكن بعد متحه بنحو عشرة ايام || البرقة عت بلوطها الكيال الجسوري تطول نحو ١٠ سم . ثوبها الى الخضار الاصفر تملو بقبعة يضاء في مقدم الصدر . رأسها مكشور الشكل ، اسود . سكتنها الشريفة تحمل ثلاث زوائد منها اثنتان علويتان متمكنتان على الظهر واحدة سفلية جاسة . سرهما علوي الفتحة يلقى للبراز على الزاقتين || طوله الكمال يستمر من ١٢ الى ١٥ ييما وينقصي لاصفاً ينصل النبات المائل بعد ان تملق فيه البرقة بزلاتها السفلية .

٢٣٧٢٨ - كُسيّة * Pelota (F), Pad (E).

تصنم جلدي يحصل في اطراف بعض الحيوانات . وتضمن في الزوائد الخلية عته بعض الحشرات .

٢٣٧٢٩ - كُسيك * Cassicus (S), Cassique (F), Cassique (E).

جنس طير من فصيلة الكارويجات . انواعه المعروفة ٢٢ جميعها من طيور امريكة الجنوبية والوسطى . تألف الغابات وبمعقها يقترب من الحدائق . نظامها الحياتي جماعي . اسرابها متساوية العدد منها الانواع التي لا يتجاوز عددها ١٠٠ زوج وبها الاسراب الوفرة العدد || اجسامها بين المتوسطة والكبيرة . اطرافها قراوح من ٢٦ الى ٤٥ سم . مناقبها مخروطية الشكل ، مستعربة القواعد ، حادة الاطراف . رؤوسها حشوية يقتارح تخولقة الاحجام . اجنتتها معتدلة الطول . اذناها مستطيلة ، مستعيرة الاطراف . اثوابها مختلفة الالوان ، يكثر فيها الاسود . انابها اصفر فداً من ذكورها || قوتها الثأر والحبوب واللبور والخبثات المختلفة الانواع والجناس || اعرف انواعه واشهرها الكسيك القنبراني .

٢٣٧٣٠ - كُسيك قُشبراني * Cassicus cristatus (S), Cassique huppé (F).

نوع من الكسيك يكثر وجوده في البرازيل والفيونان حيث يدعى «يايو» . يألف الغابات ويقترب من الحدائق والجنان والحقول . سره يراوح بين ٣٠٠ و٥٠٠ زوج || جسمه كبير القد يطول نحو ٤٠ سم . قزخته كبيرة عت المنشق الى القفن . ثوبه الى السواد الاسم الاصفر افنيكه وذنبه الى الخمرية . رقاب ذنبه الجانية صفراء اللون اما القزلالان فالى السواد الاسم الاصفر . منقاده اصفر اللون . حدة فيه زرقاء . ساقا الى السواد الاسمر المواج || من ميزاته انه يتقلد ويبرد الاصوات التي يسمها فيرد صياح الديك وثقاه الهم وصهيل الخيل ويقيق الحبير ومجيج البقر ... || قوته الثأر والحبوب واللبور والحشرات || يذئن عته في الاجبار الرقيقة الكبيرة الاخصان القارشة الاقفية الانتادة . عته جراب مستطيل يملق في الثمنن ويمكح بالالايات والقتش اغصها الايات الباهرة واليوركا . وقد يبريد على الشجرة الواحدة من ٢٥ الى ١٠٠ عش . مدخلها جانبية علوا . الاثني تحضن من بيضتين الى ثلاث بيضات بينا الذكر يؤن لها الغذاء .

٢٣٧٣١ - كُسيكان * Cracticus (S), Cassican (F).

جنس طير . من الجوامئ سنيات المناقير وفصيلة القنبرانيات .



كُسيكان عَرَب

٢٣٧٥٢ - كَيْفُ رَاؤُمُورِيَا (F). Réaumuria (S).

جنس نباتات نجمية برية معمرة من فصيلة الالديات . أنواعه المعروفة خمسة ، منهاها البلاد الحارة أخصها الصحراوية || سوطها شديدة القصر ، كثيرة الفروع الجالسة والمنفرجة . أوراقها متعاقبة ، متقاربة ، خنثائية النصال أو حليتها أزهارها لاقية الانظام والازدكان ، منها المعنوية والمذكرة والابوي والظري والمستطيل الزناد القصيرة . أشهر أنواعه الثلاثة التالية :

R. mucronata (S).

كَيْفُ حَوِيَّة

R. palestina (S).

كَيْفُ فَلَسْطِينِيَّة

R. hirtella (S).

كَيْفُ مَهْدِيَّة

Ribes (S).

٢٣٧٥٣ - كَيْفُ شِيْبِيْ

Grossellier (F). Currant-bush (E).

جنس نباتات جنثية معمرة من فصيلة البقليات . أنواعه نحو ٩٠ مظهرها بري وبعضها زراعي يُزرع لثمار المأكولة . أوراقه متعاقبة ، معنقة ، كثة ، لظلية ، مسننة . أزهاره عقدوية أو فردية التجميع . ثماره عنبة سكرية وحامضة أو مرة . أشهر أنواعه ما يلي .

٢٣٧٥٤ - كَيْفُ شِيْبِيْ أَحْمَرُ* ، كَيْفُ شِيْبِيْ عُنْقُودِي

Ribes rubrum (S). Grossellier rouge, G. à grappes, Castillier (F). Garnet-berry, Red-currant bush (E). Johannisbeere, Rote Johannisbeere (D). Ribes, R. vulgare, R. a grappoli (I).

نوع من الكشيش ، ضروبه الزراعية كثيرة العدد جميعها جنثيات فروعها تملو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم . أوراقه ثلاثية أو خماسية اللقح المسننة . مثاليه الزهرية تجميع نحو ٢٠ زهرة لثما إلى الخضار المشبع بالأحمر . ثماره متصلة اللقح ، كروية الشكل ، حراء اللون ، لذينة الطعم ، مستحبة المذاق || يحيد في جميع الأثرية لا يثنى سوى المتدنية الموطأ . يتكاثر بالتمليق ويشر على الإنبات المحولة .

٢٣٧٥٥ - كَيْفُ شِيْبِيْ أَسْوَدُ* ، هَلْمُوش

Ribes nigrum (S). Grossellier noir, Cassialer (F). Black currant bush, Quinsy-berry (E). Schwarze Ribisel (D). Grossularia nera (I).

نوع من الكشيش البري والزراعي . ضروبه قليلة العدد تتميز بندها الخنثية السطرية الصفراء اللون المبردة على الأوراق والأفانان والثآزر . سقته تملو من ٨٠ إلى ١٢٠ سم . أوراقه خماسية لخاصية التفصيص لاقية التسنين المتشارية . أزهاره عقدوية . ثماره حراء اللون خلية القنابات . ثماره كروية حطرية سوداء اللون .

٢٣٧٥٦ - كَيْفُ شِيْبِيْ شَالِكُ*

Ribes grossularia (S). Grossellier à maquereau, G. épineux (F). Gooseberry bush, Cat berries (E). Stachelbeere, Stachelbeere-Ribisel, Stachelburen (D). Grossularia rosae, G. dei giardini (I).

نوع من الكشيش البري والزراعي الشالك الملبول . تكثر زراعته في أكتلها . أزهاره فردية الانتساب فسي التجميع ، صتة تجميع من زهرتين إلى خمسة أزهار . ثماره ريفية الشكل مجزوة اللون مجزوة بالأخضر . وهي تتميز من المربوبات الصعية الشائعة في ألمانيا وإنكلترا وهولندا وبلجيكا .

٢٣٧٥٧ - كَيْفُ شِيْبِيْ

Grosselle (F). Currant (E).

ثمرة الكشيش .

أزهارها عقدوية التجميع ، حراء اللون أو زرقاء . ثمارها خنثية . بزورها كالكولبياء || أشهر أنواعه ما يلي .

٢٣٧٥٨ - كَيْفُ دَرْفِي Pueraria tuberosa (S).

Pueraria tuberosa (F).

نوع من الكشث الزراعي ساقه متصببة تملو نحو ١٠٠ سم . أوراقه مفصصة . أزهاره زرقاء اللون ، حنابلة مستطيلة مخنقة الفواصل تخضن بعض البهور . جلوده دونية لياها نشوي المادة . بهوره وجلوده مأكولة تليخ كالفاصوليا والبطاطا .

٢٣٧٥٩ - كَيْفُ يَابَانِي Pueraria hirsuta (S).

Pueraria hirsuta, Koudzou (F).

نوع من الكشث الزراعي السورتي . ساقه تطلو نحو عشرة أمتار . فروعها خلية الماء ، وريقاتها معنوية الشكل تطلو وتعرض من ١٠ إلى ١٥ سم . أزهاره إلى الزرقوة البنفسجية الموضحة بالأبيض . عقوده الزهرية بطول نحو ٢٥ سم . حنابلة مستطيلة ، زبده الثلاث || جلوده دونية مأكولة . سقته صناعية نسجية . بزوره وأوراقه طفيفة . يخرج من النباتات التي تُزرع في المواقع المعرصة لمت لأنها تتشبه بالترية وتضغ أجوافها .

٢٣٧٦٠ - كَيْفُ Huppe (F). Crest (E).

شكل من أشكال القرعة .

٢٣٧٦١ - كَيْفُ الْعَجُوز Lichen (F).

هي الخزاز ، اطلي .

٢٣٧٦٢ - كَيْفُ Marquage au fer rouge (F).

الكشيش : الكي بالنار .

٢٣٧٦٣ - كَيْفُ* Galtonogamy (F).

Galtonogamy (E).

هو في الحيوانات الاليفة والداجنة التصلاب بين الأقارب من أصل واحد .

٢٣٧٦٤ - كَيْفِيْ Haricot mungo (F).

هو الماش ، اطلي .

٢٣٧٦٥ - كَيْفُ ، كَيْفِيْ

Décorçage, Décorçation (F). Decortication, Stripping off bark (E).

إزالة لحاء الأشجار أو سقوطها طبيعياً وانتزاع قشور بعض الثآزر واليزور كالجلوز والوزر والاوز .

٢٣٧٦٦ - كَيْفُ الطُّعْبُ Emoussage (F).

Removal of moss from trees (E).

زوع الطعبل من لحاء الأشجار .

٢٣٧٦٧ - كَيْفِيْ Niquette (F). Nicking (E).

الكشيش في الخيل : التواء في عيب الذنب .

٢٣٧٦٨ - كَيْفُ ، مَعَانِيَة Constat (F).

٢٣٧٦٩ - كَيْفُ التَّحَارِيْب

Désopercussion (F). Uncapping (E).

هو رفع الغطاء الشعي من عين الشاهد عند جني العمل .



كشيش أحمر



كشيش أسود



كشيش أسود



كشيش شالك



كُثَيْفَةُ التين



كُثَيْفَةُ



كُثَيْفَةُ زَكِي الرَّائِحَةِ



كُثَيْفَةُ فِلَسْطِينِي

Or. luteus (S). Orbe jaune (F).
Or. aureus (S). Orbe dorée (F).
Or. roseus (S).
Orbe rose (F).

كُثَيْفَةُ سَوْدَاة

Cassia (F).
Black-currant (E).

٢٣٧٥٨ - كُثَيْفَةُ سَوْدَاة

ثمرة الكشيش الآسيوي.

٢٣٧٥٩ - كُثَيْفَات

Ribésiées, Grossulacées, Grossulariées (F). Grossulacées (E).

سبط من فصيلة القليبات يشمل الكشيش والربياس وغيرها. اجناسه وانواعه كثيرة العدد منتشرة في جميع الاصقاع المعتدلة المنخفضة نحو الباردة من العالم القديم والجديد.

٢٣٧٦٠ - كُثَيْفَت

Androsace (F).

هو الاندروزاس، اطلبه.

٢٣٧٦١ - كُثَي

Guéríta (F). Shelter (E).

٢٣٧٦٢ - كُثَيْفَت

Truffe noire (F).

هو الكرم الاسود، اطلبه.

٢٣٧٦٣ - كُثَيْفَةُ

Kuehneola (S).

جنس تطور مجهرية من فصيلة السحاسيات، يتميز بمشاعله الزهرية التجميع التي تركب فصل الاوراق حل صفحتها العليا. فمائله صفراء اللون قلادية التجميع والشكل. فكانته هدية متراصة. مساه السامية شعبة التركيب، وبهاية البريدات || انواعه المعروفة حتى الآن قليلة، منها كُثَيْفَةُ التين وكُثَيْفَةُ القطن.

٢٣٧٦٤ - كُثَيْفَةُ التين

Kuehneola ficl, Physopella ficl, Uredo ficl (S). Rouille du figuier (F).

فطر مجهري يتطفل على اوراق التين فيؤذيها ويهيء الى نمو الاثمار ونفج الثمار || مظهره الخارجي يقع ميمرة صفراء اللون تركب فصل الاوراق حل صفحتها السفلى فتسبب جفاف التسبج ويؤذي ثم الاثمار الباكر الذي يؤذي نمو الشجرة ويؤخر نفج الثمار || يكافح باستعمال سائل بوريد الحلاء ١٪ عند ظهور عراض الوم ويد ذلك باسرعين.

٢٣٧٦٥ - كُثَيْفَةُ القطن

Kuehneola gossypii, Uredo gossypii (S). Rouille du cotonnier (F).

فطر مجهري يتطفل على اوراق القطن فيؤذيها ويسبب سقوطها الباكر || مظهره الخارجي يقع صفراء اللون ميمرة او متلاصقة تركب فصل الاوراق حل صفحتها العليا تقابلها على الصفحات السفلى حالات بنية تمرقل سير التسبج فتذبل الاوراق بعد ان تقضي على نسجها التي تلوي وتموت. يكافح باستعمال اسد الفوليفر للتجاسية الانتكاز الضعيفة التركيب.

٢٣٧٦٦ - كُثَيْفَةُ

Orobus (S).

Orobe (F). Orobe, Bitter vetch (E). Bergerbse (D). Orobo (I).

جنس نباتات عشبية ربية معمرة من فصيلة البقوليات القرواشية. انواعها نحو ٤٠ سورها فرعاء مستطيلة، ازهارها مدثرية يجرسها النحل، ثمارها سنية. بزودا مستدرة. اشهر انواعها:

كُثَيْفَةُ رَيْمِيَّة (F). Or. vernus (S). Orobe printanière (F).

كُثَيْفَةُ رَعَاء (F). Or. variegatus (S). Orobe panachée (F).

كُثَيْفَةُ سَوْدَا (F). Or. niger (S). Orobe noire (F).

٢٣٧٦٧ - كُثَيْفَتِين

Vicia fulgens (S).
Vesce brillante (F).
نوع من الباقية وهو نبات عشبي حولي بري وريبي. ساقه فرعاء عارضة تملو من ٦٠ الى ٢٠٠ سم. سورها مستطيلة منشفية. اوراقه مركبة، وريقاتها شعبة تد من ١٦ الى ٢٤. ازهاره عقودية التجميع. سداسية التصفيف، حراء اللون، فضية المواج اللامع || ازهاره يستمر من ايار الى تموز.

٢٣٧٦٨ - كُثَيْفَت، كُثَيْفَت، كُثَيْفَت، كُثَيْفَت

Cuscuta (S). Cuscuta (F). Dodder (E). Seida (D). Cuscuta, Carpatera (I).

جاه من الكشوش في لسان العرب:

وهو الكشوش فلا اصل ولا ورق

ولا نسج ولا ظل ولا ثمر

جنس نباتات طفيلية من فصيلة المحموديات. انواعه المعروفة نحو ٨٠ مظهره امريكي التنب. جميعا من النباتات المؤذية الماعدة الورق. سورها مستطيلة، فرعاء، كثيفة التجميع، عيطية الشكل، صفراء اللون او شقراء، ثلث حل حاضيتها وتتشب فيها فراشها الماسية فتسببها نسجها وتتها. ازهارها صغيرة الحجم بيضاء اللون او وردية. احرف انواعه الشرقية والاروية ما يتبع.

كُثَيْفَت السمر، الضمير

C. epithymum, C. minor (S). Cuscuta du thym, Petite cuscute, Epithym (F).

كُثَيْفَت الكتان (F). C. epilinum (S). Cuscuta du lin (F).

كُثَيْفَت التل (F). C. trifolii (S). Cuscuta du trèfle (F).

كُثَيْفَت زَكِي الرَّائِحَةِ

C. suaveolens (S). Cuscuta à odeur suave (F).

كُثَيْفَت عربي، شريين

C. arabica (S). Cuscuta d'Arabie (F).

كُثَيْفَت طليظ (F). C. racemosa (S). Cuscuta grosso (F).

كُثَيْفَت فلسطيني

C. palaestina (S). Cuscuta de Palestine (F).

كُثَيْفَت كبير (F). C. major (S). Cuscuta grande (F).

٢٣٧٦٩ - كُثَيْفَةُ شجرة كلية السب.

٢٣٧٧٠ - كُثَيْفَت صوت الحية يجلعها.

٢٣٧٧١ - كُثَيْفَت، كُثَيْفَت جَوَال

Dendroicta (S). Dendroicta, Pie vagabonde (F). Dendroicta (E).

كُثَيْفَت هو الاسم المحدث. جنس طير من الجوارث وفصيلة الغرابيات. انواعه المعروفة عشرة موطنها افريقية. تأنف الحراج الميمرة الاثمار. ملجها الحيالي جامي. جماعتها قليلة العدد. قوتها البذور والجوابوب والثمار واغشرا || اجسامها متوسطة القد تطول من ٢٨ الى ٤٦ سم. بما فيه الذنب الذي يطول من ٢٢ الى ٢٧ سم. تتميز باذانها المستطيلة الشبه سهمية الشكل وبانيتها الحطية القائمة المائلة بالاسود والاحمر والاشبه.

٢٣٧٧٢ - كِطَامَة

Canal souterrain (F).
Underground duct (E).

القناة جـر الماء بعيدة ومقبية تحت الأرض.

٢٣٧٧٣ - كُطْر

Carène (F). Keel (E).

كل الخيلوي يارز يعمل أحد أعضاء الحشرة أو الزهرة .
ومنهم من حماه قارب وزورق .

٢٣٧٧٤ - كُطْرَان

Capsules surrénales (F).
Suprarenal capsules, S. bodies (E).

غدد فوق الكلا .

٢٣٧٧٥ - كَعَب

Nœud (F). Knot (E).

اللقطة ما بين الانبوبين من القصب والقنا . وقيل الكب
هو طرف الانبوب الناشئ . ج كبوب وكباب .

٢٣٧٧٦ - كَعَب

Malléole, Talon (F).

Malleolus, Heel (E).

هو عقب الرجل .

٢٣٧٧٧ - كَعَبُ الْفَرْكَل

راجع سكايبوزا حقلي .

٢٣٧٧٨ - كُعبَرَة

Nœud (F). Knot (E).

الكعبة : عقدة اثروب الزرع ونحوه . ج كمار .

٢٣٧٧٩ - كُعبَرِي ، كُوبِي

Radial

٢٣٧٨٠ - كُعبور

Capsule

هو الجرو ، اطلبه .

٢٣٧٨١ - كُعبوري

Capsulaire (F). Capsular (E).

نمت تعريفي يوصف به ما كان شكله كالكعبور .

٢٣٧٨٢ - كُعبَة

Pirula (S).

Pirule (F). Pirula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الاربل
وفصيلة الخنثيات . انواعها الماصرة المرفوعة عديدة منتشرة
في المحيط الهندي والبحر الاحمر || اصداؤها شبه اجاصية
الشكل ، رقيقة ، سريعة اللطخ ، كبيرة القنوط المستطيلة
القائبة ، صغيرة الاعقاب الملونة المنيبة ، جملة الالوان
المتناسقة || اشهر انواعها الكعبة التينية (Pirula fissa)
التي يكثر وجودها في البحر الاحمر .

٢٣٧٨٣ - كُعبُر

Chrysomitris (S).

Tarin (F). Siskin (E).

جنس عصافير صغيرة القد تالفة من فصيلة الشرشوريات .
انواعها المرفوعة ٨ اقويها متداخلة الالوان المركبة المتباينة . تألف
اذانها مستعرضة فائقة ، منابتها مخروطية قصيرة . تألف
الغنايات ومجاري الماء . تنجوب البلاد في طلب الرزق والمصيف
والشقي ، قوتها يزور النباتات البرية ونولي الاوراق
والخضرات الصغيرة على اختلاف فصائلها وانواعها .
تتميز في الاشجار الكثيفة انحصا السرو والصنوبر . انائها
تقع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها ١٢ يوما .
اشهر انواعها المجلول والقنبري .

٢٣٧٨٤ - كُعبُر قُشْبَرِي

Chrysomitris cucullata (S). Tarin rouge à tête
noire (F).

نوع من الكعبُر ، موطنه امريكة الجنوبية يكثر في البرازيل
ونزويلا . طوله يراوح من ١٣ الى ١٤ سم . رأسه وزوره



كعب



كعبر مبدول



كعبة جرابية

وصفته وأعلى صدره وذنبه الى السواد اللامع . قفنه قبوري
الريش الاسود الازرق المراج . ظهره ومناكب الى الجوزة .
قوامه وأباهره الى السواد المطروق بالاخر . سائر ريش
جسمه الى الحمرة النارية . اثناء اقل تلوناً بلغة || يألف
القنص ويضاهي الحسون في التنفريه .

٢٣٧٨٥ - كُعبُر مَبْدُول *

Chrysomitris spinus (S). Tarin commun (F). Com-
mon siskin (E).

نوع من الكُعبُر ، موطنه يشمل الشرق واروبه وبعض مناطق
افريقية الشمالية . يألف الجبال والبلاد الباردة في الصيف
ومجرب غابات وحدائق المناطق المعتدلة في الشتاء . وهو
صغير القد ، جميل الثوب يطول من ١١ الى ١٢ سم .
الذكر منه منتج للرأس بالاسود . ظهره الى الخضار الاسفر
يعلمو بتجميع اسمر . جناحاه الى السواد يمزجها غطان
اصفران . حشره وزوره وصدره الى الصفار الاخضر .
عذقه اسود . منقاره حنطلي الجسم اسود الملقط . حدة عينه
كستنية اللون ، ساقاه الى الوردية . الانثى اكثر بياضاً
واقل حمرة واسوداداً . اما رأسها فالى الخضار الالكهف
بدلاً من الاسود . اثناء تنبض يطمش مرة واحدة في العام
وقد يكون ذلك في الزهرة الاولى من حزن ران || وهو يألف
القنص بسرعة ويدفن بسهولة .

٢٣٧٨٦ - كُعبَرِي

Botrytide (F).

نمت تعريفي يطلق على ما كان شكله كزهره القزبيط
او كالمقنود القصير المستدير .

٢٣٧٨٧ - كُعبَرَة

Toile d'araignée (F).

هي الشق ، راجعه .

٢٣٧٨٨ - كُعبَرَة

Pésize (F). Peziza (E).

جنس فطور مقعرة من الكنديات . انواعها عديدة منها
واحدة سم الاقتصاد الزراعي يدهى الكعبة الجرابية .

٢٣٧٨٩ - كُعبَرَة جِرَابِيَة

Peziza vesiculosa, Aleuria vesiculosa, Edocephalum
fistularium (S). Péziza vésiculeuse (F)

فطر يعيش على المواد العضوية الدبالية واللبنانية || حقلاته
كبيرة القد مركب من سدائ غليظة قدسية الشكل ملفوفة
الحافة . قطره يراوح من ٣ الى ٩ سم . مواجه الخارجى اخير
خلى . سطحه النكمي امس البشرة داكن اللون المحنطلي
اضرار قائمة على ما يتلف من شتول يتغلغلها من التربة عند
شق طريقه نحو النور .

٢٣٧٩٠ - كُعبَرَات

Pezizaceae (S).

Pézizacées (F). Pezizaceae (E).

فصيلة فطور من رتبة الزقيات . اجناسها وانواعها عديدة
جميعها مقعرة ، بعضها عادم اللقح . معظم اجناسها يعيش
على المواد الدبالية والنباتية المتحللة . منها انواع كبيرة القد ،
لحمية المسكون ، مأكولة || اشهر اجناسها الكعبة والاستيوله
والسركوسينا والاوليتدا ، الخ .

٢٣٧٩١ - كُعبُر

الكرم : « شوك ينسبط له ورق كبار امثال الذراع كثيرة
الشوك ثم تخرج له شمع وتظهر في رؤوس شعبه هنات
امثال الرايح يطيف بها شوك كثير طوال ، وفيها وردة
حراء مشرقه تجمرها تنصل وفيها حب امثال الصفر الا
انه شديد السواد » (السان) .

٢٣٧٩٢ - كَفَرَة هي القعدة الندية الشكل .

٢٣٧٩٣ - كَفَس Os des phalanges (F).
الكبس عظام السلاحي في الاصابع . ج . كفس .

٢٣٧٩٤ - كَغَم Ane sauvage (F).
هو الحمار الوحشي .

٢٣٧٩٥ - كَغُورِم Ane domestique (F).
هو الحمار الاطلي .

٢٣٧٩٦ - كَغُل Métamorphose (F).
Metamorphosis (E).

الكمل هو الاكمال ، اطليه .

٢٣٧٩٧ - كَغْتَد Germon (F).
هو الكند ، اطليه .

٢٣٧٩٨ - كَغْيَب * ، شَوْك الدِّمَن ، حَرَشَف يَرِي

Carduus Marianus, Silybum Marlanum (S). Chardon-Marie, C. argenté, Laïc de N.D., Artichaut sauvage (F). Milk thistle, St. Mary's thistle (E). Echte Mariendistel (D). Cardo di Maria (I).

لبات عشبي يري عجل من فصيلة المركبات . ساقه تمل من ٢٠ الى ١٥٠ سم . اوله كبرية مفردة ساذجة . لصلها لامع الصفحة المنسجة بالابيض . حثاره شالك الاحداب . رؤياته الزهرية تكبر من ٤ الى ٨ سم . ازهارها ارجوانية ، قناباتها ماله سنانية تنتهي بشوكه مبطله الجرم سطيحة الحمة .

٢٣٧٩٩ - كَغْيَت Pycnonte (F).
هو البلب ، اطليه ، ج . كتان .

٢٣٨٠٠ - كَغْيَتِيَّات ، بَلْبِيَّات

Pycnontoidae (S). Pycnontoidés (F).
Pycnontoidae (E).

فصيلة طير من الجوامث مشروحات المناقير . اجناسها وانواعها عديدة . اعطائها معظم اقاليم البلاد الحارة والاستوائية || اجناسها صغيرة . مناقيرها مخزنية الشكل ، مستعرضة القاعدة ، منفضلة الجوانب ، مدببة الاطراف . اجنحتها مستعرضة ، متدلة الطول . اذنانها متوصلة الحميم ، مستديرة الاطراف . ارباشها ناعمة وفزيرة . ارسافها قصيرة ، سرية الفصالح الامامية . اصابعها قصيرة وقوية . قوتها الحشرات والثمار المعنية والبلود البرية وبمض نواصي النبات || اشهر اجناسها الكميث اي البلب .

٢٣٨٠١ - كَغْيَص Cri de la souris (F).
صوت الفأرة او صراخها .

٢٣٨٠٢ - كَغِيْط Brachysclen* (F).

نمت وصفي يطلق على ما كان ظله شديد القصر . ويطلق جغرافيا على الشعوب التي تسكن المناطق الاستوائية لان ظل افرادها منه الظهيرة يكون شديد القصر .

٢٣٨٠٣ - كَغْ آدم

« نبت نحو ذراع مستدير الورق خشن بين سواد وسفرة داخله احمر له بزر كالقرطم لكنه اذق وفيه مرارة بيرة »

يمنح الخلفان شرباً بالبن ويحلل الريح ويقوي الكبد . (قلندر كوة) .

٢٣٨٠٤ - كَغْ الدُّب Sauge sclarée (F).
راجع قويسة قاسية .

٢٣٨٠٥ - كَغْ السَّيْع Renoncule asiatique (F).
راجع سوزان اسيري .

٢٣٨٠٦ - كَغْ الصَّبَاغ Iris d'Allemagne (F).
راجع سوزن جرمانى .

٢٣٨٠٧ - كَغْ العَدْرَاة * ، وَرْدَة أُرْبَا

Anastatica hierochuntica (S). Rose de Jéricho, Jérôme, Anastatic (F). Rose of Jericho, St. Mary's flower (E). Jerichorose, Marienrose (D). Anastatic, Rosa di Gerico (I).

لبات عشبي حولي يري من فصيلة الصليبيات . منبته الاصقاغ القاحلة انحصا البراري الفلسطينية . ساقه فراء تمل من ١٠ الى ٢٠ سم . اوله اعلمية الشكل ، غليظة التنين ، نصلها ازغب الصفحة زليه نجسي التركيب . ازهاره ابطية الازتكاز ، فردية التجميع ، لاطنة الانثساب ، يقشاه اللون || وهو من النباتات التي تعيش من جديد بعد يبساها ، فيا لو وضعت في الماء .

٢٣٨٠٨ - كَغْ النَّسْر ، عُرْبَان ، حَشْفَنَة دُودِيَّة ، فُلَس

Scolopendre officinale, Herbe à la rate (F). Official hart's tongue (E).
هو السرخس الحزني من النباتات الطبية المشكورة ، يستعمل في علاجات الطحال ويطرد الحصى ويهدر البلب .

٢٣٨٠٩ - كَغْ الحَرَّ Renoncule des champs (F).
هو الحيزان الحقل ، اطليه .

٢٣٨١٠ - كَغْ اليَد Dessaisissement (F).
Parting with, Abandonment (E).

هو منع الشخص من ادارة ماله . وقد يكون الانتاع ملجأ واعتباراً .

٢٣٨١١ - كَغْ جَدْمَاء

الكف الجفء بضعة نجوم من كوكبة قيطس مركزها في الرأس .

٢٣٨١٢ - كَغْ مُغْضِب

الكف المغضب نجم ثير من كوكبة ذات الكرمي . ويدعى ايضاً الكف المغضب .

٢٣٨١٣ - كَغْ هَرِيم

هو الارادة ، جنية طيبة معمة . وهو كوكب البحر ، اطليه .

٢٣٨١٤ - كَغْاسَة *

Sparassus (S).
Sparassus (F). Sparassus (E).
دوبية من السناكب الساذجة القانصة ثنائية الروايا سداسية المشاتن تنتهي الى فصيلة الاجابات || جسمها صغير القد بطول نحو ٧ م . عند الذكر ونحو ١٢ م . عند الانثى . سداسها ناق* المقدم ، حشلي اللون ، كميث الحمل .



كعب



كف العذار



كغاسَة

الى الكسني الاحمر المواج . منها ورواجها الى السرة الحالكة || طور الاكمال يستمر نحو ١٦ يوماً وينقضي في الاجلثة او في التربة حيث تنعم السرة ملتصقة بجلباب من الطين .

٢٣٨١٧ - كفّاشة
Cautionnement (F).
Security (E).

هو العقد الذي يلتزم به الكفيل نحو الدائن المكفول له . وهو ايضاً الدويمة المرتبة سواء كانت اوراقاً مالية ام عقوداً تستعيد تأميناً لدين احتماله .

٢٣٨١٨ - كفّاشة ، ضمان
Garantie (F).
Guaranty, Warranty (E).

شهادة خطية من البائع بان ما يبيعه من بذار واسمدة وادوية وادوات وغيرها حائزة على التركيب المتفق عليه .

٢٣٨١٩ - كفّاشة الشكاري
Ducroire
هو ان يلتزم الوسيط دفع ثمن المشتري الى البائع اذا لم يفعل الشاري ذلك .

٢٣٨٢٠ - كفّاشة القسم
Caution juratoire (F).
Juratory security (E).

قسم تسميه المحكمة بمثابة كفالة .

٢٣٨٢١ - كفّاشة قانونية
Caution légale (F).
Common bail (E).

هي الكفالة التي تقدم تنفيذاً لنص القانون .

٢٣٨٢٢ - كفّاشة قضائية
Caution judiciaire (F).
Judicial security (E).

هي الكفالة التي يجب تقديمها تنفيذاً لحكم المحكمة .

٢٣٨٢٣ - كفّاشة
Limite du feuillage (F).
Limit of the foliage (E).

كفة الشجرة : متبني حلود دوسها حيث تنقطع اوراقها .

٢٣٨٢٤ - كفّاشة جنوبية
الكفة الجنوبية كوكب .

٢٣٨٢٥ - كفّاشة شمالية
الكفة الشمالية كوكب .

٢٣٨٢٦ - كفّاشة
Bitume
هو الحصر الفروي ، راجع حر .

٢٣٨٢٧ - كفّاشة
Kaempferia (S).
Kaempferia (F).

جنس نباتات جلمورية دوفضية معمرة من فصيلة الزنجبليات . انواحه نحو ٢٠ متنبهاً المناطق الحارة . اوراقها كبيرة اللثة ، قرصية الانتشاح يتوسطها شراخ تملوه زهرة كبيرة ، جميلة الشكل ، متباينة الالوان || جذاميرها طيبة يستخرج منها مواد ناعوظية شديدة الفاعلية .

٢٣٨٢٨ - كفّاشان
Selaginella (S).
Selaginella (F). Resurrection plant (E). Auferstehungs-pflanze (D). Selaginella (I).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الخلدريات . انواحه المعروفة نحو ٢٠ جميعها من نباتات البلاد الحارة والمتدلة . سوقها نخيلة مدادة فرما . فرصها منتسبة فناء تكسوها الاوراق الصغيرة المترتبة الحرشية الشكل ،

عينها زيمتان . شيفاخا صغيران ذوبان . فكاهها كيران جهازان بشفاف حادة . جزاميزا كبيرة مسطيلة . بطنها بيضي الشكل ، حشلي اللون تملوه شمراء واربع نقط سود || تألف البراري والمواقع النطلة . قوتها الحشرات والذباب : تسرح في الليل . ماواها سمكة صغيرة قطنسية الشكل تسبحها عند سوق الثبات . يبيتها الشفوي يستمر نحو خمسة لظهر تقضيها في مكعبة صليبية تسبحها بين الحجارة وتحتها || تعتبر من الويوات النافعة .

٢٣٨١٥ - كفّاشة تَرَاوِيَّة
Calymnia trapezina, Cosmia trapezina (S).
Calymnia trapézoidale, Cosmie trapézoidale (F).
Calymnia trapezina (E).

فراشة من فصيلة الحشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اطراف اوروبية . فراشها جولة قوتها رحيق الانهار . سرفها خاضلة تركب اوراق الانجار الوريفة || جسمها يطول نحو ١٣ سم . بطنها تراوح من ٣٠ الى ٣٢ سم . رأسها مستد الجرم ، نالتي الجبهة . عينها كيرتان نائزتان . زباناها غيطيان . ملاسها نخيلة . مرفشها مستد الطول . جيوشها وبطنها الى الخشبي الاسمر المواج || روشنها الاماميان الى الخشبي الاكلفت تملوه شمعة عنابية وضلعان مفرشان اسمران . روشنها الخلفيان الى الخشبي الاسمر المواج يبطقه حمار تني ينهني بالاسمر || لها جيل واحد في الخليل . تظهر الفراشة في ايار ويثبي حتى تموز . تسرح في الليل وتبيت في النهار || الاثني ثلثي المنك لسطحاً لامتناهية الشكل تغلفها مادة خروية تنبها على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرة عند بلوغها الاذراك التام تطول نحو ٢٨ سم . جسمها مائل القشعر ، مستد المقدم ، مستطيل المؤخر الذي يبدو كسرب البقعة . ثوبها الى البني الاسمر تملوه خطوط صفراء مفرقة . رأسها كسني اللون . منها ورواجها الى السرة القائمة || طور الاكمال الذي يستمر من ١٥ الى ١٧ يوماً وينقضي في التربة حيث تنتمن السرة على عمق ٣ او ٤ سم . ملتصقة بجلباب خفيف من الطين ينقل عند انطلاق الفراشة في ايار .

٢٣٨١٦ - كفّاشة مَرَاوِيَّة
Calymnia affinis, Cosmia affinis (S).
Calymnia complice, Cosmie complice (F).
Calymnia affinis, Cosmia affinis (E).

حشرة من النسيقيات حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبية . فراشها جارية قوتها رحيق الانهار . سرفها خاضلة تعيش على اوراق السديان || جسمها صغير اللثة يطول نحو ١١ سم . بطنها نحو ٢٩ سم . رأسها الى الخشبي . عينها كيرتان . زباناها غيطيان . ملاسها دقيقة . مرفشها مستد الجرم . جيوشها وبطنها الى الخشبي الاسمر المواج || روشنها ، عند الشقين ، الى الخشبي الاكلفت تملوه في الزوج الامامي ماجة صائبة وضلعوط حمر مفرقة ويقتدان الى الطلعة || لها جيل واحد في الخليل . تظهر الفراشة في حزيران ويثبي حتى آب . تسرح في الليل . تماثل يمد ظهورها بنحو ٤٠ يوماً وتمتد المنك لسطحاً مسطحة الشكل على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرة عند بلوغها الكمال الجلموري تطول نحو ٣٤ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مائل القشعر . ثوبها الى الطلعة ويلبها مواج اخضر وضلعوط سود مفرقة يتخللها من الجانبين نقط غبراء اللون . رأسها



كفّاشة تَرَاوِيَّة



كفّرية



كفّمان

٢٣٨٢٨ - **كُكُتُوْه** * *Cacatus, Pylctolophus* (S).
Cacatois, Cacatois (F) Cockatoo (E).

جنس طير من الببغاء. أنوعه قليلة العدد جميعها متشعبة أصالتها فسيحة الأرجاء تمتد من الهند إلى جزر الزابنج وأستراليا. أجسامها كبيرة القدد. أظفارها إلى البيضاء الناصع. طراها كثيرة فائشة ألوانها يختلف باختلاف النوع، يراوح من الأبيض إلى الوردي والأصفر || وهي هنية الخلق تعيش في القفص وتقتبس العلم والكلام.



كففة مدادة

٢٣٨٢٩ - **كُكُجَّةُ الطَّيَّانِ** *

Laemophloeus clematidis (S).
حشرة من الككجيات طويلة يراوح من ٢ إلى ٣ م. قروها إلى الحنطلي تملو ماجة جزوية. كوسلها حاد التسنين. زباناها صوبانية مهدبة || تعيش على سوق الطيآن بعد يابسها.



ككج

٢٣٨٤٠ - **كُكُجَّةُ الْمُحَايَازِ** * ، **كُكُجَّةُ سُورِيَتَام** *

Oryzaephilus surinamensis (S). *Silvain* (F). *Saw-toothed grain beetle* (E). *Getreideschmalkfer* (D).
حشرة من الككجيات قروها إلى الحنطلي قائم. جسمها مستطيل الشكل يطول نحو ٣ م. كوسلها ناعم الخلق. زباناها صوبانية مهدبة || تركب مع رقاتها جميع الحبوب الخزونة والآبار الخفيفة والساكر والخبث. وقد تقترس وينيد رقات الكلندرا (Calandra).

٢٣٨٤١ - **كُكُجَّةُ مُنْقَضِحَةِ** *

Ulsiota planata (S).
حشرة من الككجيات جسمها مستطيل مفلطح. طويلا يراوح من ٤ إلى ٥ م. قروها إلى الصلبة يملو مواج قائم. كوسلها إلى السرة ثنائي التسنين الطرفي الامامي. زباناها عيطية، مستطيلة مهدبة. || أمشي تحت لحاء الاشجار الحرجية اغصنها السندباد.



ككجة الطيآن

٢٣٨٤٢ - **كُكُجِيَّات** *

Cucujidae (S).
Cucujidae (F). *Cucujidae, Flat bark beetles* (E). *Rindenckfiser* (D).
فصيلة حشرات من غديات الاجنحة. اجسامها وأنواعها عديدة أصالتها العالم. جميعها من أجناس الصغيرة المستطيلة الشكل. قروها الاستشارية شيطنة أو صرطانية مركبة من ١١ فاصلة. أرساغها خلسة الثقيل || تعيش بين الاخشاب وتحت القشور وفي مخازن الحبوب حيث تقترس ما تقوى عليه من الحرام والحشرات الصغيرة.

٢٣٨٤٣ - **كُكُسِيْدِيْدَكَة** * هي الخثرة، اطلها.



ككجة الخازن

٢٣٨٤٤ - **كُكُسِيْدِيْدُوْز** *

مرض فثاك يدعى غريزة الأنوب، اطلها

٢٣٨٤٥ - **كُكُتُوْب** *

Coccoloba (S).
Coccolobe (F).
جنس الجبار وجيبرات برية من فصيلة البيلابيات. أنوعه للمروعة نحو ١٦ منبها المناطق الاستوائية الامريكية. تتميز بصلاية ومناعة اغصانها الصاعدة || شهر أنوعه ما يتبع.



ككجة مفلطحة

٢٣٨٤٦ - **كُكُتُوْبُ أَزْهَب** *

Coccoloba pubescens (S). *Coccolobe pubescent, Bois de fer* (F).
شجرة عطية دائمة تسو من ٢٠ إلى ٣٠ م. خشبها أحمر

الزيتونية اللون || تزود للزبين يستعملها الزمارون في صناعة ابراش وبقاات الزهر.

Croupe (F).

٢٣٨٢٩ - **كُكُل**

هو الزود، اطلها.

Glechoma (S).

Gléchome, Glécôme (F).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الشفويات. انواعها قليلة بعضها طبي. سوقها لاقية الشكل منها الماداة والمتنصبة. اورثها متقابلة متعفة، نصلها مستدير الصفحة المشابية الحلقه. ازهارها ابطة الارتكاز مختلفة الالوان منها الأبيض والأزرق والأرجواني والبنفسجي. تعيش في المراعق الرطبة وفي الاكنية والسيجات.

٢٣٨٣١ - **كُكُفَّةُ مَدَادِكَة** * ، **تِلْبَابُ أَزْهَبِي**

Glechoma hederacea (S). *Gléchome hédéracé, Herbe de St. Jean, Rondelotte, Tarrette, Lierre terrestre* (F). *Ground Ivy, Hedge malds* (E). *Echser Gundermann* (D). *Corona di terra, Erba di San Giovanni, Edera terrestre* (I).

نوع من الكففة الملهولة وهو نبات عشبي طبي بري معمر. ساقه تطول نحو ٣٠ م. اورثه جميلة الخضار الموضح ازهاره غصية التجميع، عجمحية، زرقاء اللون.

Palmipèdes (F).

Palmipeds (E).

رتبة من الطيور تلتقي إلى قسم الجارحيات، فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد تجتمع إلى أربع رتبيات :
شاملات الكفوف منها الجمع
صفصيات المنائر منها الوز والبط
طويلات الريش منها القفطرس
مدجات الريش منها البطريق.

Kéfir, Képhir (F).

Kefir, Kefyr (E).

٢٣٨٣٣ - **كُكُيْر**

مشروب كحولي حامز العلم يستحضر من مضارة اللبن بعد تخثيرها بجار نظرية خاصة تمتد من نشاط الحامض اللبي.

Caution, Fidéjusseur (F).

Caution, Surety (E).

٢٣٨٣٤ - **كُكُيْل**

هو الذي يلزم للدائن مع المدين الأصلي بقتيد الالتزام اذا لم ينفذ المدين.

Garant (F).

Guarantor, Warrant (E).

٢٣٨٣٥ - **كُكُيْل، ضَمَامِيْن**

هو الملتزم بالكفالة او الضمان.

٢٣٨٣٦ - **كُكُيْلُ التَّفَقَّاتِ التَّقْضَايَةِ**

Caution judicatum solvi

هو الكفيل الذي يعرض دفع التفقات التقضائية.

٢٣٨٣٧ - **كُكُيْلُ مُتَضَمَّيْن** (F).

Binding on several caution (E).

هو الكفيل الذي تتألف للدائن من سن المطالبة بتجريد المكفول فاصح موقفه من الدائن موقف الشريك المتضامن في الدين.

طوله نحو ١٠ سم. وبسطه نحو ٣٠ سم. رأسه شبه مخروطي: عيناه صغيرتان، ماصتان. خنثاه، مقطوعتان، مقننات. سباله متكاثف مستطيل. أذناه مستقيمتان، كبيرتان. جناحاه عريضان. ذنبه مدرج في الفشاء الجلدي || يأنف البيوت والكهوف والمنازل القريبة من مجاري الماء. يعيش جماعات متوسطة البدن. لا الذكر لا يفرط إلا في زمن الكرم. من في الحول || ممرسه يستمر من النقص إلى الفجر. قوته الحشرات على اختلاف اجتماعها وأنواعها.

٢٣٨٥٥ - كلالدة *
Chelodina (S).
Chelodine (F). Chelodina (E).
نوع من السلاحف القاذبة المفترسة تنتمي إلى فصيلة الحسبيات. تعيش في المياه العذبة وعلى ضفاف الأنهر. قوتها الأسماك والرخويات والصفادع والوزغ والسحالي والحيات || جسمها بطول نحو ١٠٠ سم. منها ٤٢ سم. الرأس والعنق وأنها مبطن الشكل، ذو الخلف. عنقها أسطواني مستطيل. ذنبها جذع. ذيلها شبه بيضي الشكل، متدلل الإسدياب، يتحرك من ٢٥ فترة لامتسارية الحبر، لونه إلى السرة الصفراء الكدنة || موطنها بعض مناطق أمريكة الجنوبية || لها كائن الصنف، ما كائن من بعض قبائل تلك البلاد.

٢٣٨٥٦ - كلالدة ين *
Cladium (S).
Cladion (F). Marsh shear-grass (E) Schneidegras (D). Panicastrella di padula, Serrazo (I).
جنس نباتات برية عشبية معمرة من فصيلة السديبات. أنواعها المعروفة نحو ٢٠ أعطائها العالم. تألف المنافع والموارد الرطبة. سيقانها دقيقة قرصية التفرع، مستطيلة السليبات. تملو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم || تستعمل في تغليف الخيل لأنها آمن وأبقى من قش الزروع.

٢٣٨٥٧ - كلاركيا، إكلركية
Clarkia (S).
Clarkia (F). Clarkia (E). Clarkia (D). Clarkia (I).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الاسديبات مهداة البلاد الأمريكية. أنواعها قليلة جميعها صغيرة القد زرع للزينة. أوراقها متعاقبة. أزهارها فردية التجميع، محورية الارتكاز، رباعية البتلات والصبان، ثمانية الاسدية. احرف أنواعها وأشهرها ما يلي.

٢٣٨٥٨ - كلاركيا رشيقة *
Clarkia elegans (S). Clarkia élégante (F).
عشبة تريبنتية سبروتية حولية تملو من ٤٠ إلى ٨٠ سم. أوراقها اعطليجية ذلقة، نصلها مسن الحافة، بحري اللون. أزهارها كبيرة القد عادية أو مكسبة، بتلاتها مستديرة أو كغوية الشكل، مسنة الحمار التجمع. ألوانها تختلف مع الفروص منها الوردي والبفسجي والأبيض. أزهارها يستمر طوال الصيف.

٢٣٨٥٩ - كلاركيا تحيفية
Clarkia pulchella (S). Clarkia délicate (F).
عشبة تريبنتية سبروتية حولية تملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. فروصها عديدة. أوراقها سنائية ذرية، نصلها حلي البشرة. أزهارها كبيرة القد، منها البادية والمكسبة، بتلاتها لاقياسية التخصيص، ألوانها تختلف باختلاف الفروص منها الاحمر والأجواني والبفسجي والأبيض. أزهارها يستمر من سزيان إلى ايلول.

الون شديد الصلابة نام الرقة يقاوم النش يبرف غشيب الحديد.

٢٣٨٤٧ - ككلوب كينو *
عنب الشقة
Coccoloba uvifera (S). Coccoloba à baguette, Bois baguette, Raisinier des bords de la mer, R. à grappes (F). Sea-side grape, Kino tree (E). Gamina Seet-raube (D). Coccoloba uvifera, Uva di mare (I).
نوع من الككلوب وهو شجرة برية تألف الشطوط البحرية. ساقها تملو ٣ إلى ٥ أمتار. أوراقها متعاقبة، مسنفة، كبيرة. نصلها مستدير الصلابة الجامدة اللامعة. أزهارها سنبل التجميع، ثنائي الارتكاز. أزهارها جملجية الشكل، صغيرة القد، وردية اللون || يستخرج من ساقها باخر مصارة لزجة، قابضة، مفراة اللون يطلق عليها اسم « كينو » (Kino).

٢٣٨٤٨ - ككم *
Ierax (S).
Hierax, Faucon nain (F). Ierax (E).
جنس طير من عائلة الصقور فضيلة الصقريات. أنواعه عديدة جميعها صغيرة القد، ربة القوام، طولها يراوح من ٢٠ إلى ٢٢ سم. ألوانها إلى الكسلة المرتفعة يكثر فيها الاطم والأصفر والأزرق البانق، ورش صدورها أغم. رؤوسها مستديرة. عينها حيلة وكبيرة. مناسرها مسنة ومتعققة. غالباً سادة || موطنها البلاد الآسيوية من تركيا إلى اليابان. تألف الاجام ويهاجر الماء. قوتها اللوديات وأغشوات اخضا الجنادب والسرابين والفرشاة الكبيرة.

٢٣٨٤٩ - ككلا
Fourrage (F).
Fodder, Provender (E).
كل ما ترعاه الماشية من اعشاب خضر او تخلفه من عشوش وصنائل مخزونة كالبطاطا والشولدر الخ.

٢٣٨٥٠ - ككلا يابس
Foin (F). Hay (E).
الككلا اليابس وأثن والمصارة والقييب هو العشب المحشوش المجفف المحفوظ كلف للحيوان.

٢٣٨٥١ - ككلاية
Pâturin des prés (F).
هي نف المروج، اطليه.

٢٣٨٥٢ - ككلاب
Canidae
فصيلة حيوانية من الأواس تعرف بالكليات.

٢٣٨٥٣ - ككلاية *
Quillaja, Quillaya
جنس اشجار برية من فصيلة اللوديات. أنواعها قليلة. أعطائها البلاد الأمريكية. سيقها وفروصها متعقبة. أوراقها متعاقبة مسنفة يبقية النصل. أزهارها نوري. أزهارها ثنائية المسكن، ابليقة وقناحية الارتكاز || أشهر أنواعها الككلاية الصابونية التي تتميز بسبابة قشور سيقها وأغصانها القنية بمادة الصابونين.

٢٣٨٥٤ - ككلوخ، خفاش أسبل

Vespertilio mystacinus (S).
Vespertilion mystacin, V. à moustaches (F).
الككلاية والككلاية نوع من الخفاش، حيوان من فصيلة الخفاشيات. موطنه فسح الارباء يتنم من الصين إلى اربوة مروراً بالشرق الأوسط والاند || ثوبه إلى الطحلة السمره تدق في الرأس والظهر، وتغير في البطن.



ككلوب كينو



ككم



كلالدة



كلالدة



كلاديون



كلاركيا رشيقة

٢٣٨٦٠ - كَلْبِيَّة

Collette (F).
جنس نباتات برية معمرة من النبتات تدعى ميكة ،
أصلها .

٢٣٨٦١ - كَلْب ، سَعَار ، سَعَر

Rage, Hydrophobia, Lyssa (F). Hydrophobia (E).
مرض خبيث يصيب الكلاب والثآليل والسمال والسنابر
ويسري إلى سائر الحيوانات كالخيل والبقر والظن والمنازل
والارانب . عدواً يهاجر من الماء .

٢٣٨٦٢ - كَلْب *

Canis familiaris (S).
Chien (F). Canis, Dog (E).
جنس حيوانات شاردة وأهلية من فصيلة الكليات . سلالات
كثيرة العدد تتجمع إلى أربع فئات :

فئة الكلاب المسبورة
Lupoides
فئة الكلاب الشمسية أو المرجية
Bracoides
فئة الكلاب الدوراسية
Molossoïdes
فئة الكلاب السلطوية
Graïoïdes

أقله حشاية الأطباء تحمل من ٦٣ إلى ٦٥ يوماً وتضع
من ٦ إلى ١٠ جراء بصغر النور بعد وضعها بشدة أيام.
وتفقد أسنان الخليل بمر ثلاثة أشهر ويكمل تسليها
النهائي بمر ثمانية أشهر . والكلب خمسة أصابع في قوائم
الاحامية وأربعة في الخلفية . أصابعه بسيطة قوية
البرائن || وهو حيوان متأنس أليف وفي يستغنى
الإنسان في الحراسة والصيد والرماية والطاردة .

٢٣٨٦٢ - كَلْب أَصْغَر

le Petit chien (F).
Canis minor, the Lesser Dog (E).
الكلب الأصغر كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها بعد
الكلب الأكبر إلى الشرق || نجومها قليلة العدد ، منها
سبعة مزدوجة وكوكب أنور من فيه تسمية العرب
« الشعرى الشامية » لأنه يهبط في شق الشام . وتسميه
أيضاً « الفمضاء » . وتسمى الكوكبين اللذين على التفرع
« اللذراع المقبوض » أو « مرزم الذراع » .

٢٣٨٦٤ - كَلْب أَكْبَر

le Grand chien (F).
Canis major, the greater Dog (E).
الكلب الأكبر كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها خلف
كوكبة الجوزاء وذلك تدعى كلباً || عدد نجومها تسعة
وعشرون . والعرب تسمي النير الاضطر الذي على موضع
الف « الشعرى العمود » . وكان قوم في الجالية يعبده
لأنه يقطع الباء عرضاً دون فيه من الكواكب . وسمي
عبوداً إلى عبر الهجرة إلى سهيل ، ويسمى أيضاً « الشعرى
الباقية » لأن فيه في شق الين . أما الاربعة التي منها
على كتفه وعلى ذيله وما بينهما وعلى فخذيه فتدعى « والمداري »
والاربعة المصطفة على الاستقامة تدعى « الفرد » .

٢٣٨٦٥ - كَلْب الْأُرْكَار

Chien-terrier, Fox-terrier (F). Terrier (E).
سلالة من الكلاب النشطة الرشقة تستعمل في ميد الجرذان
والشعالب والذباب وغيرها .

٢٣٨٦٦ - كَلْب الْبَحْر

Requin (F).
هو القرش ، أصله .

٢٣٨٦٧ - كَلْب الْبَحْر

Emissole (F).
سمكة بحرية ، كبيرة ، مفترسة تدعى سيجل ، أصلها .

٢٣٨٦٨ - كَلْبُ الْجَبَل

كلب الجبل كوكب .

٢٣٨٦٩ - كَلْبُ الرَّاعِي

كلب الراعي نجم نير من كوكبة الجبل ، يسمى أيضاً
رأس الجاني ، أصله .

٢٣٨٧٠ - كَلْبُ الصَّيْد

Chien de chasse, C. courant (F). Pointer, Beagle (E).
صرم من الكلاب النشطة الحاذقة الثم تستعمل في الصيد .
هزونها عديدة تتميز باختصاصها واشكالها وانواعها .

٢٣٨٧١ - كَلْبُ الْفَرَس

Ligne du dos (F).
هو الخط الذي يوصل ظهر الفرس .
Line of a back (E).

٢٣٨٧٢ - كَلْبُ الْمَاء

Lutra (S).
Loutre (F). Otter (E).
هو القنصاء والقنص ولعل الماء . جنس حيوانات لينة
قازية من فصيلة البرصيات. أنواعه ثمانية أصنافها الماء .

تألف الجيرات والأنهر والأخوار . قنصاً الاسماك والقشريات .
والشفاذع وبعض البقر والأشباب || أجسامها مستطيلة .
وروسها مشعرة مغلطحة . أعينها مقعرة . أذنيها
خفيفة . قوائمها قصيرة ، أصابعها خمسة ملتصقة . أذنيها
مستطيلة . جلودها غروية فانرة الصنف || أجسامها
دعائز منطوية الانفاق يتوسط تحت سطح الماء جسمين
أو ستين سم . وتنتهي على بعد ٢٥٠ سم . زدهات مستديرة
تقلو مستوى الماء بصر ١٥ سم . وتتصل مع الخارج
براديب تزين الهواء والحرب عند الحاجة || أنفها أصغر
قلداً من ذكورها وهي تضع من جرون إلى أربعة جراء
ترضعها وترينا نحو ٥ شهور .

٢٣٨٧٣ - كَلْبُ الْيَاقِ

Courtillière (F).
هو الخالوش ، أصله .

٢٣٨٧٤ - كَلْبُ مُتَقَدِّم

الكلب المتقدم كوكب .

٢٣٨٧٥ - كَلْبَان

الكلبان « نجمان صغيران كاللترين بين الثريا والدبران » .

٢٣٨٧٦ - كَلْبِيَّة

Chienne (F). She dog (E).
أنثى الكلب .

٢٣٨٧٧ - كَلْبِيَّات

Canidae (S). Canidés (F).
Canidae, Dogs (E).
فصيلة الكلاب من الأرواح تشمل الكلب والذئب والذئب
وأين أوى .. قوائمها الاسامية خالية البرائن أما الخلفية
قربانية وبرائتها لا تنقبض كما في السانبر وفي لا تتلصق
الانجليار ولا تنقبض على فريستها ببرائتها بل بانباها .

٢٣٨٧٨ - كَلْبِيَّاتُ الرُّؤُوس

Cynocéphates (F).
Cynocephalus (E).
هي القردايح جنس قرد من فصيلة المجرسيات . أربع
قردوح .

٢٣٨٧٩ - كَلْبُوم

هو الفيل والزنديل ، أصلها .



(١) كلب



(٢) كلب



(٣) كلب

٢٣٨٨٧ - كلزومة حرسية °

Calosoma rugosum (S). *Calosome rugueuse* (F).
حشرة نافعة من فصيلة السلوكيات طولها نحو ٢ سم.
ثوبها اسود اللون. غمداء غمدان يطولها مولج أحمر.
اسفح || تكثر في الصيف على الاثمار الحمرية وفي
الحادق والجنان حيث تقترس رقات خبزها من الحشرات
اخصها برقات فضيلة النقيات .

٢٣٨٨٨ - كلزومة مأكرة °

Calosoma sycophanta (S). *Calosoma sycophanta* (F).
European Calosoma beetle (E). *Puppenrüber* (D).
حشرة نافعة من فصيلة السلوكيات طولها براوح من ٢.٥
الى ٣ سم. رأسها وكسولها الى الزرقاء ، غمداء مستعرضان
الشكل ، لونها الى اخضر المذهب الاسفح المواجه .
تألف الغابات والحادق حيث تقترس ما تيسر لها من
رقات الحشرات اخصها اسارب القزيات .

٢٣٨٨٩ - كلس ، مجير
Chaux (F).
هو اكسيد الكلسيوم ، اطلبه .

٢٣٨٩٠ - كلستوركة °
Calospora (S).
جنس فطور مجهرية من الرقيقات . تتميز ببوغها المستطيل
القد ، ألغاف الجسم ، البغبي الانقسام والبوري
المترس || له نوع واحد هم الاقتصاد الزراعي يدهي
كلستوركة الرقبة .

٢٣٨٩١ - كلستوركة الويكمة ° ، تصوف الويكمة °
شقران الويكمة °

Calospora vanillae, *Gloeosporium vanillae* (S). *Anthracoze de la vanille* (F).
فطر مجهرى يركب اوراق وغمار الرقبة فيطبا ويلدوها .
مظهره الخارجى على الاوراق نقط سمر توشم صفعة النصل
البليا تنصب السنج وتمرقل حله الجسوري . وهو على
الثمار فروح صغيرة مستديرة فضيلة اللون تصيب القرن
في اسد طرفه او في وسطه تتسبب ذوبله وسقرطه || يكافح
فور ظهوره على الاوراق بمحلول بوردو المركز من ١
الى ١.٥ %

٢٣٨٩٢ - كلستوم °
Callistemon (S). *Callistème* (F). *Callistemon* (E).

جنس اشجار وجنيات معمة من فصيلة الديات . انواعها
المعروفة عديدة ، منها فسح الاجزاء ، يمتد من الشرق
الاسوط والاقصى الى امريكا واسرائيل || سقوها تملو من
مترين الى سبعة امتار . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، متقاربة ،
مدقة . نصالها سنائية ، جامدة ، ازهارها سبلي التجميع .
ازهارها مختلفة الخصب والعرف || اهرق انواعها واشهرها ،
التالية :

٢٣٨٩٣ - كلستوم أنيق °

Callistemon speciosus (S). *Callistème élégant* (F).
نوع من الكلستوم . شجرته تملو نحو سبعة امتار .
اخصانها واغنادها وانفانها هراء اللون . اوراقها تطول نحو
١٠ سم . نصالها فواحة العرف المطري ، خلية البشرة
في اول عودها . سنباله الزهرية قرمزية اللون . مياس ازهاره
الى الصفار المايق الجميل || تنويره يستمر من آذار الى
حزيران

٢٣٨٨٠ - كلتيم °
Géophyte (F). *Geophyte* (E).
كل نبات تكون اعضاء تكاثره المائية مدفونة في التراب
كالنباتات السفولية والوفصية والبصلية .

٢٣٨٨١ - كلتيم ° ، لسان المزمار

Salpiglossis (S). *Salpiglossa* (F). *Painted tongue*, *Valvet flower* (E). *Trompetenzunge* (D). *Salpiglossa* (I).
جنس نباتات عشبية حولية ثريينية من فصيلة الباذنجانيات.
انواعه المعروفة خمسة اما غروبها فكبيرة العدد جميعها زياء
الاعضاء لزجة . سقوها فراء منتصبة تملو من ٤ الى ١٢
سم . اوراقها مدقة لاهليجية ذوبة . ازهارها قمية
الشكل ، كبيرة ، القد تطول من ٤ الى ٦ سم . اقلام علقها
مبطلة . لوانها عديدة تختلف مع الصروب منها الاصفر
والاخر والازرق والبنفسجي والايض والموش والمنج
والمرطق || ازهارها يستمر طول فصل الصيف .

٢٣٨٨٢ - كلتخ
Férule commun (F).
هي القنة المبذولة ، اطلبها .

٢٣٨٨٣ - كلدة
Cumuler (F). *To accurrulace* (E).
كلد الثير : جمعه وجمل بعقه على بعض .

٢٣٨٨٤ - كلدة
Terrain dur et compact (F). *Hard and compact soil* (E).
هي التربة الصلبة المتدجة .

٢٣٨٨٥ - كلدة دكة مبدولة °

Eupithecia vulgata (S). *Eupithecia vulgaria* (F).
Eupithecia vulgata (E).
حشرة ملبولة من الرقيقات حرشيات الاجنحة . مطبها
معظم الاصفاق المتصلة الحمرية من الشرق الاقصى الى
اروبه . فراشها جارسة قوتها رقيق الازهار . سرقها
خاضعة قوتها اوراق السبوليات والشفويات والمركبات
جسمها صغير قصيف يطول نحو ٨ سم . مطبها نحو ٢١ سم .
رأسها حنطي اللون . عينها صغيرتان . زباناها مشطيان
عند الذكر ، محيطيان عند الانثى . حوشها وبطنها الى
الحنطي الاكثف المواجه || وراشها ، عند الشقين ، الى
الحنطي الاكثف تملو في الزوج الامامي بقبتان ونقطة
مستطيلة الى البني الاسمر المواجه وسبع نقط بنية في الحثار
الخارجي . وراشها في الزوج الخلفي مشمة بنية وسبع نقط
صغيرة تتأخم الحثار || لها جبل واحد في الحول . تظهر
الفراشة في نيسان وتبقى حتى اواخر حزيران . تسرح
من العمر الى خمسة اليل . تماطل بد ظهورها بنحو ستة
اسابيع وتفتح للمكن ميماديا على الصفحات السفلى من
نصال الاوراق || السرعة تطول نحو ١٩ سم . جسمها شبه
وشمي الشكل . ثوبها الى اخضر الزيتي تملو رقشة غراء
وسط بجي قالب اسمر رقشة خطوط جانبية وردية . رأسها
اسود . رواجها البطنية اليملى ماضحة مما يجعلها تنقش
عند الانتقال || طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٦٠
يوما ينقضي في الجلالة او بين فروع النبات التي تلاس
التربة ضمن جراب مخروطي الشكل ينطلق عند انطلاق
الفراشة .



كلتم



كللودة ملبولة



كلزومة مأكرة

٢٣٨٨٦ - كلزومة °
Calosoma (S). *Calosome* (F).
جنس غناضي نافعة من فصيلة السلوكيات . انواعها
مدنية تفتك بيض الحشرات الفارسة .

كَلْتُمُومُ الْاِكِيدِيَا

والاستوائية || معظم أنواعها اشجار حولية او معمرة ، بعضها بري والبعض الآخر تزييني . اكثر انواعها زهاء العاء حلية الوراق . ازهارها زرقية ، عديدة الالوان . تنموها ربيعي وصيفي || اشهر اجناسها الكليوم والعلانة والقلادة .

Calcium

٢٣٩٠٢ - كَلْتُمُومُ

عنصر فلزي غير الفين ، لين الجسم ، ثنائي التكافؤ . رمزه (Ca) وزنه الذري ٤٠.٠٨ ينصهر في ٨١٠ °مغ ويغلي في ١٤٨٧ °مغ . وهو من الاجسام الشمة التي تمتص الماء والغازات || يوجد في الطبيعة مركبا من بعض العناصر اهمها اكسيد الكليوم او الكلس الحلي . ثم كبريتات الكليوم وهو ملح ابيض يوجد في الطبيعة حل هيئة رنحام او طباشير او جص . ثم كبريتات الكليوم الموجود في الطبيعة حل هيئة حمض رموس . ثم فسلات الكليوم الذي يعتبر المادة الرئيسية في تكوين العظام وفي تكوين الانسجة النباتية .

٢٣٩٠٣ - كَلْتُمُومُ ، كَلْتُمُومُ ، سَوْرَتَجِين

Colchicine (F). Colchicin (E). مادة قلوية بلورية متياصرة تستخرج من سورتنجان الخريف تقل كتلة ١٤٥ مغ . تلويب في الماء البارد والكمحول والكحول فورم .

Crevasses (F). Chaps (E).

٢٣٩٠٤ - كَلْتُمُومُ

قشب صفت يحصل في جلد اسراع القواب .

Macule du soleil (F).

Sun-spot, Macula (E).

٢٣٩٠٥ - كَلْتُمُومُ

Galvanomètre (F).

Galvanometer (E).

٢٣٩٠٦ - كَلْتُمُومُ

مقياس القوة الكهربائية أي شدة التيار .

Phyllosticta (S).

٢٣٩٠٧ - كَلْتُمُومُ

جنس فطور مجهرية من الصفيات . بكتيدات غنية التجميع تتشأ تحت ادمة التصل ثم ترق الى السطح . اشكالها متعددة ، الواحدة عابطة ، مقع واوسع الاوتكانز ، شعيرات بسيطة ، قصيرة وشغافة || يركب الارواق فيؤثم نسيجهما ويؤذيها || انواعه عديدة . اخرها ما يتبع .

٢٣٩٠٨ - كَلْتُمُومُ الْاِسْبَاحُ

Phyllosticta spinacea (S).

فطر مجهرية يركب اوراق الاسبانج فيلوجيا . مظهره الخارجي يقع كبيرة مسطيلة تملو فصل الوراق . تبدو حنطية اللون ثم فبراء ، تسب ذبول التسبج ويدهم . يكلفه بالقطع الوراق المعالجة عند ظهور الرمم .

٢٣٩٠٩ - كَلْتُمُومُ الْاِكِيدِيَا *

Phyllosticta fusiformis (S).

فطر مجهرية يصيب اوراق الاكيديا . مظهره الخارجي بطور مستديرة قطرها نحو ٣ م . تركب التصل حل صفحة العليا . تبدو حرار اللون ثم فبراء ، بكتيدات حكاكية ، قياسها نحو ٣٠٠ × ٨٠ ميكرون . شعيرات ناعية الجسم . يوردها مسطيلة قياسها نحو ٤×٩ ميكرون || يبري الاشجار الضعيفة دون سولها ، لذلك يجر اجتناب بالتسميد .

٢٣٨٩٤ - كَلْتُمُومُ جَمِيدُ الْوَرَقِ *

Callistemon rigida (S). Callistème rigide (F).

نوع من الكليوم . جنيته تملو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقها غسيفة ، جامدة ، ذببة ، تطلو من ٥ الى ١٢ سم . وتعرض من ٣ الى ٤ م . || سابلها الزهرية حرار اللون ، قمرزية الموج || تنموها يستمر من ايار الى تموز

٢٣٨٩٥ - كَلْتُمُومُ سَنَاقِي الْوَرَقِ *

Callistemon lanceolata (S).

Callistème à feuilles lancéolées (F).

نوع من الكليوم . جنيته تملو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقه سنائية ، غسيفة ، تطلو نحو ٦ سم . وتعرض نحو ٨ سم . نصالها جلدية ، حرار اللون في اول عهدها ثم خضراء . سابلها الزهرية الى الحمرة اللونية || تنموها يستمر من حزيران الى آب .

٢٣٨٩٦ - كَلْتُمُومُ مَفْصَلِي الْوَرَقِ *

Callistemon saligna (S).

Callistème à feuilles de saule (F).

نوع من الكليوم . مجهره تملو نحو ستة امتار . اوراقها سنائية تطلو نحو ٨ سم . وتعرض نحو ٢ سم . نصالها جامدة ، مبرئة اللند المعدنية العطرة . سابلها الزهرية صفراء اللون . ازهارها شديدة الصفر || تنموها يستمر من حزيران الى آب .

٢٣٨٩٧ - كَلْتُمُومُ مَوْتَوِي الْوَرَقِ *

Callistemon pinifolia (S).

Callistème à feuilles de pin (F).

نوع من الكليوم . جنيته صغيرة اللند ، تملو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها ابرية كالوراق الصنوبر . سابلها الزهرية كثيفة التجميع ، لونيا الى الخضار الاصفر المجلج || تنموها يستمر من حزيران الى آب .

٢٣٨٩٨ - كَلْتُمُومُ ، جَمِيدِي ، جَمِيدِي

Calcaire (F). Calcareous (E).

ما كان جمعي التركيب او ما كانت تغطي على تركيبة مادة الجص .

Calca (F).

٢٣٨٩٩ - كَلْتُمُومُ

Calcaire, Calc-spar (E).

كربونات الكليوم الطبيعي المشهور .

٢٣٩٠٠ - كَلْتُمُومُ

Calyca (S). Calycère (F).


جنس نباتات عشبية ، برية ، حولية او معمرة من فصيلة الكليديات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، منها الطوي بعض اصقاع البلاد الحارة ، اخصها الشيل والبيرور || سوفها عفاة وبرية متكاثرة الزغب . اوراقها صغيرة ، سنائية التصل الاخضلة او المرطاب . ازهارها زرقية متراكبة التلات يكثر فيها الاحمر ثم الوردي فالازرق || تنموها ربيعي .

٢٣٩٠١ - كَلْتُمُومِيَّات *

Calyceraceae (S).

Calyceracées (F). Calyceraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القملات . تربتها بين المركبات والدياسيات . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، منها بعض اصقاع البلاد الحارة



كَلْتُمُومُ الْاِكِيدِيَا

عديدة ، مبشرة ، قصيرة ، سوداء اللون . بوفاته بضيئة شفافة ، قياسها ٢×٥ ميكرون .

٢٣٩١٦ - كَلْفَةُ عَافِيَةٍ *

Phyllosticta congesta (S). Blotch du prunier (F). Plum blotch (E).

وصم يصيب الخوخ سببه فطر مجهرى يركب الأوراق والثمار || مظهره على الأوراق بقع صغيرة تقشق النصل ، تبدو حطية ثم مبطلة وأخيراً قصبية اللون || وهو على الثمار بقع قروية مستديرة لوناً الى السمره يكتنفها إطار مهذب || يكافح مكافحة كلفة التفاح . ودهم من فصل الفولطير غير المرتكزة على النحاس .

٢٣٩١٧ - كَلْتَنَ - *Galvaniser* (F). To galvanize (E).

٢٣٩١٨ - كَلْفَتَةٌ ، كَلْتَنُصْ - *Galvanisme* (F). *Galvanism* (E).

٢٣٩١٩ - كَلْتَنِي - *Galvanique* (F). *Galvanic* (E).

٢٣٩٢٠ - كَلْتَنَسَةٌ - *Putois* (F). هي ابن عرس ، اطلبه .

٢٣٩٢١ - كَلْتَمَار - *Calmar* (F). *Calamary* (E).

جنس حيوانات بحرية مقرنة من الرخويات رأسيات الأرجل . انواعه المعروفة عديدة . اعطائها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي والهندى اجسامها شبه اسطوانية الشكل متباينة الاحجام التي تطول من ٥٠ الى ٣٠٠ سم . ومنها نوع جبار يبلغ طوله نحو ٧٥٠ سم . جميعها عشاقية الجرامز المستطيلة ، العادمة الفاصل المنثبة بكل من الحامض تمكثها من القش على صيدها || قوتها الاسماك والقشريات

٢٣٩٢٢ - كَلْتَمَبِلِيَّاتٌ - *Collemboles* (F). هي الكهليليات ، اطلبها .

٢٣٩٢٣ - كَلْتَمَكْنِيَّةٌ - *Ubiquité* (F). *Ubiquity* (E).

الكلمكانية الوجودي في كل مكان وفي آن واحد .

٢٣٩٢٤ - كَلْتَمِيدَاةٌ - *Chlamydospora* (F).

اسم يطلق على بورغ بعض الفطور التي تتميز بارتكازها الطرفي . ولكنكيد يعتبر من البوغ المتخدر الذي لا ينش قبل انقضاء زمن بيته .

٢٣٩٢٥ - كَلْتَنِيَّاسٌ - *Callanthias* (S). *Callantias* (F).

جنس اسماك بحرية من شاكيات الزعانف وفصيلة القرشيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة - اجسامها رفيقة تطول من ٢٢ الى ٢٨ سم . زعانفها الظهرية مستطيلة مقطوعة . زعانفها الذيلية فارقة دقيقة الاطراف . الثوابي تزاوج من الشقعة الصنانية الى الوردي . ظهورها ابيض لوناً من بطونها || لحومها مأكولة جيدة الصنف .

٢٣٩٢٦ - كَلْتَنَدِين - *Calandrinia* (S).

Calandrine, *Calandrinie* (F). جنس نباتات عشبية حولية معمرة من فصيلة الربليات . انواعه قليلة جميعها تزيينية اعطائها البلاد الامريكية الشمالية

٢٣٩١٠ - كَلْفَةُ التَّبَعِ *

Phyllosticta nicotianae (S).

فطر مجهرى من الفصليات ، يكتنفه غصية التجميع تشكاً تحت ادمة النصل ثم رقق الى السطح . مفع واضح الارتكاز شفيري يسيط التركيب ، قصيرة القد ، شفافة || يركب اوراق التبغ فيوم من النصل يقع مستديرة لاقبسية يراوح قطرها من ١ الى ١٠ م . تبدو صناعية اللون تستقر على الخنثي الاسمر || اغصاره زهيدة لا تستوجب العناية .

٢٣٩١١ - كَلْفَةُ التَّفَاحِ *

Phyllosticta solitaria (S). Blotch du pommier (F). Apple blotch (E).

فطر مجهرى يصيب التفاح في اوراقه وافناده وثماره . مظهره الخارجي على الأوراق بقع صغيرة عديدة مقرنة الزوايا ، خمر او مقره اللون ، تركب النصل فتقشق على تسجبة الادمية || وهو على الاثمار قروح مستديرة او مستطيلة طولها نحو ٣ م . لوناً الى الجوزة تركب البها تقشيب جلفاه وانضاع بشرته || وهو على الثمار يقع لاقبسية الشكل والحجم ، لوناً الى السمره يكتنفها إطار اخر ، تتسع مع حجم الثمرة فيبلغ قطرها نحو ١٠ م . || يكافح باستعمال سائل يورده الهلوى ٠٩٪ حيث تنضج الاشجار على ثلاث مرات ، الاول بعد سقوط التويجات الزهرية ياسوسين ، والثانية بعد الاول بثلاثة اسابيع ، والثالثة بعد الثانية بثلاثة اسابيع || ونهم من استعمل سائل يورده الهلوى ٠٤٪ من سلفات النحاس مع ٠٨٪ من الكلس .

٢٣٩١٢ - كَلْفَةُ الْخَوْخِ *

Phyllosticta prunicola (S).

وصم يصيب الخوخ والاياص سببه فطر مجهرى يركب الاوراق فيطبا ويقيدها الى الاحمال الباكر || مظهره الخارجي يتور مستديرة او بيضية الشكل تملو النصل على سطحه العليا . تبدو حطية اللون ، وبها الحور ، بنضجية الاطار || يظهر في اوائل آب ويصل الاوراق في اوائل تشرين .

٢٣٩١٣ - كَلْفَةُ الْوَيْثُونِ - *Phyllosticta oleae* (S).

فطر مجهرى يمتري الزيتون بارواقه الفتية فيلظها بعض الشيء || مظهره الخارجي يتور مستديرة قطرها نحو ١ م . تركب النصل على سطحه العليا . تبدو حطية اللون ثم خمر ، يمحطها إطار اسمر || يكتنفه حكاكية الشكل ، شفافة ، قياسها ٣×٣ م . ميكرون || لا يستوجب المكافحة نظراً لنقله اذاه .

٢٣٩١٤ - كَلْفَةُ السِّيمِ *

Phyllosticta antirrhini (S).

فطر مجهرى يصيب السيم في اوراقه وقروعه . مظهره الخارجي ، على الاوراق ، يتور مستديرة قطرها ١ الى ٢ م . لوناً الى الصبغة يكتنفها إطار اخر || وهو على الفروع يقع قروية لوناً الى الجوزة السمره || يكتنفه غليظة ، لاقبسية التجميع ، قياسها نحو ١٠٠ ميكرون ، بوفاته مستطيلة قياسها ٢×٥ ميكرون .

٢٣٩١٥ - كَلْفَةُ الصَّبِيَّيَّاتِ *

Phyllosticta brassicae (S).

فطر مجهرى يصيب نباتات الفصيلة الصليبية . مظهره الخارجي يقع مستديرة قطرها نحو ٨ م . تركب النصل الاوراق ، تبدو فاقمة الخضار ثم خمره اللون || يكتنفه



كَلْفَةُ التَّبَعِ



كَلْفَةُ الْخَوْخِ



كَلْفَةُ الْوَيْثُونِ



كَلْتَنَاسٌ



كلنكرو

والجنتية . أوراقها متناقبة . أزهارها جملة الشكل ، زاهية الألوان ، لاثامية التجميع والأرتكاز || أعرف أنولاه وأشهرها ما يلي .

٢٣٩٢٧ - كَلْبَرِيَسٌ خَيْمِيَّةٌ ٥

Calandrinia umbellata (S). *Calandrinia umbellata* (F). جملة زرقية مصرة تملو نحو ٥ سم . ساقها فناء جزوية اللون . فروصها فائشة . أوراقها صغيرة ضيقة تطول نحو ٢ سم . نصلها خلى البشرة على صفحتي . أزهارها خيمية التجميع ، تاجية الارتكاز ، كثيرة العدد ، صفيرة القذ ، حمراء اللون ، بنفسجية الموالج || أزهارها يستمر من تموز إلى أيلول .

٢٣٩٢٨ - كَلْبَرِيَسٌ زَيْتُونِيَّةٌ ٥

Calandrinia discolor (S). *Calandrinia discolor*, C. *élégante* (F). جملة زرقية مصرة تملو نحو ٨٠ سم . ساقها منتصبه فرها . أوراقها ملتصقة مقطوعة . نصلها بحري الصفعة العليا ، أحمر السفلى . أزهارها عنقودية التجميع ، كبيرة القذ ، قطرها براوح من ٤ إلى ٦ سم . لونها إلى البنفسجي الأزرق الموالج . أزهارها يستمر من حزيران إلى أيلول .

٢٣٩٢٩ - كَلْبَرِيَسٌ زَيْتُونِيَّةٌ ٥

Calandrinia spectabilis (S). *Calandrinia spectabilis* (F). حشية زرقية حولية تملو نحو ٩٠ سم . ساقها منتصبه فرها . أوراقها معيابة الشكل تطول من ٣ إلى ٤ سم . نصلها بحري اللون جامد الصفعة . أزهارها عنقودية التجميع ، كبيرة القذ ، قطرها براوح من ٥ إلى ٧ سم . لونها إلى الأرجواني للموخل والمضلع بالاسدي || أزهارها يستمر من تموز إلى أيلول .

٢٣٩٣٠ - كَلْبَرِيَسٌ كَثِيرَةُ الزَهْرِ ٥

Calandrinia grandiflora (S). *Calandrinia à grandes fleurs* (F). جملة زرقية مصرة تملو نحو ١٠٠ سم . ساقها منتصبه فرها . أوراقها بيضبة ذرية تطول من ١٢ إلى ٢٠ سم . وتعرض نحو ٨ سم . نصلها أخضر اللون ، سميك الصفعة . أزهارها كبيرة القذ نورية التجميع ، محورية الارتكاز ، قطرها براوح من ٤ إلى ٦ سم . لونها إلى الوردي الموخل بالأسفر والاسدي || أزهارها يستمر من حزيران إلى تشرين الأول .

٢٣٩٣١ - كَلْبَرِيَسٌ مَهْرِي ٥

Calandrinia monziesii (S). *Calandrinia de Monzies* (F). حشية زرقية حولية منتبسة . ساقها تطول من ٢٠ إلى ٤٠ سم . أوراقها الفلل ملتصقة الشكل تطول نحو ٨ سم . أوراقها العليا سائبة ضيقة . جميعها مائلة النصل الأخضر . أزهارها عنقودية التجميع ، محورية الارتكاز وتاجية ، صفيرة القذ ، أرجوانية اللون || أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

٢٣٩٣٢ - كَلْبَرِيَسِيَّاتٌ ٥

Calandrinia (F). *Calandrinia* (E). سيط من فصيلة الأرجليات يشمل بعض الأجناس والأنواع نباتاته حشوية أو مجلية وحبسية . معظمها أمريكي المنبت . أزهارها عنقودية . ثمارها جراء ثلاثية الفلق .

٢٣٩٣٣ - كَلْبَرِيَسٌ ٥

Kalanchoe (F). *Kalanchoe* (E). جنس نباتات طيبة معمرة من فصيلة المخلدات . أنولاه نحو

٢٣٩٣٤ - كَلْبَرِيَسٌ ٥

Calanus (S). *Calanus* (F). *Calanus* (E).

دوية بحرية من القشريات مجلفيات الأربيل وضيفة الكلتونيوات || جسمها صغير الحجم ، شبه غروفي الشكل مستعرض الصدر ، وحيد العين ، عديم الحواف || تعيش على الطلوح . جماعاتها وافرة العدد .

٢٣٩٣٥ - كَلْبَرِيَسِيَّاتٌ ٥

Calanidae (S). *Calanidae* (F). *Calanidae* (E).

فصيلة دويات مائية من القشريات مجلفيات الأربيل . أجناسها قليلة العدد أما أنواعها فكثيرة ، معظمها بحري يعيش في مختلف بحار العالم وبعضها بحري يعيش في الأنهر والبحيرات والمخلفات .

٢٣٩٣٦ - كَلْبَرِيَسٌ ، كَلْبَرِيَسٌ ، حَكْوِي ٥

Rein (F). *Kidney* (E). حضوي في الجسم كلوي الشكل يفرز البول . هما كليتاني أو سفولان مركبهما من جانبي السلسلة الفقرية .

٢٣٩٣٧ - كَلْبَرِيَسٌ الْمَاءِ ، لَاجِمُ الْفُكْكَدَعِ ٥

Hydrocharis morus-ranae (S). *Hydrocharis*, *Hydrocharis*, *Morus*, *Mors de grenouille* (F). *Frog-bit*, *Frogs-bit* (E). *Echter Froschbiss* (D). *Favagello di china*, *Morso di rana* (I).

نبات حشوي بري مائي معمر وسيد الجنس والزوج من فصيلة كلويات الماء . يعيش في المياه الراكدة ويؤثر في الأحواض . سويته سلاوية متقاربة المقد . جلوهه ضمية التجميع تنشب من القعد . أوراقه مستطيلة الاضلاع كلوية الشكل تطول وتعرض من ٤ إلى ٥ سم . نصلها سميك الصفعة أخضر اللون . أزهاره ثلاثية الفلل والبسات البيضاء || أزهاره يستمر من حزيران إلى آب .

٢٣٩٣٨ - كَلْبَرِيَسٌ ٥

Chlore (F). *Chlorine* (E). غاز سام أثقل من الهواء لونه إلى الأخضر الزيتي . رائحته محرقة ثخيرة السعال . وزنه الاتقي ٣٥,٤٦ روزه (كل (Cl) || يوجد في الطبيعة مختلطاً بغيره من العناصر المختلفة أنقصها ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) وهو يتميز بميله الشديد إلى الاتحاد بالفلزات والاندازات . يتجر من المطهرات المشهورة ويستخدم في تطهير مياه الشرب . كما أنه يستخدم في الفراض في إعطاء تبييض للانسجيات القطنية والكتانية وصناعة قنابل الفناز السامة .

٢٣٩٣٩ - كَلْبَرِيَسٌ ٥

Chlorops (S). ذباب أسفر اللون يعرف بغيره العين ، راجع خزياء .

٢٣٩٤٠ - كَلْبَرِيَسِيَّاتٌ ٥

Chloroplasta جنسيات الخلايا النباتية الملونة بالفضي وبالي وتتركز عليها التمثيل الخفوي .

٢٣٩٤١ - كَلْبَرِيَسٌ ٥

Chloroforme (F). *Chloroform* (E). سائل عادم اللون أثري الرائحة ينتج عن الكلور مع الكحول يستعمل في الطب كمنج يطرأ الإصباح .



كلرة الماء

كيرتان. زيانها صوبانيان، جوشنها الى الطلعة الرصاصية الزرقاء المواج. يطلها اصغر القوب اصغر المواج || رواشتها، عند الشقين، الى الخطي الاصغر الاسفع المواج يملو في الزوج الخلفي حمار ضيق اغبر وتفتوت حطية تدر كزوائد نوبلية الشكل || لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجبل الاول في مطلع نيسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في تموز. تعاقل بعد ظهورها باربعة اسابيع وتمتص المكن ميحادي على الصفحات السفلى من نصال المائل || السفة تطول نحو ١٤ سم. جسمها مستطيل الرطب، مستطيل المقدم والمؤخر، كسني اللون يملو غطان جانبيين اصفران وعشرة اطواق جزوية. اما الطوق الصدري الاول فاسود كالرأس. ملها ورواجها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر في الجبل الاول نحو ١٥ يوماً وينتهي معلقاً بافتان الثبات، يستمر في الجبل الثاني نحو ٣٠ اسبوعاً.

Kaloula (S). ٢٣٩٥٠ - **كلولة**

Kaloula (F). Kaloula (E). جنس غفاد قازبة من فصيلة الرنانيات. انواعها المرفوقة حسة. موطنها الهند والصين وماليزية والفلبين || اجسادها مستدلة اللد أو صغيرة. تتميز باصابعها الممددة المجهزة بمحاصر طرفية. حطابها قليل الانسياط عند حتى اوائل الزلم الثاني من الاصابح || اقواها السائلة الى السمرة الزيتية يملوها تبسيع اشهب اصغر ورققة حطية تمتد من مؤخر الرؤوس الى اطراف القوائم.

Collomia (S). ٢٣٩٥١ - **كلومية**
Collomia (F). Collomia, Queen Ann's tumbler (E). Blumenschleimame (D). Collomia (I). جنس نباتات حشوية حولية من فصيلة البقياس. انواعها قليلة، سوقها واروقها زراة لينة. ازهارها رويسية كثيفة التجميع. يستخرج من زورها غراء لثائي يدخل في عدة تركيب || احرف انواعها واشهرها ما يلي.

٢٣٩٥٢ - **كلومية أزهارية**
Collomia coccinea (S). Collomia écarlate (F). حشبة زينة سبروتية تملو نحو ٥٠ سم. ساقها قليلة الفروع، زياة البهاء. اوراقها بيضيه مستطيلة، نصلها ثلاثي او رباعي التفرع القدي. رويسياتها الزهرية متوسطة اللد. ازهارها حمر الابواق صفر الانلاباب || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

٢٣٩٥٣ - **كلومية كبيرة الزهر**
Collomia grandiflora (S). Collomia à grandes fleurs (F).

حشبة زينة سبروتية تملو من ٢٠ الى ٧٠ سم. ساقها فراء. اوراقها سنانة ضيقة تطول من ٤ الى ٥ سم. وتعرض من ٥ الى ١٠ م. نصلها غلي البشرة. رويسياتها الزهرية كبيرة اللد. ازهارها مستطيلة، كزومها مسنة الحافة، قويماتها تظهر صفراء اللون ثم تتصرف، مع الادراك، الى الحمرة || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين.

٢٣٩٥٤ - **كلوريات الماء**
Hydrocharidae (S). Hydrocharidées (F). فصيلة نباتات مائية من فصيلة الفلقة. اجسادها وانواعها عديدة. احرف اجنسها الاقطن والظروق وكولة الماء ووش الماء.

٢٣٩٤٢ - **كلوريدات، هيدروكلورات**
Chlorhydrate (F). Hydrochlorate (E). هو ملح الخافض الكلوريدونيكي.

٢٣٩٤٣ - **كلوريد**
Chlorides (S). Chloride (F). جنس حشرات غارة من فصيلة الزمقيقات. انواعها ١٠ جميعها متوسطة اللد هيئها الجسم. مستطيلة القرن الاستشارية المشارية الفواصل. اوتها زاحية. اتحادها غمدة يمتزها تجلجج وتقسيع. رقاتها خاضلة أو زاهمة تركب بعض النباتات من مختلف الفصائل.

٢٣٩٤٤ - **كلوريد البوتاسيوم، كلوريد البوتاس**
Chlorure de potassium (F). Chloride of potassium (E). سماد بوتاسي يحوي من ٤٦ الى ٥٠ ٪ من البوتاس الصريف وهو ملح ابيض اللون يتميز بسمرة ذوبانه في الماء ويهبط انفصاله وركيبه في التربة.

٢٣٩٤٥ - **كلوريد الصوديوم، كلوريد الصوديوم**
Chlorure de sodium (F). Chloride of sodium (E). هو ملح الطعام المعروف.

٢٣٩٤٦ - **كلوريل**
Chlorelle (F). جنس نباتات مائية من الفليات الخضر وحيدات الخلايا الهيريات. هيكلها كروي الشكل، قلعها نحو ٨ ميكرون. تعيش في المياه العذبة جامعات واقر المدد على المدارات والجذريات ويغيرها || وهي وافرة المواد الغذائية اغصها البروتين والغلوسيد والدهم والفيتامينات والكثير من طفيف العناصر || تكاثرها الجنسي في المحيط الملائم يعني اجود النتائج. نتاجها الجاف واقر المواد الغذائية القيمة.

٢٣٩٤٧ - **كلوريات**
Clusiaceae (S). Clusiaceae, Guttifères (F). Clusiaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القملات سفلية الاسدية. اجنسها وانواعها عديدة جميعها اشجار وشجيرات سوقها متصبية أو حارشة. اوراقها ابدة جامدة النصل. ازهارها عشوية التجميع، عمودية الارتكاز أو تاجية. ثمارها نورية، ثمرتها جلدية، لهاها غزير الصفراء الراتينية الصفراء اللون التي تصعب يلية بعد جفافها.

٢٣٩٤٨ - **كلورية**
Clusia (S). Clusia, Clusier (F). جنس نباتات حارشة متسلقة من فصيلة الكلوزيات. انواعها قليلة، سوقها تطول نحو ١٠ امتار تركب الاشجار الحرجية فتتغني عليها || يستخرج من سوقها حليب اصفر اللون، دبق للمادة الراتينية، يستعمل في تلييب جروح الحيوانات اغصها الخليل واليقر.

٢٣٩٤٩ - **كلوفريس التوسج**
Calliphrys rubi (S). Calliphrys des ronces (F). Calliphrys rubi (E).

حشرة من فصيلة القليات وربة حوشليات الاجتحة. موطنها بعض اصقاع البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم. فراشتها جارية قوتها رقيق الازهار. سرقها تعيش على العوج والوزاك والزان || جسمها صغير اللد يطول نحو ١٠ م. يسطحها نحو ٢٨ م. رأسها معتدل الجسم. عينها



كلوريد



كلوفريس العرج

التجميع ، محورية الارتكاز أو تاجية . ثمارها حنسية لا مأكولة لأنها إلى الحشرة البنفسجية || أشهر أنواعها ما يلي .

٢٣٩٦٥ - كليكرتبه أرجوانية ٥

Callicarpa purpurea (S). *Callicarpa pourpre* (F).
جنية زينة وفحة مهددة اليابان . تملو نحو ١٠٠ سم .
أوراقها بيضيه الشكل طول نحو ٧ سم . نصلها انغص
الصفحة العليا ، ازغب السفلى . عقايدها الزهرية رطلة ،
انزهارها أرجوانية اللون زاجية || انزهارها يستمر طوال
شهر تموز .

٢٣٩٦٦ - كليكرتبه أمريكية ٥

Callicarpa americana (S). *Callicarpa d'Amérique* (F).
جنية زينة وفحة مهددة أمريكا الشمالية . تملو من ١٠٠
إلى ٢٠٠ سم . ساقها فراء . أوراقها مستطيلة الاضلاع ،
نصلها خلي البشرة على صفحتيه . انزهارها تاجية . بنفسجية
اللون رطلة المتنايد || انزهارها يستمر من حزيران إلى
تموز .

٢٣٩٦٧ - كليكرتبه صينية ٥

Callicarpa giraldiana (S). *Callicarpa de China, C. de Girald* (F).
جنية زينة جادة مهددة الصين . تملو من ١٠٠ إلى
٢٠٠ سم . ساقها فراء . أوراقها طول من ٥ إلى
١٠ سم . نصلها ازغب الصفحة السفلى زغب نجي التركيب .
انزهارها تاجية كثيفة التجميع وردية اللون || انزهارها
يستمر طوال شهر تموز .

٢٣٩٦٨ - كليكرتبه يابانية ٥

Callicarpa japonica (S). *Callicarpa du Japon* (F).
جنية زينة سريرية مهددة اليابان . تملو نحو ١٠٠ سم .
أوراقها منقطة طول من ١٠ إلى ١٥ سم . وتعرض من
٥ إلى ٦ سم . نصلها لاص الصفحة العليا ، ازغب السفلى
متباحه التسنين للمشاري . عقايدها الزهرية صغيرة القد .
انزهارها وردية اللون || انزهارها يستمر من حزيران إلى
تموز .

٢٣٩٦٩ - كليكنثس ٥

Calycanthus (S). ** كليكنثس* (S).
Calycanthe (F). *Alapica* (E). *Kelchblume* (D).
Calicanto (I).
جنس جنات زينة عطرية من فصيلة الكليكنثسيات .
أنواعه ستة . سطها منتصبه تملو من ١٥٠ إلى ٢٥٠ سم .
أوراقها كاملة متعابلة . انزهارها فردية ، محورية أو هامة
الارتكاز ، جميلة الشكل ، محورية اللون ، فواصة العرف
الطري الشبيه بالفتح والشام .

٢٣٩٧٠ - كليكنثوسيات ٥

Calycanthaceae (S). ** كليكنثوسيات* (S).
Calycanthaceae (F). *Calycanthaceae* (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ، اجناسها وأنواعها عديدة .
نباتاتها اشجار ونباتات . سطها وفردية سطحة . أوراقها
متعابلة . انزهارها جميلة الشكل ، عطرية العرف .

٢٣٩٧١ - كليمنيه ٥ ، كليمنتيت

Clymenia (S). *Clymenie* (F). *Clymenis* (E).
جنس حوليات من الرضويات أرشبات الاجل رباعيات
الخياشيم وفصيلة الفلتيانيات . أنواعها المعروفة نحو ٤٠
جميعها من متصحات الحقة التفهنية || اصداها قروية
الشكل ، محتلة القد . اخودها القروية يستمر من القرفة
إلى القرب .

٢٣٩٥٥ - كلى ٥

من ريش جلع الطائر ما يكو قواعد الابار . ولكل
قسان صغيرة وكبيرة . الصغيرة تلحف الكبيرة والكبيرة
يكون الابار .

٢٣٩٥٦ - كليته ٥

Rein (F).
هي الكوة ، اطليا .

٢٣٩٥٧ - كليترش ٥

Callichrix (S).
Callichrix (F).
جلس قروء أمريكية من فصيلة السبوسيات . انواعه ١٥
موطها حوض الامازون . اجسامها رشيقة . روضها
مستندرة . قوائمها متصلة الطول . اذناها كاسية مملقة لا
اخاذا . اثلها قصيرة الشعر المتجان الاطراف || تألف
الاحراج والنايات . رتمها الانجار تنغل بينها بشفة الطير .
قوتها البار والحشرات والمصابير .

٢٣٩٥٨ - كليش اُرخب ٥

Clytus polu (F).
هو الصلوك الازغب ، اطليه .

٢٣٩٥٩ - كليش اُهيث ٥

Clytus étroit (F).
هو الصلوك الاثيف ، اطليه .

٢٣٩٦٠ - كليثوسيب ٥

Clitocybe
جلس فلور مؤدية من الفاريفريات مركب بمشبه القدي
الشكل اريوات واساخ وجلور بعض النباتات الزراعية
منها الموز والفاكهة والكبيرة ولكننا والكزورينه وقسط
ايضا ، في ظروف خاصة ، الفطاع والمشش والمشب
والجسورة والبيمين || مشبه غزير المادة وافر القند
المتشبة . يتحرك بين الماء والشكر او بين الجردة
والخشب فينبط الارضية والتنج حل اختلافا ثم يقضي حل
التبادل التنسي || يكالنج بقتلح الانجار الموسومة ويظهر
التربة بالكلس الحراق .

٢٣٩٦١ - كليجة ٥

Caliga (S).
Calige (F). *Calige* (E).
جنس دويات بحرية من القشريات الدنيا وفصيلة
الكليجيات . انواعها المعروفة قليلة العدد . اجسامها
صغيرة ، وحيدة العين ، عادمة العاف . تنطقل على
الاملاك .

٢٣٩٦٢ - كليجيات ٥

Caligidae (S).
Caligidae (F). *Caligidae* (E).
فصيلة دويات بحرية من القشريات الدنيا عذائيات
الاجل . اجناسها وأنواعها عديدة . جميعها طفيلية تعيش
على مختلف انواع الاملاك اعصها الفادسيات .

٢٣٩٦٣ - كليش ٥

Caliche (F).
هو ملح التيل كما يستخرج من المناجم وهو يرضى بعد
استصلاحه وتكرره نيرات التيل او نيرات الصودا الطبيعي

٢٣٩٦٤ - كليكرتبه ٥

Callicarpa (S).
Callicarpa (F). *Beauty-berry*, *Mulberry* (E).
Schönfrucht (D). *Callicarpa* (I).
جنس نباتات جنية معمرة من فصيلة الساجيات . انواعها
قلية معظمها زينة . أوراقها متعابلة احليجية ، مستطيلة ،
ممنة الحافة ، عذبة الصفحة السفلى . انزهارها عذوية



كليترش



كليجة



كليكرتبه



كليكنثس



كليمنيه

٢٣٩٨١ - كَمَّءُ أَسْوَد * ، كُشْنُج

Tuber melanosporum (S). Truffe noire, T. de Périgord (F). Black truffle, French truffle (E). Echte Trüffel, Schwarze Trüffel (D). Tartufo nero (I).
نوع من الكم المأكول الجيد الصنف . ذرته كبيرة القدحجها قدر البيضة الصغيرة . ثموها بارزة لونها الى الصبغة . لهاها اسود اللون اسفح الموالج عند الادراك . تدرك في الخريف .

٢٣٩٨٢ - كَمَّءُ شَتَوِي * ، بَسَات الرَعْد

Tuber brumale, T. hiemale (S). Truffa d'hiver, T. hiemale (F). Winter truffle (E). Französische Trüffel (D). Tartufo brumale (I).
نوع من الكم المأكول المتوسط الصنف . ذرته مستديرة حجبها حجم الجرّة . ثموها الى السمرة السوداء . لهاها احمر اللون يمثل بكنهه خاصة . تدرك في الشتاء .

٢٣٩٨٣ - كَمَّاء Rabassier (F).

جامع الكرم .

٢٣٩٨٤ - كَمَّاء Truffe (F). Truffe (E).

واحدة الكرم .

٢٣٩٨٥ - كَمَّاء الماء Macre (F).

في المكر ، نبات من الاندريات ، اطليا .

٢٣٩٨٦ - كَمَّاح Prefloral (F).

Prefloration (E).
لشوز اجزاء واصفاء الزهرة داخل الزيمة اي البرعمة الزهرية .

٢٣٩٨٧ - كَمَّاشة Fein (F).

في الكباشه ، راجها .

٢٣٩٨٨ - كَمَّاشة Pampinsetion (F).

النكاح نومة برام الكرمه وانتشارها .

٢٣٩٨٩ - كَمَّاشة Protérante (F).

كلخ م كاشة . نمت ترميها يطلق حل كل نبات يزهر قبل ان يورق .

٢٣٩٩٠ - كَمَّاد زَيْتُون Germadrée officinale

هو الطوقرين الحزني ويدعى ايضاً عامادريوس .

٢٣٩٩١ - كِمَاس Kemas (S).

Cama (F). Kemas (E).

جنس حيوانات لبنة عاشية مجتره من فصيلة الابلية . انواعه المعروفة اربعة موطنها يمتد من الهند الى الصين وبشوردي . تألف الحصاب والجلال من ارتفاع ١٠٠٠ م . حتى ٢٧٠٠ م . من سطح البحر . ملجها الحياتي جامي . ايجالها قليلة البعد الذي يراوح من ٥ الى ٩ اقطار || اجسامها قريبة الشبه باجسام الطيما كا وانها تشبه الحزري . قرونها صغيرة متناوبة الحيد ، مستقلة الاطراف المنحرفة الى الوراء . رؤوسها صغيرة ذلقة الاعظام . اعناقها مستقيمة . قوائمها شديدة النشط . اثوابها تختلف مع الانواع تكثر فيها السمرة اللبانية للمجات . غمروح اناتها ثنائية الاختلاف . يحبل الاثنى يدوم نحو ستة اشهر تقص في تمامه يغموروا واحداً || اعرف انواهم واشهرها كاس فورال .

٢٣٩٩٢ - كَلْبِيب * Calliopes (S).

Calliope (F). Calliope (E).

طائر من الجلبم وفصيلة الشروريات . موطنه بعض المناطق الشرقية من القارة الاسيوية . ملجته الحياتي زيتي باستثناء زين القطاع حيث يجمع الى اسراب وافرة العدد . يألف البراري والحراج . قوته الحشرات الصغيرة والياور البرية || جسمه صغير القدح ، قريب الشبه بالنج ، طوله نحو ١٦ سم . ثوبه الى السمرة الزرقية المتفاوتة المجات . رأسه ويحتاجه اعين من رذاه . زوره احمر . متفاده غمروبي الشكل . ذنبه مستدل الجرم ، مقطوم الطرف || يذئن عشه حل ارتفاع ٢٥٠ او ٣٠٠ سم . من سطح الارض . الاثنى تحضن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٥ بيضات .

٢٣٩٩٣ - كَلْبِيبَة Cléome (F).

في الفرة ، اطليا .

٢٣٩٩٤ - كَلْبِيب Butter (F). Raising, Mounding (E).

الكم ويدعى التخليق هو جمع التراب عند سوق النبات . الناية منه دم الساق وسحبها حل اضافي الجذيرات وابعاد الماء فيها وزيادة تعريض التربة الى اشعة الشمس ، الخ .

٢٣٩٩٥ - كَمَّء ، كَمَّء Péríanthe (F). Perianth (E).

هو خلاف الزهرة اي جماع الكأس والتويج . وهي سد كماً لانه يمتد ما يخلق عنه . ج اكمام وكام واكة .

٢٣٩٩٦ - كَمَّء Tuber (S). Truffe (F). Truffe (E).

الواحدة كماء والمثنى كاتان والجمع كرم واكرمه وكات . جنس فلور درنية من الزقيات وفصيلة الكشيات . تنبت وتتكاثر تحت الارض تحتفضها . خلاها جلدي الفسج ثؤلولي التركيب يحضن العلة انتفاشية البولية . لهاها سردى التركيب جامد المادة || انواهم عديدة مختلفة الاشكال والاحجام والالوان اشهرها ما يتبع .

٢٣٩٩٧ - كَمَّء أَيْتَش Tubér

hiemalbum, T. album (S). Truffe blanche (F). White truffle, False truffle (E). Weisse Trüffel (D). Tartufo bianco, T. del Piemonte (I).

نوع من الكم المأكول المادي الصنف . ذرته متوسطة القدحجها تشبه الثوم . لهاها ابيض اللون مسكي العرف . تدرك في الخريف .

٢٣٩٩٨ - كَمَّء أَحْمَر * ، مَغْرُود Tuber rufum (S).

Truffe rouge (F). Red truffle (E). Rote Trüffel (D). Tartufo rosso (I).

نوع من الكم المأكول الفاخر الصنف . ذرته مستديرة مغلفة القامة . ثموها ناشرة لونها الى الجوهري الاسمر . لهاها احمر اللون مستحب الطعم ، تدرك في اواخر الخريف .

٢٣٩٩٩ - كَمَّء أَرْمَد * ، بَسَات أَوْتَر

Tuber magnatum (S). Truffe magnate, T. grise (F). Gray truffle (E). Lauch Trüffel (D). Tartufo bigio (I).

نوع من الكم المأكول المادي الصنف . ذرته بيضية الشكل مغلفة . ثموها مستديرة مبطلة رمادية اللون . لهاها اغبر . تدرك في الخريف .



كَلْبِيب



كَمَّء احمر



كَمَّء اوبد



كَمَّء اسود



كَمَّء شتوي



كاشير



كالة



كالية البر



كالية فضية

كالية المروج



كيدود

٢٣٩٩٩ - كَمَالِيَّةُ الْبَرِّ *

Alchemilla arvensis (S). *Alchemille des champs*, *Perce-pierre des champs* (F). *Break-stone*, *Colicwort*, *Pertley piert* (E). *Feldsinau*, *Steinbrech* (D). *Spacca pidra*, *Petricolo* (I).

نوع من الكالية تكثر في المراعي الجبلية .

٢٤٠٠٠ - كَمَالِيَّةُ الْمُرُوجِ * ، كَمَالِيَّةُ مَبْدَلَةٌ ، وَجَلُّ الْبَيَوتِ

Alchemilla vulgaris (S). *Alchemilla commune*, *Mantelet de dame*, *Pied de lion*, *Porte rosée* (F). *Great sanicle*, *Lady's mantle*, *Lion's foot* (E). *Löwenfuss*, *Mantelsinau*, *Sinau* (D). *Alchemilla comune*, *Ventagina* (I).

نوع من الكالية تكثر في المروج . اوراقها لينة شاذفة ومزرة .

٢٤٠٠١ - كَمَالِيَّةُ فُطَيْيَّةُ *

Alchemilla argentea (S). *Alchemilla argentea*, *Saténée* (F). *Alpine lady's mantle* (E). *Alpensinau*, *Alpenfrauenmantel* (D). *Alchemilla alpsina* (I).

نوع من الكالية المزرة تكثر في أسراج الجبال العالية ، اوراقها خالية البشرة فضية المخرج .

٢٤٠٠٢ - كَمَامُ (E). كَمَامُ (F). Caveçon (F). Headstall, Curs (E).

ما يكس به قم الحيون .

٢٤٠٠٣ - كَمَامَةٌ ، مِفْطَمِيَّةُ

Muflière, *Muselière* (F). *Muzzle* (E). اداة تلتف في الحيوان تنمته من الرضاعة والاكل والعض .

٢٤٠٠٤ - كَمْبَرِي (E). كَمْبَرِي (F). Cambrien (F).

اسم يطلق على الحفنة الأولى من الابراج القديم . يقال الصخر الكمبري والحفنة الكمبرية ، وهي تتميز باحترائها على اقدم صخر الكرة الارضية .

٢٤٠٠٥ - كَمْبُودُ * (S). Campodea (F). Campodea (E).

جنس حشرات دامت من فصيلة الكمبوديات ورتبة لاختات الشك . انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة || اجسامها صغيرة لينة ، مستطيلة الشكل ، متحدة التسطيع ، مبرشة الحلب التثقيب اثنام ، تحل في الى ٦ مم . افراسها الى البياض البتني . روثها شبه مكورة . شاكها لاختة . قربها الاستشارية خيطية . عيونها شديدة الصغر . صدورها لثائية الحلقات ، بطونها عشارية الشكل ، قصية ، اي سريعة الحلب . قوائمها نحلة . اسرافها ثنائية العقل . اسراكها دقيقة مستطيلة || يتكرر وجودها تحت الحجارة وفي المواقع الرطبة . قوتها المواد النباتية المنحلة .

٢٤٠٠٦ - كَمْبُودِيَات (S). Campodeidae (F). Campodeidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة لاختات الشك . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمتعددة الحرارة || اجسامها صغيرة ، قصية ، بياض اللون . عيونها شديدة الصغر . حلقها الصدرية الاولى اصفر من الثانية والثالثة . بطونها عشارية الشكل . قوائمها الاولى مجهزة بيزواك حوصلية تنفسي . سكبها الثانية والسابعة مجهزة بمرايد صغيرة . افراسها الشرجية لثائية الاسراك || افراف اجناسها الكمبود .

٢٣٩٩٢ - كِمَاسُ غُورَال * (S). Kemas goral (S).

Céma goral (F).

نوع من الكاس . موطنه يمتد من كمشير الى برمانية واصام . يأنف الرصر للمواقع الكثيرة الضخورة . يسرح من الجبل الى نحو الساعة الثامنة ومن العصر الى فحة الليل || جسمه ربعة بطول نحو ١٣٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٠ سم . ارتفاعه نحو ٨٠ سم . وزنه نحو ٧٥ كيلو . قوته بطول نحو ١٨ سم . عند الذكر ويحوي ١٤ سم . عند الانثى . رأسه صغير الجرم ، ذلق الخط . عيناه كبيرتان مكشلتان ومبطنتان بخار اصفر . اذناه صغيرتان مستطيلتان الشكل . قوائمها شديدة النشط . ثوبه الى السرة الحمراء المزاج يمتد في الرأس والظهر ويحيط تدريجياً الى الشقعة في الصدر والبطن || اجله يمد ثمة انفار ، ذكر مانع واربع اناث واربعة شواذن .

٢٣٩٩٣ - كَمَاسِيَا (F). Camassia (F).

هي الكش من الزنايق ، اطليه .

٢٣٩٩٤ - كَمَاسُ * (S). Polycarpa (S).

Polycarpée (F).

جنس نباتات عشبية حولية وبسرة من فصيلة النيمانيات . انواعها المعروفة عديدة ستمها معظم الاصقاع الحارة من العالم القديم || سطوها مستطيلة متعبدة القروع . اوراقها متعابلة رحيمة النصال . ازهارها خالية البتلات والسبال الفصيلة الحادة الاطراف . لونها الى البياض الاصفر المخرج .

٢٣٩٩٥ - كَمَاسَانِير * (S). Athamanta macedonica (S).

Athamante, *Ache des rochers*, *Persil de Macédoine* (F). *Macedonian parsley* (E). *Macedonica Peteriille* (D). *Prezemolo di Macedonia* (I).

نبات عشبي بري معمر ميلول من فصيلة الحميات . اوراقها مفرفة وبسرة تصلها على البشرة على صلبها . ازهارها صيرلانية وردية اللون . يقال انه طهي يستعمل في معالجة العوارض المعوية .

٢٣٩٩٦ - كَمَافِيطُوس (S). Kamafitis (F).

قال الانطاكى « هو الحمايطوس يعني صنوبر الارض ثبت كسي » العالم الصغير في تقتيل اوراقه وامتلأها بالارطوية وراكمها له زهر اصفر يختلف حياً اصفر من برز الكرش ابيض الاصول مر الطم يفتح السد ويدور ويذلل الرياح ويواجه الطهر والمفاصل . »

٢٣٩٩٧ - كَمَالَةٌ * (S). Echinus phillipensis (S).

Kamala (F).

جنية زراعية معمرة من فصيلة البتوريات . مهدها الحن . ساقها فراه . اوراقها منقطة ، متعالية ، بيضية النصل المذهب الطرف . ازهارها عقودية التجميع تاجي الازتكاز ثمارها بلوطية الشكل تغلفها ثمل دقيقة تتحول الى غبار يرتقالي اللون حنطلي المخرج يستعمل في مياغ الالفة الحربية ويستعمل ايضاً لطرد البؤدة الوحيدة . النشمة منه تروخ من قرامين الى ١٢ غراماً وذلك بالنسبة الى عمر المرو .

٢٣٩٩٨ - كَمَالِيَّةُ (S). Alchemilla (S).

Alchemilla, *Alchimille* (F).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الورديات . انواعها قليلة منها الحولية والمزرة تكثر في المراعي والارواح الجبلية . يحزن لها بفس الحواس الطلية ويقولون انها شاذفة وتؤثر اغشية البكرة تنفسي الرائي ففقد كمين .

بعض الإصقاغ الأمريكية أحصيا كليفورني والمكسيك ||
جسمه كبير القد . طوله نحو ٧٠ سم . وبسطه نحو
١٠٠ سم . ثوبه إلى السواد اللامع . جناحاه مبلقان
بالأبيض . حذقة عين إلى الصفار الذهبي . مقادده وساقاه
وأصابعه إلى الزرقة الطحلاء || أخلاقه رضية لكنه يتجنب
الإنسان ويبتعد عن العمران . يتسلق جلود الأشجار
قفزاً . طيراته طويل الشوط كثير التجمعات والسيف ||
قوته الحشرات على اختلاف فصائلها وأجناسها ثم الأثمار
البرية والبلوط || يعيش ذكراً واثناً لا يفرقها سوى الموت .
يذئن عنه في تجاويف الأشجار الرقيقة . الاثنى تبيض
من ٣ إلى ٥ بيضات تحضنها وحدها دون الذكر الذي
يؤنن لها الغذاء .

٢٤٠١٩ - كمفيل أميرى *

Campophilus principalis (S).
Campéophile princier (F).

نوع من الكمفيل موطنه بعض مناطق أمريكا الشمالية من
فلوريدا إلى كاليفورنيا والتكساس || جسمه كبير القد
طوله نحو ٥٨ سم . وبسطه نحو ٨٢ سم . ثوبه إلى السواد
اللامع . جناحاه واطلاعه منقطة مبلقة بالأبيض . حذقة
عينه إلى الصفار الذهبي . مقادده حاجي اللون . ساقاه
وأصابعه إلى الزرقة || أخلاقه خنية لكنه كثير التجمهر .
قوته الحشرات والإساريج والنمل وإثار البرية والبلوط
والبلوط || يتسلق الأشجار قفزاً . طيراته متدل الشوط
كثير التجمعات || يعيش ذكراً واثناً لا يفرقها سوى
الموت . يذئن عنه في تجاويف الأشجار على ارتفاع بعض
الامتار . الاثنى تبيض من ٣ إلى ٥ بيضات تحضنها
وحدها دون الذكر الذي يؤنن لها الغذاء .

٢٤٠٢٠ - كمككات *

Kumquat *
هي ليمون ككات . ثمرة ريفية مشمرة من الحمضيات .
لها خربان مشهوران هما :

٢٤٠٢١ - كمككات مُستديرة *

Citrus japonica madurensis, *Limonellus madurensis*
(S). *Kumquat à fruits ronds*, «*Marumia*» (F).
حُرب من الكمككات . اسمه الياباني «مارومي» * ثمرة
سرسة متوسطة القد تملو نحو ٤ أثمار . أوراقها منقطة
متعاقبة سنائية . فصلها جامد الصفحة الخضراء اللامعة .
ثمارة كروية صفراء اللون مائلة البشرة . قشرها يراوح
من ٢٠ إلى ٣٠ م .

٢٤٠٢٢ - كمككات مُستطيلة *

Citrus japonica margarita, *C. margarita* (S). *Kum-*
quat à fruits oblongs, «*Nagami*» (F).
حُرب من الكمككات اسمه الياباني «ناغامي» * ثمرة سرسة
متوسطة القد تملو نحو خمسة أثمار . أوراقها متعاقبة ،
منقطة ، سنائية ؛ فصلها جامد الصفحة المائلة ، شديدة
الحضار اللامع . ثمارة مستطيلة أحجامها الشكل صفراء
اللون طولها نحو ٤٠ م . وعرضها ٢٥ م .

٢٤٠٢٣ - كمككام

Essence de la marjolaine (F).
Oil of the sweet marjoram (E).
هو دهن الرو يستعمل في الطبخة . يستخرج بتقطير
الأزهار والأوراق بعد تقمها بالماء . وهو أصفر اللون
يخضر ويصير مع مرور الزمن . عرقه ذكي الرائحة ، حامز
الطعم ، يغلي عند ١٦٤ °سغ . ويذوب بالكافور في
الكحول حيار ٨٥ .

Cambium

٢٤٠٠٧ - كمببوم
هو القُلب الطبقة المولدة في النبات .

٢٤٠٠٨ - كممّ

هي الاروسة ، اطلها .

٢٤٠٠٩ - كممّرة

هي الاجاصة ، ثمرة الاجاص .

٢٤٠١٠ - كممّرى

هي ثمرة الاجاص .

٢٤٠١١ - كممّج

كع الكرم اذا تحرك للارواق . واكمت لازمة اذا ما
ايضت وظهر عليها خل كالقطن .

٢٤٠١٢ - كممّر

الكسر من البسر : ما لم يربط على نخله ولكنه سقط فارطب
في الارض . اما النخلة لكبار .

٢٤٠١٤ - كممّس *

Camassia (S). *Camassia*, *Camash*, *Cyanotride* (F).
Camass, *Quamash* (E). *Quamassie* (D). *Camassia* (I).
من الاسم المحدث «كش» . جنس نباتات بصلية من
فصيلة الزنبقيات . اقواها المعروفة نحو ٨ منها البرية
والزراعية . اوراقها قرصية الالتشاب شقيقة مستطيلة .
شبارنها اسطوانية جبهة . ازهارها عقدوي التجميع
يكلل الشاربخ . ازهارها نجمة الشكل فارشة || احرف
انواعها واشهرها ما يلي .

٢٤٠١٥ - كممّس جوتى *

Camassia hyacinthina, *C. fraseri* (S). *Camassie-*
jaictho, *Camash-jacincta* (F).
نوع من الكممّس البروتي الزنبقي . شراخه يملو نحو ٣٠
سم . بسات ازهاره لثالية العروق تطول من ٦ إلى ١٢ م .
لونها إلى الوردي يملو موانج ليكي || ازهاره يستمر
من نيسان إلى ايار .

٢٤٠١٦ - كممّس ليشتين *

Camassia leichtholmi (S). *Camassie de Leichtholm*,
Camash de Leichtholm (F).
نوع من الكممّس البروتي الزنبقي . شراخه يملو نحو
٩٠ سم . بسات ازهاره خاسية أو سباعية العروق
تطول من ١٥ إلى ٢٥ م . فروبه المشهورة اربعة تختلف
بالونها منها الأبيض والاصفر والازرق والبنفسجي .
ازهاره يستمر من نيسان إلى ايار .

٢٤٠١٧ - كممّس مأكول *

Camassia esculenta (S). *Camassie comestible*, *Cam-*
ash comestible (F).
نوع من الكممّس البروتي الزراعي المأكول البصل . شراخه
يملو من ٤٠ إلى ٨٠ سم . ازهاره إلى الزرقة اللبنة الموانج ،
بساتها خاسية أو سباعية أو قساعية العروق تطول من ٢٠
إلى ٣٠ م . مما يجعل قطر الزهرة يراوح من ٧ إلى ٣ م .
ازهاره يستمر من ايار إلى سزيان .

٢٤٠١٨ - كمفيل امبراطوري *

Campophilus imperialis (S).
Campéophile imperial (F).
طائر من فصيلة النقايات ورتبة المتسلقات . موطنه



كش



كمفيل امبراطوري



كمفيل اميري

مستديرة
مستطيلة
ككات

٢٤٠٤٨ - **كناريوم** * Canarium (S).

Canarion, Canari, Canarium (F). Almond, Elemi tree (E). Kanarienbaum (D). Canario (I).
جنس شجيرات برية من سبط البفوريات وفصيلة البطميات.
أنواعه المعروفة نحو ٦٠٠ جميعها من نباتات المناطق الاستوائية،
تقترن عصارة راتنجية يبيض اللون ببطيئة الاشتعال قوية
الهب فواحة العرف المستحب. اشجارها مبلية ببيض اللون
لكنها لا تصلح للاستعمال الصناعي.

٢٤٠٤٩ - **كنساس** Gîte (F). Lair (E).
مأوى الطير في الغاب بين الشجر يستتر فيه. ج. كنوس
واكناس.

٢٤٠٥٠ - **كنشاشة** ° Lignée (F).
° Issus, Progeny (E).
ج. كنشاش وكناش. هي الاصول الموصفة المشتبة
كأمهات لسلالات نباتية معينة.

٢٤٠٥١ - **كنشاهة** ° Tectonique (F). Tectonic (E).
علم يبحث في تكوين الأرض وتوابعها.

٢٤٠٥٢ - **كتب** Cal (F). Callus (E).
نسيج دامل يغطي الفراخ الذي احده الجرح في الشجرة.

٢٤٠٥٣ - **كتب** Callose, Calloous
اندسال في الجلد مظهر نقط رافعة متصلبة أو تدرجات
جامدة.

٢٤٠٥٤ - **كتبات الحقل** Equisette (F).
هو الأسرخس، اطليه.

٢٤٠٥٥ - **كتبات الشتاء** Prêle d'hiver (F).
هو الأسرخس الشتوي، اطليه.

٢٤٠٥٦ - **كتبيات** Equisetaceae (S).
Equisétacées (F). Equisetaceae (E).
هي الأسرخشيات، فصيلة نباتية من مستورات الزهر
الروائية.

٢٤٠٥٧ - **كتبار** Chamaedorea (S).
Chamaedorée (F).
جنس اشجار ليفية من فصيلة النخلات. أنواعه المعروفة
١٠ اصطناعا الاقاليم الحارة معظمها امريكى المنبت وبعضها
افريقي. تزهر القزوين، جلومها تملو من متر الى تسعة
امتار، سفها يطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. كواثيرها
عديدة، قنوابها لينة، ثمارها كرزوية الشكل رائحة،
ناضجة المادة للاستعملة || اشهر انواعه التريينية :
كتبار البق °

Ch. elegans (S).
Chamaedorée élégante (F).
كتبار شامع
Ch. elatior (S).
Chamaedorée élevée (F).
Ch. gracilis (S).
كتبار ظريف
Chamaedorée gracieuse (F).

٢٤٠٥٨ - **كتبث** ° Chenopus (S).
Chénopée (F). Chenopus (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربل
وفصيلة الكنبشيات. أنواعه المعروفة كثيرة العدد، المعاصر

٢٤٠٤٢ - **كسمكة** Caecum (S).

Caecum (F). Caecum (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربل
وفصيلة الكسميات || أنواعها المعاصرة المعروفة نحو ١٠٠
متشعبة في جميع مجار البلاد الحارة والاستوائية || اصداها
صغيرة، انبوية الشكل، عازلة القنة المقوسة. أنواعها
دائرية. اسفاطها ممتلئة، قرنية الفشاء. لولاسها عادمة
الليزن.

٢٤٠٤٣ - **كسميات** ° Caecidae (S).
Caecidées (F). Caecidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربل
اماميات الخياشيم وصيدات الاجهزة || اجناسها وانواعها
المعروفة عديدة، معظمها من متحجرات الاياج الثالث.
اما الانواع المعاصرة فنحو ١٠٠ تنتمي الى جنس واحد
يهدى كيهة.

٢٤٠٤٤ - **كسمكة** * Lepidogaster gouanii (S).
Barbier, Porte-écuelle (F). Sucker (E).

سمكة من فصيلة الرغريات يكثر ببهجها في المتوسط. تتميز
بكبر رأسها واتسالة زمانفها الصدرية والظهرية. جسمها
متوسط اللد، ثوبها جميل الالوان الزاهية يعلب فيها الوردي
للنخب المواج. يطنها نضي الالين. يحسرها رنج ظهرها
متمزعة التجليح الاسمر، لحها متوسط الصفب.

٢٤٠٤٥ - **كتاب** Callosté (F).
هو الجبسة، اطليا.

٢٤٠٤٦ - **كنار** * كناري، حنكر Serinus canaria (S). Serin des Canaries, Canari (F).
Canary (E).

نوع من النر وهو صفور فريد اصفر اللون، انضمر
المواج يري في الانقاص. ضروبه وسلالاته الحالية عديدة
تختلف باختلاف القرب والحجم || موطنه الاصلي جزر
كناريه وهو يأنث الأماكن القريبة من الماء لانه يقتبل
كل يوم، قوته البزور البرية الصغيرة ونواحي النبات وبعض
الانمار السكرية انحصا اثنين التانجيس السامع. وهو في
القفص يعيش نحو ٢٠ سنة على بزر المكس والبسيبية
والقزوين والشام المنقوع وانس والبار السكرية والحطب
المنقوع بالحليب الدلي وصفار البيض || الانثى تحضن
ثلاث مرات في الحول. سفنتها تراوح من ٣ الى ٥
بيضات صغيرة الحجم فراء القشور المرقشة بالجلوي
رغمها يتسقم ١٣ يوما || وهي تساند النفر والحسن
والكسر والخفيري والتضييبي والشروش والوروي ...
تجانس نغل قري الشكية متراكب الالوان المتداخلة
المرتكة على الاصفر.

٢٤٠٤٧ - **كنارين** ° Canarina (S). Canarine (F).
جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة الجريسيات. انواعها
قليلة اصطناعا جزر كناريه. جلدورها غليظة وشية. سوقها
تملو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. حصاربها حليابية ديدة.
اوراقها متقابلة، معتقة، رعيمة. نصلها مالمش البشرة،
سمن الحافة، بحري الالين. انماها تمية الشكل، كبيرة
القد، مستطيلة المفايق متدلية. لونها الى الصفرة النديية
وروقها الى الحمرة. ثمارها جنبية مأكولة.



كيهة



كنار



كنارينوم



كتبار انيق

يقار إلى ذلك باناسة ١٥ فيصح التصريف إذ ذلك
كنا أو ككا أو ككا الح.

٢٤٠٦٦ - كُنُتُجُوس ، كُنُجُوس (S). Cajanus

(F). Cajan

جس نباتات ليفية خشبية معمرة من فصيلة القرنيات
القرشاية . أزهارها ضفدية مظهرها يري وبصفا زاهي .
اصطناعها البلاد الحارة والاسوائية . سيقانها متضخمة . أوراقها
متضخمة ، مركبة ، ثلاثية . أزهارها لوزية التجميع . ثمارها
قرون مسطحة غصورية القواصل الحية ٥ اعرف انواعه
واشهرها الكنجوس الهندي .



كنيت

٢٤٠٦٧ - كُنُتُجُوس هندي * ، كُنُتُجُوس هندي * ، كُنُتُجُوس هندي * ، كُنُتُجُوس هندي *

هندي * ، كُنُتُجُوس هندي * ، كُنُتُجُوس هندي * ، كُنُتُجُوس هندي *
Cajanus indicus (S). Ambrevade, Pois d'Angola, Pois
d'Angola (F). Doll, Pigeon-pea, Cajan-pea, Congo-
pea (E). Catjan, Angolische Erbsen (D). Cajano dell
India, Cicio dell India, Pisello d'Angola (I).

نوع من الكنجوس ازراري . فزوهه عديدة شائعة استعمال .
ساقه ليفية ، خشبية ، فروع ، زياه ، تعلو من ١٥٠
الى ٣٠٠ سم . أوراقها مركبة ثلاثية ، ورقانها احليجية
التصل ، خلية البشرة حل فسحجها . أزهارها لوزية التجميع ،
صفراء اللون ، موفقة بالاخر . ثماره قرون مسطحة تعلو
من ٤ الى ٧ سم . ثقلها من ٣ الى ٥ حبات مستديرة
مغلطمة قهريا قطر الحبة ، لونها يختلف مع الفرب
منها الابيض والحلتي والاسمر والاخر والمقرقوش ٥ قرونه
الخصر تطيح كالقوياء . حبه التامنج الجاف صلب
المادة يستعمل يده يصفه وهو غزير العناصر الغذائية يحوي
ما قل :



كنور العنكب



كنجوس هندي

٢٤٠٦٨ - كُنُتَب

Anaphalis (S).
Anaphale, Anaphalide (F). Pearly everlasting (E).
Weisses Perikörbchen (D). Semprevia blanca (I).
جس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات . انواعه
المزودة قليلة . أوراقها متضخمة مضفرة قطنية . رؤسها
الزهرية مقلقة التجميع . أزهارها حامية لوزية . ثنائياتها
ضيقة . يزورها مستقلة ٥ اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٤٠٦٩ - كُنُتَب الثَّيْت

Anaphallis nubigena (S). Anaphalide du Tibet (F).
نوع من الكنجب الثريبي يطلو من ١٥ الى ٢٠ سم .
وأوراقه مضفرة قطنية . أوراقه سنانية التصل وسيدة العرق .
رؤسها الزهرية وسيدة ، أزهارها صغيرة مضفرة حامية
اللون . أزهارها يستمر طوال شهر تموز .



كنجب ثمني

٢٤٠٧٠ - كُنُتَب ثُمُنيّ *

Anaphallis margaritacea, Antennaria margaritacea
(S). Anaphallis nacrda, Immortelle blanche (F).

نوع من الكنجب الثريبي يطلو من ٣٠ الى ٦٠ سم .
أوراقه ضيقة تطول من ١٢ الى ١٤ سم . وتعرض نحو ٥ .
تصلها اخضر الصفحة العليا زعفران اللون السفلى البيضاء زعفران
رؤسها الزهرية كبيرة اللدة ثمنية اللون واللمعة ٥ أزهارها
يستمر طوال الصيف .

منها وقد يتجاوز ٤٥ يمشي في جدار شمال المحيط الاطلسي ٥
اصداها صغيرة اللدة وضحية عازلة مثقلة الاولية . فوجها
معتدلة الانفرج ، رباعية الفلق للامتساوية التي تبدو
كأربل التم شكلا وحطابا .

٢٤٠٥٩ - كُنُتِيَّات * (S). Chenopodiidae

(F). Chenopodiidae (F). Chenopodiidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات معديات الاريل .
اجناسها وأزهارها المزودة المرفقة عديدة بعضها من متحيرات
الاحتجاب الجهرية والظاشرية وبعضها محاسر منتشر
في منظر جدار البلاد المعتدلة الحارة ٥ اعرف اجناسها
واشهرها الكنجب والذريقة والحريغود والفصجية .

٢٤٠٦٠ - كُنُتَب

Auvent (F).
Pent-roof, Porch roof (E).
سقيفة مسطحة لاقياس الطول والعرض والاعتدال ترتكز
على حائط او بناء .

٢٤٠٦١ - كُنُتَب

Enveloppe, Revêtement (F).
Covering, Facing, Revetment (E).

كل مادة حاجزة توضع لوقاء الشيء وسره .

٢٤٠٦٢ - كُنُتَب

Biblos (F). Curio (E).
ج . كتاب . هي الأشياء الصغيرة الفاعرة الصنع من تماثيل
وغيرها توضع للزينة .

٢٤٠٦٣ - كُنُتَب

Cantharide (F).
هو الذراع ، اطليه .

٢٤٠٦٤ - كُنُتُور الشَّكَّة *

Agapanthia cardui (S). Agapanthia des chardons (F).
Agapanthia cardui (E).

حشرة واسعة غاشلة من فصيلة القرنيات ورتبة مفدمات
الاجنحة . موطنها يشغل معظم اقالم حوض البحر الابيض
المتوسط . تألف جميع انواع الشكوك والقصبيات . غناصها
تميش على الازهار . يرقانها تسردب اربوات النباتات
المائلة ولا تمت من سورها ٥ جسمها صغير اللدة ، اهيف
الشكل ، يطول من ٧ الى ١٢ سم . ثوبا الى الزرقاء المائلة
يعملوها موج سوري وثلاثة خطوط حامية تقطع الكوسل ،
وتصلان اصفران يكتنفان الدرز الغصدي . رأسها مستطيل
الجرم يدور بمطلمة تحت الكوسل . عينها صغيرتان .
زبانها غسطين ، مهابان . أزهارها مذهب الحمار . غمدانها
معدلتا الصلابة ، متشابها التميز القاطب . ارسافها
حماسية العقل ٥ الاثن امير كذا من الذكر وابنت ثوبا
منه والفر زبانا ٥ لما جيل واحد في الحل . تظهر
الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتبقى حتى اواسط آب .
تسرح في النهار وتبيت في الليل ٥ البرقة حنة ادراكها
الكال الجسوري الذي يحصل بعد التقف بنحو ٣٨
اسبوعا ، تطول من ١٨ الى ٢٢ سم . جسمها دقيق الجرم ،
مستطيل الصدر ، مستدق السكة الشرجية ، سدسي
الرواجب . ثوبا الى السمرة المخيطية الثنراء للولاج يكتنفها
تقطين اسود يطوه بفص الحلب .

٢٤٠٦٥ - كُنُج

هو حاصل التجمين اشبل كان ام الشيب . يعرف عنه
عدادة بحرف ك ٥ اما السلالة الاولى فصر فيها ك ٥
والسلالة الثانية ك ٥ والثالثة ك ٥ . واذا هجن الكنج من
جديد مع احد طرفيه ، وهو ما يدعى التاثير او الدجلة ،

Gypsophila elegans (S). كُنْدُسْ أُنِيَق ٢٤٠٨٠
Gypsophile élégante (F).
 عشبة حولية تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. جلورها، دقيقة ساقها قوية متصبية. أوراقها سنانية ذلقة، نصلها وسيد البرق. أزهارها مستطيلة المالمق، يبيضه اللون أو وردية. أزهارها يستمر من تموز إلى ايلول.

٢٤٠٨١ - كُنْدُسْ دَبَحِيَّ الرَّقْ
Gypsophila scorzonerifolia (S). Gypsophile à feuilles de scorzonère (F).
 عشبة سبروتية معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها كثيرة الفروع المستطقة. أوراقها سنانية، نصلها قلبي القاعده خماسي البروق. أزهارها إلى الحفرة الجملية، كلها أخضر اللون صغير القند يطول نحو ٢ سم. || أزهاره يستمر من تموز إلى ايلول.

٢٤٠٨٢ - كُنْدُسْ دَرَب
Gypsophila acutifolia (S). Gypsophile à feuilles aiguës (F).
 عشبة معمرة زباد تملو من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها فراءه. أوراقها بحرية اللون خلية البشرة حل صفحتها. أزهارها وردية، كرونها إلى البياض الاخر تملو حسة خطوط حر || أزهاره يستمر من تموز إلى ايلول.

٢٤٠٨٣ - كُنْدُسْ كَثِيرِ الزَّهَر
Gypsophila floribunda (S). Gypsophile multiflore (F).
 عشبة حولية سبروتية تملو من ١٥ إلى ٢٠ سم. ساقها دقيقة الفروع. أوراقها صغيرة ذرية. أزهارها كثيرة العدد، صغيرة القند، وردية اللون، كلها خماسي الفلق المسننة المصنوعة بطنين ابيضين يتوسطها خط أخضر. أزهاره يستمر من تموز إلى تشرين.

٢٤٠٨٤ - كُنْدُسْ لَرَج
Gypsophila viscosa (S). Gypsophile visqueuse (F).
 عشبة حولية لزجة تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. ساقها فراءه. أوراقها سنانية؛ نصلها خلي البشرة الزرقية، ثلاثي أو خماسي البروق. أزهارها وردية اللون قصيرة المالمق || أزهاره يستمر من تموز إلى ايلول.

٢٤٠٨٥ - كُنْدُسْ مَدَادْ
Gypsophila repens (S). Gypsophile rampante (F). Chalk plant, Cloud plant (E). Kriechendes Gipskraut (D). Gesso fita (I).
 عشبة سبروتية مبلولة معمرة تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. ساقها ليفية مدادة. أوراقها سنانية مستطيلة. نصلها بحري اللون وسيد البرق. أزهارها كثيرة العدد، صغيرة القند، وردية اللون أو يبيضه || أزهاره يستمر من حزيران إلى ايلول.

٢٤٠٨٦ - كُنْدُسْ مِصْرِي
Gypsophila struthium (S). Gypsophile fruticose, Saponaire d'Egypte (F). Egyptian soap root, Struthium gypsophila (E). Spanisches Gypskraut (D). Saponaria vera, Struzio (I).
 عشبة برية مبلولة معمرة تكثر في البلاد المصرية حيث تستعمل في النسيج. ساقها مدادة. جلورها متوسطة الخشانة. أوراقها خفيفة؛ نصلها خلي البشرة، بحري اللون. أزهارها صغيرة القند وردية اللون أو يبيضه.

٢٤٠٨٧ - كُنْدُسْ
Pie (F).
 هو الملقق، اطليه.

Pterygode (F). كُنْدُسْ ٢٤٠٧١
 الكندسية جناح زائد صغير القند، قلبي الشكل، يلبس الروش عند قاعدته في رقية حزفتيات الاجنحة. وهما كندسيان، يعني ويسرى، تستعملها الفراشة لكسح وطفها الامانيون.

٢٤٠٧٢ - كُنْدُسْ أَرَا
Cantharus (S). Canthère (F). Bream (E).
 جنس اسماء بحرية من الاسبروديات الشاككات الزعانف الكثيرات الفلوس. انواها ثلاثة. اجسامها يضيئه الشكل، طولها يراوح من ٤٠ إلى ٥٠ سم. زوائفها الظهريه قشبه السنام. تألف الفرو الهيد ولا تقرب من الشواطيء الا في بعض الازمنة.

٢٤٠٧٣ - كُنْدُسْ أَرَا مَبْدُولَة
Cantharus cantharus (S). Canthère commun, Griset (F). Common sea-bream (E).
 نوع من الكندارية. سمكة بحرية يعيش من فصيلة الاسبروديات وريقة شاككات الزعانف. مسرعها المالحح تألف الشطوط والايوار وتدخل المائي. اعطائها البحر الابيض المتوسط || جسمها اطليبي الشكل، محتدل التبيط، يطول من ٤٠ إلى ٥٠ سم. ثوبا إلى الشهية الغضية المالحح تشدد سمربا في الظهر. جانبها شيزان تضطيق قاطبة صفراء اللون. رأسها كبير الجرم، قصير أنف، فكها متعادلان. شاقها مستحدل الانفراج. اسنابها رباعية الصفوف في الفكين. ميناها صغيرتان، ثلاثتان. زعنفتها الظهريه واحدة سنانية الشكل. زعنفتها اللدلية قارئة || لحمها متوسط الصنف، مأكول.

٢٤٠٧٤ - كُنْدُسْ هو كركند السند، اطليه.
٢٤٠٧٥ - كُنْدُسْ هو البان الذكر، اطليه.

٢٤٠٧٦ - كُنْدُسْ يُوْرُوْم، مِيْتُوْنْدُرِي
Chondriosomes, Mitochondries (F). Chondriosomes, Mitochondria (E).
 هي جسمية الكنداس التي تتألف منها الخبيرة الحيوانية او الخلية النباتية.

٢٤٠٧٧ - كُنْدُسْ يُوْم
Chondriome (F).
 هي المية، اطليه.

٢٤٠٧٨ - كُنْدُسْ
Gypsophila (S). Gypsophile (F).
 جنس نباتات حشيش من فصيلة القرنفليات. انواها زهاء ٤٠ منها الحولية والمعمرة والبرية والزارية. سقها فراءه. أوراقها صغيرة القند متطابقة. أزهارها خمسة التجميع، تاجية الاوتكاكز، صغيرة الحجم. جلور يضيها صناعية يستخرج منها مادة الصابونين وتستعمل في خيل الانسية الصوفية والكاتانية والطنينية تنظفها من الاقذار وتكسها بعض الزهراء والريق || أبرز انواها واشهرها ما يلي.

٢٤٠٧٩ - كُنْدُسْ الصَّخُور
Gypsophila petraea (S). Gypsophile des rochers (F).
 عشبة سبروتية معمرة برية تعيش في الازرية والصخور الكلدية. تملو من ١٠ إلى ١٥ سم. جلورها غليظة. ساقها ليفية مدادة. أوراقها صغيرة القند، بحرية اللون، بنفسجية القاعده والمنت. أزهارها متقاربة لونها إلى البياض المالح. قناباتها يضيئه الشكل ثنائية التركيب || أزهاره يستمر من حزيران إلى آب.



كندارة



كندارة مبلولة



كندس الصخور



كندس مداد



كندس مصري

Ple vagabonde (F). كُنْدُشْ جَوَّال - ٢٤٠٨٨
مائر من الجوامع يدعى كطري، اطلبه.

٢٤٠٨٩ - كَنْدَلَاءُ، كَنْدَلِي
نبت ينبت بماد البحر ويعرف بالثورة. قشره يسي
الأيدع يدبغ به (اللسان).

۲۶۰۹ - کَندَم ، جَوَز کَندَم
Mangouste (F), Mangosteen (E).
ریڏی، الجندم، هو شِمره جنم منستان.

٢٤٠٩١ - كُنْدُوج
 Silo
 شبه مخزن يشاد في الارض يضره التراب مخزن فيه الحبوب .

٢٤٠٩٢- كُنْدُور* ، قِصْر أَمْرِيكِي ، قِصْر
فَحَّاح

Sarcophagus condor, **S. gryphus** (S). Condor des Andes (F). Condor (E).

طائر من النسر ينتمي الى فصيلة الزمرياحات ، جثة كبيرة قد تصل الى نحو ١٦٠ سم. اما بسطة سطحية نحو ٢٥٠ سم. رأس مستطيل الشكل يحمل على جبهة هز اخر . منمر كبير القذ ، عريض الانقباض ، يحيط العين الزرقاء الخافتة . منقح انفر الريش كالرأس ، سطوح بالأبيض الصافي المواج ، بسطة لمنقح ، تخالفه كبيرة . ثوبه الى الصفرة الموحى بالاسود . قوامه يقبض ١٠ سم. اطراف جبال الارتفاع الى ٣٠٠٠ الى ٥٠٠٠ م. من سطح البحر . نظامه الحيواني جامي . من ريد من ١٠ الى ٢٥ ذرياً . يلتصق بيضه الى رافعة السراير ، ورغب في الجفت وان تكبر الى بعد يومه اصعد الايايل والذئب وكل ما استطاع اليه سيلا . يشتركه في الخفض في اوتاب الصخور الملققة في تنوع الجبال الزرقية . انشاء قنص وقتين كبيرتين تحضنه في سدها نحو ٤ يوما .

٢٤٠٩٣ - كِنْدِيَّة * ، زَهْرَةُ الْمَرْجَان
Kennedy (S), Kennéde, Kennédy (F), Coral creeper (E), Kennéde (D), Kennedy (I).

جنس نباتات ليفية عازلة بورية وزيتينة من فصيلة القزليات
الفراشية. أنواعها ١٢ معظمها زينة ، بعضها زراعي تطلق
من متر إلى عشرة أمتار. أوراقها متعاقبة متعقة ثلاثية
المفصوص. أزهارها كبيرة القند فردية أو عنقودية التجميع
محورية الارتكاز أو طرفية لونها إلى الحمرة ومنها البوردية
والابرجوانى والقرنيزى والياقوتى ... || أشهر
الزينة :

splendens (S). كندية مبرقة
 année splendide (F). كندية هراء ، كندية بالقزمية
 rubicunda (S). كندية حمراء ، K. à grandes fleurs (F). كندية حمراء
 nigricans (S). Kennédie noire (F). كندية سوداء
 coccinea (S). Kennédie écarlate (F). كندية فحولة
 glabrata (S). Kennédie glabre (F). كندية مبردة
 prostrata (S). كندية مستقيمة
 année couchée (F). كندية مستقيمة

٢٤٠٩٤ - كُنُس هو الشنقب ، اطلبه .

أستروئيد (F). Asteroïd (E). **كُنُوسَة** - ٢٤٠٩٥
 نمت تعريفي يطلق عل جميع الميارات الصغرى الدائرة
 حول الشمس بين المشتري والمريخ . ج كُنُوس وتسمى أيضاً
 المياري الكنُوس .

٧٤٩٦ - كُنْشِج ٥
Organite
كل عنصر من العناصر التي تتألف منها الخلية كالجبهة
والستروزم ... ج . كُنْشِج .

Ligne (F). ٢٤٠٩٧ - كَنَسَحْ
هو الكناشة ، اطلها .

٧٤٠٩٨ - كُنْسُودَة
Consouda (F).
هي السفلون ، جنس اشجار برية طيبة .

٢٤٠٩٩ - ككتسيات

Tringens (F).

حارة من فصيلة دجاجيات الارض . اجناسها قليلة .
امرؤها الجهلول . جميعها من القواطع الصغيرة القد .
مناليرها دقيقة خالية من التضديد . ارساغها نحيلة . اقواها
مرققة وهي صيافة وشعوية تختلف من بعضها بروق
الالوان واقراب الرقعة او تباعدنا .

Conchite (F). ٧٤١٠١ - كُنْشِيْت ٥
مادة متحجرة في داخل صلبة .

Garmon (F). ٢٤١٠١ - كَنْعَدَ ، كَنْعَت
هو التون الأبيض أي الجرّون، سمكة بحرية من فصيلة
الاسقمريات . قال جرّور :

« قوم اذا جعلوا في صبرهم بصلا
ثم اشتروا كنزاً من مال جعلوا »

Holacanthus (F). ٧٤١٠٢ - كَنَف
هو الطبق من الأسماك البحرية ، أطلقه .

Biotope ٧٤١٠٣ - كِنْف ، كِنْفَة
 هم المكان الموصوف الحدود بطبيعته وسنائه .

٧٤١٠٤ - كنتك هو البيان المذكور ، اطلبه .

تُعت تعريفِي يطلق عل الديدان والحِوانات الدنيا الّتي تعيش داخل التربة .

Topinambour (F). **كَنْكَر** - ٧٤١٠٦
هو عباد الشمس المبقولي ، اطلية .

٢٤١٧ - **كَنْكَلِيَّة** ، عَسم ربيع
 Combretum album, C. micranthum (S).
 ombret élevé, Kinkella, Chigomier altier (F).
 vegetable-glue plant (E). Langdang (D).
 نوع من العِسم وكَنْكَلِيَّة هو الاسم الأَرِيفِي . نبات
 حرجي طَبي معمر من فصيلة الأهلِيَجِيَّات . ينتج منه
 ١ . مَجْوَرة يُلَى إلى نَظِيرِها "شَاطِئُ" المَاجِ ٢ . و
 ثَجَرَةٌ قَرْداءَ تَعلو ثَجَرَةً أُورْبَةً أَشَارَ . ساقُها شَدِيدَةُ الصَّلابةِ
 فَرْدُها مَرَاكِبَةٌ ، مُسْتَطِيلَةٌ ، جَوْرِيَّةُ الْيَنْثَى مُمِطِلَةٌ
 أَوْرَاقُها مُسْتَدَلَّةٌ ، مُعْتَمَةٌ ، أَهْلِيَجِيَّةٌ ، تَعلو من ١
 ٢ م . وتَعرَضُ من ٢ إلى ٤ م . سَاقُها مُلَوَّنَةٌ بِالْبُشْرَةِ
 حَاطِقَةُ الخُضارِ الجَوْدِي المَواجِي . أَورَاقُها سَائِلَةُ التَّجَمُّعِ



کنکور



کندیه

٢٤١١٦ - **كُونِيَاك** ، **كُونِيَاك** (F).
Cognac brandy (E).
مشروب تقديدي شائع الاستعمال يصنع من كحول العنب .
وقد اشتهرت بصناعته بلاد الكونيكيا في فرنسا .

٢٤١١٧ - **كَنْتِيْب** (F).
Dried trees (E).
الكنب: اليبس من الشجر .

٢٤١١٨ - **كَنْتِيْدَا** ، **كَنْتِيْدَا** (F).
Conidium (E).
كل بويضة فطرية نشأت على كاتب لا في زق تدعى كنيْدَة .

٢٤١١٩ - **كَنْتِيْدَا** (F).
Locule (F). Loculus (E).
الكنتية ، في علم التاريخ الطبيعى ، هي الحفرة الشديدة الصغر .

٢٤١٢٠ - **كَنْتِيْدِيْسِيُوْم** (S).
Coniothecium (S).
جنس تطور مجهرية من حمارة الزحابات وفصيلة الطحنيات .
يتميز بظلمة من الجرب الكندية . كئالده مركبة مستطيلة .
بويضاته كروية جفيرة التجميع || انواعه عديدة جميعها
رمية تركب طلاء بعض الاجمار دون ان تؤذيها ، منها البندق
والحور والخلوخ والصمصاف .

٢٤١٢١ - **كَنْتِيُوْغْرَاف** ، **كَنْتِيُوْغْرَاف** (F).
Goniographe (F).
ويسمى مرممة الزوايا . آلة المسح تقاس بها زوايا الارض
تقسم مستواها على القوس .

٢٤١٢٢ - **كَنْب** (F).
Buffe âgé (F). Aged buffalo (E).
هو الجملوس المسن لا يزال كائن الحي .

٢٤١٢٣ - **كَنْبَل** (S).
Détar, Détare, Détarium, Ditar (F). Tallow-tree (E).
Detaripbaum (D). Detaria, Meli (I).
جنس اشجار افريقية المنبت من فصيلة القرنيات . له
نوعان نوع ثمار مرة العلم ، جسمانية المادة ، مؤذية .
نوع ثماره مأكولة مستحبة العلم يعرف بكهيل السنغال .

٢٤١٢٤ - **كَنْبَل السنغال** (F).
Détarium senegalense (S). Détare du Sénégal (F).
Senegal tallow tree (E).
نوع من الكهيل شجرته تملو نحو ١٢ م . ساقها منتصبه
اوراقها متعاقبة مركبة ، وريقاتها شبيهة بالانظام .
الشكل ، نصلها جامد الصفعة . عايق الخضر . ازهارها
عقودية التجميع ، محوري الاوتكاز ، ثمارها مششبة
الشكل والقد ، ليلب سؤذها ناشف المادة ، سكري العلم ،
اغصن الون .

٢٤١٢٥ - **كَهْدَب الإِجَاص** ، **اَكْتَارُوس** (S).
Eriophyes pyri (S).
Phytopte du poirier, Eriophyes des poiriers (F).
Pear leaf blister mite (E). Birnblatt-Pockenmilbe (D).
حشرة من الكهديات المجهرية تركب برام الاجاص
تقتسب الوراق الباكور ثم تقضي على الوراق فتضم النصال
بالبحور السمر او الحطية بعد ان تقضي على خلايا النسج
الذي يصيح كالاسفنج بين بشرته العليا والسفلى .
يكافح مكافحة التناكب باستهلاك الحواشير والمواكيز .

محوري الاوتكاز . ازهارها صغيرة ، وريدية اللون ،
تملوا رشفة نحاسية . ثمارها يزور محرمية مجتمعة صغيرة
تبدو في اول مهبطا غضراء اللون ثم يتصرف اللون ، عند
النضج ، الى الوردية الغفيرة النجاجة .

٢٤١٠٨ - **كَنْتِيْلُوجِيَة** (F).
Conchylologie (F).
Conchology (E).
هي علم الاصداف .

٢٤١٠٩ - **كَنْتِيْنَا** ، **كِيْنَا** ، **سِيْنْكُونَا** (S).
Cinchona (S). Quinquina (F). Cinchona, Quinlin bark (E).
Chinsbaum, Fieborrindenbaum (D). China (I).
جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية صناعية من فصيلة
الفويات . انواعه المخرطة ٢٠ اصلها المناطق الحارة
الرطبة . معظمها بري وبعضها زراعي صناعي طبي .
سوقها منتصبه تملو من ٤ الى ٣٠ م . اوراقها متقابلة
معقنة ، نصلها بيضيه او احليجية الشكل . ازهارها
عقودية او شكلية التجميع . ازهارها عشوية زباء
البشرة . ثمارها جفيرة مخروطية الشكل تحضن البذرة من
البزور الصغيرة النشائية الجناح || يستخرج من قشورها
مادة قلوية بيضاء اللون شديدة المذاقة تعتبر من أهم القلويات
المستخلصة من لحاء النبات وتعرف بالكينا .

٢٤١١٠ - **كَنْتِيْلِيَات** (F).
Cinchonées (F).
سبط من الفويات يشمل نحو ٩٥٠ نوعاً من النبات
تنتمي الى ١٠٠ جنس اشهرها الكنتيكينا .

٢٤١١١ - **كَنْتِيَان** ، **لِيْد** (S).
Alkana orientalis (S). Alkana, Alcanne, Alcan, Grémil à fleurs jaunes (F). Yellow bugloss, Yellow gromwell (E). Orientalische Perithrae (D). Alkana (I).
جنس نبات عشبي بري من فصيلة الحمصيات . اوراقه
ضيقة مستطيلة ، نصلها خلى البشرة . ازهارها صغيرة القد
بيضاء اللون . بزود مستديرة ، حطية ، قاسية كالحجر
تدر البزل وتفيد الحضم وتشتت الايلاع وتذيب البلم .
انواعه عديدة اصلها الجرد والبقاع الداخلية .

٢٤١١٢ - **كَنْتِيَان صِبَاغِي** ، **سَنْجَارَ الجَرَّة** ، **عَسَّ الحَمَام** ، **وجِل الحَمَام** (S).
Alkanet (E). Alkanne (D). Alkana spuria (I).
نبات عشبي بري من فصيلة الحمصيات يستخرج منه
صباغ احمر اللون شائع الاستعمال .

٢٤١١٣ - **كَنْتِيَل** (S).
الكَنْتِيَلُ جِر طام . قال امرؤ القيس :
فأضى يح الماء من كل فيقة
يكب على الاقدان دوح الكَنْتِيَل .

٢٤١١٤ - **كَنْتُوْر** (S).
Fractocumulus (S).
ضرب من التيوم التزوية المطر ويدهى الجلب ، اعليه .

٢٤١١٥ - **كَنْوَد** (F).
Terre improductive (F).
Unproductive soil (E).
ارض لا تثبت شيئاً . يقال هذه ارض كنود .



كنكينا



كبان صباغي



كهيل السنغال



كهذب الاجاص

٢٤١٢٦ - كُھَدَبُ البُنْدُقِ ° ، أَكَارُوسُ البُنْدُقِ

Eriophyes avellanae (S).
Phytopte du noisetier, Eriophye du noisetier (F).
Hazeinut gall mite (E). Haselnussgallmilbe (D).
حشرة من الكهديات المجهريات تركب حراشف برام البندق فتسبب سقوطها وأغلاص الأثمار .

٢٤١٢٧ - كُھَدَبُ البَتْدَوْرَةِ ° ، أَكَارُوسُ البَتْدَوْرَةِ

Eriophyes cladophyllus (S).
Eriophye des tomates (F).
حشرة من الكهديات المجهريات تركب سوق وأوراق البندورة فتقتلعها ويحتملها وتعمدها عن الأثمار .

٢٤١٢٨ - كُھَدَبُ التَّيْنِ ° ، أَكَارُوسُ التَّيْنِ

Eriophyes ficus (S). Eriophye du figulier (F).
حشرة من الكهديات المجهريات تركب أوراق التين الطرية النامية فتؤذيها بعض الشيء .

٢٤١٢٩ - كُھَدَبُ الرُّمَّانِ ° ، أَكَارُوسُ الرُّمَّانِ

Eriophyes granat (S). Eriophye du grenadier (F).
حشرة من الكهديات المجهريات تركب أوراق الرمان فتسبب اصفرارها وصلها بالآثار .

٢٤١٣٠ - كُھَدَبُ الزَّيْتُونِ ° ، أَكَارُوسُ الزَّيْتُونِ ، فيلركب

Phyllocoptes (S). Phyllocopte (F). Rust mite (E). Kruselmilbe (D).
حشرة من الكهديات تركب أوراق الزيتون أعضها ورققات الأنانس النامية فتسببها من أفضاء جسمها الطيبى وترشها بطور صفر تنسج لتربيتها إلى أن تم فصل فتضي عليه .

٢٤١٣١ - كُھَدَبُ الزَّيْتُونِ ° ، أَكَارُوسُ الزَّيْتُونِ

Eriophyes tiliae (S).
Eriophye du tilleul, Phytopte du tilleul (F).
حشرة من الكهديات المجهريات تركب أوراق الزيتون فتشوهها بالانابيب البشروية التي تقيمها على صفحات النصل العليا .

٢٤١٣٢ - كُھَدَبُ الكَرْمَةِ ° ، أَكَارُوسُ الكَرْمَةِ

Eriophyes vitis, Phytoptus vitis (S). Eriophye de la vigne, Erinoze de la vigne, Phytopte de la vigne (F).
Grape bud mite, Grape erineum mite (E). Rebenblattgallmilbe, Rebenpockenmilbe (D).
حشرة من الكهديات المجهريات تركب أوراق الكرمه فتتشوهها بالبربر بمد القضاء على خلايا النسيج فيسج ألتسج بين البشرين كانه محروق لا ريباه منه .

٢٤١٣٣ - كُھَدَبُ الكَيْسَمِشِ ° ، أَكَارُوسُ الكَيْسَمِشِ

Eriophyes ribis (S).
Eriophye du groseillier, Phytopte du groseillier (F).
Black-currant gall mite (E). Knospengallmilbe (D).
حشرة من الكهديات المجهريات تركب برام ولأوراق الكشمش فتؤذيها وقد تسبب أغلاص البرام والأثمار .

٢٤١٣٤ - كُھَدَبُ المَنْجَا ° ، أَكَارُوسُ المَنْجَا

Eriophyes mangiferae (S). Eriophye du mangarier (F).
حشرة من الكهديات المجهرية تركب برام المنجا فتؤذيها وقد تقضي عليها .

٢٤١٣٥ - كُھَدَبَاتِ °

Eriophyidae (S).
Eriophyidae (F). Eriophyidae, Blister mites, Gall mites (E). Gallmilben, Gallenmilben (D).
فصيلة حشرات صغيرة القند من رتبة القراذيد . أجناسها وانواعها عديدة جميعها مجهزة . أجناسها استوائية . تطول من خنيل إلى أربعة خطوط من اللبستر . جرابها رباعية طرفية تحيط بأجزاء المنك || جميع حشراتا ضارة تركب برام وأوراق النبات فتؤذيها أشد الأذى وقد تسبب تلفها .

٢٤١٣٦ - كُھَدَلُ القُطْنِ ° ، قَائِزَةُ القُطْنِ

Lepidocyrtinus incertus (S).
حشرة صغيرة من الكهديات . ذباب الجسم ، برام اللون ، مستطيلة الذنب ، تعيش على نباتات الأراضي الرطبة انصها القطن والبرسيم والفاصوليا .

٢٤١٣٧ - كُھَدَلُ المَوْزِ ° ، قَائِزَةُ المَوْزِ

Drapanura muscica, Entomobrya muscica (S).
Drépanure du bananier (F).
حشرة صغيرة من الكهديات فوجها إلى الصفرة ، تركب الموز وقصب السكر . أضرارها زهيدة لا تستوجب المكافحة .

٢٤١٣٨ - كُھَدَلَاتِ ° ، كَلَمْبُورَاتِ °

Collembola (F). Collembola (E).
وبنهم من دملها وقائزات الذنب . رتبة حشرات عامة الاجنحة ناقصة التطور المتطور الانساني العربي . حشراتا قارضة قازرة مستطيلة الأذناب تحمل في حلقائها البنية الأولى جراب صغير القند يفرز مادة لزجة تاصعدها على تساق السطح الناعمة المائلة .

٢٤١٣٩ - كُھَرَابِي °

Electrogène (F).
Electrogon (E).
نمت تعريفي يطلق على كل جهاز يولد الكهرياء .

٢٤١٤٠ - كُھَرَبَاءِ °

Electricité (F). Electricity (E).
الكهرياء طاقة موكمة ، دراستها تتبع علم الطبيعة . وهي تقسم إلى فرين الكهرياء الاحتكاكية والكهرياء الديناميكية فالاحتكاكية هي التي تستعمل في توليد الكهرياء . اما الديناميكية فهي لفصحة بالتيار الكهريائي والجهزة التابعة له .

٢٤١٤١ - كُھَرَبَةٍ ، كُھَرَبٍ °

Electrisation (F). Electrification (E).
Electrique (F).
Electric (E).

٢٤١٤٢ - كُھَرَبِي ، كُھَرَبَاتِي °

Electrique (F).
Electric (E).
Electrogalvanisme (F). Electro-galvanism (E).
درس القوى الصادرة عن الصفائح الكهربية .

٢٤١٤٤ - كُھَرْمَانُ أَصْفَرُ

Sucin
هو المنبر الأصفر مادة راتينية عجمية ، صلبة ، شبه شفاقة . لونها يراوح من الأصفر إلى الأحمر . لا تنوب في الماء وتنصهر في ٢٨٧ °م . اشتغالها يولد الحامض المنبري وزيت طيار مستحب الرائحة العطرية .



كهذب البندوة



كهذب الزيتون



كهذب الكرمة



كهذب التين



كهذب الموز

الزعانف ، انواعه المعروفة اربعة تتميز برؤوسها المستضخمة وباشداقها الكبيرة الفاغرة وباسنانها الحادة المنطقفة كالنشاب الاثافي || اجسامها عريضة ، عادمة السهف ، مبيضة المناخس . عيونها حلوية الاوتكار تحتل قمة الرأس حيث يوجد ثلاثة اسلاك او ملاس غضروفية تتدو كخيوط مستطيلة تنتهي ببعض الاسمال المختلفة الاشكال يستعملها الكواح لاجتذاب الاسماك الصغيرة ، ذلك لانه كسل قليل الحركة يقضي معظم اوقاته مستلقيا على بطنه فاحما شغته بانتظار الفريسة || اشهر انواعه كوزة المحيط وكوزة المتوسط .

٢٤١٥٤ - كوزة المحيط الأطلسي *

Lophius budgassa (S).
Baudroie de l'Atlantique (F).
سمكة من الكواح . اعطانها جناح واغواط وشطوط المحيط الاطلسي . يكثر وجودها في خليجان المراكشية والاسبانية والبرتغالية والفرنسية || جسمها شبه مخروطي الشكل طويل من ٧٠ الى ٩٠ سم . ثوبا يمانق الموقع الذي تعيش فيه لانها قليلة الحركة || لحمها جيد الصنف ابيض اللون مرغوب فيه .

٢٤١٥٥ - كوزة مبدولة * ، كوزة

المشوسط ، لطف بحري مبدول *
Lophius piscatorius (S). *Lophius baudroie*, *Baudroie commune*, *Diable de mer*, *Crapaud pêcheur*, *C. de mer* (F). *Toad-fish*, *Sas-devil*, *Fishing-frog* (E).
نوع من الكواح . سمكة بحرية يعيش اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض اقالم المحيط الاطلسي . مسرحها اضوايح الهامح والشطوط . تألف الموامع الهامدة التي يراوح عطفها من ١٠ الى ٢٠ مترا || جسمها ضفي الشكل ، يطرل من ١٦٠ الى ٢٠٠ سم . مسكها عادم السهف . ثوبها الى الخنطي الاسمر يبق في الصفحة العليا ويغير ويبيض في السفل . رأسها ضخم فليظ . شفها رجب الانفراج . عيناها كبيرتان سطحيان . وعلوها في قمة الرأس ثلاثة اسلاك غضروفية دقيقة مستطيلة ، الاول منها يلتقي بمزق صغيرة كالاسمال || زعنفتها الظهوية الانامية مستطيلة المناخس الشائكة || تتميز باستطاعة قواعده الزعانف الصدرية الرقيقة الاوتكار . وتتميز ايضا بالقدولة اي انها تمانق البيئة التي تعيش فيها || لحمها ابيض اللون ، متوسط الصنت ، مأكول .

٢٤١٥٦ - كوزاحيات *

Lophilidae (F).
Lophilidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من رتبة شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها المحيط والبحر الابيض المتوسط . تألف الهامح والشطوط . مسرحها الاغواط التي يراوح عطفها من ١٠ الى ٣٠ مترا . تتميز بالكسل وبالشدولة اي انها تمانق الموامع التي تعيش فيها || اجسامها صغية الشكل كالشرغ ، ضخمة الرؤوس ، مالة القشار الزج ، مبيضة المناخس الحادة . اعطانها فطر . اشداقها كبيرة وعريضة . اسنانها حادة متعققة || عيونها رقيقة الاوتكار تشرف عليها بعض الاسلاك الغضروفية المنوخة بالاسمال || اشهر اجناسها الكواح .

٢٤١٥٧ - كوزة *

Bulla (S).
Bulle (F). *Bulla* (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الاربيل

Hydro-électrique (F).
ما ينحس بانتاج الطاقة الكهربائية المولدة من دفع الماء .

٢٤١٤٦ - كهف *

Spéléologue, *Spéléologiste* (F). *Speleologist* (E).
من كان اختصاصه الكهنة .

٢٤١٤٧ - كهنة *

Spéléologie (F).
Speleology (E).
علم يبحث في تنقيب الكهوف وفي سبر الاغوار ومجاري المياه الجوفية .

Aubergine (F).
هو الباذنجان ، اطليه .

٢٤١٤٩ - كهنة *

Chicoca angulifuga, *C. brachista* (S).
Cahinga, *Cainça* (F). *Chicoce tree* (E). *Trauben-förmige*, *Kainzawurzel* (D).
شجرة حربية طيبة معمرة من فصيلة الفويات . مدها بعض مناطق أمريكا الاستوائية || ساقها عارضة متسلقة نزهاء . اوراقها منتفة ، متطالبة ، اعليجية الشكل . نصلها جامد الصلصة ، جميل الخضار المايك اللامع . ازهارها متقوي التجميع . ازهارها صغيرة وردية اللون ، عادمة اللف . ثمارها لحمية ، مبططة ، عاصلة للمذاق ، لا تؤكل || عصارة الاوراق ولثاثر مقوية وقاينة .

Libonum rotundum (S).
Phalangide, *Faucheur* (F). *Harvester*, *Harvest-spider* (E).
حشرة قاصصة دابة من فصيلة الكهوليات ورتبة الهريديات . موطنها معظم المناطق المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط وأوروبا || جسمها صغير اللد ، اعليجي الشكل ، ملحم الصدر والبطن ، عادم الخشن ، خيشوي التفتس . ثمانني البرامز المستطيلة الدقيقة . ثوبه اصهب اللون عند الاثني وينصرف الى السرة الخنطية يعلوها تيجع اسود عند الذكر . الذكر اصفر قدما من الاثني التي يبلغ طولها نحو ٤ م . || يألف جميع الموامع والمساكن الآهلة . يرح في الليل . قوته الحشرات الصغيرة واساريمها ويرقاتها والذباب والحمام || يجتر من الدويبات النافمة لانه يقضي على المؤذية .

٢٤١٥٠ - كهول *

Phalangidae, *Faucheur* (F). *Harvester*, *Harvest-spider* (E).
حشرة قاصصة دابة من فصيلة الكهوليات ورتبة الهريديات . موطنها معظم المناطق المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط وأوروبا || جسمها صغير اللد ، اعليجي الشكل ، ملحم الصدر والبطن ، عادم الخشن ، خيشوي التفتس . ثمانني البرامز المستطيلة الدقيقة . ثوبه اصهب اللون عند الاثني وينصرف الى السرة الخنطية يعلوها تيجع اسود عند الذكر . الذكر اصفر قدما من الاثني التي يبلغ طولها نحو ٤ م . || يألف جميع الموامع والمساكن الآهلة . يرح في الليل . قوته الحشرات الصغيرة واساريمها ويرقاتها والذباب والحمام || يجتر من الدويبات النافمة لانه يقضي على المؤذية .

٢٤١٥١ - كهوليات *

Phalangidae (S).
Phalangides (F). *Phalangidae* (E).
فصيلة حشرات دابة من رتبة الهريديات وصف التناكب . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحارة || امرف انواعها واشهرها الكهول .

Electron
٢٤١٥٢ - كهترپ
جزي . عادم الجرم الملوس يشمن للكهرباء الجلية .

٢٤١٥٣ - كوزع ، عئجوم البحر ، لطف بحري *

Lophius (S).
Baudroie, *Lotte de mer* (F). *Anglar-fish*, *Frog-fish* (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الكواحيات ورتبة شائكات



كهول



كوزة مبدولة

الجنوبية . تسرع في السباح الباكر وقرب الغروب . قتها الاشباب والظهور والحلوب . اجبرتها انفاق مستطيلة عديدة المتاريج والحداليز المنقرضة || اشهر انواعه ما يلي .



كُوَاة

٢٤١٦٩ - **كُوَيَايَ البِرَاكِيل** *Cavia porcellus* (S).
Cobaya aperea (F).
موطنه البرازيل والفيونان وبيليفيه والأروغواي . طوله نحو ٣٠ سم . ثوبه الى الصبغة الصنائية . بطنه ابيض اللون . يعيش جماعات عند اقتراده نحو ١٥ . يألف الاماكن الرطبة ويجاري الماء والطراف الاذغال والفايات || اثناء تقصع من اللدريين الى الثلاثة مرة واحدة في العام .

٢٤١٧٠ - **كُوَيَايَ الجَنُوبِي** *Cavia australis* (S).
Cobaya austral (F).
موطنه امريكة الجنوبية حتى مشرق مجلان . طوله نحو ٢٨ سم . ثوبه سوي اللون احمر الطهر اخضر البطن . وبره غثن مستطيل || يألف الحشبات والاذغال . اثناء تقصع مرتين في العام .



كُوَيَايَ

٢٤١٧١ - **كُوَيَايَ الهَشْدَه** ، **عُخْتَرِيَر الهَشْدَه**
Cavia cobaya (S). *Cobaya*, *Cochon d'Inde*, *Lapin d'Amérique*, *Rat d'Amérique* (F).
هو الكرواي الداجن . مهده امريكة الوسطى . سلالاته الرئيسية خمس تختلف من بعضها باختلاف وبرها بين الطويل والقصير والحشونة والنعومة والقالة والجلالة || طوله يراوح من ٣٠ الى ٣٥ سم . ثوبه عديد الالوان المتراكمة لثباتية || طابعه لطاح الاربب ويربي ماله . اثناء تلد عدة مرات في العام الواحد .

٢٤١٧٢ - **كُوَيَا**
Cobra (F).
Cobra, *Hooded-snake* (E).
الكوبرا وانجيا والصل اسماء مختلفة لاسمي من الحيات الحظيفة الاماينات الاخاذيد . اطلب نجما .



كُوَيَايَ

٢٤١٧٣ - **كُوَيَايَت**
Cobalt
معدن ابيض اللون شديد الصلابة صعب الانصهار ثنائي التكافؤ يوزع (كو-Co) وزنه الذري ٥٨.٩٤ ثقله الذري ٨٩.٦ يذوب في الحامض النيتريكي || لا يوجد في الطبيعة حراً بل مركب مع بعض العناصر . اوجبه استعماله مدينة انصها لتولن القزاز والخزف .



كُوَيْن

٢٤١٧٤ - **كُوَيْن ***
Galeopithecus (S).
Galeopithecus (F). *Galeopithecus* (E).
كوين هو الاسم المائليزي . لما الاسم العلمي فيني (فر-قرد) . جنس حيوان لبني حاشر رابل متسلق من فصيلة الكوينيات . له فوفان كوين ماليزه وركوين الفيلين . الفارق بين الاثنين حجم ذؤوب . المائليزي يطول نحو ٦٥ سم . بما فيه الذئب الذي يبلغ ٢٢ سم . بطنه نحو ٦٧ سم . ثوبه العلوي الى الطحلة السمراء لثباتية المايجات . ثوبه السفلي الى الصبغة السمراء . اطراف قرواعه الى السواد المشمش بالايض . الفيليني يطول نحو ٥٥ سم . وبطنه نحو ٥٧ سم . ثوبه العلوي الى السمرة السوداء تملوها رقشة يضاء لامتارية التوزيع ثوب السفلي والاطراف قوائمه الى الطحلة التبراد يملوها موج اسمر || سلجته الحياتي جاحي . يسرع في اليل ويبيت في النهار متعلق بقائمتيه الخلفيتين كالرولوط . قوته اغشرات والثار ولوراق النبات ||

وفصيلة الطاييات . انواعها الماهرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصداها اهليلجية الشكل ، ربة الفلج المصراعي القاطب رقيقة الصفة الملونة ، عادمة الخشنه والارديفة . اجسامها اهليلجية مقطوعة الرأس والعقب . رؤوسها قليلة الوضوح عادة اللواس .

٢٤١٥٨ - **كُوَاة** ، **كِيَاة** ، **كُوَاة** *Ruche* (F).
Hive (E).
هي مأوى النحل اي غليته حيثك شباكها بالقصب او بالقش .

٢٤١٥٩ - **كُوَاَسِيَب** *Rapaces* (F). *Rapacious* (E).
نعت تعريفي توصف به جوارح الطير .

٢٤١٦٠ - **كُوَاَسِيَر** *Oiseaux de proie*, *Rapaces* (F).
Birds of prey (E).
رتبة من الطير تعرف بالجوارح . فصائلها واجنسها عديدة تقسم الى فئتين كواسر النهار وكواسر اليل .

٢٤١٦١ - **كُوَاَسِيَر اللَيْل** *Rapaces nocturnes* (F).
Nocturnal birds of prey (E).
هي جوارح الليل تشمل اليوم وسائر اجناس الطير اللكواسر التي تسرع في اليل .

٢٤١٦٢ - **كُوَاَسِيَر النَّهَار** *Rapaces diurnes* (F).
Diurnal birds of prey (E).
هي جوارح النهار ولدهي سباع الطير تشمل الشبان والصقور والسنور الخ ...

٢٤١٦٣ - **كُوَاَسِيَب البَحْر** *Asteriadeae* (S).
Asteriadeae (F). *Asteriadeae* (E).
فصيلة من فوكيات البحر . اجنسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع بحار العالم .

٢٤١٦٤ - **كُوَيَايَل** *Copal* (F). *Copal-resin* (E).
صمغ راتنجي يستخرج من شجرة الكنته يستعمل في صناعة الطلاء .

٢٤١٦٥ - **كُوَيَايَلِيَه** هي الكنته ، اطبا .

٢٤١٦٦ - **كُوَيَايَان** *Caparaçon* (F).
Caparison, *Housings* (E).
سرة فضفاضة توضع على ظهور الخيل لوقايتها .

٢٤١٦٧ - **كُوَيَايَلِيَه *** *Cupanis* (S). *Cupania* (F).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة السابنديات انواعها المعروفة نحو ٤٠ منتشرة في جميع المناطق الاستوائية || جميعها اشجار وشجيرات قزواء . اوراقها متعاقبة مركبة ، شديدة التجميع ، متنايسة التصال . ازهارها محوري الانكاز ، عشقوي التجميع . ازهارها فرية متباعدة الالوان ، يكثر فيها الالويج ثم الودي . يزورها مأكولة طعمها شبيه بطعم الكستناء .

٢٤١٦٨ - **كُوَيَاي *** *Cavia* (S).
Cobaya (F). *Guinea-pig* (E).
جنس حيوانات لبنة قاضية من فصيلة الثوردييات . انواعه ثمانية . جميعها ربة ابلجة ، صغيرة القد ، متناقلة الشكل . رؤوسها غليظة . راسها لا مفلوكة . اذنانها قصيرة قارضة . قوائمه متساوية الطول . اذنانها جلداع || موطنها امريكة

٢٤١٨٢ - كوتن، أطمط *Arec (S).*
Arec (F). *Arec (E).*
 جنس أشجار مشمرة من النطليات. أنواعه عديدة منها البلاد الحارة. جذوعها رقيقة مستقيمة. جريدها ريشي السنف. ثمارها بيضية صناعية، لبها شائع الاستعمال الطبي لا سيما الطب البيري || أشهر أنواعه كوتن الكاشو.

٢٤١٨٣ - كوتن الكاشو *، أطمط الكاشو *Arec catechu (S).* *Arec catéchu, Aréquier, Noiset de l'Inde (F).* *Arecapalm, Betel-nut palm (E).* *Pinangpalme, Arekapalme (D).* *Arec, Palma arec (I).*
 نوع من الكوتن جلده مستقيم ريع. ثماره بيضية الشكل والحجم، يستخرج من لبها مادة الكاشو.

٢٤١٨٤ - كوتن الحبشة *، كوتن الإفريقي *Brucea antidysenterica, B. salutaris, B. ferruginea (S).* *Brucée d'Éthiopie, Ko-sam d'Afrique (F).*
 نوع من الكوتن. شجيرة برية من فصيلة السمرويات. مهدا الحديقة وبعض مناطق افريقية الوسط وللشجيرة || ساقها تحلة فراء تملو من ١٥٠ إلى ٢٢٠ سم. أوراقها متعقبة متعاقبة، سنائية، أبيض || تعتبر من النباتات الطبية. لحاء ساقها وجذورها تحوي بعض المواد الدوائية والحوامض الضوية ومادة الكوتين || تستعمل في معالجة الزحار ودود الاسماء.

٢٤١٨٥ - كوتن تحيل *Brucea amarissima, B. gracilis, B. sumatrana (S).* *Brucée grise, Ko-sam (F).* *Ko-sam seeds (E).*
 نوع من الكوتن. شجيرة برية من فصيلة السمرويات. متبها الطوي يمتد من جنوب الصين إلى ماليزيا والفلبين واستراليا || ساقها تحلة فراء تملو من مترين إلى ثلاثة أمتار. أوراقها متعقبة متعاقبة أهليجية، أبيض || تعتبر من النباتات الطبية. لحاء الساق والجذور مرة المذاق تحوي بعض المواد الدوائية والحوامض الضوية ومادة فلوكونيزية تدعى كوتين. ثمارها لوزية سوداء اللون تغلف بصبات لوزية الشكل دهنية المادة غواصها خراس الحاء || تستعمل كشادة للميكروبات وفي معالجة الصفراء والزحار ودود الاسماء.

٢٤١٨٦ - كوتن * *Psathyrella (S).* *Psathyrellé (F).*
 جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الفاروقيتيات. أنواعه المعروفة قليلة المدد أعطائها بعض المناطق الجبلية الممتدة من الشرق الأدنى إلى أروبة. يعيش على اللبالب واوربات الأشجار الحرة اغصانها السنديان ومنه اللك والمليط والمدر والدرايم. يتميز بسوقه النعقة الجامدة ومجودة لحية الانواع المأكولة || اعرف أنواعه واشهرها الثلاثة التالية.

٢٤١٨٧ - كوتن أمغر * *Psathyrella spadicea (S).* *Psathyrellé bai brun (F).*
 نوع من الكوتن. يعيش مجموعات وافرقة العدد على اربوات اللك والمليط. ساقه دقيقة مملوءة اللون. نكهته مقلية الشكل، قطرها نحو ٧ سم. لونها إلى الغرة الفاتحة أو الكميث الاسمر. اطراسها إلى الكسفي الاخر المواج || لحية كاعنة الصف، غير مرغوب فيها.

يعلق الاشجار بشفة ويقتل بين اغصانها برشاقة ويقتر من شجرة إلى شجرة حلقاً في الفضاء كالظلال، من أجل إلى اسفل، مسافة ٦٠ أو ٧٠ متراً.

٢٤١٧٥ - كوتنيات * *Galeoiphthecidae (S).* *Galdophthécidés (F).* *Galeoiphthécidae (E).*
 فصيلة حيوانات لبونة، حاشرة، رابطة، متسلقة، مركزها في هرم البوتات بين السيوريات والوطوطيات || اجسامها مكشوفة بشفاء أشمر، يمتد من قاعدة الحنق إلى اطراف القوائم والبال، يقوم مقام المظلة فيمكنها من الانتقال جواً بين الاشجار على مسافات تراوح من ٦٠ إلى ٧٠ متراً || اصابع قوائمها مشطية الزناكاز، لا متعاقبة. اطاريها حادة بحجة الاطراف || انثاها ثنائية الاصلاف الصدرية، قطع جرواً واحداً يتعلق بصنورها حتى النظام || لها جنس واحد يدعى كوتين وله نومان.

٢٤١٧٦ - كوتينة * هي الايدانجية، راجعها. *jour (F).*
 نافذة في جدار البناء لدخول الهواء والنور. فهو قانوني اذا كان يشرق منه على الطريق العام ما دام مطاباً للانظمة الادارية ولكنه محظور اذا كان يشرف منه على ملك الغير ولم تراعى المسافة القانونية في بدهه عنه الا ان يكون مرفقاً او مثلاً مباحاً.

٢٤١٧٨ - كوتن منقط البطن *، تيمنوريس *Cleonus*
 منقط البطن * *punctiventris, Temnorhinus punctiventris (S).* *Cléoné piqueté (F).*

حشرة مؤذية من فصيلة السوسيات. موطنها بعض اقالم حوض البحر الابيض المتوسط وبمظم اقالم حوض البحر الاسود. تأت المزارع التي توجد فيها السوسيات. غناصها تقضم الارواح. يرقاتها تركب الجلود فتتقنها وتضويها || جسمها معتدل الحجم، أهليجي اللون، بطول من ١٦ إلى ١٨ سم. ثوبا الطوي إلى الكهبة يملوا موج اشجع. ثوبا السفلى إلى الكهبة السوداء يملوا تنقيط افر. رأسها يرمي الشكل ينتمي ينظم غروطي ناشر الكظر. زفانها مرققات، وشيا الاطراف. الاثن ابرز قدماً من الذكر واطول عضله منه || لها جنيل واحد في الحبل. تخرج الحشرة الجملة من استكانتها الشعوي في اواخر نيسان تسرح في التبار. تبار مع الجنك يمد ظهورها بنحو عشرة ايام. قردته في التربة قرب استاخ النباتات المائلة || البرقة مرقاة، بطيئة النمو، تبلغ الكال الجسوري بعد الثفن بنحو عشرة اسابيع. جسمها بطول نحو ٢٠ سم. وهو اسطواني الجسم، مقوس الشكل، ابيض اللون، تنهي المواج. وأنها مستطلة، مكورة، اسمر || طور التكامل يستمر نحو عشرة ايام وينتهي في التربة.

٢٤١٧٩ - كوتشوك *Caoutchouc (F).*
 هو المطاط، اطله.

٢٤١٨٠ - كوتين * هي البشرين، اطلها.
 ٢٤١٨١ - كوت *
 كوت الزرع وكل نبات حولي: فاك الادياب وصار على اربع وقات او حلاً.



كوتن منقط البطن



كوتن الكاشو



كوتن أمغر



كُونَن كندول

متفتحة تلوح بالحاء فيفتت ويسقط || وهو حل الحفصيات يقع حطية لاقامية مستطيلة تركب الحاء تقبب جفانها وتصلها والتصاقها بالتشبب . ويدد ذاك بنسة او ثمانية اسابع تنقل الحاء باستطاعتها تظهر حل الشقوق ثنائيل نظرية دمية قفرا نحو البيرت لنها يراوح من الابيض الى الوردي || يكافئ بالاستعمال وبلاذ الجروح بد تطهيرها .

٢٤١٩٥ - كُوْدَاكَة ولفسي *

Corticium Rolfii, Sclerotium Rolfii (S).

فطر مجهرى يكثر ويبدو في المناطق الحارة رطوف حل العديد من النبات كالارز والبالديان والباله والبنسج والتامول والحفصيات والحطية والحطال والغروج والحطلي والنجير والبيوس والذرة والسلق والتشليم والمانق والفاصلريا والفعل والقليلة والوقل السني والقرقر والقفن والقفاقش والملفوف والتنجيل والطنش والتيلج والمجرى وبياد الشمس وسقط التمد وقصب السكر || يصيب النبات في عهد خيه ونشوه السريع فيوشم السيق بنقط حنطية اللون || يفسح الهور || كثيفة التجميع . تبدو كالبقعة الواحدة ، تمزق التبادل السلي وتسبب اصفرار الاوراق ويذبلوا || وقد فوح على التبع في زراعات الهند التيرلندة كما انه مركب الحاد ورق الموز دون ان يقع بها شديد الاذى || يكافئ باجتناب كثرة الرطوبة وبالأكثر من الاسمة الازرية انحصا نيرات الجير وصفات الامريك .



كُونَن غنبل



كوجر

٢٤١٩٦ - كُوْدَاكَة سُولايي * ، رِيْزُوْكَوْنُونْ اُسُوْدَه

Corticium solani, C. vagum, Hypochaeris solani, Rhizoctonia solani, R. rapae, R. batas, R. napsi (S). *Rhizoctonia noir, Maladie des collerettes, M. des manchettes, Varole des tubercules, Chancres du pied* (F). *Black spot, Collar rot* (E). *Wurzelkötter-Krankheit* (D).

فطر مجهرى يتطفل على البطاطا وعلى أكثر من ٢٠٠ نوع من النباتات تقتل الى ٩٦ فصيلة . يكثر في المساقط المتصلة الحرارة . يصيب الشغل في الأكواذ فيليرها ويركبا في الحقل فيسلبها انحصا القطن والبنجورة والبالديان . مظهره حل البطاطا المزروعة وشاح متكوني اخبر اللون يكتنف اللون والجذور والسوق حتى سطح التربة فيجشها ثم يقضي على صلابتها فترقي وتسود وتذبل اوراقها وتبيس . وهو حل دن البطاطا المقولعة وشاح مشيبي ايض اللون متكوني التواس تتخلله فروع لاقامية الشكل والحلم لنها الى اسمره تنطب التسبيج البندري || يكافئ باستعمال مركبات سلفات النحاس او املاح الزئبق .



كودانة جانا



كودانة رولسي

٢٤١٩٧ - كُوْدَاكَة كُودِيْن *


Corticidaceae (S). *Corticidaceae* (F). *Corticidaceae* (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة الحفصيات تتميز بتحتها الفارص . تكتملها حلسا السطح او زياد ، دقيقة الملب اغشيتها غنية التركيب او شمخا . بوفانها شفاة . اجناسها وانواعها قليلة المدد اعرفها الكودانة .

٢٤١٩٨ - كُوْدَايِيْن ، كُوْدِيْن

Codéine (F). *Codéine* (E).

مادة قلووية بلورية متبصرة عادمة اللون تستخرج في الافيون . تغلي عند ١٥٥ °مخ . وهي قليلة اللوان في الماء . تلوب في الكحول والكلوروفورم والبنزين وسلفور الكريون .



كودانة سولاي

٢٤١٩٨ - كُوْنَن كَنْدُول *

Psathyrella candolleana (S).

Psathyrella de Candolle (F).

نوع من الكونن . يكثر ويبدو في بعض غابات اوروبية وتركية . يعيش على الدبال في المراعي الجبلية . ساقه دقيقة ، رفيعة ، غبراء اللون . تكتمت مظلية الشكل ، غبراء اللون يعلوها موج اصفر تشته صفته وتسر عنه القرقص ، قفرا نحو ٧ سم . اطرافها وردية اللون || لحيته جيدة الصنف ، مأكولة .

٢٤١٩٩ - كُوْنَن مُجْمَكِي *

Psathyrella velutina (S). *Psathyrella veloutée* (F).

نوع من الكونن . يعيش على الدبال في المراعي الظليلة . ساقه دقيقة ، صرءاء ، سمرء اللون ، خلية الزغب حتى اواسط ازام الرابع . تكتمت مظلية الشكل ، لامتساوية السطح انخلي الزغب ، قفرا نحو ٥ سم . لنها الى الكسني الاصفر المراج || لحيته جيدة الصنف ، مأكولة .

٢٤١٩٠ - كُوْجَر * ، بُوْمَاء ، اُسْد اَمْرِيْكي

Felis concolor (S). *Puma, Puma concolor, Cougar, concolor, Lion argenté, Lion d'Amérique* (F). *Puma, Cougar, American lion* (E).

حيوان مفترس وسيد الجلس والنوع من فصيلة السنوريات . اصطناع البلاد الامريكية . شكله يشبه البوق . طوله الكامل نحو ٢٠٠ سم . جسمه ١٤٠ وذيده ٦٠ لما ارتفاه تنمو ٦٥ سم . ثوبه الى الفسلة السوية المتأخرة يمتد مع اقترابه من الظهر ويظهر عند البطن . زوره ابيض اللون وشفته العليا كذلك || يألف الاجراع الكثيفة المائية . يساق الاجراع يفتق وقد يقضي وقت استراحت عليها || قوته ما استطاع اقتراسه من الحيوان والطير . يصرح عند الغروب وفي اوائل الليل ويعد الصجر || اثناء تقص من جرد واحد الى خمسة جراء تهرس النور بد وضعا بنسة ايام تراقف امها بعد ثلاثة اشهر .

٢٤١٩١ - كُوْد * ، كُوْدَاكَة

Planche à semis (F). *كود * كوداكة* هي التربة او المسكية سطح ترابها ويقت حروفها وضمرت لاقبال البزور . ج اكود .

٢٤١٩٢ - كُوْد *

Entasser (F). *To hoard up* (E). *كود * كود* جمعه يصلمه كبة مسطحة .

٢٤١٩٣ - كُوْدَاكَة *

Corticium *كوداكة* جلس فطور مجهرية من فصيلة الكودانيات . انواعه عديدة تتطفل على مختلف اعشاء النبات وعلى الاشجاء الجافة المصنوعة || مظهره الخارجي اباد مشيبي كيث التصبيح يلسن الاضاء الموسمية ثم يرشها بقرصه الحنطية اللون الغليظة اللشاء || اشهر انواعها ما يقع .

٢٤١٩٤ - كُوْدَاكَة جَاوَا *

Corticium salmolicolor, C. javanicum, Nectator decrescus (S).

فطر مجهرى يعيش في المناطق الحارة . يتطفل على عدة نباتات انحصا الحيفية والبن والكاكاز والحفصيات والسط والكتيا والمنفا ... || مركب الانداد عند انتشارها على الاعضاء والانسان منه انتشارها على الجلود من لجة السفل المعرصة لاشعة الشمس || مظهره الخارجي يثور مستترة كثيفة التجميع تتحول الى قروح جافة صلبة

الرأس الى قاعدة الذنب . ويعلو من الحاروك الى الكفل تسعة خطوط متعرجة ، يضاء اللون ، لاشمالية الطول .
هناك لوزيتان ، بارتان . اذناه كيرتان . ويحل في اهل قصبة الانف حلال ابيض ينتهي عند المائي . قوائمه ضلابة . شديدة النشط . اجله يتألف من ذكرين مانين واربع اناث واربعه شواذن .

٢٤٢٠٧ - كُورُ العَبيد هو الشيط الحيشي ، اطلبه .

٢٤٢٠٨ - كُورُ
Uranoscopus (S).
Uranoscope (F). Uranoscopus (E).

جنس اسمك بحرية بيضه من فصيلة الترغونيات ورتبة شائكات الزعانف || انواعه المعروفة قليلة المدد اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة القدر عموما . تتميز برؤوسها المنحنية الاشدق ، وبعينها الحامية الاركاناز الاقني وبزعانفها الشائكة المنحنية الحادة || تعيش مدفورة في الرمال والاسماك لا يظهر منها سوى طرف الزعنفة الظهرية الاول ، وهي شائكة المنحني المسمة || اعرف انواعها واشهرها الكورب الاخشن .

٢٤٢٠٩ - كُورُ الخشن ، اشترَبُ ابيش ،

رَسْكَس
Uranoscopus scaber (S).
Uranoscope raboteux, Rascasse blanche, Rat (F).
Uranoscopus scaber (E).

لوع من الكورب . سمكة بحرية بيض من فصيلة الترغونيات . اعطائها البحر الابيض المتوسط || جسمها اعلاحي الشكل بطول نحو ٣٠ سم . رأسها غليظ ، كبير ، مضطج ، منتصب الفك ، مستعرض الشدق ، متراكب الزاويق العلوية . عيناها اقربتا الاركاناز تحتلان فنة الرأس . زعانفها كبيرة شائكة . زعنفتها الظهرية الاول ناشرة المنحني الصلبة الدرية المسمة . مناحس اسفله مسمة ايضا || ثوبها الملوي الى الوردية السمرات تملوها بقشة مستطيلة زاهرة . جانباها الى الوردية الفضية المواج . بطنها الى البياض الاغبر || لها كامن الصنف ، قل من يربط فيه .

٢٤٢١٠ - كُورُ بَرِيل
Courbaril (F).
هو الككرو ، اطلبه .

٢٤٢١١ - كُورُ
Crô, Cru (F).
Growth, Country (E).
منطقة معينة تميزت بمجموعة بعض صفات محاصيلها الزراعية . ج . كور .

٢٤٢١٢ - كُورُ
Pacrinia (S). Pacrinia (F).
جنس نباتات عشبية من فصيلة الناريديات انواعه المعروفة ١٢ منها البري والزرني والحر والتمر . سوقها فراجا تلوح من ٣٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها مركبة متعاقبة . ازهارها نطاطية غشوية متكونة التجميع . ثمارها يضيئة الشكل ، مستديرة الغنابت . اشهر انواعه .

كورنل الصغور . P. rupestris (S). P. des rocaillies (F).
كورنل سبرده . P. siberica (S). P. de Sibirie (F).
كورنل كعب الفزال . P. scabiosifolia (S).
P. à feuilles de scabieuse (F).

٢٤٢١٣ - كُورُ زُورُقي
Coreus scapha (S).
Coreus esquif (F).
حشرة خاضعة من فصيلة الكورسيات . جسمها مترسط

٢٤١٩٩ - كُورُ * ، كُوسَان

Pachyrhizus (S). Pachyrhiza, Pachyrrhiz (F).
كودو هو الاسم الهندي وكوسان الاسم الشائع في ملقة . جنس نباتات جنينة عارية وصعرة من فصيلة القرنيات الفرائشية . انواعها المعروفة قليلة المدد مهددا الهة الصينية وملقة . تزرع كنبات حولي لجناه جلوهها || سوقها عارية كالورياء . اوراقها معتقة مركبة من ثلاث وريقات قليلة الشكل . ازهارها عشوية التجميع ، ابيض الاركاناز . ازهارها صغيرة بنفسجية اللون ، مستديرة المرف . سفاتها مستطيلة ، معتدلة التليط || حبوبها تكوّن خضرها ومطبوخة . جلوهها شبيهة بالكربن وتكوّن طازجة ومطبوخة .

٢٤٢٠٠ - كُودُكس
Codex
مجموعة المقتاير الرسمية وهي تحوي وصف الادوية وتركيبها .

٢٤٢٠١ - كُودُن
Bardot (F). Hinny (E).
هو البهل المتولد من الحصان والأتان ومنهم من سماه البغل .

٢٤٢٠٢ - كُودُن
Croiser (F). To cross

٢٤٢٠٣ - كُودُكة
Croisement (F).
Cross-breeding (E).

٢٤٢٠٤ - كُودُو
Strepsiceros (S).
Strepsicère, Coudou (F). Kudu (E).

جنس حيوانات لينة عارية جثرة من فصيلة الايليات . له نوعان موطنها يتعد من الصومال الى الحبشة والزيبيز . وبعض اسواق افريقية الانجوية || ملابنها الحلياني جاحي . اجسامها كبيرة القدر كتين . يقرنها القلبية المستطيلة . اناثها جاح . ضررها ثنائية الاختلاف . عيها يستمر نحو ستة اشهر تنقص في تمامه بطورا واسدا .

٢٤٢٠٥ - كُودُو الحِشَّة

Strepsiceros imberbis (S).
Strepsicère imberbe, Coudou de l'Abyssinie (F).
نوع من الكودو . موطنه الحبشة والصومال . يألف الاثام والغابات التي يجتازها بجاري الماء . يسرح في النهار ويبيت في الليل في موالع معينة قلما يغيرها || جسمه كبير القدر بطول نحو ٢٦٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٤٠ سم . ارتفاعه نحو ١٢٠ سم . قرنه لويبي الشكل يرتفع نحو ٦٥ سم . ثوبه الى الشفحة السمرات متفاوتة المواج بين الرأس والظهر والصدر والبطن . وهو عادم المفرة والحلال الابيض في الجبهة انما يعلو من الحاروك الى الكفل خطوط متعرجة بيضاء مدعها ١٥ سنت الاكبر ١١٠ سنت الاث . قوائمه شديدة النشط وسرعة عدو تفوق سرعة كودو الرأس || اجله يتألف من اربعة ذكور مائة وثمان اناث وثمانية شواذن .

٢٤٢٠٦ - كُودُو الرأس

Strepsiceros capensis (S).
Strepsicère du Cap, Coudou du Cap (F).
نوع من الكودو . موطنه يتعد من رأس الرجاء الصالح الى الحبشة والصومال . يألف الغابات والارحاج . يسرح في النهار ويبيت في الليل || جسمه كبير القدر بطول نحو ٣٣٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٥٠ سم . ارتفاعه نحو ١٣٥ سم . قرنه لويبي الشكل . ارتفاعه نحو ١١٥ سم . والمسافة بين طرفي القرنين نحو ١١٠ سم . ثوبه الى الشفحة السمرات . عفرته شديدة السمرة تمتد من فة



كودو



كودو الحبشة

Coryza (F).

٢٤٢٢١ - كُورِيُولَا

هي التهاب فشاء الانثى .

Chortzema (S).

٢٤٢٢٢ - كُورِيُولَمَة

Chortzema (F). Tango plant (E). Körtzema (D). Chortzema (I).

جلس نباتات عشبية وجنية من البذراريات وفصيلة القرنليات . أنواره قليلة منبهاً استرالياً ، بعضها زراعي تزييني اشره :

Ch. didionii (S).

كُورِيُولَمَة ديكسويله

Ch. de Dickson (F).

كُورِيُولَمَة ليلية

Ch. cordatum (S).

Ch. en cœur (F).

Ch. varium (S). Ch. varié (F).

كُورِيُولَمَة موشية

٢٤٢٢٣ - كُورِيُولِيَة

Chorisia (S). Chorisia (F). جنس اشجار حرجية من فصيلة الزيفيات . أنوارها المعروفة قليلة اللمد ، منبهاً بعض المناطق الاسترالية اخصها امريكة الوسطى والجنوبية و اشجارها كبيرة ، دائمة ، تملو من ٢٠ الى ٣٠ م . أوراقها ذاتية ، مركبة ، خاسية الورقات البيضاء الشكل ، الجلمدة النصال . أنوارها عشبية ، خاسية البتلات ، عديدة الالسية . ثمارها حقية ، مستطيلة ، تحوى حلة بزور يشفاها زغب نام ، قصير الثتلة ، قلماً يصلح للقول . بزورها مأكولة بعد التخميس .

٢٤٢٢٤ - كُورِيُولِيُولَة هي الصلب ، اطليه .

Courisque (F).

٢٤٢٢٥ - كُورِيلِك

جنس طير من البذراريات مشهور باسم أمانزوة ، اطليه .

٢٤٢٢٦ - كُورِيلُولِيُوليس ، جيلُولِيَة

Corylopsis (S). Corylopsis (F).

جنس جنبات مصمرة من فصيلة المشركات . أنواره عديدة . اصطلها الصين واليابان . دعوا جيلُولِيَة لانها قريبة الشبه من الجلولز . سقها فراء . أوراقها حاملة . أنوارها سليل التجميع يستيق الاوراق . أنوارها صغيرة ملونة عريفة الرائحة . اشر أنواره ما يلي .

٢٤٢٢٧ - كُورِيلُولِيُوليس سُبُلِي

Corylopsis spicata (S). Corylopsis en épis (F).

جنية سبروية تزيينية منبهاً اليابان تملو نحو ١٢٠ سم . ساقها وفروعها زباد اللمد . أوراقها فضية النصل ، خلية الصفحة النفل تطلو من ٥ الى ٨ سم . سبلها سباحية أو تساعية الانهار تطلو نحو ٥ سم . || أنوارها يستمر طولك شهر اذار .

٢٤٢٢٨ - كُورِيلُولِيُوليس صِينِي

Corylopsis sinensis (S). Corylopsis de Chine (F).

شجيرة سبروية تزيينية منها الصين تملو من ٢ الى ٦ أمتار . ساقها فراء فله . أوراقها املجية الشكل ، نصلها يطلو من ٨ الى ١٠ سم . سبلها سباحية أو تساعية الانهار تطلو نحو ٨ سم . || أنوارها يستمر طولك الربيع .

٢٤٢٢٩ - كُورِيلُولِيُوليس قليل الزهر

Corylopsis pauciflora (S). Corylopsis pauciflora (F).

جنية سبروية تزيينية منبهاً اليابان تملو نحو ١٠٠ سم . ساقها فراء . أوراقها تطلو من ٣ الى ٦ سم . وتعرض من

القد والنبيلوط ، شبه مربع البطن ، مزواني الكوسل ، يطلو نحو ١٣ م . رأسها حرم . خطمها مستدل الطول . أنوارها نازل . عينها صغيرتان ، بارزتان . زبانا مستطيلتان . كوسلها مزواني الجانيين || قوما الى الحنطة الاسم الجولوي المواج . بطنها ملجح بالاسفر . الصفحة النفل من صدرها وبطنها الى الحنطة لتبري المواج || مسرعا الجراي حيث تكثر الاشباب والازهار .

٢٤٢٢٤ - كُورِيلِيَات

Coreidae (S).

Coreidae (F). Coreidae (E).

فصيلة حشرات من رقية خلفات الاجنحة وطبقة نصليات الجناح . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع اصقاع الاراب باقتناء المناطق القطنية || اجسامها متباينة الحجم والاشكال . رؤوسها حمرية أو مرمية . قرننها الاستشعارية رباعية النفل . صفحات صدرها النفل السفل لاقنسية التخميد للمد لاستيعاب الاعظام || جميعها من الحشرات الخاضعة القليلة الاقن .

٢٤٢٢٥ - كُورِيل

Eurypyga (S). Caurale (F).

جنس طير من فصيلة الكورليات . أنواره المعروفة قليلة اللمد . موطنها يضل كابل امريكة الجنوبية . اجسامها رفيعة . مناقبها جالسة مستعدة الاطراف . اجنحتها مستعرضة ذرية . اذنانها مستطيلة القد عريضة الرقال . ارساخها ربيعة رفيعة . ارياشها رقلة . اقولها متراكبة الالوان الزاهية || احرف أنواره واشهرها كوريل الشمس .

٢٤٢٢٦ - كُورِيلُ الشَّمْسِ * ، بَلَشُونُ الشَّمْسِ

Eurypyga helias (S). Caurale soleil, Héron soleil (F).

طائر من الكوريل طولهُ نحو ٤٤ سم . قويه موزكن الالوان يجمع بين الالطل والاسفر والاخضر والاسود والابيض والاسمر وعنفي . زور وحصره مع خطمها الى الياض الناصبي . رنقه مؤذر بالاسمر والاسود . ظهره وسفله جامدة بالاصعب والالسلح . الفتيكه وذنبه وقوادحه واباهره وسناكه مخططة بالابيض والاسود . صدره وبطنه الى الياض الحنطي . صدقة عينه حراء اللون ، متقادة وساقه صفر || موطنه امريكة الجنوبية ، يأنف الاغوار ويجاري المياه . قوته الحشرات حل اختلاف أنوارها || يدرن في الاشجار المكشوفة القناء . يميلك منه بالحنش ويبطنه بالسلك والطين . انشاء تحسن من يفتين الى ثلاث يضاها نحو ٣ اياميع .

٢٤٢٢٧ - كُورِيلِيَات

Eurypygidae

فصيلة طير تجمع بين النفل وطول الساق . رؤوسها واصناتها واجنحتها بلشونية الشكل ، مناقبها وساقها ثققلية . موطنها امريكة الجنوبية . تألف الاغوار ويجاري الماء . قوتها الحشرات حل اختلاف أنوارها .

٢٤٢٢٨ - كُورِيلَمَة

Tige souterraine bulbeuse (F). Corm (E).

نعت تعريني توصف به الساق القنسية الديماسية .

٢٤٢٢٩ - كُورِيلَاد

Corydale (F).

هي التبرية ، نبات من الحشائشيات ، اطليه .

٢٤٢٣٠ - كُورِيلَالِين

Corydalina (F).

مادة قلووية عادمة اللون مشووية البلورات تستخرج من جنور الكوريدال اكلاروند . تفل عنه ١٣٤ سم . وهي قليلة اللوان في اللد . تلذب في الكحول السائلة وفي الكلوروفورم والايتر .



كورل الشمس



كُورِيلَمَة



كُورِيلَس سَلِيل

٢٤٢٣٨ - **كُوسَج** هو القرش، اطلبه .

٢٤٢٣٩ - **كُوسَجِيَّات** Scyllorhinidae (S).

الكوسجيات فصيلة أسماك بحرية تسمى أيضاً غرائيات ، اطلبها .

٢٤٢٤٠ - **كُوسَل** Coselet, Pronotum هو في الحشرات الحلقة العليا من مقدم الجشش .

٢٤٢٤١ - **كُوسِي** Cucurbita pepo ovesera (S).

Courgette (F), Vegetable marrow (E), Elerkürbis, Kürbis (D), Zucca, Z. da mangiare (I).

نبات زراعي من فصيلة القرعيات . فروبه وأصراعه عديدة . زراعتها مروية . ثمارها مستطيلة تؤكل مطبوخة . وتُزار الكوسى تحوي نحو :

- ٩٥,٠٠ ٪ من الماء
- ٥,٨٠ ٪ من المواد البروتينية
- ٥,٢٠ ٪ من المواد النعنية
- ١٥,٢٠ ٪ من المواد السكرية
- ٢,٧٠ ٪ من المواد النشوية
- ٥,٥٠ ٪ من الألياف

وهي تحوي أيضاً بعض الأملاح المعدنية أهمها الكلسيوم والحديد مع القليل من الفيتامين ١٠ والقليل القليل من الفيتامين ٥ ث .

٢٤٢٤٢ - **كُوسِي إفرنجي** Chayote (F).

هو السكوب ، نبات زراعي من القرعيات ، اطلبه .

٢٤٢٤٣ - **كُوش** Apparier (F), To couple (E).

كوش الطائر أثناء سفدها والكوش سداد الطائر .

٢٤٢٤٤ - **كُوش** Conyza dioscoroides (S).

Conyza, Conisa, Conisa (F), Ploughman's spike-nard (E), Dörrkraut (D), Coniza (I).

نبات عشبي بري طبي مسم من فصيلة المركبات . يجلبه تملون من ٤٠ الى ٨٠ سم . ساقها عشوية فراء . اوراقها متعق اعليجية ، نصلها ازغب البشرة على صفحتيه . ازهارها الى اليباض الأخير || يستخرج منه بعض المواد الطبية الصحية وهو يحوي بعض العناصر الجسمية العلامية التي تلتك بأشجرات أهمها البرابيث .

٢٤٢٤٥ - **كُوشَاد ، جَنْشِيَّات ، جَنْشِيَّات**

Gentiana (S), Gentiane (F), Gentian (E).

جنس لبئات جنينية وضعية من فصيلة الكوشاديات . انواعه نحو ١٢٤ معلها بري وبعضها زراعي وتربي بعضها طبي . يستخرج من جذور أكثر الانواع مر الكوشاد وصالح الكوشاد وصباغ الكوشاد . ويلور بعضها تحوي نحو ١٥ ٪ من السكر الذي يستخرج منه بعد التصفير نوع من القندي الجيد الصنف || أعرف انواعه وأشهرها ما يتبع .

٢٤٢٤٦ - **كُوشَاد أَرْجَوَانِي**

Gentiana purpurea (S), Gentiane pourpre (F).

نوع من الكوشاد وهو بجلة جبلية مبدولة تمل من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقها لاطئة متعاقبة سنائية ، نصلها بطول نحو ٢٠ سم . ويعرض نحو ٥ . ازهارها طريقة الارتكاز ، قصيرة الممايق ، أرجوانية اللون ، سفاه الملاج . توجيها جري الشكل سداسي التصفير المستعرض || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

٢ الى ٤ ، سنايلها ثنائية او ثنائية الازهار || ازهارها يستمر طوال شهر آذار .

٢٤٢٣٠ - **كُورِيلُوسِ مُسْتَعْرِضِ الْبَتَلَات**

Corytopsis platypetala (S), Corytopse à pétales élargis (F).

جنبة تربيعة مهدا الصين تمل من ١٠٥ الى ٢٥٠ سم . سنايلها مجرعة القروع ، خلية اللحاء . اوراقها يضيعة الشكل ، نصلها خلية الصفحة السفلى بطول نحو ١٠ سم . سنايلها خاسية او سباعية الازهار بطول من ٣ الى ٥ سم . بتلات ازهارها فأسية الشكل مستعرضة || ازهاره يستمر طوال فصل الربيع .

٢٤٢٣١ - **كُورِيلُوسِ** Lortulus (S), Coryllis (F).

جنس طير من التسلقات وفصيلة البقارات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها ماليزية وجزر الزانج . ملجنها الحياني جامعي الا في زين التسلق والخفاضة . تألف الثفانيات . قوتها البار حل اختلاف اجناسها وانواعها || اجسامها صغيرة القد . اثوابها جميلة الالوان الزاهرة . تتميز بقصر اذنانها المستديرة الاطراف . ومن ميزاتها ايضاً انها تعدل كاتافانيس عند النوم .

٢٤٢٣٢ - **كُوز** Strobile (F).

Strobile, Pine-cone (E).

نمت تعريفي يطلق على البار الكوزية مخروطية الشكل ، الزوقية او اليقية للشجر .

٢٤٢٣٣ - **كُوز كَنْدَم** Mangoustanier (F).

هو جيز جنتم ، اطلبه .

٢٤٢٣٤ - **كُوزَن** Daine (F), Doe (E).

هي انثى الابل الاسمر او الاريل .

٢٤٢٣٥ - **كُوزُو** Trichosurus (S).

Trichosure, Kousou (F), Kousu (E).

جنس حيوانات لبونة من الجرابيات الفاشجرات وفصيلة الفلنجرينات . موطنه امترالية . تألف الاجراج أهمها اجراج الاراكاليوس . قوته الوراق والازهار وبيض الصائير والمصائير وأشجرات . يسرح في الليل ويرقد في النهار || جسمه يحيم جسم السنور البري . رأسه مخروطي الشكل . اذناه فاشرتان . غلافه خاسية الاصابع متحدة الارتقا || أثناء رباعية الاختلاف . له نوعان التلطي والتكسي .

٢٤٢٣٦ - **كُوزُو تَعْلِي**

Trichosurus vulpecula (S).

Trichosure renard, Kousou renard (F).


نوع من الكوزو شكله شكل التلبي ، حركاته حركات التلجب . اذناه كيرتان قائمتان . ذنبه جطل الصفوف المستطيل . ثوبه الى الصهوة الشهاب يملوا موج صناعي يمتد في الظهر ويغير في الاطمين والبطن .

٢٤٢٣٧ - **كُوزُو كَنْبِي**

Trichosurus caninus (S).

Trichosure canin, Kousou canin (F).

نوع من الكوزو لا يختلف من التلطي الا باذنيه المدورين ويشكل الرأس الذي يشبه رأس الكلب وبذنيه القصير الصفوف . ثوبه خال من الموج الصناعي تملو مشعة سمراء .



كوسى



كوش



كوشاد ارجواني

٢٤٢٧ - كُوشَاد أَصْفَر * ، جَنْتِيَانَا صَفْرَاءُ ،

جَنْتِيَانَا صَفْرَاءُ ، دَوَاءُ الْحَمِيَّةِ

Gentiana lutea (S). Gentiane jaune, Grande gentiane (F). Yellow flowered gentian (E). Gelber Enzian (D). Gentiana gialla, G. maggiore (I).

نوع من الكوشاد وهو جنية ممررة جصاصمة طيبة وصناعية تملو من ٥٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقها لاطئة متقابلة تطول نحو ٣٠ سم. ويعرض ١٥ ، فصلها طيب الصلصة جميل الخضار . أزهارها ضخمة التجميع ، أبوية وثابتة الارتكاز، مستطيلة المالحيل ، خماسية أبتلات التجميع الشكل والانتشابه ، لونها إلى الصفرة || جلورها وافر المواد الطبية والصباغية والسكرية . أزهارها يستمر من حزيران إلى آب.

٢٤٢٨ - كُوشَاد رَيْبِي * ،

Gentiane printanière (F).

نوع من الكوشاد وهو عشية ربية مبلولة تملو نحو ١٥ سم. أوراقها صغيرة اللثة تطول نحو ٣ سم. ويعرض نحو ١ سم. أزهارها طرفية فردية مستجيبة اللون. توجعها خامي التفصيص يطول نحو ٣ سم. || أزهارها يستمر من آذار إلى تموز.

٢٤٢٩ - كُوشَاد صَلْبِيَّي الْوَرْدِ

Gentiana cruciata (S). Gentiane croisetia (F).

نوع من الكوشاد وهو عشية مبلولة ممررة تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها خمسية رباعية متقابلة تملو كالصلب. فصلها يطول نحو ١٠ سم. ويعرض نحو ٢ سم. أزهارها أبوية الارتكاز خمسية التجميع كثيرة المدد زرقاء اللون. توجعها رباعي التفصيص || أزهارها يستمر من حزيران إلى أيلول.

٢٤٣٠ - كُوشَاد لَبْنِي * ، جَنْتِيَانَا لَبْنِيَّةُ ،

جَنْتِيَانَا لَبْنِيَّةُ

Gentiana asclepiadea (S). Gentiane-asclepiade (F). Milkweed gentian, Willow gentian (E). Würgerenzian (D). Gentiana asclepiade (I).

نوع من الكوشاد وهو جملة ممررة طيبة وصناعية تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم. أوراقها لاطئة متقابلة سنائية الشكل؛ فصلها يطول من ٥ إلى ٨ سم. ويعرض من ٣ إلى ٥ سم. عروقها بارزة ثلاثية أو خماسية المدد. أزهارها مستجيبة اللون مرتبطة بالنسجي. جلورها وسطها خزيمة الصبارة القلبية الصناعية || أزهارها يستمر من آب إلى أيلول.

٢٤٣١ - كُوشَاد مَهْدَب * ،

Gentiana scutella (S).

Gentiane scaule (F).

نوع من الكوشاد وهو نجمة تربينية مقرّة. فروجها تملو نحو ١٠ سم. أوراقها لاطئة متقابلة تطول من ١٠ إلى ١٢ سم. أزهارها كبيرة اللثة، فردية التجميع، تطول من ٥ إلى ٦ سم. لونها إلى الزرقة المستجيبة || أزهارها يستمر من تموز إلى آب.

٢٤٣٢ - كُوشَاد مَهْدَب * ،

Gentiana ciliata (S).

Gentiane cilie (F).

نوع من الكوشاد وهو عشية سربية تملو من ٢٠ إلى ٣٠ سم. ساقها غرام رباعية التصنيع . أوراقها لاطئة متقابلة ، فصلها شيق الصلصة وحيد الفرق. أزهارها زرقاء اللون ، طرفية الارتكاز ، فردية التجميع ، تطول من ٤ إلى ٥ سم. توجعها رباعي التفصيص ، مهدب الحنار والمخلّة . أزهارها يستمر من آب إلى تشرين .

٢٤٣٣ - كُوشَاد بَيَات ، جَنْتِيَانَا بَيَات ،

جَنْتِيَانَا بَيَات

Gentianaceae (S).

Gentianacées (F). Gentianacées (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وسيدات القمالة . أنوارها نحو ٥٠٠ تنتمي إلى ٦٠ جنسًا . جميعها أعشاب ونباتات صغيرة اللثة . أوراقها لاقبسية الشكل والانتظام . أزهارها عشيرة لاقبسية التجميع يكثر في ألوانها الأزرق والأرجواني.

٢٤٣٤ - كُوشَر * ،

Pluchea (S). Pluchée (F).

Ovra-bla (E). Ovrahlakorn (D). Pluchea (I).

جنس نباتات ربية ممررة من فصيلة المركبات . أنواعه نحو ٢٠ أصنافها المناطق الحارة في جميع أصقاع العالم . نباتاته عشية أو بحلية . أوراقها متعاقبة . أزهارها عطيفة التجميع .

٢٤٣٥ - كُوشَنَة ٥

Dendrométrie (F).

Forest mensuration (E).

تقدير أشجار الحرج مع أبعادها وأشكالها وأعمارها وسائلها الحاضرة والمستقبلية .

٢٤٣٦ - كُوشِيل

Cochénille (F).

هي القرمزية ، أظلم .

٢٤٣٧ - كُوشِيل أَسْتَرَالِيَّةُ

Cochénille australienne (F).

هي القرمزية الأسترالية ، أظلم .

٢٤٣٨ - كُوشِيل الْبُرْتَقَالِيَّةُ

Cochénille blanche des oranges (F).

هي قرمزية البرتقال البيضاء ، أظلم .

٢٤٣٩ - كُوشِيل الْبُرْتَقَالِيَّةُ

Cochénille noire de l'orange (F).

هي قرمزية البرتقال السوداء ، أظلم .

٢٤٤٠ - كُوشِيل الْفُضْحُ

Cochénille du pommier (F).

هي قرمزية الفضح ، أظلم .

٢٤٤١ - كُوشِيل الْفِيْنِ

Cochénille du figuier (F).

هي قمية الفين ، أظلم .

٢٤٤٢ - كُوشِيل الصَّبَار

Cochénille du nopal (F).

هي قرمزية الصبار ، أظلم .

٢٤٤٣ - كُوشِيل الْكَلِّ

Cochénille de la lique (F).

هي قرمزية الكَلِّ ، أظلم .

٢٤٤٤ - كُوشِيل الْكُورِ

Cochénille de l'amandier (F).

هي قرمزية الكور ، أظلم .

٢٤٤٥ - كُوشِيل الْخَنِيلِ

Cochénille du dattier (F).

هي قرمزية الخنيل ، أظلم .

٢٤٤٦ - كُوشِيل الْوَرْدِ

Cochénille du rosier (F).

هي قرمزية الورد ، أظلم .



كُوشَاد أَصْفَر



كُوشَاد رَيْبِي



كُوشَاد لَبْنِي



كُوشَاد مَهْدَب



كُوشَر

٢٤٢٧٧ - كوشنيل سان جوزيه

Sabulicola (F).
تحت ترميزي يطلق على كل دوية أو حشرة أو نبات يعيش في كوشنيل الرمل وكتبانه .

٢٤٢٧٨ - كوشنيل طوطية

Cuphaea (S).
Cuphée, Cuphée (F). Cigar flower (E). Höckerkiech (D). Cufée (I).
جنس نباتات عشبية خشبية من فصيلة الحثائيات . أنواعه نحو ٨٠ أصلها بلاد الحارة الأمريكية . أوراقها صغيرة متقابلة . أزهارها عيورية الارتكاز ملونة تتميز بأحاديدها ككرويسا وبكبر بتلاتها العليا || أحرف أنواعها وأشهرها ما يلي .

٢٤٢٧٩ - كوشنيل بنفسجية

Cuphaea cyanea (S). Cuphée violette (F).
نوع من الكوشة الأثيوبية المعمرة تملو نحو ٢٠٠ سم . ساقها زينة . أوراقها متقابلة بيضية ، نصلها ذات الزام الاخير . كرويس أزهارها خلية البشرة . ارجوانية الانتساب صفر الجسم . بتلاتها ثنائية ، كبيرة القند بنفسجية اللون . أزهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٤٢٨٠ - كوشنيل سلقونية

Cuphaea miniata (S). Cuphée à pétales vermillon (F).
نوع من الكوشة الأثيوبية المعمرة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . نصلها زينة فراء . أوراقها متقابلة قصيرة الاصل . نصلها خضراء ، خلية البشرة . كرويسا أزهارية عشارية التستين تملو نحو ٣ سم . بتلاتها سلقونية اللون || أزهارها يستمر طوال الصيف وأخريف .

٢٤٢٨١ - كوشنيل صناعية

Cuphaea lanceolata (S). Cuphée à feuilles lancéolées (F).
نوع من الكوشة الأثيوبية المحلية تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . ساقها وفروعها منتصبة . أوراقها سنية ، متقابلة ، تملو نحو ٥ سم . وتعرض نحو ٢ سم . نصلها خلية البشرة ناضر العروق . كرويسا الأزهارية كثيرة الاحاديث ، بتلاتها مستديرة منتصبة وريدة أو ارجوانية اللون || أزهارها يستمر طوال الصيف .

٢٤٢٨٢ - كوشنيل ناروية

Cuphaea ignea (S). Cuphée rouge-feu (F).
نوع من الكوشة الأثيوبية المعمرة تملو نحو ٣٠ سم . ساقها وفروعها مضطربة الزوايا . أوراقها متقابلة ، اهليلجية ، مدببة . كرويس أزهارها ناروية اللون ، سداسية التستين ، مستطيلة المائل || أزهارها يستمر طوال الصيف .

٢٤٢٨٣ - كوشنيل كوكا

Erythroxylon coca (S). Cocaier, Coca (F). Coca, Spadic busch (E). Cocastrach (D). Coca (I).
نبات بري وزراعي من الكوكيات . مهدد البلاد الحارة الاسيوية أعصها الهند وبرينديب . فروعه عديدة ، جميعها جنات معمرة تعيش من ٤٠ الى ٦٠ سنة وتملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . ساقها يشبه اللحاء . أوراقها متقابلة مدقة اهليلجية مدببة . نصلها بارز الضلع والمرواق واضح الشرايين ، أخضر الصفرة العليا ، زيتي السفلي . أزهارها عيورية الارتكاز ، صغرة القند صفراء اللون . ثمارها ثورية مستطيلة الشكل حاوية الاثمار || يستخرج من أوراقها بعد تقطعها ويغليها مادة قلوية غندرة طيبة طعم كوكاين .

٢٤٢٧٧ - كوشنيل سان جوزيه

Cochenille de San José (F).
هي القرمزية الناعكة ، اطلها .

٢٤٢٦٨ - كوشنيل طوطية

Cochenille floconneuse de la vigne (F).
هي قرمزية الكرم الحمر ، اطلها .

٢٤٢٦٩ - كوشنيل غبراه

Cochenille farineuse de la vigne (F).
هي القرمزية النعارة ، اطلها .

٢٤٢٧٠ - كوشنيل هيتيم

Kochia (S). Kochia, Beivédère (F).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة السرمقيات . أنواعه نحو ٣٠ معظمها بري وبعضها زينة حرمي الشكل . ساقها فراء فناء منتصبة تملو من ٤٠ الى ٢٠٠ سم . أوراقها متعاقبة مشتركة غطية يكثر فيها الهيب ، تلو خضراء اللون صفراء الملوحة ثم تحمر مع الخريف . أزهارها عيورية الارتكاز ، صغرة القند ، قليلة العدد || وهي تستعمل في صناعة الكائنات ولعود القز كالشع .

٢٤٢٧١ - كوشنيل هريمية

Kochia-cyprès (F).
هي الحشم الحرمي ، اطلها .

٢٤٢٧٢ - كوشنيل

Cochylis (F).
هو المنقوط ، اطلها .

٢٤٢٧٣ - كوشنيل الكرمية

Cochylis de la vigne (F).
هو فائلة العنب ، اطلها .

٢٤٢٧٤ - كوشنيل

Radius
هو العلم الاسفر من الزند الاصل .

٢٤٢٧٥ - كوشنيل

Colon (S). Colon (F). Colon (E).
جنس حشرات من فصيلة الكوريات وثية غديات الاجنحة . أنواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة تملو من ٣ الى ٤ مم . رؤوسها مستديرة . عيونها صغيرة بارزة . تأثيرها وكوكها ويلاصها نظامية . قرونها الاستشعارية قصيرة ، دبسية الشكل . كواصلها عريضة . امحادها لاحقة . اولها وامحادها كثيفة الخمل الناعم . قوائمها صغيرة . اثوابها تسرع من القسرة الى السواد القاتم || تأت الحفول والفايات . تسرح في الليل . طيراتها خفيف الحركة . تعيش تحت الحجارة والجافة . بعضها قاصص والبعض الآخر داسن .

٢٤٢٧٦ - كوشنيل

Colonidae (S). Colonidae (F). Colonidae (E).
فصيلة حشرات من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، نحو ٥٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ، اهليلجية الشكل ، تملو من ٣ الى ٤ مم . رؤوسها مستديرة . عيونها بارزة . تأثيرها نظامية . قرونها الاستشعارية قصيرة ، رباعية القمم ، دبسية الشكل . كواصلها عريضة ، امحادها لاحقة . خلية انتشار || جميعها مفرطة رداة . تعيش تحت الحجارة والجافة . تسرح في الليل . طيراتها خفيف الحركة || أشهر اجناسها الكومر .



كوشنيل



كوكا



كوكال السباح



كوكاليس



كوكال البحر



كوكلة كبيرة



كوكلة



كوكلة الشبحان

صغيرة. سوطها كثيرة القروع. عراجلها مشعبة. اوراقها خيطية شبه متصالية يملؤها عجيب متتابع مستنقل الوسط الاجوف، مستنق الاطراف، يبدو كجمجمة من الكوكاب.

٢٤٢٩٢ - كوكلة

Astrantia (S). *Astrantia* (F). *Astrantia* (E). جنس نباتات برية وزراعية مسمرة من السنكليات وصفيلة الخبيثات. انواعها قليلة جميعها بجيلة وجينية. اوراقها مقصصة. ازهارها صيوانية التصنيع، تبوء كالشجر يضاء اللون او وردية. جلورها طيبة سهلة. احرف انواعها واشهرها مايي.

٢٤٢٩٣ - كوكلة عوركية الورق

Astrantia helleborifolia, *A. heterophylla*, *A. pontica*, *A. trifida* (S). *Astrance à feuilles d'Elleboro* (F). نوع من الكوكبية وهي بجيلة برية وريسية مسمرة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اروتها مدادة، ساقها متصبية. اوراقها ثلاثية الفصوص السنانية المسنة المهدبة. قاذرة صيوانيا الزهري مؤلفة من ١٢ الى ١٣ قاذبة مهدبة الاطراف. ازهارها وردية اللون. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٤٢٩٤ - كوكلة صغيرة

Astrantia minor (S). *Pacite astrance* (F). نوع من الكوكبية البرية المبلولة وهي بجيلة صغيرة اللد تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اروتها مدادة، ساقها مستنقة. اوراقها خاسية او سباحية او تساعية الفصوص الضيقة التي تطلو من ٢ الى ٤ سم. وتقرض من ٨ الى ٨ سم. اصورتها الزهرية صغيرة اللد قطرها نحو ١ سم. ازهارها الى اللياس الاغبر. ازهارها يستمر من تموز الى آب.

٢٤٢٩٥ - كوكلة كبيرة

Astrantia major (S). *Astrance majeure*, *Grande astrance*, *Sanicle de montagne*, *S. femelle* (F). *Larger astrantia*, *Master wort* (E). *Grosse Sternoldole*, *Meisterwurz* (D). *Astrantia maggiore*, *Sanicola femina* (I). نوع من الكوكبية الطيبة والريسية وهي جنة صغيرة اللد تملو من ٧٠ الى ١٥٠ سم. جلورها طيبة سهلة. ساقها قوية متصبية. اوراقها كبيرة مستعرضة خاسية او سباحية او تساعية الفصوص الاطليجية الشكل المسنة الخضر. اصورتها الزهرية كبيرة اللد، ازهارها يضاء اللون، قنابها وردية. ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

٢٤٢٩٦ - كوكلة

Silquaria (S). *Silquaria*, *Ténagode* (F). *Silquaria* (E). جنس حيوانات بحرية من الرغويات مبعيات الاربيل وفضيلة المختبليات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة. اصلها انبوية مستطيلة ملوكة. قطر الانبوب ودوره الاربوية واسطها تختلف مع الانواع.

٢٤٢٩٧ - كوكلة الشبحان

Cuculla abinthii (S). *Cuculla des armoises* (F). *Cuculla abinthii* (E). حشرة من المستقيات وريبة حرشيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اطراف اوروبية. قنابها جارية قوتها رقيق الانظار. سرتها غامضة واشعة تعيش على

٢٤٢٩٨ - كوكال

Centropus (S). *Coucal* (F). جنس طير من فصيلة البتروبيات. انواعها المعروفة نحو ٣٠ اصلها البلاد الحارة الاسيوية والافريقية والاسترالية. اجسامها متوسطة القد او كبيرة. اطوالها تراوح من ٤٠ الى ١٠٠ سم. جميعها من الطيور المستقلة القليلة الطيران. تتميز باصطالة اذانها وبالحياض الصفراء المواج. اجنتها قصيرة. منقدها قوية، صعدية الاقفاك العليا. قوتها يشمل كل ما دب على الارض من احيث الاناعي الى النعام والتماكب والمقارب والديدان. ذكورها واناثها تتناوب على سحن البيض الذي يستمر نحو ١٥ يوم. اظهر انواعه كوكال السنغال وكوكال السباحات.

٢٤٢٩٩ - كوكال السنغال

Centropus senegalensis (S). *Coucal du Sénégal* (F). نوع من الكوكال. اصلها تمتد من السنغال الى السودان. يألف الاذلال والاجام والقباض. ينساب بين الاشجار ويتسلق الاشجار بصفة. جسمه يطلو من ٤٠ الى ٥٠ سم. رأسه وعنفه والقسم الامامي من ظهره الى السواد اللباس يملو مراح ازرق اسفع. جناحاه والقسم الخلفي من ظهره الى الصخرة الشفراء المواج. انفيكه وذنبه الى السواد المنسج بالاصهب. بطه الى اللياس الاغبر. قوته الخشرات والجنادب والمقارب والافاعي الصغيرة.

٢٤٢٩٩ - كوكال السباحات

Centropus rufipennis (S). *Coucal des haies* (F). نوع من الكوكال. اصلها تمتد من شط العرب الى الهند والهند الصينية. يألف للناطق الريسية والاجام والقنابات. يقترب من المزارع ويحمي حل السباحات. يملو بسرعة ويتسلق بصفة ويظهر بطه. جسمه يطلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. ثوبه الى السواد الازرق المواج. بطه الى الصخرة الخيطية. انفيكه احر. ذنبه الى الجورة. قوته الاقافي والنعام والوزغ والمقارب والجراد. يذئ حشه بالحشيش الاخضر في الانجبار القليلة الارتفاع.

٢٤٢٩٧ - كوكاليس

Cucullis (S). *Cucallide*, *Cucallier*, *Cucallina* (F). *Cucullis*, *Beer parsley*, *Hedge parsley* (E). *Hufedode* (D). *Cucullis*, *Lappolina*, *Secca* (I). جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الخبيثات. انواعها المعروفة ١٨ منها البراري والاحراج.

٢٤٢٩٨ - كوكالين

Cocaine (F). *Cocaine* (E). شبه قلوي نباتي يستخرج من اوراق الكوكا يستعمل في الطب لتفدير الموضعي.

٢٤٢٩٩ - كوكب افريقية

Aster d'Afrique (F). كوكب افريقية، اطله.

٢٤٢٩٠ - كوكب البحر، كوكب مريم

Asterias (S). *Astéria*, *Etoile de mer* (F). *Asterias*, *Starfish* (E). جنس حيوانات مائية من فصيلة كوكاب البحر. انواعه كثيرة العدد منتشرة في جميع بحار العالم.

٢٤٢٩١ - كوكبية، لومنتاريا

Lomentaria (S). *Lomentaire* (F). جنس نباتات بحرية من الخبيثات احر. انواعها المعروفة اصلها بحار البلاد المعتدلة الحارة. كلالها

يتميز بقصر منقاره الاعطف الثلاثي التفريش . اجنحته متوسطة القد منفرجة . ذيله مستدير قصير || انواعه عديدة نحو ٢٥ موطنها البلاد الامريكية . تألف البطائح والسهول . قوتها الحبوب والثمار والخضراوات || انثاه تفريش من ١٤ الى ٢٥ بيضة تحضنها وحدها في اقصوع تدثته بالخشيش بين الادغال والاشجار || اشهر انواعه ما يلي .

٢٤٣٠٤ - كُولَاة عَصِيرِل

Colin de Gambel, Caille à casque (F).
طائر من الكولان يتميز بقزخته المولفة من ٦ ارياش . ثوبه متراكب الالوان فيه الازرق والاصفر والاحمر والاحمر والازرق والاسود || يألف المناطق الرطبة قرب مجاري الماء .

٢٤٣٠٥ - كُولَاة فيرجينية

Colin de Virginie (F).
طائر من الكولان . ثوبه متراكب الالوان . ظهره الى الجوزة المؤدرة بالاسود والاصفر . رأسه عديم القزعة . يألف المراعي والحقول المزروعة وجوانب الرياش .

٢٤٣٠٦ - كُولَاة كليفرنية

Colin de California (F).
طائر من الكولان . ثوبه متراكب الالوان . رأسه متوج بقزعة مستطيلة الريش الاسجمن اللينة || يألف الحشبات والادغال وحقول المزرعة .

٢٤٣٠٧ - كُولَاة مسينا

Colin Masséna (F).
طائر من الكولان . ثوبه اسود اللون يعلوه تزييم ابيض . يألف الرياش ومجاري الماء .

٢٤٣٠٨ - كُولَاب

Cholæpus (S).
Cholæpe (F).
جنس حيوانات بحرية من فصيلة الدبابات المتسلقة البطيئة الحركة . طولها يراوح من ٤٥ الى ٥٥ سم . قوائمها ثنائية الاظافر المتسلقة المنحرفة . ثوبه كثيف الوبر لونه الى الصفرة المائلة . يعيش على الاجنار . قوته البرام والتفريش والثمار . اثناء تضع جروا واحداً ترفضه وتحمله حتى النضام || له نوعان كولب الامازون وكولب كولومبيا .

٢٤٣٠٩ - كُولَابَة

Calappa (S).
Calappe (F), Calappe (E).
جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل وفصيلة الكوليبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطاهما بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صلبة قلنسوية الفوزن محبة التدروع محرمة الافواه . ارجلها دقيقة . ملاحظها كبيرة مسطحة متائلة || لحومها كاعنة الصنف لا تؤكل || اشهر انواعها الكولبية المحببة .

٢٤٣١٠ - كُولَابَة مَحْبَبَة

Calappa granulata (S). Calappe granulé (F).
يكثر ويوجد في البحر الابيض المتوسط . تعيش على رمال الشواطئ المنصورة بالماء .

٢٤٣١١ - كُولِيَّات

Calappidae (S).
Calappidés (F), Calappidés (E).
فصيلة حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل المحرمات . اجناسها وانواعها المعروفة

اوراق المركبات وازهارها واصلها الشبان || جسمها متوسط القد يعلو نحو ١٦ م . يستطاع نحو ٤٢ م . رأسها حشلي اللوب . عينها كيرتان . زياتها خيطيان . جوشها حشلي العين اصفر المراح . يعلها الى الحشلي الاشجع المراح يعلو نحو ٦ م . جوشي اسود يقطب كامل البطن عند الذكر ويقطب نحو ثلثه عند الانثى || واصلها عند الشقين الى الحشلي الاصفر تملو في الزوج الاناسي زركشة وشفرة وتزايون تراوح من الصافي الى الاسود || لها جبل واحد في الحول . تظهر القزعة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تماثل بده ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد لكن لطفاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرعة تطول نحو ٣٢ م . جسمها اسطواني الشكل . ثوبها الى الخضار الباهت يعلو تمشيع اربد وتجديد منفرش اسود يمتد من السكة الثالثة الى التاسعة . رأسها اسود . منها الى اربعة الخضراء . وارجبها الى السمرة || طور الاكامل الذي يسرح نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة حيث تنضج السرة ملتحقة بجلباب من اللبن .

٢٤٢٩٨ - كوكو مُدَّهَب

Coucou doré (F).
طائر مشهور باسم هيو ، اطلبه .

٢٤٢٩٩ - كوكوئس

Cocculus, Cebatha (S).
Coquecul, Cébathe (F).
جنس نباتات عارشة برية معمرة من فصيلة القرنيات . انواعها نحو ٢٠ . جميعها طيبة مهدا المناطق الاستوائية . سويقها متسلقة . اوراقها متعاقبة لاقامية الشكل . ازهارها عتيقية التجميع ثنائية المسكن . ثمارها نورية لا قيمة لها .

٢٤٣٠٠ - كوكيَات

Erythroxylacées (S).
Erythroxylacées (F), Erythroxylacées (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . اجناسها وانواعها قليلة العدد اشهرها الكوكا .

٢٤٣٠١ - كُولَا * كُولَة

Stearculia acuminata (S). Colatier, Kolatier (F). Colanut, Kola-nut tree (E). Kolaubum, Stinkbaum (D). Cola, Noci del Sudan (I).

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة البرازيات . انواعها قليلة اعطاهما المناطق الاستوائية الافريقية . اشجارها تملو من ١٥ الى ٢٥ م . سويقها خضراء اللون مشقة القشور . اجناسها متباعدة متتالية . اوراقها معتقة متعاقبة اهليلجية ؛ نصلها جامد الصلصة ؛ يازر المروق ، مستطيل المتى ، مدب الطرف . ازهارها ذكورية او شتوية ، الخشيرة عتيقية التجميع ، بحورية الارتكاز ، تتكون كل الانثاء التي بلغ عمرها ثلاث سنوات او اكثر . ثمارها قرون نولية مبيلة تدلف من لوزتين الى عشر نوزات كلوية الشكل جامدة المادة اليابانية التي يراوح لونها من الاحمر الى الازرق والاصفر ، وهي مأكلة مغذية تنشط القلب رتبته الاصاب وتدفق الشعب والهرم .

٢٤٣٠٢ - كُولَان

Kaolin, Argile blanche (F).
Kaolin, Porcelain clay (E).
هو الاسم الصيني والسلمي للصصال الحر الاخير اللون الذي يستعمل في صناعة الخزف وغيرها .

٢٤٣٠٣ - كُولَان

Collins (F).
American partridges (E).
جنس طير من عمارة الحجلبات وفصيلة الطيوريات .



كوكول



كولا



كولانة كليفرنية



كولب



كولبة



كوكب أرنك

العلل : اسمر الخطم الاصل ، اصفر الاسفل . سلكه معتلة الطول سواد اللون . حلقه حيه الى الحرة اليافوتية || يأتل الاسراع الكثيفة ويقرب من الاماكن الاكلة لكنه كثير الرسل والخلد || قوته الخشبات واساربعها والجراد والبراقي والنمل والناث والبرية والزراعية ومنها الكرز والبن || الاثني ثلثون عشفا في الاشجار الرقيقة البراقة اللؤل ويبيض من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ٤٠ يوما .

Salilla, Colt, Monte (F).

كوكب

زو ذكر الحيوان حل انشاء وقد شاع استعمالها في الحيوان والديريات .

٢٤٣١٩ - كوكب روك * ، صرأبيكة

Coumarouna odorata, Dipteryx odorata (S). Fève Tonka, Sarrapia (F). Tonka-bean tree (E).

شجرة برية وزراعية من فصيلة التريبات . مهدا الود الامريكية الحارة تكثر في فنزويلا والغويان . يستخلص من بزودها الجافة ، يمدقها بالروم ، مادة الكوبرين الشائعة الاضغان اوراقها متعاقبة مركبة . وريقاتها زرية التجميع اذينية ؛ نصلها جامد الصلصة يضي الشكل . انزاعها محورية الاوتكار ، ثمارها شامية الشكل ليفة السنود تحوي عصية مبطلة طول من ٣ الى ٤ سم . وتعرض نحو ١ سم . قشرتها قليلة الشفافة ، صرمة التجميد ، لونها الى السمرة البنية للامعة ؛ لهاها جامد المكسر ، اصفر اللون .

Coumarine (F).

Coumarin (E).

هي لكتون الحامض الكوبريني ؛ مادة متبلورة يضاء اللون مستحبة العرف الطري تلون في الماء والكحول . تستخرج من الكوبرونه والحنثوق ... هي شاة الاستعمال الطري تدخل في صناعة تظير وتصيل التبروغ الامريكية .

٢٤٣٢١ - كوكب * ، كوكب Cumul, Pluralism

الكوكبية هي الجمع من كوكب جمع وكلة كلك .

Cumlingia (S).

Cumlingie (F). Cumlingie (E).

جلس حيوانات بحرية من الرخويات فضيحات الخياص فضيلة المختبرات . انواعها المعروفة المعروفة قليلة المدد اصطناعا بحار امريكية الجنوبية اغصها الشيل والبرور || اصنافها شبه يرمية الشوزن ، متساوية المصارع للاحساية الاضلع ، ماسة السطوح البيضاء اللون الموحدة بالجلوي .

Coumia gulanensis (S).

Couma, Coumier (F).

شجرة برية ورائحة مداعة من فصيلة الدفليات . منبها حراج الفويان || ساقها معتلة الارتفاع فراء . فرومها متصبية محجمة اوراقها متعاقبة ، مثلك ، جامدة النصال المرطاء . انزاعها محورية الاوتكار طريقة || يستخرج من ساقها بالخز عصاره ورائحة لها استعمالها الصناعي .

٢٤٣٢٤ - كوكب (F). Cometes (S). Comètes (F).

جلس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة التينيات . انواعها المعروفة قليلة المدد جميعها من نبوت قيات الشرق الاوسط وافريقية الشرقية || ساقها فراء ، شكلها متقودي

متوسطة المدد . اصطناعا بحار البلاد الحارة || اجسامها صغيرة اللد ، لاياسية الشكل تتميز بالفواها الحوضه ويدرورها المهدبة السطوح العلوية ، وبلاقطها الضلعية || اشهر اجناسها الكوكبة والذباباة والمثورة .

٢٤٣١٢ - كوكب أرنك *

Phascolarctus cinereus (S). Phascolarctus cendré, Koala cendré (F). Native bear (E).

حيوان لبون وحيد الجنس والنوع من الجرابيات الشجارات فضيلة الفلنجرات . موطنه بعض مناطق استرالية اغصها الشرقية . يأتل الغابات . يسرح في الليل ويبيت في النهار . قوته اوراق الاشجار وزعماتها وانزاعها ومغارها || جسمه يطول نحو ٥٠ سم . ويرتفع نحو ٣٣ سم . رأسه اظف القدم قريب الشبه من رأس الدب . قوائمه قصيرة ، خاسية الاصابع ، كبيرة الاظفار المهجنة الحادة الاطراف || ثوبه الى الرسكة ، يمتق في الظهر ويدير في البطن . الاثني رباعية الاضلاع || لحمه مأكول وفروته مرغوب فيها .

٢٤٣١٣ - كوكب كولون Coulomb

هو ما يصرفه بالتالية المبرى الكهربي التي تبلغ قدرته ١ أمبير .

٢٤٣١٤ - كوكبية Collybia (S).

جنس تطور من الفاريقيات . انولاه عديدة تركيب هرفا جلور بعض النباتات الحرجية دون ان تكوينا .

٢٤٣١٥ - كوكب الدجاج ، كوكب الطير ، هفصة الطير

Pasteurellosis avium (S). Cholera des poules (F).

مرض وبائي يصيب الدجاج يفضي عليه اذا لم يكلف وقائيا بالتلقيح قبل الاصابة .

٢٤٣١٦ - كوكب كوليس Colisa (S).

Colisa (F). Colisa (E).

كوكب هو الاسم الهندى البنغالي . جنس امحكة نيرة من شاكات الزخائف وفصيلة الطيوريات . انواعها المعروفة عشرة اصطناعا انهر الهند وميجرات ويمتلكه من اجسامها شبه اهليلجية ، صغيرة ، لا تتجاوز ٣٠ سم . رؤوسها معتلة الاضلاع الصغيرة الاضداد . زعانفها الظهرية والبطنية مسطحة ، متائلة . زعانفها الخوضية شبه غليظة . الذيلية كبيرة مقنونة . اوتوا الى اغصان الباهت يملو تجليج ممرض اريد اللون ، نحاسي المواج . بطونها الى البياض الاخير || ذكورها تحضن السرة في عشاش شبه جرابية الشكل تحبكه بين النباتات المائية || لغويها مأكولة متوسطة الصنف .

٢٤٣١٧ - كوكب امريكي Coccyz americanus (S). Coulicou américain,

Coucou à bec jaune (F). Yellow-billed cuckoo (E).

طائر من القواطع من فصيلة التيقويات . موطنه امريكية الشمالية وكندا . يرسل في اواسط الخريف الى جزر الانتيل ويعد في اوائل الربيع || جسمه متوسط القه يطول نحو ٣٠ سم . يمتد نحو ١٤ سم . ثوبه العلوي الى الكهية الزبداء تملوها مباحات تراوح من الشبهة الى الخضرة والزرق . صدره ويط الى البياض الاخير . لواضع الاجنحة الى الشبهة . نكاه بلون الرد اما ظاه انفيكه مع المزالين فال السواد التام باستثناء الاطراف البياض . ذنبه زناجي التركيب مستطيل ومريض . متفاده معتدل



كوكب



كوكب امريكي



كوكبونه (حبة)



كوكب

العقريات. موطنه يمتد من افريقية الشرقية الى الشرق الاوسط. ظهره وأغاليه الى الشبهه السوداء. بطنه وخواتمه الى الياض الاخضر. حنثه كاليانوث. منقاره اسود، ساقه الى الصفرة الخضراء. قوته القواضم والخشرات يمسدها عند الشرق وقرب القروب || يثن في الاشجار الرقيقة. أثناء تقصع من رقتين الى اربع تحضنها اربعة اسابيع.

Cautérification (F).

٢٤٣٣٤ - كتي

Cauterization (E). هو احراق الجلد بمجديده ونحوها.

Pélican (F).

٢٤٣٣٥ - كتي

هو البجع، اطلبه.

Accommodat

٢٤٣٣٦ - كيتالة

حالة حيوان أو ابات كيتنها عوامل البيئة المفروضة دون ان تجعلها وراثية.

Myopotamus ٢٤٣٣٧ - كيتور، حارود المتابع Myopotamus coypou (S). Myopotame coypou, Coypou, Castor des marais (F). Myopotamus, Coypu (E).

حيوان لبن قاضم وحيد الجنس والنوع من فصيلة الدانيات. موطنه بعض اصقاع امريكا الجنوبية اغصها الاقايام المحتلة الحارة. يأنث المتابع وضفاف البحيرات وبحاري الماء. ملجته الحياتي زوجي || جسمه يطول نحو ١٠٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٤٥ سم. رأسه شبه مكور الشكل، مقطوع الخلف. عيناه واذاها صغيرتان، مستديرتان، سباله معتدل الكثافة مستطيل. قوامه قصيرة خاسية الاصابع. ذنبه مدني الشكل غليظ القاعدة، مستقيم الطرف، هليبي الوربي في الزام الاول والثاني، حشيشي الخلفيات في الزايمين الاخيرين. وبره كبد، قصير، ناعم. ثوبه في الرأس والظهر الى السمرة الكستانية. وفي البطن الى السمرة الخنثية. خاصراته الى الشقعة || قوته المواد النباتية والاصماح والرخويات || حبره وجار يتحفر بالتربة. الاثن تقصع من ٨ الى ٩ اصداس كاسية باصرة تسرح وتقدس في الماء بعد اسبوع || فروعه جيدة الصفت مرغوب فيها ولحمه كذلك.

Chitonellus (S).

٢٤٣٣٨ - كيتون

Chitonelle (F). Chitonellus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل اماميات الخياشيم مصصحات القشار فصيلة الكيتونيات. انواحه الممارسة المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق المحيط الهادي، من ماليزيا الى الاكيتل واستراليا || اصداها مستطيلة ثمانية الصفيحات المتراكبة. اجسامها قريبة الشبه باجسام البزاق. اطولها تراوح من ٣ الى ١٢ سم. رؤوسها وعيونها صغيرة. لولاسها رباعية، زوج مستطيل وزوج قصير. اذنيتها قليلة الانفراج. تتكود عند الخوف فتبدو كالاكرة الصغيرة.

Chitonidae (S).

٢٤٣٣٩ - كيتونيات

Chitonides (F). Chitonidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل، اماميات الخياشيم مصصحات القشار. اجسامها وانواها المعاصرة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداها مؤلفة من ثمان صفيحات كلصية المادة، متراكبة، مفصلية، تغلف الظهر ويمكن العودية من التكوير كالمدرع، عند الحاجة || اشهر اجناسها الكيتون والحيدبة.

الشوزن. اورثاقها متعاقبة، وحمية النصال الضيقة المستعفة الاطراف || انهارها خاسية البتلوات والاسدية، وودية اللون دقيقة الزناد المستطيل. تنويرها ديسي.

Hobereau, Falquet (F).

٢٤٣٣٥ - كوتنج

Hobby (E).

جنس طير من عمارة الصقور وفضيلة العقريات. اثنائه اربعة جميعها خفيفة الجناح ودية الجسم طولها يراوح من ٣٥ الى ٤٥ سم. اثوابها عمرة ظهورها وسراقلها الى السمرة. بطنها الى الذبابة || اما انواعه فهي الكوتنج النبوي والكوتنج الشائع والزمزم والبيرو.

٢٤٣٣٦ - كوتنج الدبسي

Falco columbarius, Hypotriorchis columbarius (S). Faucon-pigeon (F).

طائر من الكوتنج صغير للقد طوله نحو ٣٢ سم. خفيف الجناح، ثرس الخلق، حاد المزاج، شديد البطش يصيد اتيام والمصاير والقواضم الصغيرة والجذران والحشرات. وهو من القواطع التي تجوب البلاد في طلب المصيف والمشي. سره في رحله يمد بضم مئات. يثن في الاشجار النائية وفي اوراق الصنوبر. اثنائه تقصع من ٣ الى ٤ وفنات تحضنها وسحها اربعة اسابيع

٢٤٣٣٧ - كوتنج شائع

Falco subbuteo, Hypotriorchis subbuteo (S). Hobereau commun (F). Common hobby (E).

طائر من الكوتنج حاد المزاج، خفيف الجناح، صغير القد، طوله نحو ٣٥ سم. الاثن اكبر حجماً من الذكر. وهو من القواطع يجوب البلاد الاسيوية والافريقية والاربية. يأنث الغابات والاحراج اللينة الاشجار. قوته المصاير والحشرات. يثن في الاشجار الرقيقة اثنائه تقصع من ٣ الى ٤ وفنات تحضنها وسحها نحو اربعة اسابيع

٢٤٣٣٨ - كوتي

Cosmique (F). Cosmic (E). نبت تربي يملق على بعض الاشياء الخضة بالكوتن كالأمدة الكوتنية.

Cognac (F).

٢٤٣٣٩ - كونيكا

هو الكنيك، اطلبه.

Cosmogonie (F).

٢٤٣٤٠ - كوتية

Cosmogony (E).

الكوتية نظرية في تكوين العالم، والنظريات في التكوين أو التكوين عديدة ومنها المقفورة الهابة واللامقفورة.

Candle (F).

٢٤٣٤١ - كونيديا

هي الكنديه، اطلبها.

Cunila (S). Cunille (F).

٢٤٣٤٢ - كونيكة

Dittang, Stone-mint (E). Kunel (D). Cunilla (I).

جنس نباتات برية نجية ممرية من فصيلة الشفويات. انواعها نحو ٢٠ اصطناعا البلاد الامريكية. مظهرها طبي. اورثاقها معتقة متعاقبة اهليجية الشكل. تسلمها صغير القند غلي البرشة سطوي العرف يشبه النبت. انفرارها حلقى التسجيع طري الاركاناز. تفجع اورثاقها وانوارها يفيد الاساء ويقوي المعدة.

Elanus corsuleus (S).

٢٤٣٤٣ - كوتي

Elanion blanc (F). Black-winged kite (E).

طائر من الزاويق ينتمي الى عمارة الحناء وفضيلة



كوتنج



كوتية



كوتي



كوتي



كيتون

بين الصنوبر. لحما مسحب العلم فاخر الصنف.
اشهر انولمه الثلاثة التالية :



كَيْبَلِيَّة

٢٤٣٦ - كَيْبَلِيَّة الْاُطْلَس

Labrus bergylta (S). Labre neustrian, Crahoote, Vras (F). Cockwing wrasse (E).
نوع من الكيلم. تكثر في المحيط الاطلسي من شواطئ بلجيكا الى جبل طارق. طولها نحو ٥٠ سم. ثوبها مآكب الالوان الزاهية المتباينة.

Labrus viridis (S). كَيْبَلِيَّة حَضْرَاء
Labre vert (F). Cuckoo wrasse (E).

نوع من الكيلم. تكثر في المتوسط. طولها نحو ٣٥ سم. ثوبها الى الخضار. ظهرها اسفع الموج. بطنها وردي اللون مسطح الماجة. الاثني ثلاثية البقع السود الجانبية وهي اكبر بطة من الذكر.

Labrus merula (S). كَيْبَلِيَّة زُرْقَاء *
Labre merle, Merle (F). Labrus merula (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الكيبيديات وربة شاكات الزعانف. اصلها منظم اقاليم البحر الابيض المتوسط. تعتبر من اسماك المهاد والمخاض. ملجأها الحياتي شرطي || جسمها املحلي الشكل، معتدل التسطيط، يطول من ١٥ الى ٢٠ سم. ثوبها متباين الخصب بين الشقين. اللون السائد هو الازرق، يطول في القسم الاقل من الجانبين والظهر مولوج جوي واسود عند الذكر ومولوج وردي عند الاثني. ويطول في القسم الاقل من الجانبين وفي البطن مولوج بنفسجي عند الذكر ويليكي عند الاثني. رأسها مخروطي الشكل، متشعب الشعاع، فكاهما متماثلان. شفتها متوسط الانفرج. اسنانها كبيرة، متعقبة. عيناها مستديرتان، جاسطتان. زعنفتها الظهرية واحدة، مسطيلة. زعنفتها الذيلية مقنطرة الطرف || لحما جيد الصنف، مرغوب فيه.



كَيْدَل ثَنَائِي الثَقِيظ



كَيْدَم

Labrus mixtus (S). كَيْبَلِيَّة مَلُوكَة
Labre varié, Coquette, Connet, Tenca (F). Seapartridge (E).

نوع من الكيلم. تكثر في شمال المتوسط طولها نحو ٤٠ سم. ثوبها متباين الالوان الزاهية فيها اليرودي والحلي والبي والاحمر والاصفر والاسمر الداكن.



كَيْدَم زُرْقَاء

Labridae (S). كَيْبَلِيَّة مِيَّات
Labridae (F). Labridae (E).
فصيلة اسماك بحرية من شاكات الزعانف تشمل زهاء ١٠٠ نوع منتشرة في جميع بحار العالم.

Terre de bruyère (F). كَيْبَلِيَّة ج
Heath-soil (E).

هو التراب الحرجي الخشن، تركيبة الحكيي يختلف باختلاف مناصره الاسيانية او بولية او طينية او جسمية لكنه يتميز بوفرة المادة الدبالية المنحلة التي تجعله من اجود الاتربة الساحلة للزراعات التريينية والبيئية.

Kirsch (F). Kirschwasser (E). كَيْرِش
هو خمر الكرز، شراب مسكر يصنع من ثقليد الكرز.

Choeropus (S). كَيْرُوب *
Chéropé (F). Choeropus (E).

حيوان جاس لامر وحيد الجنس والنوع من فصيلة



كَيْرُوب

٢٤٣٧ - كَيْبَلِيَّة * مَشْطُورَة

Kigelia (S). Kigélie, Arbre à concombres (F). Cucumber tree, Sacred tree of Nubia (E). Kigeliabaum (D). Kigelia, Albero di castrolo (I).

جلس اشجار برية وزينية من فصيلة البغيتيات. مهدا البلاد الحارة. انواعها اربعة. اوراثها متعاقبة مركبة. ازهارها عنقودي النجم. اعزادها كبيرة لثد جيلة الشكل، ملونة. ثمارها تشبه الخيار لكنها حاملة العلم لا تؤكل.

Rhynchonella (S). كَيْبَحَاء *

Rhynchonelle (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل وفصيلة الكيبيديات. انواعها المعروفة عديدة، معظمها من متحجرات العصر السيلوري المالك الى الابراج الاول، اما المعاصرة منها منتشرة في بحار الشمال والجنوب || اصداها مصرعية، متساوية، مروحية الشكل، غنجة الصفحات الخارجية، لؤلؤية الداخلية، تعيش شبه لاصقة بالصخور وابطالها سلك ليفي المادة طولها من ١٥ الى ٣٥ سم.

Rhynchonellidae (S). كَيْبَحَالِيَّات *

Rhynchonellides (F).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الابراج الاول || اشهر اجناسها الكيحاء.

Pipit rousseline (F). كَيْبَحَن

Tawny Pipit (E).

طائر من فصيلة الذعيرات يدعى جشة الحقل وطيروم، اطلب جشة الحقل.

٢٤٣٨ - كَيْدَل ثَنَائِي التَّسْطِيط *

Adalia bipunctata (S). Adalie à 2 points, Coccinelle à 2 points (F). Adalia bipunctata (E).

حشرة خاتلة ناعمة من فصيلة النصفيات وربة منسدات الاجنحة. موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة من الشرق الاقصى واربوية. تألف البراري والحدايق والجنان والساتين والزراعات الصيفية. ختامها ويزقاتها تموش على الارق والقرقرز والقرقرز والنبع ... || جسمها صغير لثد، يبيضي الشكل، يطول من ٥ الى ٦ سم. ثوبها لذي يتميز بدمم الاستقرار يكون غالباً الى السود تملو في كل جده من غديه نقطة حمراء. رأسها صغير الجرم، ذليل الخلف، بلور مجلته تحت الكوسل. عيناها صغيرتان مصحتان، زباناها متباين. فكاهما ذريان. تأثيرها وملاصها صغيرة || الاثني اميز قدماً من الذكر واكد ثوباً منه واقلر زبانا || ايجالها الحولية ثلاثة. تسرح في النهار وبيت في الليل. غنفساء الجيل الثالث تحمي فصل الشتاء غنيقة تحت الحجارة الى ان تدب الحرارة فتخرج من مكبتها في اوائل فصل الربيع.

Labrus (S). كَيْبَلِيَّة *

Labre (F). Wrasse (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الكيبيديات انولمه المعروفة ١٠ تتميز بالوانها المآكية الالوان الزاهية وبامتدانة زعانفها الظهرية والشرية. رؤوسها صغيرة. اعطالها مخروطية الشكل مشقوفة الغلك || مرتها قرب الشواطئ

حل القلب. وظائفه عديدة اخصها تأمين جريان الماء وادخار المواد الغذائية والمقاومة الميكانيكية.

٢٤٣٦١ - كَيْفُور * ، أبو مَالِك

Spatula clypeata (S). Canard souchet, Souchet commun, Rouget de rivière (F). Shoveller duck (E). نوع من البط الوحشي. طائر من التقاطع مشتهر البلاد الافريقية الحارة ويصطاد في البلاد الباردة والاسيرة الى جسم كبير اللد يطول نحو ٥٠ سم. رأسه رفيع الى الخصار الالاس الاسفع. صدره الى البياض الناصع. بطنه واطفله الى الشفحة الصنابية المواج. ظهره اسود اللون تلوو رقشة حنطية. جناحاه مزرقان بالابيض والازرق والاضفر والكسني. عيناه صغرتان صليتان. متفاده صفيحي الشكل ، ملحي الطرف ، اسمر اللون ، اضفر المواج. جناحاه مستطيلان ، لاسفان ، ذنبه غروري الشكل ، صغير القد ، ابيض اللون ، يتوسطه الاسود. ساقاه صغرتان لونهما الى الصفرة البرتقالية || قوته الحشرات اخصها للمالية ودعمل الضفادع وبعض النباتات المالية || يدفن انصوصه بين الاسل على ضفاف البحيرات والمناقع والاوهار في المواقع الصمية الختال. الاثخن تحضن من ١٦ الى ٢٠ بيضة. الترخيم يستمر نحو اربعة اسابيع تقوم به الاثخن دون الذكر الذي يئن لها الحاية ولغذاءه || تجتر من الطرائد المزينة. لحماها فاخر الصفن.

الزربيات. موطنه بعض احراج بلاد استرالية. قوته الديدان والحشرات || جسمه صغير اللد يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم. وزنه من ١٢ الى ١٤ سم. رأسه غروري الشكل ، مسنق القلم. قوائمه كقوائم الزرب. جراب الاثخن ثنائي الالباء. فحشه من الورد.

Mouche de l'olive (F).

٢٤٣٥٤ - كَيْفُورُورِي

هو غرقة الزيتون ، اطبا.

Cairina moschata (S).

Cairina, Canard de Barbarie (F). Barbary duck (E). طائر داجن من كليات القند صفيحيات الخناير ينتمي الى فصيلة البطيات. موطنه امريكا الجنوبية || جسمها كبير القد. متفاده اطول من متق البط الاملي جناحها كبير الحجم ، ذلق الطرف ، يكاد يلصق اللذب. ذنبها صغير الجرم ، مقطوع الطرف. ثوبها الى الخصار الالاس الاسفع يطول يتوجج ابيض || اغلقها شرمة تسمى على غيرها من الطير الناجية. لحما متوسط الصنف لا يخلو من رائحة المسك.

٢٤٣٥٦ - كَيْفُورُورِي ، كَيْفُورُورِي

Sporange (F). *Sporangium* (E).

هو الكيس الشعري الذي يحضن بؤر مستورات الزهر.

٢٤٣٥٧ - كَيْفُورُورِي * ، قَرْمُكَة

Capsella Bursa-pastoris (S). Capselle, Bourse à pasteur, B. de Capucin, Boursette (F). Mother's heart, Shepherd's burse (E). Hirtentäschel (D). Borse di pastore (I).

نبات عشبي بري. حولي ميلول من فصيلة الصليبيات.

Embryon d'animal (F).

٢٤٣٦٢ - كَيْفُورُورِي

Embryo of animal (E).

هي النمرة ، ملقحة الحياة التناسلية الكائنة في الحيوان.

Calophora (S).

٢٤٣٦٣ - كَيْفُورُورِي

Calophore (F). *Calophora* (E).

جنس نباتات عنية برية وتربينية من فصيلة الوارديات ، منتبها بعض مناطق امريكا الجنوبية. هليها حارق كالقراش سقها مدادة ، عارشة. اوراقها لآسيابية الشكل. ازهارها كبيرة القد ، حراء اللون || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التاتية.

٢٤٣٦٤ - كَيْفُورُورِي عُرُوجِ الحِقِّق

Calophora contorta (S).

Calophore à capsule tordue (F).

نوع من الكيفور. عشبة حولية تربينية. ساقها عارشة تطول نحو ثلاثة امتار. اوراقها بيضبة مستطيلة الزام الاخير. تصالها منشارية الحمار ، باهتة الخصار يطلوها بعض الزنب والمحب. ازهارها حراء اللون يطلوها بعض مواج برتقالي || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف والخريف.

٢٤٣٦٥ - كَيْفُورُورِي قَرْمِزِي

Calophora coccinea (S). *Calophore écarlate* (F).

نوع من الكيفور. عشبة تربينية ممرمة. ساقها عارشة تطول نحو اربعة امتار. اوراقها معتقة ، السفلى منها ورشية غمرية اما العليا فاحليجية. طولها يراوح من ١٥ الى ٢٥ سم. ازهارها قرزية اللون. غدة الرحيق فيها مستطيلة الخيطوط المحببة الاطراف || تنويرها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

Kysta (F). *Cyst* (E).

دملة لآسيابية الشكل والحجم تتكون تحت الجلد او في بعض النجج.

Quiscalus major (S).

Quiscale majeur (F).

طائر من فصيلة الكاروجيات. موطنه بعض مقاطعات جنوب امريكا الشمالية. يآلف المناطق الجبلية وصفات الاجار. سره وافر العدد || جسمه كبير القد يطول نحو ٤٠ سم. متفاده اطول من رأسه وهو مخدب الخظم الملوي البين التقويص. جناحه معتدل الطول. ذنبه مستطير الطرف. حقة عينه جزوية اللون. ثوب الذكر اسد اسم يطول مواج جزوي في الرأس والقدال ومواج اخضر في اللذب. ثوب الاثخن الى الكعبة السراء المابقة في الرأس والرداء والجناحين واللذب والى الكلبة الحمراء المواج في الصدر والبطن || اغلقه ريشة آتسة. قوته الحشرات من الجراد الى القراش والاساريم والضفادع والارغويات ولا ينف عن الحبوب والثار المتنية || يدفن عشه في الاجار الترابية اخصها السنوير. الاثخن تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها متناوبة الذكر نحو ١٥ يوما || عشه جرابي الشكل ، بالغ الطول ، ليد الحيك يعلقه بفنن الشجرة. طولها يراوح من ٨٠ الى ١٠٠ سم. قطر قمره من ٢٥ الى ٣٠ سم.

Xylem

٢٤٣٦٦ - كَيْفُورُورِي

هو في النباتات الخشبية نسيج الساق والجذور الذي يرتكز



كَيْفُورُورِي



كَيْفُورُورِي



كَيْفُورُورِي



كَيْفُورُورِي

صغيرة. اشداهما قليلة الانفرج. زمانها الظهيرة مسطيلة، الجزء الاول منها شفاف شالك، الجزء الثاني مغشى سرج. النهاية منفرجة، شبه فاقه. اثارها الى البردية القلعية تلوحها زخارف وتجاويز متباينة الزخاية سمراء اللون خضراء المواج || طويها مأكولة متوسطة الصنف .



كبكه

٢٤٣٧٣ - كيلوغرام Kilogramme (F).
هو الف غرام يعرف منه عادة بكتلة كيلو. وهو من المقاييس المترية الفرنسية التي شاع استعمالها، نظراً لسهولة كسورها، في معظم بلدان العالم.

٢٤٣٧٤ - كيلومتر Kilomètre (F). Kilometer (E).
من المقاييس السطحية قدره الف متر .

٢٤٣٧٥ - كيلوات Kilowatt
من المقاييس الكهربائية قدره الف وات. وهو يمثل وحدة كهربائية طاقها الف جول بالثانية.

٢٤٣٧٦ - كيمافيل Chimaphila (S). Chimaphila (F). Chimaphila (E).
الاسم العلمي من اليوناني يعنى «حبيب الشتاء». جنس نباتات معمرة مدادة من فصيلة الاغروسيات. منهاها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها مستطيلة مدادة قليلة الفروع. اوراقها متعاقبة، سانية اتصال، صغيرة الحجم. ازهارها بيضاء اللون او وردية || انواعها المروقة قليلة العدد، اشهرها التالية.



كيلع املس

٢٤٣٧٧ - كيمافيل ميمبواني Chimaphila umbellata (S). Chimaphila en ombelle (F).
نوع من الكيمافيل. ساقه تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقه جيلة انخضار تعلو نحو ٨ سم. وتعرض نحو ٢ سم. ازهاره صيوانية التجميع، صغيرة القند، وردية اللون || تنموه يستمر من حزيران الى تموز.

٢٤٣٧٨ - كيمافيل ملس Chimaphila maculata (S). Chimaphila maculé (F).
نوع من الكيمافيل. ساقه تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقه تعلو نحو ١٥ سم. وتعرض نحو ٣ سم. نصلها اخضر الصفحة العليا الملطخة بالابيض، احر الصفحة السفلى. ازهاره كبيرة القند بيضاء اللون، فواحة البرق العطري || تنموه يستمر طوله شهر حزيران.



كيلس

٢٤٣٧٩ - كيميكوي Chimique (F). Chemical (E).

٢٤٣٨٠ - كيميائي Chimista (F). Chemist (E).

٢٤٣٨١ - كيمُوح Terra arable (F). Arable soil (E).
هو التراب الزراعي. ويسمى آخر هو طبقة التراب السطحية التي يتمكن منها المحراث او التي تدير غروبها تجلور النباتات الزراعية.



كيلودكيل

٢٤٣٨٢ - كيمُوس Chyma
مجسمه المواد الغذائية الماتمة في المدة بعد اعدادها الارلي .

٢٤٣٨٣ - كيمُوح Géophage (F).
هو اللاترب، اطلبه.

٢٤٣٦٦ - كيمُي Empirique (F). Empirie, Empirical (E).
هو ما ارتكز على المادة او التجربة الشخصية وليس على القواعد العلمية الململة.

٢٤٣٦٧ - كيمُة Calca (S). Calca (F). Calca (E).

جنس طير من المتسلقات وفصيلة الببغاوات. انواعها المعروفة ستة تنتمي الى حارة الدرد. موطنها معظم مناطق امريكا الجنوبية. ملينها الخياشي جماعي باستثناء زين الكاسند والحفن || اجسامها ريمية تعلو من ٣٠ الى ٣٦ سم. اثارها تختلف مع الانواع. الوانها الملوية الى انخضار المتفاوت المجات. الوانها السفلية فراوح من الزيمية الى المسقية والسمراء، اجنتها ذلقة الاطراف، شبه رتاجية التركيب، لا تلتف كامل الذنب. اذانها معطوبة الاطراف. ارسافها قصيرة. اصابعها كبيرة، شديدة السمرة || تألف الثقات القريبة من الصمران. قوتها الثمار البردية والزراعية والحجوب.

٢٤٣٦٨ - كيمُة جاعجة Jaugage (F). Gauging (E).
طريقة الوصول الى تحديد المقدار او الحجم وما اشبه. كقياس المياه الجارية ورسم المدن وقطر الشجرة الخ.

٢٤٣٦٩ - كيمُة المساحة Levé superficiale (F).

٢٤٣٧٠ - كيمُة املس Obisium lubricum (S). Obisium lisse (F). Obisium lubricum (E).
دوية نافعة من فصيلة الكرويسيات ودية المقربيات الكاذبة. جسمها صغير القد تعلو نحو ٣ سم. صدرها جلوي اللون، مسطح الصفحة الماسة. مقنيها كيران يتجيان بعلقات كلالق التقارب يعلوها حلب دقيق المخل. بطنها مسطح عادم الذنب اكهب اللون اسم المواج. صلتها مركبات، صفراء، جرابها متفتلة الطول، متخلفة اللون || تألف الاجراج وتعيش تحت الجثالة والحجارة الصغيرة. مسرحها دجوي. قوتها الاخشار الصغيرة وبكتها ومانز النمل ودياه والديدان ... || تضر نحو خمس سنوات بيائها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر. تبس الاثني من ١٠ الى ١٢ مكنة تغلفها كالمشوية بصلية حريرية التماس سمراء اللون. يتم التفت وتفتل الصلبة في اوائل تموز وتسمى الصغار طلباً للرزق بعد التفت بنحو ٤٨ ساعة.

٢٤٣٧١ - كيمُلس Chellinus (S). Chéline (F).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الكيميدات الشاتكان الزعانف. انواعها المعروفة نحو ٢٥ اصنافها المحيط الهندي وجوار. تتميز باستقالة زمانها الظهيرة والشمسية ويتجسج لونها المتباينة وباعضار هيكلها البطني || جميع انواعها مأكولة اشهرها كيلس يشيل وهي سمكة كبيرة القند تعلو نحو ٦٠ سم. نوها الى السمرة يعلوها موج اخضر.

٢٤٣٧٢ - كيمُود كيمُيل Cheilodactylus (S). Cheilodactyle (F).

جنس اسماك بحرية من شاتكان الزعانف وفصيلة البهاريات. انواعها المعروفة عديدة. اصنافها بحار الجنوب || اجسامها شبه ايليبسية الشوزن تعلو من ٢٥ الى ٣١ سم. وروها

التبيج . ثمارها حبوب صغيرة مستطيلة مأكولة || زراعتها رابحة وسبوية شائعة الاستعمال الغذائي .

Phylogénèse (F).

Phylogeny (E).

٢٤٣٩٥ - كَيْنُونَة °

Kainite

٢٤٣٩٦ - كَيْنَيْت

ملح بوتاسي طبيعي الحامضية تركيبة مزيج من كلوريد البوتاسيوم مع سلفات المغنيزيوم وبعض النحاس من كلوريد الصوديوم والمغنيزيوم . وهو من الاسمدة البوتاسية الحامضية الاستعمال محوي من ١٤ الى ١٥ ٪ من البوتاس لكنه يمتص ذرات التربة السطحية وينشط انكشافها لذلك يحسن استعماله في الارثربة الرملية الخفيفة دون سواها .

Quinine

٢٤٣٩٧ - كَيْسِين

الكينين اصل فاك يستخرج من لحاء شجر الكينينا ويستعمل في معالجة معظم الحيات .

Prioscelus (S). Prioscèle (F).

٢٤٣٩٨ - كَيْسَب °

جنس حشرات من هذبات الاجنحة تختلفت الاجزاء وفضيلة النشبات . انواعها المروفة عديدة جميعها من علم افريقية الاستوائية والاقلام المحارة || اجسامها كبيرة ، مستطيلة ، معتدلة التبطيط . رؤوسها معتدلة الجرم . قرونها الاستعمارية صولجانية . تأثيرها عجيبة . كواثلها بحنية الشكل . احماها لاحقة محززة . جراثيمها قبيصة ، مقوسة ، نشطة . انثابها لناعه قليلة الالوان يكثر فيها الاسود والابني الاسمر .

٢٤٣٩٩ - كَيْسَن الثين ° ، سَكْرُولِت الثين

Hypoborus fuscus (S). Hypobore du figuier,

Scolyte du figuier (F). Hypoborus fuscus (E).

Feigenborkenkäfer (D).

حشرة خاضعة غشائية مؤذية من فصيلة الكراشيات ورتبة هندسات الاجنحة . اصلها اليونانية تمتد امتداد اقليم الثين ، من السواحل الى ارتفاع الف متر من سطح البحر . تركب الاناث المستضفة ولا تقرب من الريانة او اليابسة || جسمها صغير القد يطول نحو ٢ سم . ثوبها الى السمرة الكستنية يملوها في ظهرها موج اربعة . رأسها معتدل الجرم . عينها صغيرتان . زانها صولجانيات . فكها حليمان ذريان . ظهورها ذاق المؤخر اللاص . غدها متناحبة التبرزيز القاطب || اجسامها الحولية تراوح من ٢ الى ٤ ، اربعة اجيال في المناطق الساحلية وبيجان في اعالي الويوط || ويوجد الحشرة الجملدة بالبرقة لا ينقطع في مناطق الساحل والوسط ، طوال مدار السنة || والحشرة من اي شق كانت تعمل في سبيل التكاثر وتاغذ حل عاتقها علاج السرداب الرئيسي وسجرة التناقل ثم الانفاق الثانوية من البين واليسار . وقد يراوح عدد الانفاق الثانوية من ٣٠ الى ٤٠ .

Apteryx (S).

٢٤٤٠٠ - كَيْسِي °

Apteryx, Kiwi (F).

طائر راس حذاء . وسيد الجنس والنوع من فصيلة البويات . موطنه نيوزيلندا . جسمه متوسط القد ، جسمه حميم اللباجية ، قويه الى السمرة الصفراء المراج . وهو اجدع الجناح ، حاد الذنب . ينمطي الريش اللينق التام الذي يشبه الشعر . منقاره مستطيل عذب . يصرح في الليل . قويه

٢٤٣٩٤ - كَيْمُونْتَس ° ، زَهْرَة الشِيَاء

Chimonanthus (S). Chimonanthe, Calycut du Japon (F). Winter flower, Japan allspice (E). Japonische Kelchblume (D). Chimonanto (I).

جنس شجيرات رية ورتبية من فصيلة الكليكتويات . انواعه قليلة البند . سوقها تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها حابطة ، متقابلة ، بسيطة ، نصلها سناني الشكل ، مائل البشره ، زاهي الخضار || ازهارها متتالية انبوبية جرونية العرف . الوانها تختلف مع انواعها منها الازرق والاحمر والاصفر والموضح || ازهارها يستمر من كانون الاول الى آذار .

٢٤٣٩٥ - كَيْمِيَاء ، كَيْمَاء

Chimie (F).

Chemistry (E).

علم يبحث في تكوين المادة والتغيرات التي تلحق بها من جراء عوامل مختلفة تفقد الجسم مظهره الخاص وصفاته التي يتميز بها .

٢٤٣٩٦ - كَيْمِيَاء حَيَوَالِيَّة

Zoachimie (F).

Zoochemistry (E).

قسم من علم الكيمياء يبحث في تفاعلات الانسجة الحيوانية .

٢٤٣٩٧ - كَيْمِيَاء كَهْرَبَالِيَّة

Electro-chimie (F). Electro-chemistry (E).

قسم من علم الكيمياء يبحث في المنافع الكهربائية التي تسببها الكهرباء .

٢٤٣٩٨ - كَيْمِيَاءِيَّة

Chimie (F).

Biochemistry (E).

قسم من علم الكيمياء يبحث في تفاعلات المادة الحية .

٢٤٣٩٩ - كَيْمِيَاء لَبَائِيَّة

Phytochimie (F).

Phytochemistry (E).

قسم من علم الكيمياء خاص بالنباتات .

٢٤٣٩٠ - كَيْمِيَت رابح كروز فيلم كنيتور .

٢٤٣٩١ - كَيْنَا هي الكينينا ، اطلها .

٢٤٣٩٢ - كَيْنَة

هي مقر الاحساس المرفق من الفرج وهي جلام مثل الزردان او حجابيه ، مركزها تحت القرنية من داخلها .

٢٤٣٩٣ - كَيْنَا جَوْ °

Cercoleptes (S).

Kinkajou (F).

حيوان من الراتنويات وسيد الجنس والنوع . موطنه أمريكا الوسطى يعيش في غابات مناطقها الاستوائية . جسده طويل نحو ٤٠ سم . بذيله ٥٠ اما ارتفاعه فن ١٦ الى ١٨ سم . وهو يستعمل ذنبه كالقوة للاتصال من ضمن الى ضمن ومن ثمرة الى اخرى . قوته التآر واللويبات الصغيرة والصائير والبيض والحشرات والمسل الذي يفتش عنه ويلتهمه بشراهة .

٢٤٣٩٤ - كَيْنَا ° ، أَلِيْنَة كَيْنَا °

Chenopodium quinoa (S). Quinoa, Petit riz (F).

نوع من الاينة وهو نبات عشبي ينمطي حولي زراعي مهدد بلاد الشيلي والبيرو . ساقه متصببة قليلة الفروع . اوراقه معتقة متعاقبة سنانية التصل المرفرس . ازهارها سنيلي ليد



كيمونتس



كينجاو



كينرا



كيب



كين الثين



كيوي

Œuf très petit (F).

Little egg (E).

هي البيضة اي البيضة الشديدة الصغر .

٢٤٤٠٢ - كِيِيَكَة

Micro-organisme,

Microorganisme (F). Micro-organism (E).

تعريف يطلق على كل كائن حي شديد الصغر لا يشاهد بالعين المجردة بل تحت المجهر كالميكروبات والبكتيريا والخمائر والاعفان والارالي .

٢٤٤٠٣ - كِيِيِين °




الحشرات والديدان والحويوب . يعيش ذكراً وأنثى . انثاه تحفن في الحول من مرتين الى ثلاث مرات . حفتها بيضة واحدة زرعها نحو ٢٤ يوماً .

Apterygidae (S).

Aptérygides (F). Apterygidae (E).

نصيكة طير من الموادي تشتمل حالياً بنوع واحد يسمى كيوي موطنه نيوزيلندا .

٢٤٤٠١ - كِيُونَات °



لاصة السكر

Electrode

٢٤٤١٢ - لاجب

هو القطب الكهربائي أو المنفذ الكهربائي .

Lepismidae

٢٤٤١٣ - لاجسات

فصيلة حشرات تعرف بالشميميات ، اطباها .

Lepisma (S).

٢٤٤١٤ - لاجسة

Léplama (F), Lepisma (E).

جنس حشرات من فصيلة اللاسعات . انواعها عديدة تعيش على المواد العضوية والنشوية . راجع شحمة .

٢٤٤١٥ - لاجسة السكر *

Lepisma saccharina (S), Léplame du sucre, Petit poisson d'argent (F), Silverfish (E), Silberfischchen (D).

حشرة صغيرة لثقة احليجية الشكل فضية اللون من فصيلة اللاسعات مبنولة في البيوت تلتصق السكر وتقرض القرطاسية والكتب .

Cœlentérés (F).

٢٤٤١٦ - لاجسويات

Cœlentérata (E).

هي الحيوانات ويدعونها في مصر « جوفويات » . شعبة من الحيوانات الدنيا تتميز بخلوها من الاحشاء والاشعاع عنها أو الاكتفاء بتجوييف وحيد الفتحة يقوم مقام الفم والامتصاص .

Zoophage (F).

٢٤٤١٧ - لاجيم ، واليج

Zoophagous (E).

ما كان قوته اللحم حيواناً كان ام دودية ام حشرة .

Carnassiers

٢٤٤١٨ - لاجيمات

هي آكلات اللحوم ، اطباها .

Apétale (F), Apetalous (E).

٢٤٤١٩ - لايتكي

هو النبات الذي لا قفالة في زهرته . وهي الزهرة العادمة البتلات .

Lactifère (F), Lactiferous (E).

٢٤٤٢٥ - لابين

نمت تمريني يطلق على الاوعية المشوية التي تنقل اللبن او المصارات اللبنية في الحيوان والنبات .

٢٤٤٢٦ - لاكتافيمي بالوكالة

Nul ne plaide par procureur (F).

مبدأ قانوني فرنسي سري مصري الاشارة لعواء انه اذا وكل عمرو زيدا بمقاضاة بكر يجب ان يذكر في صحيفة الدعوى وفي الحكم اسم الوكيل والاصيل .

Grémillet (F).

٢٤٤٢٧ - لاكتستبي

نبات تزييني يدعى اذنان الفأر المتقني ، اطليه .

Lachryrine (F).

٢٤٤٢٨ - لاثيريون

هي الجلباتين ، راجعها .

Calcifuge (F).

٢٤٤٢٩ - لاجصي

نمت تمريني يطلق على النباتات التي لا تنمو في الاربة الكلية او انها تنحشها .

Frénateur (F), Brakesman (E).

٢٤٤٣٠ - لاجيم

نمت تمريني يطلق على الاصحاب والمضلات التي تستطيع قمع حركات بعض الاعضاء او اعمالها .

٢٤٤٣١ - لاجيم الفيغدع

نبات يدعى كلوة الماء ، اطباها .

٢٤٤٢٧ - لادن كرتي * قستوس القريطي،

Cistus creticus (S).
Ciste de Crète (F). Cretan rockrose (E). Kretische Cistrose (D). Cisto di Creta (I).

نوع من اللادن الممر الجبل. جنبه تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها فراء فناء. أوراقها قصيرة الاضلاع، صغيرة القذ ذرية. نصلها يتقاطع المروق والاصابع، غشن الملس، ازغب البشرة على صفحته. ازهارها قريزية اللون، كبيرة القذ، قطرها يراوح من ٦ الى ٨ سم. || أوراقها وفروعها وساقها لزجة يستلقت منها اجود اسنان اللادن || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران.



لاذن ازغب

٢٤٤٢٨ - لادن طوطي، برعوي

Cistus villosus (S). Ciste cotonneux (F).

نوع من اللادن الممر. جنبه تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. ساقها وفروعها مزينة. أوراقها معتقة بيضية. نصلها اغشن الصفحة المتشعبة الزباء. زغبها لبد سطيل يبدو كليل القطن. ازهارها فردية حراء اللون، قطرها نحو ٥ سم. || ساقها وفروعها وأوراقها لزجة يستلقت منها اللادن || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران.

٢٤٤٢٩ - لادن عاري الورق

Cistus laurifolius (S). Ciste à feuilles de laurier (F).

نوع من اللادن الممر وهو جنبه سبروتية تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. ساقها فراء. أوراقها معتقة غارية الشكل. نصلها ثلاثي المروق، ملس الصفحة العليا ازغب السفل. ازهارها بيضاء اللون، كبيرة القذ، قطرها يراوح من ٥ الى ١٠ سم. || ازهاره يستمر طوال شهر حزيران.



لاذن اسهالي

٢٤٤٣٠ - لادن قوسبي الورق

Cistus salvicifolius (S). Ciste à feuilles de sauge (F).

نوع من اللادن الممر وهو جنبه مبلولة ترطب في الازربة الرملية، تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. أوراقها معتقة قوسية الشكل حادة المروق. نصلها ازغب البشرة على صفحته، ابيض الصفحة السفل المشبهة الخمل والازغب. ازهارها الى البياض الاصفر. قطرها نحو ٥ سم. || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران.

٢٤٤٣١ - لادنيات

Cistaceae (S).
Cistacées (F). Cistaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة الفئات، اجناسها اربعة. أما انواعها فكبيرة العدد. اشهر اجناسها اللادن والملايين.

٢٤٤٣٢ - لار

هو جبون لار، اطله.

٢٤٤٣٣ - لايس، مَلَر

Larix (S).
Larix, Mèlèze (F). Common larch (E). Lärche, Lärchenbaum (D). Larice, Abeto larice (I).

جنس اشجار حرجية من التنزيات وطويلة الصنوبريات. اوله المعروفة نحو ١٢ اشجارا كبيرة الحجم، هريية الشكل، اقية الاغصان والفروع. غراخها صغيرة، بناتها جانبية الانتشاب، قصيرة القذ. أوراقها سطيلية، غنية التجميع، حاملة. ازهارها وسيدة المسكن، الاثنية قذية الشكل. ثمارها اكواز صغيرة. اغشائها جزوية اللون صلبة، قشورها تستعمل في الدهاقه ويستخرج من سطها بالخز مادة راتنجية شائعة الاستعمال الصناعي || اصرف انواعها واشهرها ما يلي.



لاذن كرتي

٢٤٤٣٩ - لاحيوي * Abiotique (F). Abiotic (E).
نقيض الحيوي.

٢٤٤٤٠ - لاخيبي * Intensif (F). Intensive (E).

نمت تمريني يطلق على كل ما يتميز بطابع الانتاج الوافر.

٢٤٤٤١ - لاغيبيسي * Abranche (F).

Abranchiate (E).
نمت تمريني يطلق على الحلقيات المادامات اغلياشيم.

٢٤٤٤٢ - لادن، لادن Ladanum

مادة صمغية راتنجية طيبة قفرها سوق وأوراق بعض النباتات اخصها نبات اللادن. لوئها يراوح من الاشهب الصناعي الى الجلودى الاسمر المالح، وهي ذكية العرف طيبة الرائحة || كان لا يزال يستعمل في الطب ومنهم من استعمله للبيج وهو شائع الاستعمال العصري.

٢٤٤٤٣ - لادن، قستوس، قستوس، قستوس

Cistus (S). Ciste (F). Cistus (E).

جنس نباتات طيبة بوية وترابية من فصيلة اللادنيات. انواعها المعروفة ٢٠ منها الجنبات والبيلات والاعشاب. اصلها حوض البحر المتوسط. سيقانها قصيرة متشعبة فراء. أوراقها ابيدة كاملة متقابلة صغيرة النصل. ازهارها لاقبسية التجميع، جملة الشكل، خلمية القبلات. ثمارها حقبة خلمية او عشارية الاخشية || اشهر انواعها ما يتبع.

٢٤٤٤٤ - لادن اجسعد

Cistus crispus (S).
Ciste crépu (F).

نوع من اللادن الممر وهو جملة سبروتية تملو نحو ٥٠ سم. أوراقها لاطئة سنائية الشكل. نصلها اجسد الصفحة الخشنة الزباء القفاصة العرف العصري. ازهارها ارجوانية اللون صغيرة الحجم قطرها نحو ٣ سم. || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران.

٢٤٤٤٥ - لادن ازغب * Cistus hirsutus (S).

Ciste hérissé (F).

نوع من اللادن الممر وهو جنبه سبروتية تملو من ٥٠ الى ٨٠ سم. ساقها وفروعها كثيفة للزغب. أوراقها رطلة. نصلها لبد اغشن على صفحته. ازهارها خشكولة التجميع، متوسطة القذ، لوئها الى الابيض المبيج بالأصفر || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.

٢٤٤٤٦ - لادن إسباني * قستوس، لادني،

شقرام، قستوس

Cistus ladaniferus (S). Ciste ladanifère, C. lédon, C. d'Espagne, Ladanum d'Espagne (F). Gum-cistus, Ladanum-resin tree (E). Spanische Cistrose (D). Cisto ladanifero, C. di Spagna (I).

نوع من اللادن الممر، يكثر في خضاب اسبانية وبيجاها وهو جنبه مبلولة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها فراء. أوراقها لاطئة ثلاثية المروق. نصلها اخضر الصفحة العليا غير السفل الكثيفة الخمل والازغب. ازهارها كبيرة القذ قطرها يراوح من ١٠ الى ١٥ سم. لوئها الى الابيض يعلمو تشريح وتبيح احمر || أوراقها وفروعها لزجة يستلقت منها اللادن المشهور. ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران.

صفحة العليا خضراء اللون غنّدة، صفحته السفل حلّية البشرة، غبراء اللون. وأوراقها حله تشقّر عند اقترابها من الخريف فتبدو بلون الذهب. أكوازها مخروطية الشكل تطول من ٦ إلى ٧ سم. وتعرض من ٤ إلى ٥. جرياتها جويّة اللون، هريّة الشكل، ناشرة.

٢٤٤٤٠ - لا زورّد ، لا زورّد

Lapis, Lapis-lazuli, Lazulite

حجر كريم مشهور، أجوده الصافي الشفاف الأزرق اللبّاب إلى حمرة وخضرة.

٢٤٤٤١ - لا زورّد يّة
Cynanthus (S).
Cynanthus (F). Cynanthus (E).

عشبة معمرة، برية وتربّنية من فصيلة الجريسيات. منبتها الهند وقد انتشرت زراعتها الحداثيّة والمركّبة في أكثر من قطر || ساقها قصيرة تعلو نحو ٢٠ سم. جلودها ديماء مستطيلة. أوراقها متعاقبة، بيضية النصال، صغيرة الحجم. أزهارها فردية، محورية الارتكاز، لا زورديّة اللون. قطرها نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر من أواسط آب إلى أواسط أيلول.

٢٤٤٤٢ - لا شقيّ
Agame, Asexuel (F).
Agamous, Asexual (E).

كل ما هو عادم الشق اي هادم الاعضاء التناسلية في الحيوان وفي النبات.

٢٤٤٤٣ - لا شيتاليّة
Lachenalia (F).

هي زنبق البر، اطلبه.

٢٤٤٤٤ - لا صغ
Dessevé (F).

نمت تعريفي يطلق على التسج النباتية الحالية من المواد الصائنة.

٢٤٤٤٥ - لا صيف
Plantain (F).

جنس نباتات عشبية كثيرة الانواع اشتهرت باسم لسان الحمل، اطلبه.

٢٤٤٤٦ - لا طيس ، قيشر
Lates (S).

جنس اسماء نهرية من شائكات الزهائف وفصيلة الفريخيات. انواعه قليلة العدد اصطلحوا نهر البلاد الاسيوية والافريقية الحارة كالنيل والنيجر والكنج والفرات ... جميعها كبيرة القد مستطيلة الجسم محدودة الطول. انواعها الى السمره الفصية يملؤها سراج مختلف باختلاف النوع. طولها ما كولة لكنها دون الوسط || اشهر انواعه ما يلي.

٢٤٤٤٧ - لا طيس النيل * ، حيمار البحر، قزح
Lates nilotica (S).

نوع من الاطيس وهي سمكة كبيرة القد، طولها نحو ١٠٠ سم. تكثر في مياه النيل من منبه الى مصبه. وهي من الاسماك المأكولة المنتشرة الصنف. وكان المصريون من عهد الفراعنة الى عهد الرومان يقدّمونها وبها سميت مدينة لا طوبولس اي اسنا في الصعيد.

٢٤٤٤٨ - لا طيس الهند
Lates maxima (S).

نوع من الاطيس وهي سمكة كبيرة القد غنّنة، طولها نحو

٢٤٤٣٤ - لا ريس أروبة * ، مكلز أروبة

Larix europaea, L. decidua (S). Larix d'Europe, Mélèze d'Europe (F).

نوع من اللاريس منته جبال اروبة. شجرته تعلو من ٣٠ الى ٣٥ م. غراحيها صفراء اللون. أوراقها تطول من ١٥ الى ٣٥ م. وتعرض نحو ٥. وهي رعلّة، كثرة في الشكل، ثلاثية الصفحات، حيلة الخضار الزاهي. أكوازها الانثوية ارجوانية اللون. أكوازها تعلو من ٣ الى ٤ سم. وتعرض نحو ٧. جرياتها سكية الشكل كثيرة العدد.

٢٤٤٣٥ - لا ريس الصين ، مكلز الصين

Larix chinensis (S). Larix de Chine, Mélèze de Chine (F).

نوع من اللاريس منته جبال الصين. شجرته سبرويّة، تعلو من ١٥ الى ٢٥ م. غراحيها زياه سطحية اللون. ينالها خلية. أوراقها ثلاثية الصفحات تطول من ٢ الى ٣ م. لوها الى الخضار المائل يملوء سراج أزرق. أكوازها مخروطية تعلو من ٣ الى ٥ سم. جرياتها بارزة مشتمسة الاصلع.

٢٤٤٣٦ - لا ريس اليابان * ، مكلز اليابان

Larix leptolepis (S). Larix du Japon, Mélèze du Japon (F).

نوع من اللاريس منته جبال اليابان. شجرته سبرويّة سريعة النمو تعلو من ٢٥ الى ٣٠ م. غراحيها جويّة اللون لامة. ينالها خلية لبشرة، بحرية اللون. أوراقها ثلاثية الصفحات تطول من ١٥ الى ٣٠ م. لوها الى الخضار الصناتي المراج، أكوازها مخروطية صفراء اللون تطول نحو ٤ سم. جرياتها قنصوية الشكل غائرة الخمار.

٢٤٤٣٧ - لا ريس امريكة ، مكلز امريكة

Larix americana, L. pendula (S). Larix d'Amérique, Mélèze d'Amérique (F).

نوع من اللاريس منته امريكة الشالية. شجرته سبرويّة بطيئة النمو تعلو من ٢٥ الى ٣٠ م. غراحيها الى الحسرة البفسجية. ينالها بحرية اللون، وودية الطويل. أوراقها ثلاثية الصفحات، حيلة الخضار الزاهي تطول من ١٥ الى ٣٠ م. أكوازها جويّة اللون تطول نحو ٣ سم. وتعرض نحو ٧.

٢٤٤٣٨ - لا ريس سيبريّة ، مكلز سيبريّة

Larix sibirica (S). Larix de Sibérie, Mélèze de Sibérie (F).

نوع من اللاريس منته سيبريه. شجرته سبرويّة تعلو من ٢٥ الى ٤٠ م. غراحيها سود الخمار. أوراقها ثلاثية الصفحات تطول من ٤ الى ٥ سم. وتعرض نحو ١ م. انماها الانثوية الى الخضار الباهت. أكوازها مخروطية تعلو من ٤ الى ٥ سم. جرياتها بارزة، مسمة الزوايا، قليلة العدد.

٢٤٤٣٩ - لا ريس كاذب ، مكلز كاذب

Pseudolarix (S). Faux-larix, Faux-mélèze, Sapin doré, Arbre d'or (F). Golden larch, G. pine (E). Echte Goldlärche (D). Abeto d'oro (I).

شجرة حرجية سبرويّة، سريعة النمو، هريّة الشكل، وسيدة الجلس والنوع من التنتويات. مهدا جبال الصين الشالية. تعلو من ٣٠ الى ٤٠ م. اغصانها انقية الانتشاب فارشة. أوراقها عابطة، ضحية التجميع. نصلها خطي الشكل يطول من ٥ الى ٨ سم. ويعرض من ٣ الى ٣ م.



لاريس اروبة



لاريس اليابان



لا طيس النيل

تطول من ٨ إلى ١٠ م. تخلد نصل أوراق التبغ الاخضر وتسرده بين يشرتيه فيبدو شغافاً خالياً من المواد النبتية الحيزية . راجع عنيدول البطاطا .



لاغة



لاغة الارضي شوكي



لاغة التبغ



لاغة الزرع



لاغة الكرزيتم



لاغة الوباء

24458 - **لاغمة العين** (F). Mineuse du figuier . هي قورمة العين ، اطليا .

24459 - **لاغمة الزرع** ، * ، **أغروميذا مبهمة** Agromyza ambigua (S). Mineuse des céréales (F). حشرة صغيرة من اللامخات . طولها يراوح من ٣ إلى ٤ م. رأسها وبطنها الى الجزوة البنفسجية . كسلها الى السواد الأزرق الملوخ . تكثر في اوراق نيسان . تمتع مكها حل حلف الزرع فينتف عن رقات تلم النسيج وتسبب ذبوله .

24460 - **لاغمة الكرزيتم** ، * ، **فيتوميذا قرنقاء** Phytomyza sciricornis (S). Mouches des chrysanthèmes (F). حشرة صغيرة من اللامخات ، طولها يراوح من ٢ إلى ٣ م. لونها الى الزبداء السراء تملحا بقع صفر . يرقاتها تركيب اوراق الكرزيتم فتلعها وتؤذيها اشد اذى .

24461 - **لاغمة الوباء** ، * ، **أغروميذا الفاصوليا** Agromyza phaseoli (S). Mouches du haricot (F). حشرة صغيرة من اللامخات ، طولها نحو ٣ م. فوجها اسود لاح . تمتع مكها في اوراق اللوبيا قرب الضلع فينتف عن رقات تعيش بين يشرتي الورة ثم تنسج نحو الضلع ويها الى الملاق فالتاق فالمرقة حيث تبقى الى ان يتم السلاخا وتتحول الى كزود .

24462 - **لاغمة اوراق الاشجار المثمرة** Mineuse des feuilles des arbres fruitiers (F). حشرة مؤذية من حشرقيات الاجنحة تدعى رعاة ملوحة ، اطليا .

24463 - **لاغمة** Euphorbe officinale (F). هي القريون الخروفي ، اطليا .

24464 - **لافتاري** Invertébrés (F). Invertebrata (E).

24465 - **لافتاري** Acotylédone (F). Acotyledon (E). نعت تعريفي يطلق على النبات الدائم الغلقة .

24466 - **لاغمة بوهية** Zygospora

24467 - **لاقصيات** Atracheates (F). Atracheates (E).

24468 - **لاقيات النمل** Fourmiliers (F). Ant-thrush, Ant-catcher (E).

24469 - **لاقيات النمل** Fourmiliers (F). Ant-thrush, Ant-catcher (E).

24470 - **لاقيات النمل** Fourmiliers (F). Ant-thrush, Ant-catcher (E).

24471 - **لاقيات النمل** Fourmiliers (F). Ant-thrush, Ant-catcher (E).

24472 - **لاقيات النمل** Fourmiliers (F). Ant-thrush, Ant-catcher (E).

١٣٠ م. تكثر في مياه الكنج من منبه الى مصبه . فوجها الى السرة الضخمية يملوها موج جزوي يمتد حده الطهر ويضف وزهو عنه البطن .

24473 - **لاطيات العيون** Edriophthalmes شعبة من الحيوانات الثفريات اللينات الصف .

24474 - **لاطيات المتك** Diploures, Eutotrophes رتبة حشرات مدنية من هنيات الاذنان . اجناسها وانواعها نحو ١٥٠ اطنائها جميع المناطق الحارة والمعتدة . تتميز بصغر متكا واحتجابها ، باستطالة قرونها الاستشعارية المتعددة الفواصل وبارسانها الوحيدة المفاسل .

24475 - **لاطين** Sessile (F). نعت تعريفي يطلق على الاعضاء النباتية التي لا تقوم حل دعائم بل ترتكز مباشرة على الهور كقوك ورقة لاطنة .

24476 - **لاعضوي** Inorganique (F). Inorganic (E).

24477 - **لاغية** Lophospermum (S). Lophosperma (F). جنس نباتات حارشة حلقة لزجة من فصيلة الخنازيريات . انواعها قليلة ، سوكها فراء تطول من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها متفكة قليلة خاسية التفصيص . نصلها حل البثرة مسنن الحافة . اثمارها فردية ، محورية الارتكاز ، كبيرة القد ، طولة الزاد ، وردية اللون موهجة بالابيض والاصفر وهي مغيرة الرقيق يحرسها النحل .

24478 - **لاغيات** Agromyzidae (S). Agromyzidae, Leaf miners (E). Minierfliegen (D).

نصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٥٠٠ جميعها صغيرة القد ، رمادية اللون او بنية ، ملونة الجناح . تطفر في الربيع . تمتع مكها على اوراق النبات وصاليجه انفضة فينتف عن رقات دقيقة خبيطة لتدخل التصل فتلعها وتقتطع خلاياه ، بين البشريتم ، ثم تتحول بعد السلاخا الاخير الى كزود تحبث في مكانها او تقيم في التربة كامل فترة بيوتها العلوي .

24479 - **لاغمة الارضي شوكي** ، * ، **أغروميذا اندلسية** Agromyza andalusica (S). Mineuse de l'artichaut (F).

حشرة صغيرة من اللامخات . طولها يراوح من ٣ إلى ٤ م. جسمها ازغب الكساء . فوجها الى السرة العابقة . اجناسها الحولية ثلاثة ، رقاتها تلع عروق اوراق الارضي شوكي فتلعها .

24480 - **لاغمة البهنية** ، * ، **فيتوميذا البهش** Phytomyza lilis (S). Mouches du houx (F).

حشرة صغيرة من اللامخات . طولها يراوح من ٣ إلى ٤ م. فوجها اسود اللون . رأسها وجوانبها مجعدة بالاصفر . رقاتها تركيب اوراق البهشيات فتلعها وتؤذيها .

24481 - **لاغمة التبغ** Phtorimaea operculella (S). Mineuse des feuilles de tabac (F).

فراشة من فصيلة المتجولات تدعى عنيدول البطاطا . دوريتها تحيلة فراء اللون محتبة الرأس حليلة النقط الترجية الجانية .

٢٤٤٧٨ - لامة * ، جَمَلْ أَمْرِيكَا

Auchenia, Lama (S). Lama

جنس حيوانات لبونة عاشبة من فصيلة الجمليات . انواعها اريمة ، موطنها هضاب وجبال امريكة الجنوبية . اجسامها رشيقة القوام ، طولها يراوح من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم . وارتفاعها من ٨٠ الى ١٢٥ سم . اذناتها مسطيلة . اوبارها مصنعية جيدة الصنف تحميه القدر . قوتها الاغشاب . بعض انواعها داجن يستعمل لدر الحليب ونقل الاثقال .

٢٤٤٧٩ - لَامَسَاوِي الْأَوْرَاقِ

راجع غير متساوي الاوراق .

٢٤٤٨٠ - لَامَسَاوِي الْبِتَلَاتِ

راجع غير متساوي البتلات .

٢٤٤٨١ - لَامَسَاوِيهِ الْأَجْزَاءِ

راجع غير متشابه الاجزاء .

٢٤٤٨٢ - لَامِيَاً

Atypique (F). Atypic (E).

Lamarkia (S). ◊ قَدْ يُدُون ◊

Lamarkia, Codion (F). Lamarkia (E).

جنس نباتات عشبية معقودة التعريف على اسم العلامة ◊ لاماكة ◊ . وهي بزية ، مرغوة ، حولية او معمرة من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، منها جوف البحر الابيض المتوسط || سوقها خشبية فراء تملأ من ٢٠ الى ٥٥ سم . صفيها متدد الطول ، قليل الفرس . ازهارها سبلي التجميع ، شبه غروطي الشكل ، سبيلاتها متدلية .

٢٤٤٨٤ - لَامِيَكَة

Tentacule (F). Tentacle, Feeler (E).

ج . لولس . زوائد لا مفصلية قابلة الانمط والانتكاش توجد عند بعض الحيوانات تمكّنها من القبض على فريستها او التماس طريقها ...

٢٤٤٨٥ - لَامِيَشِيَّات

Apascentaires (F).

Apascentalia (E).

شعبة من صف الفرميات . فصائلها واجناسها عديدة

تجتمع الى رتبين : الجرابيات ورسيدات المساك .

٢٤٤٨٩ - لَامِيَعَات

Ganoides (F). Ganoids (E).

رتبة اسمك غشروفية تشتمل بعض الفصائل اخصها

الحفشيات .

٢٤٤٨٧ - لَامِيَكَة

هي الثنوينية ، نبات من الورديات ، اطبا .

٢٤٤٨٨ - لَامِيَشِيَّات

Inarticulé (F).

Inarticulate (E).

نمت وصفي يطلق على الاعضاء العادة المفصائل .

٢٤٤٨٩ - لَامِي

Amyride (F).

هو الامريد ، اطبا .

٢٤٤٩٠ - لَامِي الْبَتْسَمِ

Amyride gommifère (F).

هو الامريد البلسي ، اطبا .

٢٤٤٩١ - لَامِي الْمَكْسِيكِي

Amyride élémiphère (F).

هو امريد المكسيك ، اطبا .

وانواعها كثيرة العدد معظمها من طيور افريقية وامريكة . تألف المناطق الحارة والاستوائية || اما فصائلها فهي الجليليات والفتنجيات والقرناريات والمأنوريات والهنريات والفرميات .

٢٤٤٦٩ - لَاقُون مُنَقَط

Lacon puncturé (F).

هو السائل المنقط ، اطبا .

٢٤٤٧٠ - لَاقِيَاً ، لَاقِيَاً

Asymétrique (F).

Asymmetrical (E).

نمت تعريفي توصف به الاشياء الشاذة عن نظم القياسات

المألوفة .

٢٤٤٧١ - لَاقِيَاً

Renoncule d'Orient (F).

هي الحفيضان الاسيوي ، اطبا .

٢٤٤٧٢ - لَاقِيَاً

Trillium (S). Trillie (F).

جنس نباتات عشبية سرولية معمرة من فصيلة الزنبقيات . انواعها المرموقة عديدة . افعالها المائم ، معظمها امريكي المهد . ترشب في المراتق الظليلة . اربوئها منادة . سوقها قصيرة تنتهي بقسمه ثلاثية الاوراق تملؤها زهرة ملونة ثلاثية البتلات . اعراف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٤٤٧٣ - لَاقِيَاً

Trillium nivale (S).

Trillie des neiges (F).

نوع من الالة . ساقها تملو من ٦٠ الى ٩٠ سم . اوراقها مستطقة ، بيضبة ، صغيرة اللد . تصلها ثلاث المروق يطول نحو ٥ سم . ازهارها بيض ، قطرها نحو ٤ سم . ازهارها يستمر من اذار الى نيسان .

٢٤٤٧٤ - لَاقِيَاً

Trillium sessile (S).

Trillie sessile (F).

نوع من الالة . ساقها تملو من ١٥ الى ٣٠ سم . اوراقها حاشية ، تصلها ثلاث المروق اعليها الشكل مذهب الزام الاخير يطول من ٧ الى ١٥ سم . ازهارها قرونية اللون ، قطرها يراوح من ٥ الى ٦ سم . ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

٢٤٤٧٥ - لَاقِيَاً كَبِيرَة الزَهَر *

Trillium grandiflorum (S). Trillie à grande fleur (F).

نوع من الالة . ساقها تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقها حاشية . تصلها غشاي المروق اعليها الشكل ذائق الزام الاخير يطول من ١٠ الى ١٤ سم . ازهارها عادية البرق ، كبيرة اللد ، قطرها نحو ١٢ سم . لونها الى الالبيش او الوردية . ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٤٤٧٦ - لَاقِيَاً مُنْتَصِبَة

Trillium erectum (S).

Trillie dressée (F).

نوع من الالة . ساقها تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقها حاشية . تصلها غشاي المروق ، سنان الشكل ، مستطقة الزام الاخير يطول نحو ١٢ سم . ازهارها جفر ، كبيرة اللد ، منتصبه الانتكاز . يتلاها الى الخضار الاصفر يطولها حار اخر وتغطيها ثلاثة خطوط جزوية . ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

٢٤٤٧٧ - لَامِيَاً ، هَيْبَر

Anhydre (F).

Anhydrous (E).

نمت تعريفي توصف به الاجسام الخالية من الماء او

العامة الماء .



لالة كبيرة الزهر



لالة

٢٤٤٩٧ - **لاهيّة الصنّاف** (F). *Lamie des saules* (F).
 هي قروبي الصنّاف ، اطليا .
 ٢٤٤٩٣ - **لايميون**
Lamium (S).
Lamier (F). *Dead-nettle* (E).



لايون ابيض

٢٤٥٠١ - **لاؤدّه**
 هي الخواص ، اطليا . ومنها الاصلي والذكر والخوصة
 والحسنة .

٢٤٥٠٢ - **لايتحلّ** ، **لايدوب** (F). *Indissoluble* (F). *Undissolved* (E).

٢٤٥٠٣ - **لبّ**
Pulpe (F). *Pulp* (E).
 هو ما في جوف البجعة واللوزة وبغيرها من مادة جامدة
 مأكولة أو غير مأكولة .

٢٤٥٠٤ - **لبّ القصرة** ، **ميزوكرب**
Méscarpe (F). *Mesocarp* (E).
 هو السويق ، الجزء للمتوسط من الثمرة ؛ وهو الجزء اللحمي
 في الثمار المأكولة .



لايون ارجواني

٢٤٥٠٥ - **لبّ التارجيل** ، **كهره**
Coprah, Copra (F). *Coco-nut* (E).
 لب ثمر التارجيل الذي يستخرج منه بالصر دهن لباني
 يسمى « سمن لباني » .

٢٤٥٠٦ - **لبّ يتي**
Brulissement interne (F). *Internal browning* (E).
 عارض يصيب ثمار التفاح الخروزة في البراد ، فونه عروق
 مستطيلة مستقيمة وتبرية تشعب من وسط الثمرة الى
 سطحها فتضبط الخلايا التي تغطيها وتسبب اختار عصيرا .
 يقال ان اسبابه تعود الى انخفاض درجة الحرارة قرب زين
 ادراك الثمار وإلى بوهولها في البراد حتى درجة الصفر واستمرارها
 على هذه الدرجة بعض الوقت .



لايون ارقط

٢٤٥٠٧ - **لبّا**
Arroser (F).
To water, To sprinkle (E).
 لبّ القصرة ؛ سقاها عند حرها ، اذا فرست فيلقة يهب
 ان تلبها .

٢٤٥٠٨ - **لبّا**
Amouille, Colostrum (F).
Beastings, Colostrum (E).
 اول حليب عقب الوضع تدره البقرة والثقة والعمرة . وهو
 غني بالمواد الآحيه فقير بالزبد والسكر والماء .

٢٤٥٠٩ - **لبّاب**
Pulpe (F). *Pulp* (E).
 هو بوجه عام جاع للمادة الدفنية البتائية الطبيعية . وهو
 بوجه خاص ما تبقى من الثورند بعد استخراج السكر
 ومن البطاطا بعد استخراج النشا .

٢٤٥١٠ - **لبّابي** ، **لبّوبي** ، **لبّوبي** ، **لبّوبي**
Pulpoux (F). *Pulpous, Pulpy* (E).

٢٤٥١١ - **لبّادى** ، **لبّادى**
 قال الجاحظ : « طائر على شكل البنان اذا أسفّ حل
 الارض كبه فلم يكه يطير حتى يطار » .



لايون اسفر

٢٤٥١٢ - **لبّان** ، **لبّنج**
Boswellia (S).
Boswellie (F).
 جنس اشجار حشوية من سبط البخوريات وفصيلة البطيبيات
 انواعه المعروفة قليلة اصنافها جبال المناطق الاستوائية المشية

٢٤٤٩٧ - **لاهيّة الصنّاف** (F). *Lamie des saules* (F).
 هي قروبي الصنّاف ، اطليا .

٢٤٤٩٣ - **لايميون**
Lamium (S).
Lamier (F). *Dead-nettle* (E).
 جنس نباتات برية معمرة من فصيلة الشقويات . انواعه
 نحو ٤٠ جميعها اشباب تعلم من ٣٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها
 متعاقبة ، منقطة ، مخززة . ازهارها ضمية الجميع ، ابطية
 الاوتكار . تكثر في الاماكن الظليلة وفي السياجات وبجاري
 الماء . وهي من النباتات المرموية التي تشتهى الماشية . اعراف
 انواعه واشهرها ما يلي .

٢٤٤٩٤ - **لايميون ابيض** * ، **قراض كاذب**
Lamium album (S). *Lamier blanc, Ortie blanche, O. morte, Fausse ortie* (F). *White dead-nettle* (E).
 نوع من اللايميون الطبي . عشبته تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم .
 اوراقه الى الخضار الاصفر المالح ، يطولها زغب مبعثر
 نحيل . ازهاره كبيرة اللد يضاء اللون || ازهاره رديي
 يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٤٤٩٥ - **لايميون ارجواني** * ، **قراض احمر**
Lamium purpureum (S). *Lamier pourpre, Ortie rouge, O. féide* (F). *Red dead-nettle* (E). *Rota Taubnessel* (D). *Lamio purpureo, Ortica fétide* (I).
 نوع من اللايميون الطبي . عشبته كرجة الرائحة تملو
 من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه خلية الصفحة السفلى .
 ازهاره ارجوانية اللون ، كبيرة اللد ، تطول نحو ٤ سم .
 ازهاره رديي .

٢٤٤٩٦ - **لايميون ارقط** * ، **لوقاس** ، **حرف**
Lamium maculatum (S).
ابيض

Lamier maculé, L. tacheté (F). *Spotted dead-nettle* (E). *Gefleckte Taubnessel* (D). *Lamio scritto, Dolcimele, Milzadale* (I).
 نوع من اللايميون الطبي . عشبته تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم .
 اوراقه خلية الصفحة السفلى . ازهاره كبيرة اللد تطول
 نحو ٥ سم . لونها الى البياض المرقط بالاحمر || ازهاره
 رديي .

٢٤٤٩٧ - **لايميون اصفر** *
Lamium luteum, L. galioobdolon (S). *Lamier galioobdolon, Ortie jaune* (F). *Yellow archangel, Yellow dead-nettle* (E). *Geiße Goldnessel, Goldtaubnessel* (D). *Lamio giallo, Ortica gialla* (I).

نوع من اللايميون ، عشبته تعلم من ٦٠ الى ١٢٠ سم .
 اوراقه مائلة البثرة على صفحاتها ، ازهاره متوسطة اللد
 تطول نحو ٣ سم . لونها الى الصفرة الكبريتية . ازهاره
 رديي .

٢٤٤٩٨ - **لاهيّة** * ، **ملتهاب**
Lance-flammé (F). *Flame chrower* (E).

جهاز آلي يرسل اللهب ويسده . يستعمل في القضاء على
 بعض الحشرات وفي تطهير التربة من بعض الاوسام والجراثيم

٢٤٤٩٩ - **لاهورتي** ، **أثيروبي**
Anasérobique (F). *Anasérobic* (E).

نعت تعريفي يطلق على جميع الاحياء المجهرية التي تستطيع
 الحياية بهدا من الهواء .

سوقها صارة صمغية رائحة شفاقة تستعمل استعمال
البخور ، عرفها ليموني الزانحة مستحب .
٢٤٥٢٢ - لَيْبَبَ
لب الحب : جرى فيه الدقيق وصار له لب يؤول .

Tilapia (S).

Tilapia (F). Tilapia (E).

جنس اسماك نهريه من فصيلة المشقيات . انواعه المعروفة
قليلة العدد . اصلاتها بعض انهر الشرق الاذفر وافريقية
الشرقية || اجسامها صغيرة ، قصيرة الاطعام ، صلبة الاشفاق
متعددة التبطيط ، رقيقة القدم ، تطول من ١٦ الى ٢٠ سم .
رؤوسها متدلة الجرم ، قصيرة الاطعام ، صلبة الاشفاق
كبيرة العين . زعانفها الظهرية كبيرة ، قليلة المرض .
الصدريه والخوضيه والشرجية معتدلة الجرم . الذليلية كبيرة ،
مقطعية الطرف . اوتابها تراوح من الريدة السمره الى
الريدة القفصية يطولها ستة او ثمانية او عشرة اطواق
معرضة شديدة السمره || من ميزات هذا الجنس ان الجنس ان الكور
تحسن سره الاناث في تجاريف اعطامها حتى التفت اي
نحو سمة ايام || اعرف انواعه :

Tilapia orontes (S).

Tilapia de l'Oronte (F).

٢٤٥٢٤ - لَيْبَتِ الْعَاصِي

يكثر وجوده في نهري العاصي والاردن .

Tilapia nilotica (S).

Tilapia du Nil (F).

٢٤٥٢٥ - لَيْبَتِ النيل

يكثر وجوده في النيل حيث يسموه غرشقي وشط في
سين ان الشط اي الغرشقي ينتمي الى فير هذا الجنس .

٢٤٥٢٦ - لَيْبَتِ *

Trombidium holosericeum (S). Lepa sutomnal,
Aoûtat, Mite rouge, Vendangeur (F).

حشرة من العاشيات ، طولها نحو ٣ سم . ثوبها الى الحرة
تكثر في المراعي والحقول المزروعة وظل اللوزياء . رقبها
نخيلة دقيقة طولها يراوح من ١ الى ٢ سم . تركيب الانثى
اذا جلس فوق المشب وتدخل تحت بشرة الجلد تحدث
حكة كاذبة مؤلمة . يمينها البزير .

٢٤٥٢٧ - لَيْبُوِيرِيوم *

Leptochyrium جنس فطور مجهرية من فصيلة الهديكات . انواعه قليلة ،
تتميز ببيكتانياتها المجسنية الشكل ، السطحية الارتكاز ،
البرداء اللول . بولغاته اعطليجية او وشمية || اعرف
انواعه ما يلي .

٢٤٥٢٨ - لَيْبُوِيرِيوم الشفاح *

Leptochyrium pomi (S). Maladie en crotte de mou-
che (F). Sooty blotch (E).

فطر مجهرى يمتري ثمار عدة نباتات برية وزراعية
انحصا الشفاح في بعض انواعه المتشابة || مظهره الخارجى
رقشة وشية تشبه ونم اللبالب يبلغ متوسط عددها نحو ٤٠
نمعة . تركيب بشرة الثمرة قرب ادراكها . تبسب سنطية
اللون ثم تتحرف الى السمره الفحمية || يعيش البار
فيخس قنبها التجارية دون ان يسطها || يكافئ بساتمال
سائل بودرد الخفف قبل ادراك البار ياسبوسين .

٢٤٥٢٩ - لَيْبُوِيرِيوم كَارِوِيلِيوم *

Leptochyrium carpophilum (S). Fly speck (E).
فطر مجهرى يمتري بعض انواع الاجاص المتشابة . مظهره

والانزيتية . يستخرج من سوقها بالخر صارة رائحة
سرية الجفاف فاعرة المصنف تدعى بخور اللبان || اشهر
انواعه ما يتبع .

٢٤٥١٣ - لَبَن حَبْشِي * ، بَسْتَج حَبْشِي ،
طُونَس

Boswellia papyrifera (S).
Boswellie d'Abyssinie, Arbre à l'encens (F).
Incense tree (E). Weihrauchbaum (D). Albero
Incenso (I).

نوع من اللبان ، شجرته صغيرة القد ، موطنها بلاد الحبشة .
يستخرج منها بالخر اخضر بخور واعمته .

٢٤٥١٤ - لَبَن شامي ، صَمْع البَطْم

Pois-résine (F). Shoemakers' wax (E).
مادة رائتية صمغية تستخرج من سوق البطم .

٢٤٥١٥ - لَبَن هِنْدِي ، لَبَن ذَكَر ، بَسْتَج
هِنْدِي ، كَنْدَر

Boswellia serrata (S). Boswellie des Indes, Oliban
(F). Frankincense, Olibanum tree (E). Echter Weih-
rauchbaum (D). Olibano incenso (I).

نوع من اللبان ، شجرته متوسطة القد ، موطنها بعض مناطق
الهند . يستخرج منها بالخر بخور اللبان المشهور .

٢٤٥١٦ - لَبَن

Laitier (F). Milkwoman (E).
من تاطى بيع الحليب والبن .

٢٤٥١٧ - لَبَانَكَة

Andrachne (S). Andrachné (F). False orpine (E). Echter Burgel (D). Porcellena (I).
جنس نباتات برية من فصيلة اليتونيات ، انواعه
عديدة منها الاعشاب والجنات والشجيرات . جميعها صمغ ،
اصطفا للمناطق الحارة والمتدلة في سائر اقطار العالم . سوقها
منصبة او معرجة ، فروصها دقيقة ملتوية . اوراقها صغيرة
القد معتمة متعاقبة متقاربة . ازهارها ابطية فريدة . ثمارها
جراة تغلف نحو ٦ زور آسية المادة || اشهر انواعها
الطبية ما يلي .

٢٤٥١٨ - لَبَانَكَة الخُوسَط *

Andrachne telephiolides (S). Andrachné télé-
phioïde (F).

نوع من اللبانة الطبية ، مهدا تمام شرقي المتوسط من
قلاطين الى اذير . ساقها نخيلة ، فروصها دقيقة وملتوية .
اوراقها صلبة ، بيضبة النصل ، نقيصها ينقي الدم
ويبرد البولي .

٢٤٥١٩ - لَبَانَكَة الحِنْدَة

Andrachné cadishaw (F).

نوع من اللبانة الطبية ، مهدا الهند . اوراقها مطورة ناجسة
تقل الجروح وتشي القروح الخبيثة .

٢٤٥٢٠ - لَبَانَكَة مغربية

Euphorbe résinifère هي المتجدد ، اطبله .

٢٤٥٢١ - لَبَانَكَة * ، اَمْطِي


Icica icariba, Protium icariba (S). Icaquier (F).

Elemi gum tree (E). Elemibaum (D). Elemi (I).

جنس اشجار حرجية من فصيلة البخوريات . انواعها
عديدة ، اصلها المناطق الاستوائية والحارة بعضها يمش
في رمال الشريط السبرية والبرية . اوراقها مركبة متعاقبة .
ازهارها صغيرة القد يضاء اللون . ازهارها شوكلي او
عنقودي التصنج ، محوري الارتكاز || يستخرج من



لبان حبشي



لبانة المتوسطة



لبانة



لبانة



لبانة



لبانويوم الفلاح

الخارجي رشفة حنطية تركب التآر فتصلب البشرة المنحارة وتثبت التآر دون أن تنطليا || يكافح باستعمال سائل يورده الخنثف أو السائل السفلوكليسي.

٢٤٥٣٦ - ليثورة مُنطَحة *

Leptura maculata (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٥ إلى ١٧ م . جسمها ضيق مستطيل ، رأسها وكشطلها الى السواد الفضي ، عمدا الى اصفار التبيي يملوها تخليط وتبييض وتنشيط . تميش على مختلف ازهار الورديات والغيديات . يكتر ويجودها من ايار الى ايلول . رقاتها همة مؤذية .



ليثورة ذببية
ليثورة سداسية
التجذيع

٢٤٥٣٧ - ليثورة مُنطَحة *

Leptura cerambyciformis (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ٧ إلى ١١ م . رأسها وكشطلها الى السواد اللامع . عمدا الى الصفرة المفرة تملوها نقط سود طرية || تميش في الاغصان والخلاتق الجبلية ، يكتر ويجودها من حزيران الى آب .



ليثورة سداسية
ليثورة فسقية

٢٤٥٣٨ - ليثورة مؤذرة *

Leptura aurulenta (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٤ إلى ١٨ م . رأسها وكشطلها الى السواد الباق . عمدا الى الصفية الثانية تترسها ثلاثة خطوط سر يملوها خل مذهب اللون . تميش على مختلف الاشجار الحرجية اغصانها السنبان ، يكتر ويجودها من حزيران الى آب . رقاتها مؤذية تسردب الشكير .



ليثورة مضبة

٢٤٥٣٩ - ليثوريات *

Leptoceridae (S).

فصيلة حشرات من رتبة جملويات الاجنحة . اجناسها وانواعها المرفوعة متوسطة البدن منتشرة في بعض اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة والمنحرفة نحو الياردة || اجسامها متوسطة القد ، خفراء ، اجنحتها خفراء اللون مهدبة الاطراف الخلفية ، تملوها بعض الزخارف ، تزنيها واضح الترتيب ، قليل الاعصاب للمترتبة || ملجها الحياتي جامي . اولوجها كثيرة العدد . تحلق فوق مجاري الماء خاصة بعد الظهور || اسارها تميش في المياه الجارية ملصقة بجلايب مخروطية منقعة كمد الحسام || أشهر اجناسها :



ليثورة ملطحة

٢٤٥٤٠ - ليثون *

Leptocerus (S).

Trisnoides (S).

Mystacides (S).

Leptocera (F).

البان نطشة نحيلة تظهر في الجبلية عصما تكون في اوج طور الميوزة .



ليثورة منطحة
ليثورة مؤذرة

٢٤٥٤١ - ليثونة *

Lapeon (S).

Lepton (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات سفنجيات الحانثام وفضيلة اليرسويات . انواعها المرفوعة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || جميعها صغير القد طول من ١ الى ٢ م . اصداؤها شبه بيضية الشوزن ، وريقة الصفحة ، قليلة الاحدياب . يملوها رمي في الشكل || تميش لاصقة بالصخور . ليفها غزير المادة .



ليثونة

الخارجي رشفة حنطية تركب التآر فتصلب البشرة المنحارة وتثبت التآر دون أن تنطليا || يكافح باستعمال سائل يورده الخنثف أو السائل السفلوكليسي.

٢٤٥٣٠ - ليثورة *

Leptura (S).

جنس حشرات من فصيلة القرنييات . انواعها عديدة ، جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الجرايم وزايفان ، ذابية الايلوان السوية أو المزركشة . تركب ازهار مختلف النباتات اغصانها المشبية || رقاتها همة تميش تحت لحاء الملوخ والاغصان الصلفة وقد تسردب الشكير || أشهر انواعها ما يتبع .

٢٤٥٣١ - ليثورة ذهبيّة *

Leptura fulva (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٥ إلى ١٤ م . رأسها وجودها مصطبغ سود . عمدا الى الصفرة اللحية . تميش على ازهار المركبات والغيديات . تكتر في المروج والمراعي من حزيران الى ايلول .

٢٤٥٣٢ - ليثورة سداسية التجذيع *

Leptura sexguttata (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ٩ إلى ١٥ م . لوها اسود اللون . عمدا سداسية التجذيع الاصفر . تميش على ازهار الخشويات . يكتر ويجودها في حزيران .

٢٤٥٣٣ - ليثورة سدائفة *

Leptura cordigera (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٤ إلى ١٦ م . رأسها ويقدم جوشها وحجبتها بسود . عمدا الى الحفرة الكرزية يملوها عند ملتقاعها بسود الزام الاول من القاعدة بقعة سوداء مستطيلة سدائفة الشكل تمتد حتى طرف الفلين || تميش على ازهار الشوك والاراضي شوكي . يكتر ويجودها من حزيران الى ايلول .

٢٤٥٣٤ - ليثورة فسقية *

Leptura virens (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٥ إلى ٢٠ م . لوها الى السرة يملوها خل دقيق كثيف اصفر اللون اخضر المروج . تكتر في اسراج الصنوبر . رقاتها همة تسردب قشور وشكير الاخشاب اليابسة والمقطوعة .

٢٤٥٣٥ - ليثورة مضربة *

Leptura bifasciata (S).

Leptura bifasciata (E).

حشرة واشعة غاضلة من فصيلة القرنييات ورتبة منعدات الاجنحة . تألف الهضاب والبراري . غاضها تميش على بتلات الازهار . رقاتها غاضلة ناعمة تركب لحاء الاشجار الفتية وسوق النباتات الحرجية خلفها وتسردبها وتصلبها || جسمها صغير القد يطل من ٧ إلى ١٥ م . لوها ثنائي اللون ، رأسها وكشطلها وزبانها وبرازها الى السواد المابق اللامع ، بطنا وظهورها الى البني الاسفر المالح يملوه في الغلبنين مصطبغ اسود . رأسها صغير الجرم . عينها كبيرتان حشرتان . زبانا دقيقان ، مستطيلان . ظهورها فارغ المؤثر لا يلحف السكة الشربية . عمدا مستتبع التحزير القاطب . اساغها رباعية النقل الظاهرة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملولة في اوائل حزيران وتمش حتى اواخر ايلول . تسرح في التبار . تصافد بعد ظهورها باربعة اسابيع . تزر المكان في لحاء



لبيد



لبيد



لبيد الجبل



لبرة الحمص



لبرة الزيتون



لبرة الكرز

٢٤٥٤٢ - لبيد (S). *Leptodes brevipennis* (S).

حشرة نصفية اللمد من فصيلة القزليات. اصطناع البلاد المحتلة الحارة من العالم القديم || طولها يراوح من ٤ الى ٦ مم. ثوبها الى السرة الخيطية الشبهاء. زباني ذكورها مستطيلة لتلتف كامل الجسم. زباني انثاهما قصيرة تبلغ طرف الاغاد || قوتها جميع المواد العضوية واعضاها الاغشاب اللينة التي تتغذوا وتردها وتقضي عليها.

٢٤٥٤٣ - لبيد (S). *Leptinus* (S).

جنس حشرات من فصيلة القزليات ورتبة عذبات الاجنحة انواعه المعروفة قليلة اللمد منتشرة في بعض مناطق البلاد الباردة والمعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ، بيضوية الشوزن ، تطول من ٢ الى ٣ سم. رؤوسها قصيرة ، مستعرضة. حينها طامسة. تأثيرها ولكونها وملاسها صغيرة. قرونها الاستشعارية خيطية ، مستطيلة. كواسلها مستعرضة ، خلية القشار. اغادها لاحفة يملؤها خل قصير. قوتها نشطة. اولوها الى السرة المختلفة المناجات، يكثر فيها الاصفر || تتغلف على مختلف انواع القواض. تعيش على التوصفات التي يفرزها الجله.

٢٤٥٤٤ - لبيد (S). *Leptinidae* (S).

فصيلة حشرات جلدية من عذبات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة اللمد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة ، مبطلة ، شبه بيضوية الشوزن ، تطول من ٢ الى ٤ سم. رؤوسها قصيرة ، مستعرضة. حينها طامسة. تأثيرها ولكونها قياسية. قرونها الاستشعارية صوبانية. كواسلها واحادها خلية القشار. اغادها متباينة الشكل ، بعضها يلمس كامل البطن والبعض الاخر نصفه. اوساها رباعية المقل. اولوها عادمة الشقاق || تعيش على غراء القواض الحية. قوتها التوصفات التي يفرزها الجله || اشهر اجناسها البتين.

٢٤٥٤٥ - لبيد * ، حشاش الماء *Lapachum aquaticum* (S). *Petencio aquatico* (F).

لبات حشبي بري ممر من فصيلة البطاطيات. يكثر في المائع وصل مجاري الماء. بطوره ذرية ، ساقه فراءه تملن من ٤٥ الى ١٠٠ سم. اوراقه منقطة اعليانية مستطيلة ؛ نصلها باهت الخضار البحري ، مشجع الصفعة.

٢٤٥٤٦ - لبيد (F). *Lebbek* (F).

جاء وصفه في البيزيا اللينج ، واجمعها.

٢٤٥٤٧ - لبيد الجبل (S). *Cocculus lebeba* (S).

نوع من الكركوس من فصيلة القزليات. وهو نبات حشبي طيب بري ممر. ساقه فراءه. فروعه رلة متدلية. اوراقه منقطة متعاقبة بيضوية صغيرة القد. نصلها مالى البشرة على صفحتيه || وهو يستعمل في عدة مستحضرات طبية منها علاجات الحيات والبرقان والزقنة والكدب ...

٢٤٥٤٨ - لبيد (F). *Cataplasma*, *Charge* (F). *Cataplasma*, *Poultice* (E).

مستحضر قاق يوضع على مكان الألم من الجسم.

٢٤٥٤٩ - لبيد * ، لبيد بالمكان : اقام به .

٢٤٥٥٠ - لبيد (F). *Aborigène* (F). *Aboriginal* (E).

هو الاصلي من ثبوت البلاد او عظمها اي حيواناتها .

٢٤٥٥١ - لبيد (F). *Aborigène* (F). *Aboriginal* (E).

هو السلق المضلع ، اطلبه .

٢٤٥٥٢ - لبيد (S). *Lepidurus* (S).

دوبية من القشريات خيشويات الاطراف تعيش في المياه العذبة اينما تكاثرت الاغشاب || جسمها صغير القد ، مبسط الشكل ، يملو حاف مجني يغلظ الظهر . زباناها شديدة القصر . قوتها الصدرية كثيرة العدد .

٢٤٥٥٣ - لبيد (F). *Tomenteux* (F).

لمت تمرني يوصف به كل عضو نباتي خلطه مستطيل وكثيف كالوبر.

٢٤٥٥٤ - لبيد (S). *Cylindrosporium* (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفريجات. انواعه قليلة العدد والذى || كئاده مخروطية الشكل تشأ منفردة ثم تتجمع . بويضاته مستطيلة وقد تكون خيطية منطقة ، مؤطرة الاطراف || اشهر انواعه ما يتبع .

٢٤٥٥٥ - لبيد (S). *Cylindrosporium plat* (S).

فطر مجهرى يصيب الحصص في سقوف واوراقه ونباتيه . مظهره الخارجى يقع صفر او رمادية اللون ، مقرنة الزوايا ، تركب السقوف والنباتات وقصب الجفاف واليباس.

٢٤٥٥٦ - لبيد (S). *Cylindrosporium platanoideis* (S).

فطر مجهرى تركب اوراق الدلب والقيقب . مظهره الخارجى يتور صغيرة كثيفة شقراء اللون ، تركب النصل بكامله قصب الذبول والاحبال .

٢٤٥٥٧ - لبيد (S). *Cylindrosporium olivae* (S).

فطر مجهرى يصيب النار يقيضي عليها بعد ان يجمعها ويحفظها . مظهره الخارجى يقع فسيحة مستديرة او بيضوية الشكل ، تلبو في قشرين ، تركب الاذن ثم تمتد الى النار ، تظهر بنسجية اللون ثم تتور الى السرة الباهتة قصب يباس اللب بعد تجميعه وتشقيقه || تقلبات الحرارة الجوية وارتفاعها بعض الايام يلبس هذا الوص . يكتاف باستعمال الاصلاح النحاسية الخفيفة .

٢٤٥٥٨ - لبيد (S). *Cylindrosporium padi* (S).

فطر مجهرى يصيب ويصلب اوراق الكرز || مظهره الخارجى يقع صغيرة مستديرة او مقرنة الزوايا ، قطرها من ٢ الى ٣ سم. لونها الى الصفرة الزاوية ، توسلها نقطة يضاء ، تركب النصل قصب يباس وانحناات التسج المتحارة || يكتاف باستعمال السوائل السلفوكسية بعد تخفيفها بنحو ٥٠ ٪ وتعملها ٠,٦ ٪ من سلفات الحديد .

ظهرها مستدير المؤخر القارعة اللامع . عندما متناهيًا التفتيط الخفيف . أرسافها رباعية المقل الظاهرة || الحـ جبل واحد في الخيل . تظهر أخشرة الجملانة في أواخر نيسان وتعيش حتى أواخر حزيران . تشرح في الليل وتنفذ بعد ظهورها بنحو ثلاثة أسابيع . تجمع المكن رزقًا لتفلقها مادة خروية على اتصال الأوراق وبذات السوق والتفصيان || البرقة عند بلوغها الإدراك تطول نحو ٧ م . جسمها شبه أسطواني الشكل ، قليل التقوس ، سداسي الرؤوس ، سحلي اللون ، اسمر الموالج ، أسود الرأس . ويعلو الجسم ثلاثة خطوط قاطبة عاجية وهبط دقيق أشهب اللون || طول الإكمال الذي يستمر نحو أربعة أسابيع ينتهي في التربة تحت الجلالة والميل .



لَبَرَسُ الزَّلَّك

Labeobarbus (S).

٢٤٥٦٦ - لَبَرَسُ

Labeobarbe (F).

جسـ اسمك نهرية من مفتوحات الثانة وفصيلة البليطيات. أنواعه المروفة ثلاثة ، اثنان يعيشان في أنهر الهند وأفغان وواحد يعيش في النيل || أجسامها شبه المثلجية ، قليلة التفتيط ، تطول من ٦٠ الى ٧٥ سم . رؤوسها معتدلة الجرم . حوضها جاحظة . اشداقها كبيرة ، خماسية الملبات الصغيرة . زعانفها الظهرية فردية ، شراعية الشكل . زعانفها الذيلية فارقة . ألوانها الى الأخضر البحري . زعانفها الى الأخضر الاصفر || لحويها متوسطة الصفـ ، مأكولة || أما أنواعها الثلاثة فهي :

Labeobarbus nagdia (S).

لَبَرَسُ التَّيْلِ *

Labeobarbus jungia (S).

لَبَرَسُ أَصَام

Labeobarbus macrolepis (S).

لَبَرَسُ كَشْفِي

Labrella (S).

٢٤٥٦٧ - لَبَرِيْلَا

جسـ نباتات مجهرية من فصيلة المذكيات ، أنواعه قليلة لا مؤدية . بكتباته مستديرة ، سواد اللون ، فريضة الانفلاق . يوفياته مستطيلة او وشية او كروية الشكل ، ثنائية .

Sanve (F).

٢٤٥٦٨ - لَبَسَان

هو الخردل البري او خردل الحقل وينسـ الحشاء . وقد يتبر من الاغشاب القصارة نيا لو كثر في الزرع . ابادته تـ باستعمال احد المولثبات القمالة الكثيرة الوجود في هذا البصر .

Lampene commune (F).

٢٤٥٦٩ - لَبَسَانَة

هي الخلفج ، اطليه .

Prallage (F).

٢٤٥٧٠ - لَبَسَة

علية زراعية تتقدم غرس النصب . قوامها تفتيط جلور الاغراس بروة مألـ من الماء والميل ونسـ القبر وذلك لتغطية الجذور وبروسها بنشاد ناعم واق لا يتخلل من التناء يسامحها على مقايبة عوامل البيت الجديدة ويحضرها ويحبها على ائتلاف الجذرات الخيطية وما يتبعها من عدة اختصاص اللناء ، اود الحلية والنشوء .

Lobostemon (S).

٢٤٥٧١ - لَبَسَمُون

Lobostémone (F). Lobostemon (E).

جسـ جنبات برية وتزيينية معمرة من فصيلة الحسببات . سفيها منصبة فراء تطو من ٧٠ الى ١٥٠ سم . أوراقها

٢٤٥٥٩ - لَبَرَةُ المِيوزُونِس
Cylindrosporium myosotidis (S).

فطر مجهرى ركب نعل أوراق الميزونيس || مظهره الخارجي يقع نسبة مستطيلة ، طولها نحو ١٠ م . لونها الى السرة ، اطرافها اصفر الخصب ، اشقر الموالج . تسب الدبول والالجاب .

Lapeyrousia (S).

٢٤٥٦٠ - لَبَرُوزِيَة

Lapeyrousie (F).

جسـ نباتات دوفسية من فصيلة السونيات . انواعها كثيرة العدد معظمها بري وبعضها تزيي . مهدا البلاد الافريقية . جميعها صغيرة القد وشيدة الساق الشراعية . أوراقها مروحية التصيف . ازهارها سنبلية التجميع . اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٢٤٥٦١ - لَبَرُوزِيَة أَسَلِيَة الزَّرَك

Lapeyrousia juncea (S). Lapeyrousie à feuilles jonciformes (F).

نوع من البروزيه . أوراقها اسلية الشكل ، مستطيلة التصل المهدب المختار . شراعيها الزهري يعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . ازهارها سنبل التجميع . ازهارها متوسطة القد ، كثيرة العدد ، وردية اللون || تنورها يستمر طوال شهر ايار .

٢٤٥٦٢ - لَبَرُوزِيَة عَدِي كِيَة

Lapeyrousia corymbosa (S). Lapeyrousie en corymbe (F).

نوع من البروزيه ، شراعيها يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم . ازهارها ظلي الشكل وهو بذلك يشد عن سائر انواع الجنس . ازهارها الى الزرقة الزاهية تنسجها نجمة يشفاء اللون بنفسجية المختار . تنورها يستمر نحو ٣ أسابيع ابتداء من شهر ايار .

٢٤٥٦٣ - لَبَرُوزِيَة كَبِيْرَة الزَهْر

Lapeyrousia grandiflora (S). Lapeyrousie à grandes fleurs (F).

نوع من البروزيه ، أوراقها ضية الازتكاز . شراعيها يعلو نحو ٣٠ سم . ازهارها سنبلية التجميع . ازهارها ارجوانية ، زاهية ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم . تنورها يستمر طوال شهر تشرين الاول .

٢٤٥٦٤ - لَبَرُوزِيَة مُبْطَظَة السَاق

Lapeyrousia anceps (S). Lapeyrousie à tige aplatie (F).

نوع من البروزيه ، شراعيها مبطن الجسم ، ثنائي الزوايا ، يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم . ازهارها سنبلية التجميع . ازهارها بنفسجية اللون . تنورها يستمر طوال شهر ايلول .

٢٤٥٦٥ - لَبَرُوسُ الزَّرَك

Luperus circumfusus (S). Lupère des genêts (F). Luperus circumfusus (E).

حشرة شامخة من فصيلة التصاريات وردية مخدات الاجنحة . تألف البر والبراري والاحراج . خنافسها وبقاها تعيش على نباتات القرنيات الفراشية واعضاها الزوال || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ م . ثوبا الى الصفرة الصفاء الموالج يطرقها في الكليل والنسدين سحار اسود . رأسها معتدل الجرم . عيناه صغيرتان . زباناها خيطيان . غطها مخروفي . فكها ذريان .



لَبَرَسُ التَّيْلِ

Elops conigicus (S). - لَبْسُ حُطَيٍّ ***Elops brun (F).**

نوع من الحبس. أطالته تحت من مصب النيل إلى الجزائر والمغرب. جسمه متوسط القد النسبي، يطول نحو ٧٠ سم. قو به إلى الريدة الحنطية المواج يمين في الظهر ويبيض في البطن || لحمه متوسط الصنف، مأكول.

Etopidae (S).**٢٤٥٧٩ - لَبْسِيَات****Etopidae (F). Elopidae (E).**

فصيلة اسماك بحرية من العظمايات مفتوحة المنادات. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها بحار البلاد الحارة. مسرحها الاغواط والتفاف والمجادح وبعض انواعها تدخل الاغوار والانهار || اجسامها اهليجية الشكل تطول، بالنسبة إلى الانواع من ٣٠ إلى ٢٠٠ سم. رؤوسها مخروطية كبيرة الاشداء تتميز ببروز نصل ظلي المادة يتوسط الفك السفلي ويرتكز على جانبيه. ظهورها شبه مسطحة. بطونها محدبة. زمانها الظهري مقعرة. زمانها البطني غارقة || أشهر اجناسها واعرفها الحبس والمجاس.

Leptosomus (S).**٢٤٥٨١ - لَبْسُوس****Courul, C. bicolor (F).**

طائر وسيد الجنس والنوع من فصيلة القيقويات. اعطائه فسيحة تمتد من تهام البحر الاحمر إلى الحبشة وبغسفر بعض مناطق افريقية الجنوبية || الذكر اصفر قدام من الانثى، طوله نحو ٥٠ سم. قو به متباين الألوان. ظهره مع جناحيه وقفيه إلى الخضار النعاسي المواج، يطله إلى الصبغة البهراء. رأسه إلى الصبغة الحنطية تملوها قلنسوة سمراء. زقده كمرف الذيك ثنائي الاكتساب || الانثى تطول نحو ٥٥ سم. قو بها إلى الريدة الحنطية تملوها ثمة صناعية التتم سمراء الخنار. وثوبها هذا يمين في الرأس والظهر والذنب ويغير في العنق والصدر والبطن والافنك || يألف الغابات والادغال. قو به الثار والحشرات اعصها الجراد والجنادب والزيزان || يذئ منه في الاجمار المتراكبة الاخضار والافنك. الانثى تضع من ٤ إلى ٥ بيضات تحضنها بجناحيه الذكر نحو ٢٤ يوما.

Convolvulus (S).**٢٤٥٨٢ - كِلَاب****Liseron (F). Convolvulus (E).**

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة البلبليات. انواعه نحو ١٥٠ اعطائها المناطق الحارة والمعتدلة معظمها بري وبعضها طبي وزراعي || احرف انواعه واشهرها ما يلي.

٢٤٥٨٣ - كِلَاب اُرُصِي هُو الكفة المادة، اعطيا.**٢٤٥٨٤ - كِلَابُ الْحَقُولِ * ، كِلَابُ صَغِير ، طَرِيْشُ الْغُرَاب**

Convolvulus arvensis (S). Liseron des champs, Petit Liseron, Liset, Vrillet (F). Corn bind, Corn lily, Lesser bindweed, Bearbe, E. Ackerwinde, Winde (D). Convolvato arvensis, Erba leprina, Vitechio (I). نوع من الكلاب المبلول، يكثر في الحقول وبين الزروع فيصبح من النباتات الضارة. ساقه مضلعة مزعزعة تطول من ٢٠ إلى ١٠٠ سم. اوراقه رقيقة مجتمعة. ازهاره وردية اللون او بيضاء، قطرها يراوح من ٣ إلى ١٠ سم. || ازهاره يستمر من ايار إلى تشرين.

لاطئة، متعاقبة، كاملة. ازهارها مختلفة الألوان منها الازرق والوردي والبنفسجي والاخر || انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية.

٢٤٥٧٢ - كَيْسْتُمُونُ أَنْيَق ***Lobostemon formosus (S).****Lobostémone élégant (F).**

نوع من البستمين. ساقها تملو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. افتادها مزقية اللحاء. اوراقها سنائية الشكل. نصالحا خلية الصمغحات العليا، سننة الخنار. ازهارها وردية اللون متدلية. قطرها نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر من حزيران إلى تموز.

٢٤٥٧٣ - كَيْسْتُمُونُ بِحَرِّي الْوَرَق ***Lobostemon glaucophyllum (S).****Lobostémone à feuilles glauques (F).**

نوع من البستمين. ساقها قمرها تملو نحو ٧٠ سم. اوراقها بحرية الخضار، خشنة الخنار. ازهارها متدلية الحجم، بنفسجية اللون، ناشرة الاسدية || تنويرها يستمر من ايار إلى تموز.

٢٤٥٧٤ - كَيْسْتُمُونُ فَيِي ***Lobostemon argenteum (S).****Lobostémone argenté (F).**

نوع من البستمين. ساقها تملو نحو ١٠٠ سم. افتادها زهاب اللحاء. اوراقها كاملة سنائية الشكل، نصالحا مزقية حل الصمغين، زفيا غني اللون. ازهارها متدلية القد، قطرها نحو ٣ سم. لبثا إلى الزرقعة الجميلة || تنويرها يستمر من حزيران إلى تموز.

Radier en béton (F).**Concrete bed (E).****٢٤٥٧٥ - كَيْسَة**

تسميع لاسف، شائع الاستعمال في البناء الباطوني.

Elops (S).**٢٤٥٧٦ - لَبْسُ****Elops (F). Elops (E).**

جنس اسماك بحرية من فصيلة البسليات. انواعها المعروفة خمسة. اعطائها مطر بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جميعها اعطالية الشكل، شفاء الخلف، مسطحة الظهر، محدبة البطن. جامدة الحراشف المتباينة الاحجام. اثنواها متراكبة الألوان تكثر فيها الريدة الرصاصية التي تترك في الظهر وتغير أو تبيض في البطن || احرف انواعه واشهرها، الثلاثة التالية :

Elops saurus (S).**٢٤٥٧٧ - لَبْسُ اصْغَمَ****Elops saurian (F).**

نوع من الحبس. أطالته البحر الاحمر والخليج العربي. جسمه كبير القد يطول نحو ١٢٠ سم. قو به إلى الصمغة || لحمه متوسط الصنف، مأكول.

Elops lacerta (S).**٢٤٥٧٨ - لَبْسُ حِرْدَوِي****Elops lézard (F).**

نوع من الحبس. أطالته الشواطئ الافريقية المعتدلة من المغرب إلى انكولا. جسمه كبير القد يطول نحو ١٥٠ سم. قو به إلى الريدة الرصاصية || لحمه متوسط الصنف، مأكول.



لبس حطى



لبسوس



كِلَابُ الْحَقُولِ

رطة خلية البشرة القفصية الموج. ازهاره ثلاثية التجميع، زرق الختار، حمر القاعدة، صفر الاسدية || ازهاره يستمر من تموز الى تشرين.

٢٤٥٩٣ - تِلَاب يَپَاكِي ، تِلَاب اُرُغَب

Convolvulus japonicus, Calystegia pubescens (S). *Liseron pubescent* (F).

نوع من التلابل الممر. ساقه : باز عارضة تطليق من مزين الى اربعة اxtار. اوراقه خلية النصل، صغيرة القد، قصيرة الاختاق. ازهاره كبيرة الحجم، مستطيلة المالحق، بيضيه الثنايات، وحراء اللون || ازهاره يستمر من ايار الى ايلول.



تلابل السياجات

٢٤٥٩٤ - تِلَابِي (E). Hédéracé (F). Hederaceae

نمت تفرعي، وصي يطلق على السورق المنطقة التي تلبه التلابل.

٢٤٥٩٥ - تِلَابِيَّات، حَمْدِيَّات، سَكَمُولِيَّات

Convolvulaceae (S). *Convolvulaceae* (F). *Convolvulaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وسيدات القفالة. اجناسها وانواعها عديدة. جميع نباتاتها مفاداة او مستطيلة. سيقانها غزيرة العصارة اللينة. اوراقها متناوبة مغرقة. ازهارها كبيرة القد لا قياسية التجميع والازنكاثر. ثمارها حبة تنفلق عن مصرامين او اربعة مصاريج. مضاربها لا قياسية الاخضية التي يراوح عددها من ١ الى ٤ وكل غباء يحسن حبة او حبتان قفارا جامد الماد || اشهر نباتاتها السقمونيا والبطلطا الحلوة والجلاب والتريد.

٢٤٥٩٦ - تِلَابِيَّة Cistolde (F).

اسم يطلق على منمن خاص من المعادلة الثلاثية.

٢٤٥٩٧ - تِلَابِيَّات، تِلَابِيَّات، تِلَابِيَّات Torchis (F). Cob, Loam (E).

المضروب من الطين البناء مريماً كان او مستطيل. واحدته لينة او لينة.

٢٤٥٩٨ - تِلَابِيَّات Lait (F).

هو الحليب، اطلبه. واللبن بالعرف اللبناني هو الحليب الرائب.

٢٤٥٩٩ - تِلَابِيَّات، تِلَابِيَّات، تِلَابِيَّات Lait caillé, Yoghour, Yahourt (F). Curdled milk, Yaourt (E).

هو الحليب غث بالروية قراب واستبانة حواضه.



تلابل نقي

٢٤٦٠٠ - تِلَابِيَّات، تِلَابِيَّات Lactata

هي ملح الحامض اللبني.

٢٤٦٠١ - تِلَابِيَّات، تِلَابِيَّات Lactare

طرية تحلل اللبنوز الى غلوكوز وفلكتوز.

٢٤٦٠٢ - تِلَابِيَّات

هي اللبن الرائب المنقطع الذي نضج صله.

٢٤٦٠٣ - تِلَابِيَّات، تِلَابِيَّات Lactose

هو سكر اللبن. يشبه السكر البادي لكنه اقل حلولة، يذوب في اللبن والماء ولا يذوب في الكحول.

٢٤٦٠٤ - تِلَابِيَّات، تِلَابِيَّات

هي الاصطرك، اطلبه.

٢٤٥٨٥ - تِلَاب السِّيَاجَات *

Convolvulus sepium, Calystegia sepium (S). *Liseron des haies, Grand Liseron* (F). *Hooded bindweed* (E).

نوع من التلابل الممر المائل ساقه تطول نحو ٥ اxtار. اوراقه كبيرة القد مثلكة الزوايا مستطيلة الاختاق. ازهاره كبيرة الحجم، بيضاء اللون، وردية الموج || ازهاره يستمر من حزيران الى تشرين.

٢٤٥٨٦ - تِلَاب التَجَمُّس

هو الفيرويكا الخريفية، اطلها.

٢٤٥٨٧ - تِلَاب زَيْتُونِيَّات الْوَرَق

Convolvulus oleofolius (S). *Liseron à feuilles d'olivier* (F).

نوع من التلابل الممر. ساقه غشوشة منتصبه تملق من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه زيتونية الشكل، ازهاره نورية التجميع، صغيرة الحجم، وردية اللون || ازهاره يستمر طوال الصيف.

٢٤٥٨٨ - تِلَاب لُفِيَّيَّات، تِلَاب لُفِيَّيَّات الْوَرَق، حَشَبِيَّة مَهْبَرِيَّة

Convolvulus altheoides (S). *Liseron à feuilles de guimauve, Volubilis* (F). *Mallow bindweed* (E). *Kleine Kornwinde* (D). *Convolvolo argentino* (I).

نوع من التلابل البري المائل. ساقه فراء زيا تطول نحو ١٠٠ سم. اوراقه خيزرية الشكل مقصصة، فصلها خلي البشرة حل صفحتي. ازهاره كبيرة القد، ليلكية اللون، بيضيه القصل. جلوده وردية طية عديدة المنافع || ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران.

٢٤٥٨٩ - تِلَاب مُثَلَّث الْاَلْوَان

هو شب البهار، اطله.

٢٤٥٩٠ - تِلَاب مِصْرِيَّات، تِلَابِيَّات Dolichos lablab, Lablab vulgaris (S). Dolique d'Egypte, Dolique lablab (F). Egyptian kidney bean, Hyacinth bean, Lablab (E). Aegyptische Fasel, Gernelne Lablab (D). Dolico Egiziano, Fagiolo d'Egitto (I).

نبات زراعي سولي من فصيلة القرنيات. ساقه صفراء عارضة. اوراقه مركبة ثلاثية الوريقات البيضية اللدبة. ازهاره عطرية الرائحة، عشودية التجميع، بتفسجية اللون وبها الاجروبيات والمخطة بالايض. ثماره قرن مغلطة، سيقية، مقوسة. بزورها بيضيه مبطلة بتفسجية اللون او جزوية || ازهاره يستمر من حزيران الى آب.

٢٤٥٩١ - تِلَاب مُقَصَّص

Convolvulus cneorum (S). *Liseron-camélée, Liseron argenté* (F). *Silvered bindweed* (E).

نوع من التلابل الممر. ساقه غشوشة منتصبه تملق من ٧٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه ابيدة فصلها سناني الشكل، ملحق الطرف، خلي البشرة حل صفحتي، بحري اللون، قضي الموج. ازهاره متشككية التجميع، صغيرة القد، بيضاء اللون، وردية التوشيح || ازهاره يستمر طوال فصل الصيف.

٢٤٥٩٢ - تِلَاب مُورِيَّاتِيَّة

Convolvulus mauritanicus (S). *Liseron de Mauritanie* (F).

نوع من التلابل الممر وهو جنية ليفية غشوشة. ساقها قصيرة، فروصها دقيقة مفاداة، تطليق من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها بيضيه الشكل قصيرة الاختاق. نصالها

بمد متحمه بيشمة ايام من رقات ذرية تنوجه فوراً نحو الصفحات العليا من الاوراق وتقيم في اخاديد العروق حيث يتطور لها امتصاص الغذاء . ثم تتحول تدريجياً الى لبيدة تسرح على التماس والافان والافسان والسوق .

٢٤٦١٤ - لَبُودَةُ فُلُورِيدَةِ

Ceroplastes floridensis (S). *Céropaste de Floride* (F). حشرة صغيرة من القرمزيات ، موطنها الاصل فلوريدة وقد انتشرت في جميع الاصقاع الحارة . وراثتها عديدة اعضها الغار والكاكي . طولها يراوح من ٣ الى ٤ م . وعرضها من ٢ الى ٣ . ظهرها مخدوب الشكل مقمل اللون . فوها الى البياض الاخير ، جيلها الحولي واحد . نفث مكنياً يتم في اواخر سريان . تركيب الاوراق على صفحاتها العليا وقد تركيب الاغصان والسوق . تكاثرها بالزيت الشتوي .

٢٤٦١٥ - لَبُونُ ، لَبُونُ ، لَبُونُ ، لَبُونُ (F). *Laitière* (F). *Milch* (E). صفة الانثى الحلوب .

٢٤٦١٦ - لَبُونَات (F). *Mammifères* (F). *Mammiferous*, *Mammalia* (E). هي الحيوانات اللبونة المعروفة بالثدييات . واحدها لبون .

٢٤٦١٧ - لَبِيزَا (F). *Lapiaz* هو الريي ديار طبيعي لا يقياس العمق والاتساع بخندق سطح التندوز الجصي .

٢٤٦١٨ - لَبِيَّة (F). *Lebia* (S). *Lebie* (F). *Lebia* (E). جنس حشرات قانصة من فصيلة الجيبات ورتبة عمديات الاجنحة . انواعها المعروفة كثيرة المده منتشرة في معظم اقطار واقليم العالم || اجسامها صغيرة ، مبطلة ، تعلو من ٥ الى ٨ م . رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية خطيطة . تأثيرها وفكرها ولباسها نظامي . كراسلها صغيرة ، مخدورة . بطونها مفلطحة ، مستمرة . اعماؤها تساعية الاخاديد النحيلة القاطية . قوائمها ثنطية . ألوانها متباينة الالوان الزاهرة ، تكثر لها الزفرعة || الحشرة الجملانة قانصة والبرقة ايضاً .

٢٤٦١٩ - لَبِيَّة (F). *Lippia* (F). هي اللوزة ، نبات من فصيلة رعي الحام ، اطلها .

٢٤٦٢٠ - لَبِيَّةُ الْمَيْسِ (F). *Libythea calcis* (S). *Libythée du micocoulier* (F). *Libythea calcis* (E). حشرة من فصيلة النشاميات ورتبة حرشيات الاجنحة . موطنها معظم الاقاليم الحارة المتفرقة نحو المعتدلة . فرائثها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقتها تدبش على اوراق الانجيريات ونها الميس || جسمها مردني الشكل يطول نحو ١٧ م . بسطتها نحو ٤٦ م . رأسها صغير الجسم . عيناها كبريتان . زبابان صولجانيان . جونها وربطها الى الجوزي الاشتم المراج || درواشها عند الشقن اوراق الجوزي الخطي المراج يطو في الزوج الاسامي تجذيع اكلف وبقتان عاجيتان وخس نقط بيض وسط حشاري افر . ويطو في الزوج الخلفي جده قاطبة عاجية وسط حشطي بين الجدة والطرف || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في اواخر تموز . تسرح في النهار . تماثل بمد ظهورها بنحو ستة اسابيع ويضع المكن مبيحاً على الصفحات

٢٤٦٢٠ - لَبِيَّةُ الْمَيْسِ (F). *Lactée* (F). *Lacteous* (E). ما كان يشبه الحليب او كان تركيبه كالحليب .

٢٤٦٢١ - لَبِيَّة (F). *Libitina* (S). *Libitina* (F). *Libitina* (E). اطاب لكثاريوس .

٢٤٦٢٢ - لَبُون (F). *Fécule* (F). *Faecula* (E). هو نشا البطاطا خاصة والنشا المستخرج من سائر المساقل النشوية المادة .

٢٤٦٢٣ - لَبُون (F). *Libitina* (S). *Libitina* (F). *Libitina* (E). جنس حيوانات بحرية من فصيلة الطيريات ورتبة الرخويات صفحيات الخياشيم والاريل . انواعها المعروفة عديدة اصطناعها بجار البلاد الحارة من العالم القديم . يكثر ويجهوا في البحر الاحمر والخليج الهندي || اسنانها شبه كلوية الشكل ، معتدلة الحجم ، متساوية الصاربع . مثابها صغيرة ، طليقة ، ثنائية || تدبش لاصقة بالصفور المغسورة القليلة المنق . لحياها مأكولة متوسطة الصنف .

٢٤٦٢٤ - لَبُون ، لَبُون ، لَبُون ، لَبُون (F). *Lionne* (F). *She lion* (E). يقال لها البرص ايضاً .

٢٤٦٢٥ - لَبُونَةُ التين * ، شَمْعِيَّةُ التين (F). *Lionne* (F). *She lion* (E). هي الحيوانات اللبونة المعروفة بالثدييات . واحدها لبون .

٢٤٦٢٦ - لَبُونَةُ التين * ، شَمْعِيَّةُ التين (F). *Cerophates rusc*, *C. nerii* (S). *Céropaste du figuier* (F). حشرة من القرمزيات ، موطنها حوض البحر المتوسط . تركيب التين والاس . جسمها كروي الشكل ، اسير اللون ، ظهرها يراوح من ٣ الى ٤ م . فزرها الشمعي جامد التند التمشي الشكل ، ثنائي الصمغاط الطويلة . شمها اريد اللون ينسجي المراج . ذكورها بمنجحة تطول نحو ٢ م . لونها الى البزوة . رواشها حاجية اللون مهدية الخمار .

٢٤٦٢٧ - لَبُونَةُ الْحَمْصِيَّات (F). *Coccus hesperidum*, *Lecanium hesperidum*, *Lecanium tessellatum* (S). *Pou des hesperides*, *Cochénille plate de l'oranger* (F). حشرة صغيرة من القرمزيات ، موطنها جميع مناطق الحمصيات . طولها يراوح من ٣ الى ٤ م . وعرضها من ٢ الى ٣ . وهي بيضية الشكل مفلطحة . طليها الخماري عادم الصلابة . قرونها الاستشعارية ثمانية القواسم . فونها يختلف باختلاف عمرها يعلب في البني والاسمر || تركيب جميع الحمصيات وقد تفصل الاوراق ومن الاوراق اخاديد العروق لا فارق بين الصفحة العليا والسفل || تكاثرها باستمال الزيتون البيضاء او الزيتون النباتية المركزة من ١ الى ٢ ٪ .

٢٤٦٢٨ - لَبُونَةُ الزَيْتُون (F). *Coccus hesperidum*, *Lecanium hesperidum*, *Lecanium tessellatum* (S). *Pou des hesperides*, *Cochénille plate de l'oranger* (F). حشرة صغيرة من القرمزيات ، موطنها جميع مناطق الحمصيات . طولها يراوح من ٣ الى ٤ م . وعرضها من ٢ الى ٣ . وهي بيضية الشكل مفلطحة . طليها الخماري عادم الصلابة . قرونها الاستشعارية ثمانية القواسم . فونها يختلف باختلاف عمرها يعلب في البني والاسمر || تركيب جميع الحمصيات وقد تفصل الاوراق ومن الاوراق اخاديد العروق لا فارق بين الصفحة العليا والسفل || تكاثرها باستمال الزيتون البيضاء او الزيتون النباتية المركزة من ١ الى ٢ ٪ .

٢٤٦٢٩ - لَبُونَةُ الزَيْتُون (F). *Coccus hesperidum*, *Lecanium hesperidum*, *Lecanium tessellatum* (S). *Pou des hesperides*, *Cochénille plate de l'oranger* (F). حشرة صغيرة من القرمزيات ، موطنها جميع مناطق الحمصيات . طولها يراوح من ٣ الى ٤ م . وعرضها من ٢ الى ٣ . وهي بيضية الشكل مفلطحة . طليها الخماري عادم الصلابة . قرونها الاستشعارية ثمانية القواسم . فونها يختلف باختلاف عمرها يعلب في البني والاسمر || تركيب جميع الحمصيات وقد تفصل الاوراق ومن الاوراق اخاديد العروق لا فارق بين الصفحة العليا والسفل || تكاثرها باستمال الزيتون البيضاء او الزيتون النباتية المركزة من ١ الى ٢ ٪ .

٢٤٦٣٠ - لَبُونَةُ الزَيْتُون (F). *Coccus hesperidum*, *Lecanium hesperidum*, *Lecanium tessellatum* (S). *Pou des hesperides*, *Cochénille plate de l'oranger* (F). حشرة صغيرة من القرمزيات ، موطنها جميع مناطق الحمصيات . طولها يراوح من ٣ الى ٤ م . وعرضها من ٢ الى ٣ . وهي بيضية الشكل مفلطحة . طليها الخماري عادم الصلابة . قرونها الاستشعارية ثمانية القواسم . فونها يختلف باختلاف عمرها يعلب في البني والاسمر || تركيب جميع الحمصيات وقد تفصل الاوراق ومن الاوراق اخاديد العروق لا فارق بين الصفحة العليا والسفل || تكاثرها باستمال الزيتون البيضاء او الزيتون النباتية المركزة من ١ الى ٢ ٪ .

٢٤٦٣١ - لَبُونَةُ صَيْبِيَّة * ، شَمْعِيَّةُ الْحَمْصِيَّات (F). *Cerophates sinensis* (S). *Céropaste cireux* (F). حشرة من القرمزيات تركيب الحمصيات حل اختلافها . مهدها الصين وقد انتشرت مع البليون في جميع مناطق زراعتها . وهي صغيرة التند مكررة الجسم طولها يراوح من ٤ الى ٦ م . وعرضها من ٣ الى ٥ . لونها تملو نحو ٤ م . وهي صيرة التاكيل الشائكة . فزرها الشمعي جامد التند ، اثير اللون ، يلكي المراج || جيلها الحولي واحد . الانثى تضع من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ مكنة اطيحية الشكل حقيقية اللون يدك من الموالل تموز الى اواخر آب . يتغذ المكن



لبونة التين



لبونة الحمصيات



لبونة صينية



لية



لبس النيل

البغل من نصال النبات المائل || السرفة تطول نحو ٢٥ سم. جسمها شبه اسطواني الشكل، خلي القشار، كسني القرب، عشاري الاطراف احمر. رأسها الى الجؤرة. رواجها الى السرة السوداء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي في التربة.

٢٤٦٢١ - **ليبيد** هو الكنهان، اطبله.

٢٤٦٢٢ - **ليبيد** Clerge de Notre-Dame (F).

نبات يدهي بوسير لبد، اطبله.

٢٤٦٢٣ - **ليبيد** Molène noire (F).

في البوصير الاسود، اطبله.

٢٤٦٢٤ - **ليبيس** Labeo (S), Labéon (F), Labeo (E).

جس اسماك نهريه من فصيلة الشبقيات. انواعه نحو ٢٠ اصنافها اهر وبجيرات البلاد الحارة من العالم القديم. اجسامها طول من ٢٠ الى ٦٠ سم. اثوابها سوية الالوان. يكثر فيها الاسمر والجؤري البني. جسمها كبيرة الزعانف. اشهرها ليس النيل.

٢٤٦٢٥ - **ليبيس النيل** Labeo niloticus (S).

Labéon du Nil (F).

نوع من اللبس وهو سمكة نهريه تكثر في النيل. جسمها كبير القدر يطول نحو ٦٠ سم. فؤها الى الحفار الاسمر. زعانفها كبيرة حراء اللون. لحمها مأكول متوسط الصنف.

٢٤٦٢٦ - **ليبين** Anagallis (S), Mouron (F).

ويدهي وأناخالس. جس نباتات برية وتربنية، من فصيلة الريميات. انواعه قليلة منها العشبية والخشبية والحوالية والمعمرة. اورثاتها متقابلة أو ضعية. ازهارها جويسية الشكل || احرف انواعه ما ينتج.

٢٤٦٢٧ - **ليبين الماء** Samola (F).

هو السوسل، اطبله.

٢٤٦٢٨ - **ليبين المروج** * زغليكة، حشيشة

الحلمكة، عشبة العنلق

Anagallis arvensis (S), Mouron des champs, M. rouge, Morgeline (F), Red pimpernel, Poorman's weather-glass (E), Roter Gauchheil, Rote Mühsedarm (D), Anagallide, Anagallo (I).

نوع من اللبين الحروي البري المبلول. ساقه جالسة مفصلة تطول نحو ١٥ سم. اورثاتها لائنة متقابلة، نصلها بيضي الشكل صغير القدر. ازهاره حراء اللون زرقاء المواج. وهو يتجن من الاحتباب الضارة للواهب تلفها ان في ازروع ام في الحقائق والمبايق || ازهاره يستمر من ايار الى تشرين.

٢٤٦٢٩ - **ليبين الحيفاب** * Anagallis collina (S).

Mouron des collines (F).

نوع من اللبين التربي المنصر. ساقه خشبية منتصبة تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. اورثاتها السفلى متقابلة، اعليها جة تتصل. اورثاتها ضعية ثنائية التجميع، سنانية النصل الضيق. ازهاره كبيرة القدر ارجوانية اللون || ازهاره يستمر من ايار الى ايلول.

٢٤٦٣٠ - **ليبين ضمي الورق**

Anagallis verticillata (S), Mouron verticillé (F).

نوع من اللبين التربي المنصر. ساقه خشبية منتصبة

٢٤٦٣١ - **ليبين حريف** Anagallis tenella (S).

Mouron mignon (F).

نوع من اللبين البري المنصر، يكثر في المناطق. ساقه منتصبة تطول نحو ١٥ سم. اورثاتها متقابلة متساوية، نصلها مستدير الشكل صغير القدر. ازهاره ودية اللون، مستطيلة الممايق النعيلة || ازهاره يستمر من ايار الى ايلول.

٢٤٦٣٢ - **ليبين مستعرض الورق**

Anagallis latifolia (S), Mouron à larges feuilles (F).

نوع من اللبين المنصر زرع كمزلي. ساقه منتصبة تطول نحو ٣٠ سم. اورثاتها متقابلة متساوية بيضية. نصلها يطول نحو ١٥ سم. ازهاره الى الزرة الازوردية || ازهاره يستمر من جوز الى آب.

٢٤٦٣٣ - **ليبيكة** * في القرب، اطبله.

٢٤٦٣٤ - **ليبيوت** Lepiota (S).

Lépiote (F), Lepiota (E).

جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الفاريفقيات. انواعه المعروفة نحو ١٢. اصنافها بعض اقاليم مناطق البلاد المعتدلة الحارة. تعيش حل المواد النباتية المنحلة في الغابات وفي المواق الرطبة. تتميز ببويها الابيض اللون وبأمراسها الحادة الاطراف الطليقة، ويطوق بكتف اعالي الساق، تحت الاسوية. يكثر بجودها في فصل الحريف || بعض انواعها له ليد العلم مأكول واكثر الامراء كامن الصنف غير مرقوب فيه وبها نوع جمالي المادة يلفي وقد يجت.

٢٤٦٣٥ - **ليبيوت ريكب** * Lepiota rhacodes (S), Lepiota déguanillée (F).

نوع من الليبوت المأكول. يكثر بجوده في حراج الصنوبريات. ساقه معتدلة الارتفاع، مستطيلة القاعدة. اوسرته مظلية الشكل، قطرها نحو ١٥ سم. فؤها الى البني الاحمر يطول موج اصفر عند النضج.

٢٤٦٣٦ - **ليبيوت رفيع** * Lepiota procera (S).

Lépiote élevée (F).

نوع من الليبوت المأكول. يكثر بجوده في حراج الصنوبريات. ساقه رفيعة، مستطيلة القاعدة. اوسرته مظلية الشكل، كبيرة القدر، قطرها يراوح من ١٥ الى ٢٠ سم. فؤها الى البني الباهت العادم الاحمرار.

٢٤٦٣٧ - **ليبيوت زلي البرق** * Lepiota metuespora (S).

Lépiote à spore en outre (F).

نوع من الليبوت الكامن الصنف. يوجد في المواق الرطبة. ساقه رفيعة، معتدلة الضخامة، حطبة اللون. اوسرته شبه مظلية الشكل، قطرها نحو ٦ سم. فؤها الى الغرة، وشامها اصفر البانج. بويها زلي الشكل.

٢٤٦٣٨ - **ليبيوت عادم النفع** * Lepiota naucina (S), Lépiote sans valeur (F).

نوع من الليبوت الكامن الصنف. يكثر بجوده في المراعي.



لين الحيفاب

لين المروج



لين مستعرض الورق



ليوت رفيع

ليوت ريث



ليوت زلي لموج

Latania (S). **٢٤٦٤٥ - لَتَانِيَة * ، لَاتَانِيَا**
 Latanier (F). Fan-palm (E). Latanie, Fächer
 palme (D). Latania (I).

جنس اشجار زراعية من التعلقات اللاتيات. أنواعه ٦
 منها المأكولة الجار والصناعية والزيينية. جذوعها منتصبة
 حلطية. أوراقها حامية مروحية. أزهارها ثنائي المسكن.
 لها مهبل الشكل. جبالها متبورة. أزهارها الذكورية
 منفردة. كورس وتوحيات أزهارها الانثوية ثلاثية الفصل،
 متناكها مهيمة، اسديتها عيطيلة تمد من ١٥ الى ٣٢.
 جميعها من نباتات المناطق الحارة ترطب في الارربة الخفيفة
 المبيقة النور التي لا تتقصها الرطوبة || احرف انواعها
 ما يلي .

٢٤٦٤٦ - لَتَانِيَة امريكيتي
 Latania americana (S). Latanier d'Amérique (F).
 نوع من اللاتانية، منبتها امريكا الوسطى. زرع لاترين
 ويستخرج من أوراقها الياف نسجية صناعية لا بأس بها
 شائعة الاستعمال المحلي .

٢٤٦٤٧ - لَتَانِيَة بوربونيتي
 Latania borbonica (S). Latanier de Bourbon (F).
 نوع من اللاتانية البوربونيتي. زرع في المراكن والحدائق
 التي لا تخش البرد. أوراقها مروحية جميلة انضمار الزاهي،
 تطول وتعرض من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. جريدها ضياع
 الحسف الاخضر اللون || ترطب في الارربة الدبالية
 الحلوارة الممكن دجا .

٢٤٦٤٨ - لَتَانِيَة حمراء
 Latania rubra (S).
 Latanier rouge (F).
 نوع من اللاتانية الزراعية الصناعية، منبتها البلادالاستوائية.
 أوراقها كثيرة اللد تطول وتعرض نحو ٢٠٠ سم. جريدها
 حطلي اللون جوي المراج. حوصها احمر الضلع، اغضر
 الصلصة || يستخرج من أوراقها الياف صناعية شائعة
 الاستعمال .

٢٤٦٤٩ - لَتَانِيَة صينيّة
 Latania sinensis (S).
 Latanier de Chine (F).
 نوع من اللاتانية الزراعية، منبتها الصين تتميز بكثر
 كسائها وكثرة حدها الذي يراوح من ٦ الى ١٠، أما
 متوسط وزن الكساة فنحو ٥٠ كيلو. ثمارها مأكولة وهي
 بيضيه الشكل صفراء اللون ثلثين قدرها قدر اليسر البصر
 أوراقها متوسطة اللد تستعمل في صناعة الحبال وفي بعض
 الانسجة الوطنية .

٢٤٦٥٠ - لَثْرُوس *
 Lethrus (S).
 Lèthre (F). Lethrus (E).
 جنس حشرات من غديات الاجنحة صفيحات القرون
 فضيلة المجلبات. انواعها المرفوقة نحو ٢٠ اصلها تمتد
 من الشرق الاوسط الى اربوة الشرقية والجنوبية. جميعها
 خاضعة راسمة تسرح في الليل || اجسامها شبه بيضيه
 اللون، تطول من ١٨ الى ٢٢ سم. اثنائها الى السواد
 الاصفر او الحلوارة السمراء. رؤوسها كبيرة. تكثيرها
 ضليحة. عيونها صغيرة بارزة. قرونها الاستعمارية
 صفيحات الاطراف. كاسلها عريضة مقعرة المماس
 الراسي جالسة المماس الضلعي، اعادها مستديرة الاطراف
 اللافحة. قوائمها شديدة النشط، متكافئة الملب .

ساقه معتدلة الارتفاع لنوا الى العلطة. ارسوت قلنسوة
 الشكل، قطرها نحو ١٠ سم. لنوا الى العلطة السمراء .

٢٤٦٣٩ - لَبِيُوت مجعد *
 Lepiota cristata (S). Lépiote crépue (F).
 نوع من اللبيوت الجبالي المؤذي. يوجد في الغابات كربه
 الرائحة عند المس. ساقه معتدلة الارتفاع، سمراء اللون،
 طوقها ابيض اللون، اسمر الحافة. ارسوت مجعدة الصلصة،
 مقعرة الوسط، قطرها نحو ٣ سم. لنوا الى السرة يطوها
 تنعيم اسفر .

٢٤٦٤٠ - لَبِيُوت مَرَبَحَر *
 Lepiota hystrix (S). Lépiote hérissée (F).
 نوع من اللبيوت المأكول. يكثر في المواقع الظليلة. ساقه
 مستقيمة، قصيرة، عادمة الطوق. ارسوت شبه
 مخروطية الشكل، مشطلة الصلصة، صغيرة الحجم،
 قطرها نحو ٤ سم. لنوا الى الصفرة الكستنية المولج .

٢٤٦٤١ - لَبِيُوت مُسَج *
 Lepiota excorista (S). Lépiote excoriée (F).
 نوع من اللبيوت المأكول. يوجد في بعض المواقع الرطبة.
 ساقه مستقيمة المقاعدة، مشطلة المت، فبراء اللون.
 ارسوت شبه مظلية الشكل، قطرها نحو ٥ سم. لنوا الى
 الثيرة يطوها تسنج اسمر .

٢٤٦٤٢ - لَبِيُوتات *
 Leblidae (S).
 Leblidés (F). Leblidées (E).
 فصيلة حشرات من رتبة غديات الاجنحة. اجسامها
 وانواعها المرفوقة كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم
 اجسامها صغيرة، مبطلة تطول من ٤ الى ١٢ سم. رؤوسها
 صغيرة. عيونها بارزة. فكثيرها ونكوتها قياسية، عادمة
 الملب. قرونها الاستعمارية عيطية، مركبة من ١١
 فصلة، مهدبة ابتداء من الفصلة الرابعة. كاسلها صغيرة،
 محصورة، يكثر فيها الشكل الخلدوني. اعادها تساجة
 الاغاديدي النحيلة، جميلة الالوان الزاهرة، ارساغ القوام
 الامامية، عند الذكور، مجهزة بصلفين من الهامج ||
 جميعها مقعرة، تطير بحفة وتتقلل حل الارض برشاقة.
 تألف المواقع التي يكثر فيها الارق لاته من فراشها المفضلة ||
 اشهر اجناسها اللبببة واليسيتيسيس .

٢٤٦٤٣ - لَثَات ما قت من قشور اشجر .

٢٤٦٤٤ - لَتَاسَة *
 Latasta (S).
 Latastie (F). Latastia (E).
 جنس حيوانات زحافة بيضيه من المظائيات وفصيلة
 الضبابيات. انواعها المرفوقة اربعة موطها الجزيرة العربية
 وبعض المناطق الافريقية. تألف النكسائي والباري
 والواحاح. قوتها الحشرات والدوبيات والديدان ... ||
 اجسامها مستطيلة. اطوالها تراوح من ٢٧ الى ٣٢ سم.
 رؤوسها اغشية الشكل. قوائمها خاسية الاصابع .
 اذنانها مستطيلة، دقيقة الاطراف. اثنائها الى السرة
 الخنطية او الصهية الصفراء || ذكورها اسمر قفا من
 اثنائها ولم ثودا منها. الاناث تقيم شلقها في الرمل على
 عمق ٤ او ٥ سم. يفتت بعد خسة اصابع عن دوبيات
 نجيحة دقيقة تسمى الى القوت يد التفد بيومن .



لبوت عادم النعج



لبوت مجعد



لبوت مزير



لبوت مسج



لثاسة



لاتانية



تليس



تليس مداد



ثلاثة

٢٤٦٦٠ - ثَلَاثَة مَعْتَبَةِ الْوَرَقِ (F). *Clethra alnifolia* (S).
Clêthre à feuilles d'aune (F).

نوع من الثلاثة وهي جنبة سربوتية تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها مفتحة الشكل طولها من ٨ الى ١٢ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ سم. نصلها بمتر قريب كثير المروغ للثلاثة المتوازية. ازهارها وردية اللون طرية المرف حنقودية التجميع || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

٢٤٦٦١ - ثَلَاثَة مَعْتَبَةِ

Clethra canescens, *C. barbinervis* (S). *Clêthre barbu* (F).

نوع من الثلاثة وهي شجيرة سربوتية تملو من مترين الى ٦ امتار. اوراقها بيضيه مديبة ملتحة كثيرة المروغ للثلاثة الشاركة نصلها خلى الصفحة السفلى، بحري اللون. عتاقده ازهارها حشمية رطلة، ازهارها كبيرة القف يضاء اللون || ازهارها يستمر من آب الى ايلول.

٢٤٦٦٢ - ثَلَاثِيَّات (F). *Clethraces* (S).
Clêthracées (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين، كانوا يسمونها في التصنيف السابق جنساً من فصيلة الخنجيات || انواعها كثيرة العدد، معظمها بري وبعضها تزني. جميعها شجيرات ونباتات. اوراقها متعاقبة، بسيطة، مسنة الحافة. ازهارها حنقودية التجميع او سبلي، طرفي الارزكاز. ازهارها خماسية الفصل والبتلات، عشارية الاسدية، مغلوقة المآبر، مثلثة السيات || اشهر انواعها الثلاثة الزباء والمديبة والشجرة والمفتحة للورق المنثمية.

٢٤٦٦٣ - ثَلَاثَة (F).

Macroglossus (S).

Macroglosse, Roussette klodote (F).

جنس حيوان من فصيلة الروطاطيات. انواعه المعروفة خمسة جميعها يترآه صغيرة القف، طولها من ٦ الى ٧ سم. بسطها من ٢٠ الى ٢٢ سم. انوارها الى الرتبة السوداء. فراطيلها ضيقة، ذلقة، مديبة. السنتها قابلة الانعطاف خارقة الطول || موطنها البلاد الحارة الاسيوية والافريقية. تعيش جماعات قليلة العدد. تألف مجاري الماء والارضية والكهوف والبيوت الخفية. قوتها التار حل اختلاف انواعها.

٢٤٦٦٤ - ثَلَاثَة زَعْفَاء (F).

Macroglosse minime, Roussette klodote minime (F).

Small Reed-bunting (E).

نوع من الثلاث. حيوان ليون ثامر من فصيلة الروطاطيات || جسمها صغير القف، عادم الذنب، يطول نحو ٦ سم. وقيل بسطه نحو ٢٠ سم. قوتها الى الرتبة السوداء السوداء الخواص. رأسها مستعرض القلق، غروطي الشكل. فوطها عريضة، ذلقة، اذنفا صغيرتان، عصبستان، مديبتا الطرف. عيناها مستديرتان كيرتان. قمها كبير الكشف يحوي ٣٤ سنًا. لسنتها خارقة الطول يعمل في طرفه بعض الهامير المماسه || تألف جلود الاثجار والكهوف والمخار والبيوت المهجورة. تعيش جماعات قليلة العدد من الذكور والاناث || سرهما دجوي يستمر من الدغيش الى القفر. نباتات الشوي يستمر نحو ١٢ اسبوعاً. يحل الاثنى يدوم نحو ٣٨ يوماً تقع في تمامه جرواً واحداً يكثي ويضع ويهر بعد الوضع باسبوع ويتلقح بصد امه حتى التظلم، اي نحو سبعة اسابيع || قوتها التار الهامة واخصها السكرية. تعتبر من الروطاطيد المؤذية للصارة.

٢٤٦٥١ - ثَلَاثِيَّات

Drépane (F).

سكة من السحليات مشهورة باسم قتراس، اطلبا.

٢٤٦٥٢ - ثَلَاثِيَّات (F). *Ononis* (S).

جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة التريبات. انواعه عديدة معظمها بري وبعضها طبي وزراعي || اشهر انواعها ما يلي.

٢٤٦٥٣ - ثَلَاثِيَّات الْقَدَمَاء (F).

Ononis antique (F).

هو الشجيرة، اطلب.

٢٤٦٥٤ - ثَلَاثِيَّات مَدَاد (F).

Ononis des champs, Bugrane rampante, Arrêt-bœuf (F).

Rest-harrow (E). *Kriechende Hauhechel* (D).

Bulmacola del campi, Serpeggiante (I).

نوع من التين البري الممر المائل. سكه منبسطة مدادة مستطيلة السلاحيات، كثيرة الجلود المقعدة المشرقة التي تحمل النبات كاشبكة المطروحة الناحية في التربة || يستمر من النباتات الصارة التي تؤذي النبات وتثيق الاعمال الزراعية.

٢٤٦٥٥ - ثَلَاثَة (F).

Suc végétal (F).

Vegetabilia juca (E).

ما يسيل من الشجر من صارة مما كان نوعها.

٢٤٦٥٦ - ثَلَاثَة (F). *Clethra* (S).

جنس نباتات برية ونباتية من فصيلة الخنجيات. انواعه عديدة جميعها شجيرات ونباتات. اوراقها متعاقبة، بسيطة، مسنة الحافة. ازهارها حنقودية او سبلي التجميع طرفي الارزكاز. ازهارها خماسية الفصل والبتلات، عشارية الاسدية، مغلوقة المآبر، مثلثة السيات || اشهر انواعها وانفهرها ما يلي.

٢٤٦٥٧ - ثَلَاثَة زَبَاء (F).

Clethra tomentosa (S).

Clêthre tomenteux (F).

نوع من الثلاثة وهي جنبة سربوتية تملو من مترين الى ٣٠٠ سم. قروصها زياء اللحاء. اوراقها اهليجية ضيقة تطول نحو ١٠ سم. وتعرض ٤، نصلها خلى الصفحة السفلى المخلد للون. ازهارها طرية كبيرة القف سبيلية التجميع || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

٢٤٦٥٨ - ثَلَاثَة مَدْبَجَة (F).

Clethra acuminata (S).

Clêthre acuminé (F).

نوع من الثلاثة وهي شجيرة سربوتية تملو من مترين الى ٩ امتار. اوراقها اهليجية مديبة تطول نحو ٢٠ سم. وتعرض نحو ١٦ سم. نصلها مسن الحافة، اخضر الصفحة العليا، بحري السفلى الخلفية البشرة. ازهارها كبيرة القف، سبيلية التجميع، يضاء اللون || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين.

٢٤٦٥٩ - ثَلَاثَة مَشْجَرَة (F).

Clethra arborea (S).

Clêthre arborescent (F).

نوع من الثلاثة وهي شجيرة تملو من ٤ الى ٦ امتار. اوراقها ابيدة تطول نحو ١٦ سم. وتعرض نحو ٦ سم. نصلها جامد الصفحة، خلى البشرة السفلى الصفراء اللون. ازهارها عاجية، حنقودية صغرية القف لينة || ازهارها يستمر من آب الى تشرين.

٢٤٦٧٢ - لآءة Chelonia (S).

Chelone (F). Chelone, Sea-tortoise (E).
جنس سلاحف بحرية من فصيلة اللجنيات . انواعها عديدة، جميعها كبيرة القد تقدر نحو ٢٠٠ سم . وزن نحو ٥٠٠ كيلو . ذيلها قليل الاحدياب . قترها قرني المادة قياسي الترتيب . قوائمها زيتنية الشكل ثنائية القالب . قوائمها الاحشاب البرية . تبيض عل الشطوط الرملية، لحماها مأكول ويبيضها ايضاً .

٢٤٦٧٣ - لآءة خضراء Chelonia viridis, C. midas (S). Chelone franche, Tortue verte (F). Green tortoise (E).

نوع من اللآءة المأكولة اللحم . تكثر في المحيط الهندي وفي بحر العرب ، طولها نحو المترين ، ذيلها ال الخضار الزيتوني .

٢٤٦٧٤ - لآءة سهفية Chelonia imbricata (S). Chelone imbricque, Caret (F).

نوع من اللآءة المأكولة اللحم المنتشرة في جميع البحار . ذيلها اسمر اللون ، قترها سهي التركيب لؤلؤي الماجة .

٢٤٦٧٥ - لآءة

النسجة التي قل لبها . وقد يكون ذلك عند نتاجها باربعة الشهر . ج . لآءة .

٢٤٦٧٦ - لآءة Abyss (F). Abyss (E).

المنقى البعيد الغور في البحر ، يمتدق من حدود المنطقة الجبية اي عل حق ٥٠٠ م. من سطح الماء وما دون ذلك حتى القعر .

٢٤٦٧٧ - لآءة ملقوسة Ligdia adustata (S). Ligdie aduste (F).

Ligdia adustata (E).

حشرة من اللافيات حشرقيات الاجسنة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط ال اوروبا المعتدلة الحارة . فراشها جارية قوتها رحيق الازهار . سرقها تعيش عل اوراق الخضاص ولقائم ... || جسمها صغير قصيف يطول نحو ٩ سم . بطنها نحو ٢٨ مم . رأسها ال الكسني . عيناها اسطوان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . جوشنها ال الكسني الاسود المواج . بطنها ال الطحلة السمرام المواج || رواشها عند الشقين ال الشبهة الروردة المواج تملوها في الزوج الاسامي بقبضة قاعدية بلون الجرشن وبقبضة بيضاء ورقشة ال الطحلة . وتملوها في الزوج الخلفي رفشة تراوح من الخفي ال الاسمر . اعدائها تبينة اللون || لها جيلون في الجيل . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . تسرح من الصمر ال فسة الليل . ثماغل بد ظهورها بنحو ثلاثة اسابيع وتضع المكن ميسادياً عل الصفحات السفلى من نصال النبات المائل || السرفة تطول نحو ٢٠ مم . جسمها اسطوانى الشكل ، مالمس القشار . ثوبها ال الطحلة الكدراء تملوها رفشة زرقاء قامة . رأسها ال الزرقعة السوداء . مديها ال الخفي الاخير . رواجها البطنية الوسطى ماصحة ما يحملها تنقص عن الانتقال || طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقص ضمن صلجة تحبكهما السرفة في كل مكان .

٢٤٦٦٥ - لآءة Synanthérie, Syngénésie (F).

Syngenesia, Syngenesia (E).
الثآءة حالة الاسبية الملصقة الي اللصقة المأبر .

٢٤٦٦٦ - لآءة الاقائي Astica cracca, Toxocampa cracca (S).

Toxocampe de la vesce craque (F).
Astica cracca (E).

حشرة من النسيقات حشرقيات الاجسنة . موطنها بعض مناطق الشرق الاقصى واروبية الجنوبية والفرية . فراشها جارية قوتها رحيق الازهار . سرقها تعيش عل اوراق الغرنبات القرائية واعصها الاقائي والقصاد || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٠ سم . بطنها نحو ٣٨ مم . رأسها كسني اللون جوي المواج . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . جوشنها وبعثها ال الخفي الاكلس المواج || رواشها الاساميان ال الخفي الاكلس تملو جدة كسنية وبقبضة حلالية سوداء ثم جدة اخرى خضراء . رواشها الخلفيان ال الخفي الاكلس في الزايمين الاول والثاني والى الكسني الاسمر في الزايمين الثالث والرابع || لها جيل واحد في الجيل . تظهر القرائة في تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في الليل . تماغل بد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتضع المكن ميسادياً عل نصال اوراق النبات المائل || السرفة تطول نحو ٢٣ مم . جسمها شبه اسطوانى الشكل ، مالمس القشار ، اخضر اللون ، اطبل المواج تملو خسة خطوط زاروة قاطبة منها خط ثبجي ينتهي عند السكة التاسعة . رأسها ال المغرة القامة . مديها ورواجها ال السرفة || طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقص ضمن صلجة تحبكهما السرفة عل مالمس الاوراق الذاللة القريبة من التربة .

٢٤٦٦٧ - لآءة Rosée du matin (S).

Morning dew (E).
هو الندى وبهم من يقول ما سقط آخر الليل ، وما الذي يسقط اوله فهو الندى . ويقال يوم لآءة اذا كان ساكن الريح كثير الندى .

٢٤٦٦٨ - لآءة Recueillir un suc (F).

To gather a juice (E).
لثي ولأني واتش : استنظر حصاره الازهار من صلبها وصنع وما اشبه .

٢٤٦٦٩ - لآءة ، صامع Gommeux (F).

Gummos (E).
ما كان صمغي المادة او كانت تملو مادة صمغية .

٢٤٦٧٠ - لآءة ، مكنود Synanthérique (F).

Syngenetis (E).
اللقيد من النبات ما كانت مأبر ازهاره ملصقة . ومن الازهار ما كانت مأبرها ملصقة .

٢٤٦٧١ - لآءة Syanthères (F).

Syngénésie (F). Syngenesia (E).
فصلية نباتية من ذوات الفلقتين وسيدة القاعة سفلية الاسبية الملصقة المأبر . كائنا ، فيا معنى ، يمترونها صارة من فصيلة المركبات .



لآءة الاقائي



لآءة خضراء



لآءة سهفية



لآءة ملقوسة



لجديدوم



لحانة دجوة



لحاح



لحاح أحمر

الجسم . جواميزها الاسابية قصيرة والحلقية طويلة جميعها رباعية الاصابع . وبر فراخها كثيف التجميع نام الملس ابيض القاعده اسهب الجسم صتاني الطرف || قوتها اقشاب والجلود والحلاب . اناتها تضع من ٤ الى ٦ ادراس على ثلاث مرات في السنة || انواعها اثنان :

Lagidium pallipes (S).
Lagidium à pieds pâles (F).
Lagidium persuanum (S).
Lagidium du Pérou (F).

لجديدوم البرو

Ecorce (F). Bark, Strip (E).
الحاء برجه عام هو قشر العود واللصن والساق. وللحاء من الوجهة النباتية هو احد النسيج الثلاثة التي تتكون منها الخرم الحولية . وهو يتكون من نسيجه غربالية تمر بها المواد الغذائية ومن جيوب خلوية تخزن بعض المواد . وللحاء جسموري يأتي بين القشرة والشكير وهو يغلث النسيج القلبية التي تلصق الشكير.

٢٤٩٩٦ - لحانة دجوة *

Nomophila noctuella (S). Nomophila nocturna.
Taigne nocturna (F). Nomophila noctuella (E).
حشرة من فصيلة التاربات حرشيات الاجنحة . موطنها المناطق المعتدلة الحارة في جميع اقطار العالم . فراشتها رسالة قوتها رديم الازهار . سرعتها خاضعة تميش فمن عهد سريري النسيج على الارواك التي تلامس التربة من التصيليات والمركبات والقربيات || جسمها يطول من ١١ الى ١٢ سم . يشكها ازواج من ٢٢ الى ٢٤ سم . واسها شبه مكور الشكل . صتاها صغرتان ، ناشتزان ، زباناها خيطان . ملاسها صغيرة . مرشفا مستدل الطول . جوشها وبطنها الى الكسني || رواشها الى الصتاني تملوها ، في الزوج الاسامي ، رشفة وزرا كش كسنية تمتد من القاعده الى الحمار الحاربي || لها جميل واحد في الحيل . تظهر للفرافة في نيسان ويقي حتى تشرين الاول . تسرح وتتجول في الليل || طويها الفواشي يستمر نحو سبعة اشهر تماثل في حاله نحو ست مرات . والاقي تلقى المكان بعد كل طرة زنيا شعية السعد تغلفها مادة خروية كتشبا حل الصفحات السفلى من تصال الدواك التي تلامس التربة || الطور الاسرمي يستمر من ثمانية اسابيع الى عشرين اسبعا لانه متولد بموالم البيت والحارة والاختلاء . السرة عند الادراك اتام تطول نحو ١٤ سم . جسمها اسطواني الشكل ، حطلي القون ، جسم المواج . رأسها كسني اللين . مدنها ورواشها الى الخنطي || طور الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع يتقضي فمن حلبة تتسجها للسرقة تحت الاجلثة او بين اريويات النباتات .

٢٤٩٩٧ - لحاح

Pointe (F). Tip (E).
لحاح الرشفة : اسفلها الابيض .
Protogénie (F). Protogyny (E).
الحلب هو ادراكه اعضاء التماسل الانثوية في الزمرة قبل ادراكه الاعضاء الذكرية .

Ecorcer (F).
To strip, To bark (E).
لحت التقشير : قشره .

٢٤٧٠٠ - لحنكاه
Chalcide (F).
هي الحلكة ، دودية تفوس في البريل ، الحلبا .

٢٤٧٠١ - قشوان الحيمال

Cnicus acarus, Picnomon scarra (S). Chardon acanthin (F). Cnicus, Thistle, Weltd thistle (E). Schöne Distel, Sperrdistel, Stacheldistel (D). Cardo acantino, Scardaccone (I).
نبات حشبي بري حولي شائك من فصيلة المركبات يكثر في الاراضي البرو وصل جوانب القراوات ويصعب من النباتات الضارة اذا كثر في الزروع .

٢٤٧٠٢ - قشوان

Apogon (S).
Apogon (F). Apogon (E).
جنس سمك بحرية من فصيلة الفرغيات شائكات الزعانف . انواعه المعروفة ثلاثة اصنافها بحار البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها احليلجية الشكل تطول من ١٠ الى ٢٠ سم . اوقها مختلفة الالوان . رؤوسها معتدلة الحجم ، قصيرة الخطم . اشداقها واسعة مغنرية . عيونها معتدلة القد ، مستديرة ، ماعحة . زعانفها الظهرية الثتان . زعانفها الذيلية غائرة || اشهر انواعه الصلح الاحمر .

٢٤٧٠٣ - قشوان احمر *

Apogon ruber, بوزباشي
Ap. imbarbis (S). Apogon rouge, Ap. commun, Roi des rouges (F). Apogon ruber (E).
نوع من الصلح . سمكة بحرية يبيض من فصيلة الفرغيات . اصنافها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط . مسرحها الخفاف الصخرية والاشفاف || جسمها احليلجي الشكل يطول نحو ١٥ سم . حرافها كبيرة . ثوبها الى الحمرة يعلوها تنقيب اسود . زعانفها حمراء اللين . رأسها معتدل الحجم ، ربيع المقدم ، قصير الخطم . شفها واسع الانفتاح استأنتها صغيرة ، ممرامة ، ذرية . زعانفها الظهرية اثنان . زعنفتها الذيلية غائرة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٤٧٠٤ - لحم ، لحم

Vlande (F). Meut (E).
هو النسيج العضلي في الحيران والطيور وهو من الاطعمة الهامة المفيدة لاستهلاكه حل نسبة كبيرة من المواد الغذائية تلخص متوسطها في الجدول التالي :

نوع للحوم	ماء	مواد اذوية	مواد دهنية	مواد معدنية
ايقار عادية	٧٦,٣٧	٢٠,٧١	١,٧٤	١,١٨
ايقار مسمة	٥٣,٠٥	١٦,٧٥	٢٨,٢٨	٠,٩٢
صجل عادية	٧٨,٨٤	١٩,٨٦	٠,٨٢	٠,٥٠
صجل مسمة	٧٢,٣١	١٨,٨٨	٧,٤١	١,٣٣
قم حادي	٧٥,٦٨	٢٠,٨٢	٢,٣٥	١,١٥
قم مسمن	٥٣,٣١	١٦,٦٢	٢٨,٦١	٠,٩٢
خنزير مسمة	٤٧,٤١	١٤,٥٤	٣٧,٣٤	٠,٧٢

أما بيان المواد المعدنية المذكورة في الحانة الاخرى من هذا الجدول فهو التالي :

حامض فسفوري	٠,٥٠ %
كلور	٠,١٠ %
بوتاس	٠,٥٠ %
صودا	٠,١٠ %

اسمر ، يهلك الى الصفار الاخير . طبائته صغيرة دقيقة
اربع منها تحلّي الفلك الاحل ولثنتان في الفلك الاسفل .
لحمه لذيق الطعم مرغوب فيه .

كلس ٠٠٠١ %
مغنيزيا ٠٠٠٤ %
اكسيد الحديد ٠٠٠٥ %



نُحْم القندران

٢٤٧١٩ - نُحْم شائك
Cobitis taenia (S).
Loche épineuse, *Lo de rivière* (F). *Groundling* (E).
نوع من النُحْم ، يعيش في المياه النهرية الراكمة . جسمه
يطول من ١٠ الى ١٢ سم . وهو مبسط الشكل متراكب
الاركان والقائفة والمائلة . طبائته ست تحلّي الفلك الاعلى
دون سواه . لحمه متوسط الصنف مأكول .

٢٤٧٠٥ - نُحْمُوم
Omophage (F). *Omophagous* (E).
أكل اللحم النُحْم .

٢٤٧٠٦ - نُحْمِي
Ganache (F). *Lower jaw* (E).
رماحي احياء شيبتا فلك القنرس والبلبل والحارجل...

٢٤٧٠٧ - نُحْمِيَّة التَّيْس
Salsifis des prés (F).
هو سلسفيل المَرَج ، اطليه . قال الانطاكي : « هو
الموسطيداس نبت كوروك الكركاك لكن لا يرتفع حفص
حاد الزائفة يقطع الاسهال والزفد وقروح الرئة والقصور » .

٢٤٧٠٨ - نُحْمِيَّة الحِمَار
هي كزيرة الير ، اطليا .

٢٤٧٠٩ - نُحْمِيَّة اَحْيِيَّة
هي ذئب احية ، اطليا .

٢٤٧١٠ - نُحْمِيَّة العُتْر
هي الشنداب البحري ، اطليه .

٢٤٧١١ - نُحْمِيَّة العُكْل
هي اللقيا ، اطليا .

٢٤٧١٢ - نُحْمِيَّة
Volva, *Volve* (F). *Skin* (E).
هي غشاء الفطر ، شفاء شفاف ناعم لا ينامي قوئل .

٢٤٧١٣ - نُحْمِيَّات الأُنْس
Crassilinguae (F).
زئبية من العظائيات تشمل بعض الفصائل . تتميز بالسنبا
للحمية السمكة القصيرة وغير الاخذة .

٢٤٧١٤ - نُحْمِيَّس
قال الانطاكي : « النُحْمِيَّس نبت بري وجبلي يرتفع نحو
ذراع له حب اسود مر الطعم في جسم العنيس ينفع من
السوم خصوصا المقرب ويحلل الرياح الغليظة وينفع
السدد ويزيد الفواق واليرقان وشرهته مثقال » .

٢٤٧١٥ - نُحْم
Loch (F). *Log* (E).
مقياس سرعة السفن .

٢٤٧١٦ - نُحْم ، كُيْت
Cobitis (S).
Loche (F). *Loach* (E).
جنس اسماك نهرية من الشبوطيات الليئات الرضائف . انواعه
المعروفة قليلة . اصطلحوا مياه البلاد الممتدة . اجسامها
ضيقة مستطيلة . تتميز بكثرة طبائتها واسنانها الجلموية ،
بغير فلولها وضيق خياشيمها مما يجعلها ترأود سطح الماء
كثيرا || احرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٤٧١٧ - نُحْم القُذْرَان
Cobitis fossilis, *Misgurnus fossilis* (S). *Loche d'é-*
tang, *Misgurne* (F).
نوع من النُحْم ، يعيش في سهل البعيرات والقندران . جسمه
يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . ثوبه الى الكهبة للبراء يعمل
حل جانبيه سلطان اسودان قاطبان . طبائته ١٠ ، ست
منها في الفلك الاعلى واربعة في الفلك الاسفل ، لحمه متوسط
الصنف مأكول .

٢٤٧١٨ - نُحْم حُر
Cobitis barbatula (S).
Loche franche, *Dormille*, *Moutaille*, *Motelle* (F).
Rock-ling (E).
نوع من النُحْم ، يعيش في الانهر والبعيرات والقندران . جسمه
يطول من ١٠ الى ١٥ سم . ثوبه الى الكهبة بملوحا ترويح

٢٤٧٢٠ - نُحْمِيَّة
Livistona (S).
Livistone, *Rondier* (F). *Fan-palm* (E). *Echte Schirm-*
palm (D). *Palma di cappelli* (I).
جنس اشجار ليفية صناعية وزيتونية من فصيلة النخلات .
مهلها المناطق الحارة والاستوائية . انواعها عديدة جميعها
رفيفة الجذع الجالس في اقاليمها الطبيعية ، قصيرته في
الاقليم المعتدلة ، اوراقها تشتمل في عدة صناعاات اصغرها
صناعة القبعات والسائر . الواحدة تحبة || اشهر انواعها
الزيتونية ما يلي .

٢٤٧٢١ - نُحْمِيَّة
Intensifier (F).
To Intensity (E).
استعمل ضمن الطرق لاكثر الانتاج .

٢٤٧٢٢ - نُحْمِيَّة اَنْدُويزِيَّة *
Livistona hoogendorpii (S). *Livistona de Hoogen-*
dorp (F).
نوع من النُحْم الزيتوني يزرع في المراكن والحدائق . اوراقه
مستديرة ، جرائدها شائكة تطول من ٨٠ الى ١٢٠ سم .
غوصها مخروطي الشكل ، خالي او سبامي الانشباب وهو
جامد الصفة اخضر اللون اصفر اللولج .

٢٤٧٢٣ - نُحْمِيَّة زَيْتُونِيَّة التَّحْمَر *
Livistona olivaeformis (S). *Livistone à fruits en*
olive (F).
نوع من النُحْم الزيتوني يزرع في المراكن والحدائق .
اوراقه كلوية الشكل تطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم . جرائدها
شائكة جسمها احمر اللون ، متبادد الاركان . غوصها حاقب
الانصراف حجب الاطراف . ثمارها زيتونية الشكل ولقده .

٢٤٧٢٤ - نُحْمِيَّة مُخْمَشِيَّة
Livistona humilis (S). *Livistone bas* (F).
نوع من النُحْم الزيتوني يزرع في المراكن والحدائق .
اوراقه قليلة الشكل تطول نحو ٩٠ سم . جرائدها سرسة .
غوصها ضيق الصفة جميل الحصار الزاهي وهو ذرب الزام
الاخير ، حاد الحمة .

٢٤٧٢٥ - نُحْمِيَّة مُشَدِيدِيَّة الْوَرَق *
Livistona rotundifolia (S). *Livistone Birco* (F).
نوع من النُحْم الزيتوني والصناعي . اوراقه كبيرة القذ
مستديرة الشكل قطرها يراوح من ١٠٠ الى ١٥٠ سم .
جرائدها سرسة تطول نحو ٢٠٠ سم . غوصها شديد الحصار
المابن يطول من ٥٠ الى ٧٥ سم .

٢٤٧٢٦ - نُحْم ، نُحْم
Requin (E). *Shark* (E).
هو القنرس ، حيوان بحري جصور ، اطليه .



نُحْمِيَّة اَنْدُويزِيَّة



نُحْمِيَّة زَيْتُونِيَّة التَّحْمَر



نُحْمِيَّة مُشَدِيدِيَّة الْوَرَق

٢٤٧٢٧ - لحم أبيض

Carcharodon carcharias (S). Requin blanc (F). White shark (E).

سمكة بحرية ولبد مفترسة من فصيلة الحشيات. أعضائها معظم بحار المناطق المعتدلة الحرارة أعضائها المحيط الأطلسي. مسرحها البحري يمتد من ليتوانيا إلى جنوب غرب أفريقيا. وتؤاكل السفن || جسمها كبير القد، وشي الشكل، بطول نحو ١٢ مترًا. ثورجا إلى الزرقاء البحرية البيضاء المروج. بطنها أبيض من ظهرها. رأسها مخروطي الشكل. عظمها شارب. لها لاسم مستعرض الشكل الكبير. أسنانها مثلثة الرؤوس الحادة. زعنفتها الظهرية الامامية كبيرة الحجم مقعرة الشكل. زعنفتها الذيلية حلالية الشكل مستطيلة || تتميز بالثمن وبشدة البطش. قوتها كل ما استطاعت من الأسماك والحيات || أناثها معتدلة التناثر. تضع في كل مرة ٤ بين أوائل حزيران وأواخر تموز نحو ٤٠ مجراً.



لحم الأسماك المشوية

٢٤٧٢٨ - لحم سمكة

Alopias vulpis (S). Requin renard, Renard (F). Fox shark, Thresher (E).

سمكة بحرية ولبد مفترسة من فصيلة الحشيات. أعضائها معظم بحار العالم أعضائها المحيط الأطلسي || مسرحها يمتد من المحيط الهندي إلى المحيط الأطلسي والاقتراب من الجاهج عند مطاريتها اسراب الرنكة والسريدن والاسقمري || جسمها وشي الشكل، كبير القد بطول من ٤ إلى ٦ أمتار. ثورجا إلى المنطقة الزرقاء المائج يمتد في الظهر ويتضي في البطن. رأسها مخروطي. عظمها شارب. لها لاسم مستعرض الشكل. أسنانها مثلثة الرؤوس الحادة. تتميز بزعنفتها الذيلية الكبيرة التضخضا التي يبلغ طولها طول الجسم والرأس معاً || أناثها معتدلة التناثر تضع في كل مرة ٤ بين أوائل أيار وأواخر حزيران نحو ٣٠ مجراً.

٢٤٧٢٩ - لحم سمكة

Lamnidae (S). *Lamnidae* (F). *Lamnidae* (E).

فصيلة أسماك بحرية ولبد مفترسة من السفنقيات ورقية الاضلاع. أجناسها وأنواعها المعروفة نحو عشرة. أعضائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || مسرحها يمتد من غربي وسطى || جميعها كبيرة الاجسام الوشيية الشكل. تتميز بشدة بطشها وثمنها وبأسنانها المثلثة الرؤوس الحادة وبالفتحات الجسدية الكبير بين زعنفتها الظهرية || أشهر أنواعها اللحم الأبيض والقمح الصليبي والخلخال والياهي.

٢٤٧٣٠ - لحم سمكة

جلس فلور مجهرية من الزهرقيات وفصيلة الحشريات. تتميز ببدائته النطيفة الكبيرة القمية الشكل. تكاته مخروطية متشعبة متشابكة القمة، بوجه ثنائي أو شمالي التركيب. يركب غثفل الاجناس النباتية || أشهر أنواعها وأصغرها البانية مشر التالية.



لحم الاكيدنيا

وذيل النولي وانتشار لحاء الافناد والافناد وعفن الثآر وتجنيلها || مظهره الخارجي: يبدو على التفاح والاجاص والسفرجل ذبول طارئ يصيب الثورجا أو بعض ازهارها فيصلصها ثم يركب الوراق القريبة منها وينتقل إلى الفين والفتد فيلوي الاول بعد ان يوشم الثاني يقع غنية تقضي على التسج المصابة وتسبب انتشار لحائها || ويكون على الفوخ والدراق واللوز والمشمش ذبول فجائي يمل بأوراق النولي فيذبلها ويصيب اقرب الوراق من الوراق فيقضي عليها ثم ينتقل إلى الافناد فيفقرها ويصيب انتشار لحائها. أما الثآر فانه يقتضيها على فتمتين الاول عند الاعتقاد، على اثر سقوط البتلات، فيلويها. والثانية قرب الادراك فيوشها بحرصاته الحشلية الحطية التي تعطب القشرة وتعميها بعد أن تسبب عفاها ويغني لها || وهو على الكرز ورم يصيب النور قبل انبلاج الزهر فيقضي على البتلات والبيجان والآن والوراق والافناد، والبسوة تلو الآخر. كما وانه يصيب الثآر عند ادراكها فيعطيها ويفعل فيها قله يثار الفوخ والمشمش والدراق || يكافح اولاً في فصل الشتاء، من كانون إلى شباط، يقطع جميع الاعضاء الموسومة وسرقها وينسخ الاجزاء بلوب ملح الصودا المحلول ١٪ والمصابا اليه ١٪ من الصابون الخالي من البوتاس. ثم تضعف الاجزاء مرة ثانية خلال شهر آذار أي قبل الاكاح يسائل بورود المحلول من ٠.٨ إلى ٢٪. بالنسبة إلى نوع الاجزاء والى ظروفها الخاصة، ومن الواجب ايضاً تقصنها مرة ثالثة توماً بعد المقد.

٢٤٧٣١ - لحم الكبدية

Sclerotinia mespili (S). Maladie du dessèchement des pouses de néflier (F).

فطر مجهرى يصيب الاكيدنيا في تونسبا وإزمارها واوراقها وقمارها الفتية || مظهره الخارجي حفن أصهب اللون كثيف العرصات يركب النولي فيلويها ويؤثر نموها ويركب الاثمار فيصيب سقوطها ويصيب الوراق تنحيف وتسرر ابتداء من صيفها بعد أن تكتسب راحة عطرية مستحبة. وإذا سطا على الثآر بقودها إلى اليباس بعد جفاف قشورها || يكافح باستعمال سائل بورود المحلول ١٪ بعد قطع الاعضاء الموبدة وسرقها.

٢٤٧٣٢ - لحم البقر

Sclerotinia pruni-spinosa (S). Rot-brun des prunelles (F).

فطر مجهرى يصيب الثآر والافناد فيسقطها بطفه التني اللون الذي يسبب اضرارها بكاملها أو بجزء منها. وهو حل الافناد حفن اثير ثم اسمر يطب اللحاء ويصيب اليباس || يكافح كثيره من اللخن.

٢٤٧٣٤ - لحم البقر

فطر مجهرى ينشط ويتكاثر في البيئة الرطبة الباردة التي تراوح حرارتها من ٢ إلى ١٠ درجات. يصيب حدة بقول أعضائها الحليين والجزر والكرفس واللوبيا والخس والبندورة والفطرطوف ... || مظهره الخارجي يقع غنية لبد صغيرة مستديرة تركب مختلف اعضاء النبات فتسقطها ببشور سود بعد أن تشل فيها الحركة اللغنية التي تسبب الذبول الذي يقضي اليباس || لم يكافح حتى الآن. ننصح باحتجاب زراعة البقول المعروضة لهذا الفطر في المواسم الرطبة الباردة.

٢٤٧٣١ - لحم الأشجار المثمرة

لحم سكرية - سكرية - سكرية

Sclerotinia laxa, *S. cinerea*, *S. oregonensis*, *Monilia laxa*, *M. cinerea* (S). Rot-brun des arbres fruitiers, Monilia (F). Blossom blight (E). Monilia-spitzendürre (D).

فطر مجهرى يركب التفاح والاجاص والسفرجل والكرز والفوخ والدراق واللوز والمشمش فيصيب اعلاص الازهار

حقن المحلول خلي يعلو الثَّابَ عت ابتداء الاوراق فيستقبلها برصاتها ثم يركب التواشي والاوراق الفنية والانتان فيؤذيها بعد ان يحول دون نموها || يكافح كاستنة لحن الثَّابَ .

٢٤٧٤٢ - لَحْنُ السُّوسَنِ

Sclerotinia convulsa, *Botrytis convulsa* (S).
فطر مجهرى يفتك بجذامير السوسن . مظهره الخارجى يقع غنية حنطية اللون زغبية ، تركب الجذامير المغلفة وفي الثَّابَ تنطفيها وتلفها || يكافح بتطهير الجذامير المغلفة بالفريول وبالملاح الزئبق .

٢٤٧٤٣ - لَحْنُ الشَّيْثِ

Sclerotinia temulenta, *S. secalicola*, *Stromatinia temulenta*, *Phiala temulenta*, *Endoconidium temulentum* (S). *Maladie du seigle envirant* (F).

فطر مجهرى يصيب حب الشيلم وحب بعض التصيليات العلفية والبرية || مظهره الخارجى استطالة في الحب وتخليده يعقبها انحلال وتآكل المادة النشوية || اكل الحب المبرود وحقنه يسيب في الانسان والحيوان مسا يسيب الزرآن من عوارض استرخاء ويسير || يكافح بانتقاء البذار السليم او بغير الحب مدة ٣٠ دقيقة بالماء الساخن البالغة حرارته ٥٠ درجة ستفرد .

٢٤٧٤٤ - لَحْنُ العَقْرِ * ، عَقْنُ أَشْهَبَ ، عَقْنُ عَنَكَبُوتٍ

Sclerotinia fuckelliana, *Botrytis cinerea*, *B. vera*, *Polystictus cinerea*, *P. vera*, *Sclerotium durum*, *S. echinatum* (S). *Pourriture grise*, *Pourriture noble*, *Maladie de la colle* (F). *Gray mould* (E). *Botrytis-flûle*, *Graufûle* (D).

فطر مجهرى يركب جميع الاغصاء الخشبية الثابتة من الساق الى الثَّابَ كما وانه يركب المواد العضوية على سطح التربة فيفسدها برصاتها واصهاته التي تشبه نواس العنكبوت . مظهره الخارجى يختلف مع النبات المنضار . يبدو غالباً بشكل ونية جامدة طحلاء اللون او حنطية تكتنف النبات . هو في الكربة يقع غنية زغبية طحلاء اللون تركب السروع القريبة من التربة وتركب حب التعلية فخطه وتذله . وهو في الاجاص يقع غنية متتابعة قدية الشكل تركب الافناد فتؤذيها ونحياً || ويركب الثين في اغصانه فيسبب يباسها وذبول الثَّابَ ويطافها || ويصيب النبات في المشاتل فيفشي على الشتول الفنية من اي نوع كانت || يكافح بتطهير التربة وباستعمال احسد العلاجات الاقتصادية الزغبية الثين .

٢٤٧٤٥ - لَحْنُ القَرْنَبَاتِ

Sclerotinia ciborioides, *S. triflorum* (S). *Maladie à sclérotine des légumineuses* (F). *Stem rot, Wilt of clover and alfalfa* (E). *Kleekrebs* (D).

فطر مجهرى يركب بعض النباتات القرنية الحولية انحصها القنول والبقالة والبرسيم || مظهره الخارجى يقع غنية مبترنة تركب نصل الاوراق ثم تنتشر تصطب كامل النصل والمحلل وتنت الى السوق فتذبلها وتلويها بعد ان تنطفيها وبشاح من المعن الابيض الذي ينشئ النبات والبرية || يحسن تخفيض التربة الكوم لصراف الماء انصار واجتباب الزراعة في الارربة الرطبة القوية الانفساج .

٢٤٧٤٦ - لَحْنُ الْكَسْتَنَةِ * ، قَرُوم

Sclerotinia pseudo-tuberosa, *Rhacodially castaneae*, *Harziella castaneae* (S). *Pourriture noire des châtaignes* (F).

فطر مجهرى يصيب ثمار الكستنة فحبها ويقضي عليها . مظهره الخارجى لطحه طحلاء او سمر اللون تملو القشرة

٢٤٧٤٥ - لَحْنُ الثَّيْبِ

Sclerotinia nicotianae (S). *Maladie à sclérotine du tabac* (F).

فطر مجهرى يصيب الثيب في سوقه واوراته . يبدو على السوق لطح سمر طحلاء نحو ١٠ سم . برصها ٦ . وهو على الاوراق يقع صغيرة لا قياسية الشكل والحجم تبدو كالشوبر الحنطية اللون الى ان تركبها حمرات العفن الحامل الاخير || اصرار زغبية لا تستويب الناية لان انتشاره منوط بكثرة الرطوبة الحقيقية وبشدة البرد .

٢٤٧٤٦ - لَحْنُ الثَّمَارِ * ، مَوَلِبِيَّة

Sclerotinia fructigena, *S. coryli*, *Monilia fructigena*, *Monilia fructigena* (S). *Rot-brun des arbres fruitiers à pépins* (F). *Brown rot* (E). *Monilia-fruchtfäule*, *Polsterschimmel* (D).

فطر مجهرى يصيب الاجار وثمار التفاح والاجاص والسفرجل والا كيديا وقد شوهد في ظروف خاصة على ثمار الكرز والخوخ والمشمش والذراق || يصيب في بادئ امره بتلات الانزاد ويتجابهها وانها ثم يمتد الى الانتان فيعطب اللحاء والارضية ويشل الحركة النسبية بعد ان يمتد الى الاغصاء المصابة وبشاح من حمرات المعن الحامل الاخطر || وقد يصيب الثَّابَ في مختلف ادوارها الحياتية فيعطبها بعد ان يكتشف كامل برصها || يكافح اولاً بقطع وحرق الاغصاء المعطوبة والثَّابَ المصابة المخطئة . ثم باستعمال سائل يوريد المحلول ١٪ الى اثر سقوط بتلات الزهر . وينتفع الاجار مرة ثانية بذات السائل وذات المعدل عندما تصبح الثَّابَ في نصف حبسها او في ثلثها .

٢٤٧٤٧ - لَحْنُ القَرُومِ

Sclerotinia porri (S).
فطر مجهرى يركب اوراق القوم فيؤذيها ويؤخر نموها . مظهره الخارجى يقع يبرص ثم سمر صار مستديرة تركب النصل فتشل نشاطه وتؤخر نموه .

٢٤٧٤٨ - لَحْنُ الْجَوْتُونِ * ، عُرْطُورُ الْجَوْتُونِ

Sclerotinia bulborum (S). *Morve de la jacinthe* (F).
فطر مجهرى يركب بصل الجون والاشقريل والزرعفران . مظهره الخارجى اصفراد وذبول يعلان بالاوراق لود سطوح الشراخ الزهري . ثم بدو لبد لا قياسية الحجم والشكل سمر الغلاف يبرص الداخل تركب اسطاف البصل فتضها وتبرها || يكافح بانتلاج البصل المبرود منه ظهور الوسم ويظهره التربة بالفريول .

٢٤٧٤٩ - لَحْنُ الدَّكْبُوسِ

Sclerotinia draytoni (S).

فطر مجهرى يصيب البصل المحفوظ ويتنقل معه الى التربة . مظهره الخارجى يقع غنية حنطية زغبية متراصة تركب اسطاف البصل وانقارصا تنطفيها وتبرها || يكافح بتطهير البصل عند حطه وقبل زهره بالفريول وبالملاح الزئبق .

٢٤٧٤٠ - لَحْنُ الزُّعْرُورِ

Sclerotinia crataegi, *Monilia crataegi* (S).

فطر مجهرى يركب الاوراق فيؤذيها ويصيب الثَّابَ فيلويها او يحول دون نموها || يكافح كثيره من اللحن .

٢٤٧٤١ - لَحْنُ السَّرَجَلِ

Sclerotinia linhartiana, *S. cydoniae*, *Monilia linhartiana*, *Monilia necans* (S). *Maladie du dessèchement des jeunes coings* (F).

فطر مجهرى يركب الثَّابَ في اكل حبهما فيسبب اتلاها ويركب الاوراق والانتان فيؤذيها || مظهره الخارجى



لحن الثَّابَ



لحن المعن

لحمه يحوي بعض المواد السامة المؤذية. وقد يكون السبب مرضي المرجان.

Lychnis (S).

Lychnis, Lychnide (F). Campion, Lampflower, Maltese cross (E). Lichtenke, Marienröslein, Pechnelke (D). Licnide, Croce di Malta (I).

جنس نباتات عشبية من فصيلة القرنفليات. أنواعه نحو ٣٠، منها الحولية والمعمرة. أوراقها متعاقبة بيضية أو سانية النصل. أزهارها كبيرة القد جميلة الشكل لا قياسية التجميع والارتكاز يكثر لها الاحمر والأبيض والوروش. أعرف أنواعه وأشهرها ما يلي.

٢٤٧٣ - لُغْنِيسٌ أَرْجَوَانِيٌّ، لُغْنِيسٌ سَاطِعٌ

Lychnis fulgens (S). Lychnide éclatante (F).

نوع من اللغْنِيس وهو عشبة معمرة وريضة الساق تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. أوراقها لاطئة سانية، نصلها مسن الحافة أنفب البُرشة. أزهارها متكوية التجميع، حامية الارتكاز، بتلاتها أرجوانية اللون، رباعية التجميع. أزهاره يستمر من حزيران إلى آب.

٢٤٧٤ - لُغْنِيسُ الْحِدَالِقِ، لُغْنِيسٌ مَنفُورِيٌّ

Lychnis coronaria (S). Lychnide coronaire, Agrostemma coronaria, Coquelourde des jardins, Celliet de Dieu, Passe-flur (F).

نوع من اللغْنِيس الزينة وهو عشبة معمرة زياه تملو من ٤٠ إلى ٩٠ سم. أوراقها بيضية لسنة. نصلها خلي البُرشة حل صفحتيه. أزهارها مستطيلة الاضلع كثيرة العدد. بتلاتها قليلة التشرع عديدة الألوان التي تختلف باختلاف الفصرب. أزهاره يستمر من ايار إلى تموز.

٢٤٧٥ - لُغْنِيسُ الشَّرْقِ الْأَدْنَى، لُغْنِيسُ

Lychnis chalcadonica (S). عسكندرية

Lychnide de Chalcadonia, Croix de Jérusalem, Croix de Malte (F).

نوع من اللغْنِيس وهو عشبة معمرة تملو من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. خروبه الزراعية عديدة. سوقها وأوراقها مزينة. أوراقها لاطئة بيضية، نصلها مسن الحافة اصفر الخضار. أزهارها مختلفة الألوان، ضمية التجميع، حامية الارتكاز، منها المكبسة والمعادية؛ بتلاتها مقعرة تبدو كالصليب بما جعلهم يدعونها صليب القدس أو صليب ماله. أزهاره يستمر من حزيران إلى تموز.

٢٤٧٦ - لُغْنِيسُ الشُّشْرِيِّ

Lychnis flos-jovis (S). Lychnide fleur de Jupiter, Coquelourde fleur de Jupiter, Ciel de Dieu, Fleur de Jupiter (F).

نوع من اللغْنِيس الزينة وهو عشبة زياه معمرة وريضة الساق تملو من ٣٠ إلى ٤٠ سم. أوراقها لسنة، نصلها خلي البُرشة. أزهارها كبيرة القد، بتلاتها ثنائية التجميع قرمزية اللون. أزهاره يستمر من حزيران إلى تموز.

٢٤٧٧ - لُغْنِيسُ بَرِّيٍّ

Lychnis silvestris (S). Lychnide sylvestre, Compagnon rouge (F).

نوع من اللغْنِيس وهو عشبة برية معمرة تكثر في المراعي والمروج زرعها الماشية بشبه.

٢٤٧٨ - لُغْنِيسُ كَبِيرِ الزَّهْرِ

Lychnis grandiflora, L. coronata (S). Lychnide à grande fleur (F).

نوع من اللغْنِيس وهو عشبة معمرة تملو من ٢٠ إلى

الخارجية فصلها. ثم يمتد إلى لباب الثمرة فيسبب اختلاله وتحويله إلى بؤرة من اللغْنِ الناشف الاسود تنضج حروق صقر يسقط منها عند انفلاقها غبار كالمحاب. تقدر الأبار المطبوعة من السليمة بعد نحرها بالماء لان المطبوعة تنظف والسليمة تقهر.

٢٤٧٩ - لَعْنُ النَّجَسِ

Sclerotinia narcissicola, Botrytis narcissicola (S). نطر مجهرى يركب الأوراق عند ظهورها فؤجها ويصيرها إلى تمحيا وأزهارها. مظهره الخارجى حركات صميرة طحلاء اللون تركب نصل الأوراق منه ظهورها ثم تتحول إلى وثاق سود تشبه الأوراق وتبقى عموما ونحو أزهارها وأزهارها.

٢٤٧٨ - لَعْنُ نَاهِمٍ

Sclerotinia sclerotium, S. libertiana, Sclerotium compactum, S. varium, S. brassicae (S). Pourriture des racines (F). Collar rot (E). Rapskreb (D).

نطر مجهرى يركب معظم الأنواع النباتية في مختلف أعضائها التربة وأحوالها. مظهره حركات كالشور صميرة لينة تبدو بيضاء اللون ثم تحيل إلى الزرقعة وتستقر على السمرة توشع سطح الأعضاء الموبوءة أو تصيب السوق في مناطقها المكابية كما يحيل في البطاطا والبنندرة والتبغ. وهو حل كل حال لا يقرب الأعضاء السليمة إلى يركب القشور المخدوشة ويصيب البنات في الحفل ولا يمتد في الجار والدرنات المخدوشة. يكالغ بتطهر التربة بواسطة الفريول أو الحامض الخل أو الأملاح الزرقعية.

٢٤٧٩ - لَعْنَةُ

Chou (F).

هي اللغوف، اطبه.

٢٤٧٥ - لَعْنَةُ

Lachnea (S).

Lachnée (F). Lachnea (E).

جنس طور من فصيلة الخشريات ودية الزيات. أنواعه المعروفة قليلة العدد. تمشي مجموعات في المواطن الظليلة على المواد النباتية المنحلة. مجموعتها تمد من زوج إلى ثلاثة أزواج. سوقها جدمة. تكاعها قصية الشكل أو ترسية، قطرها من ١ إلى ٣ سم. فوقها الخارجية مهدية القشار لونها إلى الصفار الاسمر الباهت أو إلى الحمرة البرتقالية. صحناتها الداخلية بيضاء اللون. وأحتما كروية مستحبة. أعرف أنواعها وأشهرها:

لَعْنَةُ تَرَسِيَّة

Lachnea scutellata (S).

Lachnée en écusson (F).

لَعْنَةُ نَصْفِ دَائِرِيَّة

Lachnea hemisphaerica (S).

Lachnée hémisphérique (F).

٢٤٧٥ - لَعْنُومٌ * لَعْنُومِيٌّ

Lachnolaimus (S). Lachnolème (F).

جنس أسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الكنيديات. أنواعه المعروفة خمسة جميعها من أسماك بحار جزر الأنتيل. أجسامها شبه أحليلية الشكل، كبيرة القد، تطول من ٧٠ إلى ١١٠ سم. رؤوسها مخروطية. أشداها معتدلة الرحابة. زعانفها الظهرية والشرجية واللبيعية مجزأة بمناعس غشورية مستطيلة. أوتياها متباينة الألوان منها الاحمر والجووي والاخضر والاسمر والاعضر البحري. ظهورها اعيق لونا في بطونها. لحمها متوسطة الصنف مأكولة. (Lachnolaimus) استثناء نوع واحد يدعى لغنوم كليي (Lachnolaimus) ثوبه إلى الخضار الزيتي. طوله نحو ١٠٠ سم.



لغْنِ نَاهِم



لَعْنَةُ تَرَسِيَّة



لَعْنَةُ نَصْفِ دَائِرِيَّة



لغْنِيس



لغْنِيسُ الشَّرْقِ الْأَدْنَى



لغْنِيسُ الشُّشْرِيِّ

صغيرة، محرمة. ظهورها كامل الحنطية، شارف، كسني الشباك. ورشها غشائيات. بطنها صغير الجرم. قوائمها نشطة || سرسها حراج الستدان. قوتها نفع الازرار.



لحنيس نرج

٢٤٧١٧ - لَدَائِيَّات (S). *Ledridae, Scaridae* (S).

٢٤٧١٨ - لَدَائِيَّات (F). *Ledridae, Scaridae* (F).

فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة وبلقة نصفيات الجناح. اجناسها وانواعها متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد أو صغيرة. رؤوسها ضخمة. اعطائها صغيرة. حيوها جانبية صغيرة. قرونها الاستشعارية قصيرة، ثلاثية الفصل اللامتناهية. كوسلها عريضة، مزودة باطناف غشائية، شفاطة. اجنتها كبيرة، شافرة. ورشها وغلافية منها مستعرضة الاقطار المستكة كالشمار.

٢٤٧١٨ - لَدَهَكَة، لَسَكَة (F). *Piqore* (F). *Prick* (E).

هي المرة من اللدغ بالنم ومن اللس بالهامة.

٢٤٧١٩ - لَدِيد (F). *Côte* (F). *Side* (E).

جانب المتق وجانب الوادي. اللدبان: جانب الوادي وصفحتا المتق دون الاذنين. ولدبنا الشيء: ناحيته ج الدية.

٢٤٧٢٠ - لَدَائِيَّة سَوْدَاة (S). *Empis nigricans* (S).

٢٤٧٢١ - لَدَائِيَّة سَوْدَاة (F). *Empis noirtre* (F).

حشرة قانصة من فصيلة اللدائيات. جسمها خفي القشار، كثيف الملب، متوسط القد، يطول من ٩ الى ١٢ م. ثوبها الى السرة السوداء بطولها في صدرها خمسة خطوط سود.

٢٤٧٢٢ - لَدَائِيَّة هِدَ بَائِيَّة (S). *Empis muscaris* (S).

٢٤٧٢٣ - لَدَائِيَّة هِدَ بَائِيَّة (F). *Empis gobe-mouches* (F).

حشرة قانصة من فصيلة اللدائيات. جسمها خفي القشار، وشي الشكل، صغير القد، يطول من ٤ الى ٩ م. ثوبها الى السرة الحنطية. رأسها كبير الجرم، شبه مكور الشكل. حيوها كيرتان، متلاحتان عند الذكر، فارتان عند الانثى، لونها الى الحمرة المرجانية. خطها مستطيلة الطول، شديدة التثبط. زباناتها مرقبان، اشقران. صدرها اسطواني الشكل، كثيف الحمل. بطنها خمسي السكم، مردني الشكل. قوائمها حنطية || قوتها اللذاب والحوام تقتنصها طائفة.

٢٤٧٢٤ - لَدَائِيَّة (F). *Rhodopaxille* (F).

هو البليك، فطر من فصيلة الفاريقونيات، اطلبه.

٢٤٧٢٥ - لَدَائِيَّة (F). *Malleabilité, Pliability* (F).

٢٤٧٢٦ - لَدَائِيَّة (F). *Ledra aurita* (S).

٢٤٧٢٧ - لَدَائِيَّة (F). *Ledra attentive* (F).

حشرة من فصيلة اللدريات. جسمها يطول من ١٤ الى ١٨ م. ثوبها الى الحنطية المنتمش بالكسني والاسمر. رأسها مستعرض ضخم. حيوها صغيرتان. زباناتها صغيرتان، كوسلها مزود باطناف شافرة. حجبها ثلاثيا الفصل.

٥٠ سم. اوراقها لاطقة بيضية الشكل. فصلها متبادح اللتين جميل الخضار. ازهارها ضخمة التجميع محورية وعامية الانكازان كبيرة القند قطرها يراوح من ٤ الى ٧ سم. لونها الى الحمرة القرميدية ومنها عاجية || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

٢٤٧٢٨ - لُحْنَيْسُ نَرْج * (S). *Lychnis viscaria* (S).

٢٤٧٢٩ - لُحْنَيْسُ نَرْج * (F). *Lychnide visqueuse, Trape-mouches* (F).

نوع من اللحنيس البري وهو عشبة معمرة تكثر في المراعي. اوراقها لينة. ازهارها ابيضانية اللون.

٢٤٧٣٠ - لُحْنَيْسُ وَرْد السَاء (S). *Lychnis coriifolia* (S).

٢٤٧٣١ - لُحْنَيْسُ وَرْد السَاء (F). *Lychnide rose du ciel, L. facin, Coquelourde rose du ciel, Rose du ciel, Lamprée* (F).

نوع من اللحنيس البري وهو عشبة حولية تملو من ٤٠ الى ٥٠ سم. ساقها وفروعها عاصمة الزغب. اوراقها ضيقة جامدة النصل. ازهارها شمالية اللون مهدبة البتلات الكاملة. ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

٢٤٧٣٢ - لُحْنَيْسُ وَرْدِي * (S). *Lychnis flos-cuculi* (S).

٢٤٧٣٣ - لُحْنَيْسُ وَرْدِي * (F). *Lychnide fleur de coucou, Fleur de coucou, Cœillet des prés, Véronique des jardins* (F).

نوع من اللحنيس وهو عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ٩٠ سم. اوراقها لاطقة، سنائية النصل، بحرية اللون. ازهارها مكسية عديدة البتلات الرامية التفرع كوردية اللون || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

٢٤٧٣٤ - لُحْنَيْسِيَّات (F). *Lychnidae* (F).

سبط من القزقييات، اشهر اجناسه اللحنيس.

٢٤٧٣٥ - لُحْنَيْسِيَّات (S). *Cobitidae* (S).

٢٤٧٣٦ - لُحْنَيْسِيَّات (F). *Cobitidae* (F).

فصيلة اسماك بحرية من رتبة مفتوسحات المثانة لبتات الزخاف. اجناسها وانواعها قليلة العدد، كانت تتبع في التصنيف الماضي، فصيلة الشبوطيات. اعطائها معظم انهر وبحيرات البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها ضيقة، مستطيلة، متباعدة الالوان. قلوبها صغيرة ونحيلة. زعانفها الظهرية وسيدة متوسط الظهر تقابلها الزعانف الخرسية من الجهة السفلى. وتتميز بكثرة عذباتها التي يراوح عددها من ١٠ الى ١٥. وبأسنانها البلورية ويضيق خياشيمها ما يحصلها تراود مطع الماء بكثرة لاستنشاق الهواء الطلق || اشهر اجناسها الخب.

٢٤٧٣٧ - لَدَائِيَّة (F). *Malleabilité, Pliability* (F).

٢٤٧٣٨ - لَدَائِيَّة (F). *Malleabilité, Pliability* (F).

٢٤٧٣٩ - لَدَائِيَّة (F). *Malleabilité, Pliability* (F).

٢٤٧٤٠ - لَدَائِيَّة (F). *Malleabilité, Pliability* (F).

٢٤٧٤١ - لَدَائِيَّة (F). *Malleabilité, Pliability* (F).

٢٤٧٤٢ - لَدَائِيَّة (F). *Malleabilité, Pliability* (F).

٢٤٧٤٣ - لَدَائِيَّة (F). *Malleabilité, Pliability* (F).

٢٤٧٤٤ - لَدَائِيَّة (F). *Malleabilité, Pliability* (F).

٢٤٧٤٥ - لَدَائِيَّة (F). *Malleabilité, Pliability* (F).

٢٤٧٤٦ - لَدَائِيَّة (F). *Malleabilité, Pliability* (F).

٢٤٧٤٧ - لَدَائِيَّة (F). *Malleabilité, Pliability* (F).



لحنيس وردى

من ٢٠ الى ٢٥ م. يستخرج من جذعها بالخز عصاره صمغية ولاتنجية تعرف بالبخور المادي. اوراقها حادة العرف المسنن. لونها الى الخضار الازرق المائل. ثمارها كروية الشكل جلدية اللون، طويلا يراوح من ١٢ الى ١٥ سم. وعرضها من ٨ الى ١٠، احشائها صناعية جيدة الصنف.

٢٤٧٧٩ - لَزَان ، لَزَان ، سَيْسُوس

Cytisus (S), *Cytisus* (F), *Broom* (E), *Kleestrauch* (D), *Cicis*, *Acynello* (I).

جنس جنبات برية وتربيتية من فصيلة القرنيات الفراسية. انواعه نحو ٣٥ معظمها من نباتات حوض البحر المتوسط. اوراقها مركبة ثلاثية الوريقات. ازهارها عقدية جالسة او متدلية ينقلب فيها اللون الاصفر. ثمارها سنغية. زروها عديمة الشكل تنحوي بعض المواد المتصهرة الجعالية، ذيفانها شديد الفعالية. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

٢٤٧٨٠ - لَزَان اَبْيَسْ

Cytisus albidus (S), *Cytisus blanchâtre* (F).

نوع من اللزان البري والرتيبي. مجلته فراء خاد متدنة تملو نحو ٥٠ سم. فروصها وفانها شاككة الاطراف. اوراقها مركبة صغيرة الوريقات المنقطة. ازهارها بيضاء اللون. ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.

٢٤٧٨١ - لَزَان اُرْجَوَانِي *

Cytisus purpureus (S), *Cytisus à fleurs pourpres* (F).

نوع من اللزان البري والرتيبي. جنبته تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها معتقة. وريقاتها اهليلجية النصل مائلة البشرة. ازهارها ارجوانية اللون فردية التجميع المحوري والطرفي. ازهاره يستمر من ايار الى كيب.

٢٤٧٨٢ - لَزَان عَيْطِيَّةُ الْوَرْي

Cytisus linifolius (S), *Cytisus à feuilles linéaires* (F).

نوع من اللزان البري المجلد. مجلته تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. وريقاتها لاطنة عيطية خالية البشرة طول نحو ٣ سم. وتعرض من ٢ الى ٣ م. ازهارها كثيفة التجميع طرفية الارتكاز صغيرة اللد صفراء اللون. ازهاره يستمر من اذار الى ايار.

٢٤٧٨٣ - لَزَان سَلْبِي *

Cytisus nigricans (S), *Cytise en épis* (F).

نوع من اللزان البري والرتيبي. جنبته تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها فراء ذبا، زنبها اصفر اللون. اوراقها معتقة. وريقاتها سنائية النصل طول نحو ٢٠ سم. وتعرض نحو ٨ م. ازهارها سنغية متدلية تملو من ١٥ الى ٢٥ سم. لونها الى الصفرة الزاهية. ازهاره يستمر طوال شهر حزيران.

٢٤٧٨٤ - لَزَان كَنْتَارِيَّة

Cytisus canariensis (S), *Cytise des Canaries* (F).

نوع من اللزان البري والرتيبي. مجلته صغيرة اللد متدنة. ساقها فراء خاد. وريقاتها بيضيه النصل طول نحو ٧ م. ازهارها طرفية صفراء اللون مستحبة العرف. ازهاره يستمر من حزيران الى آب.

٢٤٧٨٥ - لَزَان مَدِينِيَا

Cytisus maderensis (S), *Cytise de Madère* (F).

نوع من اللزان البري والرتيبي. جنبته تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها معتقة. وريقاتها اهليلجية النصل طول من ٢٠ الى ٣٥ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٥ م.

وظايبها منخبة حادة مجهزة للخلط. الجهاز التناسلي عند الذكور خارجي الارتكاز. اناثها اكبر قدما من ذكورها. تنجح مكثا في التربة وفي جنوح الاشجار النخرة. يرقاتها حديدية، شبه اسطوانية، خالية السم، شاككة الحيد. زروصها صغيرة قاصحة. تكثيرها كبير. جميعها دامت او وانجة تعيش في التربة او في جلوح الاشجار النخرة، وبعضها قازب يسرح في احوال وحوال المنطق ويجاري الماء.

٢٤٧٧٢ - لَدَاج

Hématophage (F), *Hematophagous* (E).

نمت تعريي يطلق حل كل حيوان يقتل بالدم او قوته الدم.

٢٤٧٧٤ - لَرْدِيْزَبَال

جنس نباتات زراعية ليفية عارشة معمرة من فصيلة اللرديزاباليات. مهدها امريكة الجنوبية. لها فوان لرديزبال الشيلي ولرديزبال اليرو. اوراقها متعاقبة. ازهارها بنفسجية مائلة. ثمارها لحمية غرونية تستقيت اللون ماكرلة يصونها في بلاد الشيلي (كوفيل).

٢٤٧٧٥ - لَرْدِيْزَبَالِيَّات

Lardizabalea (S), *Lardizabaleae* (F), *Lardizabaleae* (E).

فصيلة نباتات ثنائية الفلقة مستقلة القالة مرتفعة المبيض، قريبة الشبه من البر بريسيات والقمريات. تتميز جنبها الويد المسكن والبويضة. اجسامها وانوامها عديدة معظمها من نباتات البلاد الامريكية. اشهرها اللرديزبال والابني.

٢٤٧٧٦ - لَرْمُوس * ، لَرْمُوس *

Larimus (S), *Larime* (F), *Larimus* (E).

جنس اسمك بحجرة من شاككات الزمانت وفصيلة البهاريات. انواعه المحروسة ثلاثة اصطناعها بحار البلاد الحارة. اجسامها اهليلجية الشكل معتدلة التيطيط طول من ٢٥ الى ٣٥ سم. زروصها كبيرة، قصيرة الاصطام، راحة الاشدق. هيونا كبيرة جاسحة. زعانفها الظهرية مستطيلة، ثنائية التركيب. زعانفها الذيلية مزوانية. اثوابا الى الرتبة القفصية تقيم في الظهور ويملوها تسنج اسد يمتد الى ما يقارب ثلثي الاياطل. يطونها الى الشبهة القفصية اللطدية العمدان. لحوبا جيدة الصنف، مرقوب ب.

٢٤٧٧٧ - لَرْمُوس *

Larimus (S), *Larin* (F), *Larimus* (E).

جنس شحرات خاضعة من مخدات الاجنحة وفصيلة السويات. انواعه المعروفة عديدة اصطناعها المناطق الحارة والمعتدلة الحارة من العالم القديم. تألف البراري التي تكثر فيها المجرشات احصاها الاقوس. اجسامها شبه بيضيه الشكل، صغيرة اللد، مستقلة المقدم والمؤخر. قروها الاستعمارية مرفقة، بدوية الاطراف. كولسها واغادها ملحقة بقدش من الطيلس الاصهب الين. ازوارها متباينة الالوان والاشكال الخندسية تكثر فيها السرة والطحلة.

٢٤٧٧٨ - لَرَبَاب * ، عَرْمَقَر رُفِيع

Juniperus excelsa (S), *Génévrier de Tauride*, *G. en arbre* (F), *Greek juniper* (E), *Mohar Wacholder* (D), *Ginepro di Crimea* (I).

نوع من المرمر اصطناعه تمتد من البلقان الى حلايا. يكثر وجوده في بعض جرد لبنان. ثمرته كبيرة اللد تملو



لرؤوس



لَرَبَاب



لَزَان ارجواني



لَزَان سنغلي

Neritidae (S).

Nérítidae (F). Neritidae (E).

فضيلة حلازين من الرخويات المذليات . اجناسها وانواعها عديدة معظمها بحري وبعضها بحري ونبوي .

Homophylle (F).

Homophyllous (E).

نمت تعريفي يعلق كل كل نبات سائل الأوراق المتساوية.

Lasioderme (F).

Lasiostroma (S).

جنس طيور بحيرية من فصيلة الصفيات . ونبته نصف

كروية تنشأ من النسيج المتشامة ثم ترتقي الى سطحها .

بكتيدته كروية الشكل ، نخلة اللق . يوفاته بفضية

او مرئية || له نوع واحد يسمى لزيوسترومه الاجاص

(Lasiostroma pisorum) يركب ثمار الاجاص

الحفيفة ، عند ارتفاع الحرارة ، فيقرحها ويغفلها .

Déprimage (F).

رعي المائية اول نبات المرج .

المشب ما دام صغيراً لا تستمكن منه القراصة .

القساس شبة عشنة كلسان الثور وليست به (المحيط) .

عضو حشلي متحرك الجسم ، ثابت القاعدة ، مركزه اللحم

وظيفته المصغ والمصس والبلع وتكييف الصوت .

عضو حشلي متحرك الجسم ، ثابت القاعدة ، مركزه اللحم

وظيفته المصغ والمصس والبلع وتكييف الصوت .

عضو حشلي متحرك الجسم ، ثابت القاعدة ، مركزه اللحم

وظيفته المصغ والمصس والبلع وتكييف الصوت .

عضو حشلي متحرك الجسم ، ثابت القاعدة ، مركزه اللحم

وظيفته المصغ والمصس والبلع وتكييف الصوت .

عضو حشلي متحرك الجسم ، ثابت القاعدة ، مركزه اللحم

وظيفته المصغ والمصس والبلع وتكييف الصوت .

عضو حشلي متحرك الجسم ، ثابت القاعدة ، مركزه اللحم

وظيفته المصغ والمصس والبلع وتكييف الصوت .

عضو حشلي متحرك الجسم ، ثابت القاعدة ، مركزه اللحم

وظيفته المصغ والمصس والبلع وتكييف الصوت .

عضو حشلي متحرك الجسم ، ثابت القاعدة ، مركزه اللحم

وظيفته المصغ والمصس والبلع وتكييف الصوت .

عضو حشلي متحرك الجسم ، ثابت القاعدة ، مركزه اللحم

وظيفته المصغ والمصس والبلع وتكييف الصوت .

عضو حشلي متحرك الجسم ، ثابت القاعدة ، مركزه اللحم

وظيفته المصغ والمصس والبلع وتكييف الصوت .

عضو حشلي متحرك الجسم ، ثابت القاعدة ، مركزه اللحم

وظيفته المصغ والمصس والبلع وتكييف الصوت .

عضو حشلي متحرك الجسم ، ثابت القاعدة ، مركزه اللحم

وظيفته المصغ والمصس والبلع وتكييف الصوت .



لزقة



لزيق



لزقة

ازهارها طرفية التجميع صفراء اللون || ازهاره يستمر طوال فصل الشتاء .

Cytisus purgans (S). لزقان مُسْهِل

Cytis purgatif (F).

نوع من اللزان الطلي البري المبتل . يملكه تلو من ٣٠

الى ٦٠ سم . اوراقها لاطئة بسيطة ، نصلها لسن الصفحة

الحرية اللون . ازهارها الى الصفرة . يزورها ويجورها

مسلة || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

٢٤٧٨٧ - لزينة هي الذاكرة القانصة ، اعطيا .

٢٤٧٨٨ - لزنج Visqueux (F). Viscous (E).

ما به لزوج اي تعلق وتمدد وذك يعلق باليد ونحوها .

٢٤٧٨٩ - لزوجة ، لزوق Viscité (F).

Viscosity (E).

٢٤٧٩٠ - لزوق Emplâtre (F). Plaster (E).

دواء يلزم الجرح او الصدغ حتى يبرأ .

٢٤٧٩١ - لزوكية Luzula (S).

Luzule (F). Wood-rush, Cuckoo grass (E). Hasen-

brotmarbel, Marbel (D). Luzula, Luziola, Giunco

peloso, G. secco (I).

جنس نباتات عشبية برية مرعوية علفية معمرة من فصيلة

الاسيايات . انواعها المعروفة ٢٥ ، اصطناعها البلاد الممتدة

الحرارة من العالمين القديم والجديد . جلودها مدادة . سوقها

فردية متشعبة . اوراقها متطابقة صفصية ، نصلها خلى البثرة ،

مهدب الحافة ، غير المالح . ازهارها حشوكية التجميع ،

طرفية الارتكاز . ثمارها حقية . تستعمل لتثبيت الأراضي

الجبلية المنحدرة التي يمشي عليها من انجراف التربة .

٢٤٧٩٢ - لزريق Falco erythropus (S).

Kobez (F). Red-legged falcon (E).

جنس طير من حمزة الصقور وفصيلة الصقريات . انواعها

قليلة جميعها من القواطع التي تجوب البلاد في طلب المصيف

والشقي . عدد افراد سرجها يراوح من ٥٠ الى ١٠٠ وهي

صغيرة القد ريمة القامة طولها يراوح من ٣٠ الى ٣٢ سم .

الوانها ترة . مناسرها وبيوتها حبيبات وسيلاتها الى الحمرة .

ذكورها سمى الرووس والاحتناق والصدور . اناثها حمر

الرووس والصدور || قوتها الحشرات على اختلاف انواعها

واشكالها . تدفن في الاجار العالية . اناثها تضع من ٤

الى ٦ فنان تحضنها اربعة اسابيع || احرف انواعها ما يلي .

٢٤٧٩٣ - لزريق الشرق Falco erythropus amurants (S). Kobez oriental (F).

نوع من اللزريق يحوم الشرق حتى روسيا ويستقر خسة

شهور في الجبلية او مصر والسودان حيث يدفن ولكنه

وببيض .

٢٤٧٩٤ - لزريق الغرب Falco erythropus vaspertinus (S). Kobez vaspéral (F).

نوع من اللزريق يحوم آسيه الصغرى واروبه ويستقر

نحو خسة شهور بين جبال الاطلس والسنغال حيث يدفن

وكنه وبيض .

٢٤٧٩٥ - لزريقية Nerita (S).

Néríta (F). Nerita (E).

جنس حلازين بحيرية من اللزريقيات . انواعها المعروفة

نحو ٢٠٠ جميعها قديمة الشكل مولها بحار وشواطئ البلاد

الحارة .

٢٤٨١٧ - لِسَانُ الْعُصْفُورِ الْجَبَلِيِّ
Cérinthe retournée (F). هو السرته المغلوقة ، اطبلية .

٢٤٨١٨ - لِسَانُ الْعُصْفُورِ الصَّغِيرِ
Cérinthe petite (F). هو السرته القصيرة ، اطبلية .

٢٤٨١٩ - لِسَانُ الْعُصْفُورِ الْمُرِّ

يعرف باسم حلقى ، اطبلية .

٢٤٨٢٠ - لِسَانُ الْفَرْزَالِ *
Botrychium (S).

Botryche, Botrychie, Botrychion (F). Moon-fern, Moonwort (E). Echte Mondraute (D). Lunaria del garrolo, Sfera cavallo (I).

جنس نباتات عشبية من السراخس . أنواعه نحو ٢٠ أعطائها البلاد الباردة والمعتدلة . تعيش في المواقف الرطبة . تتميز بأكياس بويضها السبيلية التي تنجب البعوضة الفتوح .

٢٤٨٢١ - لِسَانُ الْفَرْزَسِ
Langue de cheval (F). هو السقندر اللين ، اطبلية .

٢٤٨٢٢ - لِسَانُ الْكُتْبِ * ، آذَانُ الْأَرْثَبِ ، آذَنُ الْفَرْزَالِ

Cynoglossum (S).
Cynoglossa, Langue de chien (F). Gipsy flower, Hound's tongue (E). Echte Hundszunge (D). Cinoglossa, Lingua di cane, Erba vellutina (I).

بجلة برية معمرة من فصيلة المحسنيات ، ساقها زباه تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم . أوراقها معتقة لسنة . نصلها ذرب إلزام الأخير ، حلي البشرة على مسطحه . إزهارها عشقودية النجم ، متجمدية اللون ، بيض الحشا . يقال ان جميع أجزاءها طيبة قابضة تلطف السعال والمفص . إزهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

٢٤٨٢٣ - لِسَانُ الْمُرْمَرِ
هو الكلمم ، اطبلية . هو الكلمم ، اطبلية .

٢٤٨٢٤ - لِسَانُ الْوَحَلِ
Langue de cerf (F). هو السرسان الحزني من النباتات الطيبة ، اطبلية .

٢٤٨٢٥ - لَيْسْتُوسُ أَزْرَقُ *
Leistus caeruleus (S). Léiste bleu (F). Leistus caeruleus (E).

حشرة قافضة من فصيلة التيريديات وربة غدييات الاجنحة تألف الاخراج الظليلة والمواقع الرطبة والجائحات والحدائق . خنافسها وورقاتها تعيش على ما تقتنصه من حشرات ووراث . جسمها صغير اللد يطول نحو ١٠ سم . ثوبها الى الزرقه الجميلة رأسها صغير الجسم . فكاهها ذريان . زباناها عظيمتان مستطيلتان . عيناها صغيرتان بارزتان . ظهورها متوسط الاحدياب ، مستدير الطرف اللامع ، ثماني التحزيز الفمدي . إرسافها خماسية العقول || الاثنى عشر قدماً من الذكر وابنت ثوباً منه واقصر زبناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملة في اواسط الربيع وتعيش حتى اواسط الخريف . تسرح في النهار . تسافه في الليل . تجتمع المكن تحت الجفالة والطحالب والليل || البرقة عند تمام ادراكها تطول نحو ١٦ سم . جسمها اسطواني الشكل ، مداسي الرواجب . ثوبها الى السمره . رأسها وشرجها ورواجبها الى السواد الفحمي || طول الاكمال الذي يستمر نحو ٥٥ يوماً ينقضي في بيض عودتي الفور تحفر البرقة على غرق ه أو ٦ سم .

وانشمال والكل وسرقة البول والزلف شراباً والأورام علاه والقروح غداً ، وتمنع الصرع وداء الليل || اشهر انواعه ما يلي .

٢٤٨١٠ - لِسَانُ الْحَمَلِ السِّيَانِي * ، آذَانُ الْكَبَشِ
Plantago lanceolata (S). Plantain lancéolé, Oreille de lièvre (F). Great ben plant, Rib-grass, Ribwort (E). Sotzweigerich (D). Plantagine lanceolata, Lingua di botta (I).

نوع من لسان الحمل الطبي الجليل . أوراقه سنائية لسنة . إزهاره الى اليافس التي . مناته الطيبة عديدة كتافع راقه .

٢٤٨١١ - لِسَانُ الْحَمَلِ الْقَرْنِيِّ * ، قَرْنُ الْأَيْلِ
Plantago coronopus (S). Plantain corne de cerf, Coronope (F). Buck's-horn plantain, Star of the earth (E). Hirschornweigerich (D). Plantagine corno di cervo, Minutina (I).

نوع من لسان الحمل الطبي الجليل ، أوراقه سنائية مستطيلة ملتفة اختار او منمقة . إزهاره الى الصفرة الباهتة . مناته الطيبة منافع راقه الا ان مادته المتصرية أقل فعالية .

٢٤٨١٢ - لِسَانُ الْحَمَلِ الْكَبِيرِ * ، لِسَانُ حَمْدَه ، لِسَانُ الْكُتْبِ ، مَصَّاصَه

Plantago major (S). Plantain majeur, P. des oiseaux, Grand plantain (F). Greater plantain, Waybread (E). Grosser Wegerich (D). Plantagine maggiore, Arnoglossa, Pentinervi (I).

نوع من لسان الحمل وهو الجليل في المواقف الرطبة . أوراقه يبيضة النصل ، مقبوضة القاعه ، مستطيلة النقي ، بحرية انفسار . إزهاره الى الصفار الاخير . يزوره دقيقة ترطب فيها المصافير . وهو من النباتات الطيبة ، أوراقه الخضرة تعيد في التزيف والحروق والكدمات والحمره . تقطير قه الزهرية ينفع العين . وعصيره خسانفس لمرارة ملطف للمحوضة مفاد لدهق الحولام والحشرات .

٢٤٨١٣ - لِسَانُ الْحَمَلِ الْمَوْطِطِ * ، مَصَّاصَه صَغِيرَه

Plantago media (S). Plantain moyen, P. bittard (F). Lamb's tongue, Hoary plantain (E). Mittlerer Wegerich (D). Plantagine mezzana (I).

نوع من لسان الحمل الطبي الجليل ، إزهاره وردية اللون . أوراقه قابضة مجففة تضمة بها الجراح المزمنة والحية . وإذا أكلت مطبوخة مثل يلع أذنت في قرصة الاسد . والاسهال المزمن . والمفصصة بجلي أوراقه تشفي قروح الفم واللثة الدامية . وإسحاق حصيره في صده يثني قروح الرسم والوراث التي تسيل منه « (الانطاكي) » .

٢٤٨١٤ - لِسَانُ الْحَيَّةِ * ، لَكِيْفَه

Ophoglossum (S). Ophoglossa, Herbe sans couture, Langue de serpent (F). Adder's tongue, Adder's spear fern (E). Echte Natterzunge (D). Lingua serpentina, Luccia, Erba senza nervi (I).

نبات عشبي طبي بري ممر من السراخس ، صغير اللد يطول نحو ٣٠ سم . أوراقه حادة المروك . يتكر في المناطق والمواقع الرطبة . جذوره طيبة تظم الجروح وتفيد الكبح .

٢٤٨١٥ - لِسَانُ الْقَصْبِ * هو شوك فرياس ، اطبلية .

٢٤٨١٦ - لِسَانُ الْعُصْفُورِ

اسم شائع لا يجوز اعتماد لانه يطلق على عدة نباتات مختلفة انصها الدودار والمران والمائق والسرته .



لسان الحمل السنياني



لسان الحمل الكبير لسان الحمل المتوسط



لسان الحية لسان الفزال



لسان الكلب



لستوس أزرق

الاستوائية || نباتاتها اشجار وحميرات . اورقها ابيدة ، متعاقبة متعقة ، قلبية النصال . ازهارها سليل الجميع . ازهارها خماسية البتلات ، عديدة الالوان ، حيلة الالوان الزاهية . ثمارها نووية || اشهر اجناسها السيميم .

٢٤٨٣٤ - **نسيجة** هي الطولق القرني ، اطبه .

٢٤٨٣٥ - **نسين** Ligula (F). Ligula (E).

هنة في ورق النجيليات بين فصل العصفه ونحوها .

٢٤٨٣٦ - **نسين** Actinella (S). Actinella (F).
جنس نباتات عشبية طيبة من فصيلة المركبات . ازواحه عديدة جميعها حرة الرائحة مرة الطعم . اورقها لا قراسية الترتيب والتجميع منها المتعاقبة والقصية والجلمية . ازهارها صفراء اللون وريساتها الزهرية عديدة اللينيات ، تحترق عريانة . بزورها مدنية الشاور || اعرف ازواحه واشهرها ما يتبع .

٢٤٨٣٧ - **نسيعة** Lingula (S). Lingula (F). Lingula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفديات الارجل وفصيلة النسيينات . ازواحه الماصرة المعروفة قليلة العدد تعيش لاصقة بالصخور المعورة والنباتات البحرية || اصداؤها متساوية المصارع ، يفيضة اللون ، مستطيلة بسيطة ، مقطوعة الرأس ، مدنية العقب . مفصلاتها عادية النسيين . لوافها كثيفة الملب التام العقيق .

٢٤٨٣٨ - **نسيعة عطفية الزرق** Actinella linearifolia (S). Actinella à feuilles linéaires (F).

نوع من اللين المحيط . ساقها منتصبة فراء تملو من ١٥ الى ٤٠ سم . اورقها بسيطة عطفية النصل . رؤسها الزهرية صغيرة القد تحمل شعر لينيات اطليجية الشكل . تنورها يستمر من ايار الى ايلول .

٢٤٨٣٩ - **نسيعة كبيرة الزهر** Actinella grandiflora (S). Actinelle à grandes fleurs (F).

نوع من اللين المحمر . ساقها مزهرة اللحاء منتصبة تملو من ١٥ الى ٢٠ سم . اورقها ريشية شمرة . رؤسها الزهرية كبيرة القد ، يراوح طولها من ٨ الى ٨ سم || تنورها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٤٨٤٠ - **نسيعة نجمية** Actinella scaposa (S). Actinelle aculee (F).

نوع من اللين للممر العادم الساق . اورقها جلعية الازنكار ، غنية الجميع ، مساوية النصل . رؤسها الزهرية مستطيلة اللينيات المنقطة الى الحجاج || تنورها يستمر من ايار الى تشرين .

٢٤٨٤١ - **نسيجات** Linguleae (F). Lingulés (F). Linguleae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفديات الارجل اللاصفلية . اجناسها وازواحه المعروفة عديدة ، معظمها من متحجرات الاحقاب القديمة ، جميعها بسيطة كالسان ملتصقة باصداؤها يسوقات طيبة مستطيلة قابلة الانعاط || اشهر اجناسها واعرفها النسيعة .



لنوس



لينة

٢٤٨٣٩ - **نسيكية** Lasthenia (S). Lasthénie (F).
جنس نباتات عشبية حرة من فصيلة المركبات . ازواحه المعروفة قليلة . سوقها فراء تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اورقها متعاقبة متناوبة النصل . ازهارها رؤسية الجميع . ثباتات قلاطها ملتصقة تشكل اقاداً احفنا مؤلفة من ١٥ ساق . ازهارها مختلفة الالوان يكثر فيها الاصفر . تنورها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٤٨٣٧ - **نسد** Téter (F). To suck (E).

رفع . يقال لسد الطل امه ولندا : رفع جميع ما في ضرعها .

٢٤٨٣٨ - **نسعة** راجع لدفة .

٢٤٨٣٩ - **نيسنوس** Liclus (S). Licine (F). Licinus (E).

جنس خنافس جاسة مفترسة من خدليات الاجنحة وفصيلة النسيينات . ازواحه المعروفة ١٢ موطنها حوض البحر الابيض المتوسط || اجسامها تطول من ١٢ الى ١٨ م . يكثر فيها الشكل الاهليلجي . احمادها لاحفة ، عذدة وحمية . الزواها الى السواد الفضي او الكسبي الاسمر الاسفع || تعيش تحت الحجارة او في الثقاب تحلقها قرب جلود النبات . تسرح من اواسط الربيع الى اواسط الخريف . قوتها كل ما تستطيع قتله من دويبات ويرقات وديدان .

٢٤٨٤٠ - **نيسنوسيات** Licinidae (S). Licinidae (F). Licinidae (E).

فصيلة خنافس جاسة مفترسة من خدليات الاجنحة . اجناسها وازواحه المعروفة عديدة اصطلها معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صفراء او متوسطة القد ، شبه اهليلجية الشكل . رؤسها حمرة . قرونها الاستشارية مركبة من ١١ فصلة . احمادها لاحفة . قوتها نشطة . من ميزاتها ان ازوها لامتدادة وغالباً مثرية . جواضها ثنائية الفلق المحيطة . تكثرها قصيرة وشقيقة . ملاسها الشفوية جزلة || اشهر اجناسها النيسون .

٢٤٨٤١ - **نيسنوسيات** Phaneroglossae (S). Phanéroglosses (F). Phanéroglossa (E).

مرتبة حيوانات من رتبة البتر ، عذجات الذنب ، تشكل عمل لثن وعشر فصائل || جميع حيواناتها من مختلف الفصائل والاجناس تنتم بوجود اللسان || لثامها الخشنة عذجات والرقصيات .

٢٤٨٤٢ - **نيسيم** Lacistema (S). Lacistème (F).
جنس نباتات حرجية من فصيلة النسييمات . ازواحه المعروفة ١٥ اصطلها امريكة الاستوائية . جميعها اشجار وحميرات . سوقها منتصبة فراء . اورقها ابيدة ، متعاقبة ، متعقة ، جامدة النصال القلبية الشكل . ازهارها سليل الجميع ، طرفي الازنكار وحموري . ازهارها صغيرة ، يكثر فيها اللون الاصفر . ثمارها نووية لا تؤكل انما يستخرج منها صبغ احمر شائع الاستعمال المحلي .

٢٤٨٤٣ - **نيسيميات** Lacistomaceae (S). Lacistomacées (F). Lacistomaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وازواحه المعروفة قليلة العدد . اصطلها بعض مناطق امريكة

انجلبها فتبدو زاهية اللون شخافة ثم خضراء زيتونية وتنتهي بالبن الاصفر. أما الثمار المصابة فتبدو كأنها موشة يتبدل لا قياسية الشكل والحجم تحفظها الزمان متغلطة قبل ان تستقر على الاصفر الذي يجتمع الغلاف مع الإدراك.

٢٤٨٥٣ - لُصْفُ الْعَلَقِ ، لُصْفُ الْعَوْسَجِ

Elsinoe veneta, *Plectodiscella veneta*, *Gloeosporium venetum*, *G. necator*, *Phyllosticta rosarum* (S). *Anthracoze du framboisier*, *A. des ronces* (F).
وصم يصيب العوسج والعلق في الفروع والأوراق والثمار فيؤذيها ويوقع بها الاضرار. سببه فطر مجهري من الفطريات. مظهره الخارجي يقع حراء اللون أو بنفسجية، ظهرها من ٣ الى ٥ سم. تركيب الأوراق فتعطيها تركيب الفروع فتشوها، أما الثمار فيصيرها || يكافح باستعمال سائل بوردو المخلول ١٪ في اوائل الربيع.

٢٤٨٥٤ - لُصْفُ

Catapsia هي البليغة توضع على مكان الألم من الجسم.

٢٤٨٥٥ - لُصُوفُ

Gloeosporium (S). جنس فطور مجهرية من فصيلة الرنغيات. أنواعه عديدة معظمها مؤذي || مشبه بنمو تحت الطبقة الادمية حيث ينتشر في اللون ثم يتجمع ويتحول الى ونبية تقوم عليها الكتلان. قصباته قرصية أو سرغولية. بروفاته وسيدة الخلية، شخافة، مستطيلة، مستقيمة أو منعققة || وصم متفاوت الاضرار والأذى يمتري الأوراق والثمار والافئاد || اعرف انواعه ما يتبع.

٢٤٨٥٦ - لُصُوفُ الإِسْبَاحِ

Gloeosporium spinaciae (S). فطر مجهري. تركيب أوراق الإسباح فيؤذيها ببعض البقع المستترة المتلاصقة السوداء اللون التي تشوها وتؤدي من قوتها التجارية || يكافح باستعمال أحد مركبات النحاس.

٢٤٨٥٧ - لُصُوفُ الْهِنِّ

Gloeosporium coffeanum (S). فطر مجهري يركب أوراق البن فيؤذيها ويسبب الافئاد فيؤرخها || مظهره على الأوراق لطخ حطئية اللون مستطيلة تركيب حافة التصل فتقضي على خلايا النسج الادمية. وهو على الافئاد قروح مستطيلة سمراء اللون تلعب اللحاء وتحتها || يكافح بالقطع الاضواء الموضوعة وينضج الاطيار عدة مرات ببعض السوائل المركزة على املاح النحاس.

٢٤٨٥٨ - لُصُوفُ الْبَنْدُورَةِ

Gloeosporium phomoides (S). فطر مجهري يركب ثمار البندورة عند اقترابها من الإدراك. يبدو كالبقع الحطئية أو السوداء اللون يسببها مشجع الفطر الذي ينتشر في الطبقة الادمية وتتسع معه البقع السطحية حتى انصداعها الذي يعقبه شيء من الحريان || يكافح باستعمال أحد الفطواير المركزة على الكبريت والنحاس.

٢٤٨٥٩ - لُصُوفُ الْجَوْزِ

Gloeosporium epicarpi (S). فطر مجهري يصيب لباب الجوز فيعطيه. مظهره الخارجي يقع مستترة أو بيضية الشكل طلاء اللون سمراء الحامدة تركيب لباب الشرة. فان حصلت الإصابة في أثناء النمو أطاحت بالثمرة وأن وقت قرب الإدراك سبت حقن اللباب || اضراره غالباً محدودة لا تستوجب المكافمة لانها لا تفوق ٣ أو ٥ ٪.

٢٤٨٤٢ - لُصِيَّةُ الزَّهْرِ

Liguliflora (F). فطر من فصيلة الركبات.

٢٤٨٤٣ - لُصُوفُ

اللس هو السباق أو ثوره.

٢٤٨٤٤ - لُصْفُ

Echenels (S). *Echénide*, *Rémora* (F). Sucking fish, Remora (E). جنس اسماك بحرية من شالكات الزعانف وفصيلة الكشكيات. انواعه نحو ١٠ اجسامها مستدقة، طولها يراوح من ٢٦ الى ٣٢ سم. تتميز برووسها المكلفة بمجناات بيضية الشكل غمدة شاطفة تمكنها من الالتصاق بالاسماك والاشياء التي تريدھا. وهي تتلصق بالحويت والبال والدلفين واللبانة والبلانشير.

٢٤٨٤٥ - لُصُوفُ ، لُصُوفُ

Homochromia (F). *Procrapsis* (E).

خاصة تتميز بها بعض الكائنات الحية من حيوان ونبات، تمكنها من الاختصاص بلون الاشياء التي تحيط بها.

٢٤٨٤٦ - لُصُوفُ

Oxyria (S). *Oxyria* (E).

جنس نباتات عشبية برية ممررة من فصيلة البطاطيات. منها جبال حوض البحر الابيض المتوسط.

٢٤٨٤٧ - لُصُوفُ

Lachensia (F). هي الزيجيل من الزنايق، اطليه.

٢٤٨٤٨ - لُصُوفُ

Zygotene (F). *Zygoten* (E). دور التطور الميزوزي الذي يتميز بتلاصق النشب المتشابهة.

٢٤٨٤٩ - لُصُوفُ

Fluorescence (F). خاصة تمكن بعض الاجسام من تحويل الاشعة الضوئية التي تنقلها الى اشعة ضوئية اطول موجة.

٢٤٨٥٠ - لُصُوفُ

Clapier commun (F). هو الكبير الشائك وهو ثمر الكبير.

٢٤٨٥١ - لُصُوفُ الثَّمَارِ وَالْإِجَاصِ

Elsinoe piri, *Plectodiscella piri*, *Sphaceloma*, *Phyllosticta rosarum* (S). *Anthracoze du pommier et du poirier* (F).

وصم يصيب الثمار والاجاص والسفرجل في الافئاد والأوراق والثمار. سببه فطر مجهري من الفطريات || مظهره الخارجي يقع صغيرة كثيرة العدد منتشرة بدون ترتيب على نصل الأوراق ولطخ الافئاد ويشتر الثمار. وعده البقع التي يقع قطر الواحدة منها نحو المليمتر الواحد تبدو كاسطوانة مستطنة حراء اللون توسطها نقطة يضاء || يكافح باستعمال أحد الفطواير النحاسية.

٢٤٨٥٢ - لُصُوفُ الْحُمْضِيَّاتِ

Elsinoe fawcetti, *Sphaceloma fawcetti*, *Sporotrichum citri*, *Cladosporium citri*, *Sphaceloma citri* (S). *Scab des agrumes*, *Maladie des verrues* (F).

وصم يصيب أكثر انواع الحمضيات في افئادها وأوراقها وثمارها. سببه فطر مجهري يعيش ويتكاثر على الترواي الفنية عندما يكون معدل الحرارة نحو ٢٠ درجة ستينراد. لذلك فهو نادر الجيود في القلم حوض البحر المتوسط. مظهره الخارجي يقع صغيرة تملو نصل الأوراق الفنية عند



لشك



لصف التفاح والاجاص



لصف الحمضيات



لصف البندورة

٢٤٨٦٠ - نُصُوفُ الزَّيْتُون * ٥

Gloeosporium olivarum (S). Lèpre des olives, Galla (F).

فطر مجهري يظهر في آب ويبلغ أوج انتشاره في أواخر ايلول، يركب الثآليل فيشوها ويصطبها || مظهره الخارجي بقع مستديرة تركب غلاف الثمرة فقتيب انغراض السطح ثم انصاع البشرة ومغرها بمادة لزجة يرتقالية تنصرف الى السمرة مع الرطوبة || يكافئ باستعمال احد المولتات النحاسية.

٢٤٨٦١ - نُصُوفُ الفَرَسِيَّاتِ ٥

Gloeosporium caulivorum (S). Anthracnose des légumineuses (F).

فطر مجهري واسع الانتشار يصيب بعض نباتات الفصيلة القرنية اخصها النفل والبرسيم والقمصة والعرن || يركب السوق وممايلق الاوراق فيوتنها بقع حطية ثم سمراء اللون تصعد البشرة بعد ارتفاع التسجج وانفلاتها || يكافئ بتطهير البذار بمحلول سلفات النحاس المركز ١ ٪ بعد تغيير موقع الزراعة.

٢٤٨٦٢ - نُصُوفُ الكَرْمَةِ * ٥ ، سُودِ الكَرْمِ

Gloeosporium ampelophagum (S). Anthracnose de la vigne (F).

فطر مجهري يتطفل على الاوراق والسروخ والناتيد فيصطبها ويبلغ بها اشد الاذى || مظهره الخارجي بقع صغيرة، مستديرة ، لا قياسية التصنيع ، تركب فصل الاوراق. تبدو حطية، قطرها من ١ الى ٤ م. ثم تتسع فينصرف لونها الى البياض الاخرى تحوالة فصيصة السمرة بنفسية الموج ، تقضي على التسجج المنحارة ظفوها ونفاتها || وهو على السروخ يقع مستطيلة مشيرة تركب اللحاء فظفرها وتغور فيها حتى الشكير والكلك || وهو في المناديق يقع مستديرة مستطيلة تركب الحب فتبدو حطية اللون مبردة تكثر في المنطقة الخافية ثم تتسع فينصرف لونها الى السمرة يحيطها اطراف غميق اسود || يكافئ باستعمال سائل بورديو اهلل من ٢ الى ٣ ٪ او السائل البورديني المألوف ٢ ٪. ومن الضروري اقتطاع وسرق السروخ الموصية.

٢٤٨٦٣ - نُصُوفُ اللُّوزِ ٥

Gloeosporium amygdalinum (S). Anthracnose de l'amandier (F).

فطر مجهري يصيب اللوز في اثنائه واوراقه ونحوها. يبدو على الثآليل قروح لملولية صغيرة ، حطية اللون تطرح بالزئبق ثم تنخفض وتغور الى الداخل || وهو حصل الاثنان مشجج يمحج تحت اللحاء ثم يحفل على حين فرة قبل اكتمال نمو الاوراق || وهو على الاوراق يظور مباشرة سمراء اللون تجف وتتمتد بسرعة || يكافئ باستعمال سائل بورديو او احد السوائل السلفوكسية.

٢٤٨٦٤ - نُصُوفُ اللَّيْمُونِ ٥ *

Gloeosporium limeticolum (S). Anthracnose du citronnier (F).

فطر مجهري يركب بعض انواع الليمون اخصها الليمون الحلو والرائج || يبدو على نواحي الاثنان بقع حطية مستطيلة يتمايلها على نصل الاوراق بقع شديدة الغضار الاسمر تطفن النصل وتقوده الى التذوق فيبيس مع الاثنان. ويركب الاثناذ فيطوح بها. ويصيب الثآليل فيشوها ويؤلف نموها بعد ان يوتها ينقط حطية اللون تكلف القشرة وتغور فيها || يكافئ باستعمال سائل بورديو المركب ٣/٥ ٪ يضاف اليه ١ ٪ من الزيت قبل الاثناذ وبعد الانتهاء.

٢٤٨٦٥ - نُصُوفُ الطَّطَا ٥

Gloeosporium albobrumbum (S). Anthracnose de Phéva (F).

فطر مجهري يصيب المطاط في اوراقه وجلوته فيؤذيه اشد الاذى || مظهره على الاوراق لثنية بقع كبيرة لاقياسية الشكل ، لونها الى الكهية يملوها موج زئبي. وهو على الاوراق البالية يقع فصيصة صفراء اللون ثم حطية تتوسلها نقط سود تقضي على الاوراق فتصطبها || وهو على الجذوع اطلع حطية تتوسلها بقع خيزاء اللون ، قطرها نحو ٣ م. تسبب تفنين اللحاء واسودادها ثم انصاع البشرة وشلل الفسج مع المصارة || يكافئ عند ظهوره باستعمال الاملاح النحاسية كما وانه يحسن استعمال الاسمدة المعدنية التي تنشط النسو الخصري فتضلل دون انتشار الرصم.

٢٤٨٦٦ - نُصُوفُ المَوْزِ ٥

Gloeosporium musarum (S). Anthracnose de la banane (F).

فطر مجهري يصيب الموز في ثماره النامية وللدركة فيصطبها. مظهره الخارجي بقع مستديرة او مستطيلة سمراء اللون تركب القشرة ثم تغور فيها فتصطب الب || يكثر في الموانع الرطبة الخالصة. || يكافئ عند ظهوره باستعمال الفوطاير المركزة على الاملاح النحاسية.

٢٤٨٦٧ - نُصُوفُ بَخْمَرِ مَرْمِثِ ٥

Gloeosporium cyclaminis (S).

فطر مجهري يركب الاثناذ في ايل نمجا فيشوها او يلونها || مظهره الخارجي بقع حطية تركب السروج فتقبله وتركب زناد الزهرة فتقرحه وتصبغ. وهو على الاوراق بقع حطية لا قياسية الشكل والحجم تركب النصل فتصعجه وشلل فيه حركة التبادل السلي || يكافئ باستعمال اوكسيكلورير النحاس المركز ١ ٪.

٢٤٨٦٨ - نُصُوفِي ٥ هو الفالدين الايشي ، اطلية .

٢٤٨٦٩ - نُصُوفُ ٥

Indehiscence (F).

Indehiscence (E).

صفة الثآليل والبلور التي لا تطلق تلقائيا عند الادراك

الناس .

٢٤٨٧٠ - نُصُوفِي ٥ *Indéhiscant* (F). *Indéhiscant* (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ثمرة او بذرة لا تطلق تلقائيا اي طوعيا عند الادراك النام .

٢٤٨٧١ - نُظْ ٥

Lecythis (S).

Lécythis, *Marmite de singe*, *Quazalé* (F). *Monkey-pot tree*, *Sapumala-nut tree* (E). *Topfbaum* (D).

Maudorio della *Colombia* (I).

جنس اشجار وشجيرات من الطليات وفضيلة الآسيات. انواعه نحو ٥٠ جميعها من نباتات المناطق الاستوائية الافريقية والامريكية. اوراقها متعاقبة معقاة اعليجية. ازهارها تاجية. ثمارها جراء طليعية مستطيلة صميكة الجوانب. سداداتها قلسوية تنفتح من فوق تحوى عدة زور مر الطعم تأكلها القردة وتستعمل في بعض العلاجات الصديرة .

٢٤٨٧٢ - نُظْ ٥

Lota (S).

Lote (F). *Lote*, *Eel-pout* (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السمكيات. انواعه قليلة نائف البسميرات وبيضاء الانهر الزاكية . اجسامها تطول من ٢٥ الى ٧٥ سم. شاشتها صغيرة دقيقة لزجة . الثوبا



نُصُوفُ الزَّيْتُون



نُصُوفُ الكَرْمَةِ



نُصُوفُ اللَّيْمُونِ



نُظْ



نُظْ

متاقية متعة كاملة اهليجية تصغر عند تجفيفها ويستخرج منها ومن خلا السوق مادة خضابية صفراء اللون . انزعارها خاسية الفصل والبتلات ، حديدية الاسدية ، ثمارها عنبية ، صغيرة القند ، حلوة || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٤٨٨٠ - لُطْر الصَّبَاغِين (S). *Symplocos tinctoria*

Symplocos des teinturiers, Lotur des teinturiers (F).
نوع من اللطر السبروتي . هذه البلاد الايركية . ثمرته تملو من مدين الى سبعة امتار . اذناها واقلها الى السهبة . اوراقها حاملة ، نصلها سيمك الصفحة سكري العظم . انزعارها خضبة التجميع ، صفراء اللون ، فواحة العرف العطري . انزعارها يستمر طوال شهر نيسان .

٢٤٨٨١ - لُطْر اليابَان (S). *Symplocos japonica*

Symplocos du Japon, Lotur du Japon (F).
نوع من اللطر التريبي مهده اليابان . ثمرته تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها ابيدة ماسية . انزعارها صفودية التجميع ، لونها الى الصفرة الباحة . ثمارها حراء اللون . انزعارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٤٨٨٢ - لُطْر عُنُقُودِي (S). *Symplocos paniculata, S. crataegoides (S). Symplocos paniculata, Lotur paniculé (F).*

نوع من اللطر السبروتي . هذه الشرق . ثمرته تملو من ٤ الى ١٢ م . ساقها فراء . اقلها زباء . اوراقها حاملة ، نصلها سنن الحافة ، خلي البشره حل صفحتها الغل . انزعارها متكرية التجميع ، محورية الارتكاز وتاجية . لونها الى الالبيض او الاسفر . ثمارها كروية ، قطرها نحو ٨ سم . لونها الى الزرقه || انزعارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٤٨٨٣ - لُطْر عُنُقُودِي (S). *Symplocos en grappes*

هو الايلاك يستخرج منه مادة قلبية تدعى لطرين .

٢٤٨٨٤ - لُطْرِيَّات (S). *Symplocaceae (F). Symplocaceae (E).*

فصيلة نباتية كانت في التصنيف الماضي سبطا من الاسطركيات . اشهر اجناسها اللطر .

٢٤٨٨٥ - لَطِيَّات (F). *Lécythidées (F).*

سبط من فصيلة الآسيات ، نباتاته لا قياسية الانتظام الوردي تتميز بخلوها من الجيوب الانفرازية .

٢٤٨٨٦ - لَطِيَّسَة (S). *Lepas (S).*

Lépas, Anafie (F). Lepas (E).

جنس دوبيات بحرية وبهرية من القشريات الدنيا هدايات الارجل وفضيلة الطيسيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار واهر العالم || اجسامها صغيرة . عيونها مزودة . الخلفها خامية القطع . ارجلها الصدرية هداية || جميعها تتصلق بانابيب كلسية المادة تشبه التنازل تشدها على الصخور المغسورة وعلى وحاف المرجان وعلى الاعشاب العائمة والمراكب .

٢٤٨٨٧ - لَطِيَّسِيَّات (S). *Lepadidae (F). Lepadidae (E).*

فصيلة حيوانات بحرية من القشريات هدايات الارجل . اجناسها قليلة العدد اما انواعها فكثيرة منتشرة في جميع بحار العالم || تتميز بمخالبها التي تنشب في كل شيء . معذور من الصخور الى الاصمك .

الى الصفرة تملوا زراكتي مختلفة . سمراء اللون . تسرا في الشتاء من كانون الاول الى شباط || لحمها بيض الصفه مستحب الطعم مرغوب فيه .

٢٤٨٧٢ - لُطْ بَحْرِي مِيدُول (F). *Lotte de mer vulgaire (F).*

سمكة بحرية تدعى كواحة مبلولة ، اطلبها .

٢٤٨٧٤ - لُطَّاس (S). *Molothrus (S). Molothre (F).*

جنس طير من فصيلة الكاروجيات . انواعه المعروفة نحو ١٢ جميعها من طيور القارة الامريكية . ثالث السباب والمراعي وصفات مجاري الماء . نظامها الحياتي جماعي . تجمعاتها لاقامية العدد منها الفوج ومنها السرب || اجسامها تطول من ١٧ الى ٢١ سم . مناقبها غرورية ، صغيرة وقوية . اجنتها متصلة الطول . اذناها مستديرة الاطراف . ارساغها مستدلة الارتفاع . اظفارها متباينة التضييق . انثاها اصفر قدما من ذكورها وابنت خضابا . وهي لا تحسن البيض بل تقعه في اعشاش غيرها من الطير ولا تضع في العش الواحد اكثر من بيضتين . يرجع انها تبيض في موسمها الحولي من ١٢ الى ١٤ بيضة || قوتها الخشترات المختلفة وبعض البذور البرية || اعرف انواعه واشهرها لطاس الماشية .

٢٤٨٧٥ - لُطَّاس المَاشِيَة (S). *Molothrus pecoris (S). Molothre des troupeaux (F). Cowbird (E).*

طائر من اللطاس . موطنه بعض مقاطعات امريكا الشمالية . يألئ المراعي وصفات مجاري الماء . قوته يمد من ٢٠ الى ٤٠ زوبا || جسده ريش القرام يطول نحو ١٨ سم . لونه اسود اللون يعلو موج ازرقي في الظهر والصدر . حلقه ميتة سوداء . مناقده ورساغ الى السرة السوداء . الاثنى عادية الموج الازرق || اخلاعه مرسة ، حنسية . قوته الخشترات ويصط البذور البرية . يراقق قطان البقر والبيسون فيجمع على ظهورها ويقضي على الاساريع والكرزود التي تكثف جلودها || الاثنى تقبش البيض في اعشاش غيرها من الطير .

٢٤٨٧٦ - لُطَّاسِيَّات (F). *Dématiées (F).*

عمارة طيور مجهرية من فصيلة الكتنيات . تتميز ببهجها الملون الشديد لاسرة || اجناسها ثلاثة : الخش والزعيمية والنشابة .

٢٤٨٧٧ - لُطَّاسِيَّات (S). *Dematiaceae (S). Dématiacées (F). Dematiaceae (E).*

فصيلة طيور مجهرية من مرتبة الحفانيات ورتبة الزروحيات . تتميز بهجها وكتانها السوداء اللون ، بوجها ثنائية الخلية ، شبيها فرعي اللؤلؤ || اجناسها عديدة تجميعها اربع صارات : الغيات ، الريدانيات ، الزرانيات والزناغيات .

٢٤٨٧٨ - لُطَّاس (F). *Macule (F). Macule, Stain, Spot (E).*

Symplocos (S).

Symplocos, Symploque, Lotur (F). Lohd tree (E). Lotbaum (D). Simplocos (I).

جنس اشجار وشجيرات برية وزيانية من اللطريات . انواعه نحو ١٦٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة . اوراقها



لُطَّاس المَاشِيَة



لَطْر



لَيطَة

الطول . ميناها صغيرتان ، ناشرتان . زبانتها دقيقتان
كوبلتها قمي الشكل . حقيقتها صغيرة . حنجرتها ظهورانيا
ممشحان بالأحمر والأسمر . ظهرانيا ينادي اللين ، أصفر
العروق . روثانها غشاقان . يلقها إلى الخلف الأسمر .
يقطعه حنار مصدف . قوائها نضيفة ، حنطية ، سمراء
المزاج || تألف المروج والحقول واليابسين . قوتها ثلاث
الأزهار والأوراق الغنية .



لغسوم

Lagopède (F).

٢٤٩٠٢ - لُغِيد

هو المغد ، أطليه .

٢٤٩٠٣ - لُغِيرِيس الرُّقُوقُ

Lygis du prunellier (F).

قراشة مزرققة مشهورة باسم أرقية الخوخ . أطليها .

Lagotomus (S).

٢٤٩٠٤ - لُغُسُومُ

Lagotoma (F).

حيوان لين قاضم وجه الجنس والنوع من فصيلة الشفليات.
موطنه فياني أمريكية الجنوبية . جسمه ربع القامة بطول
من ٥ إلى ٦٠ سم . وذنبه نحو ١٨ . ظهره مقوس الشكل .
رأسه عريض القامة . مقضه قصير مقطوم . سباله
كثيفة الملب الجامد . اذنانه ممدتان بارتزان . جمرانه
الامامية قصيرة ثلاثية الاصابع والخلفية طويلة رباعية
الاصابع . اظافره قوية حادة || جمره فصح الرباعية
يتألف من اربع رداء متراكبة فوق بعضها . مدخله وغارجه
انفاق عديدة تمررها هذازير متصالية ، تتجمع فيها الاناث
من ١٠ إلى ٢٠ يحافظ عليها ويصحبها ذكر واحد || قوته
الاحشاب والجذور وجميع المواد النباتية يتغذى الى مدخل
جمره || يعيش بجوامع كثيرة العدد . تبلغ مساحة
قريته في بعض مناطق الاروفاي نحو ٤ كيلومترات مربعة .



لغوريش

٢٤٩٠٥ - لُغُلُغُ هو اللقلق الاسود ، أطليه .

٢٤٩٠٦ - لُغُو هو لبح الكلاب .

٢٤٩٠٧ - لُغُورِيش

Lagothrix (S).

Lagothricha (F).

جنس قروء امريكية من فصيلة السيبسيات موطنها البرازيل
والنويان وكولومبيا والبيرو || اجسامها تطول نحو ٧٥ سم .
واذنانها كذلك . التواهب الى الكفة السوداء المزاج . شمارها
ناعمة لينة ووثيرة || له نويان بالآلاف الغابات والاسراج
الجبلية . قوتها الجار .

٢٤٩٠٨ - لُغُولِيَا

Lagoecia (S). Lagoecia (F).

نبات عشبي بري طيب من السكيات . يملو نحو ذراع .
اوراقه مركبة ، مشطية ، بحرية اللين . ازهاره غريبة
التنجيع لوها الى الزرق . يزود طيبة وهي دقيقة مستطيلة
حنطية اللين مرة الطعم حريفة تغيد الصدر وقتي البلغم
وتقضي على الريح والمغص .

٢٤٩٠٩ - لُفَاح

Mandragera (F). Mandragora (E).

هو اليربوع ، أطليه . ويدي السابريك . قيل وينسي
المقد . قال الانطاقي : ه وهو يسكن غليان الدم والسفراء
وسرقة البول والخفقان ويقطع الاسهال والدم شرابا ويسكن
الصران مطلقا وكذا الصداع للاء . ويسيت فيمنع الهر
والقلق .

٢٤٨٨٨ - لُغَاب ، لُغَم ، لُغَام

Saliva (F).

Saliva, Spit (E).

اللغاب واللغم غليط حاصل من افراز الشدد اللامية
والغاطية للغم . وهو نويان : اللغاب التكني أو المصفي
واللغاب اللبي . أما اللغم اللامية فهي حل ثلاثة انواع :
التكنية والتكنية واللسانية || أما اللغام فهو زبد الجبل
يقذفه من فيه .

٢٤٨٨٩ - لُغَابَات

Racines de mandragore (F).

Roots of the mandrake (E).

جذور الفلاح غراسها كثيرة النفع تستعمل في الصيدلة .

٢٤٨٩٠ - لُغَادَة

Ethologie (F). Ethology (E).

درس حياة احيوان ونشاطه الجسموي والخلقي في محيطه
الطبيعي .

٢٤٨٩١ - لُغَامَة

Légume tendre (F).

New green (E).

كل نبات لين من احجار البقول . واللغامة ايضا ج لغام .
وفي القول المأثور : «أما الدنيا سامة وبتاعها لغامة» أي
قليل البقاء كالنبات اللين .

٢٤٨٩٢ - لُغَل ، يَاقُوتُ أَحْمَرُ

Rubis (F). Ruby (E).

حجر كريم من الاولين المبلور الشفاف ، لونه الى الحمرة
الصنائية الزاهية . اجوده ما جاء من التبت والهند .

٢٤٨٩٣ - لُغُلُ هو الحليزيه ، أطليها .

٢٤٨٩٤ - لُغُلُغُ

Réfringent (F).

Refringent, Refracting (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما يحل بخاصية كسر الاشعة
الضوئية أي تغير اتجاهها .

٢٤٨٩٥ - لُغُلُغَة

Réfringence (F).

Refringency (E).

اللمعة خاصة تتميز بها الاجسام بكميها للشفافة بكميها للالزمة
الضوئية .

٢٤٨٩٦ - لُغَم

Saliva des reptiles apodes (F).

Saliva of apodous reptile (E).

الغم لغاب الزحافات المرقالة أي العادة الارجل كالحيات .

٢٤٨٩٧ - لُغَوَة

Chienne (F). She dog (E).

هي الكلبة وبهم من غصها بالكلية الحائل . قالت العرب :
أجرع من لومة وأضجع من لومة .

٢٤٨٩٨ - لُغُوسُ هو اللذب ، أطليه .

٢٤٨٩٩ - لُغِيِثُ

Lablé (F). Labiate, Lipped (E).

نعت تعريفي يطلق على كل زهرة مغلفة التويج كالشبتين .

٢٤٩٠٠ - لُغَارِيَتَمَة ، لُغَارِيَتَمَة

Logarithme (F).

Logarithm (E).

علم انساب الاعداد .

٢٤٩٠١ - لُغَاسُ المُرُوجُ

Lygis pratensis (S).

Lygis des prés (F).

حشيرة غاضلة من فصيلة الضمحيات . جسمها صغير القد
يطول نحو ٧ م . ثوبها متراكب الشفة والصفره وتتمتع
ابيض واسمر وأحمر . رأسها صغير عرسم . خطمها مستدل



لغوليا

وهو على الدورات وشاح اسمر اللون يلحف البشرية بكاملها او يجزم منها فسطحها ويتلفها || يكافح باستعمال اسد الفواطير الحديثة او مخلول بوردو المركز على الشكل التالي :

سلفات النحاس ٣ كيلو
كلس حراق ٣ كيلو
مساه ١٠٠ لتر

ويتم من فضل مخلول « بورفينين » المركز على الشكل التالي :

سلفات النحاس ٣ كيلو
كربونات الصودا ٣ كيلو
مساه ١٠٠ لتر

٢٤٩١٨ - لَفَافَةُ الْبَيْض *

Phytophthora nicotianae (S). Black shank (E).

وصم يسببه فطر مجرمي يركب البع في المثلث وفي الحقل. مظهره الخارجي على شتول المثلث يبدأ باسوداد بعض السرخ والجذور ثم ينتهي بالمريان والاضمحلال || وهو على شتول الحقل، في اولى عهده ، بقع تظهر على الاوراق بيضيه الشكل ، لا قياسه الحميم . كونه اشد اخضراراً من السرخ الذي يحيطها ثم يتحول تدريجاً الى الشقرة فالصبغة الفاسدة ضمن اطراف خضبة فاصلة قليلة الوضوح . وفي دوره النهائي يذبل الاوراق ويصب السوق ويسبب اسودادها من السرخ وساحداً على ارتفاع ٢٠ او ٣٠ سم. وعند شق او فلق الشتل المصاب ينمو مكافها جافاً منفصلاً متقطعاً اسود اللون || يكافح في المثلث باستعمال الفواطير المركزة على النحاس او الزنك ويكافح في الحقل باجتناب الزراعة في التوالع الرملية .

٢٤٩١٩ - لَفَافَةُ الشَّمْسِ

Coup de soleil (F). Sun scald (E). عارض يصيب ماء الانجار في خلايا نسيجها البشرية والحيالية سببه اشعة الشمس الحارقة التي ترشها وتستهويها قسراً لواء السوق المرفوعة الى الجنوب ثم يدركها البرد القارس فجأة فسطحها ويسبب يباسها || يكافح بفسل السوق بالكلس لان اللون الابيض يمنع تخزين الحرارة .

٢٤٩٢٠ - لَفَافَةُ الصَّبَّارِ ، لَفَافَةُ النَّفَمِ

Phytophthora cactorum, Ph. omnivora (S). Pourriture du collet, Maladie des sams du hêtre (F). Crown-rot, Omnivorous phytophthora disease (E). Kragenfäule, Keimlingfäule (D).

وصم مؤق يسببه فطر مجرمي يركب مختلف النباتات اللحمية وشاتل النباتات الحرجية ويترى النغم بمعدنه فيغيبه . مظهره الخارجي بقع شقر ثم سمر ، لا قياسه الشكل والحجم تقلب فيها الاضطالة ، تلعب بالنسج فتصيبها || يكافح كثيره من ظهور اللعنة بمركبات النحاس او الزنك .

٢٤٩٢١ - لَفَش * ، لَفَافَش

Distichodus (S). جنس اسماك ثورية من مقتوحات المثانة وقصيلة السلونيات. انوامه المعروفة قليلة العدد اجسامها مستطيلة ، ملاحظها معدية ، اعطائها مقلقة . سهها صغرى اللد برياني الطرف . اشهر انوامه لفش النيل الذي يطول نحو ٦٠ سم. ثوبه الى الحصار القضي الموج .

٢٤٩٢٢ - لَفَافِل

Cuscute (F). هو الكشوث ، الحلبه .

٢٤٩١٠ - لَفَافَشَة *

Salmo salvelinus (S). Ombie, O. chevalier, Salvelin (F). Char (E).

سمكة ثورية بيض من السلونيات ، اعطائها معظم بحيرات اوروبية وتركيا || جسمها كبير القد ، يطول نحو ٨٠ سم. ثوبها ، عند اكثال نموها ، ثنائي اللون ، ظهرها والقمم الاكبر من جانبها الى الربعة الخضراء . بطنها وما تبقى من جانبها الى الصغار البرتقالي يعلو موج وردي يبق عند حافة البطن . اما ثوبها في طور النمو فكثير التلط الأبيض || لحمها فاخر الصنف يعتبر من اجود لحوم اسماك المياه العذبة .

٢٤٩١١ - لَفَافَةُ الْوَرْدِ *

Blennocampa pusilla (S). Rouleuse des feuilles, Tanchra des feuilles du rosier (F). Rose leaf sawfly (E). Kleinste Rosenblattwespe (D).

حشرة من الفطريات ، جسمها صغرى اللد اسمر اللون . ورقاتها مستعدة غشاء اللون تميش على ورق الوردة فتلفه وتلتصق به ثم تروده وتضي عليه .

٢٤٩١٢ - لَفَافِيَة

Diploëne (F). جنس ثالاث جنسية من السذابيات تدعى عيت ، اطليا .

٢٤٩١٣ - لَفَت *

Brassica rapa (S). Rave, Navet (F). Rape, Turnip (E). Wasserrübe, Welsche-Rübe (D). Raps (I).

بقلة زواحية من فصيلة الصليبيات ، جذرها مستدير الشكل مقلط ، عرقل طرياً ومطبوخاً وخلاً ، ومنه شرب علفية كبيرة تأكلها الابقار والخنازير || يزود زيتية طيبة تحوى بعض الفسفور والمواد الحارقة الحمضية . وقد شاع استعمالها للانماط منذ زمن الفراعنة الذين اطلقوا عليها اسم (دجم) اي يزود اللفت او زيت يزود اللفت.

٢٤٩١٤ - لَفَت بَرِّي

Raplanca saline (F). هو القيتوه الرطبة ، اطليا .

٢٤٩١٥ - لَفَتِيَّة

Napiforme (F). Napiform (E). تمت تعريفه وصي يعلق على الجذور القصيرة المستطيلة التي تشبه اللفت .

٢٤٩١٦ - لَفَنَة

Phytophthora جنس ظهور مجرمية من مارة الوصليات وقصيلة الصناتيات تتميز بنمطها البولية الناجية الارتكاز والتشمب || انواعها عديدة . اشهرها واغبرها للاقتصاد الزراعي لفنة البطاطا ولقعة البتبع .

٢٤٩١٧ - لَفَنَةُ الْبَطَاطَا * ، مِلْدِيُو الْبَطَاطَا

Phytophthora infestans, Botrytis infestans, B. devastatrix (S). Mildiou de la pomme de terre (F). Potato blight (E). Kraut-und knollenfäule der kartoffel (D).

وصم وبخى العالمة يسببه فطر مجرمي يترى معظم ثالاثات الفصيلة الباذنجانية واعضاها البطاطا والبندورة || يركب الورق والسوق والجذور والدرنات . مظهره الخارجي على الاوراق يبق لا قياسه الشكل والحجم تبدو حطية اللون ثم تتحول الى السرة يقابلها على صفحة النصل السفلى غبار ابيض فسجالي ، يطو حمار البقع فيحدها ويستقر بعض الرقت ان لا يشمل القليل كامل النصل فيطرح به .





لقوت للتوسط

٢٤٩٢٩ - لِقْ • • • لِقْه
Pompilus (S).
Pompile, Centrolophe (F).
 جنس حشرات من فصيلة اللقيات . أنواعه عديدة منتشرة في معظم البلاد المعتدلة الحرارة . جميعها متوسطة القد هيئات الجسم تطول نحو ٣ سم . ألوانها إلى السواد الامع يميل لجميع مفرس احر اللون او اصفر . تتميز بقتصها وتغذرها النكابت التي تغذرها في مكانها كذا لبنها الخديث النصف .

٢٤٩٣٠ - لِقَاق
Inoculum (F). Inoculum (E).
 الجرثومة النقية السالحة للتطعيم .



لقية

٢٤٩٣١ - لِقَاق ، طْعَم
Vaccin (F).
Vaccin matter (E).
 فوعة محدودة الفاعلية النسبية تحقق في جسم الحيوان لوائته بعد حدوث الحفظة المقصودة .
٢٤٩٣٢ - لِقَاق ، لِقَاعَة
Etaules, Glanure (F).
Gleanings (E).
 ما عظمه الحاصد من السبلل فتلقته الناس .



لقيم

٢٤٩٣٣ - لِقَاق • • •
Colaptes (S).
Colaptes (F). Flicker (E).
 جنس طير من فصيلة الثقاريات ودية المتسلقات . أنواعه المعروفة ستة جميعها امريكية المله إلى اجسامها معتدلة القد تطول من ٢٧ إلى ٣٠ سم . بسطها مزاج من ٤٠ إلى ٤٥ سم . ألوانها إلى السمره السوداء المبلغة والمرقطة بالاصفر والاحمر والاشهب . تتميز بمناخها المستعرة بالقواصة وباراسها المستطيلة || قوتها الاسراع والديهان والنمل والغشرات ولتثار البرية والبلور والبطون . هي من الطيور الحازنة التي تجمع البلوط في تجاريف الاججار ويجريها قوين بذلك مونة فصل الشتاء || انثائها تكمن في تجاريف الاججار وفي صناديق وتبيض من ٦ إلى ٧ بيضات على مرتين في الحول . الصغار تسرح في طلب القوت بعد التفك باسبوعين || أشهر أنواعه المعروفة :



لق

Colaptes chilensis (S).
Colaptes du Chili (F).
Colaptes mexicanus (S).
Colaptes du Mexique (F).
Colaptes auratus (S).
Colaptes doré, Pic doré (F).

لقاط البلي

لقاط المكسيك

لقاط ملعب



لقاط

٢٤٩٣٤ - لِقَاعَة البَقَر • • •
Hypoderma bovis (S). Hypoderma du bœuf, Varron (F). Ox warble fly, Cattle grubs (E). Dassefliche (D).
 حشرة من الصيديات ، طولها يراوح من ١٢ إلى ١٥ سم . وهي كبيرة الرأس ، قصيرة الطعم ، مستطيلة المزج . تنح مكبا على ظهور البقر فينتفح من رقعات غليظة بيضاء تغلقها البقرة بلسانها من جملها إلى سطحها فيطبخا حيث تنسل ورتي حتى التسح الجلدية فتتقبح الجلمع مع انتهاء دورها البرقي وتنسقط على الارض فتختبئ في التراب وتتولد الى كزود ثم الى حشرة تعيد سيرتها الازل .

٢٤٩٣٥ - لِقَاعَة الْحُلُجُوم • • •
Lucilia bufonivora (S). Lucille du crapaud (F).
 حشرة من الصيديات ، طولها يراوح من ٨ إلى ٨ سم . ألوانها إلى الخضار القاتم تكثر في الأماكن الرطبة . رقعاتها طفيلية تركب جمع الضفادع اغصها للحلجوم .



لقاعة البقر

٢٤٩٢٣ - لَقُوت • • •
Lophotes (S). Lophote (F).
 جنس املاك بحرية من فصيلة المتجليات . أنواعه المعروفة قليلة العدد اعطاهما بحار البلاد الحارة والمعتدلة . اشهرها لقوت المتوسط .

٢٤٩٢٤ - لَقُوت المتوسط • • •
Lophotes cepedianus (S). Lophote de la Méditerranée (F).
 نوع من اللقوت وهو ممكة بحرية مأكولة لحما متوسط الصنف . جسمها مبسط الشكل يطول نحو ١٥٠ سم . زعنفتها الظهرية تمتد من لة الرأس الى طرف الذنب وتنتهي عند الرأس بقرن محدب مخروطي الجسم عظمي المادة . ثوبها الى الخضار الرصاصي تملوه رقعة بيضاء .

٢٤٩٢٥ - لَقِيعَة • • •
Laphygma exigua (S).
 فراشة من فصيلة الليليات موطنها البلاد الحارة . طولها يراوح من ١٢ إلى ١٤ سم . بسطها نحو ٢٥ سم . جسمها وروشتها الاباضين الى الرمادي العايق . ريشاتها الخلفيات والياض الاخرى ، اطرافها واعصاها سحر || الاثني اكبر قدأ من الذكر تمتع مكبا الذي يد نحو ٥٠٠ كتلا متفرقة لا تباينة الشكل والصدع على صفحات اوراق القطن السفل فينتفح بعد مته بثلاثة او اربعة ايام من رقات تسليخ خمس مرات . طورها البرقي يدمج من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع وقد يطول اكثر من هذا في الشتاء . ثم تتحول في البرية الى طرداء || اجسامها الحولية معتدلة . الصبي يدوم نحو ٦ اسابيع وللشعري من ٤ الى ٦ اسابيع || رقاتها تدعى دودة القطن الخضراء ، اعطاهما .

٢٤٩٢٦ - لَقِيعُولُز ، لَقِيعُولُز
Larvacea (F).
Larvacea (E).
 ضرب من السكر ينتمي الى فئة التلوكوز يوجد في معظم ثمار الفاكهة وفي اللسان والاسفل .

٢٤٩٢٧ - لَقِيم • • • ، هَوَيْسَة ، أَم هَوَيْس
Lophomyia imhausi (S). Lophomyia d'imhaus (F).
 حيوان لبون قاصم من فصيلة القويويات . موته يمتد من حوض البحر الاخر الى الحيشة . يألف البرير والادغال والحراج المتناحاة الاججار . ملجته الحياتي جماعي . جماعته قليلة العدد || جسمه مستطيل الشكل ، يطول نحو ٤٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٥ سم . يتميز بكثرة في البرير المستطيل الحشن تمتد من قفن الرأس الى اواخر الزام الثالث من الذنب . رأسه صغير القد ، مخروطي الشكل ، مبسط الجرم . سبالة كثيف مستطيل . مينا وذاته معتدلة . قوائمه قصيرة ، خاصة الاصابع . ثوبه الى الكلسه السوداء يعلوها تمصيح الغبر في الرأس والظهر والبطن . طرف الذنب امرط حاد البرير || سرجه دجوي . يتسلق الاججار بقفة السحاب . قوته الجلود والاوراق والحبوب والبلور .

٢٤٩٢٨ - لَقِيمِيَّات • • •
Lophomyiidae (S).
Lophomyiidae (F).
 فصيلة حيوانات لبيفة من ودية القواصم . اجسامها وانوامها قليلة العدد . اعطاهما تمتد من حوض البحر الاخر الى افريقية الشرقية والحيشة والسودان وافريقية الوسطى || اجسامها معتدلة القد ، مستطيلة الشكل ، كثيفة البرير ، مستطيلة السبال والاذناب الكاسية . قوائمه قصيرة ، خاصة الاصابع . حادة البرائن القليلة التسحب || جميعها شاجرة . قوتها الجلود والاوراق والحبوب والامار وبيض البلور .

Glanage (F). Gleaning (E).

اللقط واللقاط هو جمع السبايل التي يخطتها الحاصد خفيقي في الحقل بعد الرياء .

٢٤٩٤٧ - لَقَطَلَة

ه بقلة طيبة تبعها الدواب ه ج . لقط .

Défaut apparent (F).

Visible default (E).

٢٤٩٤٨ - لَقَع

العيب الظاهر .

Happer (F). To snatch (E).

٢٤٩٤٩ - لَقَفَ

Parol (F). Coat (E).

٢٤٩٥٠ - لَقَفَ

القف جانب البئر والحوض ه ج القاف .

Ciconia (S).

٢٤٩٥١ - لَقَلَقَ ه لَقَلَقَ

Cigogne (F). Ciconia, Stork (E).

اللقلق ج . لقالق . جنس طير من فصيلة اللقليات ورتبة طول الساق . صوته لقلقة . انواعه خمسة جميعها من القواط طويلة السيقان والاعناق والمنائر . قوتها الانعامي والبرذآن والخشرات والجيف والتفانيات ه اشهر انواعه .

٢٤٩٥٢ - لَقَلَقَ اَيْضَ * ه بَلَّارَجَ ه اُبُوْحَدَيْج

Ciconia alba (S). Cigogne blanche, C. commune (F). White stork (E).

نوع من اللقلق ابيض الثوب ه اسود القوام ه احر الساقين والمنائر . طوله نحو ١١٠ سم . وبسطه نحو ٢٣٠ سم . يسكن من ايران الى العراق وآسية الصغرى وأروبة وأفريقية الشمالية والجنوبية والشرقية حيث يعيش فصل الشتاء ثم يهجر البحر الى ايران والعراق .

٢٤٩٥٣ - لَقَلَقَ اَسْوَدَ ه عَنَزَ ه اَبُوْسَعِيد

Ciconia nigra (S). Cigogne noire (F). Black stork (E).

نوع من اللقلق طوله نحو ١٠٠ سم . وبسطه نحو ٢١٠ سم . اسود الثوب ه ابيض الكتفين والذنب والصدر والبطن والافئنيك ه احر الساقين والمنائر . مسرته يشمل الهند ومنشورية وآسية الصغرى وأروبة وأفريقية .

٢٤٩٥٤ - لَقَلَقَ اَلْاَقَامِي

هو الكرم المتوج ه اطلبه .

٢٤٩٥٥ - لَقَلَقَ حَبَشِي * ه عُنَاز

Ciconia abdimii (S). Cigogne d'Ethiopie (F). Ethiopian stork (E).

نوع من اللقلق . طوله نحو ١٠٠ سم . وبسطه نحو ٢٠٠ سم . ثوبه الى السواد الابريواني . المواج . بطنه ابيض . رأسه وقوامه سود . حقه وبقاؤه وسقاء حر . يكثر في الجبسة ويحوي معظم الاقطار الافريقية .

٢٤٩٥٦ - لَقَلَقَ مَسْرُوجَ المِثْقَالِ

هو المكثير الاثري ه اطلبه .

٢٤٩٥٧ - لَقَلَقِي ه من الطير ه اطلبه .

٢٤٩٥٨ - لَقَلَقَات

Ciconiidae (S).

Ciconiidae (F). Ciconiidae (E).

فصيلة طير من طول الناق ورتبة بلشويات الشكل . انواعها المروفة ١٧ بعضها ابد اعطانه البلاد الاستوائية وحارة والبعض الآخر قاطع يحوي البلاد في طلب المصيف والمشي ه ملجئها الحيواني زويجي وجماعي . قوتها الصفاد

٢٤٩٣٦ - لَقَاعَةُ حَمَلِيَّة * ه

Lucilia sericata (S).

Lucille soyeuse (F).

حشرة من الصديديات ه طولها راوح من ٧ الى ١٥ م . جسمها خيل البشرة يكثر ويبدوها من اذار الى تشرين الثاني . يرقاتها هواكة وثائلة وقد تكون وانجة وبطيالية .

٢٤٩٣٧ - لَقَاعَةُ قَيْصَرِيَّة * ه

Lucilia caesar (S). Lucille impératrice (F).

حشرة من الصديديات ه طولها راوح من ٧ الى ١٢ م . تغزل من نيسان الى تشرين تكثر على الازهار والاقطار المعرضة لاشعة الشمس ه يرقاتها وانجة وهواكة . تركب الحيوانات الكفارية .

٢٤٩٣٨ - لَقَاعِيَّات

Calliphoridae (F).

هي الصديديات فصيلة حشرات ذبابية من ذوات الجناحين .

٢٤٩٣٩ - لَقَالَقَة

Freluche (F). Butterfly-net (E).

جيب ه غرطلي الشكل ه من النسيج الناعم اللين ه يستعمل لاقطاص الحشرات والقرارات .

٢٤٩٤٠ - لَقَامَة

Phagocytosis (F).

Phagocytosis (E).

عمل ارتشاف المتنامات والجراثيم التي تقوم به بعض الحبيريات الحيوانية .

٢٤٩٤١ - لَقَامَة

Phagocyte (F). Phagocyte (E).

اللقامة حبيرية في الجسم الحيواني وتلغظها اللقامة . وتسمى راعية وفافوسيت وهضامة .

٢٤٩٤٢ - لَقَامِي

Phagocyte (F).

Phagocyte (E).

نمت تعريفي يطلق على كل ما هو غصا باللقامة .

٢٤٩٤٣ - لَقَّةُ سَوْدَاة

Centrolophus niger (F).

سكة بحيرية تدعى رطمة ه اطلها .

٢٤٩٤٤ - لَقْس

Epinephus (S).

Epinéphèle (F). Epinephelus (E).

جنس اسماك بحيرية من فصيلة الصرايات ورتبة شائكات الزعانف . انواعه المروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم . اجسامها اطيالية الشوزن ه متوسطة الحجم ه مستطيلة الرؤوس ه مقطوعة الاطراف ه مسنة الزعانف الاسامية في الظهر والذنب . اثوابها كسنية اللون تملوها رقشة ملونة وبعض الاماجات الزاهية والمابقة ه اشهر انواعه اللقي الجبار والصغري والرملي .

٢٤٩٤٥ - لَقْسُ جَبَّار * ه صَرَّانُ جَبَّار

Epinephus gigas (S). Epinephèle géant, Serran géant, Merou (F). Epinephelus gigas (E).

سكة بحيرية يمرض من اللق . اعطائها البحر الابيض المتوسط . جسمها كبير القد اطيالي الشكل ه يطول نحو ١٠٠ سم . ثوبها الى الجوزة الخطية السمراء المواج تملوها رقشة لبراء مسوية التوزيع تكتنفها من الرأس الى الذنب ه لها منظر الخيل الالفس . فكاهها كيربان .

شغلها رجب . حينها كيربان ه مستندة التشوز . زعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة يملوها في اقسامها الاول مناسخ حادة ه زعنفتها الذيلية متفرجة الطرف المستدير ه لحمها متوسط الصنف ه مأكول .



لقامة قيصريّة



لقس جبّار



لقلق ابيض



لقلق حشوي

عابقة . تحمل في مؤخر اجنحتها الخلفية زوائد دقيقة . مكها مستدير الشكل . ذري القند . رقاها قصيرة فليقة تستطيع اخفاء رؤوسها تحت حلفاتها الصدرية الاول . غادارها عاريات . ياباتها لا قياسي النمط والشكل يختلف مع الاجناس . فيه المتدبة المائلة بلمعورها والمطوقة المائلة ببطانها والمنسقة والسالية . الخ .



لقطة الحمل الحبيفة

٢٤٩٦٧ - **لقطية البازيلا** * (S). *Lycaena baetica*
 Liché des pots (F).
 حشرة من القنديات كثيرة الانتشار في الجبل الحولي . اقلها حوض البحر المتوسط . يستطاع نحو ٣٠ م . ثوبا الى الزرقاء الجسيلة يملوه موج خلي واطار اغبر في الذكور ، اسر في الاناث . قرونها الاستشعارية دقيقة ، قوية الشكل ، صقية الطرف || رقاها عند اكبال تطورها ساطع طول نحو ٢٠ م . ثوبا الى الغبار الباقى يملوه موج بني لا يخلو من الاحمر ونض اسر قاطب وضطوط جانبية متعرجة غيرا اللون || تركيب البازيلا والباكية واكثر القنديات . تعيش داخل السفلات تلبم الحب وتقتني عليه .

٢٤٩٦٨ - **لقطية الصمتر** * (S). *Lycaena arion*
 Liché arion (F).
 حشرة من القنديات صغيرة القند ، زرقاء اللون ، مزرقة الرواشن . اناثها اكبر حجما من ذكورها واحسن لونا ولق زراكتش || رقاها دقيقة الجسم سمراء اللون وودية المراح . تركيب الصمتر حتى السلائخ الرابع ثم تقسم قري السل قتلهم الرصع .



لقطة النعجة

٢٤٩٦٩ - **لقطة** (F). *Alge femelle* (F). She eagle (E).
 القناب الاثني .

٢٤٩٧٠ - **لقطيات** * (S). *Leucostictes*
 Leucostictes (F). *Leucostictes* (E).
 فصيلة دوبيات بحرية من القنديات عشاريات الارجل محرمحات الاقواء || اجناسها وانواعها قليلة العدد ، نحو ٥٠ ، منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها صغيرة بيضية الشوزن او مكورة . عمودية الطور ، مغرصة القفصم والمؤخر . ملاصقتها دقيقة ، مسطيلة ، سننة الشفار الداعلية .



لقطية البازيلا

٢٤٩٧١ - **لقطية** * (S). *Leucothoe*
 Leucothoe (F). *Leucothoe* (E).
 الاسم العلمي من الميثوربوسيا الافريقية . جنس جنبات برية وزراعية تربيانية من فصيلة الخنثنيات . منها بعض الاصناف الامريكية . سوطها متعرجة تلو من متر الى ثلاثة امتار . اوراقها متعاقبة ، سننة الحدار . ازهارها خاسية النصل ، اسطوانية التبروعات ، عشارية الاسدية ، يكثر فيها اللون الياض || انواعها المعروفة عديدة ، اشهرها التالية .

٢٤٩٧٢ - **لقطية حبيفة** * (S). *Leucothoe catesbaei*
 Leucothoe catesbaei (S). *Leucothoe spinulosa* (F).
 نوع من القطية التربيانية . ساقها فرعاء تلو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها مسننة . انتقلت الى الحرة . نصلها احليجية ذرية مسننة الحدار ، مسطيلة الانسان الحسنة الشاذكة . ازهارها غمي التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها بيضاء اللون ، ناضلة العرف التله || تنويرها يستمر طوال شهر ايار .



لقطية الصمتر

والعطاء والعاين والاسماك والقناريات والقناريات الصفيرة والحشرات . بعض انواعها ، احصها الكبير ، يعيش على الجبل وقد يتعدى النور التي تحشاء عندما تصيب جيفة || اجسامها عصبية متباينة الهجوم ، منها الوسطى والكبيرة . تتميز باستطالة القوائم والمنقذات الكبيرة ، المستقيمة ، الذرية ، الرشبية الشكل . جميعها بكية ، عادة الجهاض الصوت || تدن اعشاشها في المواقع الرقيقة وفي اعالي الانجار الباسقة . اناثها تنفع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوية الكفور من ٣ الى ٤ بيضا .

٢٤٩٥٩ - **لقطة** (F). *Condyle* (F).
 تنوع المفاصل او حيد مستدير في العظام .

٢٤٩٦٠ - **لقطة الحمل ، لوتش ، قندول** * (S). *Alternanthera* (S). *Alternanthera* (F). *Chaff-flower* (E). *Weckelskölbchen* (D). *Alternanthera* (I).
 جنس نباتات برية وزراعية بقلية من فصيلة القطيفيات . انواعها نحو ١٠ جميعها اعشاب حولية او معمرة . اوراقها كثيرة العدد لا قياسية الشكل والحجم . ازهارها موزرة عائدة الطلادة يكثر فيها اللون الياض . اوراقها صلبة تنفع للمدة .

٢٤٩٦١ - **لقطة الحمل العفيفة** * ، **لقطة الغزال** ، **قندول لاطي** * (S). *Alternanthera* (S). *Alternanthera* (F). *Brède-chavrette* (F). *Sessile flowered globe amaranth* (E). *Garnelkraut* (D). *Alternanthera* (I). *molucca* (I).

نوع من لقطة الحمل اوراقها كبيرة القند لاطة . تركل مطبوخة . تنفع المدة وتقليد النض .

٢٤٩٦٢ - **لقطة القاصي** (F). *Ottalie* (F).
 هي اذن الشيطان ، اطلبها .

٢٤٩٦٣ - **لقطة النعجة** * ، **كباش** ، **مخيط** * (S). *Plantago ovata* (S). *Plantain* (F). *Spogel plantain* (E). *Spogel Wegerich* (D). *Lingua d'angelino* (I).

نوع من لسان الحمل وهو نبات عشبي ، مقري ، بري ، طبي ، معم ، يكثر في المواقع الرطبة .

٢٤٩٦٤ - **لقن** (F). *Lutage* (F). *Luting* (E).

٢٤٩٦٥ - **لقنة** * (F). *Lagune* (F). *Lagoon* (E).
 اقنفة كل بحر قريب القاع وقد تكثر فيه الحشاش والمخوم . ج ليقنا .

٢٤٩٦٦ - **لقنديات** * ، **هرقيات** * (S). *Lycanidae* (S). *Lycanidae*, *Lycnidae* (F). *Lycanidae*, *Hainbreaks*, *Gossamer wings* (E). *Blau-linge* (D).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اجسامها متوسطة القند ، قوامها الانامية ناقصة التركيب . اسراع ذكورها حيدة القلة . قرونها الاستشعارية تفلظ مع ابتعادها عن الرأس . اناها

Chêne chevelu (F).

٢٤٩٨٢ - لُكَاك

هو السنديان الأشعر ، اطلبه .

٢٤٩٨٣ - لُكَاك ، لُكَاكَة

داه يأخذ اللحم في اشنتها وشفاها وهو مثل القرع .

٢٤٩٨٤ - لُكَاك

اللُكَاك : الحجر البراق الالسل يوربد في الجص .

Lachesis (S).

٢٤٩٨٥ - لُكَاكَة

Lachésis (F). Lachesis (E).

جنس حيات سرلوة سامة من انبويات الاحاديد وفضيلة الانبيات . انواعها المروقة نحو ٤٠ موطنها بعض مناطق امريكا الجنوبية والوسطى اغصها المناطق الاستوائية || اجسامها كبيرة تغطي من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . رؤوسها خفيفة شبيه برؤوس ذوات الاجراس وتحتل مثلها بقتر واضحة بين العين والاذنوف . اعناقها دقيقة واذنابها كذلك . اذنانها تحمل من ١٠ الى ١٢ صف من الحراشف الشاذكة المشققة كالكلاليب . اولياها تختلف مع الانواع معظمها مرقط بالاصفر والاحمر والاشقر والاشهب || اشهر انواعها الكَاكَة الصاعدة والكَاكَة السانلة .

٢٤٩٨٦ - لُكَاكَة سَيَانِيَّة * ، سَيَان الرُوح *

Lachesis botrops (F).

Lachésis lancéolé, Fer de lance (F).

نوع من الكَاكَة . موطنها جزر الفيليبين . تألف الغابات والمواقع الرطبة . يكثر وجودها في زراعات المصان والموز . قوتها القتران والجذران والصفاد والمظاء والتانبر الصغيرة والطيور || جسمها يغطي نحو ٢٠٠ سم . ثوبها الى الصفرة النحاسية الموج . سمها ناعم . لدغها تقضي على الانسان باقل من ثلاث ساعات .

٢٤٩٨٧ - لُكَاكَة صَامِيَّة *

Lachesis mutus (S).

Lachésis muet (F).

نوع من الكَاكَة . موطنها بعض مناطق امريكا الاستوائية . تألف الغابات الرطبة ولا تقترب من الاماكن الآكلة . قوتها كل ما استطاعت اليه من حيوان وطيور || جسمها يغطي نحو ثلاثة اشرار . ثوبها يراوح بين البرتقالي والاصفر الى ملوح تراوين سود رقيقة شهاب || سمها زائف . لدغها تقضي على الانسان باقل من ساعة .

Odynerus (S).

٢٤٩٨٨ - لُكَاك *

Odynerus (F). Odynerus (E).

الواحدة لكَاكَة . جنس حشرات قاضية وثابة نافعة من الحسويات فشايات الاجنحة المنصورة وفضيلة الدغيات . انواعها المروقة نحو ٣٠٠ منتشرة في جميع اقطار العالم || اجسامها متوسطة القد وحماها كذلك . اولياها ملونة يكثر فيها الاسود المجلع بالاصفر الالصاني او البرتقالي وبغصها جلوي مجذع بالاصفر الذهبي ونبها الآخر القرميدي المجلع بالاصفر الكبريتي والاسود || تصفن في التربة والحيطان والاشجار النخرة وفي سلايات القصب . اصنافها رداء رعية غمرطية المداخل المستطيلة || قوتها الاساريع والعايس تقتنصها فتخدها وتنقلها الى اصنافها زائد لها ولبقاتها .

٢٤٩٨٩ - لُكَاك * ، رَيْسِي * Rhaps (S). Rhaps (F).

الواحدة لكَاكَة . جنس نباتات تزيينية من فصيلة النخلات .

٢٤٩٧٣ - لَقُوطَة حَوْرِيَّة الورق *

Leucothoe populifolia (S).

Leucothoë à feuilles de peuplier (F).

نوع من القوطَة التزيينية . ساقها فراء تملو من مترين الى اربعة اشرار . اغصانها عادة الخمل والزغب . اوراقها نازرة المروق على الصفحات السفلى ، طويها يراوح من ٨ الى ١٢ سم . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها مستطيلة المالحق ، متدلية ، لونها الى الياض العاصي || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٤٩٧٤ - لَقُوطَة سَلْبِيَّة *

Leucothoe racemosa (S). Leucothoë à épis (F).

نوع من القوطَة التزيينية . ساقها تملو من متر الى ثلاثة اشرار . اوراقها حاملة ، يضيئة النصل ، ذلقة الزام الاخضر ، تغطي نحو ٧ سم . وتعرض نحو ٣ سم . ازهارها سبلي التجميع . ازهارها صغيرة القد ، يضاء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٤٩٧٥ - لَقُوطَة لُوبِي *

Leucothoe Lobbl (S).

Leucothoë de Lobbi (F).

نوع من القوطَة التزيينية . ساقها تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها ابيدة ، جلدية النصل ، مسنة الحمار ، تغطي نحو ٧ سم . ازهارها عنقودي التجميع ، طرفي الازنكاز . ازهارها يضاء اللون || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٤٩٧٦ - لَقِيَات *

Pompilidae (S).

Pompilidés (E).

فصيلة حشرات من غشايات الاجنحة . اجسامها وانواعها عديدة منتشرة في جميع الاسواق الحارة والمعتدلة . قوتها ما تقتربه من الحشرات والحوام . تحفر مكاهي في التربة على اصاق تراوح من ١٠ الى ٣٥ سم . تلتصق عنها عدة سراديب تلتوي رداء مستطيلة مسمة الاضلع تقع في كل ردة منها ٤ الى ٨ مكبات تنقف بعد ٩٦ ساعة . اشهر اجناسها القق اطلبه .

٢٤٩٧٧ - لَقِيَس * هو ما طال زين نمر . راجع قصص .

٢٤٩٧٨ - لَقِيَط *

Dracunculus mucivorus, Helicodracos mucivorus (S). Serpentinaire atrape-mouches (F).

نبات حشبي اردبي بري وتزييني من فصيلة التفلسيات . ارونه صقريه مقلطة . اوراقه برتلية مستطيلة الزناد وريقاتها ودية التجميع فصلها ثنائي الصفحة المزركشة والمجتمبة بالاحمر والاصفر . شراخه يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . شراخه خلي الصفحة الداخلية جلوي اللون متوسطه غبة حجة تكسوها الياف شمرية الشكل .

٢٤٩٧٩ - لَقِيَمَة ، لَقِيَمَة

Ophlogosse (F).

عشبة طيبة تترف بلسان احية . اطلها .

٢٤٩٨٠ - لَقِيَمِيَّات *

Ophloglossaceae (S). Ophloglossacées (F).

فصيلة من البراسي تشل بعض الاجناس والانواع اشهرها الاقيقة ولسان النزال .

٢٤٩٨١ - لُكَاك *

Laque, Gomme-laque (F).

Lac, Gum-lac (E).

حصارة راتنيية صمغية صنعتها قنرزها بعض الاجناس

تلقاتيا بمد حوها او برسطة الحشرات .



لَقِيَط



لُكَاكَة سَيَانِيَّة



لُكَاك



لُكَاك

٢٤٩٩٧ - لُكَاةٌ رُيُوسٌ حَرِيفٌ *

Lactarius acris, *L. sanguifluus* (S). *Lactaire acro*, *L. à lait rouge* (F).
من الفطور الجحالية المؤذية يكثر في الإحراج والغابات الظليلة في الصيف والخريف. عصارته حراء اللون حريفة المذاق. ساقه تملو من ٤ الى ٥ سم. حشيتها يعلوها قشيع طويّ أحر الملوّج. قطرها يراوح من ٥ الى ٦ سم.



لُكَاةٌ رُيُوسٌ حَرِيفٌ

٢٤٩٩٨ - لُكَاةٌ رُيُوسٌ سَامٌ *

Lactarius torminosus (S). *Lactaire vénéneux*, *L. aux tranchées*, *L. à toison* (F).
من الفطور الجحالية المؤذية يكثر في الإحراج والغابات. عصارته بيضاء اللون حريفة المذاق. نكتته أظفية الصفعة الهفدية، طليقة التضديد، زهاب الحمار والحلقة، لوئها الى الوردي يعلو موج أصفر وتؤشج عاتق.



لُكَاةٌ رُيُوسٌ رَتَقَالِي

٢٤٩٩٩ - لُكَاةٌ رُيُوسٌ لَدِيَّةٌ *

Lactarius deliciosus (S). *Lactaire délicieux* (F).
من الفطور المأكولة القليلة الطعم. يكثر في ظل الأشجار الصنوبر والسرور. عصارته حراء اللون سكرية المذاق. ساقه تملو من ٤ الى ٧ سم. نكتته تجلو عذبة ثم مستوية أظفية وتنتهي مقمرة. قطرها يراوح من ٥ الى ١٥ سم. لوئها الى الحمرة البرتقالية تملوها رقيقة خضراء وأطراق مابطة.



لُكَاةٌ رُيُوسٌ حَرِيفٌ

٢٥٠٠٠ - لُكَاةٌ
هي البتاز ، اطالبا .

٢٥٠٠١ - لُكَاةٌ
هي البتوز ، اطالبا .

٢٥٠٠٢ - لُكَاةٌ رُيُوسٌ *

Lycet (S).
Lycet (F). *Lycet* (E).
جنس حشرات مؤذية من عديدات الاجنحة وفصيلة الكوتويات. أنواعه المروفة نحو ٢٥ منتشرة في معظم أقطار العالم || اجسامها صغيرة القد، مستطيلة الشكل ، وحيدة اللون السوي || يرقاتها غالبة لونها لا تقرب من احشائها الفصيلة الصنوبرية || اعرف أنواعه واشهرها الكيوس الاسمر والخطي والهدد .



لُكَاةٌ رُيُوسٌ سَامٌ

٢٥٠٠٣ - لُكَاةٌ رُيُوسٌ سَامٌ
Lycet brunneus, *Xylotrogus brunneus* (S). *Lycet brun* (F).

حشرة غاشية من الكيوس. طولها نحو ٣ سم. قوفا الى السمرة الحظيفة المابطة || يرقاتها تلية اللون ، سمراء الرأس، مستطيلة المقدم. تركيب الكيوس من الاخشاب ونبتا النبتة فتتفخروا وتطهاها. وعندما تتكمن من المرقوس. فانها تفصله كل فذاء .



لُكَاةٌ رُيُوسٌ لَدِيَّةٌ

٢٥٠٠٤ - لُكَاةٌ رُيُوسٌ حَرِيفٌ *

Lycet linearis (S). *Lycet linéaire* (F).
حشرة غاشية من الكيوس. تألف الحراج والمنازل المسقوفة بالخشب. طولها نحو ٤ سم. قوفا الى السمرة الكستنية || لها جيل واحد في الحول. يرقاتها قوية ، مستطيلة المقدم ، مستعدة المخصر ، مائلة القشار . سداسية الرؤوب ، تينية اللون ، سوداء الرأس. تسردب مع خنافسها الشكير تحت الحما وتنتشر الاضاعة والاخشاب المصنوعة لونها لا تقرب احشائها الصنوبريات .

أنواعه قليلة العدد اصطلحها المناطق الحارة. جلوسها عند وجودها ذئقة مستقيمة كثيرة العدد ضمية التجميع تكسوها غشاة من الليف الاسمر. اوراقها مستديرة الشكل ، غوصها جيل الفخار الزاهي ، كرجها مستطيل الجرم سرج الصفعة أو شالك الجوانب || والكاك يعيش في اقل الحشويات حيث يزرع في المراكب وفي الحدائق الخاصة التي لا تحصى القر. يتكاثر بالنسل. اشهر أنواعه التزينية ما يلي .

٢٤٩٩٠ - لُكَاةٌ قَرْمَةٌ

Rhaphis humilis, *R. strotaks* (S). *Rhaphis nain* (F).
نوع من اللُكَاة. ساقها جمعة. تتكاثر بالنسل. تعيش في المراكب. اوراقها ذوقية الشكل. كرجها منقش الشكل الاسمر المتبايع الارتيكار.

٢٤٩٩١ - لُكَاةٌ مَرُوجِيَّةٌ

Rhaphis flabelliformis (S). *Rhaphis en éventail* (F).
نوع من اللُكَاة. ساقها تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها مريسية الشكل. غوصها جيل الفخار الزاهي. كرجها قليل الشكل الحظي المتبايع. يزرع في المراكب والحدائق. ترطب في الأثرية الدبالية الخشوية الرطوبة.

٢٤٩٩٢ - لُكَاةٌ نَاشِطَةٌ

Rhaphis major (S). *Rhaphis major* (F).
نوع من اللُكَاة. ساقها مستعدة تملو نحو ١٢٠ سم. اوراقها مستديرة. غوصها فسفي اللون. كرجها سرج الصفعة. تزرع في المراكب والحدائق. ترطب في الأثرية الدبالية الخشوية.

٢٤٩٩٣ - لُكَاةٌ

« شويكة تحطبل لها سويقة قدر شبر لينة كانه سير ولها فروع مملوءة شوكاً وهي خلال الشوك وريقة لا بل بها تنقيش ثم يبقى الشوك اذا جفت ايشت » (اللسان).

٢٤٩٩٤ - لُكَاةٌ رُيُوسٌ ، لُكَاةٌ

Lactarius (S). *Lactaire* (F).
جنس فطور من الفاريفوريات أنواعه عديدة منها المأكولة والجحالية جميعها دماعة اذا جرحت. عصارته لينة لزجة حلوة الطعم او حريفة المذاق. لوئها يختلف باختلاف الأنواع ، منها الابيض والاصفر والاحمر والاريد والبنيضي || اعرف أنواعه واشهرها ما يلي .

٢٤٩٩٥ - لُكَاةٌ رُيُوسٌ أَشْفَحٌ *

Lactarius rufus (S). *Lactaire roux* (F).
من الفطور المؤذية يكثر في الصيف والخريف يعيش في ظل الصنوبر والسرور. عصارته بيضاء اللون حريفة. ساقه تملو من ٥ الى ٦ سم. نكتته أظفية الصفعة الملوية قطرها يراوح من ٦ الى ٩ سم. لوئها الى الشفعة .

٢٤٩٩٦ - لُكَاةٌ رُيُوسٌ بُرْتَقَالِيٌّ *

Lactarius volemus, *L. lactifluus* (S). *Lactaire orangé*, *L. à lait abondant* (F).
من الفطور المأكولة القليلة الطعم. عصارته كالحليب لونا ولزوية وتندبق. ساقه تملو من ٦ الى ٨ سم. نكتته تيلو قلندوسية في اول همدان ثم أظفية وتنتهي مقمرة يتوسطها ثقلول غليظ. قطرها يراوح من ٨ الى ٢٠ سم. لوئها يستمر حل الصفرة البرتقالية حتى تتغير فيضرب اذ ذلك الى الجروي وهو يربيد في الغابات الظليلة الرطبة من نحو الى آب .

غيره اللون يدلها موج ذهبي، قطرها نحو ٤ سم. اطرافها مستقلة الكثافة بنفسجية اللون || لحيتها جيدة الصنف، مأكولة.

٢٥٠١١ - **لُكُوسَةٌ شَدِيدَةٌ** *
Laccaria laccata (S).
Laccalre laqué (F).

نوع من اللكمة. توجد في المواقع الرطبة. ساقها رفيعة، شقراء اللون. اروسيتها شبه صاجية الشكل، قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الشفحة الصفراء اللامعة. اطرافها بلون الساق || لحيتها جيدة الصنف، مأكولة.

٢٥٠١٢ - **لُكُوسٌ بَلَسْتِيْدِي**
Leucoplaque (F).
Leucoplaque (E).

هي البوصية المادة اللون اي مواد الحلية العادمة اللون.

٢٥٠١٣ - **لُكُوسَات**
Phytolaccaceae (S).
Phytolaccaceae (F). Phytolaccaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. اجناسها ١٧ وانوعها ٦٠ اعطائها المناطق الاستوائية والحارة. معظم انواعها اشجار وشجيرات وبعضها جنباث لينة السوق واغشاب حولية ومعمرة. اوراقها بسيطة. ازهارها خشوية او ثنائية المسكن. لا تلبسية التجميع والارتكاز. ثمارها غنية يستخرج منها صبغات ارجوانية. عصارة جلدها حلابة دقة لكمة صافية.

٢٥٠١٤ - **لُكُوسَةٌ** *
Phytolacca (S).

Phytolacca (F). Dyer's grapes, Poke (E). Gewöhnliche kermesbeere (D). Fitolacca, Amaranto (I).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة اللُكُوسَات. انواعها قليلة منها الاشجار والجنباث والاعشاب. اوراقها كاملة متعاقبة بيضية النصل او اهلجية. ازهارها تنقودي التجميع صغيرة القد، ملونة. ثمارها لورية غزيرة العصارة الحمراء تستعمل في سبائك الخمر. جلدها طيبة || اشهر انواعها ما يبيع.

٢٥٠١٥ - **لُكُوسَةٌ ثُنَائِيَّةُ الْمَسْكَنِ**

Phytolacca dioica (S). Phytolacca dioique, Belombr (F).

نوع من اللكمة الشائعة. شجرتها تملو من ٦ الى ١٥ م. ساقها قرعاء فناء، قلقسوية الفتحة وارفة الظل. اوراقها بيضية ذلقة طول نحو ١٢ سم. وتعرض نحو ٧ سم. نصلها اخضر الصفة الجلمدة يتغض في كاثون. ازهارها ثنائية المسكن، مستطيلة المتناظرة الاكبرية والاثورية || تنويرها يستمر من ايار الى تشرين.

٢٥٠١٦ - **لُكُوسَةٌ عَشَارِيَّةُ الْأَسْدِيَّة**

Phytolacca decandra (S). Phytolacca à 10 étamines (F).

نوع من اللكمة الزرقانية. ساقها منتصبه قرعاء تملو من ١٧ الى ٣٥٠ م. اوراقها اهلجية سانية، نصلها يطول من ١٠ الى ٤٠ سم. ويعرض من ٣ الى ١٠ سم. وهو دهل السنج اجر الصفحة. ازهارها تنقودي التجميع مستطيل الشكل. ازهارها عشارية الاسدية تبتلو بيضاء اللون ثم تتحول الى الارجواني. ثمارها بنفسجية عشارية الاضلع || تنويرها يستمر من حزيران الى اواسط الخريف.

٢٥٠١٧ - **لُكُوسٌ** *
Donovania (S). Lachesis (F).

جنس حيوانات بحرية مقرعة من الرخويات مديات الاربل وفصيلة المريفات. انواعها المعاصرة المعروفة قليلة

٢٥٠٠٥ - **لُكُوسٌ مُخَدَّدٌ** *

Lycus unipunctatus (S). Lycte canaliculá (F).

حشرة عاشية من اللكوس. طولها نحو ٤ م. ثوبها الى الشبهة الحطية السمراء الموج، تنقب في الرأس والكتويل وتزهر في جنبها المحدثين || يرتبها غيره اللون، جزوية الرأس. غليظة الصدر، مستقلة المؤخر. تركيب معظم الاغشاب الصلبة ومنها المصنوعة، باستثناء الصنوبريات.

٢٥٠٠٦ - **لُكُوسِيَّات**

Lycidae (S).
Lycidae (F). Lycidae, True powder-post beetles (E). Splintkäfer, Holzmehlkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة ضفديات الاجنسة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد. اعطائها جميع مناطق بلاد الشام || حشراتها صغيرة القد، مستطيلة الشكل، ضبية الانحدار الحطية، ضيقة الزباني، خابية الفصم الرفيعة || يرتبها عاشية تنخر وتؤرب جميع انواع الاغشاب اعصها الصلبة.

٢٥٠٠٧ - **لُكُوسٌ مُسْتَطِيلٌ** *

Lixus elongatus (S).

Lixe elongé (F). Lixus elongatus (E).

حشرة غاضلة مؤذية من فصيلة السوسيات ورتبة مفدمات الاجنسة. تألف زراعات الشوندر والمواقع التي يكثر فيها السرم. غناصها تعيش على ما تقضمه وتمتصه من عصارة نصل الارواق. يرتبها تخليج الاسناخ وتؤربها نصلها || جسمها متوسط القد يطول من ١٠ الى ١٥ م. ثوبها الى اللكمة السمراء يطولها طيلس جزوي. رأسها صغير الجرم ينتهي بشفك قاصر ثاقب وراش. عينها صغيرتان. زباناها مرتفان صولطانيان طولها مستطيل الشكل، مستدير المؤخر للاحد. غداها متتابعتا التحيزيز الثقوب القاطب. ارسافها رباعية المقل الظاهرة || الاثنى اكبر قدًا من الذكر وابتع ثوبًا منه واطول سرًا وبتكا || لها جيل واحد في الجيل. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع. تسرح في البهار. تساقد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وترز المكان مباحديا في اسناخ الشوندر وفي سوق السرم || والبرقة منه بلوطها الكال تطول من ١٤ الى ٢٢ م. جسمها شبه اسطواني الشكل، مستدق المؤخر، عادم الراجوب، بيثر الحلب، حطلي اللون، اسمر الرأس والشرج والمذنب || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينتهي في التربة قرب النبات البائل.

٢٥٠٠٨ - **لُكُوسٌ**

Piquer (F). To prick (E).

لكع ولدغ ولسب ولسع ونخس ونس.

٢٥٠٠٩ - **لُكُوسَةٌ**

Laccario (S).

Laccalre (F). Laccaria (E).

جنس فطور من فصيلة الفاريقونيات. انواعها المعروفة قليلة البد. اعطائها بعض غابات وحراج مناطق البلاد المعتدلة الحارة. جميعها مأكولة لذيلة الطعم، مستحبة المذاق.

٢٥٠١٠ - **لُكُوسَةٌ بَسْمَسِيَّةِيَّةٌ** *

Laccaria amethystina (S). Laccalre amethyste (F).

نوع من اللكمة توجد في حراج السديان. ساقها رفيعة، عوياء، ليلكية اللون. اروسيتها شبه صاجية الشكل،



لكوس غند



لكوس مستطيل



لكمة بنفسجية



لكمة شفة



لكية



لكيس

25023 - **لَمَجَاةٌ تَائِهَةٌ** *
Clubiona erratica (S). *Erratic clubiona* (E).
 هوبية من العناكب الساعية القانصة ثنائية الروايا ،
 سداسية الشاثن تنتمي إلى فصيلة الهابيات . موطنها معظم
 مناطق البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم - جسمها
 صغير القد بطول نحو ٨ م. عند التكب ونحو ١٢ م.م.
 عند التكب . صدرها مستطيل الشكل ، اسمر اللون ،
 احمر الموضع . عيناها زرقائتان . شيفها ضلعا . فكاهما
 ذقائمان . جرابها مستطيلة ، منحنية ، كثيفة الحب .
 بطنها اسمر اللون ، احمر الموضع ، عابق الزخم - تألف
 البراري والمواقع الدخلة . تسرح في النهار . عندها ستة
 بنتنة الشكل والقد تنسجها حيث تبني لانها جولة لا
 تستقر في مكان معين - قوتها الحشرات الصغيرة والاساريع
 والديدان . بيئاتها الشتوية يستمر من ١٨ إلى ٢٠ أسبوعا
 تقضيها في مكعبة جوزية الشكل ، خيزر اللون ، جامدة
 الحيك تنسجها تحت الحجارة وفي كل مكان أمين -
 ملجئها الحيائي لا يخطف عن ملين سائر العناكب -
 تعتبر من الدوبيات النافعة .



نم

25024 - **لَمَجَاةٌ رَيْبِيَّةٌ** *

Clubiona nutrix, *Chiracanthium puncturium* (S).
Clubione nourrice (F). *Nutrix clubiona* (E).
 نوع من العناكب الساعية القانصة ثنائية الروايا ، سداسية
 الشاثن تنتمي إلى فصيلة الهابيات . موطنها المناطق الحارة
 من حوض البحر الأبيض المتوسط - جسمها متوسط القد
 بطول نحو ٢٠ م.م. عند التكب ونحو ٢٤ م.م. عند
 التكب . صدرها اسمر اللون ، اسمر اللون احمر الموضع .
 عيناها زرقائتان . شيفها ضلعا المقاف الدرية . فكاهما
 ضلعان . جرابها مستطيلة مهدبة . بطنها رمي الشكل ،
 حنلي اللون ، جزوي الموضع تلوو ريشة سوداء - تألف
 الادغال والسيابجات حيث تكثر النباتات الشائكة .
 تسرح في النهار . قوتها الحشرات واساربعها - بيئاتها
 الشتوية يستمر من ١٨ إلى ٢٠ أسبوعا . مأواها مكعبة
 صلبة الشكل لا تحفر الوسط ، ومنية الحيك ، مدخلها
 من الجهة السفلى - تعيش نحو ثلاث سنوات . الاثني
 تموت بعد تقف المكان وحسن الصغار ، اما الذكر فيعد
 الكوم اذ تقضي عليه الاثني - نشتها ملقة . سمها شديد
 الفاعلية يؤذي الانسان .



لَمَجَاةٌ تَائِهَةٌ

25025 - **لَمَجَاةٌ مُزَكَّشَةٌ** *

Clubiona compta (S). *Clubione parée* (F).
 نوع من الهابيات الساعية القانصة . موطنها بعض المناطق
 الحارة من العالم القديم - جسمها صغير القد بطول نحو
 ٥ م.م. عند الذكر ونحو ٨ م.م. عند الاثني . صدرها
 مستطيل الشكل ، اسمر اللون ، اسمر اللون . عيناها
 زرقائتان . شيفها مجهزان بمقاف محببة نحو الداعل .
 فكاهما صغيران . جرابها منحنية مستطيلة ، كثيفة الحب .
 بطنها احمر اللون ، اسمر اللون . احمر الرأس
 ينتهي برزائتين صغيرتين - تألف المروج والراش
 تسرح في النهار . قوتها الحشرات الصغيرة . عندها مكعبة
 بلطية الشكل ، حريرية الثلاس ، بيضاء اللون ، تحيكها
 تحت قشور الاجار - تعتبر من الدوبيات النافعة .



لَمَجَاةٌ مُزَكَّشَةٌ

25026 - **لَمَجَاةٌ** *

Clubionides (S). *Clubionidés* (F).
 فصيلة عناكب من رتبة الزيلولات . اجسامها وانواعها

البدد ، اصلاها بحار البلاد المعتدلة الحارة - اصلها
 غرومية عازلة يملؤها تخمد قاطب ويمرر من ممرض عند
 من الفرجة إلى القب . قوتها احليجية الانفراج ، جالسة
 الاريلة العادمة التضخيم .

25018 - **نم** *
Uria (S). *Lumme*, *Guillemot* (F). *Guillemot* (E).
 جنس طير من عارة القيات وفصيلة البيريقيات . انواعه
 المعروفة ثلاثة اعطاه المناطق الباردة القطبية ، تزرع
 عنها في فصل الشتاء والجلد إلى المناطق المعتدلة الحارة .
 ملجئها الحيائي جامعي الياف . جاعاتها اسراب لا يحمي
 لها عدد . قوتها الاسماك والقشريات والدعاصيص - اجسامها
 كبيرة مثاقيدها مستطيلة جالسة مذبذبة الاطراف المفردة .
 مناقشها كاسية ، ضيقة ، فائدة من جانب إلى جانب .
 اجسمتها معتدلة الجسم ، ذلقة ، اذناها قصيرة ، مستديرة
 الاطراف الضيقة . ارساها قصيرة ، سرية التشبيك .
 احطيتها تحيط بكامل الاصابع - وكناتها نقر في القوار
 القضاة المشرفة هل البحر . الاثلاث تحض بمنوبة
 ١٠ م. الحصة بيضة واحدة والترخيم يستمر من ٢٠
 إلى ٣٥ يوما .

25019 - **نم اذجكل**

Uria troile (S). *Lumme à capuchon*, *Guillemot à capuchon* (F).
Common foolish, *Common guillemot* (E).
 نوع من الطير موطنه عند من التاروج إلى جزر القطب .
 يزرع في الشتاء إلى بعض المناطق المعتدلة الحارة اصغها
 الجزر البريطانية والخطوط الفرنسية والاسبانية والايطالية
 في المتوسط - جسمه بطول نحو ٤٢ م.م. ثوبه اسود الرأس
 والعنق والرداء والجناحين والذنب ، ابيض الصدر والبطن
 والركبي . منقاده إلى الرعدة السوداء الموضع . حلقه فيه
 إلى الشفحة السوداء . رساه إلى السمرة الخفيفة .

25020 - **نم اعنيس**

Uria grylle (S). *Lumme grylle*, *Guillemot grylle* (F).
Black-throated diver (E).
 نوع من الطير . موطنه بعض المناطق القطبية . يزرع في
 الشتاء نحو مجاح البليكي . جسمه بطول نحو ٥٠ م.م.
 ثوبه اسود الرأس والعنق والرداء والجناحين والذنب ، ابيض
 الصدر ، ابيض البطن ويعلمو في مناكب الجناح والاباير
 والكل تجنيد مندرس ابيض . حلقه فيه حنطة اللون .
 منقاده اسود . رساه إلى النعسة .

25021 - **نم غرقتندك**

Uria Mandit (S). *Lumme de Mandt*, *Guillemot de Mandt*. (F).
Bridled Guillemot (E).
 نوع من الطير . موطنه لواز غرلندة ويحدها . يزرع في
 الشتاء نحو جنوب كندا . جسمه بطول نحو ٤٥ م.م. ثوبه
 إلى البياض الناصع تلوو في الظهر ريشة جزوية ويعلمو
 في الرأس تقيج اسود احمر الموضع وضمان جزويان ايم
 وايسر يمتدان من التذق إلى الظهر . حلقه فيه عنابية
 اللون . منقاده ادس ورساه كذلك .

25022 - **لَمَجَاةٌ**

Raja Jimma (S).
 سمكة من شفتين البحر اعطاهها جنوب المتوسط تكثر في
 المناطق الرملية القاع .

٢٥٠٣٧ - **لُكْمَا ، لُكْف ، لِيمَكَا**

Lympe (F). Lymph (E).

إخلاط صفراء اللون أو عادية تنقلل مصحوبة بالكريات البيض في الاوعية اللمفاوية .

٢٥٠٣٨ - **لُكْسِيَلِيَّات**

Lymexyliidae (S). Lymexyliidae (F). Lymexyliidae (E).

فصيلة حشرات غاشية من رتبة غمديات الاجنحة || اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المنتدلة الحارة || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل تتميز بقلعة صلابة القشور وباستمرار الرأس وبكبر العين الجاحضة وبامتدالة الزنابي المركبة من ١١ فصلة . انحدارها قصيرة لا تلحف كامل البطن . ارسافها خماسية التركيب || يرقاتها تعيش على الاثمار اليابسة او السائرة نحو الياس وهل الاشغاب المصنوعة || اشر اجناسها الكسكيل .

٢٥٠٣٩ - **لُيْمَنَارِيَّات**

Laminariaceae (S). Laminariaceae (F). Laminariaceae (E).

فصيلة نباتات بحرية من الخفيات السف .

٢٥٠٤٠ - **لُيْمَنَارِيَّة**

جنس نباتات غشية من فصيلة الليمناريات تعيش على الصخور البحرية المنمورة بالماء . اوراقها قدية عذرة تطول عدة امتار ، نصلها اصفر اللون اسمر الخارج منها انوار مأكولة واخرى علفية وصناعية يستخرج منها اليود والصدا . جميعها سبادة تفيد التربة والنبات .

٢٥٠٤١ - **لُيْمَنَارِيَّة سُكْرِيَّة**

Laminaria saccharina (S). Laminaria saccharina, Baudrier (F). Devil's-apron, Sweet-tangle (E). Zuckerrentang, Zuckertang (D). Cinture di Nectun (I).

نوع من الليمنارية المأكولة والمالحة . اوراقها سكرية الطعم تأكلها شعوب البلاد الشالية .

٢٥٠٤٢ - **لُيْمَنَّة**

Limnaea (S). Limnée (F). Limnaea (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات غمديات الارجل وفصيلة الليمنيات . انواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع بحار العالم ومنها انواع تعيش في المياه العذبة كالبحيرات والنتام || اصداها غشورية المادة ، شبه غلورية الشكل ، محلظة ، مدببة الانقباض ، شدة القلب . اجسامها مستطيلة . لولبية ، مستعرضة الرؤوس ، مبطلة اللواس السنانة الشكل . ميزنها قاعدية الارتكاز . ارجلها فردية ، مبططة ، مستديرة الطرف الامامي ، مستنقة الخلفي .

٢٥٠٤٣ - **لُيْمَنُورِيَّة**

Limnoria (S). Limnoria (F). Limnoria (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات العليا متساويات الارجل وفصيلة الدوبيريات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار البلاد المنتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ، مبططة ، بيضية اللون ، تحمله القوائم المنتدلة الطول || اعرف انواعها واشهرها لثورية ثنائية الخشب Limnoria terebrans (S). Limnoria perce-bois (F). مشهورة بالاضرار التي توهمها في اختباب الاحداث واوحاش السفن غير المعالجة ضد هذه الافات .

عديدة تناهر اللة ، منتشرة في معظم البلاد الحارة والمنتدلة الحارة || جميعها مقترسة ، صغيرة القد ، ثنائية الروايا ، سداسية المشانق ، شياستها مجهزة بمخاف مجننة نحو الداخل || اثارها تراوح بين الصلبة والشفقة . تعيش في مكادب بلوفية الشكل ، حريرية النراس ، بيضاء اللون ، تحبها تحت قشور الاجبار او تحت الحجارة وبينها || اشر اجناسها الياجة والكفلسة .

٢٥٠٣٧ - **لُكْمَاس**

Tactile

صفة الشئ الذي يتحسس باللمس .

٢٥٠٣٨ - **لُكْمَاسَات**

Palpigrades (F). Palpigrades (E).

فئة من المنكرويات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، جميعها كهام ، عادمة الجهاز التنفسي ، تطول نحو ١ سم . اجسامها لتني بطنية خفيفة ، قصيرة || تعيش تحت الحجارة وفي المغاور الرطبة .

٢٥٠٣٩ - **لُكْمَاحَة**

هي المقاب اللحية ، اطلبها .

٢٥٠٣٠ - **لُكْمَاس**

Lemme (F). Lemma (E).

عمرس تمهدي لآليات قسية .

٢٥٠٣١ - **لُكْمَام**

هو النتع الاخضر ، اطلبها .

٢٥٠٣٢ - **لُكْمِيرُكَا ، لُكْمِيرُفِيَا**

Lambertia (S). Lambertia (F).

نبات مقدود التعريف على اسم العالم الاكلينيكي ا.ب. لميرت (١٧٦١ - ١٨١٢) وهو جنبة معمرة برية وريثية من فصيلة الفصيات مهدا استراية . ساقها فراج تمل نحو ١٢٠ سم . اوراقها سنانية تطول نحو ٥ سم . وتعرض نحو ٥ سم . نصلها ملتف الخلفية ، شالك النقصه لامع الصفنة العليا غلي السفل . ازهاره مقدودية التجميع صغيرة القد البرجوانية اللون . ثماره برجوانية الشكل مسلمة بقرنين مستطيلين . تنوره يشمر من ثمر الى آب .

٢٥٠٣٣ - **لُكْمِيرُوش**

هي كرة لبروش ، اطلبها .

٢٥٠٣٤ - **لُكْمِيد السُفَف**

Lampides boeticus (S).

فراشة من فصيلة اللقيات . اطلبها فصيلة الارباء تشمل البلاد الاسيوية والافريقية . جسمها الحامل الثوب ازرق المواج . ذكرها يطول نحو ٣٤ سم . رواشه الى الزرة البنفسجية بعلها تمشيع مسك حاق ويطولها اطار اسمر || انتاعها تطول نحو ٣٨ سم . رواشه ازرق الانتشاب سخطية اللون بعلها تمشيع اغير || يرقاتها تركب سف نباتات الفصيلة القرنية وتقرض البور قبل ادراكها .

٢٥٠٣٥ - **لُكْمَة**

جميعية افراد نباتية من صرم واحد تميزت بصفات خاصة ثابتة . والمة لا تأتي الا عن طريق التمثيل والتفصيل . واذا تكاثرت بالبر قدت صفاتها المميزت ولم تعد لة .

٢٥٠٣٦ - **لُكْمُدُور**

Limodorum (S). Limodore (F).

جنس نباتات طفيلية من السحليات . انواعها المعروفة قليلة . اوراقها متراكبة حشوية الشكل والدة ، زرقاء النصل . ازهارها سنبلية التجميع . ازهارها صغيرة بنفسجية اللون || منبتها الادوية والمواقع الظليلة الرطبة .



ليد السنف



لثورية سكرية



لث

الناذة . تتميز برؤوسها الجزلة وبقوائمها الاسامية الشديدة
الانطاس المجهزة اما السطك كما في البرصوة أو القيقص كما
في المغرب بواسطة اطرافها المنطوية الشكل || جمع اجناسها
عائلة تعيش من قنصها . اشهرها البعثة .

٢٥٠٥٠ - تَيْسِيَّة

Gnathopode (F).
Gnathopodite (E).
زائدة متحركة أو عضوية تكون عند بعض القشريات .

٢٥٠٥١ - تَيْسِيَّة

Limulus (S).
Limule (F). Limulus (E).
جنس حيوانات بحرية من المفصليات وفضيلة العنكبوتيات .

انواعها قليلة العدد منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة ||
اجسامها شبه مستديرة الشكل ، مغطاة الظهور بدروع
مجنية ومحملة في مؤخرتها سراديب مستطيلة حادة الاطراف .
واجسامها هذه تتكون من جزئين ، جزء أمامي مملوح يحمي
نصف دائري يغطي الصدور واليدين والذوائل وستة
ازواج من القواس التي تحرق اللحم . زوائد الصدرية
تستعمل كجهاز للتنقل والركوب . اما الجزء الثاني فلانه
شبه محرم الشكل ينتهي بمجرده حاد الطرف . وهو عند
قاعته يلتصق حدة ازواج من الجرايز المنعدسة لسانية ||
بعض انواعها مأكول . اغصنها لينة انثوزيسية وهناك
نوع آخر كبير القد يطلو بحر ٢٠٠ سم . يكثر وجوده
في بحار شمال الولايات المتحدة .

٢٥٠٥٢ - تَيْسِيَّة أندونيسية

Limulus moluccanus (S). Limule des Molouques (F).
نوع من البعثة يكثر وجودها في مياه اندونيسية . جسمها
كبير القد ، يطلو من ٩٠ الى ١١٠ سم . بما فيه المروء ||
لحمها مأكول ، مرفوف فيه .

٢٥٠٥٣ - تَيْسِيَّات

Limulidae (S).
Limulidæ (F). Limulidae (E).
فضيلة من المفصليات الشبيهة بالمرسوطيات . اجناسها
وانواعها القليلة كانت عديدة وقد انقرضت ولم يبق منها
سوى بعض الانواع تنتمي الى جنس واحد يدعى ليمطة .

٢٥٠٥٤ - لَيْسِيَّة

Lemmus (S). Lemming
جنس حيوانات ليلية قاضية من المكربيات وفضيلة
الغاريات . انواعه عديدة بعضها صغيرة القد بعضها البلاد
الباردة تجوبها من الجنوب الى الشمال || اجسامها ربعة ،
طويلة يراوح من ١٥ الى ١٨ سم . وذانها من ٢ الى ٣ سم .
مقاسها صغيرة . اذنانها صغيرة . جرائرها خسانة الاسابع .
انظرها حادة جامة . اذواها الى الفردة الصغرى يعلوها
تتبعج اسمر . يطونها الى الصغار الرلي . جرائرها واذانها
صفر || قوتها الاشعاب والجلود والحزاز .

٢٥٠٥٥ - لَنْارِيَّة

Lanaria (S).
Lanaria (F). Lanaria (E). Lanaria (D). Lanaria (I).
جنس نباتات عشبية جوفية مادة معمرة من فضيلة
الترجيسيات . انواعها قليلة متنبها لقرينة الجنوبية . نزرع
لتربين .

٢٥٠٥٦ - لَنْجُور

Semnopitheque (F).
نوع من القردة المقامة يدعى هبار ، اطلب .

٢٥٠٥٧ - لَنْجِيَّات

Lonchitis (F).
هو القسم ، من النباتات الطبية والثرينية .



لينة



ليمدة



ليمطة



لين

٢٥٠٥٨ - لَيْسِيَّات

Limnidae (S).
Limnidae (F). Limnidae (E).
فضيلة حيوانات مائية من الرضويات معديات الاصل
ورثة الرضويات المائية . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة
منتشرة في معظم بحار وبحيرات العالم . قوتها البوت المائية
والضريع || اصنافها لاحقة ، شبه خلروفية الشكل .
محلزة الاطراف ، سدفا الوب || اعرف اجناسها واشهرها
السمنة واليافق واللوب والاصليل .

٢٥٠٥٩ - لَيْسِيَّة

Lemonia (S).
Lemonia (F). Lemonia (E).
جنس حشرات من فصيلة العنكبوتيات ورتبة سرشيات
الاجنحة . انواعها المعروفة ٢٠ بعضها يألف الاقاليم
الباردة والبعض الآخر يعيش في المناطق المعتدلة الحارة
والخارة || اجسامها كبيرة ، عضلية ، يفرها الخمل
بسطها تراوح من ٤٥ الى ٥٥ سم . رؤوسها مزوانية
الشكل . هيوتها صخرة ، بارزة . اعطائها وملاسها
قصيرة . قرونها الاستشعارية مشطية . اجنحتها كبيرة ،
ملونة ، مجنعة ومتقطعة . اذواها قليلة الزخرفة || اسارها
مثاقلة يعلوها حلب دقيق . تألف البراري بجمها خاضعة
تعيش على معظم ثبوت فضيلة المركبات واعصها الخندب .

٢٥٠٦٠ - لَيْسِيَّات

Lemoniidae (S).
Lemoniidae (F). Lemoniidae (E).
فضيلة حشرات من رتبة حرشيات الاجنحة . اجناسها
وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، معظمها شبيهة بالاصطان
وبعضها يألف المناطق الحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها
كبيرة ، عضلية ، يعلوها خمل مستطيل . بسطها تراوح
من ٤٥ الى ٥٥ سم . رؤوسها معتدلة الجرم . هيوتها
صغيرة . اعطائها شديدة القصير . ملاسها صغيرة .
قرونها الاستشعارية مشطية مزدوجة . اجنحتها كبيرة
عامة التدبيب . اذواها مزخرفة || اسارها مثاقلة القشار
يعلوها بعض الحلب || اشهر اجناسها القوثة .

٢٥٠٦١ - لَيْسِيَّات

Uriens (F).
حمار طير من فصيلة البطريقيات . اجناسها وانواعها
قليلة العدد بجمها من طيور المناطق القطبية والباردة ||
تتميز باجسامها الكبيرة ، بريشها البلس ، باراسها
البردية ، وريشاتها المائلة الافلاك و المتدلة الاحدياب ،
القليلة الانضغاط والارتفاع || اما اجناسها فهي الغم والمرغول
والرغولان .

٢٥٠٦٢ - لَيْسِيَّة

Phymata (S).
Phymate (F). Phymate (E).
جنس حشرات قاضية من فصيلة الديدان . انواعها
المعروفة عديدة منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة
الحارة والحارة || اجسامها صغيرة تطول من ٩ الى ١٠ سم .
اشكالها مستغرة لامألوفة . رؤوسها جزلة شاذكة . اعطائها
قصيرة شديدة النشط . قوائمها الاسامية مجنعة الخسلف ||
اذواها متباينة الالوان تكثر فيها الشقعة والسمرة || جمع
انواعها ناعمة لانها تنتمي على الحشرات الضارة .

٢٥٠٦٣ - لَيْسِيَّات

Phymatidae (S).
Phymatidae (F). Phymatidae (E).
فضيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة تصفيات
الجنح . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد معظمها
من علم المناطق الحارة || اجسامها صغيرة غريبة الاشكال

Lennon

٢٥٠٦٣ - تنوآ *

جنس نباتات عشبية طفيلية من فصيلة النوريات . انواعها المرفوعة ثلاثة منتبها بلاد المكسيك .

Lennoceae (S).

٢٥٠٦٤ - تنويآت *

Lennoceae (F). Lennoceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة العقالات . اجناسها وانواعها المرفوعة قليلة العدد . اعطائها بعض مناطق المكسيك || جميع نباتاتها عشبية طفيلية . اوراقها سهقية . ازهارها صغيرة ، سننية الازديكار || اشهر اجناسها التوا .

Lignodes (S). Lignode (F). * ٢٥٠٦٥ - لينود

جنس حشرات خاشطة من مخدبات الاجنحة وفضيلة السويبات . انواعها المرفوعة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة . يكثر ويبدوها على المران والياك والباس ، خاصة في زعن الاثمار || اجسامها صغيرة ، شبه بيضبة الشوزن ، تطول من ٤ الى ٦ سم . اذواها الى الشقعة السفدا يعطوها ، في بعض الانواع ، تبيض اسود متفاوت الرسابة يكتشف الامداد .

Lenle (S).

٢٥٠٦٦ - لينون *

Lenlon (F). Lenlo (E).

جنس طير من الجوامح غرطويات المناقير وفضيلة التنفريات انواعها المرفوعة خمسة موطنها المناطق الاستوائية من البلاد الامريكية . تألف الاجراج . ملجئها الحياتي . جماعي باسكتانه وزن التسايف والحضانة والتصيل ، جماعتها قليلة العدد . قوتها الحشرات والبلود والثار النباتية البرية والزرارحة || اجسامها ردية تطول من ١٥ الى ٢٥ سم . رؤوسها معتدلة القد . مناقيدها غرطوية . اجنحتها مستطيلة ، ذلقة . اذناها مقمرة شبه مرفوعة . اذواها تختلف عن الانواع لها الاسفر والاحمر والاداسر والخضر الاسي ، جميعها مبلقة او مبيضة بالادس || تدثن اعشاشها في الادغال القريبة من سطح الارض . الاثان تحفن وسدا من ٥ الى ٧ بيضات بينا الذكور تكون لها الحياة والقداء .

Epiglotten (F). * ٢٥٠٦٧ - لهاسة ، ليسان المزمار

Epiglottis (E).

الهة او لسان المزمار سقاط ليلي . غسرفني يقع في الجزء العلوي من الحنجرة .

٢٥٠٦٨ - لهاسة الجرود *

Xanthorhoe montanata (S). Xanthorhoe des montagnes (S). Xanthorhoe montanata (E).

فراشة من فصيلة الاريايات ردية حرشليات الاجنحة . موطنها بعض جبال حوض البحر الايبيس المتوسط والمناطق الداخلية المخافة . قوتها رقيق الازهار . سرقها خاشطة تدثش على اوراق النبات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٣ سم . بطنها نحو ٣ سم . رأسها حطلي اللون . عينيها صغيرتان . زباناها مشطبان عند الذكر ، عينيها عند الانثى . جوشها وبطنها الى الحطلي الاثبع المالح || وراشها عند الفتنين الى الحطلي الاكثف بملوي في الزوج الاسامي تحفج ابيض واغير وبقجة وسطى شديدة السمرة تتنهي بشمتين تتوسطها نقطة سمراء . ويملوي في الزوج الخلفي تحفج اسمر وعطان من الزراکش . اهداها الى الشقعة || لها جبل واحد في الحول . تظهر الفراشة في

Landolphia (S).

Landolphie, Vahé (F). African rubber tree (E). Kantschuklane (D). Landolphia (I).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة البفلجات . منتبها افريقية الجبوية ومغسفر . سوقها جالسة ، مالة سمراء اللون . اوراقها متعاقبة ، نصلها لامع الصفحة الجالسة . ازهارها تالية || يستخرج من جلونها بالخر عصارة مطاطة صناعية تستعمل استعمال المطاط .

Lenzees

٢٥٠٥٩ - لتزوت *

نظر من السميات مركب الاعشاب المقطوعة من فصيلة الصنوبريات . مظهره الخارجي نظر صغير القد لونه الى الجوزة ، نكتة مفلطحة ، قطرها نحو ٣ سم . سطحها الامل مستدير التخميد ، تملو اعاديه حرارثف ورر هيفية متناسبة البعد شياء اللون . لبابه قليل الباكة ، فاني التركيب ، حطلي اللون . بوفاته اسطوانية الشكل قياسها نحو ٣×٨ ميكرون || مشبيه بتري الاعشاب المقطوعة ليسب عطفا واعطالا يمد ان يعطفا بوشاع كندف اقلن لونه الى الصفرة البرتقالية ثم ينحرف الى الحطلي || يكالنج بمرق الاعشاب المصابة وبطيمبر السطبة بأحد المركبات القمالة كالنيترول والكرولين .

Linsang (S).

٢٥٠٦٠ - لينسان *

Linsang (F). Linsang (E).

جنس حيوانات لاحمة مفترسة من فصيلة الزباديات . انواعها المرفوعة ثلاثة موطنها الهند الصينية وجزر الزايج . تألف الثايات والرياض . ملجئها الحياتي فرعي الذكر يكوم عدة اناث والاثى تقاطط عدة ذكور || اجسامها مستطيلة الشكل هيفاء تطول من ٦٥ الى ٨٥ سم . بما فيه الذنب . رؤوسها صغيرة ، شبه غرطوية الشكل . اذناها صغيرة ، كاسية . مرنها ماصة ، حادة البصر . اذناها مستطيلة ، سداسية او ثمانية الاطواق ، بالنسبة الى النوع . فراقها قصيرة الوير اليد النام . اذواها سبيقة ، مرفوقة ومذرة || اناثا ثنائية الاثداء والجارء ، تضع حل مرقين في الحول . المرة الاولي في اواخر شباط والثانية في اواسط آب || سرسها دجوي . قوتها الطير والحيلوان الصغير || اما انواعها الثلاثة فهي :

Linsang pardicolor (S).

Linsang pardicolor (F).

Linsang gracilis (S).

Linsang gracieux (E).

Linsang maculosa (S).

Linsang maculé (F).

٢٥٠٦١ - لتسفن *

Ammodytes lanceolatus (S).

Langon (F).

سمكة بحرية من فصيلة الردياليات . اعطائها مظهر شطوط بخار البلاد المعتدلة الحارة || جسمها شبه اسطواني للشكل قليل التبطيط يطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . رأسها صغير الجسم مستطيل الحطر . فكها السفلي يتقدم العلوي . زعنفتها الظهرية قاطبة يتقدمها منخس حاد . زعنفتها الشرجية تمتد من اواسط البطن الى الذيل . زعنفتها الذيلية فارقة ، ثوبها الى الرعدة القصية يسر ويميق في النصف العلوي || لحمها جيد الصنف مرقوب فيه .

٢٥٠٦٢ - لتشف حي اللغا ، اطلبا .



لندليه



لنسان



لنسون



لنود



لنود



لهوة

٢٥٠٧٨ - **لهوية لاطفة** (S). *Uvularia sessilifolia* (S).
Uvularia à feuilles sessiles (F).
 نوع من الالهوية تملو نحو ٣٠ سم. اوراقها لاطة اخيلاجية نصلها بطول من ٤ الى ٨ سم. صفته السفلى الى الخشار الازرق المثلج. ازهارها تولوية الانتشاب صغيرة القذ تطول من ١٥ الى ٢٥ سم. نيسا الى الصفرة الباحة. ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

٢٥٠٧٩ - **لهوية مثقوبة** (S). *Uvularia perfoliata* (S).
Uvulaire perfoliée (F).
 نوع من الالهوية تملو من ١٥ الى ٥٠ سم. اوراقها مثقوبة تحترقها اسوق وهي متضامة سنانية الشكل، نصلها بطول من ٤ الى ٨ سم. وهو مائل الصفحة، اخضر السليا، باهت السفلى. ازهارها تطول من ٢ الى ٣ سم. بتلاتها مدبة الاطراف لونها الصفرة الجسمية || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.



لهوية

٢٥٠٨٠ - **لهوية مهبدة** (S). *Uvularia puberula* (S).
Uvulaire à feuilles ciliées (F).
 نوع من الالهوية السبروتية تملو نحو ٤٠ سم. اوراقها متضامة سنانية. نصلها جامد الصفحة، اخضر اللون، مهبد الحافة، بطول نحو ٥ سم. ازهارها مقبوبة الثلاث تطول نحو ٢٥ سم. لونها الى الصفرة الكبريتي || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

٢٥٠٨١ - **لهيب، حشيرة** (S). *Ruticilla, Phoenicurus* (S). *Rouge-queue* (F). *Redstart* (E).
 جنس طير من فصيلة الشحروبوات. انواحه كثيرة العدد اصطناعا العالم القديم تكثر في البلاد الاسيوية || جميعها صغيرة القذ، رشيقة القوام، قصيرة المنقار، مستطيلة الجناح، ذنبية الراس، رطله الريش، حيلة الذوب. اذواب اناتها اقل زركشة وزده من اذواب ذكروها. قوتها الحشرات حل اختلاف انواحه. تنش في شجائف الصغور وتجاوليف الاجار || اشهر انواحه ما يلي.



لهيب اسود الرأس

٢٥٠٨٢ - **لهيب اسود الرأس** (S). *Ruticilla ethys, Phoenicurus ochrurus* (S). *Rouge-queue ethys, Rouge-queue noir* (F). *Black redstart* (E).
 طائر من اللهيب طول نحو ١٦ سم. ثوبه ثوب اللهيب الاسود الزور باستثناء الرأس الذي يمه السواد والاواخر المخبجة بالابيض. تفريده لطي الاخوان. حصفته تراوح من ٥ الى ٦ بيضات تقود بها الانثى دون الذكر.

٢٥٠٨٣ - **لهيب اسود الزور** (S). *Ruticilla phoenicea, Phoenicurus phoenicurus* (S). *Rouge-queue à gorge noire, Rouge-queue à front blanc, Rouge-queue de muraille* (F). *Common redstart* (E).
 طائر من اللهيب طول نحو ١٥ سم. ثوبه جميل الانوان المتراكبة، رأسه الى الكهية الزرقاء تتوسطه بقعة يضاء تمتد الى الجبهة. زوره اسود، ظهره الى الكهية الربادية يطوها موج ازرق. جوشه وايظاه وذكاه وذنبه الى الصبغة السنانية الزاوية. ريشه عزالانه وكوامد جناحه الى السرة الخفية، اباهره الى الصبغة، حدة عيه سنانية اللون. منقاره ويبراه الى السرة السوداء || اثنتا تحض مرتين في العام، الاولى في اواسط نيسان والثانية في اوائل حزيران. حصفته تراوح من ٥ الى ٨ بيضات.



لهيب اسود الزور

اوائل حزيران ويبقى حتى اواخر تموز. تشرح من المبرر الى قصبة الليل. تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع ويصح الككن ميحاديا على الصفحات السفلى من نصال الارراق || السرة تطول نحو ٢٨ سم. جسمها اسطواني الشكل، كثيف الملب القصير. ثوبا يماثل البيت التي تمشي فيها وهو يراوح من اخشار البيري الى الرية والصبغة الصفراء يملو ثلاثة خطوط قاطبة الى الجفوة. رواجها البطنية الوسطى ماضعة ما يحمله تقصص عند الانتقال || طور الامكامل الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي في الجفلة.

٢٥٠٩٦ - **لهناق** (F). *Taureau blanc* (F). *White bull* (E).
 النهاق: الثور الابيض. وكل ابيض فاق وفاق. بقرة فاق ولقة. ثور، ملق اللين: ابيضه.

٢٥٠٩٧ - **شجبة، شحطة** (F). *Emphysème pulmonaire* (F). *Pulmonary emphysema* (E).
 تعرف ايضا بانتفاخ الرئة، داه يصيب الهائم في صدورها لا تكاد تسلم منه، وهو في الخيل من الورب المبطلة ليع.

٢٥٠٩١ - **لهيم** (F).
 اللحم هو السن من الهيدون واخصها حيدان القصباسة كالبقر والضان والماعز. ج. لحوم.

٢٥٠٩٢ - **لهيم** (F). *Loam* (E).
 من الامير مصطلح الشهاقي. تربة مكونة من فرين وويل وصلصال بنسب متعادلة لا يسد فيها عنصر حل آخر.

٢٥٠٩٣ - **لهوب** (F). *Inflammable* (F).
 قابل الالتهاب او سريع الاشتعال او الاحتراق.

٢٥٠٩٤ - **لهووية** (F). *Inflammabilité* (F).
 هي قابلية الالتهاب او الاشتعال.

٢٥٠٩٥ - **لهوة** (S). *Isothécium* (S). *Isothécion* (F). *Isothécium* (E).
 جنس طحالب من جانبيات الالهاء. انواحه المعروفة نحو ٣٠ ممتها المناطق المحتلة الحارة من العالم القديم. تعيش في الصغور في المواقع الرطبة || سوقها دقيقة، نخلة، مدادة. اوراقها متراكبة شديدة الصفرة. غبائها جرابية مستطيلة الحامليق المنصبة.

٢٥٠٩٦ - **لهوية** (S). *Uvularia* (S). *Uvulaire* (F).
 جنس نباتات جذمورية عشبية زيبينة معمرة من فصيلة الزنبقيات. انواحه المعروفة منه. سوقها دقيقة، نخلة فضاء. اوراقها لا قياسية الشكل والانتظام. ازهارها فردية او تولوية الانتشاب، ابطية الارتكاز، سدنية بتلات المستطيلة المتدللة، لونها الى الصفرة || اعرف انواحه ما يتبع.

٢٥٠٩٧ - **لهوية كبيرة الزهر** (F). *Uvularia grandiflora* (S). *Uvulaire à grande fleur* (F).
 نوع من الالهوية السبروتية. تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها مقبوبة سنانية، نصلها بطول من ٦ الى ١٠ سم. وهو مائل الصفرة السليا اخضره، خيل السفلى الطحلاء. ازهارها كبيرة القذ تطول من ٣ الى ٤ سم. لونها الى الصفرة الجسمية || ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران.

٢٥٠٩٨ - **لهوية كبيرة الزهر** (F). *Uvularia grandiflora* (S). *Uvulaire à grande fleur* (F).
 نوع من الالهوية السبروتية. تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها مقبوبة سنانية، نصلها بطول من ٦ الى ١٠ سم. وهو مائل الصفرة السليا اخضره، خيل السفلى الطحلاء. ازهارها كبيرة القذ تطول من ٣ الى ٤ سم. لونها الى الصفرة الجسمية || ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران.

٢٥٠٨٩ - **لَوَابُ الْمَسَوِطِ * ، لَوَابُ مَسَلَحِ ***
Lupa hastata (S). Lupa armée (F).

نوع من اللواب. اعطانه بعض مناطق البحر الابيض المتوسط جسمه صغير القند بطول نحو ٣ سم. ويمرض نحو ٦ سم. ثوبه متداخل الالوان فيه الاسمر والاديس والاصفر والاشفق والاسمر ويملو في القسم الخلفي من درعه ثلاث نقط مستديرة جوية اللون.

٢٥٠٩٠ - **لَوَابُ الْهِنْدِ * . Lupa tranquebarica (S). Lupa des Indes (F).**

نوع من اللواب. اعطانه شطوط الهند الجنوبية. جسمه كبير القند بطول نحو ١٥ سم. ويمرض نحو ٣٠ سم. ثوبه متداخل الالوان الجميلة فيه الازرق والاحمر والبرتقالي والاصفر والاشفق والصفاني.

٢٥٠٩١ - **لَوَاحِمِ ***

Carnassiers, Carnivores, Fauves (F). Carnivorous, Fallow-deer (E).
رتبة من الحيوانات البينة آكلات اللحوم. فصائلها عديدة اشهرها السنوريات والكلبيات والذبيات والضبقيات والسموريات والزباديات ...

٢٥٠٩٢ - **لَوَازِكُ * . Loasa (S). Loasa, Loase (F). Loasa (E). Loasa, Nesselina (D). Loasa (I).**

جلس نباتات عشبية حولية ريشة زرقية من فصيلة اللوازيات. انواعها قليلة جميعها زباء. زهبا حارق كالقفراس. اوراقها متعاقبة، مفروشة. ازهارها فردية محورية الارتكاز، تقابل الاوراق وهي خماسية التركيب، جميلة الشكل، نارية اللون تصطبغ بعض النوقت. ازهارها يستمر طوال الصيف.

٢٥٠٩٣ - **لَوَازِيَاتُ ***
Loasaceae (S). Loasacées (F). Loasaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة الفصائل اجناسها. انواعها قليلة، معظمها اشعاب حولية ومحولة. اعطائها امريكا الاثرائية.

٢٥٠٩٤ - **لَوْبِ ***
Abelles (F).

اللوب هو النحل والاب واللب أيضاً.

٢٥٠٩٥ - **لَوْبِيَا * ، لَوْبِيَا ***

Dolichos unguiculatus (S). Dolique, D. asperge (F). Black eyed dolichos, Asparagus bean (E). Riesen Spargelbohne (D). Dolico asparago, Fagiolo dall'occhio (I).
نبات عشبي زراعي حولي من فصيلة القرنيات الفرفرافية. شروبه كثيرة العدد زروع ثمراتها الخضراء القليلة او ليزورها الجافة || وهي تجود في جميع الارربة القليلة الانساج الممكن ربحا. يزودها وأقرة المادة الغذائية تحوي مساقوم:
من المواد الازوتية ٢٢,٢٤ %
من المواد الدهنية ١,٣٠ %
من المواد الهيدروكربونية ٥٦,٨٠ %
٢٥٠٩٦ - **لَوْبِيَا بَلْدِيَّة * . Dolich de China (F).**
هي الدجر الصيني، اطليه.
٢٥٠٩٧ - **لَوْبِيَا سَوْدَانِيَّة * . Ambrevade (F).**
هي البيلة الهندية، اطلبا.

٢٥٠٨٨ - **لَهَيْمَةُ ***
Crenilabrus (S). Crenilabre (F). Crenilabrus (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الكيديديات شائكات الزعنات. انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها شبه اهلبيجية الشكل تقابل من ١٥ الى ٣٥ سم. وذوها اسفينة. زعناتها الظهرية مستطيلة. زعناتها الذيلية مقطوعة. خراشفيها مائلة. اللواب جميلة الالوان المراكية الزاهية تتركز على الريدة الفضية تعلوها خطوط ومجاميد ومجرات فراوش من الاحمر الى الاصفر والاخضر || اسماك هذا الجنس تسرا في وكثات من الحث وتفتقد السرة وتحافظ عليه حتى التقف || حولها متوسطة الصنف، مأكولة.

٢٥٠٨٥ - **لَهَيْمَةُ طَاوُوسِيَّة ***

Crenilabrus pavo (S). Crenilabre pavo (F). Crenilabrus pavo (E).

نوع من الهيمه. سمكة بحرية يبيض. اعطائها بعض اقالم البحر الابيض المتوسط. تعتبر من اسماك المباح وحشاش || جسمها اهلبيجي الشكل، متحمل التبطيط بطول نحو ٣٥ سم. لونها متراكب الالوان القسطانية الجميلة. الذكر اكبر قداً من الانثى واكثر تزويجاً والحم خصباً. رأسها مخروطي الشكل. فكها قويان، متداولان شفقها متحمل الانفراج. ميناءا كبيرتان، جاحضتان. باقوتيتان. زعناتها الظهرية مستطيلة، لامتساوية الارتفاع. زعناتها الذيلية مستديرة الطرف والزوايا || لحمها جيد الصنف، مغروب فيه.

٢٥٠٨٦ - **لَهَيْمَةُ مَبْدُولَةُ ***

Crenilabrus melops (S). Crenilabre commun, C. mélops (F). Crenilabrus melops (E).

نوع من الهيمه. سمكة بحرية يبيض. اعطائها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي تعتبر من اسماك المباح وحشاش || جسمها اهلبيجي الشكل متحمل التبطيط، بطول نحو ١٨ سم. لونها متباين الخصب بين الذكر والانثى. القين الجفوي يسود عند الذكر والاخضر الخففي عند الانثى. ويملو عند الشقين حلال اسود رءاه كل حين وبقبة سوداء قرب قاعدة الزعنات الذيلية. رأسها مخروطي الشكل، ذلق الحلق، متحمل الشفق. ميناءا كبيرتان، جاحضتان. زعناتها ملونة. الظهرية مستطيلة والذيلية مقطوعة الطرف || لحمها جيد الصنف مغروب فيه.

٢٥٠٨٧ - **لَوَاكُ ***
Torcou (F).

طائر من النقاويات يعرف بابي لوي، اطلبه.

٢٥٠٨٨ - **لَوَابُ ***
Lupa (S). Lupa (F). Lupa (E).

جنس نوع من النقاويات عفايات الارجل قصيرات القليل وفصيلة الخيليات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة اعطائها المحيط الهندي || اجسامها متفاوتة القند، شديدة اللبائن الحمضي. تتميز بدورها المصممة وبامتداداتها الجانبية التي تأخذ شكل الاستواء الحراب. حمار دورها الاسمية منشاري الشكل. ارجلها الخلفية عملاقة القصل الطرفية. ملاقطها سنية شبيهة || اشهر انواعها لواب الهند ولواب المتوسط.



هيمه طاووسية



هيمه مبدولة



لواب المتوسط



لوازنة



لوبياء

٢٥١٠٧ - **لُوبِيَلِيَّةُ زَرْقَاءَ** ، **لُوبِيَلِيَّةُ السُّفْلِسِ**
Lobelia syphillicica (S). Lobélie syphillicique, Cardinale bleue (F).

بجلة طبية وزينة ممرعة تملو من ٤٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها فراء. أوراقها سنائية ذلقة طول نحو ١٥ سم. نصلها مائل الصفحة المسنة الحافة. أزهارها سبيلة التجميع تاجية الأرنكاز طول نحو ٣ سم. لونها إلى الأزقة البنفسجية المورج || أزهارها يستمر من تموز إلى تشرين. كانوا ولا زالون يستعملون أزهارها وزهورها ويؤثرها في معالجة السفلس.

٢٥١٠٨ - **لُوبِيَلِيَّةُ سَاعِطِيَّة**
Lobelia fulgens (S). Lobélie éclatante (F).

بجلة زينة ممرعة تملو من ٦٠ إلى ٩٠ سم. ساقها قليلة الفروع. أوراقها لاطئة لسة سلتة الأطراف، نصلها جوي اللون خلي البشرة، أزهارها كبيرة القد، خلية القنابات الدرية، برتقالية اللون || أزهارها يستمر من أيار إلى أيلول.

٢٥١٠٩ - **لُوبِيَلِيَّةُ قَانِغَرِيَّة**
Lobelia splendens (S). Lobélie splendide (F).

بجلة زينة ممرعة تملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها فراء. أوراقها لاطئة لسة نصلها مسن الحافة، اغضر الصفحة، جوي المختار. أزهارها كبيرة القد، اريوانية اللون، برتقالية المورج || أزهارها يستمر من تموز إلى تشرين الثاني.

٢٥١١٠ - **لُوبِيَلِيَّةُ قَرَوَهَاءَ**
Lobelia rumosa (S). Lobélie ramifiée (F).

بجلة زينة ممرعة تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. ساقها اسطوانية زياء. أوراقها السفلى ريشية مخمرة. أوراقها العليا سنائية مدهية الزام الاخضر. نصلها خلي البشرة اسفل اللون. أزهارها كبيرة القد لونها إلى الأزقة || أزهارها يستمر من حزيران إلى آب.

٢٥١١١ - **لُوبِيَلِيَّةُ قَرْمِزِيَّة**
Lobelia cardinalis (S). Lobélie cardinale (F).

بجلة زينة ممرعة تملو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. ساقها قليلة الفروع، أوراقها لسة سلتة. نصلها مائل الصفحة يطول من ٥ إلى ١٥ سم. أزهارها قمرزية اللون لا تتسارية القنابات || أزهارها يستمر من أيار إلى أيلول.

٢٥١١٢ - **لُوبِيَلِيَّةُ كَرَلِيَّة**
Lobelia amans (S). Lobélie de la Caroline (F).

بجلة زينة ممرعة تملو من ٦٠ إلى ١٤٠ سم. ساقها فراء. أوراقها اعليجية سنائية تطول من ١٠ إلى ١٥ سم. نصلها مائل الصفحة المسنة الحافة. أزهارها سبيلة التجميع، تاجية الأرنكاز، لونها إلى الأزقة البياضة. أزهارها يستمر من تموز إلى أيلول.

٢٥١١٣ - **لُوبِيَلِيَّةُ مُحَرَّرِيَّة**
Lobelia urens (S). Lobélie brûlée (F).

بجلة طبية ممرعة تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم. تعيش في المناطق والاراضي الرطبة، مدهها الحد. يقال أنها جمالية المادة قلتها تغيد المدة، كثرها مؤذية. ساقها زياء اللحاء. أوراقها مزغرة، زغبها محرق قارس. أزهارها وردية اللون.

٢٥٠٩٨ - **لُوبِيَلِيَّةُ عُسْقُولِيَّة**
Dolique balbeux (F). هي النامر، اعليه.

٢٥٠٩٩ - **لُوبِيَلِيَّةُ لَبْلَابِيَّة**
Dolic lablab (F). هي اللباب المصري، اعليه.

٢٥١٠٠ - **لُوبِيَلِيَّةُ سِيكَلَات**
Dolique à oil noir (F). هي الدجر، اعليه.

٢٥١٠١ - **لُوبِيَزِيَّة**
Lopezia (S). *Lopézia* (F). *Lopezia* (E).

جنس نباتات عشية برية وزينة من فصيلة الاغبريات. مدها بعض مناطق أمريكا الجنوبية والمكسيك || ساقها ترتفع من ٣٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقها متعاقبة، مخلفة الاشكال. يكثر فيها السنائي. أزهارها عتدي التجميع. أزهارها لانظافية، متباينة الألوان، رباحية انفصل والبلات اللامساوية، ثنائية الاسدية المستعرضة الاطراف || انواعها المعروفة قليلة العدد، أشهرها التالية:

٢٥١٠٢ - **لُوبِيَزِيَّةُ زَرْجَنْجَرِيَّة**
Lopezia minima (S). *Lopézia cinabre* (F).

نوع من الوريذه. جنية سريرية ممرعة. مدها المكسيك. ساقها مخشوشية تملو نحو ٥٠ سم. أوراقها متعاقبة اعليجية مسنة انفصل. أزهارها عتدي طري. أزهارها إلى الحسرة الزغفرية اللامعة || تنويرها يستمر من تموز إلى تشرين الثاني.

٢٥١٠٣ - **لُوبِيَزِيَّةُ كَثِيرَةُ الزَّهَر**
Lopezia grandiflora (S).

Lopézia à grandes fleurs (F). نوع من الوريذه. جنية سريرية ممرعة. مدها فواتيالا. ساقها منتصبه فراء تملو من ١٠٠ إلى ١٦٠ سم. أوراقها متعاقبة اعليجية انفصال تطول من ٥ إلى ٩ سم. نصلها خلية مدهدة الاطراف. أزهارها فردية، محورية، قفها من ٢ إلى ٣ سم. لونها إلى الحسرة السبعاء المورج || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف والخريف.

٢٥١٠٤ - **لُوبِيَزِيَّةُ مُتَوَجَّحَة**
Lopezia coronata (S). *Lopézia couronnée* (F).

نوع من الوريذه. عشية سريرية زينة حولية. مدها المكسيك. ساقها مضطعة مزوانية تملو من ٤٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها متعاقبة، يفضية انفصل المسن المختار. أزهارها عتدي طري. أزهارها إلى الوريدي الازجواني المورج || تنويرها يستمر من تموز إلى أيلول.

٢٥١٠٥ - **لُوبِيلِيَّات**
Lobeliaceae (S). *Lobéliacées* (F). *Lobeliaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القملات. اجناسها وانواعها كثيرة العدد، أشهرها اللوبيلية.

٢٥١٠٦ - **لُوبِيلِيَّة ***
Lobelia (S). *Lobélie* (F).

جنس نباتات عشية حولية وممرعة من فصيلة اللوبليات. انواعها نحو ٢٠٠ مدها بري ومدها طبي وزيني. أوراقها متعاقبة لا قياسية الشكل. أزهارها لا نظامية التجميع والارنكاز، جملة الشكل مخلفة الألوان || احرف انواعها وأشهرها ما يتبع:



لوبيلة

٢٥١٢٣ - **لَوْتٌ** Polluer (F). To pollute (E).

وسخ الشيء باضاعة الاقذار عليه كتلوثير مياه الانهر
يبيض المواد الكيماوية .

٢٥١٢٤ - **لَوْدِيَّاتٌ** Eupaléodictyoptères (F). Eupaléodictyoptera (E).

رقة حشرات متفرقة من طبقة المفكيات . اساقيرها
تعود الى الحقبة الرابعة من الاياج الاولي المعروفة ايضا
بالحقبة الكربونية || جميع حشراتنا كبيرة القد حاصلة
او دامة .

٢٥١٢٥ - **لَوْدِيَّةٌ** Lucina (S). Lucine (F). Lucina (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحيات الخياشيم
وفصيلة اللودينييات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ بعضها من
تصحيحات الحقبة السيلورية والبعض الآخر منتشر في
معظم ببحار العالم || اصداؤها متباينة الاشكال والابعام
منها التقيمة والبيضية والمالسة والمحددة والمضلمة . جميعها
ثنائية المثالب الطليقة المستطيلة || تعيش في الرمال المنسورة
بالماء قرب الشواطئ والمجاريح .

٢٥١٢٦ - **لَوْدِيَّاتٌ** Lucinidae (S). Lucinidés (F). Lucinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفيحيات الخياشيم .
اجناسها وانواعها المعروفة ، من غابرة وبماصرة ، عذبة
الغابرة تجيد العصر السيلوري اما المعاصرة فتنتشر في
معظم ببحار العالم || اصداؤها لاقباسة الشكل والحجم
يكثر فيها البيضي المثلج . اطراف مصاريها مسننة
الخمار او مالة || اعرف اجناسها واشهرها اللودينية
والكربيس .

٢٥١٢٧ - **لَوْدِيَّةٌ** Planché à dessin (F). Drawing-board (E).٢٥١٢٨ - **لَوْحَسٌ كِبْرِيئِيٌّ** Cosmia fulvago (S). Cosmie jaune soufre, Calymnie jaune (F). Cosmia fulvago (E).

حشرة من فصيلة الفسيقات حرشفيات الاجنحة . موطنها
بعض الاقاليم المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط والاندلس
وأروية . فراشها جارية قوتها رحيق الازهار . سرقتها
تتشبه حل اوراق النباتات والاشجار الخرجية || جسمها
مردني الشكل يطول نحو ١٢ سم . بطنها نحو ٣١ سم .
رأسها كبريتي اللون . عينها كبيرتان . زبالانها خيطيان .
جوشها وبطنها الى الصفار الكبريتي || ورشانا الاماميان
الى الصفار الكبريتي يطوه بتيجع عنابي وتشبيك بني .
ورشانا الخلفيان الى الشبهة الصفراء || لها جويل واحد
في الجول . تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى ايلول .
تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع
وتتمتع المكن لطفاً الى الصفحات السفلى من نصال
الاوراق || السرة تطول نحو ١٨ سم . جسمها اسطواني
الشكل . مائل القشعر . اسفر اللون . اسود الملاتي .
رأسها اسود . منها ورواجها الى السرة || طول الاكدمال
الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي في التربة حيث تنفخ
السرة ملتصقة بجلباب من الطين .

٢٥١١٤ - **لَوْبِيْلِيَّةٌ هَانِكَةٌ** Lobelia heterophylla (S). Lobélie hétérophylle (F).

عشبة حولية تزيينية تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . ساقها
مضلعة مرسعة قليلة الفروع . اوراقها السفل ريشية مفرفة،
اوراقها العليا املبلجية او متباينة التصل . ازهارها عتيقودية
التجميع . كبيرة القد ، خلية البشرة ، لونها الى الزرقا
يطولها موج وردى او ابيض || ازهارها يستمر طول
فصل الصيف .

٢٥١١٥ - **لَوْتُ** Scaena (S). Scièna (F). Scaena (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الباريات . انواعها نحو ٢٥
جميعها مفترسة ، قوتها الزنكة والسردين . معظمها من اسماك
البحر الاطلسي . تتميز بكثر اجسامها وزمانتها الظهرية .
اثرها الى الكهبة السراء يطولها موج اسفح || اشهر
انواعها لوت المتوسط .

٢٥١١٦ - **لَوْتُ الْمُخَوَّطُ ، نِسْطَرَاوُ** Scaena aquila (S). Sciène algie, Mègre, Persèque (F). Mègre (E).

نوع من اللوت الميول في المتوسط . مسرعه ضمن المياه
الاقطالية ، حيثه كبيرة القد تطول من ٤٠ الى ٦٠ سم .
ثوبه الى الريدة الطملاء السقاء الموج . لحمه لذيق الطعم
جيد الصنف .

٢٥١١٧ - **لَوْتُسٌ** Lotus

هو اللوتس ، اطلبه .

٢٥١١٨ - **لَوْتُيَا لِحْيَةُ الْفَيْلِ** Anthyllis barba jovis (S). Anthyllide barbe de Jupiter, Barbe de Jupiter (F). Jove's beard, Jupiter's beard (E). Jupiterabart, Silberbart (D). Antillide, Barba Giova (I).

عشبة برية مرموعة من القرنيات القفرشية تكثر في الاراضي
الحصاة ، ساقها فروع مستقيمة . اوراقها مركبة متعاقبة
وريفاتها بيضية متقاربة . ازهارها ابليطة وطريقة الارتكاز
مستحبة العرف ، مثدية .

٢٥١١٩ - **لَوْتُيَا نَافِلَعَةٌ ، حَشِيْشَةُ الْبُرْجِ ، حَشِيْشَةُ اللَّذْبِ** Anthyllis vulneraria (S). Anthyllide vulnéraire, Trèfle jaune (F). Kidney-vetch, Layd's fingers (E). Echter Wundklee, Geißler Hasenklee (D). Vulneraria, Trifoglio giallo delle sabbie (I).

عشبة برية طيبة ومرموعة من فصيلة القرنيات القفرشية ،
تكثر في الاربة الرملية الغاسلة . ساقها مستقيمة . اوراقها
مركبة متعاقبة ، وريفاتها بيضية متباينة الارتكاز .
ازهارها مستطيلة المذايق صفراء اللون وريدة الموج . اوراقها
طيبة تائم الجرح بعد ان تقضي على الالتهاب .

٢٥١٢٠ - **لَوْتُيسِيُومٌ** Lutécium (F). Lutecium (E).٢٥١٢١ - **لَوْتِيْنٌ** Lutéine (F). Lutén (E).٢٥١٢٢ - **لَوْتُ** Essaim (F). Swarm (E).

هو نول النحل من الهجرة الثانية والثالثة . اما النول من
الهجرة الاولى فيسمى ديسماً .



لوت



لوتيا لية الجبل



لوتيا نائمة



لوتية



لوحس كبريتي



لوحس مدعب



لوحف



لوح



لورس



لور



لورس

٢٥١٣٢ - لَوْرِيَسَات

Clavigeridae (S).

Clavigeridae (F). Clavigeridae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم انحاء العالم لانها تعيش في قرى النمل مع اكثر اجناسها مستطيلة قصيرة طولها من ٢ الى ٤ م. رؤوسها صغيرة، ضيقة، مستطيلة الشكل. عيونها طامسة. قرنها الاستشعارية صولجانية، سداسية الفصل. تأكلها وتكونها صغيرة. كواسلها بيضية الشكل، صغيرة الحجم. بطونها اجاصية الشكل. الحامدا قصيرة تلتصق ثلث البطن تعيش مع النمل الذي يلقها بالفلس والذي يلصق ما تنفضه مسام بطونها من مواد مائنة الشجر اجناسها القويص.

٢٥١٣٤ - لَوْر

Coregonus lavaretus (S).

Lavaret (F). Gwyniad (E).

سكة نهريه وبحيرية من فصيلة السلمونيات. جسمها اهلبيجي الشكل بطول نحو ٤٥ سم. ثوبها الى الاربعة ازرقة يملونها موج فضي وتكت سود تكتنف الظهر من جانبيه. ترطب في المياه المسيرة. تسرا في تشرين الثاني. لحمها لذيق العلم جيد الصنف.

٢٥١٣٥ - لَوْرَاسِيَا

Lauraea (F). Lauraea (E).

اسم يطلقه علماء الجيولوجيا والجيولوجيا على الحصى القارية التي كانت، قبل تجزئتها، تتألف من آسيا واروپة وامريكا الشمالية.

٢٥١٣٦ - لَوْرُوس

Mouetta (F).

هو زوج الماء، اطليه.

٢٥١٣٧ - لَوْرُوس

Lorocera (S).

Lorocéra (F). Lorocera (E).

جنس حشرات قانصة من فصيلة القوريسات ورتبة غديات الاجنحة. انواعها المعروفة قليلة العدد اصطناعها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة اجسامها حفاة طولها من ٧ الى ١٠ م. رؤوسها كبيرة. ناشرة. قرنها الاستشعارية مقدية الفصائل المجهرية بعض الهلب المستطيل. تأكلها ضلبيية. كواسلها معقدة، مخصورة. اغادها لاسقة، نحلة التخديد القاطب. قواظها فضيحة، مبيضة الهلب. انثويها الى السرة السوداء المتفاوتة الاماجات الحشرة الجملانة قانصة، تألف المواقع الرطبة احصها صفات المتعلق. البقرة وانجة.

٢٥١٣٨ - لَوْرُوسِيَات

Loroceridae (S).

Loroceridae (F). Loroceridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اصطناعها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة اجسامها مستطيلة الشكل، رؤوسها كبيرة. عيونها كبيرة، ناشرة. قرنها الاستشعارية وتكونها مستطيلة الهلب الشالك. تأكلها بارزة الاطراف الخارجية الممسكة. يرانجها مائدة الزناد. الحامدا نحلة التخديد القاطب الذي يمد ١٢ اغصودا. قواظها معتدلة الطول، مبيضة الهلب. مكها به اسطواني الشكل، عين الطرف اللقيح، تنصه الاثنى افراديا في التربة. يرانجها سداسية القوائم والمقل. حورياتها تنحور في التربة داخل اروقة البوابة الشكل سطوية الرأس والمقب

٢٥١٣٩ - لَوْحَس مُدَّعِب

Cosmia aurago (S). Cosmie dorée, Callymnia

dorée (F). Cosmia aurago (E).

حشرة من السليقات حشرغيات الاجنحة. موطنها بعض الاقاليم المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط والاندلس واروپة. فراشها جارية قوتيا رقيق الازهار. سرتها تعيش على اوراق وبقاير الزان والمثلث. جسمها مستطيل القدر بطول نحو ١٣ م. بسطها نحو ٢٢ م. رأسها الى الخلفي الهلب الموج. ميناها كيريتان. زباناها غيطيان. عيونها وبطنها الى الصغار الهلب الموج. رؤسها الامايان الى الصغار الكبرى يملونها تقطيع وتبيض عتاي. رؤسها الخلفيات الى الشبهة الغبراء تملونها شمة تهلوج بين الخلفي والاندلس الى جليل واحد في الحول. تظهر الفراشة في آب وتبقى حتى اواخر الخريف. تسرح في الليل. تماثل يده ظهورها بنحو خمسة اسابيع. وتتمتع المكان لطفا مستطيلة على المسحات السفلى من لصلال الاوراق الى السرة طول نحو ٢٠ م. جسمها اسطواني الشكل، مالمس القشاش غرنويي اللون، زنيي الموج. رأسها الى الجوزة. منها الى السرة. وراجها الى السرة السوداء. طول الاكمال الذي يستمر نحو ٥ يوبا يتقضي في التربة حيث تنفد السرة ملتصقة بجلباب من الطين.

٢٥١٤٠ - لَوْحَف

Parmophorus (S).

Parmophore (F). Parmophorus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل وحيدات الاجهزة وفصيلة القويصيات. انواعها المعروفة قليلة العدد اصطناعها البحر الاحمر وبندس البحار الاسيوية تعيش على المديح قرب الشواطئ. جميعها سرة وتعيش الثور فتتفنن في الحصاها وتحت الرمال. اصطناعها شبه اعطليجية الشكل، مقبولة المقدم، مستديرة المؤخر، ناشرة التيج، قليلة الانفتاح، تلتصق كامل الظهر. رؤوسها تنتهي باعظام اسطوانية. لواسها شبه مخروطية الشكل. عيونها جاسطة قاعدية. غياشها ظهريه الارتكاز تقوم في تجويد خاص يلاصق التمسق اشهر انواعه لوفعة البحر الاحمر.

٢٥١٤١ - لَوْح

Cluytia (S). Clutia, Cluytia (F).

Cluytia (E). Clutia (D). Clutia (I).

ليات حشري ليني ترتيب من فصيلة السوسيات مهدد البلاد الاستوائية. ساقه كدنة، اوراقه خلية جميلة الخضار الاطحل. انزاهه زائجة الالوان البنية. يزدهج في المراكب والمصارى.

٢٥١٤٢ - لَوْحَس

Claviger (S).

Clavigère (F). Claviger (E).

جنس حشرات من فصيلة القويصيات ورتبة غديات الاجنحة. انواعها المعروفة سبعة اصطناعها تمتد من الهند وايران الى اروبية. تعيش مع بعض انواع النمل احصها الكبار اجسامها صغيرة، طولها نحو ٣ م. رؤوسها ضيقة، مستطيلة الشكل. عيونها طامسة. قرنها الاستشعارية صولجانية. تأكلها وتكونها صغيرة. ملامسها نحلة. كواسلها صغيرة، شبه بيضية الشكل. بطونها اجاصية. الحامدا قصيرة تلتصق ثلث البطن. انثويها الى الصرة المسفاة المتفاوتة الاماجات تعيش مع النمل في قراء يلقها ويلصق ما تنفضه مسام بطونها.

٢٥١٤٤ - **لُورْ الجَبَر**
Olivier du Maroc (F).
هو الأركان ، اطلبه .

٢٥١٤٥ - **لُورْ الهِنْد**
Amandier des Indes (F).
هو الاطليج اللوزي ، اطلبه .

٢٥١٤٦ - **لُورْ حُلُو**
Prunus amygdalus communis, Amygdalus communis, A. dulcis (S). Amandier commun (F). Common almond tree (E). Echte Mandel (D). Mandorlo comune (I).
هو اللوز المشهور المأكول الثمار ضروبه الزراعية كثيرة العدد تقسم الى فئتين : فئة الضروب ذات النواة الصلبة ، وفئة الضروب ذات النواة الطرية الممكن فقشها بالاصابع .
انجار غليظة السوق تملو من ١ الى ١٢ م . ثمارها مأكولة اللوب تحوي ما يراوح قدر :

من ٥٠ الى ٥٥ ٪ من المواد الزيتية
من ٢٣ الى ٢٥ ٪ من المواد الاحية

وهي شائعة الاستعمال في صناعة السكاكر ويستخرج منها زيت اللوز .

٢٥١٤٧ - **لُورْ هَر** ، **هَرِج**
Prunus amygdalus amara, Amygdalus amara (S). Amandier amer (F). Bitter almond tree (E). Bittere Mandeln (D). Mandorlo amaro (I).
نوع من اللوز ثمرته سبروتية نشطة تملو من ٦ الى ١٥ م . زراعتها صعبة لانها تستعمل كطعم لضرروب اللوز الحلو . ثمارها صلبة : لوبها مر الطعم يحوي بعض المواد الجسمية اعصها الايميذالين (Amygdaline) التي ينشأ منها الحامض السيناديريكي او الحامض البروسي الشديد الفعالية السامة . ثمارها تستعمل في الصناعة فيستخرج منها زيت اللوز المشهور وهو طيب ، عادم الاذى ، فغال من العناصر السامة . اما المكسب اثناسج من عصره فهو سام ميت .

٢٥١٤٨ - **لُورْكَ**
Amande (F). Almond (E).
هي ثمرة اللوز منها الحلوة والمرة .

٢٥١٤٩ - **لُورْكَ الوُصَاب**
هي اللدة اللامية ، اطلبه .

٢٥١٥٠ - **لُورْلية**
Lacelia (S).
Lacélie (F). Lacélie (E).
جنس نباتات عشبية حولية برية وتزيينية من فصيلة القشقيات معقودة التبريد على اسم العلامة «لوزل» .
ههنا بعض مناطق المكسيك . سوقها منتسبة تملو من ٥٥ الى ١٠٠ سم . اوراقها بيضبة التمثل او ستانية . ازهارها زرقاء اللون او قرزية . قناباتها مسنة ١١ انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية .

٢٥١٥١ - **لُورْلية زرقاء**
Lacelia coerules (S).
Lacélie bleue (F).
نوع من الورلية . عشبة حولية تزيينية . ساقيها تملو من ٥٥ الى ٧٠ سم . فروعها نخيلة صلبة ، خلية اللحاء . اوراقها بيضبة الشكل ، صالها مسنة اخضر . ازهارها زرقاء اللون . قناباتها صامدة واردة ١١ تنويرها صيفي .

تميش حل ضفاف الاتهر والبيمرات والمناقع . معظم انواعها قاصص وبعضها خاضل ١١ اشهر اجناسها اللورس .

٢٥١٣٩ - **لُورْ كُنْص**
Loranthé d'Europe (F).
هي البتوية ، اطلبه .

٢٥١٤٠ - **لُورْ كَسِيَة**
Laurencia (S).
Laurencia (F). Laurencia (E).

جنس نباتات بحرية من اخليات البحر . انواعها المعروفة نحو ٢٥ اطلانها معظم بحار العالم ١١ بعضها غسروني المادة والبيض الآخر حلاصا . الونانها تلوو من الاصفر الى الاحمر ١١ بعض انواعها الغسرونية حريقة الطم تستعمل استعمال التوابل في بعض مناطق اوروبا الشمالية .

٢٥١٤١ - **لُورِي**
Domicella (S). Lori (F).
جنس طير من المتسلقات وفصيلة الببغاوات . انواعه المعروفة ٢٢ موطنها يمتد من الهند الصينية الى ماليزية والفيليبين . صلبها الجواني جماعي الا في زمن التساد والحضلة . تألف النباتات والمروج وضفاف مجاري الماء . قنيتها حبوب التيجولية واثار ١١ اجسامها معتدلة اللد ، قرزية الشبه بالهام . الونانها متباينة الالوان القراكية يحكر فيها الاحمر الابيضوي ثم الاصفر فالاصفر فالازرق فالعنابي . اجنحتها ذلقة ، اذنانها متوسطة الحجم ، مستديرة الاطراف .

٢٥١٤٢ - **لُورْ**
Prunus amygdalus (S).
Amandier (F). Almond tree (E). Mandel (D). Mandorlo (I).

جنس اشجار مشرة برية وزراعية من فصيلة الورديات . انواعه اثنان : لوز سلو ولوز مر ، فالسلو هو الزراعي وهو كثير الضرروب ولز هو البري . وبجرة اللوز من اي نوع كانت تستعمل بذلات الشوية الجلدية : جلوزها ولديته تنور في التربة على اعماق بيدة . ساقيها مستقيمة غشنة . اقصابها متفرجة كثيرة الانقاد . اقتادها غدا . قنيتها معتدلة الشموع ، قصيرة الذروة . اوراقها عابلة ، معتقة ، رمية ، ذلقة . نصليها يبرو اخضر اللون في اول عهد ثم ينحرف الى الفضة ويستقر عليها حتى الذبول والايال . ازهارها لوزية التجميع ، يضاء اللون ، ودية المراج . تتكون على الانقاد الحولية والحولة . وهي تنور في اواسط الشتاء فيليلج زهرها ، في لبنان ، خلال الزهرة الثانية من شباط وذلك قبل ابراق بعض البقت . ثمارها لوزية مستطيلة مذبذبة المقصبة تتكون من غلاف لحمي اخضر اللون المحل البشرة الكثيفة المحل يحف مع الادراك وهو يحسن عصية غشبية النشاء تغلف نواة لوبها ابيض اللون جامد المكسر وافر المادة الزيتية ١١ واللوز يتكاثر بالبلد ومن المستحسن وضع البذور في مستقرها مباشرة دون اللجوء الى المشتال وذلك لان نقل الفرم من المشتال الى مستقرها يوجب قطع الجذور الرقيقة العمل الذي يتناني مع سويحات هذه الشجرة ١١ وهو يعيش ويزدهر في جميع الاقاليم الحارة والمعتدلة لا يؤذيه سوى الصقيع لانه يسحب اغلاص الزهر او القند ١١ وهو يحذر في جميع الارابة انما يربح المتوسطة الانساج التي لا تفترق الى الكلس كما وانه لا يثمر كثيرا في الارابة الغنية المندجة .

٢٥١٤٣ - **لُورْ الكَلِيَة**
Cacaoyer (F).
هو الكاكاو ، اطلبه .



لوزية



لوري



لوز سلو



لوز



لوز



لوطس ارجواني



لوطس اصفر



لوطس فلسطيني



لوطس قرني

نحو ١٠٠ مظهرها نبات عشبي وبشفا جنبي. اوراقها مركبة، ثلاثية، اذينية. ازهارها لا تباينة التجميع والارتكاز جميعها سفلية || اكثر انواعها علفية زماما الماشية وبها الطليعة المديدة الفولاد، اشهرها.

٢٥١٦١ - لُوطُس اُرْجَوَانِي * ، لُوطُس زُرْجَاقِي حَمَض سَكْرِي

Lotus tetragonolobus, Tetragonolobus purpureus (S). *Lotier cultivé, L. pourpre, L. rouge, Pois café* (F). *Garden winged pea* (E). *Rote Spargelerbs* (D). *Loto cultivato, L. rosso, Vacca pisella* (I).

نوع من اللوطس البري والزراعي، وهو عشبة سرولية حولية تطو من ١٥ الى ٤٠ سم. ساقها مستقيمة فراء. وريقاتها واذايتها بيضيه الشكل. ازهارها فردية او ثنائية التجميع، ابليّة الارتكاز، حراء اللون، ساقها رباعية الاصلع. ازهارها يستمر من آذار الى ايار.

٢٥١٦٢ - لُوطُس اَصْفَر * Nelumbo lutea (S). Nélombo jaune, Lotus jaune (F).

نبات عشبي مائي جلموري من فصيلة النيلوفرينات. جلاميره حشولية نشوية المسادة المأكولة. اوراقه زنادية كبيرة مستديرة قطرها يراوح من ٣٠ الى ٦٠ سم. ازهار صفراء اللون عادمة البرق قطرها يراوح من ١٥ الى ٢٥ سم. تزكتر على شرايح تطول من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. || ازهاره يستمر من تموز الى آب.

٢٥١٦٣ - لُوطُس النِيل ، لُوطُس مِصْرِي ، عُرُوس النِيل ، زُرْدَة النِيل

Nelumbium speciosum, Nelumbo nucifera (S). *Lotus sacré, L. du Nil, Fève d'Egypte, Rose du Nil* (F). *East Indian lotus, Pythagorean bean, Sacred bean* (E). *Lotus blume, Agyptische bohne, Nillilie* (D). *Loto sacro, Fava del Nilo* (I).

نبات عشبي مائي جلموري مائي من فصيلة النيلوفرينات. اطرافه مياه البلاد الحارة الهندية والافريقية. اوراقه زنادية كبيرة مستديرة، نصفها يوم على سطح الماء قطره يراوح من ٣٠ الى ١٠٠ سم. أما زنادها فيطول من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. ازهاره كبيرة الله وردية اللون قطرها يراوح من ٢٠ الى ٣٥ سم. وهي ذكية البرق البطري. تمارة كروية الشكل نشوية المادة المأكولة || ازهاره يستمر طوال الصيف.

٢٥١٦٤ - لُوطُس فِلِسْطِينِي * عَظِيمَة

Lotus palaestinus (S). *Lotier de Palestine* (F). *Four winged pea* (E). *Garten Spargelerbs* (D). *Loto di giardino* (I).

نوع من اللوطس البري المروي المسمر. اطرافه تعطل يلاذ شرق البحر المتوسط. ساقه متعصبه فراء. ازهاره ابليّة وطرفية الارتكاز صفراء اللون. بزوره ما مأكولة تتبر من المقويات المادة المعقول الرجي.

٢٥١٦٥ - لُوطُس قَرْنِي * قَرْنُ القَزَال، كَتِيهَة

Lotus corniculatus (S). *Lotier corniculé, L. commun, Trèfle cornu, Corne du diable, Pied-de-poule* (F). *Bird's foot, Bird's-foot trefoil* (E). *Geheimer Hornklee, Schotenklee* (D). *Loto corniculato, Baccellina, Ginestrina salvatica* (I).

نوع من اللوطس البري المائي المسمر. ساقه متعصبه فراء. ازهاره الى الصفرة زنادية يعلوا تبقيج احمر، وهو

٢٥١٥٢ - لُوزِيَّة قِرْمِزِيَّة *

Loesslia coccinea (S). *Loesslie écarlate* (F).

نوع من اللوزية، عشبة حولية تزينية. ساقها تطو من ١٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها سنانية الشكل. نصفها مسنة الحمار، بجلة الحمار الاسم. ازهارها قرمزية اللون تطول نحو ٢ سم. ثنائيات عاصلة || تنموها يستمر طوال شهر حزيران.

٢٥١٥٣ - لُوزِيَّات

Arbres à noyaux (F). *Stone-plants* (E).

هي الاشجار اللوزية البزور، اغلب عصيات.

٢٥١٥٤ - لُوزِيَّين *

Amygdaline (F). *الوزين* غلوكوزيد يوجد في لب عصيات الوز المر والدراق والكرز... الوزين نمو في الماء وتصل الى غلوكوز وساحض سيانيدريك والهديد بنزويك. وهي، في مدة الانسان، تصل الى الماء فتسبب عارض تسم قد يكون مميتا.

٢٥١٥٥ - لُوسِيَّت

Leucite *جسم يتكون في وفة الخلايا النباتية، ج. لوسيات.*

٢٥١٥٦ - لُوتُوب *

Ocotayon, Chien oreillard (F). *Ocotayon* (E).

حيوان لام مفترس يسجد الجلس والنوع من فصيلة الكليات. موطنه بعض مناطق افريقية الشرقية والجنوبية. يأنف الادلخال والامراج البمشرة الاشجار. ملجته الحياتي زوجي || جسمه قريب الشبه بجم اين اوى، طوله نحو ١٠٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٣٨ سم. رأسه مستد الجرم، ذلق الخضر. عيناه صغيرتان حادتا البصر. اذناه عريضتان كيرتان. ذنبه كاذب الثعلب. ثوبه الى الكلبة الموشحة بالخطي. قوامه الى الكلبة السوداء وهي خاسية الاصابع في القافيين الامانيين، ورائحتها في الخلفيين || يسرح في الليل ويبيت في النهار. قوته كل ما استطاع اليه سبيلا من الحيوان والحشرات اغصها الجراد.

٢٥١٥٧ - لُوتُوبَة *

Paralepis (S). *Paralépis* (F). *جلس اسماك بحرية من مفتوحات المانة وفصيلة القوسيات.* ازوارها المرفوعة ثلاثة، اثنتان تمشان في البحر الابيض المتوسط واحدة في بحار الشمال || اجسامها وشية الشكل، مستطيلة. رؤوسها مخروطية، ذلقة، عادمة السم. ميزنها كبيرة صاجطة. اطرافها رمية الاشداد. زمانها الظهريه صغيرة الله، خلفية الارتكاز. زمانها الليلية فاقرة || الارباع الى الشبهة القفصية تبق في الظهر ويملاها مواج يراوح من الوردي الى اليلكي في البطن || لحوبا جيدة الصنف، مغروب ليا.

٢٥١٥٨ - لُوتُوسِي *

Froscole (F). *الفرسق غدة مغلقة ساقها شديدة القوية يسلق الطلع حدة السحابيات.*

٢٥١٥٩ - لُوطُوس هو الاطلس، اطليه.

Lotus (S).

Lotier (F). *Lotus* (E).

جنس نباتات برية وزراعية من القرنيات الفراقية. انواعه

Arum maculé (F).

٢٥١٧٣ - **لَوْفٌ مُبَعَّعٌ**
هو الاروم ، اطبله .

Luffa acutangula (S).

Louffa anguleux (F).

نوع من اللوف الزراعي . مهده الخند . ساقه تطول من ٣ الى ٦ امتار . اوراقه شديدة الخضار خماسية او مسباعية التفصيص القلبي الشكل . ازهاره ثلاثية الاسدية . ثماره مستطيلة ، عشارية الاصلع البارزة تطول من ١٥ الى ٣٥ سم . وتعرض من ٦ الى ١٠ سم . ليها شائع الاستعمال .

Lophyrus pini (S).

Lophyre du pin (F). Pine sawfly (E). Gemeine Kiefernblattwespe (D).

حشرة من اللشاريات ، طولها يراوح من ٩ الى ١٠ سم . اجيالها الحولية ثلاثة . ذكرها اسود اللون . انثاها ملطخة بالاصفر ، تنمت مكنها على بناتج الصنوبر يتفتت عن يرقات دقيقة مهمة تلهم الاهداب اللامية وتتقي عليها .

٢٥١٧٦ - **لَوْقَاس**

هو اللابون الارقط ، اطبله .

Leucaenilidae (S).

Leucaenilidés (F). Leucaenilidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة الممد جميعها متوسطة القد او صغيرة . اطباها العالم . تعيش على الاعشاب البرية والزراعية اخصها النجيليات .

Leucania (S). Leucania (F).

جنس حشرات حرشفية من فصيلة اللوقانيات . انواعها عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم . اجسامها صغيرة القد . وارضها قليلة الزراكن والاحدباب يتكرر فيها الاسمر وشقاقها || اشهرها واضرها لوقانية النجيل .

٢٥١٧٩ - **لَوْقَانِيَّةُ النَجِيلِ * (دودة الذرة)**

Leucania forey (S). Leucanie du maïs (F).

حشرة من اللوقانيات ، طولها نحو ١٧ سم . ثوبها حنطي اللون اسمر الموج . وارضها الى السمر اللوردية . ريقها دقيقة الجسم تطول نحو ٣ سم . رأسها الى الجؤرة . ثوبها حنطي اللون وردي الموج يطوى تحطيط اسمر قاطب ويمرض تنخله نقط سود نظامية اخصها الذرة والحصان والحلطة فتؤدي البرية والزراعية اخصها الذرة والحصان والحلطة فتؤدي المصنف وقد تقتضي عليه عند كثرتها .

٢٥١٨٠ - **لَوْقَانِيَّةُ دَكِسَّةٌ ***

Leucania impura (S). Leucanie impure (F).

حشرة من فصيلة اللوقانيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط والناطق الداخلية للناخلة . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقتها تعيش على عصف النجيليات البرية || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ سم . بسطها نحو ٢٣ سم . رأسها اكلس اللون اسمر الموج . عيناها كبيرتان . زناهاذا خيطيان . جرشها وبعثها الى الكلسة الصهباء الموج || وارضها عند الشقين الى الكلسة تملوها مشقة سمره عند الذكر ، شهبا عند الانثى || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في

نبات طبي يلم الجرح وينفع من البواسير . تقيع ازهاره يقي على التهاب العين .

Loées (F).

٢٥١٦٦ - **لَوْطِيَّاتٌ**

سبط من فصيلة القترنيات القروانية ، اشهر اجنسه اللوطس .

٢٥١٦٧ - **لَوْطَانِيَّاتٌ ، سَبَجِيَّاتٌ**

Loganiaceae (S). Loganiacées (F). Loganiaceae (E). فصيلة نباتية من مزدوجات الفلقة متحدة الفلقات . تشكل ٣٥٠٠ نوعاً من النباتات الشبية والنباتية والشجرية . اوراقها بسيطة ، كاملة ، اذينية ، متقابلة . ازهارها صغيرة القد ، لا قياسية الازتكاز . ثمارها كرابل مزدوجة ، متغلقة . اكثرها من نباتات البلاد الاستوائية والحرارة . معظمها جمالي يحوى بعض النامير السامة اخصها السركتين والبروسين .

٢٥١٦٨ - **لَوْفٌ ، لَيْفٌ ، قَيْلَجُوشٌ**

Luffa (S). Louffa, Luffa (F). Towel gourd (E). Schwammkürbis (D). Luffa (I).

جنس نباتات عشبية حولية عارضة من فصيلة القرويات . انواعها ١٥ منها المناطق الحارة ، بعضها متسلقة ، حولهاها مشعبة . اوراقها متعاقبة ، متغقة ، قلبية الشكل ، خماسية او سباعية التفصيص . ازهارها وبيدة للسكن ، كبيرة القد ، صفراء اللون . ثمارها خيارية الشكل مستطيلة . لنسجها عشن اللين الخاوي الاسفنجي التركيب || اشهر انواعها ما يلي .

٢٥١٦٩ - **لَوْفٌ اسْطُرَاقِيٌّ * ، لَوْفٌ مَصْرِيٌّ**

Luffa cylindrica, L. aegyptiaca, Poppia fabiana (S). Louffa cylindrique, Eponge végétale, Pétrole, Torchon (F). Egyptian towel gourd, Rag-gourd, Vegetable sponge (E). Aegyptische Schwammkürbis (D). Luffa d'Égypte, Petcola, Petucola, Spugna vegetale (I).

نوع من اللوف الزراعي الشائع الاستعمال . ساقه تطول من ٣ الى ٧ امتار . اوراقه خماسية التفصيص الكلوي الشكل . ازهاره خماسية الاسدية . ثمارها اسطوانية تطول من ١٥ الى ٣٠ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ سم . ليها شائع الاستعمال الحزلي .

٢٥١٧٠ - **لَوْفُ الْحَبَّةِ ، أَذُنُ الرَّاهِبِ**

Arum dracuncul, Dracuncul vulgaris (S). Serpentinaire commune, Gouet serpentinaire (F). Common dragon, Snake plant, Dragon arum (E). Drackenwurz, Schlangenkraut (D). Aro serpone, Dragontea, Serpentinaire (I).

نبات عشبي ارضي بري ورتبي من فصيلة اللقلقيات . اودته عشقولة مبطلة . اوراقه برتنية مستطيلة الزناد . وريقهاها ورتبة التيجيم ، تفصلها ساقها الصلبة الخضراء المزركشة والمبطجة بالاسمر والاخر والاصفر . ثمرهاها يطول من ٥٠ الى ١٠٠ سم . ينهي بصراف يحوق الفبة لونه الى الجؤرة المابقة .

٢٥١٧١ - **لَوْفٌ جَمَدٌ**

هو الاروم الايطالي ، اطبله .

٢٥١٧٢ - **لَوْفٌ عَظْرِيٌّ**

هو الزاونه الشعباني ، من النباتات الطبية ، اطبله .



لوف اسطرقلي



لوير الصنوبر



لوقانية النجيل



لوقانية دنسة

قسمين ، القسم العلوي رسامي المراج ، مبشر الحلب المشعب الشائك ، وقسم سفلي غير المراج يملو جميع اسود يكتنف قواعد الرواجب . رأسها اسود اللون . ورجلها سمراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن جراب تملته في النبات .

٢٥١٨٨ - **لُوم** هو التلرج النعولي ، اطبله .



لُومَة البسج

٢٥١٨٩ - **لُوماسية** *Lomatia* (S). *Lomatia* (F). جنس نباتات جنينية برية وحدائقية من فصيلة القضييات . انواعها المعروفة كثيرة بعضها بلاد امريكية واوراقها . سفيها . واوراقها لا قياسية الشكل منها البسيطة والمسننة والمقرضة . انزهارها عتقويبة التجميع ، طرفي وعودي الارتكاز . انزهارها جميلة الشكل ثنوية التركيب لونها الى الصفار الاخير || اشهر انواعها الحدائقية ما يتبع .

٢٥١٩٠ - **لُوماسية بهشية الورق**

Lomatia ilicifolia (S). *Lomatia à feuilles de houx* (F). نوع من اللوماسية جنبها تملو من متر الى مترين . واوراقها بيضيه واهليجية وثنائية الشكل . نصلها اخضر اللون على صفحتيه ، مفروض الحلقة او مسننات . متعلقها الزهرية مستطيلة رهلة . تنورها يستمر من تموز الى آب .

٢٥١٩١ - **لُوماسية حديدية**

Lomatia ferruginea (S). *Lomatia ferruginea* (F). نوع من اللوماسية جنبها تملو من مترين الى ٣ امتار . واوراقها مستطيلة الاغصان ثلاثية التفرع . نصلها مائل الصفرة العليا خلي السفلى خله حديدي المراج متعلقها الزهرية متوسطة الحجم والكثافة معظمها طرفي الارتكاز . تنورها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٥١٩٢ - **لُوماسية صباغية**

Lomatia tinctoria (S). *Lomatia colorante* (F). نوع من اللوماسية جنبها تملو من متر الى مترين . واوراقها مستطيلة القد لا قياسية التفرع ، نصلها لامع البشرة على صفحتيه . متعلقها الزهرية صغيرة الحجم كثيفة التجميع . يزورها صباغية تحضب المله بالاسمر الوردية . تنورها يستمر من تموز الى آب .

٢٥١٩٣ - **لُوهف**

Serrasalm (S). *Serrasalm* (F).

الواحدة لوهفة . جنس اسماك نهريه من مفعحات الحائنة وفصيلة القرصانيات . انواعها المعروفة قليلة العدد يكثر وجودها في بعض انهر امريكية الاستوائية (ا) اجسامها مبطلة ، بيضيه الشوزن ، متباينة الاحجام . رؤوسها مقطوعة ، واسعة الاشدق ، مرسوفة الاسنان الحادة . اذواها الى الخصار البحري المتفاوتات المتباينة تكثر فيه الرقشة . زعانفها الثليبية ثاقبة || تتميز بجسمها البانقة اذ انها تقسم كل ما تشاهد في الماء وكثيرا ما ترق شباك الصيادين || لحومها فاخرة الصنف مرغوب فيها .

٢٥١٩٤ - **لُويحقي** هو البازي ، اطبله .

٢٥١٩٥ - **لُويزة** ، **لُيبه**

Lippia (S). *Lippie* (F). جنس نباتات خشبيرة برية وزيتونية من فصيلة رعي الحام . انواعها زهاء ٩٠ اصنافها المناطق الاستوائية والحارة . واوراقها كاملة ، صفيحة ، دقيقة التسنين . انزهارها لا قياسية التجميع يكثر فيها السنيبل والتكولي || اشهر انواعها الزراعية ما يلي .

الليل . تعامل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتع المكن لتعلقا على الصفحات السفلى من نصال المصف || السرفة تطول نحو ٤٠ سم . جسمها اسطواني الشكل ، مائل القشار تملو نقط سود نظامية الارتكاز . رأسها الى الحزوة ثوبها متعطي اللون ، اسمر المراج يملو تحطيط اسمر قاطب ومتمرس . مدنها الى السرفة . وراجها سود || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي في الآتية حيث تنفخ السرفة ملتصقة بجلباب من اللبن .

٢٥١٩١ - **لُولاية**

Grand Nacré (F). فراشة تدمي ارجينيس البرادي ، اطبلها .

٢٥١٩٢ - **لُولب**

Vis (F). *Screw* (E). قطعة اسطوانية معدنية او خشبية مفروسة حلزونيا تستعمل في اغراض تش . اشهر القلوب :

Vis d'Archimède (F). لولب ارجينيس

Vis sans fin (F). لولب لا نهائي

Vis multiple (F). لولب مضاعف

Vis tangente (F). لولب ماس

Vis hollandaise (F). لولب هولندي

٢٥١٩٣ - **لُولب سلامي**

Cycle maritthal (F). هو الدورة السلاية ، اطبلها .

٢٥١٩٤ - **لُولسي**

Spiral (F). لولب حلزوني

٢٥١٩٥ - **لُولكة**

Perle (F). هي الدرة . ج الى لول ولائي .

٢٥١٩٦ - **لُوليات ، مُطَيِّقة الأجنحة**

Plecoptera (S). *Plécoptères* (F). *Plecoptera*, May flies, Ephemeral flies, Shad flies, Lake flies (E).

Eintagfliegen (D). رتبة سحرات من طبقة مستقييات الاجنح . انواعها عديدة زهاء ٧٠٠ تجمعها بعض المصائل والاجناس . تتميز بعيناتها الخافرة الثلاثية التركيب وبانطباع اجنحتها الى الوراء عند الراحة والحمود || رقاتها مائية تعيش عاتقة على الصخور المغمورة بالماء .

٢٥١٩٧ - **لُولكة البتفسج**

Boloria selene (S). *Nacré des violettes* (F).

Boloria selene (E).

حشرة من فصيلة البشوريات ورتبة حشرقيات الاجنحة . موطنها يطل الاقاليم المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقية الشمالية . فراشها واثمة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق البتفسج البري والزراعي || جسمها مستطيل القد يعطون نحو ١٥ سم . يسطل نحو ٣٨ سم . رأسها كعبي اللون . عينها كبيرتان . زبائنها صلبانيات . مرشها دقيق الجرم . جوشها ويطنها الى الكسني || وراشها عند الشقن الى الصخرة الصنانية يطولها تجميع وتقيح وتنفيط وثمة جسمها الى الكسني المنطلي المراج || لها جويلان في الخول . تظهر فراشة الجليل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجليل الثاني في اواخر آب . تسرح في النهار . تعامل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتع المكن ميعادوا على نصال اوراق النبات البائل || السرفة تعلق نحو ٣٢ سم . جسمها اسطواني الشكل . ثوبها الى البطلة الخفسرا يملوها غطان بجانيات اسودا يفسلان الجسم الى



لوهف

Acinopus pidipes (S).

* ٢٥٢٠٤ - ليح * ٥

حشرة من فصيلة الهربوليات ، طولها يراوح من ١٢ الى ١٧ م . جسمها مخموي للظهر . ثوبها الى السواد الحمسي . تعيش في الارربة الطينية الرملية تقيم تحت الحجارة والاشخاب . تسرح في الليل . قوتها البلبور والحبوب وقد تتعقب الديدان القارضة وتفتريها || يرقاتها خاضلة قليلة الاذن .

Acinopus pidipes (S).

* ٢٥٢٠٥ - ليح أسود *

Acinopus noir (F). Acinopus pidipes (E).

حشرة دهوية خاضلة وقائمة من فصيلة الهربوليات ورتبة دهويات الاجنحة . موطنها بعض مناطق البلاد المتعددة الحرارة من الشرق الادنى واروية || جسمها صغير القد ، غصور الشكل ، مخدوب الصفة العليا ، عادم الجناح ، يطول من ١٥ الى ١٧ م . ثوبها الى السواد الحمسي . رأسها كبير القد ، مستدير الشكل ، قصير الخطم . فكها ضليان . زباناها عظيمان دقيقان ، عيناها صغيرتان || الاذن اصغر قدأ من الذكر واكد ثوباً منه واقصر زبانا واقصر بطناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملة في اوائل حزيران وتبقى حتى اوائل ايلول . تسرح في الليل وتبيت في النهار تحت الحجارة . قوتها البلبور والحبوب وتتغيب الديدان القارضة وتفتريها .

Lias

* ٢٥٢٠٦ - لياس *

طبقة ارضية توجد في اسفل الاراضي الجورية .

Mortier (F). Mortar (E).

* ٢٥٢٠٧ - لياط *

خليط من التلك والرمل او من الاسمنت والرمل يضاف اليه الماء اللازم ويستعمل في البناء لتاسك الحجارة فيها .

Libratula (S).

* ٢٥٢٠٨ - ليبرالولا *

Libratule (F). Libratula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صليحيات الخياشيم وفصيلة الغلويات . انواعها المعاصرة المروفة قليلة العدد . موطنها حلجان جزر اقنايا . تعيش بين رصاف المرجانيات . اصداها شبه بيضبة الشكل ، ثنائية المصاريع تنشب في مدائع المرجان وتستقر عليها .

Librellia (S).

* ٢٥٢٠٩ - ليبريللا *

جنس فلور بحيرية من فصيلة الرغيات . انواعها قليلة العدد والاصرار تركيب السوق والافصان الباسية || وثيمته لا قياسية الشكل والشكل والحجم . مشيبيه عصير حلامي التركيب ، اصغر اللون او وردي . بويضاته خيطية ، حلالية الشكل ، شفافة .

Libertia (S).

* ٢٥٢١٠ - ليبرتيه *

Libertie (F). Libertia (E).

جنس نباتات عشية معمرة من فصيلة السوسنيات . جلودها ليفية . سوقها منتصبة معتدلة الارتفاع . اوراقها ضيقة الاتصال ، ثنائية التصنيف . ازهارها حوضية التجميع ، رتاجية الترتيب تبلى كالكسانيل وهي يبيض اللون او زرقاء || تزورع لقرتين في المراتك والحدائق || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

* ٢٥٢١١ - ليبرتيه جميلة *

Libertia formosa (S). Libertia belle (F).

نوع من الليبرتيه . عشية تزينية معمرة . ساقتها منتصبة

* ٢٥١٩٦ - لوزة سكرية ، ليته سكرية *

Lippia dulcis, L. superfolia (S). Lippie sucré (F).

نوع من اللوزة وهي عشية سرولية تزينية معمرة تملو نحو ٣٠ سم . ساقتها فروع . اوراقها سكرية الطعم ، متعاقبة ، متفلة . فصلها يضيي الشكل ذات الزام الاخير يطول من ٣ الى ٤ سم . ازهارها عثكولي التجميع ، ابلي الارتكاز او طرفي . ازهارها صغيرة القدة يبيض اللون فواحة العرف العطري || تنورها يستمر طوال الصيف .

* ٢٥١٩٧ - لوزة ليمونية * ، ليته ليمونية *

Lippia citrodora (S). Lippie citronnelle, Citronnelle (F). Herb Louisa, Lemon verbena (E). Citronkraut, Lemonkraut (D). Cedrina, Cetrina, Erba limonada (I).

نوع من اللوزة الزينية وهي جنبية سرولية معمرة تملو نحو ٣٠ سم . ساقتها منتصبة فروع . اوراقها متفلة ثلاثية او رباعية القمة . فصلها سناني الصفحة يطول من ٨ الى ١٠ سم . || ازهارها هربي الشكل . ازهارها بنفسجية اللون . اوراقها وازهارها فواحة العرف العطري القريب الشبه من الليمون وهي تستعمل استعمال الشاي || تنورها يستمر من تموز الى آب .

* ٢٥١٩٨ - لوزة ثورية العقد * ، ليته ثورية *

العقد * ، ليته *

Lippia nodiflora, L. canescens (S). Lippie fleur aux nœuds (F).

نوع من اللوزة وهي عشية تزينية معمرة . منبها الاصمغ الحارة . ساقتها مستقيمة مدادة . قرونها تملو نحو ٣٠ سم . اوراقها صغيرة القد ، اطليجية الشكل ، فصلها سنن الحلقة . ازهارها عثكولي التجميع ، عطري الارتكاز . ازهارها صغيرة القدة تطول من ٣ الى ٥ سم . وهي مادمة العرف وردية اللون او ليلكية || تنورها يستمر من ايار الى ايلول .

Alternanthera (F).

* ٢٥١٩٩ - لوتيق *

نبات يحيى لقمة الحمل ، اطليه .

Innocuité (F). Innocuousness (E).

الثامة كون الشيء غير مضر او خلوص الشيء من الضرر .

Hérisson (F).

* ٢٥٢٠١ - لشمه *

هو القنفذ ، اطليه .

* ٢٥٢٠٢ - لياك * ، قصب ، بلبك *

Lamna (S). Lamie, Touille, Nasilang, Requin-marsouin (F). Lamia, Porbeagle, White shark (E).

سمكة بحيرية مفترسة وحيدة الجنس والنوع من السفليات القرشيات . جسمها مردي يطول نحو ٨ امتار . خطها مخروطي يشرف على الفم . نياها شقيقة مستطيلة . ثوبها رصاصي اللون يميل وزرق مع التزايه من ثوب الظهر ويتر ويبيض عند البطن || حياتها جاحية سرها يراوح من ٥ الى ٢٠ زويجا . تألف البحار الباردة والمعتدلة ، ويده منها في المتوسط . قوتها الاسماك في اي نوع كانت . لحمها مأكول . تجست منها واحدة حل الشاطئ اللبناني قرب نهر الكلب ، في ضيه ، وذلك في اواخر شهر شباط عام ١٩٥٨ .

* ٢٥٢٠٣ - لياك * ، لياك : الارض البعيدة عن الماء .



لوزة ليمونية



لوزة ثورية العقد



لياك



لياك



لياك أسود

ترتفع نحو ٤٠ سم. أوراقها ثنائية التصفيف ، ضيقة التصل . أزهارها شبه سنبل التجميع . أزهارها بيضاء اللون ، فواحة النرف السطر || تنويرها يستمر طوال شهر أيار .

٢٥٢١٢ - ليبرييه رشيقة *

Libertia pulchella (S). *Libertia graciosa* (F).

نوع من الليبريه . عشية تزيينية معمرة . ساقها نحيلة ترتفع من ١٥ الى ٣٠ سم . أوراقها شبه سنانية الشكل تطول من ٨ الى ١٥ سم . أزهارها شبه متكوني التجميع . أزهارها مستطيلة الاذن ، بيضاء اللون || تنويرها يستمر طوال شهر نيسان .

٢٥٢١٣ - ليبرييه زرقاء *

Libertia corulescens (S). *Libertia bleutée* (F).

نوع من الليبريه . عشية تزيينية معمرة . ساقها صلبة ترتفع من ٣٠ الى ٦٠ سم . أوراقها مستطيلة ، ضيقة ، جامدة التصل . أزهارها شبه صيرافي التجميع ، سنبل التريب . أزهارها صغيرة الجرم زرقاء اللون يعلوها تمسح اطول || تنويرها صيفي .

٢٥٢١٤ - ليبرييه كبيرة الزهر *

Libertia grandiflora (S).

Libertia à grandes fleurs (F).

نوع من الليبريه . عشية تزيينية معمرة . ساقها صلبة ترتفع من ٩٠ الى ٩٠ سم . أوراقها كبيرة القند تطول من ٣٠ الى ٧٥ سم . أزهارها سنبل التجميع . أزهارها كبيرة الجرم بيضاء اللون || تنويرها صيفي .

٢٥٢١٥ - ليتيت *

Erythraea (S). *Palmier bleu* (F).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة النخلات. أنوارها قليلة ، أطرافها البلاد الحارة والاستوائية . أجلاها منتصب مستقيمة . أوراقها متداعة ناجية . غوصها ثنائي التفلج جامد التصل المنتصب || أعرف أنوارها وأشهرها ما يلي .

٢٥٢١٦ - ليتيت سرح *

Erythraea edulis, *Brahea edulis* (S). *Palmier bleu inerme* (F).

نوع من اللبت الزراعي . مجمرته مشرة تملو من ١٢ الى ١ م . برهتها كثيفة الأوراق . أوراقها مستطيلة الأجزاء كبيرة القند ، قطرها يراوح من ١٥٠ الى ١٨٠ سم . غوصها جامد التصل . جيل الحصار البحري الزراعي . ثمارها يلحبة التركيب ، بيضية الشكل ، صغيرة القند ، سكرية الطعم ، مأكولة .

٢٥٢١٧ - ليتيت شالك *

Erythraea armata (S). *Palmier bleu piquant* (F).

نوع من اللبت الزراعي التريبي . مجمرته تملو من ٤ الى ١٢ م . برهتها مستعدة الكثافة . أوراقها الى الحصار الاذرى القضي المراج . قطرها يراوح من ٥٠ الى ١٢٠ سم . غوصها جامد التصل ، جرائنها تطول من ٧٠ الى ١٠٠ سم . وهي شائكة الدرز ، غليظة الحسف الاسود المحة .

٢٥٢١٨ - ليتيت *

Spire (F).

Single turn, *Whoral* (E).

الية دورة الخط الحلزوني .

٢٥٢١٩ - ليتيت *

Leia (S). *Leia* (F). *Leia* (E).

جنس حشرات من فصيلة الرقصيات وربة ذوات الجناحين . أنواعها المعروفة ٣٠ مقشرة في جميع مناطق البلاد الممتدة الحارة || أجسامها عفاة تطول من ٤ الى ٨ م . رؤوسها صغيرة . عينها متباعدة عند الشقين . قريبا الاستشعارية غيطية . ملاسها ربابية العقل . مرافقها رشيقة . كواسها شبه بيضية الشكل . بطونها اهليلجية . أطوارها ملونة . رواشها قسطانية الخصب يطولها تجليغ وتبيغ . قوائمها مستطيلة . غنابها بمجزة متعاقب قوة || تألف الحراج والغابات والمروج وصفات مجاري الماء ، قوتا طلع الأزهار ورحيقها . اساريمها خاضعة او دامتة وبضفا عار .



ليتيت ناضجة

٢٥٢٢٠ - ليتيت ناضجة *

Lytta vesicatoria (S). *Cantharide du frêne* (F). *Green cantharide* (E). *Spanische Fliege* (D).

حشرة طيبة ناضجة من فصيلة اللبديات ، لونها ذهبي اللون صناعي المراج . جسمها يطول من ١٥ الى ٢٥ م . الذكور أصفر قداً من الانثى . مرهمها الاثمار الحربية انحصا الكران وقد تؤذيها بالتهامها اوراق . ريقها تمشي على بعض النباتات المشرية || كانوا وما زالوا يلتقطونها لتجفيفها وحفظها واستعمال مسحوقها كنافط ونامط .

٢٥٢٢١ - ليتيت و لفر *

Litre وسلة المكابيل المتويزة وهو عبارة عن ديسيت مكعب . مضاعفاته الذكاليتر (١٠ ليتر) والمكوكليتر (١٠٠ ليتر) أما اجزائه فهي الليتير والستيليتير والليليتير .

٢٥٢٢٢ - ليتيتي *

Litchi (S). *Litchi*, *Ponceau* (F). *Litchi* (E).

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة الصابونيات . مهدها البلاد الاستوائية الاسوية . انوارها قليلة . أوراقها متعاقبة منعقة اهليلجية . أزهارها على التجميع ، محوري وتنجي الارنكاز . أزهارها صغيرة القند بيضاء اللون . ثمارها ذكية اللزف توكل وتستهمل في استحضار بعض القشائيد والمشروبات الروسية || أعرف أنوارها وأشهرها ما يلي .

٢٥٢٢٣ - ليتيتي أصفر * ، وسيرفان *

Nephelium lappaceum (S). *Néphélion*, *Ramboutan* (F). *Rambutan*, *Rampontan* (E). *Rampontan-Frucht* (D). *Nefelio* (I).

نوع من الليتي الزراعي . ثماره قليلة الشكل صفراء اللون مأكولة ويستخرج من صعيها بعد تخميره وتقطيره قنديد كحول شائع الاستعمال في الشرق .

٢٥٢٢٤ - ليتيتي صيني *

Litchi chinensis (S). *Litchi de Chine* (F). *Litchi*, *Laechee* (E). *Litschibaum* (D). *Litchi* (I).

نوع من الليتي الصناعي مهد الصين حيث تكثر زراعته الاستوائية . ثماره بيضية الشكل والحجم حواء اللون مأكولة ويستخرج من صعيها بعد تخميره وتقطيره قنديد كحول لاذع شائع لاط استعمال .

٢٥٢٢٥ - ليتيت *

هي قوبة الفولدر ، اطليا .

٢٥٢٢٦ - ليتوب *

Lithobius (S). *Lithobie* (F).

Lithobius (E). *Brauner Steinkriecher* (D).

جنس دويبات من فصيلة الليتويات . انوارها كثيرة العدد



ليتيتي أصفر



ليتيتي صيني



ليتوب

أَبُو عَوْيَفٌ ، أُمُّ عَوْيَفٌ ، أُمُّ قَيْسٍ
Fourmil-ion, Myrmé-léon (F). Ant-lion, Myrme-léon (E).

جنس مشفرات من عصبيات الجناح. أنواعه عديدة منتشرة في جميع اصقاع البلاد الحساسة وفي بعض مناطق البلاد للمتندة. حشراتا مرعقة تعيش على رقيق الأزهار ، أما دعاميسها لغفيرة تصيد الحشرات الصغيرة اغصها النسل.

٢٠٢٣٣ - لَيْثَم
Licmetis (S).
Licmetis (F), Licmetis (E).

جنس طير من المتسلقات وفصيلة الببغاوات. أنواعه المعروفة ثلاثة موطنها استرالية وشبهانية وبجزر سليمان. تألف الغابات والمواقع الرطبة. ملجأها الحيواني جامي. أفواجها قليلة العدد. قوتها البذور والنباتات والمساقل وبعض الحشرات والاساريع || اجسامها متندة القد ، طولها من ٥٥ الى ٥٥ سم. تتميز بمناقيدها المصونة الذرية التي طولها من ٦ الى ٦ سم. وبقرص اذنانها المستديرة الأسراف. أنواطها الى البياض الماجي يعلوه موانج اصفر او اخضر يشمل القصعة السفلى من الجناح ويمتد الى الاطليان والاذنيك. رؤوسها وعارسها وكشاتها الى الحمرة التي تختلف موانجها مع اختلاف الانواع.

٢٠٢٣٤ - لَيْثُوم
Lithium
لغات قوية توجد في الطبيعة وفي بعض النباتات اغصها النبت || وهو ابيض اللون فصي الرجمة اصلب من البوتاسيوم والصوديوم. نقله النوبي ٥٩٠٩. ينصهر في ١٨٠ درجة مع.

٢٠٢٣٥ - لَيْثِيَّة
Ligia (S), Ligia (F), Ligia (E).
جنس دويبات بحرية من القشريات متساويات الاربيل وفصيلة الظرموليات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحر العالم. تألف القشوط البحرية || اجسامها صلبة ، اهليجية الشكل ، متندة التيليط. رؤوسها صغيرة. حيوتها جاحظة. قوتها الاستعمارية مستطيلة ، مركبة. ملابسها الشرجية فارة الاطراف المستطعة المستطيلة.

٢٠٢٣٦ - لَيْثِيَّة
Liche (F).
سكة بحرية قديم سموده ملساء ، اطلمها .

٢٠٢٣٧ - لَيْثِدَة
Lyda (S), Lyda (F).
جنس حشرات من المشاويات غشائيات الاجنحة. انواعه نحو ٥٠ اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة ، ملونة. اجنتها خفيفة. رفاقها مستطعة نهم تركب الانجار الحرجية والمثمرة اغصها الصنوبر والتوترب والدراق والاجاص فلتهم الارواق وتتغني عليها || اظهر الوانها واغرها ما يلي .

٢٠٢٣٨ - لَيْثِدَة الإِجَاص
Neurotoma flaviventris (S). Lyda du poirier (F).
Pear web-spinning sawfly (E). Gesallige Birnblattwespe (D).

نوع من اللية وصيدة الجبل الحولي ، جسمها يطول من ١٢ الى ١٤ سم. لونه الى السمرة يطولها يتبع متفرص اصفر يمتد من الرأس الى الشرج || رقتها برتقالية اللون ، سوداء الرأس ، عديمة الاربيل البطنية تظهر في الربيع . تركب اوراق الانجار المثمرة اغصها الاجاص .

منتشرة في معظم اصقاع العالم . اجسامها مركبة من ١٥ حلقة تحمل ١٥ زوجاً من الجرايم منها ثلاثة ازواج صغيرة القد .

٢٠٢٣٧ - لَيْثُوب مَبْدُول
Lithobius forcipathus (S). Lithobius tenailles (F).
Lithobius (E).

دوية مقترنة مبدولة من فصيلة الليثويات ورتبة اللنداعنيات شقويات الاربيل ، موطنها يشمل معظم مناطق البلاد الحارة والمتندة الحارة من المدين القديم والجديد || جسمها قريب الشبه بجسم الحريش ، مبط الشكل ، مستطيل . مركب من ١٥ سكة . الذكر اصغر قدماً من الانثى بطول نحو ٣٥ م. والانثى بطول نحو ٦٠ م. رأسها صغير الحجم ، مستعرض الشكل . عينها زرقانية . شمسها ضلعيان ، مقروبان ينبتان بكاشتين قويتين . زباناها مستطيلان احمران . جبرامها نشطة . ثوبها الى الفضة الخاطئة الموانج . مدنها جبرامها الى الطلة اللبراء || تألف الاراضي الزراعية والملاحة . مسرحها ديري . قوتها الحشرات والرمويات الصغيرة . عضها مؤلمة لكنها قليلة الاذى .

٢٠٢٣٨ - لَيْثُوبِيَّات
Lithobiidae (S).
Lithobiidae, Lithobius (F). Lithobiidae, Lithobius (E). Steinläufer (D).
فصيلة دويبات من اللنداعنيات الشقويات الاربيل . اجسامها وانواعها عديدة ، اشهرها الليثوب .

٢٠٢٣٩ - لَيْثُوفَانَة سَمَرَاء
Lithophana semibrunnea (S). Lithophana semibrunnea (F).
Lithophana semibrunnea (E).

حشرة من النسيقيات حشرقيات الاجنحة. موطنها بعض اصراع الشرق الاقصى . فراشتها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقتها تعيش على اوراق السديان || جسمها متوسط القد بطول نحو ١٧ م. بطنها نحو ٤١ م. رأسها فاسي الشكل ، اسمر اللون . عينها كبرتان . زباناها خيطان . جوشنها اسمر اللون ، حطلي الموانج . بطنها حطلي اللون اسمر الحيد || رؤسها الاماميان الى الخلفي الاسمر يعلوه تقبيج اسمر قائم . رؤسها الخلفيان الى الخلفي الاخير يعلوه تقبيج اسود في اختار الخافري . اهدابها حطية || لها جيل واحد في الجيل . تظهر القراقة في ايلول وتبقى حتى ايار . تسرح في الليل . تمتع الممكن لطعام مستطيلة على الصفحات التثقل من نصال اوراق السديان || الرقة عند ادراكها الكمال الجسوري طولها نحو ٣٥ م. جسمها اسطواني الشكل ، شديد القشار ، ارمد اللون ، اسمر الموانج يعلوه خط شبيبي اغبر وتسعة خطوط جانبية متعززة صفراء اللون . رأسها مخروطي الشكل ، اسود . مدنها وراجبها الى السمرة || طور الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع ويتغني في التربة حيث تنضج الرقة ملتصقة بجلباب من العن .

٢٠٢٣٠ - لَيْث
Lion (F).
الليث هو الاسد . ج ليث .

٢٠٢٣١ - لَيْث
الليث : نبات ملفف (اللسان) .

٢٠٢٣٢ - لَيْث عَفْرَيْن
بَقَرَة بَنِي إِسْرَائِيل ،



ليثوب مبدول



ليثوفانة سمراء



ليث عفريين



ليث



ليدة الاجاص



ليدة الدراق



ليدرك مرسي العرف



ليدك شم



ليدك عراب



ليدك سيك



ليشية

اتواعه المعروفة خمسة منها حوض البحر الابيض المتوسط
وجزر كثرية || جميعها نباتات نجمية قمرية. اوراقها
مركبة ، وقرية ، ثلاثية الوريقات ، ثقلية الشكل .
انزعارها عقدي طري . ازهارها صفراء اللون أو أرجوانية .
ثمارها قرين مبطنة خلية القنار || أشهر انواعه اللبب
المشعب واللبب اليوناني .

٢٥٢٤٦ - لَيْدَبْ مُشْعَبٌ °

Adenocarpus divaricatus (S).
Adenocarpus divariqué (F).

نوع من اللبب . طوي في جبال لبنان . فروعه مزغبة
السواد ، وريقاته السفلية بيضية النصال . اما العليا
فصلتية || تنويره صيفي . ازهاره صفراء اللون .

٢٥٢٤٧ - لَيْدَبْ يُونَانِي °

Adenocarpus graecus (S).
Adenocarpus de Grèce (F).

نوع من اللبب . طوي في جرد لبنان . فروعه وكروس
ازهار مزغبة وخليئة || تنويره صيفي . ازهاره صفراء اللون .

٢٥٢٤٨ - لَيْزُون °

هو الاسلخ ، نبات بري طوي ، اطليه .

٢٥٢٤٩ - لِيْرِدِلْدُون °

Liriodendron (F).
هي شجرة التوليب ، اطليا .

٢٥٢٥٠ - لِيْسَر °

Lysa (F). *Lysin* (E).
اسم تعريفي يطلق على الانحلال النسجي الذي تسببه
بعض المواد المنسوية المعروفة بالبرين .

٢٥٢٥١ - لِيْزُولٌ ° لِيْسُولٌ °

Lysol
سائل دهنى كثيف المادة، جوزي اللون، اسمر الماية، مركب
من الكريوزوت والقطران والشم وقصابون . وهو من
المطهرات الفعالة الشائعة الاستعمال الزراعي .

٢٥٢٥٢ - لِيْسَيْن °

Lysine (F). *Lysin* (E).
الليزين مادة عضوية معجولة الطبيعة تحللك خاصية تلويب
الكرات الحمر وحبيرات النسيج والكثيريات .

٢٥٢٥٣ - لِيْسَـيُون °

Leycesteria (S).
Leycesteria (F).
جنية معمرة برية وريبتين من فصيلة المانيات . منها
البالد الاسيوية الحارة . ساقها منتصبة فروع جواء تملو
من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها عابطة متقابلة ، نصلها
بيضي الشكل ذات لزام الاخير يطلى نحو ١٦ سم . ويغرض
نحو ٩ ازهارها حيلة القالب ، يبيض اللون ، وريدة
التوشح . ارجوانية القنابات ، عقودية النجسج ، متدلية .
ثمارها حنينة جلوية || تنورها يستمر من آب الى ايلول .

٢٥٢٥٤ - لِيْسِن °

Chrysopogon (S).
Chrysopogon (F).
نبات عشبي بري مرحوي حرلي من النجيليات . ينكر
في الاراضي الجبلية الملحاة . وهو من نباتات لبنان الطوية .

٢٥٢٥٥ - لِيْشِيَّة °

Lichia amia (S). *Liche amia* (F).
سمكة بحرية من الاسقمريات . جسمها اهليجي الشكل ،

٢٥٢٥٦ - لَيْسَدَةُ الدَّرَاقِن °

Neurotoma nemoralis (S). *Lyde du pacher* (F).
Apple web-spinning sawfly (E). *Gesellige Pfrsch-*
blattwespe, *Stainobet-Gespinnstblattwespe* (D).

نوع من الليدة وسيدة الجبل الحولي ، جسمها يطلى من
٧ الى ٨ سم . لونها الى السرة السوداء . رأسها مبقع بالاصفر
يطها جردع بالابيض . تظهر في اواخر نيسان ، تنح
مكنها على سطوح الاوراق السفلى فينثف عن رقصات
منطقة نية لونها الى الخضرة المابتة تملوا خطوط مر
قائلة ، تركب بعض الاشجار الخضرة انصها الدراق
واللوز فتلهم الاوراك بعد ان تمتلها بنسها المتكوي
التدني .

٢٥٢٤٠ - لَيْسَدُكَةٌ ° لَدَاكٌ °

Rhodopaxillus (S). *Rhodopaxille* (F).

جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الفاريقيات .
انواعه المعروفة قليلة العدد اسطانيا النباتات والحراج الجبلية .
تتميز بالوانها الزاخرة . جميعها مأكولة مستحبة الطعم
والرشف || اعرف انواعها واشهرها الاربعة التالية :

٢٥٢٤١ - لَيْسَدُكَةٌ مُسَوِّتِي الْعَرَف °

Rhodopaxillus irinus (S). *Rhodopaxille iris* (F).

نوع من الليدك . يعيش على الدبال والمواد النباتية المنحلة .
يوجد عند اطراف النباتات وفي منطقاتها . ساقه غليظة ،
مستضفة القاعدة ، متدلة الانتفاع ، غبراء اللون .
نكته قلنسوية الشكل ، سوسية العرف ، ليلكية اللون
يطلوا موج حثالي ، قطرها نحو ٧ سم . اطراسها صفراء
اللون || لحيتها مأكولة ، فاخترة الصف .

٢٥٢٤٢ - لَيْسَدُكَةٌ شَحِيْم °

Rhodopaxillus saevus (S). *Rhodopaxille sinistre* (F).

نوع من الليدك . يعيش على الدبال في المراعي . ساقه
قصيرة ، مستضفة ، بنضجية اللون . نكته كبيرة القف
قطرها نحو ١٢ سم . لونها الى البني الاسفع يذو عند
الحافة . اطراسها الى الصفرة البنية الموج || لحيتها جيدة
الصف ، مأكولة .

٢٥٢٤٣ - لَيْسَدُكَةٌ عَرَبِيَّان °

Rhodopaxillus nudus (S). *Rhodopaxille nu* (F).

نوع من الليدك . يعيش على المواد النباتية المنحلة . ساقه
متدلة اللعانة والارتفاع ، مستضفة القاعدة ، ليلكية
اللون . نكته صاجية الشكل ، قطرها نحو ١٠ سم . لونها
الى البنفسجي يطلو موج كستني اسفع . اطراسها ليلكية
اللون || لحيتها مأكولة فاخترة الصف .

٢٥٢٤٤ - لَيْسَدُكَةٌ سَهِيْكَ °

Rhodopaxillus sordidus (S).
Rhodopaxille sordide (F).

نوع من الليدك . يعيش على الدبال في حواشي الغابات .
ساقه متدلة اجرم بنضجية اللون . نكته منطشة الصفحة
المنندرة ، قطرها نحو ٦ سم . لونها الى البنفسجي ،
اطراسها الى الليرة اليلكية الموج || لحيتها جيدة الصف ،
مأكولة .

٢٥٢٤٥ - لَيْدَبْ °

Adenocarpus (S). *Adenocarpe* (F). *Adenocarpus* (E).

جنس نباتات برية وتريبتين من فصيلة القرنيات الفراضية .

من عضوية ومعلمية || أنواعها المعروفة كثيرة أشهرها الثلاثة التالية :

٢٥٢٦٧ - ليكوديس بهي *
Lycoris radiata (S).
Lycoride rayonnante (F).

نوع من اليكوديس . عشبة دوفضية سرقية منبتها الصين واليابان . شراخها يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها قلبية الشكل تمضي نحو ٢ سم . تصلها الى الخضر البحري . ازهارها قصيرة الكؤوس منبسطة البتلات النجمية الشكل ، قطرها نحو ٤ سم . لونها ال احمر القرمزية يعطيها اطار ابيض || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٥٢٦٨ - ليكوديس مدني *

Lycoris sanguinea (S). *Lycoride rouge-sang* (F).
نوع من اليكوديس . عشبة دوفضية سرقية . منبتها اليابان . شراخها يعلو من ٣٥ الى ٥٠ سم . اوراقها صغيرة نحلة ، تظهر به الاضرار ، لونها الى الخضر الالوس . ازهارها معتدلة الحجم تطلو من ٤ الى ٦ سم . قطرها نحو ٤ سم . لونها الى احمر الدائمة اللامعة || تنويرها يستمر من تموز الى آب .

٢٥٢٦٩ - ليكوديس مدهب *

Lycoris aurea (S). *Lycoride dorée* (F).
نوع من اليكوديس . عشبة دوفضية جادة متطلبة . منبتها الصين . شراخها يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها قلبية الشكل ، تصلها الى الخضر البحري . ازهارها عادية اللون تطلو نحو ٨ سم . لونها الى الصفار الذهبي || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٥٢٧٠ - ليكوس *

Lycus (S). *Lycus* (E).
جنس حشرات من فصيلة اليكوسيات . وربة عديمات الاجنحة . انواعها المعروفة عديدة : منتشرة في بعض المناطق الاستوائية والحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، هباء ، تطلو من ٧ الى ١٢ م . رؤوسها صغيرة . عينها بارزة . تأثيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية غيبية . كواسلها شبه مربعة الشكل . احمادها لاحفة . قوائمها نشيطة . اثنائها ملوكة || الحشرة الجلجلة غاصلة وواشعة ، اما البرقة لفرسة .

٢٥٢٧١ - ليكوسيات *

Lycidae (S). *Lycidae* (E).
فصيلة حشرات من عديمات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في بعض اصقاع البلاد الاستوائية والحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة النشيط ، تطلو من ٩ الى ١٥ م . رؤوسها صغيرة . عينها بارزة . تأثيرها وفكوكها وبلاستها نظامية . قرونها الاستشعارية غيبية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها صغيرة ، احمادها لاحفة . رشفة . ارسافها غصاية القمل || أشهر اجناسها اليكوس .

٢٥٢٧٢ - ليكوفوسيه أرجوانية *

Lycophotia porphyrea (S). *Lycophotia pourpre* (F).
Lycophotia porphyrea (E).
حشرة من الفسقيات حشرشوات الاجنحة . موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية

كبير القد ، يطول نحو ١٠٠ سم . تنيز بمشطها الثاني الانسان الذرية الحادة الذي يتقدم الزمعة للظهرة . اصنافها شرق البحر المتوسط . يكثر وجودها في العنق . لحمها مأكول متوسط الصنف .

٢٥٢٧٦ - لبطة
اللبط : قشر القصب اللازق به . الواحدة لبطة .

٢٥٢٧٧ - لبيقيات
فصيلة حشرات من نصفيات الجناح تسمى ايضاً طلريات . اطلها .

٢٥٢٧٨ - ليف هو اللوف ، اطله .

٢٥٢٧٩ - ليفياني ، ليفي
ما كانت نسجه ليفية التركيب .

٢٥٢٨٠ - ليفية ، ليفير
الليف خلايا مستطيلة مردنية الشكل ، غشبية الجدران تجتمع على شكل نسيج ليفي .

٢٥٢٨١ - ليفين ، بيسوس *
Byssus (F). *Byssus* (E).

مادة ليفية شديدة التماس تفرزها بعض الرغويات للاتصاق بالصخور المغمورة بالماء . وقد يحاك منها نسيج اتم من الحرير لوناً الى الخفي للحي المواج .

٢٥٢٨٢ - لبتي ، بيسوسية *
Byssogana (F). *Byssogenic* (E).

نمت تعريفها يطلق على كل ما له صلة باللبين كاللدة الليفية وغيرها .

٢٥٢٨٣ - لبتي
نمت تعريفها يطلق على النباتات الخشبية السوق والفروع .

٢٥٢٨٤ - ليفين
هي القبرين ، مادة آسية حيوانية او نباتية تستخرج من القدم في الحيوان على شكل عيريط يبيض .

٢٥٢٨٥ - ليكست *
Lycasta (S). *Lycasta* (F).
جنس نباتات معمرة نارية او امعية من فصيلة السطليات . انواعها المعروفة نحو ٢٥ جميعها امريكية المهد وقد انتشرت زراعتها المركبة الازينية في معظم اقطار المعمورة || سرها دوفضية تطلو من ٤ الى ٨ سم . اوراقها قليلة العدد متعكة ، كبيرة الاتصال تطلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . ازهارها وحيدة كبيرة قطرها يراوح من ١٢ الى ٢٠ سم . تركزت على شاربخ دقيقة ليفية تطلو من ٢٥ الى ٤٠ سم . اللون ازهارها عديدة اكزها الابيض والاحمر والاصفر والابيض المرقوش بالجلوي والاصفر المرقش بالكتني ... تنويرها يستمر من تشرين الثاني الى اواخر اذار .

٢٥٢٨٦ - ليكوديس *
Lycoris (S). *Lycoride* (F). *Lycoris* (E).

جنس نباتات عشبية دوفضية من فصيلة الترجيبات . منبتها الصين واليابان . شراخها مصمت . اوراقها نيفة النصال . ازهارها شبه قمية الشكل صفراء اللون او حمراء || تزور للزيتون ضمن البيوت وفي الحدائق . قروب في الارابة المنسوبة التركيب المنصري الوافرة المواد الغذائية



ليكاس



ليكوس



ليكوفوب ارجوانية

الكورن: الرباعية الستين. بتلاتها رباعية التفصيص. اسديتها ثنائية التركيب. ثمارها جراء ثنائية المصارع. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

٢٥٧٧٦ - تيلك أزرق ، تيلك مبدل

هو الأغروان ، اطله .
Lilas commun (F).

٢٥٧٧٧ - تيلك أزهب

Syringa pubescens (S).
Lilas pubescent (F).
نوع من اليلك التريبي جنبته تملو من ١٥٠ الى ١٥٠ سم. فروعه جوية اللون. اوراقها ييشقة ذرية ، نصلها على البشرة على صفحته. ازهارها مستطيلة الشكل ، ارجوانية اللون ، ياسينية العرف المسطح || ازهاره يستمر طولا شهر ايار .



ليكوفوبه ناهمة

٢٥٧٧٨ - تيلك حصاريا

Syringa emodi (S).
Lilas de l'Himalaya (F).
نوع من اليلك التريبي جنبته تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقه اعليجية الشكل نصلها اسم العروق، خلي البشرة السفلى. ازهارها ذرية ، غبراء اللون ، كريمة الرائحة || ازهاره يستمر طولا شهر حزيران .

٢٥٧٧٩ - تيلك ريشي

Syringa pinnatifolia (S).
Lilas à feuilles pennées (F).
نوع من اليلك التريبي جنبته تملو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها مركبة ديشية. وريقاتها سباعية او تساعية العدد ، نصلها اذنب الصفحة السفلى. ازهارها ودية اللون غايبة العرف || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار.

٢٥٧٨٠ - تيلك صيني

Syringa chinensis (S).
Lilas de Chine (F).
نوع من اليلك التريبي شجرة تملو من ٥ الى ٦ أمتار. اوراقها سنانية تتصل مستطيلة الشكل الاثناك الجلوية اللون. ازهارها الى البياض الثلجي لكحة كريمة الرائحة || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٥٧٨١ - تيلك عريش الورق

Syringa oblata (S). Lilas à larges feuilles (F).
نوع من اليلك التريبي ، جنبته تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها مستعرضة تطول وتعرض نحو ١٢ انصفا لاسع البشرة على صفحته ، شبه الخشخاش الباق. ازهارها ليكية اللون فواحة العرف السطري || ازهاره قصير الامة ينوم نحو ٢٠ يوما ابتداء من النصف الثاني من نيسان .



ليك

٢٥٧٨٢ - تيلك فارسي

Syringa persica (S).
Lilas de Perse (F).
نوع من اليلك التريبي ، جنبته تملو من ٧ الى ١٠ أمتار. اوراقها سنانية ذرية ، نصلها خلي الصفحة السفلى ، جامد الصفحة زاهر الخشخاش يطول نحو ٤ سم. ازهارها بتفصيصية اللون فواحة العرف السطري || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٥٧٨٣ - تيلك ياباني

Syringa japonica (S).
Lilas japonais (F).
نوع من اليلك التريبي ، شجرة تملو من ٧ الى ١٠ أمتار. اوراقها سنانية ذرية ، نصلها خلي الصفحة السفلى ، بحري اللون ، ازهارها حادة العرف ، لونها الى البياض الثلجي ، قنودا كبير القد يطول نحو ٣٠ سم. ويعرض نحو ٢٠ سم. تنوره يستمر طولا شهر حزيران .

قوتها رقيق الازهار . سرقتها تمشي على اوراق الخلتجيات واعصها الجسم || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٢ سم. يسلطها نحو ٣١ سم. رأسها فاسي الشكل . عيناها كبرتان. زباناها غيطيان . مرشها معتدل الجرم والظليل . جوشها ويطها الى الكلفة المشيرة بالارياض || دروشها الاناميان الى الحفرة الابرجوانية تملوها زركشة ييشاه وتزاورق سود ورققة مستطيلة . دروشها الخلفيان الى الكلفة يعلوها موج اشعل وسحر اسم يستبق الاهداب البنية || لها جيل واحد في الحول . تظهر ، القراشة في حزيران وتبقى حتى آب. تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد الممكن مبيحيا على الصفحات السفلى من نصال الارواق || السرعة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٣٠ سم. جسمها اسطواني الشكل ، مشدود القشار . ثوبا الى الخشخاش الاطحل تملوه ثلاثة عطلوط خيزاء اللون يتوسطها الجلوي الاسود الموج . رأسها الى الجذوة . مدها الى المطة . وارجواها سود || طور الاكمال الذي يشر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع ينتهي في التربة ضمن جلباب من الطين يلحف السرعة .

٢٥٧٧٣ - ليكوفوبه ناهمة

Lycophotia saucia (S). Lycophotia polyphaga (F).
Lycophotia saucia (E).

حشرة من فصيلة الفسيقيات حشرقيات الاجنحة . موطنها عند من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقية الشالية والبلاد الاسريكية . فراشتها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقتها خاملة ناهمة تمشي على اوراق النباتات المختلفة من البقول الى النباتات الزراعية والصناعية والزينة والاشجار الحضرية || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٨ سم. يسلطها تراوح من ٤٠ الى ٥٠ سم. رأسها فاسي الشكل . عيناها كبرتان. زباناها غيطيان . مرشها معتدل الجرم والظليل . جوشها ويطها الى المشطي الاسمر الموج || دروشها الاناميان الى الجذوة السنانية الموج تملوها زركشة وتزاورق سمراء اللون . دروشها الخلفيان الى البياض الاخير يعلوها حشار حطلي || لها ثلاثة ابيال في الحول . تظهر فراشة الجليل الاول في نيسان ورأشة الجليل الثاني في حزيران ورأشة الجليل الثالث في ايلول . تسرح في الليل وتماثل بعد ظهورها ونحو عشرة ايام وتقتد الممكن مجموعات متباينة العدد على الصفحات السفلى من نصال الارواق التي تلتاس التربة || الطور الاسروي يستمر نحو ستة اسابيع في الجليلين الاول والثاني ونحو ٣٧ اسبوعا في الجليل الثالث . والسرقة عند ادراكها الكمال الجسموري تطول من ٤٠ الى ٤٥ سم. جسمها مستدق المقدم مستطيل المخرج . ثوبا متعادل السرة والكهبة يعلوها غط لبيبي اسود متعرضة فقط سفر . رأسها منقط بالاصفر || طور الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع ، في جميع الاجيال ، ينتهي في التربة ضمن جلباب من الطين .

٢٥٧٧٤ - ليل - كوريلون

Courillon (F). Whimbrel (E).
الليل هو فرخ الكروان . يفاك فلان اجين من ليل .

٢٥٧٧٥ - تيلك * و ليلج و ليلج

Syringa (S). Lilas (F). Lilac, Pipe tree (E). Lilac, Flyer (D). Lilac, Siringa, Siringa, Siringa (E).
جلس نباتات برية وريديت من فصيلة اللزيتنيات. انواعها عديدة منها الجنيات والاشجار. اغنائها واراقها متقابلة. ازهارها قنوي التجميع ، ناهي الارتكاز . ازهارها قصيرة

الكهباد اللون بين تكون الصفحة اليسرى يضاء اللون غبراء اللونج. وهي من الاسماك المأكولة المتسبعة الطعم.

٢٥٢٩٣ - ليمنوغال عَقْدَاس

Limnogaes margulus (S). *Limnogaes plongeur* (F). حيوان ليل حاشر من فصيلة المذاليات. موطنه جزيرة مدغشكر. يألف ضفاف مجاري الماء. قوته الحشرات والديدان. جسمه صغير القد مكرهم يطول نحو ٢٦ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ ١٣ سم. رأسه فيه غزيرى الشكل مستطيل الخطم. عيناه وأذناه صغيرتان. جوارحه قصيرة. جميع أعضائه محطبة عما يساعده على السباحة والغوص لونه الى الشققة السوداء. وبره دقيق لاهم. الاثنى ثنور تضع في كل يوم من ٨ الى ١٠ جراء.

٢٥٢٩٤ - ليمنوفيليات

Limnophiliidae (S). *Limnophiliidae* (F). فصيلة حشرات من رتبة جلوليات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة تنتشر في معظم اقطار العالم. اجسامها متباينة الحجم. اقواها تراوح من الطغلة الى السمرة. ملاسها الفكية للاثية الاجزاء عند الاكدر. خاصيتها عند الاثان. ثلثها مسودة. اجنحتها الامامية رقيقة يطولها بعض الحمل المبر. قواها الامامية مجعزة بمنحس ظنوبى الارتكاز. قواها الوسطى للاثية المناسخ. اسارها تميش في الماء ملحوة بجلابيب مختلفة الاشكال منها الاسطوانية والمروية والمروية والمبططة. اشهر اجناسها :

<i>Limnophilus</i> (S).	الليمفيل
<i>Anabolia</i> (S).	الانابوليا
<i>Grammotaulius</i> (S).	الغرامماتولس
<i>Colpotauius</i> (S).	الكولبوتولس
<i>Mesophylax</i> (S).	الميزوفيلاكس
<i>Halesus</i> (S).	الهلسوس
<i>Drusus</i> (S).	الدروسوس
<i>Enoclyta</i> (S).	العتيل

٢٥٢٩٥ - ليمور

Lemur (S). *Lémur* (F). *Lemur* (E). جنس حيوانات لاحة صغيرة من الليموريات. انواعه المعروفة اربعة. مهداة عصابة وبرنقات جزيرة مدغشكر. جميعها مستطيلة الشكل. مستطيلة الاجسام الرقيقة والاذناب الطويلة. تألف الغنايات. تسرح في الليل او في النهار. قوتها الحشرات والطاء وتختلف الزخافات والطير والثار.

Lémuriens, Prosimiens (F). *ليموريات* (F). رتبة حيوانات ليلية من القربيات اليمشيات تشمل فصائل تضم بعض الاجناس والديدان من الانواع. جميعها صغيرة القد. رقيقة القوام. مستطيلة الاذناب.

Citrus (S). *ليمون* (S). جنس اشجار وعجيرات شجرة برية وزايرية من الحمضيات. انواعه عديدة اعطانها البلاد الحارة. سوتها متسعة فراءه. قنار. سفة. اوراثها معتقة. نساها مستطيلة لامة الخصار. ازهارها عنثوية مثدية عطرة. ثمارها مختلفة الاشكال والاحجام والالوان. يغلب فيها الاخضر الاصفر

٢٥٢٩٤ - ليميتات

هي اللتقيات، فصيلة حشرات، اطباها.

٢٥٢٩٥ - ليميتية

هي اللتقية من الحشرات، اطباها.

٢٥٢٩٦ - ليميتية الجنبجل

Hepialus humuli (S). *Hépile du houblon*, *Phalène du houblon* (F). *Ghost swift moth* (E). *Hopfenwurzelbohrer* (D).

حشرة من الليميتات، جسمها غليظ الشكل حنطى اللون، بسطها تراوح من ٥٠ الى ٦٠ سم. الاثنى اكبر حجماً من الاكبر. رواشها الى الصفرة الوردية يطولها تقيج اخر. رواش الاكبر فضية اللون جلوية الالهاب. جيلها الحولى واحد. يكثر وجودها من حزيران الى تموز. تموش ريقها على جلور الجنبجل تسطها وتؤذيها.

٢٥٢٩٧ - ليميتية قارضة

هي لافقة النودة القارضة، راجعها.

٢٥٢٩٨ - ليميتية

Laelia (S). *Lélie* (F). *Laelia* (E). جنس نباتات عشبية امنية من فصيلة السطليات. شاربها لاقهاسية الارتقام. اوراثها سمسكة التصال القاسية. ازهارها متدوي التجميع، طري الارتكاز. ازهارها كبيرة بعضها عطري المرف. انواعها المعروفة قليلة، اشهرها التالية :

٢٥٢٩٩ - ليميتية عخراسية

Laelia furfuracea (S). *Lélie furfuracée* (F). نوع من الليميتية منبها المكسيك. ساها ريمية تملر نحو ٧٠ سم. اوراثها عديدة الالمانية التصال اخراشية الصفحات العليا. ازهارها كبيرة القد عطرة، قطرها نحو ١٢ سم. لونها الى البياض المالحى يطولها في وسطها بقجة مستديرة صغار. تنويرها يستمر طوال فصل الخريف.

٢٥٢٩٠ - ليميتية قزمية

Laelia pumila (S). *Lélie naine* (F). نوع من الليميتية. ساها دقة مستطيلة متسعة تحمل ورقة واحدة الالمانية التصل. زهرها وحيدة كبيرة القد، وردية اللون، قطرها نحو ١٠ سم. وهي فواصة المرف الطل، ترتكز على شراخ يرتفع نحو ٥ سم. تنويرها يستمر عدة اسابيع بين ايلول وتشرين الاول.

٢٥٢٩١ - ليميتية مستطيلة الزهانة

Laelia peduncularis (S). *Lélie à long pedoncule* (F). نوع من الليميتية. منبها المكسيك. ساها شراخية قصيرة تحمل ورقة واحدة الالمانية التصل المقطوم الطرف. ازهارها وردية اللون متبجبة بالبنفسجي. تنويرها يستمر طوال فصل الصيف.

٢٥٢٩٢ - ليميتية

Limanda vulgaris (S). *Limande*, *Lime* (F). *Dab* (E). سمكة بحرية من اللساوات الالمانية الموم تنتمي الى جنس اسماك موسى. جسمها بيضى الشكل مبط لثالب يطول نحو ٣٠ سم. وهي تتميز باختلاف لون صفحي جسمها وبارتكاظ منها الواحدة فوق الاخرى على الصفحة اليسرى



ليميتية الجنبجل



ليميتية عخراسية



ليميتة



ليمور

منها الحلوه ومنها المأكولة ومنها الحامضة ومنها الحامضة المرة . اشهر انزلها على مائي .

٢٥٢٩٨ - **لَيْمُونُ اَصْيَالِيَا *** ، **بَرْغَمُوت** ، **زُبُونُ**
Citrus bergamota, C. bergamia (S). Bergamotier, Bergamottier (F). Bergamot orange (E). Bergamot-tenzitron (D). Bergamotta (I).

نوع من الليمون الزراعي المجهول المهد . تذكر زراعته الصائغية في بعض وسائل المتوسط انحصاها السواحل الايطالية حيث يستخرجون من قشور ثماره عطر البرغموت . ثمرته صغيرة ، اغصانها متفرجة . اثمارها وولايها خضراء اللون . اوراقها مستطيلة الاثناض . ازهارها بيضاء اللون ، فواحة العرف المطري . ثمارها برميعة الشكل مقطوعة الرأس . قشورها كثيفة الجريب الطرية غزيرة المادة . عصارة حمضها حامضة .

٢٥٢٩٩ - **لَيْمُونُ اَلْتَنَدِي *** ، **يُوسُفُ اَلْتَنَدِي** ، **يُوسُفِي** ، **مَنْدَارِين**

Citrus nobilis, C. nobilis deliciosa, C. deliciosa (S). Mandarinier (F). Mandarin orange (E). Mandarine, Jericho Orangenbaum (D). Mandarina (I).

نوع من الليمون الزراعي الخمر . شروبه واصرامه حامدة ، مهدا الصين وقد عمت زراعتها معظم المناطق الحارة اخصها البحرية . اثمارها صغيرة القند تملو من سترن الى سبعة امتار . سوقها منتعجة ، اغصانها متفرجة ، اثمارها فتاه . اثمارها دقيقة مستطيلة ، اوراقها متعالية ، معتقة ، بسيطة . اغصانها احليجية الشكل ، ذلي الزام الاخير ، لوله الى الخضرة العائقة . ازهارها بيضاء اللون خافتة العرف . ثمارها مستديرة منتفخة الطينين تلمس من ٥ الى ٧ سم . قشورها مثقله وافعة نضجة لا ترقص بالخصوص . وهي غزيرة الملوحة البطرية الذكية العرف . لونها عند الادراك يراوح من الاصفر الاخضر المواج الى الاصفر الصائغ الاخر الترضيع . لباب حمضها متعجب التكهة ، سكري الطعم في بعض المولوس الصائغة الثالثة . (راجع جدول التقيتين) . . اشهر اصرامه الحالية واعها زراعة التسوسه (Satsuma) ثمارها زاهية اللون الاصفر الصائغ ، حامدة البلور ، معتلة العرف والتكهة . ثمرتها متوسطة القند تتصلب الصقيع خاصة اذا كان طعمها ليمون يري || واليوسي رطب في الارربة المبيقة اللور ، الحبيصة والقليلة الانساج . متطلباته الغذائية لا تقل من متطلبات البرتقال لانه شربه يستأثر العناصر القسورية والمعدنية بسرعة .

٢٥٣٠٠ - **لَيْمُونُ الْبَحْرِ ***

Ximenia americana (S). Ximénia, Prune de mer (F). حبة مشرة من فصيلة الازيديات . مهدا المناطق الاستوائية الافريقية والامريكية . ساقها فراء . فروصها اغنية الارزكان قصيرة القاب . اوراقها متعالية ، سائنة التصل الجلمد ثمارها خضوية الشكل والقند ، حامدة الطعم ، مأكولة .

٢٥٣٠١ - **لَيْمُونُ اَلْجَنَّةِ *** ، **كُورْبُوت** ، **كُورْبُون**
Citrus decumana paradisii, C. paradisii (S). Grapefruit (F). Grapefruit (E). Lederorangenbaum (D). Pomei (I).

شرب من الليمون الهندي الزراعي . ثمرته تملو من ٨ الى ١٠ امتار . ساقها وانفادها قليلة الحشف القصير ، اغصانها فارقة . اثمارها قليلة الكثافة . اوراقها كبيرة القند بيضيه الشكل . ثمارها كثار الليمون الهندي شكلا وصحفا ولونا الا انها اجد عصارة واقل مرارة وحوضة وهي تركز مع السكر .

Orange

٢٥٣٠٢ - **لَيْمُونُ بَرْتَقَال** ، **هَو** ، **الْبَرْتَقَال** ، **الطليه** .

٢٥٣٠٣ - **لَيْمُونُ بَرِّي**

Citrus trifoliata, C. triptera, Poncirus trifoliatus (S). Citronnier à 3 folioles (F).

نوع من الليمون مهد الصين واليابان . ثمرته سبروتية صغيرة القند تملو نحو ٣ امتار . ساقها منتعجة حشفة فراء . فروصها قليلة الانفراج متوسطة الاتقاد والاثان . اوراقها مركبة ثلاثية الورقات . وريقاتها احليجية التصل الحسن المقطوم الطرف . ازهارها كبيرة القند بيضاء اللون خافتة العرف . ثمارها مجسم التفاحة الصغيرة وهي حامدة مرة لا تركزل . قشورها رقيقة لونها الى الصفار الباهت . وهو شائع الانتشار كالتارنج لانه يفرس الطعم نظرا لنشاطه ويناعه وسرعة اثماره وقوة احماله الصقيع .

٢٥٣٠٤ - **لَيْمُونُ حَامِض** *

Citrus medica (S). Citronnier, Limonier (F). Lemon tree, Common lemon (E). Limonenzitron (D). Citreno, Limone (I).

نوع من الليمون الزراعي السبروتي . مهد المشرق الهند الصينية وجوراجا . شروبه واصرامه عطيفة . اثمارها تملو من ٣ الى ٦ امتار . سوقها وفروصها حشفة . حشفها حاد الحمة يطول نحو ٣ سم . اغصانها فائشة . اثمارها وزاويها موشحة بالبنفسجي . اوراقها متعالية معتقة . اثمارها حامدة الجناح ، تصالها بيضيه الصائغة المستطيلة الخشابة الحافة . ازهارها خماسية الفصل ، فواحة العرف المطري ، لونها الى البياض تشوبه ماجة ارجوانية . ثمارها بيضيه مستطيلة تنتهي بنذلة صغيرة حامدة الطعم . عصارة حمضها حامضة الطعم حامدة المرارة .

٢٥٣٠٥ - **لَيْمُونُ حُلُو ***

Citrus aurantium aurantifolia, C. limetta, C. limonium dulcis (S). Limettier doux, Limonier doux (F). Sweet lemon tree (E). Süsse Limone (D). Limone dolce (I).

نوع من الليمون الزراعي المأكول الجار . ثمرته تملو من ٤ الى ٧ امتار . ساقها وفروصها حشفة . اغصانها متوسطة الانفراج . اثمارها وولايها خضوية اللون . اوراقها مجتمعة الاتقاد . تصالها بيضيه الصائغة ، معتلة الحافة . ازهارها عطرية ، بيضاء اللون ، صفراء المواج . ثمارها مستديرة تنهي بحليمة معلقة . قشورها مائسة ، باهتة الصفار . حمضها غزيرة العصارة الحالية من الحامض الليموني .

٢٥٣٠٦ - **لَيْمُونُ كُمُكَات *** ، **كُمُكَات** *

Citrus japonica (S). Kumquat (F).

نوع من الليمون الزراعي الخمر ، مهد اليابان وفورورا ثمرته تشبه ثمره اليوسي ، اوراقها سائنة التصل العابق الحفصار . ثمارها توكل بكاملها عند الادراك وهي صغيرة الحجم كروية الشكل او مستطيلة . قشورها مائسة مبيكة اللباب ، حمضها دقيقة لا تملو من الحوضة || اقليمه اقليم اليوسي وقد يسترده متاعه واسما على طعم ليد الليمون البري . شروبه المشهورة اثنان المستر والمسطيل . راجع كمكات .



ليمون اصيليا



ليمون اهندي



ليمون البحر



ليمون الجنة



ليمون حامض



ليمون حلو



ليمون كمكات

٢٥٣٠٧ - **لِيمُون مَالِح * ، لِيمُون مِعْرِي ،**

بَشْهِير
Citrus limonum pusilla (S).
Limon d'Egypte, Petit limon d'Egypte (F). Egyptian small lime (E). Egyptische kleine Limonenzitronen (D). Limone piccolo, Limoncello calabrese (I).

نوع من الليمون الحامض . أصلها البلاد الحارة تكثر زراعتها في مصر والهند وبعض المناطق الأمريكية . ثمرته صغيرة القذ تعلو من ٣ الى ٥ أمتار . اغصانها متدبة . انقائها نفا . اوراقها بحرية اللون ، مجتمعة الاوراق ، بيضيه النصل . ازهارها صغيرة القذ بيضاء اللون ، ثمارها صغيرة شبه كروية . قشورها مألحة رقيقة ، حصوصها غزيرة الصارة الشديدة الحموضة .



ليمون مالح

٢٥٣٠٨ - **لِيمُون هِنْدِي * ، قَوَامَكِين**

Citrus decumana, C. maxima (S). Pamplemoussier, Châdêque (F). Pomelo tree, Schaddock tree (E). Pampelmusorangebäum (D). Pompa di Genova, Pampelmo (I).

نوع من الليمون الزراعي، مهدد القدر جزر الزايج . ثمرته تعلو من ١٥ الى ٣٠ أمتار . ساقها واغصانها حشفة . اغصانها زهاء الماء . اوراقها كبيرة القذ تعلو نحو ١٥ سم . وتعرض نحو ٥ اغصانها مجتمعة ، نصلها بيضيه جامدة لائمة الخضار . ازهارها متفويدي التجميع يضم من ٦ الى ١٥ ازهار كبيرة القذ ، يضاء اللون ، مستحبة العرف الطري . ثمارها مستدرة ، متخففة الرأس والقلب . قشورها براوح من ١٥ الى ٣٥ سم . قشورها صميكة خشنة لونها الى الصفرة . حصوصها كبيرة الحجم ، متوسطة الصارة الحامزة المرة المأكولة مع السكر .

٢٥٣٠٩ - **لِيمُونَات ، سِيَرَات**

Citrate
Citron (F). Citron, Lemon (E).
هي ثمرة الليمون الحامض .

٢٥٣١١ - **لِيمُونَة حَنَوَة**

Limetta, Lime (F).
Lime (E).
هي ثمرة الليمون الحلو .

٢٥٣١٢ - **لِيمُونَة هِنْدِيَة**

Pompoléon, Pomélo, Pamplemousse, Chaddock (F).
هي ثمرة الليمون الهندي أي الفراسكين . Shaddock (E).

٢٥٣١٣ - **لِيمُونِيَت ، هِمَمِيَت اَسْمَر**

Limonte, Hématite brune (F). Limonte, Brown haematite (E).
معدن حديدية اسمر اللون يعرف كياويو بأكسيد الحديد الهيدراتي الطبيعي . وزنه براوح من ٣٥٦ الى ٤ وصلابته من ٥ الى ٥.٥ وهو تسري حديم التبلور والانتظام . اشكاله عديدة انحصا الليمونيت أثر في اللون والليوسونيت التفلل المعروف بالفرص للصفراء والليمونيت الشاكي والليوسونيت المحبب .



ليمون هندي

٢٥٣١٤ - **لِيمُون الجِلْد**

Malacoderme (F).
Malacodermatous (E).
نعت تمريفي يطلق على كل حيوان لين الجلد ان من الرغويات أو خريها .

٢٥٣١٥ - **لِيمُون العَظَم**

Osteomalacia (F).
Osteomalacia (E).
شاقية تصيب البشر الحلوب سبها نقص في الفسفور يعمو الى قلة نسبته في الاغصان او الاطلاف التي تتجسمها الابقار .

٢٥٣١٦ - **لِيمُونَا الحَقُور** هي نصارية الحور ، اخلبا .

Malacotérygiens (F).
Malacopterygii (E).
رنية من الاسماك .

Malacostracées (F).
Malacostraca (E).
صفيغ حيوانات من القشريات .

Malacodermes (F).
Malacoderma (E).
لمسة من الحشرات القعدية الاجنحة قذت من ريقاتها لكنها لينت الانحاء . نصلها عديدة اشهرها البراريات .

٢٥٣٢٠ - **لِيمُونِيَة ، حَبَابِيْب**

Linaria (S).
Linaire (F).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الخنازيريات . انوامه نحو ١٢٠ منها الاشعاب والجنات الحولية والمعمره . اوراقها واغصانها لا قياسية الشكل والتجميع والانتظام والارتكاز || احرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٥٣٢١ - **لِيمُونِيَة اُرْجُونِيَة**

Linaria purpurea (S). Linaire pourpre (F).
نوع من الليناريه المعمره وهي بجلة جاسدة تعلو من ٦٥ الى ١٥٠ سم . اوراقها خفيفة غطية . السفل منها غمية التجميع والعليا متعاقبة . ازهارها متفويدي ارجوانية اللون صغيرة القذ || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الثاني .

٢٥٣٢٢ - **لِيمُونِيَة اَسْكِيَة**

Linaria spartea (S).
Linaire jonciforme (F).
نوع من الليناريه الحولية وهي خفية سريرية تعلو من ٣٠ الى ٥٥ سم . اوراقها خفيفة مستطيلة اسليه الشكل ، السفل منها غمية التجميع ، أما العليا فتعاقبة وهي بحرية اللون قليلة العدد . ازهارها الى الصفار الباهت ، قواعدها برتقالية المواج . يزورها حنفة حادة المناخ || ازهارها يستمر من ايار الى آب .

٢٥٣٢٣ - **لِيمُونِيَة بَاهِيَة**

Linaria pallida (S).
Linaire pâle (F).
نوع من الليناريه المعمره . ساقها مدادة تعلو نحو ٨٠ سم . اوراقها متعاقبة منفعة كبيرة القذ . نصلها مستدير الصفرة ، سبالي القفصوس . ازهارها بطرية العرف تعلو نحو ٢ سم . لونها الى الزرقة الباهت || ازهارها يستمر من ايار الى تشرين .

٢٥٣٢٤ - **لِيمُونِيَة حَرَشَاء ، حَبَابِيْب اَحْرَش**

Linaria elatine (S). Linaire élatine, Muflier élatine, Velvete, Véronique femelle (F). Cancerwort, Pointed leaved toad-flax (E). Spiessleinkraut (D). Elatine, Linaria veronica, Veronica femmina (I).
نوع من الليناريه المعمره وهي بجلة بخند حرشاء . تعلو نحو ٦٠ سم . ترطب في الاثرية الطينية . اوراقها سنانية ، خفيفة ، متعاقبة . ازهارها صفراء اللون صغيرة القذ . ازهارها يستمر طول فصل الخريف .

٢٥٣٢٥ - **لِيمُونِيَة خَمَلِيَة**

Linaria pilosa (S).
Linaire velue (F).
نوع من الليناريه المعمره . ساقها مدادة تعلو نحو ١٢٠ سم . اوراقها كبيرة القذ كثيرة التفصيص . نصلها خلي البشره الحبل اللون . ازهارها متوسطة القذ لونها الى الزرقة الخيمية || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٥٣٢٦ - لينارية دلماسية

Linaria dalmatica (S). *Linaire de Dalmatie* (F).
نوع من اللينارية المعمرة وهي جنية سريرية تملو من ٦٠
الى ١٢٠ سم. ساقها منتصبة قليلة الفروع. اوراقها
لاطفة متناقبة. نصلها ساني الشكل، مستعرض القاعدة،
بحري اللون. ازهارها كبيرة القدد تطلو من ٣ الى ٤ سم.
لونها ال صفرة الزاوية || ازهارها يستمر من تموز
الى آب .

٢٥٣٢٧ - لينارية صناعية ، حجاب الشرق

Linaria cymbalaria (S). *Linaire cymbalaire*, *Cymbalaire*, *Ruines de Rome*, *Lierre des murailles* (F).
Cymbalaria, *Ivy leaved cord-flax*, *Kenilworth-ivy* (E). *Zimbelkraut*, *Gemeines Zimbelkraut* (D). *Linaria cimbalaria*, *Rovine di Roma* (I).
نوع من اللينارية للمعمرة، تعيش بين الصخور وعلى الجدران
القديم. ساقها منتصبة تطلو نحو ٨٠ سم. اوراقها متناقبة
مستعرضة خاسية القصوس. نصلها احر الصفحة السفلى.
ازهارها ليلكية اللون صغيرة القدد || ازهارها يستمر من
ايار الى تشرين .

٢٥٣٢٨ - لينارية عادية * ، حجاب مبدل

Linaria vulgaris (S). *Linaire commune*, *L. vulgaire*,
Muffler båtard, *Lin suavage* (F). *Butter and eggs*,
Dragon-bushes, *Toad-flax* (E). *Flackskraut*, *Frauen-*
flachsleinkraut, *Leinkraut* (D). *Linaria comune*,
Abrotano salvatico, *Urnaria* (I).
نوع من اللينارية البرية الطيبة المبدلة المعمرة ، تكثر
في الجور وعلى حافة المزارات. مجملتها تملو من ٣٠ الى
٧٠ سم. اوراقها متناقبة، نصلها ضيق الصفحة ثلاثي
المروق بحري اللون. || ازهارها ال الصفار الباهت يعلوها
عند قواعدها مواج اسع || ازهارها يستمر من حزيران
الى ايلول. اوراقها وازهارها كريمة تتسمل ضد
البراسير .

٢٥٣٢٩ - لينارية كبيرة الزهر

Linaria grandiflora (S). *Linaire à grandes fleurs* (F).
نوع من اللينارية المعمرة وهي جنية سريرية تملو من ٧٠
الى ١٤٠ سم. اوراقها غنية التجميع، نصلها خطي الشكل
بحري اللون. ازهارها نورية ، كبيرة القدد تطلو نحو ٤ سم.
لونها ال البنفسجي يعلو تجديج ارجواني وبشمة صفراء.
ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٥٣٣٠ - لينارية كركهانية

Linaria amethystea (S). *Linaire améthyste* (F).
نوع من اللينارية الحولية وهي شبة مثنونة تملو نحو ١٥
سم. اوراقها خطية لا قياسية التجميع والانتظام لونها ال
الخضار البحري . ازهارها كركهانية اللون يعلوها عند
قواعدها مواج بنفسجي || ازهارها يستمر من تموز
الى آب .

٢٥٣٣١ - لينارية مرا كاشية

Linaria maroccana (S). *Linaire marocaine* (F).
نوع من اللينارية الحولية وهي عشية سريرية تملو من ٢٥
الى ٣٥ سم. اوراقها عدية لا قياسية التجميع والارتكاز.
نصلها غزل البشرة احمال اللون . ازهارها كبيرة القدد
بنفسجية اللون ارجوانية المواج || ازهارها يستمر طول
فصل الصيف .

٢٥٣٣٢ - لينارية مقدونية

Linaria macedonica (S). *Linaire de Macédoine* (F).
نوع من اللينارية المعمرة وهي بجلة سريرية تملو من ٥٠
الى ١٠٠ سم. ساقها منتصبة قليلة الفروع. اوراقها
لاطفة، نصلها يضيي الشكل ذلق الزام الاخير . ازهارها
مستطيلة الاذن، متوصلة الحجم، لونها ال صفرة الزاوية .
ازهارها يستمر طولك فصل الصيف .

٢٥٣٣٣ - لينارية وديلية

Linaria genistifolia (S). *Linaire à feuilles de genêt* (F).
نوع من اللينارية المعمرة وهي بجلة سريرية صغيرة القدد
تملو نحو ٦٠ سم. اوراقها لاطفة ، متناقبة ، نصلها
كالوزك وهو جامد الصفحة بحري اللون . ازهارها
متوصلة القدد ، قصيرة الاذن باضة الصفار || ازهارها
يستمر من حزيران الى آب .

٢٥٣٣٤ - لينيت ٥ ، لجيت

Lignita
هو الخشب المنقسم والقمم الاذكن . نوع من الفحم
الحجري الحديث العهد المتوسط الفصلية .

٢٥٣٣٥ - لينين

Lignine
هي الخشيين ، للمواد الكيماوية الطبيعية ، التي تطلو لفصلية
والقوة في النج النباتية الخشوية .

٢٥٣٣٦ - لينوت ٥ *

Alstroemeria ligu (S).
Liuo (F).
نبات عشبي زراعي من فصيلة الترجسيات . اصلانه البلاد
الامريكية . تكثر زراعت في الجور والشليل . ذواته
مستطيلة لا قياسية الشكل والحجم يستخرج منها لبوب
يضيي " فلوو " لذية الطعم شائع الانتاج يقيه المرضي
وصاحب المنه والادماء الضعيفة لانه سرع الحضم عادم
الانفعال مع اي طعام كان .

٢٥٣٣٧ - لينوت عفيرين

Myrmelionides (F).
Myrmelionides, *Ant-lions* (E).
هي الميريفيات ، فصيلة حشرات من مصليات الجناح .

٢٥٣٣٨ - لينود ٥ *

Liods (S).
Liods (F). *Liods* (E).
جنس حشرات من فصيلة اليروديات ودية عهديات الاجنحة
انواعها المعروفة قليلة ، نحو ١٢ ، اصلاتها تشمل معظم
اقاطل النصف الشمالي من الكرة الارضية || اجسامها
صغيرة ، ممددة ، اهليلجية الشكل ، تطلو من ٤ الى
٦ م. رؤوسها صغيرة ، مستعرضة ، عينها صغيرة ،
بارزة . تأثيرها وفكوكها نظامية . ملاسها قصيرة .
قرونها الاستشعارية صولتانية . كواسلها مستعرضة .
اغدها لاطفة ، تحلة التخديد القاطب . قوائها نشطة
مهدبة . اولها ملونة لما عت تعيش على الفطور الابلية
وفي الاعشاب النخرة .

٢٥٣٣٩ - لينوديات ٥

Liodidae (S).
Liodidae (F). *Liodidae* (E).
فصيلة حشرات من عهديات الاجنحة . اجناسها وانواعها
المعروفة عديدة ، منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها
صغيرة ، ممددة ، تطلو من ٢ الى ٦ م. رؤوسها صغيرة ،
مستعرضة . عينها بارزة . تأثيرها وفكوكها قياسية .
ملاسها قصيرة . قرونها الاستشعارية صولتانية . كواسلها



لينارية عادية



لينوت



ليود

فرعاه تملو نحو ٨٠ سم. أوراقها ايّدة بقسيّة الشكل ،
تطول من ٥ الى ٦ سم. نصلها جامدة ، مائلة الصفحات
اللامعة . ازهارها علقى التجميع ، طرفي الارتكاز .
ازهارها بيضاء اللون ، متكها ارجوانية ، كمابرها ثلاثية
المصاريع || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .


مستعرضة . اغمارها لاحقة . اثلواها ملونة لماعة || تمش
عل الفطور الذائقة والمتحلة وفي الاغشاب النخرة والدردي
وتحت الجاه || اشهر اجناسها الاسود واليفيل .

٢٥٢٤٠ - ليوفيل بقسيّ الورق °

Leiophyllum buxifolium (S).

Leiophylle à feuilles de buis (F).

جنبه برية وتزيينية معمرة من فصيلة الخلنجيات . ساقها



Diffus (F). To dilute. مائتة ٢٥٣٤٨ - مائتة

مائتة الليرة اذابه . مائت الملح في الماء . مائت الكلس في الماء .

Candeflora (F). مائتة ٢٥٣٤٩ - مائتة

Pyramidal fruit-tree (E). شكل من اشكال التشذيب خاص بالشجر المستوي شمدان .

Reflet (F). Reflection (E). مائتة ٢٥٣٥٠ - مائتة

مائتة ٢٥٣٥١ - مائتة ٥٥ زهرة المجد

Cilanthus (S). Cilanche (F). Glory-pea, Parrot's-bill (E). Prachtwicke, Ruhmesblume (D). Cilanco (I). جنس نباتات زينة معمرة من فصيلة القرقيات القرابية . انزلها المعروفة قليلة . اعطانها جزر المحيط الهادي . ساقها خشبية ، اوراقها وزرية التركيب مشطية . ازهارها كبيرة القند ، جميلة الشكل . سميت زهرة المجد لان ساقها يمجده الخالق || اعرف انزلها ما يلي :

٢٥٣٥٢ - مائتة ٥٥ مائتة

Cilanthus speciosus (S). Cilanche de Dampier (F). نوع من المائدة وهي جملة سرولية تملو نحو ٦٠ سم . ساقها فروع . وريقاتها سنائية الشكل . نصلها نام المس ، فهي البيرة . ازهارها خلية او سداسية التجميع ، كبيرة القند ، تملو من ٨ الى ١٠ سم . زهرها الى الانحر الايجوي يملوها عند قاعدة الزهرة بقمة جلوية لامة . ازهارها يشمر طوال الصيف .

٢٥٣٥٣ - مائتة ٥٥ مائتة

Cilanthus puniceus (S). Cilanche ponceau (F). نوع من المائدة وهي جنبة سرولية مارشة تملو نحو ١٢٠ سم . ساقها مشقوفة القروع . وريقاتها احليجية .

Eau (F). Water (E). ماء ٢٥٣٤١ - ماء

جسم مائل حاد اللون والطعم والرائحة . ثقله النجمي ١ وزله الاكثبي ١٨ يحمده عند بلوفه درجة الصفرة وما دونها من المقاييس الستيفرادي ويغل عند بلوفه نحو ١٠٠ سم في الضبط الجوي المادي || وهو من اكثر مواد الكون انتشاراً . يوجد في الطبيعة على ثلاث حالات : سائلة بخار في الجو . وسائلة جراد في المواقف الباردة فيكون جليداً عند القطبين وتليجا في الجبال العالية . وسائلة سائل في البحار والانهار والينابيع || والماء كيمياً هو نتيجة تآلف هيدروجين و٢ بين الاكسجين والهيدروجين بنسبة ١ الى ٢ .

Eaux résiduaires (F). ماء التجميع ٢٥٣٤٢ - ماء

Residuam water (E). هو الماء الناتج من معادل السكر والفاشا والتقطير .

Eaux fossiles (F). ماء الجيتين ٢٥٣٤٣ - ماء

سائل لزج خاص يشمر الجيتين في الزحم .

Eaux aux jambes (F). ماء الرئس ٢٥٣٤٤ - ماء

رسم يصيب التليل في رسلها وحشيتها فيحدث فيها تشققات تليل منه مادة مائلة كزربة الرائحة .

٢٥٣٤٥ - ماء المتعاقب ، ماء التجارير

Eaux d'égoûts (F). Sewage, Sullage (E).

هو ماء المنازل والطرارح .

٢٥٣٤٦ - ماء التراحيض ، ماء الكفف

Eaux-vannes (F). Sewage (E).

هو خليط من الماء والبول والرجيع الصادر عن الكفف .

٢٥٣٤٧ - ماء المتراكل (F). Dung-water (E).

سائل مركب من بول الحيوانات والماء المستعمل من الزيل .



مائتة



مائتة

Substance (matière) (F). **٢٥٣٣٢ - مَادَّة**
Matter (E).

Article (jur.) **٢٥٣٣٤ - مَادَّة**
تقسم القوانين والمراسم والقوانين والمقود الى مواد . والمادة هي الجنس الواضح لشيء المقصود .

Corpus delicti (F). **٢٥٣٣٥ - مَادَّةُ الْجَرِيْمَةِ**
Corpus delicti (E).
هي الوقائع المادية التي تدل على الجريمة وصفتها .

Adjuvant **٢٥٣٣٦ - مَادِيخ**
المواد المادحة، مواد قليلة تضاف الى بعض الادوية او الشحنت البتدائية فزيد نفعا البتدائي .

Nématocide (F). **٢٥٣٣٧ - مَادِيْد**
Nematocide (E).

كل مادة تستعمل في القضاء على الديدان الشبانية .

Matérialisme (F). Materialism (E). **٢٥٣٣٨ - مَادِيَّة**
المادية ملهب القائلين بانه لا يوجد في هذا الكون سوى مادة وسرعة ، وان الجيلة والحياة والضمير ما هي الا مناشع يفسرها تحليل المادة والحركة .

Madia (S). Madi, Madie (F). **٢٥٣٣٩ - مَادِيَّة**
Madi, Tarweed (E). Olmadia (D). Madia (I).
نبات عشبي ينحني سناحي من فصيلة المركبات ، مهدد الاصيل بلاد الشيل زرع لزوره التي يستخرج منها مادة دهنية تستعمل في صناعة الصابون . وقد زرع ايضا لاستعماله كعبد خضري .

٢٥٣٣٧ - مَادِي
المادي : السل الابيض او الجديد او خالصه .

Capra falconeri (S). **٢٥٣٣١ - مَارُخُور**
Bouquetin markhor, Markhor, Chèvre de Falconer (F). Markhor (E).

اسم فارسي بمعنى اكل الحيات لانهم زعموا انه يأكلها . وهو نوع من الويل ضروبه المعروفة اربعة اعطائها اسراج ومزقعات التبت والافغان وكثير... يتميز باستطاعة وانتصاب قرونه الخضرية الضليلة . جسمه يطول نحو ١٣٥ سم . ويبلغ نحو ١٠٠ سم . الاثنى اصغر جنس وقربا من الفلور . خلفها ثنائي الضرع وهي تقصع من جدي الى جبينين || والمارخور ثنائي الضرع وهي تقصع من جدي الى ٥٠ و ٧٠ نفراً وهو يتصالب مع المارخ مع المارخ ويتاجه بحسب السيلة .

Canna des Indes (F). **٢٥٣٣٢ - مَارُزَوَان**
هو قننا الهند ، اطليه .

٢٥٣٣٣ - مَارُزَوَانِيَّات ، قَنَوِيَّات
Cannaceae (S). Cannacées (F). Cannacées (E).
فصيلة نباتية من سبديات الفلقة عديدة الاجناس والانواع اشهرها المارزوان .

Enrymère (F). **٢٥٣٣٤ - مَارُغ**
مارغ او مارغة نمت تمرين يطلق على كل حشرة تركب النبات في جميع اعضاءها اخصها الهوائية من الساق الى الورقة والتمرة .

نصلها خيل البقرة ، حريري المس ، نضي اللون . ازهارها خملية او سداسية التجميع تطول من ٨ الى ١٢ سم . لونها الى الازرقاني ، قاعدة وايتها بيضاء || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

Malidae (S). **٢٥٣٥٤ - مَاجِيَّات ، مَاجِيَّات**
Malidés (F). Malidées (E).

فصيلة من التشرينات حشرات الاربيل . قصيرات الذيل . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة جميعها بحرية اعطائها بحار البلاد المعروفة الحرارة || اجسامها متباينة القد ، تطول من ١٢ الى ٢٤ سم . تتميز بدهنها الملينة الشائكة الاطراف وبملقتها الكبيرة الضليلة || بعض انواعها مأكل ، مستحب الطعم .

Jaune d'oeuf (F). **٢٥٣٥٥ - مَاح**
Yolk of an egg (E). الملح : صفرة البيض .

Improductif (F). **٢٥٣٥٦ - مَاحِل ، مَاحِل**
Unproductive, idle (E). ماحل ومحال كل ارض لا تحسب قط .

Manettia (S). Manettie (F). **٢٥٣٥٧ - مَاحُور**
جنس نباتات جنينية حارسة معمرة من فصيلة الفويث . انواعها قليلة معظمها بري وبعضها زبني . سوقها دقيقة متشكلة . اوراقها ابيدة متقابلة متقة . ازهارها قمية الشكل محورية الارتكاز او تاجية || احرف انواعها واشهرها ما يلي .

Manettia ignita (S). **٢٥٣٥٨ - مَاحُور لَوْرِيْزِي**
Manettie rouge feu, M. à fleurs vermillon (F).
نوع من الماحور الزبني ، ساقه دقيقة لولية تطول نحو اربعة امتار . اوراقه اهلجية الشكل ، نصلها مقطوع القاعدة ذلق الزام الاخير . ازهاره محورية وقائمة الارتكاز ، قمرية اللون ، لامة المواج . قطر قمرها نحو ٤ سم || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

٢٥٣٥٩ - مَاحُور قَلْبِي الْوَرَق
Manettia cordifolia (S). Manettie à feuilles en coeur (F).

نوع من الماحور الزبني . ساقه دقيقة تطول نحو خمسة امتار . اوراقه قليلة القاعدة مستطيلة النصل الذروب في زامه الاخير . ازهاره كبيرة القد ، ابيضوتية اللون السوي ، قطر قمرها نحو ٥ سم || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

٢٥٣٦٠ - مَاحُور مُرْدَوِيح الْوَلِي
Manettia bicolor (S). Manettie bicolor (F).

نوع من الماحور الزبني . ساقه دقيقة نحيلة تطول نحو اربعة امتار . اوراقه ستائية مستطيلة الاضناق ، نصلها ذروب القاعدة والطرف . ازهاره قمرية الاثيوب ، ابيضوتية القسم ، صفر الحنار والحافة . قطر اقاصها براوح من ٢ الى ٣ سم || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

Makairo (F). **٢٥٣٦١ - مَاحِرَكَة**
سكة بحرية تدعى سارية ، اطليها .

Amouillante (F). **٢٥٣٦٢ - مَاحِيْص**
About to calf (E).
الاثني من الحيوان ان سحير او بقره او ناقة او نعجة او حن حان وضعها .



ماحور



مادي



مارخور



ماره



ماروت



مارش



مازيون



مازيون هندي

Bois Joli, B. genti (F). Mezereon, Dwarf laurel, Spurge olive (E). Echter Seidelbast, Kellershals (D). Laureola gentile, Biondella, Mezereon (I). نوع من الفلقة عديد القلوب يعلو من ٧٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقه متعاقبة مستطيلة، نصلها مائل البشرة يطول نحو ٨ سم. ويعرض نحو ٢٠ سم. أزهاره طرفية، غنية التجميع عوروية الارتكاز، تستبق الأوراق. البتلات تختلط مع القلوب منها الأبيض والآخر الوردي. ثماره عنبية لونها إلى الخضرة. يستخرج منها من الأوراق مادة فعالة سامة يقال أن القليل منها ينفع من الاستسقاء واليرقان وضغط الكلى.

Daphné alpestris (F). - **مأزويون جبلي** ٢٥٢٨٧
أطبخ دفنة ألبية.

Daphné camélie (F). - **مأزويون مكجيس** ٢٥٢٨٨
نبات من الفلقة، أطبخ دفنة صغيرة.

٢٥٢٨٩ - **مأزويون هندي** *، **هوج**، **بطورية ليرتات**
Citoria ternata (S).

Citoria de Ternate (F). Blue Citoria, Butterfly-pae (E). Blue Citoria blume (D). Fagiolo indiano, Fior celeste (I). نوع من البطورية من فصيلة القرشيات القرشية. وهو نبات حشبي زراعي متسلق يعلو نحو ٩٠ سم. أوراقه مركبة ثلاثية، وريقاتها بيضبة لثة. أزهاره كبيرة القند زرقاء اللون تتميز بعدم انتظام بتلاتها. وهي تستعمل في الهند لتدوين الرز المطبوع وبعض الحلويات. أما ثماره فسنبية دقيقة مستطيلة، يزورها صغرة مستديرة سمراء اللون.

٢٥٢٩٠ - **مأزويونيات**
Thymelaeaceae (S). Thymalécées (F). Thymelaeaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة الثغالات. أجناسها وأزهارها كثيرة العدد معظمها حشبي وبعضها جنبي منه الطيبي والسهباني والرائحي.

٢٥٢٩١ - **مأزون**
Œufs de fourmis (F). Eggs of the ants (E). يبيض النمل.

٢٥٢٩٢ - **مأزوت**
Mazout (F). Oil fuel (E). ستارة وقود تجم من تقطير النفط الخام.

٢٥٢٩٣ - **مأزور** (F). Martin-chasseur (S). Dacelo (S). جنس طير من المازوريات. أنواعه عديدة أطرافها فسيحة الأرجاء تشل معظم خطوط المحيط الهادي. جميعها مستعرة التأثير الكبيرة المتدلية الصفحة السفلى. أجسامها ريمية، أجنحتها متدلة الطول، أذنانها مستعرة، أصابعها قصيرة وقوية || يألث الحياة الجبلية. أسراه تمه من ١٠ إلى ١٠٠ || أعرف أنواعه وأشهرها المأزور الجبار.

٢٥٢٩٤ - **مأزور جبار** *
Dacelo gigantea (S). Martin-chasseur géant (F). Laughing jackass (E).

طائر من المأزور، قال فيه الجاسط: « طائر مبارك ينابض به أصحاب السقف طوله يراوح من ٤٧ إلى ٥٠ سم. يسلط نحو ٦٥ سم. ثوبه غايق اللون. رأسه مستطيل الريش اللدب الاسمر. حشره مستعرض الخط الاسود. ظهره إلى السمرة. يسلط إلى الصبهة يطولها ملح أسود. جناحها إلى الزرقه الباقية. فؤاده إلى السواد اللامع. فته إلى الجلود.

٢٥٢٩٥ - **مأزوه** *
Dolichotis patagonica (S).

Maru, Lièvre de Patagonia (F). حيوان ليرن قاضم وسيد الجلس والنوع من فصيلة الثورديات. موطنه الهول والمراعي الايركية القائمة بين مندوزا وبضيق بجان || جسمه متوسط القند طوله نحو ٥٠ سم. ارتفاعه ٤٠ سم. ونيته ٤ سم. رأسه صغير القند. عيناه مستطيلتان اذناه كبيرتان. عنقه طويل. كفه غليظ مستدير. قوائمه رفيعة دقيقة. برأته قوية سادة. ثوبه إلى الصبهة اليرباء يعلوها ثوب أبيض. يسلط حاجي. ويره دقيق وكثيف، شديد اللسعة، لأم اللبس || يعيش بجاعات يراوح عدد افرادها من ١٠ إلى ٣٠ يسرح في النهار. قوته الاشباح البرية أخصها النمل || أذناه تقضم مرتين في العام وتنتج كل مرة جررين. جبره ردهة كبيرة عفرها حل عمق ١٠٠ سم. مدخلها وعبرها نفق واحد طوله نحو ٥ أمتار.

٢٥٢٩٦ - **مأزوت** *، **شمر الكلب**، **بأبوتج**
Maruta (S).

Maroute, Camomille puante (F). Mayweed, Dog-fennel (E). Stinkhunds-kamille (D). Maruta (I). نبات حشبي بري حولي من المركبات وهو نوع من الاقمارون يكثر بين الزروع فيصح من الاصاب الفأرة وهو كريح الرائحة عند اللبس. أزهاره صفراء اللون.

٢٥٢٩٧ - **مأزوم**، **مأزون**
Marum (F). هو صخر المر، أطلبه.

٢٥٢٩٨ - **مأزوخ**
Oryx (F). في الارخ، أطلبه.

٢٥٢٩٩ - **مأزوية إفريقية**
Oryx beisa (F). في الارخ الافريقي، أطلبه.

٢٥٣٠٠ - **مأزوية البادية**
Oryx capensis (F). في ارخ البادية، أطلبه.

٢٥٣٠١ - **مأزوية الجزيرة**
Oryx beatrix (F). في ارخ الجزيرة، أطلبه.

٢٥٣٠٢ - **مأزوية الصحراء**
Oryx gazelle, Pagan (F). في ارخ الصحراء، أطلبه.

٢٥٣٠٣ - **مأزوية سودانية**
Oryx de Nubie (F). في الارخ السوداني، أطلبه.

٢٥٣٠٤ - **مأريش** *
Bryopsis (S). Bryopsis (F). Bryopsis (E).

جنس نباتات بحرية من الخفيات الخضرة. أنواعه المعروفة نحو ٢٥. أطرافها تشل معظم بحار العالم || كلالها صغيرة. سوقها دقيقة، شبه أسطوانية الشكل متناوبة الافناد المتراكبة الريشية التصلال.

٢٥٣٠٥ - **مأزكة**
Nitrière (F). Nitrebed (E).

المكان الذي يصنع فيه الأزوت او يتحول فيه إلى نترات والماتة قد تكون طبيعية كما في شيلي او اصطناعية كما في مصانع الأزوت.

٢٥٣٠٦ - **مأزويون** *، **دفنة سمكة**، **أم**
Daphné mezereum, Thymelaea mezereum, Meze-reum officinal (S). Daphné mézéréon, D. jolibois,

٢٥٤٠٤ - **مَاشِيَّة ، بُهْم ، قَتَم ، مَآل**
Betail, Bestiaux (F). Cattle, Livestock (E).
الابل والبقر والذئب والماعز . احصاها ما كان منها للسل
والقنية . سميت ماشية لرعيها وهي تمشي وقيل لكثرة سلها ،
ج. مؤنث .

٢٥٤٠٥ - **مَاصَات**
Cyclostomes, Siphonophores (F). Siphonophores (E).
هي الحفليات الانواع رتبة من الاسماك .

٢٥٤٠٦ - **مَاصِيَّة**
Pipette (F). Pipet (E).
اداة مخبرية تستعمل لشفط السوائل . راجع شفاعة .

٢٥٤٠٧ - **مَاصِر**
Enclos (F). Enclosure, Close (E).
الماصر هو الحاجز تؤصر به الخيل والبقر والمواشي حصرها
في مكان معين ومنعها عن ارتياد غيره .

٢٥٤٠٨ - **مَاصِيَّة**
البقرة التي ولي لبها .

٢٥٤٠٩ - **مَاصِيَّة**
Cephalosporium (S).
جنس فطور مجهرية من الماصيات وفصيلة الروطيات .
أزواحه عديدة معظمها دني يعيش ويتكاثر على المواد
النباتية المنحلة . امشاجها خفيفة مادة تركب سطوح
حوائلها .

٢٥٤١٠ - **مَاصِيَّات**
Céphasporiées (F).
Cephalosporiées (E).
عمارة فطور مجهرية من فصيلة الروطيات . اجناسها ثلاثة
وهي التريكويدية والفلوية والمنازوع .

٢٥٤١١ - **مَاصِر**
Acescent
لمت تربي يطلق على جميع المواد الممكن ان تنحصر .
فالبقول والذئب والحليب تنحصر من المواد الماهرة لأنها قابلة
لتنحصر .

٢٥٤١٢ - **مَاصِر**
Pliqué (F). Sour (E).
بعض ماصراً كل مشروب يصير نحو التحليل او الفساد .

٢٥٤١٣ - **مَاصِر ، مُصْطَر ، شَات**
Pluvieux (F).
Rainy, Wet, Pluvieux (E).

٢٥٤١٤ - **مَاصِر**
Ovis capra (S).
Chèvre (F). Goat (E).
الماعز الذكر والانثى ج. معز ومعز ومعز . ويقال
للذكر تيس والانثى من . والماعز حيوان مجر داجن من
فصيلة الثننيات . انواعه عديدة تمت بلوات الشعر تميزاً
لها عن ذوات الصوف وهي الثمن . وهي تميز ايضاً بقصر
اذنابها وقوة قوائمها وصلابة اظفارها التي تمكها من تسلق
الصخور . انثاها اصفر قدماً من ذكورها . ضرورها ثنائية
الحلف . يحلبها يدرم ١٥٤ يوماً تقص عند تمامه من جدي
الى ثلاثة جداء . والماعز يربي لحلبه وشره . اشهر
انواعه ما يتبع .

٢٥٤١٥ - **مَاصِر النَّبَت**
Chèvre de Thibet (F).
Tibetan goat (E).
نوع من الماعز الموصوف بشعره الناعم الالبه لكنه يأتي
بهد الكشمير من حيث الجودة .

الحيدة بالاسود . اما طرف الريش فأبيض || يأنف
والشطوط ويجاري الماء والاذخال ، قوته الاسماك والظاه
والزرع والفار والحشرات والحيات || انشاء قصع من
٣ الى ٥ يعضات تقصها وسحاً نحو ٣ اسابيع .

٢٥٣٩٥ - **مَازُونِيَّات**
Dacéloniens (F).
عمارة طير من القرليات تشمل المازور والقيش والقيش
والهول . اصنامها البلاد الاسورية والاغريقية وجزر
اقيانية || طيورها تتميز بمناخها المستمرة القاعدة ،
الحيرة الصفحة السفلى ، اللدية المنطق . ريشها متوسط
الكثافة ، اثارها مختلفة الزجاء واللمسة || تألف الاجراع
والناتق والشطوط البحرية ويجاري الماء . قوتها الديدان
والحشرات والقشريات والاسماك . تدفن في تجاويف سطوح
واغصان الاشجار اليابسة .

٢٥٣٩٦ - **مَاس**
Diamant (F). Diamond (E).
هو السامور للشطوط سموت صفحاته بالنحت .

٢٥٣٩٧ - **مَاسِج**
Arpenteur (F). Land-surveyor (E).
الماسح والمساح والأرقي هو الذي يمسح الارض فيرسمها
ويقسم طولها وعرضها الخ .

٢٥٣٩٨ - **مَاسِكَة**
Jonchals, Jonchère, Joncherats (F).
Bed or plantation of rushes (E).
مقطع وما اشبه كثرة في الأصل .

٢٥٣٩٩ - **مَاش**
ماش المطر الاض : سمها فهو مطر مثيش .

٢٥٤٠٠ - **مَاش ، كَشْرِي**
Phaseolus mungo, Ph. radistius (S). Haricot d'Angola,
H. mungo (F). Green gram, Black gram (E). Mungo-
bohne, Schwarzerbohne (D). Fagiolo a zigzag (I).
نبات عشبي زراعي حولي من الفاصوليات وفصيلة القرنيات
الفراسية . زراعه منتشرة في جميع بلاد الشرق . ساقه فروع
قائمة . اوراقه متفكة مركبة ثلاثية . وريقاتها بيضيه
التصل المتصلب المنحني المقع . ازهاره خضيه التجميع ،
زنادية الارتكاز ، صفير اللون ، غصير اللج . ثماره
قرون اسطوانية ضيقة مستطيلة . بزوره كروية الشكل
سمراء اللون او خضراء مائلة بالاسود . تحوي من العناصر
الغذائية ما قدره :

٢٣,٨٠ ٪ من المواد الازوية

١,٤٦ ٪ من المواد النعنية

٦,٢١٥ ٪ من المواد النشوية

زراعه مروية يبلر عادة على صقير الحنطة بعد تريس
المزدرد وسره . يدار الذئب يراوح من ١٣ الى ١٥ كيلو
واتاجه من ٩٠ الى ١٢٠ كيلو .

٢٥٤٠١ - **مَاش شَرِي**
Dolic de Chine (F).
هو الذئب الصيني ، اطلبه .

٢٥٤٠٢ - **مَاشُونِيَّات**
Mandibulats (F).
نفة من المفصليات تشمل الحيوانات المهزة بتأثير وزياتي .
اشهر صفاتها القشريات والرخساعات والحشرات .

٢٥٤٠٣ - **مَاشُونُط**
Chelmatoble (F).
حشرة مؤذية تنمي ارضية الشتاء ، اطلها .



مازور جبار



ماش



ماعز التوبة



ماعز انقرة



ماعز سوري



ماعز كشمير



ماكك الغات



ماكك بولون



ماكك ريس

وبرية التجميع . وريقتها لا تقياسه المد الذي يراوح من ١٩ إلى ٢٩ ، تصلها اعليجل الشكل ، ماس الصفحة العليا خلي السفلي . اترارها متقوس التجميع . اترارها صغيرة لينة بيضاء اللون خضراء اللونج || توبرها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٥٤٢٦ - ماكك (S).

Macaque (F). Macaco, Macaques (E). Makaken (D). جسمه قروي ذئالة من فصيلة القهريرات . اترارها ١٩ ، موطنها مختلف المناطق الاسوية . اجسامها متوسطة او صغيرة القد . اعطاطها بارزة اعشارها وسية . قوتها قوية . اباها طويلة . اذناها لا تقياس . اترارها تختلف مع الانواع || تعيش جهات متوسطة او كبيرة المد . تألف الاجراج والحضاب الصخرية والشلوط . قوتها التار والحوب والخرشات واللح والغذاء والصفاد || انماها جبراً واحداً يبلغ كامل نشاطه بمره سنوات .

٢٥٤٢٧ - ماكك التيت (S).

Macacus thibetanus (F). Macaque du Thibet (E). موطنه ارجاع التيت الشرقية وششورية . جسمه متوسط القد ، ريش القوام بطول نحو ٧٥ سم . وذنبه ١٥ سم . ثوبه خلي الشعر المستطيل ، لونه الى الكهية السوداء تروى عند البطن وتبقى عند الظهر || يعيش جهات كبيرة تند من ٦٠ الى ١٢٠

٢٥٤٢٨ - ماكك الغات (S).

Macacus silenus (S). Quanderoo (F). Wanderoo (E). موطنه تها ميلبار والغات . جسمه بطول نحو ٧٥ سم . وذنبه ٢٧ سم . ثوبه اسود اللون ، خلي الشعر المستطيل . حار ويجه افرق الجهة ، ابيض اللون || تألف الغابات الكثيفة الابالية ، جهات تتألف من ذكر ونس او ست اناث ويبيض الصغار .

٢٥٤٢٩ - ماكك بولون (S).

Macacus cynomolgus (S). Macaque de Buffon, M. crabier (F). موطنه منلق وادغال الهند الصينية . يكثر قرب مصبات الانهر . يتسلق الاشجار ويسبح ويغوص || جسمه بطول نحو ٨٦ سم . وذنبه ٤٨ سم . ثوبه ينحرف من الخطي للهب الى الاكعب الاسمر . حار ويجه لغير البياض . جهات قليلة المد تتألف من ذكر ونس اناث ويبيض الصغار .

٢٥٤٣٠ - ماكك ريس (S).

Macacus rhesus (S). Macaque rhesus, Rhesus (F). Rhesus (E). موطنه فسح الارباء بجته من الهند الى اناام والصين ، جسمه متوسط القد ، مغموري الشكل ، كلف الشعر ، بطول نحو ٥٦ سم . ويرتفع نحو ٤٥ سم . ثوبه الى الكهية الصفراء ينحرف الى الجلاوة مع اقترابه من فوج الظهر . ويجه واذاء الى البصرة الصفاء . ذنبه بطول نحو ٢٥ سم . قوته التار والحوب والحشرات على اختلافها يتسلق الاشجار ويسبح ويغوص || يعيش جهات كبيرة المد .

٢٥٤٣١ - ماكك شائع (S).

Macacus sinicus (S). Macaque commun, Bonnet chinols (F). Bonnet macaque (E). موطنه مناطق الهند الجنوبية حتى يمي . تألف الغابات الكثيفة ويغزو الحقول والمزارع والمساكن . طوله نحو

٢٥٤٣٢ - ماعز النوبة * ، ماعز الحبيطة

Chèvre de Nubie (F). Nubian goat (E).

نوع من الماعز الافريقي . اجسامه كبيرة القد تملو من ٦٠ الى ٦٥ سم . يتيز بوبره اجم المفلطحة العادة للحي ويقصبه انه الخدوية ويقصر شعره . الاثني جيدة الدرة ، ضرها متوسط الحجم . مجموع درها اخلوي يراوح من ٢٥٠ الى ٤٥٠ ليتر .

٢٥٤٣٧ - ماعز انقرة * ، ماعز

Chèvre d'Angora (F). Angora goat (E).

نوع من الماعز المشهور باستمالة شعره الابيض الناعم . منه غرب اسود الرأس والعتق ، غث اللحية موصوف بؤرة شعره الناعم .

٢٥٤٣٨ - ماعز سوري *

Chèvre de Syrie, Ch. mambrine (F). Syrian goat (E). نوع من الماعز موطنه جهال لبنان وسورية . جسمه يملو من ٦٠ الى ٧٠ سم . يفر افعل الرأس ، اكث اللحية ، كثير الاذن للتدلية الفارسة . الاثني جاء افراس كبيرة الفهر . متوسط مجموع درها الموي يراوح من ٤٠٠ الى ٥٠٠ ليتر .

٢٥٤٣٩ - ماعز كشمير *

Chèvre de Cachemire (F). Cashmirian goat (E).

نوع من الماعز الموصوف بشعره الناعم الحريري اللعاج . يكثر في بلاد كشمير حيث يستعملون شعره .

٢٥٤٤٠ - ماعز

Miauler (F). To mew (E).

ماع السنور : ماع وعا .

٢٥٤٤١ - ماعل

Polycarpique (F). Polycarpic (E).

ماعل م . ماعلة نمت تعريفي يطلق على كل ليات ممر يهر ويهر اكثر من مرة في اخلو .

٢٥٤٤٢ - ماعطوط

Vermicide (F).

هو كل مادة تستعمل للقضاء على البهتان .

٢٥٤٤٣ - ماع قبل الحيموان

Protérozoïque (F).

Proterozoic (E).

اسم يطلق على الحقبة الثالثة من اياج ما قبل الكمبري ؛ ذلك لان آثار المتحجرات والافاير المكتشفة حتى الآن ، بالاضافة الى المداير الجيولوجية المعروفة ، تنفي وجود حياة حيوانية حتى اواخر هذه الحقبة .

٢٥٤٤٤ - ماع قبل الكمبري

Précambrien (F).

Precambrian (E).

اسم يطلق على الاباج البدائي من تاريخ تكوين صفور الارض . وهذا الاباج الطويل الامد ، الذي تم فيه تنفيذ الصخور ، والذي يمثل خسة اساس هر الارض ، يقسم الى ثلاث حقبة : حقبة التكوين ثم الحقبة السحيقة ثم حقبة ما قبل الحيوان . راجع حياة .

٢٥٤٤٥ - ماعية

Mackia (S). Mackie (F).

نبات معقود التصريف على اسم البراني الروسي « ماك » (١٨٢٧-١٨٨٦) وهي شجرة برية وحدائقية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة القرنيات . ساقها تملو من ٥ الى ١٥ م . خشبها صلب التمدد اسمر اللون . اوراقها عابلة ، مركبة ،

Rouleau (F). Roll (E).

٢٥٤٤٢ - **مَالِي**
للماني والملقية: محدة اسطوانية تستعمل في حذل التربة
أو تلميحها. راجع ملاءة.

Propriétaire (F).

Proprietor, Owner, Holder (E).

٢٥٤٤٣ - **مَالِك**

هو الذي له حق الملكية.

Héron (F). Heron (E).

٢٥٤٤٤ - **مَالِك الحزين**

هو البيلشون، اطلبه.

Courtillière (F). Mole-cricket (E).

٢٥٤٤٥ - **مَالُوش**

حشرة مذيبة تدمي الحالموش والمعنجوس، اطلبه.

Mammoth

٢٥٤٤٦ - **مَامُوث**

هو الصناجة، اطلها.

Glaucium (S).

٢٥٤٤٧ - **مَامِيكًا ء مَمِيكًا**

Glaucia, Glaucière (F).

جنس نباتات عشبية من فصيلة الخشخاشيات. أزهاره
قليلة منها الحولية والمصرة، أوراقها حاشنة، متعاقبة،
كبيرة القند مقشرة. ازهارها كبيرة الحجم، فردية التجميع.
ثمارها حطية. بزورها دهنية يستخرج منها مادة زيتية
عادمة الحوامض تستعمل في الطب كزيت الخشخاش.
وهو ينفع من البسمة والروطبات واسترخاء الجفن وضعف
البصر كسلا، والاورام والمفاصل الحادة طلاء ويقطع
الدم والاسهال مطلقاً، وحمه يسمن جداً وهو يضر السلحال
ويصلحه اللوز.

٢٥٤٤٨ - **مَامِيكًا حَمَرَاء * ء حَمَشَاش فينيجي**

Glaucium corniculatum (S). Glaucis cornus, G. à
fleurs rouges. Glaucienne (F). Red horned poppy
(E). Roter Hornmohn (D). Papavero cornuto picco-
lo (I).

نوع من الماميشا الحولية ساقها حليلة للحاء تملحو ٥٠ سم.
ازهارها حمراء اللون، كبيرة القند، قطرها نحو ٥ سم.
ثمارها مبشرة الخسف، حطية الشكل، تطلو من ١٠ إلى
٢٠ سم. || زرع قنزين ولاستخراج الزيت من بزورها.
ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

٢٥٤٤٩ - **مَامِيكًا حَمَرَاء * ء حَمَشَاش مَسْرَن**

Glaucium flavum (S). Glaucis jaune, G. à fleurs jaunes.
Pavot cornu (F). Sea poppy, Yellow horned
poppy (E). Galber hornmohn (D). Papavero cornuto
giallo, P. marino, Parallo (I).

نوع من الماميشا الحولية. ساقها مرطاة تملو من ٥٠ إلى
١٠٠ سم. ازهارها الى الصفار اللهب. قطرها يراوح من
٩ إلى ٨ سم. سقها مقوس الشكل يطول من ١٥ إلى
٣٠ سم. || ترطب في السواحل الرملية. زرع قنزين
ولاستخراج الزيت من بزورها || ازهارها يستمر من
حزيران الى آب || والماميشا الصفراء شديدة الرائحة والمرارة،
قابضة، كانت تستعمل في الاكحال، ويصير زهرها قطرة
للبثور.

Curcuma (F).

٢٥٤٥٠ - **مَامِيرَاك**

اطلب كركم صباغي.

Renoncula ficarofide (F).

٢٥٤٥١ - **مَامِيرَاك صَغِير**

هو الخيوان النثي، اطلبه.

٢٥٤٥٢ - **مَكَن** هو القرحمان، اطلبه.

٥٠ سم. وذنبه ٥٥ سم. ثوبه الى الكهبة الخضراء يطولها موج
اسمر. وبهية وذئنا وبيداء الى السمرة العابقة || جماعته
تعد من ١٢ الى ٥٠.

٢٥٤٣٢ - **مَآكَاك مَهْمُون ***

Macac pilatus (S).

Macaque couronné (F).

موطنه جزيرة سرنديب. يألف الغابات الكثيفة وينزو
الحقول والحدائق. جسمه ربع الوجة. طوله نحو ٥٠ سم.
وذنبه ٥٥ سم. ثوبه الى الصبغة الصفانية. بطنه وباطن
قوائم الى البياض الاخير. حمار جبهته منقصب الشعر،
تأسي الشكل. جماعته تعد من ١٠ الى ٢٥.

٢٥٤٣٣ - **مَآكَاك مَهْمُون ***

Macac nemestrinus (S). Macaque malmou, Singe-

cochon (F). Pig tailed macaque (E).

موطنه برمايه وبلق وبيزو الزايج. جسمه يطول نحو
٤٦ سم. ويرتفع ٤٠ سم. رأسه مخروطي الشكل، مستطيل
العلم. قوائم قوية وعظيمة، ذنبه مقوس يطول نحو
١٨ سم. ثوبه الى السمرة يعق مع اقترابه من ثوب الظفر.

Comestible (F).

Edible, Estable (E).

٢٥٤٣٤ - **مَآكُول**

هو الصالح للأكل.

Ovidide

٢٥٤٣٥ - **مَآكُون**
الماكون هو كل دواء يقضي فصل مكن الحشرات،
ج. موكين.

Aristotelia macou (S).

Maqui de Chili (F).

٢٥٤٣٦ - **مَآكِي**

نوع من الاريسوتلية، جنسية زراعية من فصيلة
الترنوفيات. ساقها منقبة تملو نحو ثلاثة امتار.
انتفاخا حر الجاه. اوراقها ابيدة، متعاقبة، بيضيه
التصال اللامعة المسننة الخفاف، تطلو من ٦ الى ١٢ سم.
وتمرض من ٣ الى ٦ سم. ازهارها منفردية التجميع،
محوري الارتكاز. ازهارها صغيرة، بيضاء اللون. ثمارها
عنبية ابيضانية اللون مأكولة تعتبر من المربوطات الناعمة.

Machine (F).

Machine, Engine (E).

٢٥٤٣٧ - **مَآكِيكَة**

كل جهاز آلي هذه الاقتصاد يدعى ماكينة. لذلك
فالمكينات كثيرة الممد اشهرها الصناعية والكهربائية والزراعية
والتجارية.

Blens (F). Weals (E).

٢٥٤٣٨ - **مَال**
المال ما يملكه من جميع الاشياء. يقال هو المال وبني
المال. قال الشاعر:

والمال تلدي بقلوم ذوي حسب

Malsto

٢٥٤٣٩ - **مَالَات**

ملح حفص التلحاح.

Maltine (F).

٢٥٤٤٠ - **مَالْتِين**

هي الملتين، اطلها.

٢٥٤٤١ - **مَآكَاك ***

Biocnosa (F). Biocnosa (E).

منج سلكي تتبعه بعض الحشرات في كامل دورتها
الحياتية او في جزء منها.



ماكك شائع



ماكك متوج



ماكك ميسون



ماميشا حمراء



ماميشا صفراء



مانور بيلور

وغاباتها || تتميز بحمال رفال اذئاب الذكور وبقلة الطيران وبسرعة النمو . سوقها محدلة الارتفاع . اصابعها نشيطة . غالبا جالسة || اعرف اجناسها واشهرها المانور والعرلون .

Mahagon (F). **مَاهُون** ٢٥٤٦٠
هو الاكاجو ، اطلبه .

Mahonia (S). **مَاهُونِيَه** ٢٥٤٦١
Mahonia, Mahonie (F). Mahonia (E).
جنس نباتات جنينية معمرة من فصيلة البرباريسيات . انواعها حليقة معظما بري وبعضها زراعي وتربسي . اولها ابيدة مركبة . وريقاتها زرية الحد ، مشارية الحافة . ازهارها حنقوية التجميع ، صفراء اللون ، مستحبة العرف . ثمارها نوية الشكل ، باذنجالية اللون ، مأكولة وترب || احرف انواعها واشهرها ما لي .

Mahonia aquifolium (S). Mahonia à feuilles de houx (F). **مَاهُونِيَه بَهْجِيَه الْوَرَق** ٢٥٤٦٢
جنبة سرويتية تملو من ٧٥ إلى ٣٠٠ سم . وريقاتها اوراقها بحية الشكل تده من ٣ الى ٩ ، نصلها ضيق المسفحة الالامة المستطيلة . ازهارها الى الصفرة الموشة بالاحر . حنقيتها الزهرية تطول من ٨ الى ١٠ سم . || ازهارها يستمر طوال شهر اذار .

Mahonia pinnata, M. fascicularis (S). Mahonia fasciculé (F). **مَاهُونِيَه حَزْمِيَه** ٢٥٤٦٣
جنبة سرويتية رفراء تملو من ٢٥٠ الى ٣٥٠ سم . وريقاتها اوراقها تده من ٧ الى ١٣ ، نصلها ضيق الشكل ، جامد التسنين الثالث . حنقيتها الزهرية كهيئة التجميع تطول نحو ٨ سم . ازهارها صغيرة القند صفراء اللون || ازهارها يستمر طوال شهر ايار .

Mahonia nervosa (S). Mahonia nervé (F). **مَاهُونِيَه رُبَاكِيَه الْعَرُوق** ٢٥٤٦٤
بجلة سرويتية مشفوة تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم . وريقاتها اوراقها تده من ٩ الى ١٧ ، نصلها باهت اخضر رايحي العروق البارزة . حنقيتها الزهرية تطول من ١٠ الى ٢٠ سم . ازهارها الى الصفار الكبيرتي || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

Mahonia repens (S). **مَاهُونِيَه مَدَادَكَة** ٢٥٤٦٥
Mahonia rampant (F).
بجلة ركوبية ممدادة تطول من ٣٠ الى ٥٠ سم . وريقاتها اوراقها تده من ٣ الى ٧ ، نصلها ضيق الشكل ، مطعوم القاعدية ، بحري الصفحة الممادة الالامة . ازهارها الى الصفرة السوية || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

Mahonia nepalensis (S). Mahonia du Népal (F). **مَاهُونِيَه نَبَالِيَه** ٢٥٤٦٦
جنبة سرويتية شائعة تملو من ٣ الى ٥ امتار . وريقاتها اوراقها تده من ١١ الى ٢٥ ، نصلها ضيق المسفحة ، جميل الخضار الالام . حنقيتها الزهرية تطول نحو ٣٠ سم . ازهارها كبيرة القند بجلة الصفار اللهب || ازهارها يستمر طوال فصل الربيع .

Pangolin (F). **مَاهُونِس** ٢٥٤٥٣
جنس حيوانات لبونة من القرد . اسمها الشائع ام قرقة . اما مائس فهو ترجمة الاسم العلمي .

Fore (F). **مَانَع** ٢٥٤٥٤
نمت تعريبي يطلق على كل تبغ يتحل بسورة مماننة مركزها التعريبي دون العالفة ولفق الناطقة .

Empêchement (F). Hindrance (E). **مَانَع** ٢٥٤٥٥
مائق يحول دون اتمام عمل ما كاتزواج مثلا وذلك لانعدام إحدى الشرائط القانونية المطلوبة . ولما لم قد يكون :

Empêchement prohibitif (F). مانع حائل
Prohibitive hindrance (E).

Empêchement dirimant (F). مانع لافسخ
Invalidating impediment (E).

Menura (S). **مَانُور** ٢٥٤٥٦
Menure, Oiseau-lyre (F). Menura, lyre-bird (E).
جنس طير من فصيلة المانوريات . انواعها المعروفة لثلاثة ، اصطناعها بلاد استرالية حيث تألف المراج والغابات || اجسامها متوسطة القند . مناقيدها قوية ، قليلة الاحديداد والتسني . اجنحتها قصيرة . اولها متوسطة الطول حليقة البشرة . ازفادها جرداء || ذكورها كبيرة الاذنان القشازية الشكل . اناثها مدمعة الزينة .
اما انواعها الثلاثة المعروفة فهي :

Manura Alberti (S). مانور آلبرتي
Menura Victorioe (S). مانور لكتوريا
Manura superba (S). مانور مبلول
نحس منها بالوصف المانور المبلول ، اطلبه .

٢٥٤٥٧ - **مَانُور مَبْلُولٌ** ، **مَانُور أَلْبِق** ، **طَائِر الْفَيْشَارَكَة الْأَلْبِق**
Menura superba (S). Ménure commun, M. superbe, Oiseau-lyre superbe (F).

نوع من المانور . مهد اجراج استرالية . جسم الذكر يطول نحو ٤٥ سم . وذنبه ٦٠ سم . جسم الانثى ، بما فيه الذنب ، لا يتجاوز ٩٠ سم . || ثوبه الى الزبدية الخطية العابقة . اثنيك جقوري المراج . زوون احمر . يطه الى الزبدية القرمادية . قوادمه واباهه وسناكه الى السرة الخطية الحمراء المراج . ذنبه قيثاري الشكل لونه الى السرة الخطية الهيدة بالزبدية الغضبية . ثوب الانثى داكن الالوان القليلة الزهاء || يألف الاجراج التي تتخللها الصغور والاراضي الملائحة . يردد جميع اصوات الطير والحيوان ونسبا البهائم والنباح || قوته الحشرات والديدان يلتغها ايما كانت وفي الجلالة التراكمة || يذئن عصف في الادغال او في الاجراج المكدنة الشائنة على اسمع الادوية . حشنته يفض واحدة ترخها الانثى دون الذكر الذي يؤن لها البناء .

Blade (F). **مَانُورِي** ٢٥٤٥٨
سمكة بحرية تسمى حنجلة ، اطلبها .

Menuridae (S). **مَانُورِيَات** ٢٥٤٥٩
Ménuridae (F). Menuridae (E).

فصيلة طير من الجراجم لاقتات التل وريقات المنقير . اجناسها وانواعها قليلة الحد . اصطناعها جبال استرالية



ماهوتيه

- Râperie (F). **مَبْرَشَة** ٢٥٤٨٤
معمل لبرش الجلود وتقليمها أو سحقها .
- Orangerie (F). **مَبْرَكَة** ٢٥٤٨٥
Orangery (E). هي بستان البرتقال .
- Sardine (petite) (F). **مَبْرُوم** ٢٥٤٨٦
Pilchard (small) (E). المبروم السردين الصغير لا يتجاوز طوله ٥ سم .
- Porte-graines (F). **مَبْرَرَة ، مَبْرَرِيَّة** ٢٥٤٨٧
هي البجزة ما يزرع من البقول ويغطف النباتات العشبية للحصول على بزرودها . ج. مبررات و بزارى .
- ٢٥٤٨٨ - **مَبْرُوطَة**
المبرطة أو القدم المبرطوة نجم ثمر من كوكبة برج الثورين
مركزة على الركبة اليسرى من الثورام المتقدم .
- Omnivore (F). **مَبْشَار** ٢٥٤٨٩
Omnivorous (E). نمت تعريفي يطلق على كل حيوان قوته اللحم والنبات .
- Racle (F). Scaper (E). **مَبْشَرَة** ٢٥٤٩٠
Oignonière (F). Onionbed (E). **مَبْشَلَة** ٢٥٤٩١
هي حقل البصل .
- Canardière (F). **مَبْط** ، **مَبْطَرِي** ٢٥٤٩٢
Duck-pond (E). غدير خص بالبطن أو غدير حوض لصيد البط البري .
- Melonnière (F). **مَبْطَحَة** ٢٥٤٩٣
المبطحة حقل لقيام .
- Culture de pastèque (F). **مَبْطَحَة** ٢٥٤٩٤
هي حقل البطيخ .
- Jardin potager (F). **مَبْطَلَة** ٢٥٤٩٥
Kitchen-garden (E). هي البستان المد لزرعة الخضار .
- Hâtil, Précoce (F). Early, Precocious, Forward (E). **مَبْكَار ، مَبْكَال ، مَبْكَور ، مَبْكَر** ٢٥٤٩٦
صفة النبات السريع النمو والقريب الإدراك .
- Drosomètre (F). **مَبْطَل** ٢٥٤٩٧
Drosometer (E). الميطل جهاز يستعمل في قياس ما يسقط من سدى وندى
في وقت معين ؛ غالباً من الغروب الى الشروق .
- Accrescent ٢٥٤٩٨ - **مَبْطَق**
لمت تعريفي يوصف به مختلف اعضاء الزهرة ، دون
المبيض ، التي تتابع نموها بعد الانحساب .
- Houssale (F). **مَبْهَنْكَة ، مَبْهَنْكَة** ٢٥٤٩٩
Holly-grove (E). منبت البهشية .
- Mabouya ponctué ٢٥٥٠٠ - **مَبُونِيَّة مُنْقَطَعَة**
هي الحكانة المنقطعة ، اطليا .
- Mahonia japonica (S). **مَاهُونِيَّة بَابَانِيَّة** ٢٥٤٩٧
Mahonia du Japon (F). جنبة سبروتية فرعاء تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . وريقات
اوراقها تمد من ٩ الى ١٩ ؛ فصلها غصق الصفحة ؛ ذرب
الزمام الاخضر ، يطول نحو ١٢ سم . عناقيدها الزهرية مستدلة
الكثافة تطول نحو ١٥ سم . ازهارها متوسطة القد جميلة
الصغار الزاهي . ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .
- Métaphysique (F). **مَاهُونِيَّة** ٢٥٤٩٨
Metaphysics (E). هي الميتافيزيك ، اطليا .
- Liquide (F). Liquid (E). **مَاهِي** ٢٥٤٩٩
Hydraulique (F). Hydraulic (E). **مَاهِي** ٢٥٤٧٠
Ruche (F). Hive (E). **مَاهِي** ٢٥٤٧١
للهاية ولكوكرة والتغير هي مأوى النحل .
- Guâpier (F). **مَاهِيَّة الزكابر** ٢٥٤٧٢
Wasp's nest (E). هي خلية الزنابير .
- ٢٥٤٧٣ - **مَاهِي** ، **مَاهِي**
Coéchangiste, Copermutant (F). Permutor (E). هو احد الطرفين في عقد الدبل أو المقايضة .
- Réciprocité (F). Reciprocity (E). **مَاهِيَّة** ٢٥٤٧٤
هي الاتفاق على موضوع معين .
- Concours (F). Concourse (E). **مَاهِيَّة** ٢٥٤٧٥
هو الاشتراك في عقد قانوني .
- ٢٥٤٧٦ - **مَاهِيَّات زراعية**
Concours agricoles (F). Cattle show (E). مسابقات تقويمها الحكومة او الجسيمات والتماريات الزراعية
توزع فيها الجوائز المالية والشهادات . وهي تتناول الحيوانات
والانتاج والمصنوعات والآلات الخ... النهاية منها تشجيع
الزراعة بساتن فرعيها وتشيطط المبودة والانتقان .
- ٢٥٤٧٧ - **مَاهِيَّة ، مَاهِيَّة** ، **مَاهِيَّة**
Cisailles (F). Shears, Clipper (E). مقص كبير يستعمل في جز الخضير وبتر الانثان الزائدة
في جنبات واجنار الزايرين .
- ٢٥٤٧٨ - **مَاهِيَّة** ٢٥٤٧٨
Evaporimètre (F). Evaporimeter (E). مقياس القوة البخيرة في الجو .
- ٢٥٤٧٩ - **مَاهِيَّة**
Convertible
- ٢٥٤٨٠ - **مَاهِيَّة**
Semoir (F). Seed-bag, Sowing-machine, Drill (E). آلة تستعمل في نثر البذار او الاسمدة .
- ٢٥٤٨١ - **مَاهِيَّة** ٢٥٤٨١
Cénolide (F). Czenolide (E). * . لمت تعريفي يطلق على الاجسام التي تملو اطرافها الطليقة
بعض الاحداثب الدربة الشائكة كما في بعض الاسماك .
- ٢٥٤٨٢ - **مَاهِيَّة** ، **مَاهِيَّة** ٢٥٤٨٢
Fulgurimètre (F). * . مقياس قوة الكهرباء الجوية .
- ٢٥٤٨٣ - **مَاهِيَّة** ٢٥٤٨٣
Râpe (F). Grater, Rasp (E). آلة تبرش الجلود المسقولة كالشوندر والجوز...



ميراث جرشفة الفرخ



مناع

Divergent ٢٥٥١٥ - مُتَبَاعِد ، مُتَبَاعِدِي قَبَاعِدِي ما كان مختلف الاتجاه .

Dissemblable (F). ٢٥٥١٦ - مُتَبَايِن Dissimilar (E).

Volatil (F). Volatile (E). ٢٥٥١٧ - مُتَبَيِّر

Fissuré (F). Cracked (E). ٢٥٥١٨ - مُتَبَدِّح

Dispersé (F). Scattered (E). ٢٥٥١٩ - مُتَبَشِّر

Toussière (F). ٢٥٥٢٠ - مُتَبَقَّة كل تربة تزرع تباً عدة سنوات متتالية . ج متابع . ولاي يتماثل زراعة التبغ باقى تباعاً .

Penil (F). Hayloft (E). ٢٥٥٢١ - مُتَبَقَّة ، مُتَبَقَّة فَيَان مبقية لحفظ الحشيش ولتبين .

٢٥٥٢٢ - مُتَبَايِنَسَة الأجنحة Homoptera (S). Homoptères (F). Homopters (E). رتبة حشرات من طبقة نعلليات الجناح . فصائلها وأنواعها عديدة مظهرها صغير اللد يجمع وبفسها عدم الجناح . تطورها تدريجي . اضماها ثالثة مامة مُتَبَايِن من ارتفاع التسع . أشهر فصائلها الأرتيات والحرايط والغفريرات والزيزيات ...

Pondre (F). ٢٥٥٢٣ - مُتَبَّح ، مُتَبَّح ، مُتَبَّح باهر To lay (E). يقال باهر الطير ورأ السلك ويتع الحشرات .

Endosmometre (F). ٢٥٥٢٤ - مُتَبَحَّل Endosmometer (E). مقياس التماسل أو التناقل .

Fossiles (F). Fossils (E). ٢٥٥٢٥ - مُتَبَحَّجَرَات هي الاساكير ، اطباها .

Homofocal ٢٥٥٢٦ - مُتَبَحَّد البؤرة

Monadelphie (F). ٢٥٥٢٧ - مُتَبَحَّد الخروفيات Monadelphous (E).

٢٥٥٢٨ - مُتَبَحَّد المراكز ، مُتَبَحَّد المراكز Concentrique (F). Concentric (E).

٢٥٥٢٩ - مُتَبَحَّدَة الفصائل ، مُتَبَحَّدَة الكاسيات Gamosepale (F). Gamosepalous (E). صفة ازهرة للتلصص الفصائل الكاسية .

٢٥٥٣٠ - مُتَبَحَّدَة السُّعَالَات ، مُتَبَحَّدَة التوتيمات ، مُتَبَحَّدَة التوتيمات Gamopétale (F). Gamopetalous (E). صفة ازهرة للتلصص السُّعَالَات اي التوتيمات والبلات .

٢٥٥٣١ - مُتَبَحَّل Reductible (F). Reducible (E). مكن تحليلة .

٢٥٥٣٢ - مُتَبَحَّض Acidifiable (F). لتت تريلي يعلق على كل مادة قابلة التعميض .

٢٥٥٠١ - مُبَقَّر Focometre (F). Focometer (E). جهاز يستعمل لتحديد المسافة البؤرية .

٢٥٥٠٢ - مُبَيِّنَة Cellier (F). Cellar, Store-room (E).

٢٥٥٠٣ - مُبَيِّن Diagramme (F). Diagram (E). هو البيان ، اطباها .

٢٥٥٠٤ - مُبَيَّد ، مُبَيَّت Léchifère (F). Lechiferous, Deadly (E). لتت تريلي يعلق على المصارات النباتية والادوية الحاشورية التي تقتفي على الحياة .

٢٥٥٠٥ - مُبَيِّن Ovaire (F). Ovary (E). المبيض في الحويان هو البصر الذي يتكون فيه البويضات او البويضات || والمبيض في النبات هو الجزء الاسفل للتفتيح من الملق ، يحوي من بويضة ال عدة بويضات ويصير ثمرة بعد الانغصاف .

٢٥٥٠٦ - مُبَاكَة Mûrserie, Mûrserie (F). Mulberry plantation (E). بستان الثوت .

٢٥٥٠٧ - مُبَاك Odometre (F). Odometer (E). آلة تقاس بها المسافة .

٢٥٥٠٨ - مُبَاك * ، وكريم Gynécée (F). Gynaeceum (E). هو مجموع اعضاء التأنيث في الزهرة وهو مؤلف من المبيض يطوره قلم انثوي ينتهي بالمقلقة .

٢٥٥٠٩ - مُبَاكَة هيد Métaaldéhyde (F). Metaldéhyde (E).

مادة كباوية لفاقة تستعمل في القضاء على جميع انواع الرضويات التي تركب المزروعات . تحضر بمعدل ٥ ٪ وليس اكثر مزوجة بالنخالة او بلشارة الخشب وتنتشر على التربة حيث الحزرون والبرايق ويترسها تقضي عليها جميعها .

٢٥٥١٠ - مُبَاك ما بين كل حويين .

٢٥٥١١ - مُبَاك ، مُبَاك Méthane (F). Marsh gas (E). غاز ملهب عدم اللون .

٢٥٥١٢ - مُبَاك * Phaneroptera falca (S). Phanéroptère (F).

حشرة من الجنادب ولصيلة القربويات . جسمها صغير اللد ، اخضر اللون ، اسمر النشفة والشفة ، يطول منه الذكور من ١٢ الى ١٥ سم . ويطول منه الاناث من ١٦ الى ١٨ سم . جناحها بطولان من ٢٥ الى ٢٣ سم . وساقها من ١٨ الى ٢٢ . مرز الانثى غليظ الحجم اسمين الشكل مبطط الطرف المستدق يطول منه ٥ الى ٦ سم . || انتاها تمتص السرة في حجار الارواق والمصنف داخل اللون فينتفح من دى نهمه ثرود حافة التصل قبل ان تتمكن من السير والتلق .

٢٥٥١٣ - مُبَاكَة Consistance (F). Consistence (E).

٢٥٥١٤ - مُبَاكَة Figuerie (F). الثانة كرم التين او المكان الذي تكثر فيه الجهار التين .



منان

انزعاجها المروقة قليلة المدد اعطائها بعض مناطق المحيط الهادي. تعيش على الصخور المنصورة قرب الشواطئ || اصداؤها شبه هرية الشكل وحيدة المصارع. سقاها اجسامها يتطور مع العمر ويصبح كالنفسوة. اجسامها مخروطية. وروسها شبه اسطوانية. ميزنها قاعدية. لراسها انبوبية قليلة الاستطالة. خياشيمها نظامية. ارجلها وحيدة مبطلة .

Isométrique (F). **مُتَسَاوِي الأبعاد**
Isometric (E).

Isotrope (F). **مُتَسَاوِي الاتجاه**
Isotropic (E).

Equilatéral (F). **مُتَسَاوِي الأضلاع**
Equilateral (E).

Equidistant **مُتَسَاوِي البُعد**

Equiangle, isogonex (F). **مُتَسَاوِي الزوايا**
Equiangular (E).

Isomorphe (F). **مُتَسَاوِي الشكل**
Isomorphic (E).

Isobare (F). **مُتَسَاوِي الضغط**
Isobaric (E).

Isocèle (F). **مُتَسَاوِي الضلعين**
Isosceles (E).

Isodynamique (F). **مُتَسَاوِي القوة**
Isodynamic (E).

Isopoda (S). **مُتَسَاوِيات الأرجل**
Isopodes (F). Isopods (E). Assein (D).

رتبة حيوانات من التقرينات .

Grimpeurs (F). **مُتَسَلِّكات**
Climbers (E).

رتبة من الجوسجيات طيورها صغيرة القد أو متوسطة تتميز بتسلقها الاشجار . فضائلها عديدة اشهرها البيسارات والبقايات والطرفونيات والطرقايات والتقرقيات والنقارات .

Grimpante (F). **مُتَسَلِّكة**
Climbing, Twining (E).

النباتات المتسلقة والمبارجة التي هي تتميز سوقها عن الانتصاب بدون عائل .

Accipiens **مُتَسَلِّم**
التمسك أو القايض هو من يقبض المفود عليه أو الملكية .

Homologue (F). Homologous (E). **مُتَسَاوِيَة ، مُتَسَاوِيَة ، مُتَسَاوِيَة**

Isomère (F). **مُتَسَاوِيَة الأجزاء**
Isomeric (E).

Isotope (F). **مُتَسَاوِيَة الخواص**
Isotopic (E).

Démagogue (F). **مُتَقَرِّص**
Demagogus (E).

المُتَقَرِّص من يتظاهر بجماعة الشعب لاسمائه اليه .

Lézardé (F). **مُتَشَقِّق ، مُتَشَقِّق**
Cracked (E).

Converti (F). Converted (E). **مُتَحَوَّل**

2٥٥٣٤ - **مُتَح**
متح الجراد : اذا رز ذنبه وفرغه ليبيض .

Hibernant (F). Hibernating (E). **مُتَحَدِّر**
صفة الحيوان الذي يبيت زمن الشتاء متحدرًا باستمرار النوم .

Casométopes (F). **مُتَحَكِّيات**
Catometopa (E).

لة من التقرينات عشاريات الارجل تنتمي الى مرتبة قصار الليل || اجناسها وانواعها المروقة قليلة المدد . اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة القد أو متوسطة . تتميز بدورها شبه المربعة والقليلة الاحدياب .

Intercalaire (F). Intercalary (E). **مُتَحَلِّل**
صفة الاشياء المتخللة . راجع بيني .

Interlobaire (F). **مُتَحَلِّل الفصوص**
Interlobular (E).

Adaptation **مُتَّكِد**
هو الالتا والازااب .

Mètre (F). Mètre (E). **مِقْر**
وحدة قياسية وضمتها الثورة الفرنسية وقد شاع استعمالها الآن في جميع اقطار العالم باستثناء البلاد الانكليزية والامريكية || يعتبر طول المتر مساويًا لجزء واحد من العشرة ملايين جزء التي تولدت زام الحاضرة أو المسافة بين القطب وسط الاستواء || اجزاء المتر هي السيمتر اي عشر المتر ، والسنتيمتر اي جزء من مئة ، والمليمتر اي جزء من الف . اما مضامطات للمتر فهي الديكاسمتر اي عشرة امتار واليكسومتر اي مائة متر والكيلومتر اي الف متر .

Métrier (F). To measure (E). **مِقْر**
قاس بالمتر .

Centiare, Mètre carré (F). **مِقْر مربع**
Hundredth part of an are (E).

وحدة مساحة تقاسها الطولي والعرضي متر واحد .

Mètre cube (F). **مِقْر مكعب**
Cubic meter (E).

وحدة حجمية تقاسها الطولي والعرضي والارتفاعي متر واحد .

2٥٥٤٤ - **مِقْرَاح**
نمت تعريبي يطلق على كل حلوب من بقرة ونسجة ومنز وناقة ينظم دها بصره . تقول بقرة متراح . ج مترايح .

Conjugué (F). **مِقْرَاقِي ، مِقْرَاقِي**
Conjugata (E).

2٥٥٤٦ - **مِقْرَاقَات الأَسنان**
Opotérodontes, Typhloplédes (F). Typhloplédes (E).
مرتبة من الحيات تكوّن أسنانها إما في الفك الاعلى أو في الفك الاسفل .

2٥٥٤٧ - **مِقْرَاقَة**
Mitularia (S).

Mitralaire (F). Mitularia (E).
جنس حيوانات بحرية من الرعويات مميزات الارجل اماميات الخياشيم وحيوانات الاجهزة وعضلية الهيكلية .



مِرْة

٢٥٥٦٦ - مُصَرَّف (F). Sector (E). ٢٥٥٨٢ - مُتَلَف

هو من يُلْقِ الثبر تبرًا سواء جبة في حياته أم بوصية بعد موته .
الثلث كوكبة نجوم جنوبية الموضع مشهورة باسم باطية ،
اطلبها .

٢٥٥٦٧ - مُتَصَلَّب ، عَيْن ٥ Scierophyta (F).
Multicolore (F). Multicolour (E). ٢٥٥٨٣ - مُتَوَلَّن
Sclerophyta (E).
كثير الألوان المختلفة .

٢٥٥٨٤ - مُتَآبِل (F). Amétabole, Homomorphe ٢٥٥٨٥ - مُتَآبِل الأجزاء

نمت تعريفى يطلق على علمي الحيوان والنبات على الإصماء
أو الأجزاء المتشابهة الشكل .
نمت تعريفى توصف به الأجزاء المتآكلة في كامل الجسم
أو في قسم منه .

٢٥٥٨٦ - مُتَآبِل الأصابع Homopode (F). ٢٥٥٨٦ - مُتَعَارَف

نمت تعريفى يطلق على كل حيوان أصابعه متآكلة المند
في فوائده الأربع .
نمت تعريفى يطلق على كل حيوان أصابعه متآكلة المند
في فوائده الأربع .

٢٥٥٨٧ - مُتَمَآلِلَات الأَسنان ٥ ٢٥٥٨٧ - مُتَعَهَّد

Denticates, Odontocetes (F). ٢٥٥٨٧ - مُتَعَهَّد
مرقبة حيوانات بحرية لبونة من رتبة الحويطات تشمل
الحيئات من ذوات الأسنان المتآكلة غير قابلة التجديد ||
أجناسها المعروفة ٢٤ تنحصر أربع فصائل : الجبلديات
والدلتينيات والتمبريات والقرقيات .

٢٥٥٨٨ - مُتَمَكِّك ، مُنَدِّج Compact ٢٥٥٨٩ - مُتَمَمَّجَة ، حَزْرَوِيَّة

Spirille (F). ٢٥٥٨٩ - مُتَمَمَّجَة ، حَزْرَوِيَّة
Spirillum (E).
نمت تعريفى شامل يطلق على البكتيريا والميكروبات
الخليوية الشكل من أي نوع كانت .

٢٥٥٩٠ - مُتَمَكِّب ٥ Tropicalis (F). ٢٥٥٩١ - مُتَن

نمت تعريفى يطلق على كل مادة صار أخطاها ال
المقلبة .
نمت تعريفى يطلق على كل مادة صار أخطاها ال
المقلبة .

٢٥٥٩٢ - مُتَن Châtrer (F). ٢٥٥٩٢ - مُتَن

To castrate, To geld (E). ٢٥٥٩٢ - مُتَن
من الحصان والثور والكبش والنعيس ... شق صلبًا
وأستخرج خصاهما .

٢٥٥٩٣ - مُتَنُ القَرَس ٥ ٢٥٥٩٤ - مُتَنَاسِب طَرْدًا

من القرس نجم ثير من كوكبة نجوم القوس الاعظم .
Directement proportionnel (F). Proportional directly (E).

٢٥٥٩٥ - مُتَنَاسِب عَكْسًا ٥ ٢٥٥٩٥ - مُتَنَاسِب طَرْدًا

Inversement proportionnel (F). Proportional inversely (E).

٢٥٥٩٦ - مُتَنَاسِب عَكْسًا ٥ ٢٥٥٩٦ - مُتَنَاسِب طَرْدًا

من القرس نجم ثير من كوكبة نجوم القوس الاعظم .
Directement proportionnel (F). Proportional directly (E).

٢٥٥٩٧ - مُتَنَاسِب عَكْسًا ٥ ٢٥٥٩٧ - مُتَنَاسِب طَرْدًا

Inversement proportionnel (F). Proportional inversely (E).

٢٥٥٩٨ - مُتَنَاسِب طَرْدًا ٥ ٢٥٥٩٨ - مُتَنَاسِب طَرْدًا

Directement proportionnel (F). Proportional directly (E).

٢٥٥٩٩ - مُتَنَاسِب طَرْدًا ٥ ٢٥٥٩٩ - مُتَنَاسِب طَرْدًا

Inversement proportionnel (F). Proportional inversely (E).



متك



متك

دون سولها . تكثر في تجاويف الاشجار . اناتها تبيض مرتين في العام، المرة الاولى في اواخر اذار والثانية في اواسط حزيران . ذكروها تقتناب مع اناتها في حضان البيض الذي يستمر نحو اسبوعين .

٢٥٦١١ - متوتل الغاب * *Certhia familiaris* (S). *Grimpeur des bois* (F). *Tree-Creeper* (E).

طائر من الطغلات . اطائه تشمل الشرق الادنى واروبه . يأنف المناطق الجبلية واصحابها اخرج الثوب والشرين || جسمه صغير القد بطول نحو ١٤ سم . يستطع نحو ١٩ سم . ثوبه متداخل الالوان . راسه ورديا وظفيره وصبره الى الشقعة السمره تعلوها رقعة بيضاء . جناحاه بجلدان بالابيض . زوره وصدره وبعته الى البياض العاجي فتشبه شحمة قيراء . ذنبه متوسط الطول زناجي الريش ، اسمر اللون ، اشتمق المواج . متفاده بين الاحديداد اسمر اللون . رساء قصيراتان حطيتان . غنائه هجينة ، حادة الاطراف ، سرياء اللون || يأنف معظم اخرج الجربور . يتسلق ساق الشجرة حتى القنة ويرتبي منها الى الارض ثم يتسلق فيها متقبيا عن الحشرات ويرقاتها ويكبتها . طيرانه قصير القوط وانتقاله على الارض عرقصة خرقاء || يلدن منه في تجاويف الاشجار . الاثني تبيض مرتين في الدم الاول في اواخر اذار والثانية في اواسط حزيران . الذكر يتنارب الاثني في حضان البيض الذي يستمر نحو اسبوعين . يبيضها حاجي اللون تعلو رقعة جلوية تتكاثف عند العقب || قوته الحشرات ويرقاتها ويكبتها لذلك فهو من الطيور الجزيلة النفع .

٢٥٦١٢ - متوتلات * *Certhidae* (S). *Certhidés* (F). *Certhidae* (E).

فصيلة طير من الجواثم رقيات المناقير . اجناسها وانواعها عديدة جميعها من الطيور النافعة . قوتها الحشرات .

٢٥٦١٣ - متوتلي * *Métonien* (F). *Metonic* (E). *Metonic* (E). من متون (*Méton*) اسم سلم . تمت تعريفه يطلق على دورة فلكية مدتها ١٩ سنة ، تدعى الدورة المتوتلية ، يقع بعدها كل من ايام الاسابيع في التاريخ ذاته من الاشهر . والدورة المتوتلية تشمل ٢٣٥ هلة او شهر قري او ٦٩٣٩٧ يوما و ٧٠ ٪ من اليوم .

٢٥٦١٤ - متوتيسر * *Lévogyre* (F). *Lavogyrate* (E). *Lavogyrate* (E). ما كان سطح استقطابه متجها الى اليسار .

٢٥٦١٥ - متوتيسين * *Dextogyre* (F). *Dextogyre* (E). ما كان سطح استقطابه متجها الى اليمين .

٢٥٦١٦ - متوتيرة * *Muticla* (S). *Muticla* (F). *Muticla* (F). جسس نباتات جنينية مبررة عارضة من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة ٣٠ اصنافها بلاد امريكا الجنوبية . اوراقها متضاربة لا لقياسة التركيب منها البسيطة ومنها المركبة التي تلتبي بمحاوي دقيقة مستطيلة . وريقاتها شائعة متضاربة . ازهارها كبيرة القد متراكبة السيدات الثلاثية التسنين . بزورها مخروطية مسطيلة تلتبي بقتازع ريشية || اشهر انواعها التزيينية ما يقع .

٢٥٥٩٦ - متوتيرة * *Sapinière* (F). *Fir wood, Fir-grove* (E). مفرس تنوب او حرجية تنوب .

٢٥٥٩٧ - متوتيرج * *Récessif* (F). *Recessive* (E). تمت تعريفه يطلق على الصفات الوراثية المسددة .

٢٥٥٩٨ - متوتيرة * *Oryx belza* (F). هي الارغ الافريقي ، اطبل .

٢٥٥٩٩ - متوتيرج ، متوتيرج * *Hydrogéné* (F). *Hydrogenated* (E). مركب مع الهيدروجين او يحوي بعض الهيدروجين .

٢٥٦٠٠ - متوتير * *Inculpé* (F). *Defendant, Accused* (E). هو من وقع عليه الاتهام .

٢٥٦٠١ - متوتير ، متوتير * *Parallèle* (F). *Parallél* (E). متوازي ، متوازي .

٢٥٦٠٢ - متوتيركاري الحرركة * *Isotherme* (F). *Isotherm* (E). مطابقة درجة الحرارة في اماكن مختلفة .

٢٥٦٠٣ - متوتيركاري السطوح * *Parallépipède* (F). *Parallelepiped* (E). متوازي السطوح .

٢٥٦٠٤ - متوتيركاري المستطيلات * *Parallépipède rectangulaire* (F). *Rectangular parallelepiped* (E). متوازي السطوح المستطيلات .

٢٥٦٠٥ - متوتيركاري * *Progression* (F). *Progression arithmétique* (F). *Arithmetical progression* (E). وقد تكون متوالية حسابية .

٢٥٦٠٦ - متوتيركاري * *Progression géométrique* (F). *Geometrical progression* (E). او متوالية هندسية .

٢٥٦٠٦ - متوتيرة * *Matuta* (F). *Matuta* (E). جسس حوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل المهرمات وقصيلة الكوليبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة اصحابها شواطي البحر الاحمر والمحيط الهندي || اجسامها صغيرة القد رافضة الدروج المعقدة المهيمنة بسنين جاتين كيرين . ارجلها الخلفية والاسامية ملقحة الاطراف . ملاصقتها كبيرة ونشطة || غلوها كاتعة الصنف لا تتوكل .

٢٥٦٠٧ - متوتيرج ، متوتيرج * *Debt* (F). *Debit* (E). هو المطلوب من صاحب الحساب .

٢٥٦٠٨ - متوتيركاري الطول * *Médioligne* (F). تمت تعريفه توصف به بعض سلالات الخيول والطير كالغزل والابقار والاعشام والماعز والنعاج المتعددة الطول .

٢٥٦٠٩ - متوتيركاري * *Moyenne proportionnelle* (F). *Geometrical mean* (E). المتوسط التسي والمتوسط النساب والمتوسط التناسبي واحد .

٢٥٦١٠ - متوتير * *Certhia* (S). *Grimpeur des bois* (F). *Tree creeper* (E). جسس طير من فصيلة الطغلات . انواعه عديدة جميعها نافعة . يأنف المناطق الجبلية اصحابها الحرجية . قوتها الحشرات



levkoje Matthiole (D). Violsacclocco (I).

نوع من المِيزَة الأُرْبِيَّة. ضروبها عديدة، جميعها حولية أو حولية تملو من ٣٠ إلى ٨٠ سم. سوقها فرعاء. أوراقها بحرية اللون عناقيدها الزهرية كبيرة القند. ازهارها مكسبة مختلفة الألوان يكثر فيها الاحمر والبنفسجي. جميعها فواحة العرف المستحب || ازهارها يستمر طوال فصل الربيع.

٢٥٦٢٦ - مِيزَة مَسَاخِيْدَة. مَسَاخِيْدَة، هو القراش.

Emblavement, Emblavage (F). مِيزَة مِيزَة
Wheat-sowing (E).

هو الحقل وكل مزدوع سم وكرب ويلد وأثير.

Prototype مِيزَة مِيزَة
هو السب، الطبع.

Vessie (F). Bladder (E). مِيزَة مِيزَة
عضو رئيسي في الجهاز البولي. والثلاثة تتكون من جراب عضلي يستلبي البول ويصحه بعض الوقت.

Fixateur (F). مِيزَة مِيزَة
Fixing solution (E).

نمت تعريف يطلق على كل مادة تتميز بخاصة الثبات. ج. مثابت.

٢٥٦٣١ - مِيزَة مِيزَة، مِيزَة مِيزَة

Limnimètre, Limnomètre (F). Limnimeter (E).
جهاز يستعمل في تقدير اوضاع مستوى البحيرات والاهوار.

Mixtion مِيزَة مِيزَة
مِيزَة مِيزَة: خلطه.

Siphon مِيزَة مِيزَة، مِيزَة مِيزَة، مِيزَة مِيزَة

Siphonose (S). Siphonées (F). Siphonose (E).
فصيلة من الخفيات الحفر.

Tarière (F). Auger, Drill (E). مِيزَة مِيزَة
هي البريمة، أداة تستعمل لتقب.

٢٥٦٣٦ - مِيزَة مِيزَة

Trematoda (S). Trématodes (F). Trematoda (E).
صف من الديدان المريفات.

Trypanosoma (S). مِيزَة مِيزَة
Trypanosomes (F). Trypanosoma (E).

حيوانات دنيا طفيلية من الازالي السوطيات.

Orbicole (F). Orbicool (E). مِيزَة مِيزَة
نمت تعريف يطلق على كل حيوان أو نبات يستطيع الالباد في مختلف اقاليم المعمورة.

Perversité (F). Perversity (E). مِيزَة مِيزَة
الخطية عيب خلقي أو فساد في الاخلاق. مثالب الحكم والقضاء.

٢٥٦١٧ - مِيزَة حَظِيَّة الْوَرَق

Mutisia linearifolia (S). Mutisie à feuilles linéaires (F).
نوع من المِيزَة. ساقها قصيرة تملو نحو ١٠٠ سم. أوراقها عسقية الشكل. نصلها ملتصقة الاطراف تنتمي عساق مستطيلة. ازهارها ثنائية السينات، كبيرة القند. قرمزية اللون || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف.

Mutisia decurrens (S). مِيزَة مِيزَة
Mutisie décurrente (F).

نوع من المِيزَة، ساقها دقيقة فرعاء تملو من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ سم. أوراقها ساعدة كاملة، نصلها سناني الشكل بحري اللون ينتهي بطفة فرعاء || ازهارها يرتقالية اللون تملو من ١٥ إلى ١٢ سم. ازهارها يستمر طوال فصل الصيف.

٢٥٦١٩ - مِيزَة مُسْتَعْرِضَة الْوَرَق

Mutisia latifolia (S). Mutisie à feuilles larges (F).
نوع من المِيزَة، ساقها تملو نحو ٢٠٠ سم. أوراقها ساعدة لاطفة قلبية الشكل، نصلها سنن الحافة ثلاثي الأذنان. ازهارها وردية السينات، صفر الاقراص، مزينة القلائد، حاسفة القنابات الفارشة || ازهارها يستمر من ايلول الى تشرين.

Mutisia climaticis (S). مِيزَة مِيزَة
Mutisie climatique (F).

نوع من المِيزَة، ساقها دقيقة تحملة تملو من ٦ إلى ١٠ اعمار. أوراقها مركبة، وريقاتها شضية التجميع ثمانية أو عشارية الاذواج. نصلها احليجية الشكل، خلية البشرة. ساقها ثلاثية الانشعاب. ازهارها كبيرة القند، حمراء اللون، مستطيلة الانحاء، متدلية || ازهارها يستمر من الصيف الى الخريف.

٢٥٦٢١ - مِيزَة مِيزَة *

Matisia (S). Matisie (F).
جنس الشجار برية وزراعية من فصيلة المِيزَات مهادها بعض مناطق امريكا الاستوائية || اشجارها كبيرة دائمة. سوقها منتصبه تملو من ١٢ الى ١٥ م. أوراقها متعاقبة، ممتدة. نصلها سنائية الشكل، جامدة الوثل، ناشرة الوردق السباعية الاذواج. ازهارها عسي التجميع. ازهارها مستطيلة الانحاء، بيضاء اللون، وردية الملاج. ثمارها نووية، بيضيه الشكل، غاسية الخلود، مأكولة مستحبة الطعم القريب من طعم المشمش.

٢٥٦٢٢ - مِيزَة مِيزَة
هو التامبول الضيق الورق.

٢٥٦٢٣ - مِيزَة مِيزَة
كحول مستقطر من الخشب.

٢٥٦٢٤ - مِيزَة مِيزَة

Matthiola (S). Matthiole (F).
جنس نباتات حشبية وجينية من فصيلة الصلينيات. انواعها عديدة، معظمها بري منه القصر والجعل والجعل. جميعها قريبة الشبه من الخيري، سوقها وأوراقها زبداء. ازهارها حلقوية، طرفية، عطرية. ثمارها حردلية ثنائية الخلد. زهورها دقيقة مبطلة حنطية اللون.

٢٥٦٢٥ - مِيزَة مِيزَة *، مِيزَة مِيزَة
Matthiola bicornis (S). Matthiole à 2 cornes, Giroflée des jardins (F). Night scented stock (E). Garten-



مِيزَة



مِيزَة مِيزَة

هي الجلالة ، أطلبها .

Satyrus circe (S). *Satyre circé*, *Silène* (F).

Satyrus clirca (E).

حشرة من فصيلة الهجانيات ورقية حشرنيات الاجنحة.

موطنها معظم المناطق المعتدلة الحرارة من الشرق الأوسط إلى
البحر الأبيض المتوسط. في أستراليا واثمة قبتا منذ الانهال.

سرقيا تعيش على عصف النحليات || جسمها كبير القدر.

بطل نحو ۲۳ م. بطنها نحو ۶۶ م. رأسها کستی

اللون الداكن . عيناها كبيرتان . زباناها صولطانيان .

مرشفتها معتدل الجرم والطول . جوشنها وبطنها الى الخلفي لا

وروايتها كسكنية اللون يعلوها عند الذكر شجرة لامعة وسبع

الشيخ بولس وسبع لفظ خطية فالتسبية الأرثوذكس . ويعتقدون
أنه لا شيء يرفع بولس بغير توبة الصفحة بكاملها .

لما حيا، واحد في الحول، تظهر الفراشة في تموز، تسرح

في الليل. تعاظمت بعد ظهورها بنحو مائة أساييم وتمت

الْمَكْنَ لَطْفًا عَلَى الصَّفَحَاتِ الْبَقِيَّةِ مِنَ نَصَالِ الْمَصْنُفِ ۥ

السرفة طول نحو ٣٦ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل ،

مالى القشار . توبها الى السعة الكسنية يملوها خطان

المناطق: صدرية، جوفية، وتسعة أطواق، بطنية، مبدئية، شرحها

ذلك الطرف المفلوق . مديها ورواجبها الى السرة || طور

الأكمال الذي يستمر نحو ثلاثة أسابيع ينقضي في التربة

نحت الجنائز .

Satyridae (S). ٢٨٦٧ - مَحَالِيَات ٥

Satyridae (F). Satyridae (E).

فصيلة حشرات فراشية من رتبة حرشفيات الاجنحة .

أجناسها وأنواعها المعروفة كثيرة العدد. معظمها متوسط

القد أو صغير. تتميز بالتباين الموي بين الشقين |

أجسامها، فليته الصلاة، رؤسا، قائما، أخفيتها بها
ثالثة الخ، وفي أو عادت، وللمسح، ومجسدة، قد وثقا

الاستشارة نحلة صولجانية الشكل || طرائق مزيج من

الخوم والعرقصة والسليف السريع القصير الشوط ١١

أساسها تميش على النجليات وهي مجهزة بزوائد شرجية

صغيرة فرقة || أشهر أجناسها الجبان والرهالة والشوق .

Chambers, J. (1997) $1000 = 1000$

Mushroom bed (E). المكان المهد لزراعة الفطريات.

© 1999 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 245: 115–121

Formacif (F). Formative (E). **مَجِيل - ١٥٦٢**

نعت نعيماني يدل على وجود الجبل. كفوك القطب

الجميل للدلالة على المطبخ الذي تتحول فيه اشعة في البيت
المزينة

...

Présure (F). Rennet (E). ٢٥٦٧٣ - عجينة

هي المرأة ، أطلبها .

Fromagerie (F). ٢٥٦٧٤ - مَجِينَة

المصالح المختصين باستشارة المحامين

۱۰۰

Ruminants (F), مجترات - ۲۵۶۷۵

المُحَنِّمَاتُ الْمُحَنِّمَةُ أَكْلًا وَهِيَ مِنَ الْمُحَنِّمَاتِ الْإِصَابِيَةِ

[illegible]

2٥٧٠٧ - مَجَسَّةُ الْحَقُونِ (E). Aloyau (F). Sirloln (E).

2٥٧٠٨ - مَجَسَّةُ الْخَاصِرَةِ (F). Travers (F).

2٥٧٠٩ - مَجَسَّةُ الْعَجَزَيْنِ (E). Breadth (E).

Maniement des abords - مَجَسَّةُ رَأْسِ الْكَتِفِ (F). Avant-cœur, Paleron (F). Shoulder-blade, Chuck (E).

2٥٧١١ - مَجَسَّةُ رَأْسِ الْوَلَدِ (F). Bord (F). Edge (E).

2٥٧١٢ - مَجَسَّمُ مُرْبَعِ الْوُجُوهِ (F). Tétraèdre (F). Tetrahedron (E).

2٥٧١٣ - مَجَسَّمُ نَائِصٍ (F). Ellipsoïde (F). Ellipsoid (E).

2٥٧١٤ - مَجَسَّوْسِيَّةٌ ، مَجَسَّوْسِيَّةٌ (F). Palpabilité (F). Palpability (E).

2٥٧١٥ - مِجْهَاصٌ (F). Gypsomètre (F). Gypsumeter (E).

يُقاسُ بِمِقْيَاسِ الْجِصِّ ، جِهَازٌ يُسْتَخْدَمُ فِي قِيَاسِ الْجِصِّ لِحَقْفَةِ مَقْدَارِهِ وَنِسْبَتِهِ .

2٥٧١٦ - مَجْعَدَاتٌ (F). Exosceles (S). Exosceles (F). Exosceles (E).

فَصِيلَةُ فَطُورٍ مَقْطُوعَةٍ مِنَ الزُّقَاتِ ، اِسْتِخْصَاصٌ وَأَنْوَاعُهُ حَدِيدَةٌ جَمِيعُهَا مُصَارَةٌ ، بَعْضُهَا يَرْكَبُ أَوْرَاقَ الْإِجْمَارِ الْمُشْتَرَةِ لِيُؤَدِّيَهَا .

2٥٧١٧ - مَجْعَدَةٌ (F). Exosceles (S). Exosceles (F). Exosceles (E).

جِلَسُ فَطُورٍ مُؤَدِّيَةٌ مِنْ فَصِيلَةِ الْهَيْدَاتِ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ تَقْرِينَتِهِ ، أَطْلُقُهَا .

2٥٧١٨ - مِجْهَافٌ (F). Four à dessécher, Séchoir au feu (F). Bake house, Drying-house (E).

بِنَاءٌ خَاصٌ يُجَفِّدُ فِي دَاخِلِهِ بِوَسْطَةِ الْحَرَارَةِ بَعْضَ الْمَحَاصِلِ الزَّرَاعِيَةِ اِخْصَاصًا لِتَبْرِخِ السِّكَارِ وَتَبْرِخِ فِيرِجِيَّةِ .

2٥٧١٩ - مِجْهَافَةٌ * ، مِجْمٌ (F). Écuve (F). Stove (E).

جِهَازٌ حَكَمُ السَّدِّ ، اِسْتِخْصَاصٌ لِلْحَرَارَةِ ، يُسْتَخْدَمُ فِي شَيْءٍ اِلْعَامَالِ الْاِنْتِاشِيَّةِ وَالتَّهْلُوبَةِ وَالتَّهْمِيَّةِ .

2٥٧٢٠ - مِجْهَافَةٌ (F). Arillé (F). Arillate (E).

نَعْتٌ تَعْرِيفِيٌّ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ بَزَّةٍ مِجْمَةٍ بَارِئِلِ اَيِ جَسَّتْ .

2٥٧٢١ - مِجْلٌ (F). Arillé (F). Arillate (E).

اِجْلٌ : اِنْتِاقٌ مِنَ النِّصْبَةِ فِي اَسْفَلِ عَرَقِ الْفَرَسِ ، وَهُوَ مِنْ حَيَوانِ الْخَيْلِ .

2٥٧٢٢ - مِجْلَاةٌ * (F). Ovocope (F).

جِهَازٌ خَاصٌّ يُسْتَخْدَمُ فِي اِسْتِجْلَافِ بَعْضِ اَلزَّرْعِيَّاتِ لِنَتَاقِهَا اَلْمَرْكُومِ الصَّالِحِ وَتَرْكِ الْجَدْبِ .

2٥٧٢٣ - مِجْلَاةُ الْحَوِيرِ (F). Sérimètre (F). Serimeter (E).

جِهَازٌ يَبِينُ وَزْنَ خَيْطِ الْحَرَرِ وَصِلَاتِهِ وَيُورِنَتُهُ .

اَلْمِجْلَاةُ الشَّكْلُ . فِصَالَتُهَا وَاجْناسُهَا وَأَنْوَاعُهَا كَثِيرَةٌ اَلْمَدِّ اَعْلَانُهَا جَمْعُ الْبَحَارِ وَالْيَاءِ الْمَدْبَةُ تَعْيِشُ مُتَعَلِّقَةٌ عَلَى اَلْاِسْمَاكِ .

2٥٦٩١ - مِجْلُورٌ (E). Multiple (F). Focus (F). Focus (E).

اَلْمِجْرُ : مَا فِي بَلُونِ الْحَوَالِ مِنْ اَلْعَنَمِ وَفِيهَا مِنْ خَوَاتِ اَلظَّلْفِ .

2٥٦٩٢ - مِجْرٌ (F). Bief (F). Reach, Level (E).

قَنَاةٌ مَسْطُوعَةٌ لِمَرِّ الْمَاءِ .

2٥٦٩٣ - مِجْرٌ (F). Héliomètre (F). Heliometer (E).

جِهَازٌ يُسْتَخْدَمُ فِي قِيَاسِ قَطْرِ دَائِرَةِ الْاَجْرَامِ الْمَسَاوِيَةِ .

2٥٦٩٤ - مِجْرَامٌ * ، هِلِيُومِتْرٌ (F). Voie lactée (F). Galaxy, Milky way (E).

بِيَاضٌ يَرَى فِي السَّمَاءِ يَتَكَوَّنُ مِنْ اَلْوُفِّ اَلنَّجُومِ الْمُتَقَارِبَةِ اَلَّتِي تَطَسُّ لَوْرَ بَعْضِهَا بِعَضَا فِصَالَتِهَا كَالْمَا بِصَاحِبِ اَلْبَيْضِ .

وَمِمَّا يَرَى فِي الشَّمَاءِ اَوَّلُ الْاَلِيلِ فِي نَاحِيَةِ السَّمَاءِ . وَرَى فِي الْبَيْضِ اَوَّلُ الْاَلِيلِ فِي وَسْطِ السَّمَاءِ . وَهُوَ تَدَوُّرُ حَوْرَةٍ رَحْوِيَّةٍ تَرَاهَا نِصْفُ الْاَلِيلِ مَتَّةً مِنَ الْمَشْرِقِ اِلَى الْمَغْرِبِ وَفِي اَخْرَ الْاَلِيلِ مِنَ الْجَنُوبِ اِلَى الشَّمَالِ .

2٥٦٩٥ - مِجْرَةٌ ، شَرْجُ السَّمَاءِ (F). Houe d'entrée (F). Hoc (E).

اِدَاةٌ زُرَاعِيَّةٌ تَسْتَعْمَلُ لِبْعِ الْاَرَابِ وَتَرْبِيَةِ .

2٥٦٩٦ - مِجْرَتِي مَاءٍ (F). Tondeuse (F). Shearer, Clipper (E).

اِدَاةٌ يَدَوِيَّةٌ أَوْ آلِيَّةٌ تَسْتَعْمَلُ لِحَزِّ صَوْفِ الْاَوْرَاجِ .

2٥٦٩٧ - مِجْرَتَانِ (F). Balsamine des jardins (F).

هِيَ الْهَسَا مِنَ اَلنَّبَاتَاتِ اَلزَّيْتِيَّةِ ، اَطْلُقُهَا .

2٥٦٩٨ - مِجْرَتَانِ (F). Contre-espeller (F). Espeller facing another (E).

فِي الْاِشْجَارِ الْمُشْرَةِ اَلْقَائِمَةِ عَلَى الْاَسْلَاقِ وَهَذِهِ صَارَتْ تَعْلِيْقًا وَفَقًا لِقَائِمَةِ .

2٥٦٩٩ - مِجْرَتَانِ (F). Filet (F). Dash (E).

الشَّيْءُ يَصَادُ بِهَا السَّمَكُ .

2٥٦٩٠ - مِجْسٌ ، مِجْسَةٌ (F). Manet, Maniement (F). Handling (E).

مَا يَحْتَسُ بِأَلْيَدٍ مِنْ جِسْمِ الْحَيَوانِ لِحَقْفَةِ سَمْتِهِ أَوْ هَزَلِهِ .

2٥٦٩١ - مِجْسَادٌ * (F). Stéréoscope (F). Stereoscope (E).


مَنْظَارُ جِسْمٍ . جِهَازٌ بَصَرِيٌّ يُمْكِنُ مِنْ مَشَاهِدَةِ اَلرُّسُومِ بِقِيَامِهَا بِفَعْلِ اَلتَّصْفِيدِ الَّذِي كَوْنُهُ اِنْتِظَارَاتَانِ .

2٥٦٩٢ - مِجْسَادِيٌّ (F). Stéréoscopique (F). Stereoscopic (E).

2٥٦٩٣ - مِجْسَةٌ الْاُذُنِ (F). Oreillette, Oreillon (F). Auricle, Earlet (E).



جِجَاد



جِجَلَانَةُ



جِجَلَةٌ

Cheiroptères **مُجَنِّحات الأيدي**

Genre	جنس	Sous-Famille	هجرة	Famille	فصيلة	Sous-ordre	مرتبة
Roussettes	شفاعة			Pteropodidés	وطواييات	Mégachiroptères	وطاويط
Cynonycteris	رقاصة						
Epomophores	حيتر						
Cynoptères	سقنوط						
Harpie (Céphalote)	مساخة						
Macroglosse	لثانة						
Eonycteris des cavernes	سر حباب						
Néonycteris	مجنون						
Rhinolophes	عماش			Rhinolophidés	عماشيات	Microchiroptères	عطافيل
Triadenops	مخاطط						
Phyllorhines	دبابش						
Authops orné	دملوح						
Cœlops	قناب						
Mégadermes	مطاب			Nyctéridés	وسرديات		
Nyctères	وحرة						
Oreillardes	طروق			Vespertilionidés	عفاشيات		
Synotes, Barbastelles	سحاة						
Vespérugos	عفاش						
Scotophilus	ذحاط						
Vespertilionas	عفاش						
Minioptères	زباب						
Furies	دوس	Emballonurines	رئسات	Emballonuridés	رئسات		
Saccoteryx	مضروف						
Diclidures	دماس						
Noctilions	نكيتل						
Emballonurea	رئاس						
Taphiens	شقدان						
Rhinopomes	هيتوم						
Chiromèles	زغذاب	Molossinés	مهرات				
Molosses	هيرة						
Nyctinomés	ضفوف						
Mystacops	خوبر						
Vampires	نزاف			Phyllostomidés	ورقيات		
Phyllostomes	ورقية ، فليستوم						
Glossophages	مصاص						
Desmodes	علوق						
Diphyllies	علوق						

بالاستمرار المربع . ويختلف الجهود باختلاف العرض المطارب لذلك فهو قد يكون :

جهود أمن Effort de sécurité (F).
Safe stress or strain (E).

جهود التواء Effort de torsion (F).
Torsional stress (E).

جهود ضغط Effort de compression (F).
Compressive stress (E).

جهود شد Effort de traction (F).
Tensile stress (E).

جهود كسر Effort de rupture (F).
Ultimate stress (E).

٢٥٧١٧ - ميجنوا ، ميسنحاح ، مسسكك ٥
Aéromètre (F). Aerometer (E).

جهاز خاص يستعمل في تحديد كثافة الهواء .

٢٥٧١٨ - مجوكلات ، لاحشويات
Cosolentérés (F). Cosolenterata (E).

شعبة من الحيوانات لا اعضاء لها فيها تجويف واحد له فتحة واحدة الى الخارج تفرم مقام الفم والامتصاص .

٢٥٧١٩ - مجوكلات القرون
Cavicornes (F).
Cavicornes (E).

قسم من المجربات ذوات القرون الحيفية كالبقر والغنم والكتايا .

٢٥٧٥٠ - مجيل ٥
Magilus (S).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مغطيات الارجل وفضيلة المجلليات . انواعها المعروفة قليلة العدد اغطائها البحر الاحمر وبعض مناطق المحيط الهندي . تعيش في تجاويف مدافئ الرخويات || اصدافها كلسية المادة ، بيضاء اللون ، منحنية التفرز ، صلبة ، محكوة ، ثلاثية الارباب او رباعية في اول حدها ثم تطول مع مرور الزمن تصبح كالقشر الاسطوانية الشكل .

٢٥٧٥١ - مجليات ٥
Magillidae (S).

Magillides (F). Magillides (E).

فضيلة حيوانات بحرية من الرخويات مغطيات الارجل . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار المناطق الحارة || اعرف اجناسها واشهرها الجبل .

٢٥٧٥٢ - مئج ، مئج ، مئج
Vitelina صفرة البيض ، وهو العرقل .

٢٥٧٥٣ - مئجات هي الخلمي القزمي ، اعطيه .

٢٥٧٥٤ - مئجاجة ٥
Phytotomie (F).

Phytotomy (E).

الحاجة او القيتوتوميه علم يبحث في تشريح النبات .

٢٥٧٥٥ - مئجاح ٥
Pauciflore (F). Pauciflorous (E).

نمت نباتي يذلل على شكل الزهر في اي شكل كان من اشكال الايزرار . تفردل منابها ومناقيدها ومساكنها ونورها خاص .

٢٥٧٥٦ - مئجار ، مئجارية ، مئجاريون
Ostrea (S). Huitre (F). Oyster (E).

جنس حيوانات من الرخويات وفضيلة المحاريات . انواعها

كثيرة العدد تنقسم الى اثنين الاول تشمل عمار المياه البحرية وهي منتشرة في معظم بحار العالم . والثانية تشمل عمار المياه العذبة التي تعيش في الأنهار والبحيرات || وهو من الرخويات الضخمة الاحساس ، القليلة الحركة ، يتغذى بالكلائنات الدنيا الحيوانية والنباتية التي تدخل له مع الماء .

٢٥٧٥٧ - مئجار مائوف ، توكاف
Ostrea edulis (S). Huitre ordinaire (F). Edible oyster (E).

نوع من المحار المائل للأكل . يكثر على الصخور المغمورة بالماء على طول الشاطئ اللبناني . وهو يربي في اسواق خاصة مؤدية فينكار بصرة .

٢٥٧٥٨ - مئجارة
الحايتان هما رأسا الورق المشدودان اللذان تكون فيها رؤوس الفضلن .

٢٥٧٥٩ - مئجارة ، قوف ، صيون
Pavillon de Foraille (F). Pavillon, Auricle (E).

راجع قوف وصيون .

٢٥٧٦٠ - مئجارية
Ostréole (F).

٢٥٧٦١ - مئجاريات ، مئجاريات
Ostréides (F). Ostreidae (E).

فضيلة من الرخويات ذوات الصدفتين .

٢٥٧٦٢ - مئجاس ٥
Vinago (S).

Vinago (F). Vinago (E).

جنس طير من الجواثم حايات الشكل وفضيلة الزنويات . انواعها المعروفة قليلة العدد موطنها بعض اصقاع افريقية الاستوائية والحارة . ملجها الحياقي جامي . افواجها مغطاة القعد . تجوب البلاد في طلب الرزق . قوتها البزور والحبوب وبعض الثمار الباردة والخشرات والديدانيات || اجسامها شبيهة بالحماس الا انجل . مناقيدها مستطرفة . ارسافها كاسية . افواجها تختلف من الانواع جميعها حادة الا لوان السفماء اللمعة .

٢٥٧٦٣ - مئجاسب
Comptable (F).

Accountable, Responsable (E).

الوكيل المؤتمن على الحساب .

٢٥٧٦٤ - مئجاسبية ، مئجاسية
Comptabilité (F). Accounts, Book-keeping (E).

٢٥٧٦٥ - مئجاق ، مئجاق ، مئجاق
الحاق او الاقتران وجه من اوجه القمر يحدث عندما يتوسط القمر بين الارض والشمس ويكون نصفه المضيء متجها نحو الشمس فتستعمل رؤيته . والحاق يتبقى حرف الحلال يورم .

٢٥٧٦٥ - مئجاق ، مئجاق ، مئجاق
الحاق او الاقتران وجه من اوجه القمر يحدث عندما يتوسط القمر بين الارض والشمس ويكون نصفه المضيء متجها نحو الشمس فتستعمل رؤيته . والحاق يتبقى حرف الحلال يورم .

٢٥٧٦٥ - مئجاق ، مئجاق ، مئجاق
الحاق او الاقتران وجه من اوجه القمر يحدث عندما يتوسط القمر بين الارض والشمس ويكون نصفه المضيء متجها نحو الشمس فتستعمل رؤيته . والحاق يتبقى حرف الحلال يورم .

٢٥٧٦٥ - مئجاق ، مئجاق ، مئجاق
الحاق او الاقتران وجه من اوجه القمر يحدث عندما يتوسط القمر بين الارض والشمس ويكون نصفه المضيء متجها نحو الشمس فتستعمل رؤيته . والحاق يتبقى حرف الحلال يورم .

٢٥٧٦٥ - مئجاق ، مئجاق ، مئجاق
الحاق او الاقتران وجه من اوجه القمر يحدث عندما يتوسط القمر بين الارض والشمس ويكون نصفه المضيء متجها نحو الشمس فتستعمل رؤيته . والحاق يتبقى حرف الحلال يورم .

٢٥٧٦٥ - مئجاق ، مئجاق ، مئجاق
الحاق او الاقتران وجه من اوجه القمر يحدث عندما يتوسط القمر بين الارض والشمس ويكون نصفه المضيء متجها نحو الشمس فتستعمل رؤيته . والحاق يتبقى حرف الحلال يورم .

٢٥٧٦٥ - مئجاق ، مئجاق ، مئجاق
الحاق او الاقتران وجه من اوجه القمر يحدث عندما يتوسط القمر بين الارض والشمس ويكون نصفه المضيء متجها نحو الشمس فتستعمل رؤيته . والحاق يتبقى حرف الحلال يورم .

٢٥٧٦٥ - مئجاق ، مئجاق ، مئجاق
الحاق او الاقتران وجه من اوجه القمر يحدث عندما يتوسط القمر بين الارض والشمس ويكون نصفه المضيء متجها نحو الشمس فتستعمل رؤيته . والحاق يتبقى حرف الحلال يورم .

٢٥٧٦٥ - مئجاق ، مئجاق ، مئجاق
الحاق او الاقتران وجه من اوجه القمر يحدث عندما يتوسط القمر بين الارض والشمس ويكون نصفه المضيء متجها نحو الشمس فتستعمل رؤيته . والحاق يتبقى حرف الحلال يورم .

٢٥٧٦٥ - مئجاق ، مئجاق ، مئجاق
الحاق او الاقتران وجه من اوجه القمر يحدث عندما يتوسط القمر بين الارض والشمس ويكون نصفه المضيء متجها نحو الشمس فتستعمل رؤيته . والحاق يتبقى حرف الحلال يورم .

٢٥٧٦٥ - مئجاق ، مئجاق ، مئجاق
الحاق او الاقتران وجه من اوجه القمر يحدث عندما يتوسط القمر بين الارض والشمس ويكون نصفه المضيء متجها نحو الشمس فتستعمل رؤيته . والحاق يتبقى حرف الحلال يورم .

٢٥٧٦٥ - مئجاق ، مئجاق ، مئجاق
الحاق او الاقتران وجه من اوجه القمر يحدث عندما يتوسط القمر بين الارض والشمس ويكون نصفه المضيء متجها نحو الشمس فتستعمل رؤيته . والحاق يتبقى حرف الحلال يورم .



مجل



عمار مائوف



مئجاس


الاسم الفرنسي	التاج	الحبل باليوم	الحيلون	Transmission (F). Transmission, Transmittal (E).	٢٥٧٦٧ - مَحَالَة جهاز ميكانيكي .
Guanon	١	٢١٠	دحية	Pouille de transmission (F). Pulley (E).	٢٥٧٦٨ - مَحَالَة هي البكرة العديدة المتحات التي تستعمل في رفع الاثقال .
Lièvre	٥-٣	٣٣	ذراة	Egrappoir (F).	٢٥٧٦٩ - مَحْبِل آلة تفصل حب الثوب عن التفروق أي الملووش .
Fouine	٧-٢	٥٦	دلق	Terre fertile (F). Fruitful soil (E).	٢٥٧٧٠ - مَحْبِل المحار : الأرض الفتحة السريعة النبات . « لنا جبال وصى محار » ج . محابر .
Louve	٦-٣	٦٨	ذئبة	Granulaire, Granuleux (F). Granular, Granulous (E).	٢٥٧٧١ - مَحْبِل ذو حبوب .
Lale	٨-٥	١٣٠	رث	Jus de grenade (F). Juice of pomegranate (E).	٢٥٧٧٢ - مَحْبِل المحرم : ماء حب الرمان .
Renne	١	٢٤٦	رنة	Stalle, Box (F). Stall, Box (E).	٢٥٧٧٣ - مَحْبِل المهس واليكس : مرقة الفرس الواحد في الاصطبل .
Clivette	٤-٣	٧٢	زيادة	Désoperculeur (F).	٢٥٧٧٤ - مَحْبِل أداة خاصة يشار بها العمل .
Rat des moissons	٩-٣	٢٢	زبابة	Gestation (F). Gestation, Pregnancy (E).	٢٥٧٧٥ - مَحْبِل الحبل هو مدة الحمل ، أي زمن تكوين الجنين ، يستمر من الانغساب إلى الوضع تختلف مع نوع الحيوان، انصردا ١٣ يوما وأطولها نحو ٧٦٠ وقد ذكرنا في الجدول التابع أشهر أنواع الحيوان ومدة حملها باليوم ومدة نتاجها :
Girafe	١	٤٥٠	زرافة		
Muscardin	٧-٢	٢٨	زغبة		
Belette	٨-٣	٣٥	سرغوبة		
Marte	٦-٣	٥٦	سمور		
Ecreuill	٤-٣	٢٨	سناجب		
Chamois	٢-١	١٦٥	شمولة		
Chat sauvage	٤-٣	٥٦	فسيون		
Taupe	٥-٣	٢٨	طوفون		
Biche	١	١٨٥	ظبية		
Campagnol	٧-٤	٢٢	عكبر الحقل		
Chèvre	٣-١	١٥٤	عنز		
Eléphant	١	٧٦٠	عمشوم		
Blaireau	٥-٣	٦٥	غريراء		
Gazelle	١	١٥٤	غرزالة		
Souris	٨-٥	٢١	فأرة		
Jument	١	٣٤٥	فرس ، حبر		
Lérot	٦-٤	٢٨	قرنب		
Tigresse	٥-٣	١٠٠	فزارة		
Morse	١	٢٦٠	فظ		
Phoque	١	٢٧٦	فقمة		
Léopard	٥-٣	٩٦	فهدة		
Hermine	٨-٥	٦٠	قائم ، هرين		
Hamster	٧-٣	١٦	قد آد مستر		
Loir	٦-٢	٢٨	قرقندون		
Loutre	٣-٢	٦٣	قضاة		
Hérissonne	٦-٤	٤٨	قنقلة		
Rhinocéros	١	٥٥٠	كركدن		
Chienne	١٠-٣	٦٣	كلية		
Cobaye	٥-٢	٦٨	كوباي		
Lama	١	١٦٨	لاما		
Lionne	٣-٢	١١٠	ليونة		
Mara	٢	٦٠	مارة		
Marmotta	٦-٢	٣٥	مردوط		
Mandrill	١	٢٧٠	ميسون		
Chamelle	١	٣٢٠	ناقة		
Brebis	١	١٤٧	نسيجة		
Panthère	٥-٣	٩٦	نمرة		
Chatte	٧-٥	٦٠	هرة		
Lynx	٤-٢	٦٣	رثق		
Bouquetin	١	١٦٧	وعل		
Chevreuil	٢-١	٢٧٠	يأمور		



محبس



مُحَرَّر



مُحَرَّر



مُحَرَّر



مُحَرَّر



مُحَرَّر



مُحَرَّر



مُحَرَّر



مُحَرَّر

٢٥٧٩ - **مَحَرَّر** (F). Heat-conveying. يعمل الحرارة ويشمها. جهاز يؤمن التفتت.

٢٥٧٩١ - **مَحَرَّر طَبَقِي** (F). Bolometre (E). ميزان حرارة يشغل بالمقاومة الكهربائية.

٢٥٧٩٢ - **مَحَرَّرَات** (F). Charrue (E). الحراث أداة الحراث. ج. محارث. وأغاريت. عينة الاشكال تختلف باختلاف الاعمال المطلوبة.

٢٥٧٩٣ - **مَحَرَّرَات الْجَث** (F). Charrue déboiseuse (F). Clearing plough (E). هو الحراث المدة لانتاج ارضيات الاشجار.

٢٥٧٩٤ - **مَحَرَّرَات التَلَج** ، **مَحَرَّرَات الْجَدَاوِل** ، **مَحَرَّرَات التَشَايِير** (F). Charrue rigoleuse, Ch. fossayeuse (F). Ditching plough (E). محراث تَلَج به جداول الاسقاء.

٢٥٧٩٥ - **مَحَرَّرَات التَقَب** ، **نَقَابَة** (F). Charrue défonceuse (F). Trenching plough (E). محراث يستعمل في تقب التربة الزراعية على اعماق تراوح من ٥٠ الى ٨٠ سم.

٢٥٧٩٦ - **مَحَرَّرَات الْحُوم** (F). Foulleuse, Sous-soleuse (F). Subsoil-plough (E). محراث فيه اصابع تحرك الحوم مع استيقاظ ترابه في مكانه.

٢٥٧٩٧ - **مَحَرَّرَات رِبَان** (F). Charrue brabant (F). Belgian plough (E). محراث يقلب التربة رأساً على عقب.

٢٥٧٩٨ - **مَحَرَّرَات فُو مَقْطَعِينَ** (F). Charrue bise (F). Bi-share plough (E). محراث مركب من باسنتين.

٢٥٧٩٩ - **مَحَرَّرَات عَادِي** ، **مَحَرَّرَات** (F). Araire (F). Swing-plough (E). هو الحراث الذي يشق التربة.

٢٥٨٠٠ - **مَحَرَّرَات كَثِير المَقْطَع** (F). Charrue polysoc (F). Polysshare plough (E). هو الحراث العديد اليوانس وهو يستعمل لزق التربة.

٢٥٨٠١ - **مَحَرَّرَات** (F). Thermomètre enregistreur (F). Self-registering thermometer (E). هو الآلات ، اطلية.

٢٥٨٠٢ - **مَحَرَّرَات الْقَصْوَى وَالْدُنْيَا** (F). Thermomètre maxima-minima (F). نوع من ميازين الحرارة للتتبع الجيوب المائلة والاعمة الزئبقية التي يدل كل واحد منها على حرارة.

٢٥٨٠٣ - **مَحَرَّرَات** (F). Brûleur (F). House-burner (E). جهاز يسهل وينفث احتراق المواد الملتهبة.

٢٥٨٠٤ - **مَحَرَّرَات** (F). Graine de coton (F). Cotton seed (E). هي حبة القطن. ج. محارن.

٢٥٨٠٥ - **مَحَرَّرَات** (F). Mûche (F). مفصل النمل.

٢٥٨٠٦ - **مَحَرَّرَات** (F). Mûche (F). هو المشفر. ج. محارن.

٢٥٧٩٠ - **مُحَرَّرِينَ** (F). Grésière, Grésier (F). Sandstone quarry (E). لغ الحجر الريلي.

٢٥٧٩١ - **مُحَرَّر** (F). Grésière, Grésier (F). Sandstone quarry (E). جمع المود : قشرة.

٢٥٧٩٢ - **مُحَرَّرَات** (F). Lithopage (F). Lithopagus (E). ريش الحبارية.

٢٥٧٩٣ - **مُحَرَّرَات** (F). Lithopage (F). Lithopagus (E). ل نبات محوّرت ماهيته الخشبية الى مادة حجرية دون يتر في الشكل يدعى محجراً.

٢٥٧٩٤ - **مُحَرَّرَات** (F). Lithopage (F). Lithopagus (E). ل نبات محوّرت ماهيته الخشبية الى مادة حجرية دون يتر في الشكل يدعى محجراً.

٢٥٧٩٥ - **مُحَرَّرَات** (F). Lithopage (F). Lithopagus (E). ل نبات محوّرت ماهيته الخشبية الى مادة حجرية دون يتر في الشكل يدعى محجراً.

٢٥٧٩٦ - **مُحَرَّرَات** (F). Lithopage (F). Lithopagus (E). ل نبات محوّرت ماهيته الخشبية الى مادة حجرية دون يتر في الشكل يدعى محجراً.

٢٥٧٩٧ - **مُحَرَّرَات** (F). Lithopage (F). Lithopagus (E). ل نبات محوّرت ماهيته الخشبية الى مادة حجرية دون يتر في الشكل يدعى محجراً.

٢٥٧٩٨ - **مُحَرَّرَات** (F). Lithopage (F). Lithopagus (E). ل نبات محوّرت ماهيته الخشبية الى مادة حجرية دون يتر في الشكل يدعى محجراً.

٢٥٧٩٩ - **مُحَرَّرَات** (F). Lithopage (F). Lithopagus (E). ل نبات محوّرت ماهيته الخشبية الى مادة حجرية دون يتر في الشكل يدعى محجراً.

٢٥٨٠٠ - **مُحَرَّرَات** (F). Lithopage (F). Lithopagus (E). ل نبات محوّرت ماهيته الخشبية الى مادة حجرية دون يتر في الشكل يدعى محجراً.

٢٥٨٠١ - **مُحَرَّرَات** (F). Lithopage (F). Lithopagus (E). ل نبات محوّرت ماهيته الخشبية الى مادة حجرية دون يتر في الشكل يدعى محجراً.

٢٥٨٠٢ - **مُحَرَّرَات** (F). Lithopage (F). Lithopagus (E). ل نبات محوّرت ماهيته الخشبية الى مادة حجرية دون يتر في الشكل يدعى محجراً.

٢٥٨٠٣ - **مُحَرَّرَات** (F). Lithopage (F). Lithopagus (E). ل نبات محوّرت ماهيته الخشبية الى مادة حجرية دون يتر في الشكل يدعى محجراً.

٢٥٨٠٤ - **مُحَرَّرَات** (F). Lithopage (F). Lithopagus (E). ل نبات محوّرت ماهيته الخشبية الى مادة حجرية دون يتر في الشكل يدعى محجراً.

٢٥٨٠٥ - **مُحَرَّرَات** (F). Lithopage (F). Lithopagus (E). ل نبات محوّرت ماهيته الخشبية الى مادة حجرية دون يتر في الشكل يدعى محجراً.

٢٥٨٠٦ - **مُحَرَّرَات** (F). Lithopage (F). Lithopagus (E). ل نبات محوّرت ماهيته الخشبية الى مادة حجرية دون يتر في الشكل يدعى محجراً.

٢٥٨٠٧ - **مُحَرَّرَات** (F). Lithopage (F). Lithopagus (E). ل نبات محوّرت ماهيته الخشبية الى مادة حجرية دون يتر في الشكل يدعى محجراً.

٢٥٨٠٨ - **مُحَرَّرَات** (F). Lithopage (F). Lithopagus (E). ل نبات محوّرت ماهيته الخشبية الى مادة حجرية دون يتر في الشكل يدعى محجراً.

٢٥٨٠٩ - **مُحَرَّرَات** (F). Lithopage (F). Lithopagus (E). ل نبات محوّرت ماهيته الخشبية الى مادة حجرية دون يتر في الشكل يدعى محجراً.

٢٥٨١٠ - **مُحَرَّرَات** (F). Lithopage (F). Lithopagus (E). ل نبات محوّرت ماهيته الخشبية الى مادة حجرية دون يتر في الشكل يدعى محجراً.

٢٥٨١١ - **مُحَرَّرَات** (F). Lithopage (F). Lithopagus (E). ل نبات محوّرت ماهيته الخشبية الى مادة حجرية دون يتر في الشكل يدعى محجراً.

٢٥٨١٢ - **مُحَرَّرَات** (F). Lithopage (F). Lithopagus (E). ل نبات محوّرت ماهيته الخشبية الى مادة حجرية دون يتر في الشكل يدعى محجراً.

٢٥٨١٣ - **مُحَرَّرَات** (F). Lithopage (F). Lithopagus (E). ل نبات محوّرت ماهيته الخشبية الى مادة حجرية دون يتر في الشكل يدعى محجراً.

٢٥٨١٤ - **مُحَرَّرَات** (F). Lithopage (F). Lithopagus (E). ل نبات محوّرت ماهيته الخشبية الى مادة حجرية دون يتر في الشكل يدعى محجراً.

٢٥٨١٥ - **مُحَرَّرَات** (F). Lithopage (F). Lithopagus (E). ل نبات محوّرت ماهيته الخشبية الى مادة حجرية دون يتر في الشكل يدعى محجراً.

٢٥٨٥٠ - مَحْكَمَةٌ
Cour, Tribunal (F).
Court, Tribunal (E). هي المحكمة التي تلي القضاء .

٢٥٨٥١ - مَحْكَمَةُ الاسْتِثْنَاءِ

Cour d'appel (F). Appel court (E).
هي المحكمة التي تنظر في جميع القضايا التي حكم فيها ابتدائياً .

٢٥٨٥٢ - مَحْكَمَةُ الْبِدَايَةِ

Cour de première instance (F). قضاء أول درجة .

٢٥٨٥٣ - مَحْكَمَةُ التَّحْكِيمِ الدَّوْلِيَّةِ

Cour internationale d'arbitrage (F).
انضمت هذه المحكمة بمقتضى اتفاق لاهاي عام ١٨٩٩ لكي تفصل بطريق التحكيم في جميع المنازعات الدولية التي لم تقلع الطرق السياسية في نفسها . مركزها مدينة لاهاي .

٢٥٨٥٤ - مَحْكَمَةُ التَّمْيِيزِ ، مَحْكَمَةُ التَّقْضِ

Cour de cassation (F). Highest court (E).
هي أعلى المحاكم درجة لأنه يطلب منها النظر في الأحكام التي صدرت من محاكم الدرجة التالية فهي تقض منها ما ترى فيه مغايرة للقانون أو تفسيراً خاطئاً له .

٢٥٨٥٥ - مَحْكَمَةُ الْجَنَايَاَتِ

Cour d'assises (F). Assize court (E).
هي المحكمة التي تنظر في المسائل الجنائية وهي تتألف من ثلاثة أعضاء تعينهم محكمة الاستئناف من المستشارين ويكون أحدهم رئيساً .

٢٥٨٥٦ - مَحْكَمَةُ الْعَدْلِ الدَّوْلِيَّةِ

Cour internationale de justice (F). International justice court (E).
هي الإدارة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة لايتهاي تشمل كل ما هو متضمن عليه في الميثاق والمعاملات والاتفاقات الملزمة بها .

٢٥٨٥٧ - مَحَلُ الْإِقَامَةِ

Domicile de fait, Résidence (F). Dwelling, Ordinary residence (E).
هو المكان الذي يقيم فيه المرء دون أن يكون زائماً لموطنه القانوني .

٢٥٨٥٨ - مَحَلَب

Galactophore (F).
Galactophorous (E).
نمت تمرثي يطلق على كل روماء ينقل الحليب أو يقوده إلى الخارج .

٢٥٨٥٩ - مَحَلَال

Bordereau (F).
Memorandum, Schedule, Account (E).
هو البيان التفصيلي الذي يوضح الإعمال والحسابات .

٢٥٨٦٠ - مَحَلَبٌ *

Cerasus mahaleb, Prunus mahaleb (S). Mahaleb, Cerisier mahaleb, C. Ste Lucie (F). Perfumed cherry, Ste Lucie cherry (E). Lucienholz, Stein-Weichsel, Weichselkirsche (D). Cillio mahaleb, C. odoroso, Pruno odoroso, C. canino, C. S. Lucia, Legno di S. Lucia (I).
نوع من الكرز البري، شجيرة كبيرة القند متضبة أساق تملأ نحو ١٠ امتار . فروصها وأغصانها متفرقة . أوراقها صغيرة النصل . أزهارها نورية التجميع . ثمارها حصى

الوفاة مختلفة ، قرونها الاستعمارية خيطية ، مرزاتها مستطيلة || ريقاتها غاشية تركب الصنوبريات تقسردب الشكير والحشب .

٢٥٨٦٨ - مِخْطَارُ أُسُودٍ *
Sirax juvencus (S). Sirax noir, Sirax commun, Bouvillon (F). Polished horn-tail (E). Kiefernholzweape (D).
مِخْطَارٌ كبير القند ، طوله نحو ٣٠ سم . لونه إلى السواد اللامع . جوارزه إلى الحمرة . مرزه مخزوي الشكل . يتبع مكته داخل قشور الصنوبريات فوق الشكير فيقتف من ريقات تقسردب الشكير والحشب بانفاق مستطيلة ومنجوعة .

٢٥٨٦٩ - مِخْطَارُ جَبَّارٍ *

Sirax gigas, Urocera gigas (S). Sirax géant (F). Giant horn-tail (E). Riesenholzweape (D).
نوع من المِخْطَارِ ، طوله نحو ٤٠ سم . رأسه وبؤشته وحلقات بطنه الوسطى سود . سائر جسمه مع جوارزه إلى الصفار أناري . مرزه ينتهي بشعلة سادة || ريقاتها غاشية تركب جمع الصنوبريات تقسردب الأخشاب وتطعها .

٢٥٨٦١ - مِخْطَارِيَّاتٌ *

Siricidae (S).
Siricidae (F). Siricidae, Horn-tails (E). Holz-wespen (D).
فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة . اجناسها وانواعها قليلة العدد . اصطناعها البلاد المعتدلة الحرارة . جميعها اسطوانية الشكل ، كبيرة القند ، طول اجسامها يراوح من ٢٠ إلى ٤٠ سم . || ريقاتها غاشية مؤذية تعيش على الصنوبر والتنوب .

٢٥٨٦١ - مِخْلَاقَةٌ ، قِلَاعَةٌ

Arracheuse, Arrachoir (F). Grubbing plough (E).
آلة تستعمل لقلع الحباط والشوذر والجزر .

٢٥٨٦٢ - مِخْطَارٌ

Sablère (F).
Sand-pit, Gravel-pit (E).
هو المروطة ، منجم يستخرج منه الرمل .

٢٥٨٦٣ - مَحْفُوظَاتٌ ، كَنْسِرَوَاتٌ

Conserves (F). Preserves (E).
الحق : الشجر المقارب بينه في الفرس .

٢٥٨٦٤ - مَحَقٌّ

Ferme (F). Farming, Farm (E).
الحقل في المزرعة . ج محقل . وفي الحديث « ما تصنعون بمحافلكم » .

٢٥٨٦٥ - مَحْفَلَةٌ

الحقل في المزرعة . ج محقل . وفي الحديث « ما تصنعون بمحافلكم » .

٢٥٨٦٦ - مِخْلَعٌ

Injecteur (F).
Seringue (F).
Syringe, Squir (E).
أداة تحقن بها السوائل في جسم الحيوان وفي جوفه .

٢٥٨٦٧ - مِخْلَعَةٌ *

٢٥٨٦٨ - مِخْلَكٌ ، مِشْطَبٌ

Raclette, Raclor (F). Scraper (E).
١٠

٢٥٨٦٩ - مِخْكَالَةٌ

Trihomètre (F).
Tribometer (E).
الحكالك جهاز يستعمل في قياس قوة الاحتكاك .



مِخْطَارُ أُسُودٍ



مِخْطَارُ جَبَّارٍ



مِخْلَعَةٌ



مَحَلَب

- Axle, Axillaire (F). **مَحْوَرِيّ** ٢٥٨٨٠
Axial, Axillary (E).
- Herbe d'inde (F). **مَحْوَر** ٢٥٨٨١
لها بر ي طبي يعرف باسم اخيرايتون ، اطلبه .
- Fascié (F). **مُحَوَّر ، مُشْتَمَل** ٢٥٨٨٢
Fasciated (E).
نمت تعريفني يطلق على كل ما هو صوموم بمصائب ،
وعلى النباتات المصاب بالشملة اي الاغراب .
- Biennal, Bisannuel (F). **مَحْوَل** ٢٥٨٨٣
Biennial (E).
- Transformateur (F). **مُحَوَّر** ٢٥٨٨٤
Transformer (E).
جهاز يغير درجة توتر اتيار الكهرباء .
- Teneur (F). **مَحْوِيّ** ٢٥٨٨٥
Tenor, Percentage (E).
هو ما تحواه كل مسادة معينة من المنتصر المطلوب او
الناصر المطلوبة ، ج . محوي .
- Cercle (F). Circle (E). **مُحِيط** ٢٥٨٨٦
هو الدائرة ، اطلبها .
- Océan (F). Ocean, High sea (E). **مُحِيط** ٢٥٨٨٧
البحر هو قسم شاسع المساحة من سطح ماء الكرة الارضية .
الحيثيات المحدودة اربعة : (١) المحيط الهادي الذي تبلغ
مساحته نحو ٨٨ مليون كيلومتر مربع اي ما يقارب
مساحة اليابسة بكاملها . (٢) المحيط الاطلسي الذي تبلغ
مساحته نحو ٥٣ مليون كيلومتر مربع . (٣) المحيط
الجنوبي ومساحته نحو ٤٨ مليون كيلومتر مربع .
(٤) المحيط الهندي ومساحته نحو ٢٧ مليون كيلومتر مربع .
- ٢٥٨٨٨ - **مُحِيط الدائرة ، مُحِيط دائرية**
Cercle de la circonférence, Périmètre, Périphérie,
Pourtour (F). Circle of circumference, Periphery,
Perimeter (E).
- Petites fourmis (F). **مُحِيل** ٢٥٨٨٩
Small ants (E).
اخييل : اصغر الدّر . قال الاخطل :
« ولو بات يسري الدّر فرق جلودها
لأثر في اباريقن محيلها »
- Méillet à petites fleurs (F). **مُحِبِّلِيَّة** ٢٥٨٩٠
هي المخترق الصغير ، اطلبه .
- Moelle (F). **مُحْ** ٢٥٨٩١
هو النخاع وهو المكك ، اطلبها .
- Tenants (F). Adjacent lands (E). **مُحْتَارِج** ٢٥٨٩٢
هي قطع الارض المجاورة للملك من جهة العرس .
- Docks, **مُحْتَارِج عُمُومِيَّة** ٢٥٨٩٣
Magasins généraux (F). Docks, Ware house (E).
- ٢٥٨٩٤ - **مَحَاسِ الزُّعْرُور** ، **مَحَاسِ ثَسَانِيّ**
الثَّقَل
Cryptoccephalus
octopunctatus (S). Cryptocéphale octoponctué (F).
Cryptoccephalus octopunctatus (E).
حشرة غاطسة من الثفساريات مسمدة الاجنحة . تألف

القة ، سواء اللين ، حريقة العلم . انشائها صلبة
معرفة طيبة الرائحة مرتويب فيها || والحب يستعمل خاصة
كعلم لبعض انواع الكرز لانه نبات سروتي يعيش في
معظم الارترية || « ثمارة مفرحة مقوية للحواس
مطلقا ، تمتع الخلفاء والبر وشيق النفس واللبم ، وتنتي
اللمة واوباج الكبد والكل والطحال والخصى وصر البول
شربا . ويقل به يقطع الكلف والجرب » .

Escargotière (F). Snailery (E). **مَحَلَّة** ٢٥٨٩١
هي المكان المدة لتربية الحلزون .

Réducteur (F). Reducer (E). **مُحَلِّل** ٢٥٨٩٢

Solution **مَحَلُول** ٢٥٨٩٣

Bouillie (F). Wash (E). **مَحَلُول ، سَائِل** ٢٥٨٩٤

Vernaculaire (F). Vernacular (E). **مَحَلِّيّ** ٢٥٨٩٥
ما هو خاص بالبلد كقولك الاسماء المحلية او اللغة المحلية .

Piso-acide (F). **مَحَاسِي** ٢٥٨٩٦
Acetometer (E).
مقياس او ميزان الحواض .

Educoré (F). Sweetened (E). **مُحَوَّر** ٢٥٨٩٧
نمت تعريفني يطلق على كل دواء ثاله العلم او مر أخيف
اليه بعض السكر تحسنتا للمذاق .

Acidifiant (F). Acidifying (E). **مُحَمِّص** ٢٥٨٩٨
نمت تعريفني يطلق على كل مادة تقود الى التخمض .

Mammoth (F). **مَحْمُود** ٢٥٨٩٩
هو الصنابة ، اطلبها .

Scammonée d'Alep (F). **مَحْمُودَة** ٢٥٩٠٠
هي التسمونيا ، اطلبها .

Convulvaceae **مَحْمُودِيَّات** ٢٥٩٠١
نصيلة نباتية مشهورة باسم اليليايات ، اطلبها .

Cumulo-nimbus **مَحْمُودِيّ** ٢٥٩٠٢
هو الزكام ، نوع من اليوم ، اطلبه .

Test **مَحْن ، مَحْنَة** ٢٥٩٠٣

٢٥٩٠٤ - **مَحْمُودَة** كثيرة الحيات . يقال ارض حمراء .

Axe (F). Axle, Axon (E). **مَحْوَر** ٢٥٩٠٥
هو نقطة الارتكاز .

٢٥٩٠٦ - **مَحْوَر أَكْسِيّ ، مَحْوَر سِنِيّ**
Abscisse (F). Abcissa (E).

Thawing **مَحْوَر التَّهَر** ٢٥٩٠٧
امق خط في قامه . واذا كان النهر بين دولتين حد
محوره حدا بينهما .

Ordonnée (F). **مَحْوَر صَادِيّ** ٢٥٩٠٨
Ordinate (E).

Peupleraie (F). **مَحْوَرَة** ٢٥٩٠٩
Plantation of poplar trees (E).

مفريس المحور وكل مكان فيه حور .



محاس الزعور

٢٥٨٩٧ - مخاس لسماني النقط

Cryptocéphale octoponctué (F).

هو مخاس الزعرور ، اطلبه .

٢٥٨٩٨ - مخاس نجيب

Cryptocéphale distingué (F).

هو مخاس الشب ، اطلبه .

Dentelure du flimbe (F).

٢٥٨٩٩ - مخاس

Indenting of flimb (E).

اسنان حافة فصل اقوة .

Prise à partie (F).

٢٥٩٠٠ - مخاصصة الشابي

وسيلة طين خير حادية مؤداها رفع حصوى على القاني امام عككة الاستلثاف او التفتش والارام يطالب فيها بتوضيح عن ضرر وقع من عمل صدر منه يتصل بوظيفته ويطلب عليه القانين .



مخاس الشب

Gué (F). Ford (E).

٢٥٩٠١ - مخاخفة

كل مكان من البهر قليل المسق والماء يمكن اجيانه حل الاقدام .

Ecrémause (F).

٢٥٩٠٢ - مخاخفة * قروزة

Separator (E).

آلة تستعمل لفرز الكتانة من الحليب .

٢٥٩٠٣ - مخاخفركة

بيع الكبار ويخر لم يبد صلاحها .

Sébestier (F).

٢٥٩٠٤ - مخاخفة

هي شجرة البستان وتسمى اطباء الكلية .

Mucilagineux (F).

٢٥٩٠٥ - مخاطي * شمائي

Mucilaginos (E).

الاجسام المخاطية اجسام لزجة مركبة من الكربون والاكسجين واليديرين توجد في حدة نباتات .

Myxinidae (S).

٢٥٩٠٦ - مخاطيات

Myxinidae (F). Myxinidae (E).

فصيلة السمك المخاطي من قسم اللامسات .

Quittance (F). Recalpt (E).

٢٥٩٠٧ - مخاخفة

هي الاراء .

Contravention

٢٥٩٠٨ - مخاخفة

المعمل الذي يقوم به المرء خلافا لاسكام القانون او النظام .

Braconnage (F).

٢٥٩٠٩ - مخاخفة الصيد

Poaching (E).

عدم التقيد بالنظمة الصيد المرصية الاجراء .

Tube à essai (F).

٢٥٩١٠ - مخبخار *

Tube of trial, Pipe of essay (E).

Laboratoire (F).

٢٥٩١١ - مخبخر

هو المختبر ، اطلبه .

Fournil (F). Bake house (E).

٢٥٩١٢ - مخبوز

بناء الفرن واذاوات الخبازة .

Boulangerie (F).

٢٥٩١٣ - مخبزة * خبازكة

Baking (E).

صناعة الخبز ومكانها .



مخاس الشرب



مخاضة



مخابر

البراري والاحراج للبعثة الاشجار . خنافسها ويرقاتها تعيش على اوراق الزعرور والبرقوق والبنق والتبانات الفقلية || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٦ م . ثوبها متراكب الالوان ، كوسلها الى السمرة السوداء ظهرها تزيين عابيه . ظهرها الى الحمرة البرتقالية يعلوها تنقيط اسود ثنائي العدد . بطنها وبرازها سود || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في التبار . تسلف بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتفتح المكن مباحيا على الصفحات السفلى من نصال الالوراق || والبرقة عند ادراكها الكمال الجسدي تظل نحو ١٠ م . جسمها اسطواني الشكل ، دقيق الجرم ، سداسي الرؤاي ، حطلي اللون ، اصفر الموج ، اصغر الرأس والرؤاي .

٢٥٨٩٥ - مخاس العشب * ، مخاس نجيب

Cryptocéphale primarius (S). Cryptocéphale distingué (F). Cryptocéphalus primarius (E).

حشرة خاضعة من النصاريات مفدمات الاجنحة . تألف البراري والاراضي للامساة . خنافسها ويرقاتها تعيش على النباتات الشبية || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٦ م . ثوبها متراكب الالوان . رأسها وكوسلها وظهرها وبرازها الى السوداء الاخضر الموج . ظهرها الى الحمرة الاروانية يعلوها عشر نقط سود . رأسها صغير الجرم . عينها صغيرتان . زباناها خيطيان . ظهرها متعبدل الانحداب مقطوع الطول للاش . غذائها متاعينا التحيز الخفيف || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى ايلول . تسرح في التبار . تسلف بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتفتح المكن على الصفحات السفلى من نصال العصف والالوراق || والبرقة عند بلوغها الالواق تمام تظل نحو ١٠ م . جسمها اسطواني الشكل سداسي الرؤاي ، اخبر اللون ، اصفر الموج ، اسود الرأس ، يملو من جانبيه خط من النقط السر المتبزة بزواج من الحلب القصير || طور الاكمال ينقضي في التربة ضمن حبيرة جبرائية الشكل .

٢٥٨٩٦ - مخاس اليسرين *

Cryptocéphalus Marise (S). Cryptocéphale de Marie, C. des églantiers (F). Cryptocéphalus Marise (E).

حشرة واحة خاضعة من النصاريات مفدمات الاجنحة . تألف البراري والاحراج . خنافسها تعيش على ازهار اليسرين والعمر والابهل والدرام ... يرقاتها تعيش على الالواق فتقتطع الخصب بين التروق ثم تلم النصل وتعيش في داخله || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ م . ثوبها الى الشقعة الصفراء البرتقالية الموج . كوسلها ثلاثي الزاويق السود . ظهرها يبلع بالاسود || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط ايار وتبقى حتى اواسط آب . تسرح في التبار . تسلف بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتفتح المكن على الصفحات السفلى من نصال الالوراق || والبرقة عند ادراكها الكمال الجسدي تظل نحو ٧ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، تبي اللون ، اصبر الرأس والرؤاي تملو ثلاثة خطوط قاذبة حمراء اللون || طور الاكمال الذي يعيش نحو اربعة اسابيع ينقضي في التربة ضمن جراب من المواد النباتية المنجومة بالبراز والرياك .

Rayonneur (F). مِخْبُط * ، مِخْدَاد * ، مِخْبَط (E).

جهاز ثنائي أو ثلاثي أو خماسي الاسنان يستعمل في تجدييد التربة خطوطاً مستقيمة متساوية الأبعاد البيئية .

Canaliculé (F). مِخْدَاد (E).

Channelled, Furrowed (E). نمت وضي يطلق على بعض اعضاء الحشرات كالكراسل والاعواد الخيزانية التجدييد .

Narcotique (F). مِخْدَاد * ، مِشْوَم (E).

Narcotic (E). كل نبات يحوي اشباه قلبية مخدرة كالتيغ والحشاش وما اشبه .

Dominant (F). مِشْدُوم * ، مِشْدُوم (E).

Dominating, Ruling (E). هو المغار الذي ينتفع من الارتفاع .

Employeur (F). Employeur (E). مِشْدُوم (E). المخدم أو المستخدم هورب العمل الذي يستعين على عمله بالذين يستخدمهم .

2٥٩٣٠ - مِشْدَعَة ، مِشْرَمَة ، مِشْرَمَة (E). Hachoir (F). Chopping-board, Chopping-knife, Chaff-cutter (E). آلة لا قياسية الشكل والحجم تستعمل في اغراض مختلفة اخصها تقطيع اللحم وفرم ورق التبغ وفرم الجذور الخ .

2٥٩٣١ - مِشْر (E). غر الاذن : شها الزراعة . او ارسل فيها الماء لتجود .

2٥٩٣٢ - مِشْرَكِي (E). Stylée, Scylaire (F). شكل من زيات الحشرات ونصال الاوراق يشبه المِشْر .

2٥٩٣٣ - مِشْرَف * (E). Cueille-fruits (F). اداة تستعمل لقطف الفاكهة .

2٥٩٣٤ - مِشْرُوط (E). Cône (F). Cone (E).

2٥٩٣٥ - مِشْرُوطِي (E). Conique (F). Conical (E).

2٥٩٣٦ - مِشْرُوطِي الشَّكْل (E). Conoïde, Cunéiforme (F). Conoid, Cuneiform (E). نمت تعريفي توصف به الاشياء المخروطية الشكل .

2٥٩٣٧ - مِشْرُوطِيَات (E). Confères (F). فصيلة نباتية مشهورة باسم صنوبريات .

2٥٩٣٨ - مِشْرُوطِيَات المتناقص (E). Coniostres (F). رتيبة من الطيور الجوارح تشمل عدة فصائل ، اشهرها الشروشات والقريبات والقرقيليات .

2٥٩٣٩ - مِشْرُوطِيَة (E). Conicité (F). Conicalness (E).

2٥٩٤٠ - مِشْرُوزَة (E). Clapier (F). Hutch (E). مكان تربية الارانب ان يقفص او رديعة .

2٥٩٤١ - مِشْرَنِي (E). Official نمت تعريفي يطلق على كل نبات يستعمل في تركيب الادوية .

2٥٩٤٤ - مِخْبُط * ، مِخْبِن (E). Malaxeur (F). Kneader (E).

2٥٩٤٥ - مِخْبَن (E). Laboratoire (F). Laboratory (E). مكان التجربات والفحوصات والتحليل المختلفة .

2٥٩٤٦ - مِخْبَلِف الخطوط (E). Mixtiligne (F). Mixtilineal, Mixtilinear (E).

كل رسم مختلف الخطوط بين المستقيمة والمستديرة .

2٥٩٤٧ - مِخْبَلِفَات الاجزاء (E). Hétéromères (F). Heteromera (E). رتيبة حشرات من ممدات الاجنحة .

2٥٩٤٨ - مِخْبَلِفَات الاذنين (E). Hétérocardes (F). Heterocarda (E).

رتبة حيوانات من الرخويات الحدية الاماميات الخياشيم .

2٥٩٤٩ - مِخْبَلِفَات الارجل (E). Hétéropodes (F). Heteropoda (E).

رتبة حيوانات بحرية من الرخويات مملكات الارجل . فصلاتها واجناسها وانواعها عديدة جميعها شقية ، مية ، مفترسة . ملجئها الحياتي جماعي . تعيش في عرض البحر ولا تقرب الشاطئ . اصطناعها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تسبح وتزحف على ظهورها ، بطونها موجهة نحو سطح الماء || اجسامها حلالية . رؤوسها تنتهي باعظام متفاداة الطول . ارجلها زعنفية الشكل تناسب الحياة البيئية || اشهر فصلاتها الاطنطيات والبرمائيات .

2٥٩٥٠ - مِخْبَلِفَات القرون (E). Hétérocères (F). Heterocera (E).

رتبة حشرات من حرشيات الاجنحة تشمل عدة فصائل . اشهرها القزليات والتاربات والنسيقيات والحوليات والاربابيات والفتقيات والقناتلات الخ... تتميز بالوانها المتراكبة المادمة الزعاج وبقرونها الاستعمارية اللاقائية . عاداتها مجلبة بفرقة .

2٥٩٥١ - مِخْبَلِفَات الحدب (E). Hétérotriches (F). Heterotriches (E).

رتبة حيوانات دنيا من الحديات او التقيعات الهدبية .

2٥٩٥٢ - مِخْبَلِفَة الاجنحة (E). Hétéroptères (F). Heteroptera (E).


رتبة حشرات من طبقة نصفيات الجناح . فصلاتها واجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها تدريجية التطور . مملكتها متوسط القد او قصيرة . منها الجنحة والمادمة الجناح . قرونها الاستعمارية قصيرة . اعظامها ثقاة ماصة تمكها من ثقب الانسجة النباتية واعتصاص النسغ . من ميزات بعض فصائلها ما تنقله ، عند الدفاع عن النفس ، من سرائل كريمة الرائحة تخزنها في غد خاص || اشهر فصائلها : النسيقيات والقيقات والبلاريات والقياسيات .

2٥٩٥٣ - مِخْبَلِفَة النكار (E). Hétérocarpe (F). Heterocarpous (E).

نمت تعريفي يطلق على الاشجار اللاقائية الفاكهة .

2٥٩٥٤ - مِخْبَلَة ، مِزْبَلَة (E). Fosse à fumier (F). Midden-pit (E).

سفرة تصنع لجمع الزبل على اختلاف مصادره .



مِخْبَط



مِشْدَاد



مِشْرَف

وفي حرم السباد الممد لتكاثر الفطور المأكولة كالناريقون المرئي وغيره || مظهره الخارجي كتل ناعقة الشكل يضاه اللون أو صفراء تركيب طبقة الأدمة السطحية حيث تتشب خيوطها المتشابكة التي تحول دون نشوء الفاريقون وغيره || يكاتف باجتناب الاسمدة التي يملؤها العفن والاسمدة الضوئية الكثيرة المواد المنحلة التي قبل فيها التخمير .



مخشل

Rayonneur (F). Drill (E). **مخشط**
آلة تستعمل لتخطيط صفوف القرس ، راجع مخند .

Mégamètre (F). **مخطاط**
Megameter (E).
جهاز آلة يستعمل في تحديد خطوط الطول وهو شائع الاستعمال في الملاحة وفي الرصد .

Lobipes (S). Lobipède (F). **مخطاف**
طائر وحيد الجناح والنوع من عمارة العماليات وفضيلة دجاجيات الأرض . طوله نحو ٢٠ سم . ثوبه اسم الطير يعلو تنسيق وتزيين . بطنه وصدره وبطنه يبيض . رأسه أسود القشة الأبيض الحمار . عيناه مكشطان بالأسود . منقاره مقطوع الطرف . أرسافه قصيرة وقوية . أصابعه منقسمة الخطاب || يرتاد البحار والبحيرات يسبح ويصوم كطيور كفتيات القدم . قوته الحشرات والشرافيف والقشريات والروغويات والاسماك الصغيرة || الألفي تدفن في البر ، قرب الماء ، بين الأعشاب . تبيض نحو ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر من ١٧ إلى ١٩ يوماً .



مخضير لوتيا

Graphique (F). Graphie (E). **مخطط**
هو الخط البياني .

Zébré (F). **مخطط ، زَرَبِي**
Striped like the zebra (E).
نعت تعريفي توصف به الأوتاب الحيوانية المجلطة بخطوط معترضة كما في حمار الزرد .

Mandibule (F). Mandible, jaw (E). **مخطوم**
هو الفك أي فك منقار الطائر وما حضان . ج خاتم .

Mandibule (F). Mandible, jaw (E). **مخطوطات الرؤوس**
Rhynchocéphales (F).

رؤية من الزحافات يمد ظهورها إلى الأمام الثاني وقد انقرضت ولم يبق منها سوى النوع المعروف بالحذيريه الذي يعتبر أقدم الزحافات المعاصرة لأنه مثلك السبب الأول .

Lavier (F). Lever (E). **مخبل**
هو الرافعة والعتلة ، أحطابا .

Musette (F). Nose bag (E). **مخبله**
كيس صغير يوضع فيه العلف ويعلق برأس الدابة .

Acétomètre (F). **مخبال**
Acetometer (E).
الخلل جهاز يستعمل في قياس حموضة الخل . ويستخدم أيضاً لقياس التحليل .

Griffe, Serre (F). **مخبلط**
Claw, Talon (E).
ظفر سباع الطير كالبرن من سباع الرنح .

Xylomètre (F). **مخشباب**
Xylometer (E).

المخشاب جهاز يستعمل في تعيين حجم قطعة من خشب غير مستقيمة . وذلك بقياس كمية الماء التي ترسلها تلك القطعة .

Glacière (F). **مخشف**
راجع مشطبة .

Tamis (F). Sieve, Sifter (E). **مخشكة**
أداة تستعمل لفرض الحبوب والثمار والأجرام المختلفة بالنسبة إلى الحجم .

Ligneux (F). **مخشوب ، ليئي**
Ligneux, Woody (E).
يكون النبات خشبياً عندما تجمد اليافه فتكثر فيها المادة الخشبية الصلبة القاسية ، ومكسكه النبات المشي . وما بين الخشبتين يسمى النبات المخشوب أي اللين .

Eliminé (F). Eliminate (E). **مخشول**
كل حين من الحيوان أو النبات صار أبعاده لنقص في صفاته المطلوبة أو المرغوب فيها .

Fertile (F). Fat, Rich (E). **مخشاب**
هي التربة الجيدة الآتية الماددة الجلب .

Réconduteur (F). **مخشيب ، مزكيم**
Fecunder (E).
المخشب والمزكم من الحيوان أن كان يحمل طالة الاخصاب .

Barattage (F). Churning (E). **مخشط**
فرض الكتاة بمد مزحاً لإجتاح واندهام الكريات الزبدية وانفصالها عن الخيض .

Gazonnant (F). **مخشتر ، مخضوئير**
Grassy, Turfy (E).

Gazon (F). **مخشتره**
Grass, Turf, Sward (E).
أرض كثيفة المشب الأخضر الممر . راجع خضير ونضور .

Psychromètre (F). **مخشعل**
Psychrometer (E).
أداة تقاس بها رطوبة الهواء وذلك لمقارنة مقدار بخار الماء الموجود في الجو .

Eburné (F). Dentine (E). **مخشون**
المخشون اللبنيه البالج .

Mycelophthora (S). **مخضير**
جنس فطور مجهرية من فصيلة الفوطيات . يتميز بكتانده القصيرة الشعب ، الصغيرة القد ، البيضية الشكل ، اللاقياضية التجميع إذ أنها تحوي الفردية والقصية || أنواعه قليلة ، أهمها مخضير لوتيا .

Mycelophthora lutea (S). **مخضير لوتيا**
Vers-de-gris du champignon de couche (F).
نوع من المخضير وهو فطر مجهرى يعيش على المواد العضوية



مطاف

انزاعها نورية التجسيع . ثمادها تفتح لونها الى الحمره البرتقالية .

٢٥٩٧٦ - **مُحِبَّة** *Linaria commune (F).*

عقبة مشهورة باسم ليناريا عادية ، اطباها .

٢٥٩٧٧ - **مُحَلَّق** *Créature (F). Creature (E).*

كل كائن حي يدعى مخلوقاً . والمخلوقات الحية تقسم الى ملكتين مملكة الحيوان وملكة النبات || مملكة النبات تقسم نحو ٢٥٠ مليون نوعاً تنتمي الى مئات الفصائل والرتب والمصفوف || اما الملكة التقريري تختلف انواع الحيوان المعروفة فهو نحو مليون ومائة عشر ألفاً كما هو مبين في الجدول التالي .

العدد التقريبي لخلف انواع الحيوان المعروفة

Nombre approximatif d'espèces animales connues

صف	صنف	عدد الانواع	Sub-Class	Class
نقاريات	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	Insectes	Vertébrés
مفصليات	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	Arachnides	Arthropodés
فقراريات	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	Crustacés	
دعدهايات	٨٠٠٠	٨٠٠٠	Myriapodés	
رغويات	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	Mollusques	
حليقات	٨٠٠٠	٨٠٠٠	Annélidés	
حويلات طليقة	٤٠٠٠	٤٠٠٠	Bryozoaires	
فركيات	٥٧٠٠	٥٧٠٠	Echinodermes	
سلكيات	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	Némertodes (vers ronds)	
حمرجات	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	Vers plats	
ميركات	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	Cestodiers	
سليقيات	٤٣٠٠	٤٣٠٠	Spongiaires	
أركيات	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	Protozoaires	
دورات	١٥٠٠	١٥٠٠	Rocifères	
مخلف	٢٠٠٠	٢٠٠٠	Divers	
		١٠٨٠٠٠		

٢٥٩٧٨ - **مُحِبَّار** *Zymosimètre, Zymoscope (F).*

Zymosimeter (E).

المجهر جهاز تقاس بواسطته درجة اختار السوائل .

٢٥٩٧٩ - **مُحَمَّس** ، **مُحَمَّس** *الزوايا* ، **مُحَمَّس**

الأضلاع *Pentagone (F). Pentagone (E).*

من الاشكال الهندسية وبغيرها ما هو مركب من خمس زوايا او خمس اضلاع .

٢٥٩٨٠ - **مُحَمَّس** *Pentagonal*

ما كان شكله شكل الخمس .

٢٥٩٨١ - **مُحَمَّس** *Tagetes (S). Tagète (F).*

Marigold (E). Sambtume, Studentenblume (D). Tagete, Puzzoloni (I).

جنس نباتات من الثرونيات وفصيلة المركبات . انولها عديدة مظهرها بري . اوراقها لا تقياسية الشكل والارتكاز . ازهارها صفراء اللون او برتقالية . بتلاتها حلقة اللبس يفرح منها هتد اللبس رائحة مسهبة || اشهر انولها التريينية ما يلي .

٢٥٩٨٢ - **مُحَمَّس** *جِيلَة* ، **قَرَنُفُل** *Tagetes patulus (S). Tagète couffue, Œillet d'Inde, Veloutine, Passo-velours (F).*

نوع من الحمضية التريينية المشهورة . خرونها عديدة

٢٥٩٧٧ - **مُحِبَّب** *Griffe (Hort.) (F). Root (E).*

كلمة تطلق على جلور وفصوص وبجذامير بفن النباتات لقرب شبهها بالخشب .

٢٥٩٧٨ - **مُحِبَّب** *Pterospira (S).*

Ptéropsora (F). Dragon-root (E). Drachenroot-baur, (D). Pterospira (I).

عشبة طفيلية ممرية في فصيلة الخنجنيات . اصلها انبلاد الباردة . تتميز بازهارها المتعدية التجسيع الطريقة الشكل .

٢٥٩٧٩ - **مُحِبَّب** *Astragale (F).*

هو الاسطراغالوس ، من نباتات الفصيلة القرنية ، اطباها .

٢٥٩٧٠ - **مُحِبَّب** *Crassulacées (S).*

Crassulacées (E).

فصيلة نباتية من فوات الفلقتين عديدة القمالات . اجناسها وانواعها زهاء ٢٠٠ منسها نبات عشبي وبعضها جنبي . اوراقها متعاقبة حلجية صغيرة . ازهارها ، في الغالب ، عشوية وهي ابلية او هامة الارتكاز ، جيلة الشكل ، زاجية الاكوان . نباتاتها ريفية تمشي في جميع الارربة وقد تفصل القليلة الخشب .

٢٥٩٧١ - **مُحِبَّب** *دم العاشق* ، **زَرَّ حَبَنِي**

Gomphrena (S). Gomphréne, Amarantoide (F).

Globe amarant (E). Gemeiner Kugelamarant (D).

Amaranto, Amarantoide (I).

جنس نباتات عشبية مزجية من فصيلة القطيفيات . انواعها للمرة نحو ٨٠ منسها بري وبعضها زراعي . اوراقها لاطنة متعاقبة . ازهارها نورية التجسيع ، ابلية الارتكاز او طرية . اشهر انواعها التريينية ما يلي .

٢٥٩٧٢ - **مُحِبَّب** *Gomphrena haageana, G. aurantiaca (S). Gomphréne orange, Amarantoide de Haage (F).*

عشبة حولية جادسة فراءه تملو نحو ٤٠ سم . اوراقها بيضية النسل . ازهارها برتقالية اللون ، نوريتها ثلاثية الازهار الكبيرة للقد || ازهارها يستمر طولان الصيف .

٢٥٩٧٣ - **مُحِبَّب** *Gomphrena globosa (S). Gomphréne globe, Amarantoide globe, Immortelle violette (F).*

وقس (عاشق ومشرق) عشبة حولية فراءه متعاقبة تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها سنانية النسل . ازهارها بتفسيمية اللون ، نوريتها ثلاثية الازهار || ازهارها يستمر طولان الصيف .

٢٥٩٧٤ - **مُحِبَّب** *Gomphrena pulchella (S). Gomphréne gracieuse, Amarantoide gracieuse (F).*

عشبة حولية مبروتية فراءه تملو نحو ٥٠ سم . اوراقها سنانية مبيضة تملو نحو ٥ سم . ازهارها ودية اللون ، نوريتها ثلاثية او خماسية الازهار ، قطرها رايوح من ٢ الى ٣ سم . || ازهارها يستمر من الصيف الى الخريف .

٢٥٩٧٥ - **مُحِبَّب** *Sorbus aria (S). Alouchier (F). Chequer tree, Maple service, Wild service tree (E). Wilder Elsebeerbaum (D). Bacarello, Mangiolo (I).*

نوع من الصلبة وهي شجرة برية فراءه برمجية الشكل تملو من ٣ الى ١٥ م . اوراقها معتقة ، متعاقبة ، حاملة . نسلها يطول من ٦ الى ١٤ م . ويعرض من ٤ الى ٩ سم .



عشبة



مخلص



مخار



مخيلة

٢٥٩٩٥ - **مُخَيِّلَةٌ** Culture de concombres (F).
زراعة الخيار وموضع هذه الزراعة .

٢٥٩٩٦ - **مُخَيِّلٌ** Babeurre, Lait écorché (F).
Whey, Buttermilk (E).
الحليب الباقى بعد فرز قشده ، ويؤلف أيضاً بالمطووس .

٢٥٩٩٧ - **مُخَيِّلُ الْمَاءِ** Cayx
جنس طير من القريشات. أنواعه ثمانية موطنها البلاد الآسيوية.
تتميز بمناقيرها الكبيرة القند الطويلة القاعدة الحمراء اللون.
اجنحتها طويلة . أذنانها وأرجلها قصيرة . ألوانها الى
الصفحة البرتقالية . رؤوسها واجنحتها سود تعلوها نمشة
بيضاء || تألف الشطوط البحرية ويجاري الماء . قوتها
الاسماك والقشريات والحشرات عل اختلاف فصائلها .
انثاها تلد في صدف الصغور تبض من ٧ الى ٩ بيضات
تحضنها نحو الاسويين .

٢٥٩٩٨ - **مُخَيِّلَةٌ** Sébeste (F). Sébasten (E).
ثمرة الخشخشة اي اللبغ . كانت ولا تزال تستعمل في الطب
لثلاث الصدر . كما تستعمل في صناعة ديق الطير .

٢٥٩٩٩ - **مُخَيِّلَات** Cordiaceae (S).
Cordiacées (F). Cordiaces (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وأنواعها كثيرة
البلد ، أعطانها البلاد الحارة والاستوائية . أشهر اجناسها
الحطاطة المعروفة بالسجستان .

٢٦٠٠٠ - **مُخَيِّلَةٌ** Nimbus
هي السحابة ، نوع من النجوم ، اطلها .

٢٦٠٠١ - **مُدَّ**
المد ، كمال لا يقاس الجسم يختلف من بلاد الى بلاد
ومن منطقة الى منطقة في ذات البلاد . ج أمداد ومدة
ومداد .

٢٦٠٠٢ - **مُدَّاعِل** Aboutissants (F).
Bordering upon (E).
هي قطع الارض المجاورة للحد من جهة الطول .

٢٦٠٠٣ - **مُدَّاد** Piagiotrope (F).
نمت وصفي يطلق عل كل نبات نوعه يجوده اقلية
الاكتساب .

٢٦٠٠٤ - **مُدَّاد** Hemidactylus turcicus (S).
Hemidactylus verruculeux, Margouillat (F).
حيوان يربو من النطام وفضيلة الزواجات . جسمه صغير
القد يطول نحو ١٠ سم . رأسه بيضي القرون . عيانه
مستحان . اجفانه شفافة ثابتة . اذناه رافقتا الدماء
الصواني المكفوف . لسانه غليظ الطرف . ظهره مشط .
بطنه كثير الحراشف الصلبة . ذنبه سريع الانقسام .
قوائمه صلبة . اصابعه نصفية الخطاب مجرمة بلواقظ
عززة تمكنها من السير عل السقف || قوته الى الصبغة
الخطية المرقطة بالاسمن والاخير ، لكنه يفتن الخيط
الموجرد فيه || يألف الموائج الكثيرة الجارية والمساكن
الارضية . يسرح في التبار وفي الليل . قوته الذباب والبعوض
والناتك والديدان || يعتبر من الزخافات النافعة .

٢٦٠٠٥ - **مُدَّاد** Tragant (F). Running (E).
نمت تمرني يطلق عل الجلود الاقنية الاكتساب وبلى
الوق التي تفتش البرية .



خيط الماء



مُدَّاد

فوارقها لك النبات ولون الازهار . جميعها حولة تملو من
٢٠ الى ١٢٠ سم . أوراقها لا قياسية الارتكاز ، خلية
النمل . ازهارها عطرية التجميع ، تاجية . لونها الى الصفرة
للمناطرة التوشج والمواج || تنورها يستمر من تموز
الى ايلول .

٢٥٩٨٣ - **مُخَيِّلَةٌ لَامِعَةٌ** Tagetes lucidus (S).
Tagète luisante (F).
عشبة سريرية معمرة ، طرغونية الرائحة والطعم ، تملو من
٣٠ الى ٥٠ سم . أوراقها كاملة متعاقبة . نصلها ساني
الشكل . مسن الخافة ، لامع الصفرة الشديدة الخضار .
ازهارها احداق متعاقبة كالصقود . ازهارها لبنة نارية
اللون || تنورها يستمر من آب الى تشرين الثاني .

٢٥٩٨٤ - **مُخَيِّلَةٌ مَرْقُطَةٌ** Tagetes signatus (S). Tagète mouchetée (F).
عشبة سريرية معمرة تملو من ٩٠ الى ٧٠ سم . أوراقها
متعاقبة غرضية وسننة . ازهارها حلقى التجميع . ازهارها
ذهبية اللون مرقطة بالجلوي || تنورها يستمر من تموز
الى تشرين .

٢٥٩٨٥ - **مُخَيِّلَةٌ مُتَشَبِّهَةٌ ، وَرْدَةٌ الْهِنْدِ** Tagetes erectus (S). Tagète dressée, Rose d'Inde (F).
عشبة سريرية حولية تملو من ٨٠ الى ١٠٠ سم . أوراقها
لا قياسية الارتكاز ، كثيرة التشرم القدسي المسن . ازهارها
عطرية التجميع ، كبيرة القند ، لونها الى الصفرة الكبرى
اللامع || تنورها يستمر من تموز الى تشرين الثاني .

٢٥٩٨٦ - **مُخَيِّلٌ** من العيد : قشره .

٢٥٩٨٧ - **مُخَيِّلَات** Androgyne (F).
Androgynous (E).
نمت تمرني يوصف به كل نبات يحصل الازهار الذكرية
والانثوية معاً كالجزر مثلاً .

٢٥٩٨٨ - **مُخَيِّلٌ** Etouffoir (F). Extinguisher (E).

٢٥٩٨٩ - **مُخَيِّلَات** Hyalostilbaceae (F).
Hyalostilbaceae (E).
عمارة تطور مجهرية من فصيلة الكسيمييات . تتميز بأعضائها
المروائية الشفافة . اجناسها وأنواعها عديدة أعما المؤذي سبأ
قلي . أشهر اجناسها المؤذية الازارية والكيمية .

٢٥٩٩٠ - **مُخَيِّلٌ ، مُخَيِّلِيٌّ** Sensorial (F).
Sensorial (E).
نمت تمرني يطلق عل كل ما هو منسوب الى الخبيث .

٢٥٩٩١ - **مُخَيِّلٌ** Hétérogame (F).
Heterogamous (E).
نمت تمرني يطلق عل النباتات المزواجية التي تحمل زهوراً
ذكوراً واناثاً في تزويج واحد . راجع هيزن .

٢٥٩٩٢ - **مُخَيِّلٌ** Epidiascope

٢٥٩٩٣ - **مُخَيِّلٌ** Sensorium (F). Sensorium (E).
الخبيث مركز الحواس في الدماغ اي انه المركز الذي يتلقى
الاحساس وينظمه .

٢٥٩٩٤ - **مُخَيِّلٌ ، مَدِّيٌّ ، مَهْوٍ** Lait mouillé (F). Milk and water (E).
هو الحليب المولب بالماله .

٢٦٠١٧ - مَدَاهِين صَفْصَالِي الرُّزَى *

Helianthemum salicifolium (S). *Hélianthème à feuilles de saule* (F). Willow leaved rock-rose (E). *Sonnenröschen, Citröschén* (D). *Elantemo* (I).
بجلة سروية تملو من ١٠٠ إلى ١٢٠ سم. فروعها منفردة مسترسلة. أوراقها مستطيفة صفيحية الشكل. أزهارها حثكولية التجميع، محورية الإرتكاز، ولونها إلى الصفار اللهبلي اللامع تملو ريشة أرجوانية || أزهارها يستمر من أيار إلى آب.

٢٦٠١٨ - مَدَاوَاة (F). *Traitement* (F). *Treatment* (E).
هي المعالجة، أطبها.

٢٦٠١٩ - مَدَّسَب ، مَدَّسَب (F). *Acuminé* (F). *Acuminate* (E).
لعت تعريفى توصف به أعضاء النبات والحشرات التي تنبت على شكل الحمة وينتهي.

٢٦٠٢٠ - مَدَّيَكَة ، مَدَّيَكَة (F). *Tannerie* (F). *Tannery* (E).
لعت تعريفى توصف به أعضاء النبات والحشرات التي تنبت على شكل الحمة وينتهي.

٢٦٠٢١ - مَدَّيَة (F). *Délai* (F). *Delay, Time* (E).
٢٦٠٢٢ - مَدَّكَرَات (F). *Entélégyes* (F). *Entelegyna* (E).
فتة من العناكب تتميز بهيئتها المركبة من ثمان زلثم وبالنسبوات الشَّوَارِبَة المذرة عند الذكور والاناث.

٢٦٠٢٣ - مَدَّجَج ، مَدَّجَج (F). *Notacantha* (F). *Notacanthus vulgaris* (S). *Notacanthus commun* (F). *Common Notacanthus* (E).
جنس اسمك بحرية يعيش من فصيلة المدججات. أنواعه المعروفة قليلة منتشرة في جميع بحار العالم. أجسامها مستطيلة الشكل مدنية، تملو من ٢٠ إلى ٤٥ سم. رؤوسها مقبوضة، أعظامها متقبضة صلبة. عينها مستديرة بارزة. زعانفها الظهرية مؤلفة من ٦ أشواك حادة. أنفها إلى السمرة الرصاصية يملوها مزاج اسفنج. لحونها مأكولة متوسطة الصنف.

٢٦٠٢٤ - مَدَّجَج مَدَّوَل ، مَدَّجَج مَدَّوَل (F). *Notacanthus vulgaris* (S). *Notacanthus commun* (F). *Common Notacanthus* (E).
سمكة بحرية يعيش من فصيلة المدججات ورتبة ثلاثيات الزوائد. أصلها منظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ونها البحر الأبيض المتوسط. تتميز من اسمك اللثاق المتوسطة الفمور || جسمها سطوي الشكل، مستطيل الذنب، متعدل التتبطيع، يطول نحو ٤٠ سم. ثوربا إلى السلطة الرصاصية السفاه الموج. ظهرها شاذية السمرة. بطها باحت الخضاب. رأسها شارف الجبهة. متقبض الخطر، صغير الفم، قصير الشفق المريض. أسننها صغيرة، ذرية. عيناها صغيرتان، بارزتان. حذقة عيناها سوداء لامعة. زعنفتها الظهرية كثانية من ستة مناسخ متتابة منطقة، شاذكة. الصدرية تساهية الشع السرة. الخوضية بطنية الإرتكاز، سباعسية الشع. الفرعية مستطيلة، غيبقة، تمتد حتى طرف الذيل ويتقدمها تسعة مناسخ حادة الأطراف. ذيلها عديم الزعفة، دقيق الطرف || لحنها متوسط الصنف، مأكول.

٢٦٠٢٥ - مَدَّجَجَة (F). *Poulailier* (F). *Hen-house, Hen-roost* (E).
هي ذرية الدجاج المشيدة وفقاً لقواعد الفن والمغتفيات الصحية.

٢٦٠٠٦ - مَدَكَاكَة (F). *Verminière* (F).
حفرة يربى بها الديد الذي يحمل علماً السمك.

٢٦٠٠٧ - مَدَكَر ، مَدَكَر (F). *Orbite* (F). *Orbit* (E). *فَلَك* (F).
طريق الكوكب السيار.

٢٦٠٠٨ - مَدَكَاكَة ، مَدَكَاكَة (F). *Orbitale* (F). *Orbital* (E). *وَقَبَة* (F).
المدارة عظم سير الجرم المتحرك.

٢٦٠٠٩ - مَدَكَاكِي ، مَدَكَاكِي (F). *Orbital* (F).
نعت تعريفى يطلق على كل ما له صلة بسير الجرم المتحركة.

٢٦٠١٠ - مَدَكَاكَة (F). *Oenologia* (F). *Oenology* (E).
كل سمكة تعيش بين الصخور لا تبعد عنها قلبي مدالة.

٢٦٠١١ - مَدَكَم (F). *Vin* (F).
هو الخمر والتبذير وأين الحانة وأين اللذ.

٢٦٠١٢ - مَدَكَاكَة (F). *Oenologia* (F). *Oenology* (E).
هي علم الخمر، علم يبحث في صنع الخمر وسفطها.

٢٦٠١٣ - مَدَاَن (F). *Eau salée, Eau de mer* (F). *Sea-water* (E).
الماء الملح، ماء البحر.

٢٦٠١٤ - مَدَاَن (F). *Plectranthus* (S). *Plectranthus, Germaine* (F). *Plectranthus, Chinese basil* (E). *Hahnensporn* (D). *Plectrantho* (I).
جنس نباتات جنينية مسرة عطرية من فصيلة الشفويات. أنواعه زهاء ٤٥ معظمها بري ومنهافها بزيتي. سوقها فروعها تملو من ٦٠ إلى ١٥٠ سم. فروعها غيبقة الانفرج زياء اللحاء. أوراقها كاملة متقابلة مستطيفة. نصلها قلبي الشكل، مسن الحافة، خلي البشرة حسل صفحية. أزهارها صغيرة القد زرقاء اللون حثكولية التجميع فواصة العرف المستعبد الذي يفر منه العث.

٢٦٠١٥ - مَدَاهِين ، زَهْرَة الشَّمْس (F). *Helianthemum* (S). *Hélianthème* (F).
جنس نباتات جميلة مسرة من فصيلة اللاذنيات. أنواعه عديدة، معظمها بري منه الجبال والحضاب ومنهافها بزيتي. يزرع بين الصخور. سوقها فروعها. فروعها مستطيلة. أوراقها لا قياسية الإرتكاز والشكل. أزهارها صغيرة القد متعددة الألوان. وهو يرغب في المواقع الجافة وفي الماراض الجنوبية الكثيرة الفصح || أحرف أنواعه وأشهرها ما يلي.

٢٦٠١٦ - مَدَاهِين شَالَع (F). *Helianthemum vulgare* (S). *Hélianthème commun* (F). *Herbe d'or* (F). *Sun-rose, Common rock-rose* (E). *Echtes Sonnenröschen* (D). *Panacea, Chironia, Erbo d'oro* (I).
نوع من المدايين، فروعه الزرقاء عديدة، تملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. فروعها مستطيلة. أوراقها متقابلة أذنية. نصلها بيضي الشكل يطول من ١٠ إلى ٤٠ سم. ويرض من ١٥ إلى ١٥، أزهارها بسيطة أو مكسية تعرض من ٤ إلى ٤ سم. ألوانها عديدة تختلف باختلاف الفروغ منها الأصفر والأبيض والوردي والأحمر || أزهارها يستمر من أيار إلى آب.



مَدَاَن



مدايين شائع



مدايين صفيافي الروق



متج مَدَّوَل

تنقيش وتكوير عند الطاب . بعض اجناسها أورد والبعض الآخر جزئي التستين || أشهر اجناسها التاتو والتاتوزيه والعبار .

Forme d'élevage (F).

٢٦٠٢٦ - مَدِينَة ٥

Rearing farm (E).

هي المزرعة المخصصة لتربية التوابين من أي جنس كانت، وهي تشمل الأرض وما عليها من أبنية ومعدات .

٢٦٠٤٢ - مَدِينَة ٥

Crocethia alba (S).

Corcori des sables (F). Sanderling (E).

طائر من طوال الساق القواطع وفضيلة الزنقاقيات . مشاه بعض شطوط البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر . مصيفه شطوط البحار الشمالية . قوته البندان والقشريات والرخويات التي تلتفها الأمواج || جسمه صغير القد يطول نحو ١٨ سم . ثوبه الصيفي إلى السوداء تلوو رقعة صناعية يتخللها الأبيض في الرأس والرداء والجناح والذنب ، صدره إلى الشقعة ، بطه أبيض . منقاده وساقه إلى السمرة السوداء . ثوبه الشتوي إلى الوردية في الرأس والرداء والجناح والذنب وإلى الأبيض الناصع في الصدر والبطن . الأني تتصل بنفس القرب || يذئن انغمسه في الرمال . الأني تحضن بيضها من ٢ إلى ٤ بيضات . الترسيم يستمر نحو ١٧ يوماً .



مدنية

٢٦٠٤٣ - مَدِينَة ٥

دوية تلجج كالتنكيرت (اللسان) .

٢٦٠٤٤ - مَدِينَة ٥

Tropisme (F). Tropism (E). شلجوز مرضي في نمو بعض اعضاء الاجسام الحيوانية والنباتية تتركز فيه وتوجهه بعض العوامل الخارجية كالنور والحرارة والصقيع والاختفاء .



مدريون

٢٦٠٤٥ - مَدِينَة ٥

Déversoir (F). Overflow, Wasta-Weir (E). المدسق المكان الذي يفيض منه الماء المعبور .

٢٦٠٤٦ - مَدِينَة ٥

Henicopus pilosus (S). Henicope poilu (F).

Henicopus pilosus (E).

حشرة وأشعة قانصة من فصيلة المملحات ورتبة مفدمات الاجنحة . تألف البراري والمقاول المزريرة . غناصها تعيش على رسيق الاذوار وبلاجاتها . يرقاتها تعيش تحت لحاء الاشجار وفي الاغصان النخرة ساعة وراء اساريع الحشرات الخائبة لاقتناصها || جسمها صغير القد ، كثيف الزغب والحلب ، يطول من ٧ إلى ٨ سم . لونها إلى السمرة السوداء . رأسها مستعرض الجرم . حينها صغيراتان بارزتان . زياناها غيبطيان مستطيلان . ظهورها مستدير الطرف اللامع ، تحيل التحزيز الشدي . ارسافها خالصة المقل || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الحشرة الجالطة في ايار وتبقى حتى اواخر تموز . تحسح في التار . تسالده بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع . تمكن ميمادياً تحت لحاء الاشجار وشوردها ويحث الانفاض وفي الجالطة والعليل || البرقة عند بلوغها الادراك التام تعطيل من ١٢ إلى ١٤ م . جسمها أسطواني الشكل . مستطيل الرأس ، اسمر اللون الكادمي ، صديي الازواج التحيلة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوماً يتقضي في آخر سرداب دخلته البرقة .



مدشاة زبا

٢٦٠٤٧ - مَدِينَة ٥

Requérant, Demandeur (F). Plaintiff, Pétitionner (E).

٢٦٠٤٨ - مَدِينَة ٥

جوزة التانجيل المرفقة من لها يغترف بها .

Notacanthidae (S).

٢٦٠٢٧ - مَدِينَة ٥

Notacanthidae (F). Notacanthidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شالكت الزمانف . اجناسها المرفقة اربعة اشهرها المدج .

Pondolr d'autruche (F).

٢٦٠٢٨ - مَدِينَة ٥

Nest of ostrich (E).

انفوس تحفزه القفوس اي النعامة الاثني في الرمل . قطره نحو ١٠٠ سم . وعقه نحو ٣٠ سم . تضع فيه من ١٢ إلى ١٨ بيضة تحفها بمناوبة الظلم .

Rechaussement (F).

٢٦٠٢٩ - مَدِينَة ٥

عملية زراعية قوامها حفر جذع الشجرة او ساق الشتلة للتعدي بقليل من التراب لحماية .

Fumivore (F).

٢٦٠٣٠ - مَدِينَة ٥

Smoke-consuming (E).

نعت تعريفي يطلق على كل جهاز يختص الدخان فيحرقه .

Polypter (F). Polyp (E).

٢٦٠٣١ - مَدِينَة ٥

مجوفة من المديح تعيش على قاعلة كلسية واحدة .

Provision (F).

٢٦٠٣٢ - مَدِينَة ٥

Provision, Store (E). المذخر هو اللخيرة ، اطلبها .

Apport (F).

٢٦٠٣٣ - مَدِينَة ٥

Lactigène (F).

٢٦٠٣٤ - مَدِينَة ٥

Lactigenous (E). كل ما ينشأ القدر وزيد من قدره .

Tubérigène (F).

٢٦٠٣٥ - مَدِينَة ٥

نعت تعريفي يطلق على الجين المدرة الشكل .

Glàbe, Morte de boue (F). Glàbe, Sod, Clod (E).

٢٦٠٣٦ - مَدِينَة ٥

الكثلة من التراب المماسك .

Galéa (F).

٢٦٠٣٧ - مَدِينَة ٥

هي المكناة ، الملبها .

Processus (F). Process (E).

٢٦٠٣٨ - مَدِينَة ٥

انطور التدرجي النتج المتتابع .

Batteuse (F).

٢٦٠٣٩ - مَدِينَة ٥

Threshing-machine (E).

آلة ميكانيكية تستعمل لدس الحنطة والشعير .

Armadille (F).

٢٦٠٤٠ - مَدِينَة ٥

هو التاتو ، سوان صفن الجلد المدرع ، اطلبه .

Dasypodidae (S).

٢٦٠٤١ - مَدِينَة ٥

Dasypodidae (F). Dasypodidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة . اجناسها وانواعها المرفقة عديدة ميمها ملحقة بدروع عظمية وفقرافية حزامية التركيب

Dopé (F). Doping (E). **مَدْمُوش** ٢٦٠٦٤
من اجترع للمشفة ان كان انساناً او جرّح الفشة ان كان حيواناً .

Cuverie, Cuvier (F). **مَدْكُفَة** ٢٦٠٦٥
السرداب او البناء الذي تحفظ فيه دنان الخمر .

Pommelé (F). Dappled (E). **مَدْكُر** ٢٦٠٦٦
شبه من شيات الخليل وهو ان يكون في شعر الفرس لكت تخالف سائر لونه .

Oléomètre (F). **مِدْهَكَان** ، **مِدْزِيَات** ٢٦٠٦٧
Oleometer (E).
جهاز تقاس به كثافة الادمان والزيوت .

مَدْهَوْب ٢٦٠٦٨
Nécrolique, Nécrotique (F). Necrotic (E).
المدهوب من الثبات ما كان مصاباً بالذهب اي النخر .

Orbiculaires (F). Orbicular (E). **مِدْوَكَار** ٢٦٠٦٩

Spesule rose (F). **مِدْوَاس** ٢٦٠٧٠
هو الملاحقي ألودي، طائر من طول الساق ، اظله .

Trochanter (F). **مَدَوَّر** ، **مِدْوَر** ٢٦٠٧١
عضو يجمع الحرقلة الى الخلف .

Cyclomètre (F). Cyclometer (E). **مِدْوَر** ٢٦٠٧٢
جهاز يستعمل لقياس الدوائر .

مَدْمُوس * ، **مَدْوَر** ، **قَرَجَ الْبَحْر** ٢٦٠٧٣
Medusa (S). Méduse (F). Medusa, Jelly-fish (E).
الواحدة ملوسة وملوسة . جلس حيوانات حلالية بحرية .
انواعها واشكالها عديدة تلعب فيها الاستدارة .
الوانها تراوح من الاصفر الباهت الى الازرق الساجوني .
وهي تفسف في الليل وتبدو في بعض الظروف والحالات
شفافة كالزجاج . واذا ذهرت من شي قلقت برشاش نافط
يلامع ككشرا النار . اشهر انواعها قنديل البحر ورثة البحر .

مَدْمُوسِيَّات ٢٦٠٧٤
Méduses (F). Medusae (E).
حيوانات حلالية بحرية صغيرة القد تنتمي الى عدة فصائل
واسمها ملوسة .

مَدْمُوكَة ٢٦٠٧٥
Madoqua (F).
جلس غياة افريقية متوحلة القد ، ريمة الجسم ، جميلة
الشكل ، حنلية الثوب ، مستطيلة الاذن ، قصيرة الذنب .
انثاها جهار . قرون ذكورها صغيرة القد ، مبطلة القواعد
المتنامية الحيدة . مائة الاطراف المستديرة المدببة .
انزواها المعروفة ستة . اصطناعها شامة الاطراف تمتد من
تمام البحر الآخر الى السوداء والحيفة والصيلان وركبها .

مَدْمُوكَة ٢٦٠٧٦
Médulla (F). Medulla, Pitch (E).
اسم يطلق على كامل الملكة انثائي ، الداعلي والخارجي .

مَدْمُوكَة ، **دَوْمِي** ٢٦٠٧٧
Dolomitique (F). **دَوْمِي** (E).
Dolomitic (E).
نمت تعريف ي يطلق على ما كان تركيبه الدولوم .

Plaignant (F). **مَدْمُعي** ٢٦٠٤٩
Plaintiff, Complainant (E).
هو من رفع تلامته او دعواه امام المحكمة .

Défendeur (F). **مَدْمُعي عليه** ٢٦٠٥٠
Defendant (E).
هو الذي ترفع عليه الدعوى .

Conjugues (F). **مَدْمُعَمَات** ٢٦٠٥١
Conjugate (E).
فصلة نباتية من رتبة الخفيات الخضر . اجناسها وانواعها
عديدة ، جميعها من نباتات المياه العذبة ، تتميز باشكالها
الطيطية المادمة الفروع .

Alléomorphe (F). **مَدْمُعُوش** ٢٦٠٥٢
نمت تعريف ي يطلق على الصفات للنباتية المتناظرة المخططة .

Amont (F). **مَدْمُلق** ٢٦٠٥٣
Up-stream, Up-river (E).
يلتقي او حالية النهر هي الجهة التي تصدر عنها المياه
الجارية . يقابلها المنسحب .

Enfouisseur (F). Burier (E). **مِدْقَنَة** ٢٦٠٥٤
هي المطرقة ، أداة تضغط الى اغرات فتريه الزبل في التلم
ليطردو مقلب اغرات .

Légende (F). Legend (E). **مِدْقَال** ٢٦٠٥٥
تفسير ما في رسم او خارطة من حروف وعلامات وتصاوير
والوان الخ .

مِدْقَة ٢٦٠٥٦
Pistil
هي طرف المتاع اي عضو الانثوي في الزهرة . وهي حدة
ادراكها تفرز مواد لزجة تمكن جنونات الطلع من
الاتصاف بالخصاب .

مِدْقِي ٢٦٠٥٧
Pistillé (F). Pistillate (E).
صفة الاثمار السعيدة التي المهزلة بملقات اي اعضاء
انثوية .

مِدْقَال ، **أَلْدِيس** ٢٦٠٥٨
Indices (F). Index (E).

مِدْقَة ٢٦٠٥٩
Piscansie (F).
Plantation of plane-trees (E).
غابة الدلب والارض الكثرة الدلب .

مِدْقِج ٢٦٠٦٠
Hérison (F).
هو القنفذ ، اظله .

مِدْقَال ٢٦٠٦١
Cordon du maçon,
C. du charpentier (F). String, Strand (E).
للملك هو حبل البناء والتجار . وقد شاع استعماله للدلالة
على ساق الحجارة البنية .

مِدْقَة ٢٦٠٦٢
Râteau (F). Raie (E).
اداة تنهي بحشية ممتدة تتصلها اسنان من حديد كدم
بها التربة أي تسوى .

مَدْمُعي ٢٦٠٦٣
Fluvatile (F). Fluvatile (E).
نمت تعريف ي يطلق على كل حيوان يعيش في المياه العذبة .
وعلى كل نبات يعيش فيها او ينبت على ضفافها ويربها .



مدقة



ملوس



مدوكة

Dichogamie (F).

Dichogamy (E).

تفاوت زمن الإندراك التناسلي الذي يحصل بين الأعضاء الذكورية والانثوية في تنور بعض النباتات.

Coursier très rapide (F).

٢٦٠٨٩ - مدآقي

الفرس السريعة جداً .

٢٦٠٩٠ - مدآله * ، مدآق * ، مدآق * ، مدآق *

Centetes ecaudatus (S). Tanrec commun (F).

Tanrec, Tenrec (E).



مدآق

حيوان لين حاشى وحيد الجنس والنوع من فصيلة الخنازير . موطنه جزيرة مدغشقر . يألف المناطق الجبلية حيث تكثر السراخس . سرعته دجوي . قوته البدن والحشرات وبعض جلود الثبات في جسمه مكرهم صمغوي يطبخ نحو ٤٠ سم . رأسه شبه غروبي الشكل ، مستطيل انحر . فكك الأعلى يتقدم الأسفل . عيانه صغيرتان . أذناه مستعرضتان . ذنبه ماسح لا وجود له . جرابونه قصيرة . أصابعه قوية . الظفر عجيبة ، حادة الأطراف . لديه قصير تتخلله مسال ذرية الأطراف متباعدة الطول والشحانة تكثف الرأس والفتق ولجج الظهر حتى الكفل . يياته الشثوي يستمر نحو خمسة أشهر . جمره نقي مستطيل يحضره في التربة في الاتق ثورود تضع في كل ربع من ١٥ إلى ٢٥ جرأ .

Centetidae (S).

٢٦٠٩١ - مدآلييات *

Centetidés (F). Centetidés (E).

فصيلة حيوانات لينة حاشرة . اجناسها وأنواعها قليلة العدد أصلاتها جزيرة مدغشقر . اجسامها صغيرة ، مكرمة ، منقبضة ، أطعمها مستطيلة جرابونها قصيرة . أطرافها قوية ، ذرية . بعضها كثيف الوريد الناعم ، قصير الذنب أو مستطيل والبعض الآخر ماسح الذنب أو عاده ، هلي الوريد وتطو سعال متباعدة الشحانة والظفر . احرف اجناسها المذلل والميلد والميرق والميكروفال والمينغال .

Gobe-mouches (F).

٢٦٠٩٢ - مدآيكاب *

هو أكاك الذباب ، اطليه .

Muscipédée (S).

٢٦٠٩٣ - مدآيكابيات *

Muscipédée (F). Muscipédée (E).

فصيلة طير من الجرايم السليبات المتأخر . أنواعها نحو ٣٧٥ جميعها من المصانير الصغيرة لقد . أصلها تشيل تحتفظ مناطق المسال القديم . تألف النباتات والحداق والجائز . قوتها الحشرات اعصها الذباب .

Aetal, Vesta (F). Are (E).

٢٦٠٩٤ - مدآيح هريخ *

الملح المريح كوكبة نجوم جنوبية الملح مركزها تحت ذنب المغرب في عدد نجمها ثمانية منها ثلاثة من المرتبة الثالثة .

Terre nue (F). Naked land (E).

٢٦٠٩٥ - مدآحالة *

الارض البور لا شجر فيها .

Gézer (F).

٢٦٠٩٦ - مدآر *

To spoil, To damage (E).

مذرت البضة : فسدت فهي مذرة . والجوزة كذلك .

Polype (F). Polyp (E).

٢٦٠٩٨ - مدآيخ *
جنس حيوانات بحرية من الحفوات . أنواعه عديدة . أشكالها الكائيات . أفرازها كلسي المادة سريع التحجير تعيش عليه وفي دأله .

Barbotage (F). Mess, Mash (E).

٢٦٠٩٩ - مدآيد *

شراب مرطب للدايج يرتكز حل اللينق وبعض النخالة .

Cynanchum (S).

Cynanche, Cynanque (F). Scamony plant (E). Roter Hundswürger (D). Scamones (I).

جنس نباتات مدادة من فصيلة السقليات . أنواعه عديدة منتشرة في جميع أصقاع العالم . معظمها بري وبعضها ترابي . سوقها مدادة عطلة يستخرج منها عصارة لينة طيبة . أوراقها متفقة متقابلة مزراية النصل . أزهارها خالصة التركيب ، صوبوانية التجميع ، محورية الإزتكاز . احرف أنواعه واشهرها المدية العطل .

Cynanchum Indicum (S).

٢٦٠٨١ - مدآيد عطير *

Cynanche odorant (F).

جنية مصورة متسلقة تطول نحو ٣٠٠ سم . ساقها وريصها عطرية للحاء الحليط . أوراقها مستطيلة الاثناق . نصلها خلي الصندقة يطول نحو ١٤ سم . ويرف نحو ٨ . أزهارها جرسية الشكل ، صفراء اللون ، عطرية الرائحة اللبية بالياسمين . أزهارها يستمر من اواسط تموز الى اواسط آب .

٢٦٠٨٢ - مدآيكه *

Turbo (S).

Turbo, Sabot (F). Turbo, Turban-shell (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدييات الارجل وفصيلة المدييات . أنواعها المعروفة قليلة العدد أصلها بحار البلاد الحارة . أصلها كبيرة القد ، متسائكة ، محززة الاغقاب ، لؤلؤية الصفحات الداخلية ، فسيحة الفتحات شبه المستديرة . لحومها مأكولة وأصلها صناعية .

٢٦٠٨٣ - مدآيكيات *

Turbinidae (S).

Turbinidés (F). Turbinidés (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مدييات الارجل أمانيات الخياشيم . اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والاستوائية . أصلها غليظة متسائكة لؤلؤية الصفحات الداخلية بعضها يشبه المدمة والبعض الآخر يشبه المداس . احرف اجناسها واشهرها المدية والدرعية والنبهية .

٢٦٠٨٤ - مدآيين *

Débiteur (F). Debtor (E).

هو في الشمول من يجب عليه تنفيذ الالتزام وفي التخصيص من كان عليه الدين .

٢٦٠٨٥ - مدآيئية ، مدآلوب *

Débit (F). Debit (E).

هو ما على المرء من حساب ودين أو ما هو مطلوب منه .

٢٦٠٨٦ - مدآخير *

Intestins (F).

Intestine, Bowel, Gut (E).

هي الامعاء . يقال ملأت الدابة مدآخيرها .

٢٦٠٨٧ - مدآع *

Porc-épic à queue blanche (F).

هو الشحم الأبيض الذنب ، اطليه .

الى الصفرة يطولها تجذع مترشح لا قياسي الشكل اسود اللون . روشنها الخلفيان مذهبان وبهتان بالاحمر والاسود . تظهر في اوائل الربيع ، تمتع مكها على اوراق اللوز والذرايق والحوخ والكرز فينفق عن رقات غاصلة تلثم بعض اجزاء الاوراق .

٢٦١٠٧ - مِذْرَبَاب مَكُون * ، مَكُون *

Papilio machaon (S). Machaon, Grand porte-queue (F).

فراشة كبيرة القد من عارة المذانيات . جسمها اسود اللون . بسطها لا تقل عن ٧٥ سم . وراشها الى الصفرة يطولها تجذع وتبيج وتنسيق وتسليج متراكبة الاوان يكتر فيها الاسود والاسود والاحمر . روشنها الخلفيان مذهبان . تظهر في اوائل الربيع . تمتع مكها على اوراق الجوز والكرز فينفق عن رقات تعيش على الاوراق فتلتهمها .

٢٦١٠٨ - مِذْرَبَابِيَات *

Papilioninae عارة حشرات من فصيلة الفراشات ورتبة سرغيفيات الاجنحة صرغيفيات اللون . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . منتشرة في جميع بلاد العالم . فراشاتها منوعة القد وكبيرة . اقواها متباينة الالوان الغامقة . اشهر اجناسها المذانيات والمذباب والميضام .

٢٦١٠٩ - مِذْرَبَاب *

Comète (F). Comète (E). كوكب طالع منتقل تلبه بحافة مضيفة . حركة دورانه حول الشمس مستطيلة المدار || مد المذانيات المرفوعة حتى الآن يتاح ١٥٠٠ اشهرها « مذنب هالي » الذي يظهر كل ٧٦ سنة وقد ظهر عام ١٩١٠ ويظهر ايضا عام ١٩٨٦ .

٢٦١١٠ - مِذْرَبَاب *

Urodèle (F). Urodela (E). نمت تعريفي يطلق ، في علم الحيوان ، على كل دويبة او يرقة او اسروع مجنوة بذنب او بزايدة تشبه الذنب .

٢٦١١١ - مِذْرَبَابِي *

Sperme (F). Sperm (E). هو نبي الحيوان عامة ، راجع في .

٢٦١١٢ - مِذْرَبَابِي ، حَالَة *

Solvant (F). Solvent (E). مذيب

٢٦١١٣ - مِذْرَبَاب *

Dissolvant (F). Dissolvent (E). مذيق ، مَصْفِيْر ، مَهْو

Lait mouillé (F). Whey (E). اللبني وغيره والمهو ، مزيج من اللبن والماء .

٢٦١١٥ - مِرْ * ، شَوْكَة *

Croc, Trident (F). Hook, Trident (E). اداة تستعمل في الزراعة لقلب التراب .

٢٦١١٦ - مِرْ *

Amer (F). Bitter (E). نمت يطلق على ما كان طعمه ضد الحلو .

٢٦١١٧ - مِرْ *

Myrrhe (F). Myrrh (E). صمغ راتنجي يستخرج من سوق شجر المر . قال الدكتور بزي مفتاح في احياء التذكرة عن الانطاكي ما سرهني : وهو السرى في المقالات وهو معروف يسيل من شجرة للغرب فيجعد قطعاً الى حرة صافية . منه ما يسه على سلق الشجرة وقد وجد كالجواهر وهذا هو المر المعروف بالبطارخ لانه يحساكي بعض السمك في دسوته وسفرته

٢٦١١٧ - مِذْرَآة * ، مِذْرَبِي *

Fourche (F). Fork, Pitchfork (E). اداة من خشب او حديد تلوى بها الحنطة ويرفع بها الكلا والزريل وغيرها .

٢٦١١٨ - مِذْرَبَة *

Semoir (F). هي المبر .

٢٦١١٩ - مِذْرَب *

المذرع من الخيل والبرص وسائر الدواب من كانت امه اشهر سلاله او عرقاً واجيد اصلاً من ابيه .

٢٦١٢٠ - مِذْرَبِي ، مِذْرَبِي ، مِذْرَبِي *

Mouillage (F). Soaking, Wetting (E). هو المزج بالماء كغسل اللبن بالماء فهو مذيق وغيره .

٢٦١٢١ - مِذْرَبِيَة *

Polyphyllie (F). Frenching (E). علة جمهورية قليلة الاذن شاملة في جميع بلاد العالم تسمى التيغ تشقو تصالداوراته وتقضي على صفه || مظهرها الخارجي اصفرار في الاوراق يبدأ من حافة الصل ويقتصر تدريجياً نحو الداخل الى ان يتاح الصلغ فينبو الورقة صفراء النسيج ، غضراء الصلغ والعروق ، رافعة الوثن الخشن || وفي حال اشتداد العلة فانها تسبب وباط الشلة وتراكب الاوراق التي تصبح مذمرقة ، مستطيلة اتصال الضيقة ، متصبية الأطراف ، ملتوية الرؤس || اسبابها الرئيسية عديدة وبشابة اعصها قلبية التربة وفقره وطوبها وضمت بعمرها الازوتي وقلة موادها الضوية وصيرها الجريسي || يقول العالم « ستينبرج » ان المذرة علة مجنبة فيضان خاص يفرزه تفتور تربي يصب باليوس مريوس . وان هذا اللبنا الذي يسبب اختلال الايض الازوتي في النبات ينشك تكرون الحواض الامينية اللطيفة التي تحدث هذه الشوائب او تقود اليها .

٢٦١٢٢ - مِذْرَبِي ، مِذْرَبِي *

Adulte (F). Adulte (E). من دخل في الدور الثاني من حياته وهو الدور القام بين الفترة والشينوخة .

٢٦١٢٣ - مِذْرَبِيَة *

Mémoire (F). Memorandum, Bill (E). عرضة تفصيلية تسرد وقائع القضية واسبابها وما آلت اليه .

٢٦١٢٤ - مِذْرَبِي *

Treuil (F). Treva (E). آلة تربط بها احيوانات الكيرة لتقل تسهل مداواتها .

٢٦١٢٥ - مِذْرَبَابِيَة *

Papilio alexandor (S). فراشة متوسطة القد من عارة المذانيات . جسمها اصفر اللون يطول غط مستعرض قاطب اسود . بسطها نحو ٦٥ سم . وراشها الى الصفرة يطولها تجذع اسود اللون مختلف الاشكال والاجسام . روشنها الخلفيان مذهبان وبهتان بالاحمر || تظهر في اواخر الربيع ، تمتع مكها على منظم نباتات الفصيلة الصيرانية فينفق عن رقات غاصلة تعيش على الاوراق فتلتهمها .

٢٦١٢٦ - مِذْرَبَابِيَة *

Papilio podalirius, P. sinon (S). Flambe (F). فراشة متوسطة القد من عارة المذانيات ، جسمها حنطي اللون يطول غط قاطب اسود متقطع عند مؤخر الظهر ثم يعد فيطو البطن الى الترج . بسطها نحو ٦٥ سم . وراشها



مِذْرَآة



مِذْرَبَابِيَة



مِذْرَبَابِيَة



مِذْرَبَابِيَة



مِرْ

وسهوكه وليس بالريدي. ومنه ما يصير فيسيل ماء ثم يجمد ملأ إلى السواد ويحكى اللمبة السائلة ويسقى للرجل الجاني وهو دين الثاني || وهو دكن عظيم في المرامم والاكمال على اختلاف أنواعها. وهو ينفع سائر التلذات والصداخ...

يكتسل به فيحل المدة وغلظ الجفن، ويزيل القرد بلن التلس. والقرقة بماه الورد والحلية. ويصل سائر القروح اذا نثر فيها وقت غسلت قبله بماه لسان الحمل. ويشه اللثة ويزيل قيرسها ووجعها الانسان بالمر بالمر والزيت مضغمة. والسعال ووجع الظهر. وشربة القصبه استحلوا في اللث. ووجع الكبد والكلى، والنفاس والنفاس ثربا خصوصا مع الترس والافستين. وامراض الارصام خصوصا الصلبة والذئب حتى يحاله ولو جاء الاس. ويلحم الفتق اذا تموي عليه ويحل عرق النسا والمفاصل والقرص مطلقا. ويزيل نثر الابط بالثب وصف الشعر. وانتاره بانفسر والاددن ووجع الاس، والقراق بالصل، والتاليل والاثار كلها. دماغه ينبت شعر الاجفان وينرم نفسه شام ويغسل الحق طلاء يوم من اللوز المر ينفع في امراض الاذن، ومع التسع امراض الانف، وهو يفسر اللثة وينسقط الاجفة ويصلحه السل ورشبه الى ثلاثة ويده فلفل او قسط او جذبا دسر.

٢٦١١٨ - مر * Commiphora myrrha (S). Commiphora, Arbre à myrrhe (F). Myrrh tree, Myrrha (E). Myrrhenbaum (D). Albero del mirra (I). نوع من البلسان من فصيلة البخوريات. شجرته صغيرة القند شائكة، يقطر الصمغ من ساقها على شكل دموع حواء اللون شاحبة مفيضة. اوراقها مستطبة مركبة ثلاثية الوربقات. اغشائها غارها حطرية الرائحة النفاذة. صمغها جيد الصنف شائع الاستعمال الطبي.

٢٦١١٩ - مر افريقي Commiphora schimperi (S). Commiphora d'Afrique (F). African myrrh tree (E). Echar Myrrhenbaum (D). Albero del mirra d'Africa (I). نوع آخر من المر، اصله البلاد الافريقية يكثر في الجزائر ومراكش. شجرته صغيرة القند شائكة. يستخرج من ساقه صمغ رائحته الماده جيد الصنف صناعي اللون، شائع الاستعمال الطبي.

٢٦١٢٠ - مر حبشي * Commiphora abyssinica (S). Commiphora d'Abyssinie (F). Coarse myrrha (E). Afrikanischer Myrrhenbaum (D). Commifora (I). نوع من المر، اصله الحبشة وسائر افريقية الشرقية وبجزيرة العرب. شجرته صغيرة القند شائكة. ثماره مجسم الجوز كانت ولا تزال تستعمل في بعض المستحضرات الطبية. صمغ رائحته الماده جيد الصنف ياتي به المر الافريقي جودة.

٢٦١٢١ - مر اسبغ Mésayer (F). Mézayer (E). هو من استعمل الارض بالزراعة، اغلب مزارع.

٢٦١٢٢ - مرأة مسكسكة Andromède (F). Andromeda (E). المرأة المسكسكة كوكبة نجومها قرب القطب الشمالى. عدد نجومها ٥٩ اشهرها ثور الرأس واسرة والقدم ورجل بالقرب من هذه الكوكبة سديم لولبي اكتشف عام ١٩١٢ يبعد عن الارض نحو ٨٠٠٠٠٠ سنة ضوئية وقطره نحو ١٠٠٠٠٠ سنة ضوئية.

٢٦١٢٣ - مرأكلة * Enflourage (F). طريقة صناعية لاستخراج العطر تركز على مرث الازهار في الدهن او الشمع.

٢٦١٢٤ - مروح Etable (F). Scabie (E). هو ماوى البقر والقنم واللغز وسائر الثواب، اي موضع واسهنا في الليل.

٢٦١٢٥ - مروح Centauree étoilée (F). هو القنطريون النجمي، اغلب.

٢٦١٢٦ - مروح Vésicule biliaire (F). Gall-bladder (E).

٢٦١٢٧ - مروح Amertume (F). Acerbité (E). وصف ميكروبي يترى اغمر فيفسدها به ان يهيب طمها اذ يجمعه مر اللذاق.

٢٦١٢٨ - مروح الحنث * قنطريون صغير، قصة الحية * قنطريون طوفور

Erythra centaurium (S). Erythrae centaurée, Petite centauree, Herbe à la fièvre (F). Earth-gall, Centaury, Fever wort (E). Eches Tausendguldendrücke (D). Centaurea minore, Blondella, Caccie-febbre (I).

نوع من الاريتريا وهو نبات عشبي بري حولي طلي صغير القند. ساقه فروع مستقيمة. اوراقه متقابلة صغيرة. نصلها ضيق الصفحة، حلي البيرة، اطلس اللون، شديد المرارة || يستعمل منه في الطب القنم الزهرية والاوراق. وهي مقوية المعدة دافعة للحصيات. ويحفز منه متفوق حاتم يستعمل في حالات زيادة الحموضة والقرحه المعديه او المعوية ذلك لان هذا النبات يحوي بعض الاصلاح القلوية بنسب كبيرة لها منافعها الطبية.

٢٦١٢٩ - مروح الصخاري Chicotin (F). هي الخنظل، اغلب.

٢٦١٣٠ - مروح * Ophonus sabulicola (S). حشرة من فصيلة المربليات. طولها يراوح من ١٤ الى ١٧ مم. رأسها وكسولها الى التمرة السوداء. عندها الى الزرقة الصفراء يعلوها موانع اشعر || تكثر في الارثة الكلية. تركب ازهار نباتات الفصيلة الصبوانية وتلتهم البذور منه تكويها || يقاها عاقلة قليلة الاذى.

٢٦١٣١ - مروح * Chirotauthis (S). Chirotauthis (F). Chirotauthis (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات واسيات الارجل وفصيلة المراسيات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطاه بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || اجسامها شبه وشية الشكل. زعانفها مستديرة طرفية الاوتكانز. رؤوسها اسطوانية. عينها كبيرة صامخة. ثمانية من جرائزها طليقة صعبة متقاربة الطول واثنان شديدا الطول عادتا الحامض تنهبا برسى سنانية الشكل.

٢٦١٣٢ - مروحيات * Chirotauthidae (S). Chirotauthidae (F). Chirotauthidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات واسيات الارجل، ثنائيات الخياشيم، عشاريات الجرامز. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق المحيط الاطلسي



مر



مرأة الحنث



مراس



مراس

تينة اللون صناعية. اوراقها غليظة وصلبة || كانت قشور المران تستعمل استعمال الكينا قبل معرفتها وهي معرفة غافضة للحرارة. أما الاوراق فتفيد الفوصة والقرص. احرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٦١٤١ - **مران أبيض** * Fraxinus alba (S).
Frêne blanc, F. d'Amérique (F). American white ash (E). Amerikanische Weissasche (D).
شجرة سبروتية باسقة تملو من ٢٠ الى ٤٠ م. منهاها امريكية الشالية. اوراقها تطويل نحو ٣٠ سم. وريقاتها تده من ٧ الى ٩ ، نصلها ساني الصلصة بطول ١٥ سم. ويعرض ٥ سم. وهو اطلل اللون مدبب المقصة سنن الحافة. ازهارها حشوكي، طرفي وبحوري الارتكاز ، بطول نحو ١٠ سم. ازهارها بيضاء اللون.

٢٦١٤٢ - **مران أحمر** * Fraxinus pubescens (S).
Frêne rouge (F). American ash, Red ash (E). Amerikanische Rotesche (D). Frassino rosso americano (I).
شجرة سبروتية تملو من ١٢ الى ١٨ م. وريقاتها تده من ٧ الى ٩ ، نصلها أخضر اللون يحمر في الخريف وهو ساني الشكل مدبب المقصة ، سنن الحافة بطول نحو ١٢ سم. صفحته السفلى خلية البشرة. ازهارها حشوكي، طرفي وبحوري الارتكاز، بطول نحو ١٥ سم. ازهارها نضقية اللون.

٢٦١٤٣ - **مران أسود** * Fraxinus nigra (S).
Frêne noir, F. à feuilles de sureau (F). American black ash (E). Amerikanische Schwarzasche (D). Frassino nero (I).
شجرة سبروتية جميلة الشكل، تملو من ١٠ الى ٢٠ م. غراحيها خضر نمشة بالاسود. وريقاتها تده من ٩ الى ١١ ، نصلها بيضي الشكل ، لامي الانتشابه، صان الخضار. ازهارها حشوكي التجميع ، كبير القد. ازهارها نضقية اللون.

٢٦١٤٤ - **مران ذرب الورق** * Fraxinus oxyphylla (S). Frêne oxyphylle (F).
شجرة متوسطة القد تملو من ١٠ الى ١٥ م. براصها الى الشقة السفاه المواج. وريقاتها تده من ٧ الى ١٣ نصلها سناني الشكل ذرب الزوام الاعير، صفحته السفلى خلية البشرة. ازهارها حشوكي التجميع طرفي الارتكاز. ازهارها بيض.

٢٦١٤٥ - **مران شامخ** * Fraxinus excelsior (S).
Frêne élevé (F).
اكبر انواع المران واشهرها واسرعها نمو واعمرها. عجيته سبروتية تملو من ٣٠ الى ٤٥ م. غراحيها اسطوانية، براصها سيد. وريقاتها تده من ٩ الى ١٥ ، نصلها ساني الشكل، سنن الحافة. ازهارها حشوكي التجميع، طرفي الارتكاز وبحوري. ازهارها بيض يطويها مواج أخضر. يستخرج من سوطها بالخر من لا بأس به سكري الحليم يحوي نحو ٧٠ ٪ من المنبت.

٢٦١٤٦ - **مران شائع** * **مستقي** * Fraxinus ornus (S).
Frêne à fleurs, F. à manne, Orne commun (F). Manna-ash, Flowering-ash (E). Blumen Esche, Manna Esche (D).
شجرة سبروتية مبلولة تملو نحو ١٥ م. فروصها حر

والبحر الابيض المتوسط || اجسامها شبه وشية الشكل او جرابية. زعانفها مستديرة طرفية. رؤوسها مستطيلة. عيينها كبيرة ماحمة. جرابها لامتناهية الطول والشكل || اعرف اجناسها واشهرها المران والمرس.

٢٦١٤٧ - **مرشش** * Spinax (S).
Spinax (F). Spinax (E).
جنس اسماك بحرية مفترسة من فصيلة المرششيات. انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة ، شبه وشية الشكل. اعطامها ذلقة شارفة. اسنانها متشارية ، حادة تقطع كل شيء. جلودها مهيبة. زعانفها كبيرة. الذيلية لامتناهية الشطرين || اشهر انواعه واعرفها المرشش الاسود (S. niger) الذي يحبب البحر الابيض المتوسط.

٢٦١٤٨ - **مرشكة** * Mulch
مواد مضوية مختلفة اغصبا الورق والقص تقش على التربة لحفظ رطوبتها ولتبع تكاثر اعصابها الطوية ولوقايتها من قسوة البرد.

٢٦١٤٩ - **مرششيات** * Spinacidae (S).
Spinacidae (F). Spinacidae (E).
فصيلة اسماك بحرية مفترسة من الاشلاق. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. اصنامها يحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جميعها وشية الشكل ، متباينة القد والحجم. منها الصغير والوسط والكبير || اعطائها شرسة ماحكة ، لا تمر بسكة الا فقسبتها الى شطرين.

٢٦١٥٠ - **مرشكة** * Plaidoirie, Plaidoyer (F).
Pleading, Speech for the defence (E).
المرافعة هي عرض وقائع الدعوى ومطالب المتقاضين شفهيا امام القاضي. وهي حق يحوز القانون لكل متقاض.

٢٦١٥١ - **مران** * المراق نجم ثير من كوكبة الدب الاكبر.

٢٦١٥٢ - **مرشكة** * Doimétrie, Titrage (F).
Doimetry, Titration (E).
فن قياس التركيز والاضلاط.

٢٦١٥٣ - **مرشعري** * Kobus (S). Cobe, Kob (F).
جنس حيوانات لبونة من الفيلد الكبيرة لقد. انواعه حسة اصنامها البلاد الافريقية. اجسامها منسجمة القوام طرفية الشكل تملو من ١٧٠ الى ٢١٠ سم. وتعلو من ١٤٠ الى ١٥٠ م. اذوابها الى الخطي الاجهر المواج ومنها البلقا. للذكر منها قرنان كبيران لولبيان. أما الانثى فبها عني رباعية الاختلاف. اصغر قدما من الذكر || يالفت النسيب والتأبات ويهاوي الماء. اجله يراوح من ١٥ الى ٢٥ نفرا.

٢٦١٥٤ - **مران** * **لسان المصفر** * Fraxinus (S). Frêne (F). Ash-tree (E). Esche (D). Frasio, Frassino (I).
جنس اشجار حرجية ويزينة من المرانيات وفصيلة الزيتونيات. انواعه عديدة منها الجنيات والشجيرات والاشجار الباسقة. اوراقها مركبة وريفة متعاقبة عابلة. ازهارها حشوكي. ازهارها بيضاء اللون او نضقية. ثمارها جناحية. براصها سيد. لحاء سوطها واغصانها الى الريفلة السمراء. اخشابها



مرشش



مرامري



مران امر



مران شامخ

٢٦١٥٥ - **مُرَيْكِيَّو** (E). Epigé (F), Epigenous (E).
تنت تمرني يطلق حل البزور التي ترتفع زياراتها عنه
الانتاش فوق سطح التربة .

٢٦١٥٦ - **مُرَيْكَاة** (E). Lais (F), Saddle (E).
المرواة . ج. مراب . هي الشجرة الباقية عند قطع الغابة .



مران شائع

٢٦١٥٧ - **مُرَيْج** (E).
طائر من طير الماء قبيح الهيئة (الجاحظ) .

٢٦١٥٨ - **مُرَيْد** (E).
المربد هو حبس المواشي . وفي الحديث « انه تيمم بمربد
النم » . وهو الفضا وراه البيوت يرتفع به . وهو الموضع
الصالح لتجفيف الثمر .

٢٦١٥٩ - **مُرَيْض** ، **صَيْرَة** (E).
Enclos pour caprine et ovine (F), Paddock (E).
حظيرة الغنم والماعز .

٢٦١٦٠ - **مُرَيْج** (E). Carré (F), Square (E).
شكل حتمسي قائم الزوايا المتساوية الاضلاع .

٢٦١٦١ - **مُرَيْج الزَوَايَا** (F).
Quadrangulaire (F), Quadrangular (E).

٢٦١٦٢ - **مُرَيْج الزَوَايَا والمثلث** (F).
Tétragone (F), Tetragon (E).

٢٦١٦٣ - **مُرَيْج مُتَحَرِّف** (F).
Trapèze (F), Trapezium (E).
مربع متوازي القاعدتين الكبرى والصغرى .

٢٦١٦٤ - **مُرَيْكَاة** (E).
Confitures (F), Preserve (E).
المربيات هي الثمار المخبوزة بالسكر .

٢٦١٦٥ - **مُرَوَّ** (E).
وبقلة تنفطر حل الارض لها ورق مثل ورق الخندباء
او ارض ولها لوزة صفراء واروية يفضاء وتقطع مع اروبها
فصل ثم تترك بالملح والمليز ولها طبخة صيرة « (من ابي
حنيفة) » ج مر وأسوار .

٢٦١٦٦ - **مُرَوَّ** (F).
Heron gollath (F).
هو الباشون الجبار ، الطليه .

٢٦١٦٧ - **مُرَيْكَاة** (F).
Lichophage (F).
هو المحجار ، طليه .

٢٦١٦٨ - **مُرَيْكَاة** (E).
Vivarium (F), Vivarium (E).
المرتق قصص لانياس الطويل والعرض والارتفاع ، غالباً
مزيج او مغلف بشرط ضيق التناوب ، يشتمل لتربية
الحيوانات والحشرات .

٢٦١٦٩ - **مُرَيْكَاة** (E).
Fastigié (F), Fastigiato (E).
تنت تمرني يطلق حل الفروع النباتية المرتفعة الاطراف
نحو الغلاء .

٢٦١٧٠ - **مُرَيْكَاة جَوِّي** (F).
Anticyclone (F), Anticyclone (E).

٢٦١٧١ - **مُرَيْكَاة البيض** (F).
Superovariée (F), Superior ovary (E).
تنت تمرني يطلق حل اثمار النباتات المرتفعة المبيض
من فئة النباتات المتعاليات .

الحساء ، صفر التمشيح . وريقاتها تعد من ٥ الى ٩ ،
نصلها اعليجي الشكل يطول نحو ٩ سم . ويمرض نحو ٥
تسنية مستدير الاطراف ، ازهارها حركوي ، طري ،
لبد التجميع ، يطول نحو ١٥ سم . ازهارها بيضاء اللون .
يستخرج من سوقها باخر من لا بأس به يحوى ٧٢ %
من النيت .

٢٦١٤٧ - **مُرَان صِينِي** (S).
Fraxinus chinensis (S), Frêne de Chine, Orne de Chine (F).

شجرة سبروتية زينة مهدا الصين تملو من ١٢ الى
١٥ م . براعمها سود في الشتاء حمر في الربيع . وريقاتها
تعد من ٥ الى ٧ ، نصلها اعليجي الشكل يطول نحو ١٤
سم . ويمرض نحو ٦ سم . حروفه بارزة ، تسنية متشاري .
ازهارها حركوي طري يطول نحو ١٨ سم . ازهارها بيضاء
اللون ، ثمارها جلوية .

٢٦١٤٨ - **مُرَان كثير الزهر** (S).
Fraxinus floribunda (S), Frêne floribond, Orne florifère (F), Bitter-ash (E).

شجرة سبروتية مهدا الهند تملو من ١٠ الى ١٢ م .
وريقاتها تعد من ٧ الى ١٣ ، نصلها سناني الصنفه يطول
نحو ١٥ سم . ويمرض نحو ٥ وهو مالم البشرة ، دقيق
التسنية الحاد . ازهارها حركوي طري يطول نحو ٢٥ سم .
ازهارها بيضاء اللون فراء الملاج .

٢٦١٤٩ - **مُرَان مُعْيِيَّي الْوَرَق** (S).
Fraxinus parvifolia (S), Frêne rhomboidale, Orne de Bunge (F).

جنية زينة سبروتية مهدا الصين تملو نحو ٢٠٠ سم .
وريقاتها تعد من ٣ الى ٧ وهي معنية الشكل تطول نحو
٤ سم . وتعرض نحو ٢ ، نصلها سنن الخالقة ، عتقا
مزغير الحساء . مثلكها الزهرية طرية لا تكثر تطول من
٥ الى ٧ سم . ازهارها بيضاء اللون .

٢٦١٥٠ - **مُرَان مَشْشُورِيه** (S).
Fraxinus mandshurica (S), Frêne de Manchourie, F. du Japon, Tamo (F), Japanese ash, Tamo (E),
Japanese Esche, Tamo (D), Fraxino giapponese, Tamo (I).

شجرة شائعة تملو من ٢٥ الى ٣٠ م . مهدا منشوريا .
فروعها رباحية التصلح . وريقاتها تعد من ٧ الى ١١
نصلها ضيق الصنفه ، مدبب القمعة ، مستطيل المتق،
ياحت الحصار البحري . ازهارها حركوي التجميع مستطيل
الشكل . ازهارها يفض ، خضر الملاج .

٢٦١٥١ - **مُرَاة** (F).
Frénale (F), Ash-grove or plantation (E).
مترس المران او حجرة المران .

٢٦١٥٢ - **مُرَاةِيَّات** (F).
Fraxinées (F).
سبط من فصيلة الزيتونيات اشهر اجناسه المران .

٢٦١٥٣ - **مُرَاةِيْن** (F).
Fraxinea, Fraxine (F).
خلوكوزيه يكثر ريجوده في غاء المران . ويسيد ايضاً في
غاء القندل الهندى . يستخرج من الحساء يده تقمها بالماء
ولطائها . ثلوره ايزي الشكل ابيض اللون . طسه مر
حريف . يلوب في الماء وفي الكحول .

٢٦١٥٤ - **مُرَاة** (F).
المرب : الارض الكثيرة النبات .



مران كبير الزهر

٢٦١٨٢ - **مرتقيشية *** Martynia (S), Martynie (F).
جنس نباتات عشبية من المرتقيات. أنواعها قليلة، جميعها أمريكية المنبت منها البرية ومنها الزينية. أوراقها مدققة لا قياسية الشكل والارتكاز. أزهارها جميلة القالب، زاهية الألوان، لا نظامية التجميع والارتكاز. ثمارها جرداء مقرنة الاطراف. احرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٦١٨٣ - **مرتقيشية حويطة** Martynia annua, M. diandra (S), Martynie annuelle (F).
عشبة حولية زباه غدية لزجة تملو من ٤٠ الى ٥٠ سم. أوراقها مدققة متقابلة قلبية الشكل، نصلها خلي البشرة لخامس التنسبن. ازهارها بيض القنأة أرجوانية الاطراف. ثمارها بيضية مالة تثبت زائدة متقادية الشكل قصيرة. ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين .

٢٦١٨٤ - **مرتقيشية غوطوية** Martynia proboscidea (S), Martynie à trompe, Bicornes trompe d'éléphant, Cornes, Ougles du diable (F).
عشبة حولية زباه لزجة تملو نحو ٩٠ سم. أوراقها مدققة متقابلة قلبية الشكل، نصلها مستطيل الزنأد خلي الصفحة المتصعة المستعرضة التنسبن. ازهارها كبيرة القد، موعجة القنأة، غائرة الاطراف الخامسة التفريغ. قناتها البيضاء الاصفر المواج يطو تنمش اخضر واجر. اطرافها مويجة بالبنفسجي يطو مواج أرجواني. ثمارها غوطوية الشكل تطول نحو ١٥ سم. || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٦١٨٥ - **مرتقيشية صفراء الزهر** Martynia lutea (S), Martynie à fleurs jaunes, Bicornes jaunes (F).
عشبة حولية زباه لزجة تملو نحو ٦٠ سم. أوراقها متقابلة، مدققة، قلبية الشكل، مستديرة الطرف. نصلها خلي البشرة مسن أخلة. ازهارها عنقودية التجميع ملحية اللون يطوها عند انقشاه مواج أحر || ازهارها يستمر طوال شهر آب .

٢٦١٨٦ - **مرتقيشية عطرك** Martynia fragrans (S), Martynie odorante, Bicornes odorante (F).
عشبة حولية زباه لزجة تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. أوراقها مدققة متقابلة ثلاثية القوس. نصلها خلي الصفحة المتقاربة التنسبن. ازهارها عطرية، بنفسجية اللون، أرجوانية اللوحة، منقضية التجميع. ثمارها تطول نحو ١٢ سم. ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٦١٨٧ - **مرتقيشية ككية** Martynia craniolaria (S), Martynie craniolaire, Craniolaire (F).
عشبة زراعية حولية زباه غدية تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم. أوراقها مدققة متقابلة ككية الشكل مسنفة الحافة. ازهارها بيضاء اللون كبيرة القد تطول نحو ٨ سم. ثمارها كبيرة كروية المصافير، غوطوية الزائدة. جلودها حزنانية الشكل، مأكولة ورتب .

٢٦١٨٨ - **مرتث، حرمي** Macération (F), Macération (E).
نقع جسم صلب في الماء او في سائل آخر ليئين او لاذابة بعض اجزائه الكيادية .

٢٦١٧٢ - **مرتقي، حادام** Dominé, Servant (F).
المرتقي والمرتقي به. هو الذي عليه حق ارتفاق لمعار آخر .

٢٦١٧٣ - **مرتقي** Dominant (F).
المعار المرتقي او المخدم هو الذي ينتفع من الارتفاق .

٢٦١٧٤ - **مرتك، مرتك، حرداسنج** Litharge, Protoxyde de plomb cristallisé (F), Litharge (E).
هو بروكسيد الرصاص المنصهر المتبلور البرتقالي اللون .

٢٦١٧٥ - **مرتكب الجنحة، حمرم** Délinquant (F), Delinquent, Offender (E).
هو الذي يرتكب فعله يعتبرها القانون الجنائي جنحة يعاقب عليها .

٢٦١٧٦ - **مرتقيشية *** Mertensia (S), Mertensia (F), Blue-bells (E), Lun-genwurz (D), Mertensia (I).
جنس نبات من فصيلة المحسبات مقود التمرير باسم الطيب مرس (١٧٦٤-١٨٣١). أنواعها المروفة ١٥، جميعها عشبية مسرة. اصلها البلاد الممتدة الحارة. أوراقها كاملة متقابلة. نصلها مويجة بندق شفاة. ازهارها عنقودية التجميع. تويجات ازهارها انبوبية الشكل. اشهر انواعها الزينية ما يلي .

٢٦١٧٧ - **مرتقيشية لحيانية** Mertensia echinoides (S), Mertensia vipérine (F).
عشبة من المرتقيشية تملو نحو ٤٠ سم. ساقها وقروصها مزينة للحاء. أوراقها سنانية الشكل، نصلها خلي البشرة حل مسطح. ازهارها كثيفة التجميع متوسطة القد لوناً الى الزرقاء المابقة || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٦١٧٨ - **مرتقيشية سيبرية** Mertensia sibirica (S), Mertensia de Sibirie (F).
عشبة عشبية من المرتقيشية تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها وقروصها مسرة. أوراقها قلبية الشكل مدققة، نصلها ناعم النسيج المتجمع. ازهارها بنفسجية اللون متصبة. ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٦١٧٩ - **مرتقيشية حنكولية** Mertensia paniculata (S), Mertensia paniculée (F).
عشبة من المرتقيشية تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم. ساقها وقروصها مهدبة للحاء. أوراقها سنانية التصل المستطيل القوس. تنورها حنكولي التجميع بخلاف سائر أنواع جنسها. ازهارها الى الزرقاء الليلية. تويجها خلي الصفحة، مسن أخلة. ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٦١٨٠ - **مرتقيشية فيرجينية** Mertensia virginica (S), Mertensia de Virginie (F).
عشبة من المرتقيشية تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. ساقها وقروصها حريلقة. أوراقها اهليلجية مقطوعة تطول من ١٠ الى ١٥ سم. وتعرض من ٥ الى ٨ سم. ازهارها كبيرة القد متعالية، لوناً الى الزرقاء الجميلة. ازهارها يستمر من اذار الى حزيران .

٢٦١٨١ - **مرتقيشيات** Martyniaceae (S), Martyniacées (F), Martyniaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقين حديدية القمالات. اجناسها وانواعها قليلة المند، اشهرها المرتقيشية .



مرتسية



مرتسية

Pageau, Pagel (F).

٢٦٢٠٠ - مرآة

هو الفولاذي، جنس سمك من فصيلة الاسبوريات .

Zoanthaires (F).

٢٦٢٠١ - مرآة زهرية

Zoantharia (E).

رنية حيوانات بحرية عديدة الفصائل والجناس . جميعها جسمية الافراز كالمرجان، مداخلها فسيحة الانبعاث تتكون منها الشعاب والمستمرات والجزر .

Corallaires (F).

٢٦٢٠٢ - مرآة نباتات

شعبة حيوانات بحرية من صف المحرقات .

Berberidopsis corallina (S).

٢٦٢٠٣ - مرآة نباتية

Berberidopsis coral (F).

جنبة ترينية ممرية من فصيلة النضيات . ساقها سرعية الفروع مسلسلة تلطو من مترين الى ثلاثة أمتار . اوراقها ابيدة، متعاقبة، معتقة، قليلة الشكل . نصلها جامد الصفحة الامة ، ملتبس التسنين الشاك . انزوارها عقودي التجميع ، طري الارتفاع . انزوارها تسامية البتلات والفصل ، سيادية الاسدية ، مرجانية اللون ، كروية الشكل ، متدلية || تنورها يستمر طوال فصل الصيف .

Coralline (F).

٢٦٢٠٤ - مرآة نباتية

شعبة تدعى ثور الماء ، اطلبه .

Chaudière, Culseur,

٢٦٢٠٥ - مرآة

Ebouillanteur (F). Copper, Boiler (E).

لدر كبير من النحاس او الحديد يملئ فيه الماء .

Fronde (F). Sling (E).

٢٦٢٠٦ - مرآة

هي الصفحة السفلى من نصل ورقة البرسيم حيث توجد الحفاق . وقد تستعمل بصيغة الجمع فتدل على مجموعة الصفحات السفلى من اوراق البرسيم الواحد .

Praticulture (F).

٢٦٢٠٧ - مرآة

المربوطة علم يبيث في زراعة المروج والمراعي .

Praticole (F).

٢٦٢٠٨ - مرآة

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة او طائر او حيوان ملأه المروج .

Emergnula (S).

٢٦٢٠٩ - مرآة

Emergnule (F). Emergnula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مملوآت الانبيل امانيات الخياشيم الحلقية وقصيلة الصديديات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠ منها ٤٠ منتشرة في بحار البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش على الصخور قرب الشطوط || اصداؤها شبه مخروطية الشكل ، مضطحة السطح المحززة اقلية || اجسامها شبه بيضوية الشكل ، رمية الاربدة الفضفاضة ، صغيرة الرؤوس ، كبيرة العين الجاحضة القائمة على قواعد اللواس انماحية . لولاسها قصيرة ، مخروطية . اربطها وحيدة مستعرة ، ملطقة بزوائد انبوية الشكل .

Eplir (F). To ear (E).

٢٦٢١٠ - مرآة

مرح ائزود : مخرج منبله .

Egare (F). Whaznoe (E).

٢٦١٨٩ - مرآة

رف مستقل لا يستند الى سائط ، ج مرآة .

Couvoir (F).

٢٦١٩٠ - مرآة ، محضن

Incubator (E).

مطر في سلة او في صندوق وما اشبه ترعى فيه الدجاجة الرقاع، حضنتها . وهو ايضا بناء تجمع فيه الحواضن والحضانات .

Nez (F). Nosa (E).

٢٦١٩١ - مرآة

المترجم والمترجم الانف وقد كثر اسناده الى الحيوان . ج مترجم .

Faire paltre (F).

٢٦١٩٢ - مرآة

To graze, to feed, to tend (E).

مرج الدابة : ارسلها رعى في المرح .

Prairie (F).

٢٦١٩٣ - مرآة

Meadow, Grass-land (E).

ارض نسبية معشوبة ينبت فيها العشب طويلا او يبار وتمرح فيه الماشية او يحش ويحش . نباتاته مختلفة وعديدة اشيعها من القطنيات والنباتات . والمرج قد يكون :

Prairie artificielle (F).

مرآة صناعية

Artificial meadow (E).

تركز اعشابه على القطنيات كالبرسيم والفضة والباكية . .

Prairie naturelle, Pré (F). Meadow (E).

مرآة طبيعية

وهو المرج المعروف بالرعى او المتجمع .

Prairie temporaire (F).

مرآة مؤقتة

Temporary meadow (E).

هو الذي لا يبقى اكثر من بضع سنوات وتكون اعشابه من النباتات والقطنيات .

Pré-verger (F).

٢٦١٩٤ - مرآة

Orchard-meadow (E).

مرج طبيعي غرس فيه شجر مشعر كالاجاص والتاح للاستفادة من العشب والثمار معاً .

Piézographe (F).

٢٦١٩٥ - مرآة

Piezograph (E).

المرباج جهاز يستعمل في قياس القوى الامتزازية وضغطها .

Faneuse (F). Hay-making (E).

٢٦١٩٦ - مرآة

اداة تستعمل في تقليب الاعشاب المحشوة اجتناباً لسطها وتبديلها في جلفانها .

Sonde (F).

٢٦١٩٧ - مرآة

هو السبار ، اطلبه .

٢٦١٩٨ - مرآة

Séismographe, Stmographie, Trommètre (F).

Seismograph, Tromometer (E).

آلة تسجيل الهزات الارضية بما في ذلك مدة الزلازل وصفه .

Corail (F). Coral (E).

٢٦١٩٩ - مرآة

حيوان بحري من المنخ المحرقات وهو من الحيوانات الركية التي تعيش راحة على صخور واعشاب القاع . انزوارها جسمي حديد الالوان يكثر فيه الاحمر الغروي (المرباجي) من عايق وباهت . والاسود والابيض . اما الابيض فنادر الوجود .



مرآة



مرآة



مرآة



مرآة

٢٦٢٢٢ - مرذ قوش ، مرذ كوش ، مرذ قوش ،
مرذ كوش ، ريشان د اود ، سمسق
Majorana (S), Marjolaine (F).

نبات عشبي صري بري وزراعي من فصيلة الشفويات .
انواعه عديدة جميعها مخشبة زياه اللحاء . اوراقها لا
نظامية . ازهارها سنبلية التجميع . يستخرج من اوراقها
وازهراها عطر صناعي شائع الاستعمال || اعرف انواعه
وازهرا ما يلي .

٢٦٢٢٤ - مرذ قوش بستاني *

Majorana hortensis, Origanum majorana (S), Mar-
jolaine des jardins, M. à coquille (F), Knotted mar-
joram, Sweet marjoram (E), Echter Majoran (D),
Maggiolana (I).

بجلة ممرعة تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . ساقها فراء .
فروعها منفردة . اوراقها منقطة كاملة اهليلجية ، نصلها
خلى البشرة على سفحتها . ازهارها بيضاء اللون او وردية .
وهو نبات طبي ينفع من اضطراع ويمس الزكام كليا
استعمل . طيبه يخل ارباع الصدر والربو والسعال ويسقي
النفس . ويقال انه يفت الحصى ويادر البول . دهنه
يلعب العرشة والفالج .

٢٦٢٢٥ - مرذ قوش وزري

Majorana onites, Origanum onites (S), Marjolaine
onites (F).

بجلة مبلولة طيبة ممرعة تملو نحو ٣٠ سم . ساقها فراء .
فروعها منبسطة . اوراقها لائحة اهليلجية . نصلها مسنن
الحافة ، خلي البشرة على سفحتها . ازهارها سنبلية التجميع
وردية اللون . منافقها الطيبة لا تختلف عن منافع المردقوش
البستاني .

٢٦٢٢٦ - مرذ كوش احمر ، قوبسة مهيجمة

Horminum (S), Hormin, Horminelle (F), Common
age, Annual clary (E), Buntschopsalvei (D), Orm-
ino, Salvia ormino (I).

بجلة برية طيبة مبلولة ممرعة من فصيلة الشفويات . تملو
من ١٥ الى ٣٠ سم . ساقها عادمة الفروع . اوراقها
غنية ، سفلية ، تملو من ٣ الى ٦ سم . وتعرض من ٢
الى ٥ . ازهارها ثورية التجميع ، ابطية الارتكاز ، زرقاء
اللون || اوراقه وازهرا تنفع الامعاء وتبيج الحامض .

٢٦٢٢٧ - مرذ ك ٥

Radula, Radule (F).

المردل نصل قرني المادة تملو اسنان صغيرة متساوية
الترتيب المترس . وهو من اعضاء الجهاز الهضمي عند
الخزغويات باستثناء صفيحات الخياشيم . اما وظيفته فسحق
الغذاء .

٢٦٢٢٨ - مرذلة مُعَصِّبَة *

Mordella fasciata (S), Mordelle bandé, Mordelle
à fascies (F), Mordella fasciata (E).

حشرة واشمة غاشلة دامتة من فصيلة المردليات ورتبة
منفصلات الاجنحة . تألف البراري التي تكثر فيها
الصيولاتيات ، غنائها تموش على بتلات الازهار واوراق
النبات . يرقاتها تعيش على المواد النباتية المنحلة والصلابة
نحو الاضلاع || جسمها صغير القند يملو من ٥ الى ٧ سم .
لونها الى السواد الدايق يملو في عهديه زرجان من البقع
البيضاء . راسها مستعرض الجرم ، قصير الخلف . منهاها

Guitare (F).

٢٦٢١١ - مرشح

سمكة بحرية تنس غضايط ، اطلمها .

Sérial (F), Seral (E).

٢٦٢١٢ - مرشحلي

نمت تعريف يملو ، في علم التنوخ اي في علم اثر
البينة ، على طود من اطوار المتعاقب النجي في النبات .

٢٦٢١٣ - مرشح

شجر سريع الوري يقتتح به ؛ الواحدة عرشة (اللسان).

Détendeur (F).

٢٦٢١٤ - مرشحء

Pressure reducer (E).

جهاز يستعمل لتخفيف ضغط الغاز . ج مرشح .

Microchirus (S).

٢٦٢١٥ - مرشحيرة *

Microchire (F).

جنس اسماك بحرية من رتبة المسارات وفصيلة جانبيات
السم . ازواعها المعروفة قليلة جميعها من اسماك البحر
الايض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || اجسامها
مسطحة مفلطحة شبة بسلك موسى . زعانفها الظهرية
قائمة تمتد من الخلف الى قاعدة الذيل . زعانفها الصدرية
والخلفية شديدة الصغر . زعانفها الشرجية تقابل الظهرية .
اما الذيلية فستتدور الشكل || اشهر انواعها واغرها :

٢٦٢١٦ - مرشحيرة صفراء

Microchirus luteus (S), Microchire jaune (F).

مولتها معظم مناطق البحر الابيض المتوسط . جسمها يملو
نحو ١٢ سم . لونها الى الشبة الصفراء يملوها موج ذهبي ||
لحمها فاخر الصنف ، مرغوب فيه .

٢٦٢١٧ - مرشحيرة مرزوقة

Microchirus variegatus (S), Microchire panaché (F).

مولتها تمتد من البحر الابيض المتوسط الى المحيط الاطلسي .
جسمها يملو نحو ١٥ سم . لونها الى الشبة الصفراء
تملونها زونقة سواء تمتد الى الزعانف || لحمها فاخر
الصنف ، مرغوب فيه .

Effeuiller (F).

٢٦٢١٨ - مرذ

To strip of leaves (E).

جذ التقصيب او الشجرة من الورق .

Intérêt (F).

٢٦٢١٩ - مرذ ، مرذلة

راجع فائدة .

٢٦٢٢٠ - مرذء

Arbre dépourvu de feuilles, Terre dépourvue de
plantes (F).

المرداء : الشجرة لا ورق عليها . والارض الخالية من
النبات .

٢٦٢٢١ - مرذاس ، مرذس

Cylindre compresseur (F), Compressor cylinder (E).

Litharge (F).

٢٦٢٢٢ - مرذك سنج

هو المركب اي بر وكسيد الرصاص .



مرشحيرة



مردقوش بستاني



مردقوش احمر



مرذلة مُعَصِّبَة

٢٦١٣٢ - مِرْدَوِيَّاتُ Mouche des narcisses (F).

حشرة من الذباب مشهورة باسم سرفيد البرجس .

٢٦١٣٣ - مِرْدَوِيَّاتُ Vanne (F). Sluice, Water-gate (E).

٢٦١٣٤ - مِرْدَوِيَّاتُ Oviscapte (F). Oviscapt (E).

جهاز منقح السرة أو للكنز في بعض الحشرات، ويعني أكرة، أطليا .

٢٦١٣٥ - مِرْدَوِيَّاتُ Pal Injecteur (F).

Injecting tube (E).

أداة تحقن بها التربة لأغراض شتى اغصانها للتطهير والتسميد للملح للمائع .

٢٦١٣٦ - مِرْدَوِيَّاتُ * مِرْطَب ، مِرْطَب ،

مِقْيَاس الرُّطوبَةِ Hygromètre (F).

Hygrometer (E).

أداة تستعمل في معرفة الرطوبة الجوية أي كمية بخار الماء الموجودة في الجو بالإنسبة إلى درجة الحرارة .

٢٦١٣٧ - مِرْدَوِيَّاتُ شَعَرِي * مِرْطَب شَعَرِي

Hygromètre à cheveux (F).

مِرْطَب يرتكز على تمدد وانكماش الشعر الذي يتأثر بالرطوبة

٢٦١٣٨ - مِرْدَوِيَّاتُ * Balance de précision (F).

هو ما يعينه ميزان الدقة لانه دقيق التركيب يتأثر بكمور الميعرام .

٢٦١٣٩ - مِرْدَوِيَّاتُ Circus (S).

Busard (F). Buzzard (E).

جنس طير من حمارة الرزيات وفصيلة الصقريات، أنواعه عديدة منتشرة في معظم أقطار العالم . جميعها من الكواسر التي تقتنص القوافض والجربان والصائير والقطا والحشرات . اجسامها متوسطة الحجم، طولها يراوح من ٤٥ إلى ٦٠ سم . اجنحتها وأرجلها وأذناها طويلة . أنفها إلى البنية المحمرة . تدفن في الانبهار الحربية الباسقة أو على الحضيض وفي أوتاب الصخور . أنفها تحضن من ٣ إلى ٤ فريسات مدة ٤ أسابيع || أشهر أناملها الأربعة التالية .

٢٦١٤٠ - مِرْدَوِيَّاتُ البَطَّاحِ * Circus strigops (S).

Busard blasé, B. des steppes (F). Pallid harrier (E).

طائر من المِرْدَوِيَّات صغير الجثة، أحمر اللون المرقط بالأسمر، أسود المنسر، أحر العينين والرجلين . وهو من القواطع يألف السبب والبطاح، قوته للزحاضة من طياء صياد وديويات وبعض الحشرات .

٢٦١٤١ - مِرْدَوِيَّاتُ الدَّجَاجِ * * صَنْكِرُ الدَّجَاجِ

Circus cyaneus (S). Busard Saint-Martin (F). Hen harrier (E).

طائر من المِرْدَوِيَّات، متوسط القد طويل الجناحين والرجلين والذنب . ثوبه إلى البنية المرقطة بالأسمر . وهو أسود المنسر، أصفر العينين والرجلين . يصيد القوافض والصائير والفسادح والقطا والحشرات وبراخ الدجاج . يدفن وكه على الحضيض بين القصب والزار .

٢٦١٤٢ - مِرْدَوِيَّاتُ الصَّانِعِ * دُرَّاج

Circus ceruginosus (S). Busard des marais, B. harpaye, B. des roseaux (F). Marsh harrier (E).

طائر من المِرْدَوِيَّات، كبير الجثة طوله يراوح من ٥٥ إلى ٦٠ سم . ثوبه إلى الصبغة المحمرة . وهو من القواطع يألف

كيرتزان . زباناها غطيان . ظهراتها لا يلحف كابل العين . بطنها مستطيل السمكة الشرجية المدنية الطرف || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الحشرة الجملة في أواخر نيسان وتعيش حتى أواخر آب . تسرح في النهار . تساقط في تموز || البرقة عند بلوغها الكمال الجسموي طول نحو ١٢ م . جسمها مبطل الشكل ، مستطيل المقدم ، سداسي للرؤوس ، ضخم الرأس ، ضلع التأثير الفتيكية، أطول اللون ، يسود في الرأس والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ يوماً ينتهي تحت السماء طليقاً من كل غلاف .

٢٦١٤٣ - مِرْدَوِيَّاتُ * Mordellidae (S).

Mordellidae (F). Mordellidae (E).

فصيلة حشرات واسعة من رتبة غدييات الاجنحة || اجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من حشرات المناطق الحارة . خنافسها تألف نباتات الفصيلة الخيمية . يرقاتها دامت تعيش على المواد النباتية السائرة نحو الاغصان || جميع حشرات صغيرة القد ظلاً يتجاوز طولها ١٠ م . اجسامها لاقفاصية الشكل . اغصانها لا تلحف بطنها بكلفتها المستطيلة المدية الاطراف الشرجية . زباناها خيشية ، مستطيلة ، مركبة من ١١ فصلة . ارساخ جرائزها الخلفية رباعية المقل اما ارساخ الجرائز البسطة والامامية فغاسية || أشهر اجناسها المردلة والزحلوقة والريشة .

٢٦١٤٤ - مِرْدَوِيَّاتُ * مِرْدَوِيَّاتُ Quenouille (F).

Distaff (E).

شكل من اشكال الهيكل المتينة في تشذيب بعض الاجناس المشرقة والثرينية || والشكل المردني يكون اضيح قامة وجسماً من الرشي واكثر ارتفاعاً .

٢٦١٤٥ - مِرْدَوِيَّاتُ البَرْلُوقِ * Odonestis pruni (S).

Odonestis du prunellier, Bombyx du prunellier (F).

Odonestis pruni (E).

حشرة من فصيلة الجفنيات ورتبة حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الأقصى إلى اربوة . فراشها صلبة تعيش على غزونها الانمائي . سرحها تعيش على اوراق البرقوق والزعرور والاجاص ... || جسمها مستطيل مكرم يطول نحو ٢١ م . بطنها نحو ٤٤ م . رأسها حشلي اللون . مينها كيرتزان . زباناها مشطيان . مشطها جعدة . حشرتها وبطنها إلى الحشلي الكلف || روشاها الاماميان إلى الحشلي الكلف تلمت ماجة حمراء وضعت منقرض اسمر وبقعة وسطى يضاء . روشاها الخلفيان إلى الحشلي الاثنت . اهدايا إلى الشقعة || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الغفارة في تموز . تسرح من الغروب إلى الفجر في اليالي الممطرة . تماثل بند ظهورها بنمو اربعة ايام وتعيش الحنك لطحاً على لاه الجلود والاصان || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٤٤ م . جسمها شبه اسطواني الشكل . ثوبها إلى الحشلي الاسمر المالح يطولها من الرأس إلى الشرج خط هريس من الحلب القصير تتخلله عند كل مفصل سحدي نسبة من الحلب المستطيل . مدنها وشرجها ودواجيبها كاسية . شرجها ينتهي بزايدة صلبة لمعدنية الشكل || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينتهي تحت القشور وبين الحاء ضمن صلجة ينقلها غشاء كالنخامة اغبر اللون .



مردوة البريق



مِرْطَب



مِرْطَب



مِرْدَوِيَّاتُ البَطَّاحِ



مِرْدَوِيَّاتُ الدَّجَاجِ

Décret (F). Decree, Order (E). - مرزوم ٢٦٢٥٤
هو كل قرار يصدره رئيس الجمهورية. وتختلف أسماء
المراسم باختلاف موضوعاتها فتكون جمهورية وسكوية
وعامة وتنظيمية وعسائية.

Décret-loi (F). - مرزوم قانون ٢٦٢٥٥
Order in council (E).
هو كل نص تشريعي يصدره رئيس الدولة في أثناء غياب
المجلس التتائي ويكون ناذراً كالتأويل بشرط موافقة المجلس،
عند انعقاده، عليه.

Marssonina, Marsonia (S). - مرزونية ٢٦٢٥٦
جنس طيور مجهرية من فصيلة الرغيفيات. يتميز بكتائله
الشفافة الثنائية الخالية البنية الشكل أو المستطيلة المنعقفة.
يركب الأوراق فيلطنها. قصاته أدمية الارتكاز تصنع
البشرة || أنواعه عديدة لكنها قليلة الأذى. أضرها ما يلي.

٢٦٢٥٧ - مرزونية البرسيم *
Marssonina medicaginis (S).
فطر مجهرى من المرزونية يصيب البرسيم واللثة
في سوقها وأوراقها. مظهره الخارجي بطور صغير لا يقياسه
الشكل، حنطية اللون، سمراء الأطار، تركيب السوق
والأوراق فتؤذيها || يكافئ بالخطر عند ظهور الوصم
ويمنع من سرح الماشية في المقاضب لتزدها.

٢٦٢٥٨ - مرزونية التفاح *
Marssonina betulae (S).
فطر مجهرى من المرزونية يصيب التفاح في أوراقه.
مظهره الخارجي بطور صغير مستدرة شفرة اللون حنطية
الأطار لا يقياسه الترتيب تركيب نصل الأوراق حسل
صفحاتها العليا || أضراره زهيدة لا تستوجب المكافئة.

٢٦٢٥٩ - مرزونية الحور *
Marssonina populeorum (S).
فطر مجهرى من المرزونية يخطب أوراق الحور ويصيبها.
مظهره الخارجي بطور متتابعة طحلاء اللون جووية الأطار
تركيب نصل الأوراق وقف تشابه يرمته قشيب اللبيل
والأصبال.

٢٦٢٦٠ - مرزونية الخس *
Marssonina panattoniana, M. perforans (S).
فطر مجهرى من المرزونية يصيب الخس فيؤذيه. مظهره
الخارجي يقع مستدرة لونها إلى السمره ظهرا من ٢ إلى
٣ م. تبدو مبهمة على صفحاتها نصل الأوراق الخارجي
ثم تمتد وتتلاقى وتركيب الأوراق الواحدة تلو الأخرى
حتى الساق || يكافئ بتقلع النباتات المرصومة وينفخ
النهائيات الباقية يحمل كبرونات النحاس أو سائل يورود
المحود المركز ٠.٨ ٪ || من الواجب تطهير البذار قبل
استعماله بواسطة الأخضر المكنني (Vert malachite)
المركز ١ ٪.

٢٦٢٦١ - مرزونية الصفصاف *
Marssonina salicicola (S).
فطر مجهرى من المرزونية يصيب أوراق بعض أنواع
الصفصاف. مظهره الخارجي يقع لا يقياسه بشكل واضح،
مسنة الأطار، حنطية اللون، تركيب نصل الأوراق
فتبدو كالبيثور الزائفة || أضراره زهيدة لا تستوجب
المكافئة.

المنطق والبيجرات ويجاري الماء. قوته القواصم والطيور
المائية والصفاد.

٢٦٢٦٣ - مرزة زمداء ، حبيب
Circus cinereus (S). Busard cendré, B. de montagne
(F). Montagn's harrier (E).
طائر من المرزة، متوسط القد، أبيض القوب المتبادر الرقعة،
أسود المنسر، أصفر العينين والرجلين. وهو من القواطع،
يألف الجبال والمنطق والبيجرات وشطوط الأنهار. قوته
الماء والصفاد والحشرات.

٢٦٢٦٤ - مرزة
Rizière (F). Rice-plantation (E).
هي عقلة الارز أو الارض المغروسة رزاً.

٢٦٢٦٥ - مرزح ، مسالك ، مخطط
Charasson, Echale, Etançon de vigne, Paisseau (F).
Vine-prop, Vine-stick, Stay, Shore (E).
مستد يستعمل للحم الكركية أو لرغها من التربة.

٢٦٢٦٦ - مرزوم ، مرزوم
Flamant (F).
Flamingo (E).
هو النحام من طير الماء، طويل الرجلين والتمت، أعوج
المقار، في أطراف جناحيه سواد، أطلب نحام.

٢٦٢٦٧ - مرزوم
الميرزسان نجمان مع الشريرين.

٢٦٢٦٨ - مرزوم الذراع
مرزوم الذراع نجم تير يعرف أيضاً بالذراع المبسوطة، أغلبه.

٢٦٢٦٩ - مرزونات
Busards, Circiens, Circinés
حمار طير من فصيلة العقريات. أنواعه عديدة تتميز
بقدها الرشيق الأحي. تناسرها قصيرة عجبة. سوطها
مستطيلة. أذناها بيضة. أرساغها مستطيلة معتلة الطول.
غالبها حامرة || أخطائها المالم. تألف الأماكن الرطبة.
قوتها القواصم والزحافات والحشرات.

٢٦٢٧٠ - مرزوب
Précipité (F).
Précipitate (E).
المرسب والرأس واحد.

٢٦٢٧١ - مرزونيةيات *
Mérostomes (F).
Merostoma (E).
صنف من المفصليات المتحجرات لرتبته التصنيفي يأتي
بين القشريات والمتكبريات || من هذا الصنف يوجد
رتبة واحدة ماصرة تدعى مريدويات الأذنان.

٢٦٢٧٢ - مرزوب *
Amphicoma (S).
Amphicome (F).
جنس خنافس من فصيلة العمليات ورتبة ممدات الاجنحة.
أنواعه عديدة، أخطائها الشرق الاوسط. أجسامها متوسطة
القد زيا. رؤوسها قصيرة. قرونها الاستشعارية صغيرة
التركيب. أرساغها خماسية الفصل. أنثاها أكبر قدماً من
ذكورها || تعيش على ثلاث الأنواع والأوراق الغنية.
رقاتها مقيمة الشكل، سداسية الاربيل تعيش في التربة
على المواد العضوية والنباتية السائرة إلى الانحلال.

٢٦٢٧٣ - مرزوب
Nex des solipèdes (F).
Nose of soliped (E).
المرزوب هو أنف ذوات الخافر.



مرزة المنطق



مرزج



مرزونية البرسيم

٢٦٢٧٤ - مَرُوءِنَةُ ٥ Robot (F). Robot (E).

جهاز آلي يقوم مقام الانسان في ايجاد بعض الاعمال .

٢٦٢٧٥ - مَرُوءِنُونَ ٥ Parasité

٢٦٢٧٦ - مَرُوءِنَةُ الْجَوَائِثِ

Observatoire météorologique (F). Meteorological

observatory (E).

مكان جهاز بالمدلة اللازمة لرصد العوامل الجوية .

٢٦٢٧٧ - مَرُوءِنُ Adhérent (F).

يقال جوز مَرُوءِنُ ومَرُوءِنُ إذا تميز خروج له .

٢٦٢٧٨ - مَرُوءِنُ وَهَم Maladie (F).

Illness, Diseases (E).

اغتراف صحي سببه تقاصر الضرع عن القيام بوظيفته على

الريه الاكل || الاوصام التي تصيب الحيوان والنبات

حديثة منها داخلية وخارجية وطفلية وبكتيرية . الخ .

٢٦٢٧٩ - مَرُوءِنُ الْبُتُورِ السَّارِي ، دَرْمِيتِ

Dermite (F). Polt-evil (E).

وصم سار يصيب الخيل والبقرة .

٢٦٢٨٠ - مَرُوءِنُ الْحَرَاثِفِ Lépidorthose (F).

Lepidorthosis (E).

وصم جرثومي يصيب الاسماك بحرثائها .

٢٦٢٨١ - مَرُوءِنُ الْبُتُورِ السَّارِي

Coccidiosis, Maladie du gros ventre (F).

وصم جرثومي يصيب الارباب خاصة والطيور والاداجية

صغيرة .

٢٦٢٨٢ - مَرُوءِنُ الصَّخَنِ Bleime (F).

Sand-crack (E).

وصم يصيب باطن سافر الخيل .

٢٦٢٨٣ - مَرُوءِنُ الظِّلْفِ ، تَعَفُّنُ الظِّلْفِ

Necrosis bacillaris (S). Pétion (F). Foot-rot (E).

مرض معد يصيب اظلاف البان .

٢٦٢٨٤ - مَرُوءِنُ الْقَطَرِ الشَّعَامِيِّ

Actinomycose (F). Actinomycosis (E).

هو الحاروش وصم يصيب الفواشي ويقتل الى الانسان .

سببه القطر الشعامي . مظهره قباب في الفك واللسان .

عوارضه هزال وضعف وحى وانخفاض في الوزن . وقد

يمتد الى اشحاء الحيوان وظلمة بطنه .

٢٦٢٨٥ - مَرُوءِنُ التَّمْلُجِ Phthiriasis (F).

Phthiriasis (E).

كل مرض جلدي سببه الحشرات من قمل وقراد...

٢٦٢٨٦ - مَرُوءِنُ التَّمْتَمِجَاتِ Spirillosis (F).

Spirillosis (E).

وصم ينشأ من ويبدو التمتجمات في الدم .

٢٦٢٨٧ - مَرُوءِنُ بَكْتِيرِي

Maladie bactérienne (F). Bacterial illness (E).

كل مرض سببه البكتيريا .

٢٦٢٨٨ - مَرُوءِنُ جِلْدِي ، دَرْمُوءِنُ

Dermatose (F). Skin disease (E).

تعبير شامل يطلق على جميع الاوصام الجلدية مما كان

سببها .

٢٦٢٦٢ - مَرُوءِنَةُ الْقَيْبِ ٥

Marssonina acerina (S).

فطر مجهري من المرسونية يصيب اوراق القيقب وقد

يمتد الى الاذن والافاناد . مظهره الخارجي يقع صغيرة

مفرقة الزوايا تبلو سمراء اللون ثم تتحول نحو الصهبة

البياض . تركب نصل الاوراق وطاء الاذن والافاناد .

اضرارو زهيدة لا تستوجب المكافحة .

٢٦٢٦٣ - مَرُوءِنِيَّاتُ

Marciéres (F).

سبط من فصيلة الجرميات يشمل الكثير من الاجناس

والانواع معظمها بري وبعضها زراعي زينة .

٢٦٢٦٤ - مَرُوءِنِيَّسُ

Peuplier de l'Euphrate (F).

هو أطور القراقي الجليل الشكل ، اطلبه .

٢٦٢٦٥ - مَرُوءِنِيَّةُ ٥

Marsilea (S).

Marsilea, Marsilie (F). Marsilea, Nardoo (E).

Marsilie, Kleoforn (D). Marsilea (I).

جنس نباتات حشوية مائية معمرة من فصيلة المرسلات

انواعها قليلة العدد . سوقها جلدومية مدادة تنسج في الماء .

جلودها تحلج تنور في السبل تقابلها اوراق مستطيلة

الزائد رباعية الوريقات المتقابلة المتطابقة على سطح الماء .

اغصن الواهيا :

مرسيلة السنغال ٥

Marsilea senegal (S).

Marsilie pygmée (F).

Marsilea aegyptiaca (S).

Marsilie d'Egypte (F).

٢٦٢٦٦ - مَرُوءِنِيَّاتُ ٥

Marsiliaceae (S).

Marsiliaceae, Marsiliaceae (F). Marsiliaceae (E).

فصيلة نباتية من المتفيمات . اجناسها وانواعها حديثة ،

جميعها اشباح جلدومية مدادة تعيش في اممال المياه

القليلة الدور .

٢٦٢٦٧ - مَرُوءِنُونُ ، مَرُوءِنُونُ

Myrte commun (F).

هو الآس الجربي ، اطلبه .

٢٦٢٦٨ - مَرُوءِنُ

Terre imperméable (F).

Impervious earth (E).

هي الارض المسكبة التي اذا اطمرت سالت سريعا ،

يج مروض وامراض .

٢٦٢٦٩ - مَرُوءِنَاءُ

Stérile (femelle) (F).

Sterile (femelle) (E).

المقور من كل حيوان .

٢٦٢٧٠ - مَرُوءِنَاءُ ٥

Robotologie (F).

Robotologie (E).

من تعامل المرشدة .

٢٦٢٧١ - مَرُوءِنَةٌ * Arrosoir (F). Watering-pot (E).

وهاء لاسقاء بالرش .

٢٦٢٧٢ - مَرُوءِنَاءُ ٥

Robotologie (F).

Robotology (E).

المرشدة علم يبحث في تطوير الاجهزة الآلية وتمكينها من

انجاز ما يقوم به الانسان من اعمال .

٢٦٢٧٣ - مَرُوءِنَتُ ، مَرُوءِنَتُ

Suoïr, Trompe d'insecte (F). Sucker (E).

جهاز انبري لاقب يمكن الحشرات من ارتشاف السوائل .



مرسيلة



مرشة

٢١٣٠٣ - مَرَعَاوِيلَا شَرِيبَة

Echinops tournefortii (S). Boulette de Tournefort, Echinope de Tournefort (F).

حشبة معمرة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. سوقها خالية اللحماء، حلها غيطي مستطيل أكثره أبيض اللون ويضه اجر. اوراقها جامدة النصل الخامسي التفريش، الشائك الحافة. ازهارها وردية وبيض، وريساتها متوسطة القد.

٢١٣٠٤ - مَرَعَاوِيلَا لَوْرَجَة

Echinops viscosus (S). Boulette visqueuse, Echinope visqueux (F).

حشبة معمرة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقها كثيرة الفروع اللدنية للزجة. اوراقها كبيرة القد، قدية التفريش، زغبية لتصل القدي للزج، شائكة الحافة، ازهارها غبراء اللون، وريساتها صغيرة الحجم.

٢١٣٠٥ - مَرَعَاوِيلَا وَطِيمِيكَة

Echinops humilis (S). Boulette humble, Echinope humble (F).

حشبة معمرة قليلة الفروع تملو نحو ٦٠ سم. اوراقها قطنية البشرة حل صفحتها. ازهارها زائفة الزرقة، قطر الرؤية نحو ٤ سم.

٢١٣٠٦ - مَرَحَة

Porzana (S).

Porzana (F). Porzana (E).

المرعة. ج. مرع. جلس طير من دجاجيات الماء وفصيلة التفليقيات، أنواعه المرولة ١٦ جميعها من طيور العالم القديم، اجسامها متوسطة القد وصغيرة. اثوابها الى الصهبة الخطية يعلوها رقبن ابيض وتبيح أسود || اعطائها تمتد من الهند الى اوروبا ومن الصيرال الى مراكش. معظمها من القواطع يمحج مناطق البلاد في طلب الرزق والمصيف والمشي. أحرف أنواعها واشهرها المرعة الشائعة.

٢١٣٠٧ - مَرَحَة شَائِكَة * ، مَرَحَة مَرُوطَة

Porzana maruette (S). Porzana marouette, Marouette (F).

طائر من المرع، قدرة قدر الساني، لونه الى الصهبة الخطية البسراء الموج، رأسه متمش بالابيض. زوره ويطنه الى البياض الناصع. صدره الى الطحلة الخطية الموج. ظهره اسود التبيح ابيض الخمار. جناحه مجذع بالابر. منقاره جالس الازتكاز، اسر القاعدة، احر الطرف. ساقه الى الخضار الاسفر || يألف التنازع وضفاف البيمرات والابار. قوته الحشرات والبراق ويؤرور النباتات المائية. مرقته من الغروب الى الظلمة ومن الضحى الى الفجر. يطن حشبه وسط جم السعادي. اثناء تخضن نحو ١٢ بيضة.

Chèvre d'Angora (F).

٢١٣٠٨ - مِرْغِز

هو مازن انقره، اطلبه.

Prallal (F). Meadow (E).

٢١٣٠٩ - مِرْعَوِي *

Embouche, Gagnage, Herbage (F). مِرْعَوِي

Pastura-land, Rich meadow, Grass-land (E). مرج طبيعي تسوم الماشية اعشابه.

Clio (F).

٢١٣١١ - مِرْعَوِي الْحُوت

جلس حيوانات بحرية من الرخويات تدعى مِرْعَوِي، اطلها.

Hygrophyte (F).

٢١٣١٢ - مِرْعَاهَد *

نمت تمرغفي يطلق على كل نبات ينمو في المواقع الرطبة.

٢١٣١٩ - مَرَعِي دُودُ الْأَمْعَاء Helminthiasis (F).

Helminthiasis (E).

هو الخلمتياز، وصم تسببه الديدان في الامعاء.

٢١٣٢٠ - مَرَعِي سَلِي، مَرَعِي وَيْسَل، وَيَمَة

Maladie infectieuse (F). Infectious disease (E).

كل مرض جرثومي أو ميكروبي ينتقل بالمعدى من حيوان الى آخر.

٢١٣٢١ - مَرَعِي قُطْرِي

Maladie cryptogamique (F). Cryptogamic disease (E).

كل مرض تسببه الفطور، مجهرية كانت أو غير مجهرية.

٢١٣٢٢ - مَرَعِي صَعْدِي

Maladie contagieuse (F).

Contagious disease (E). كل مرض جرثومي أو ميكروبي ينتقل بالمعدى من فرد الى فرد.

٢١٣٢٣ - مِرْعَاسِي *

Slalagogue (F). Slalagogic (E).

نمت تمرغفي يطلق على كل مادة تسبب افراز الرضاب.

٢١٣٢٤ - مِرْعَاش، مِرْعَاشَة

Concasseur (F).

هو الجاروش، اطلبه.

٢١٣٢٥ - مِرْعَاش، مِرْعَاش

Hygromètre (F).

هو المرزاق، اطلبه.

٢١٣٢٦ - مِرْعَاش شَعْرِي

Hygromètre à cheveux

هو المرزاق الشعري، اطلبه.

٢١٣٢٧ - مِرْعَاشِي، مِرْعَاشَة

Amétystae (F).

هو الكركمان، اطلبه.

٢١٣٢٨ - مِرْع

مرع ومرع المكان؛ انصب بكثرة الكلا.

٢١٣٢٩ - مِرْعَان

Clématite toujours verte (F).

هو الملى المنعي، اطلبه.

٢١٣٣٠ - مَرَعَاوِيلَا * ، شَوْكَة الْجِمَعَال

Echinops (S). Echinope, Boulette (F).

جلس نباتات برية عشبية من فصيلة المركبات الانبوية ازرع. انواعه عديدة منها الحلوية والحولة والمصرة. سوقها فرماء. اوراقها كبيرة القد شائكة النصل. ازهارها رؤسية كروية الشكل || احرف انواعه واشهرها ما يلي:

٢١٣٣١ - مَرَعَاوِيلَا زَرْقَاء

Echinops ritro (S).

Boulette azurée, Echinope azuré (F).

حشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم. اوراقها كبيرة القد فلقية التفريش. نصلها اخضر الصفحة العليا المائلة، ابيض السفلى الخلفية، شائك الحافة. ازهارها زرق. قطر الرؤية يراوح من ٣ الى ٤ سم.

٢١٣٣٢ - مَرَعَاوِيلَا شَائِكَة ، شَوْكَة الْجِمَعَال

الشامك، رمعي الإبل، سَكَاكِي

Echinope commun (F).

نوع من المرعاويلا، مشهور باسم رمي الايل، اطلبه.



مرعاويلا



مرعة شائعة

٢٦٣١٢ - مرغة

المرقة والمرغ : الروضة الكثيرة النبات .

٢٦٣١٤ - مرغود الياسمين

Margarode du jasmin, Pyraie du jasmin (F).

فراشة من المرغويات وفصيلة التارويات مشهورة باسم ناراية الياسمين ، يرتقا مؤذية .

٢٦٣١٥ - مرغوريت

Reine Marguerite (F).
Queen Margaret (E).

نبات تزييني حولي يعرف بالخنكار ، اطلبه .

٢٦٣١٦ - مرغورين

Margarine
زبدة صناعية مركبة من ادهان نباتية مع شحم البقر .

٢٦٣١٧ - مرغرف

Marcgravia (F).

جنس نباتات برية وتربينية عارضة من فصيلة المرغريات . منبتها القلوبي ينش مناطق امريكة الاستوائية || انواعه المعروفة قليلة العدد منها السريعة ونمها المتسلقة المارعة . ازهارها اوراقها مزدوجة الشكل ، ابيدة ، متعاقبة . ثمارها عتودي التجميع ، ثمارها كروية ، جامدة ، حراء اللون .

٢٦٣١٨ - مرغريعات

Marcgraviaceae (S).
Marcgraviacées (F), Marcgraviaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين . اجناسها واتواعها متوسطة العدد . اصطلحنا بعض اصفاغ امريكة الاستوائية || نباتاتها متباينة الاشكال ، منها الاشجار والشجيرات والمتسلقات . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، جامدة النصال المستنة الاطراف . ازهارها لاقائي التجميع منه السيواني والدنقوي والسنبلي ، جميعها مستطيلة المالحق . ازهارها لاقائية الحميم . كرومها لانظامية التركيب منها الثنائية الفصل والثلاثية والخاصية . عدد بتلات توجيهاها بمائل . عدد الفصول . جميعها ملونة . ثمارها كروية ، ديوام ، جامدة القشور || اشهر اجناسها المرغف .

٢٦٣١٩ - مرغنة

Mérogenia (F), Merogony (E).
المرغة احصاف بوفضة متسلسلة بحويين متوي .

٢٦٣٢٠ - مرغني

Mérogenique (F).
Merogonic (E).

نمت تدرفني يطلق على كل ما له صلة بالمرغة ككوك اخصاب مرغني .

٢٦٣٢١ - مرغوسة

Prolifique (F), Prolific (E).
نمت تدرفني توصف به الانثى الكثيرة التنتاج .

٢٦٣٢٢ - مرغول

Margulus (S).
Mergule (F), Mergulus (E).

جنس طيور بحرية من فصيلة البطريقيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . اصطلحنا مناطق الدائرة القطبية . لا تترك اليم الى اليابسة الا في زمن الترخيم والحياة . الرحالة القطبية تلقنها بطير الجليد || ملجئها الحياتي جلي . اسرابها وافرة العدد . قوتها الحوام والخشرات والدمايس والقشريات والاسماك الصغيرة || اشهر انواعه واعرفها واعما انتشاراً الميرغول القزم او الميرغولة .

٢٦٣٢٣ - مرغول قزم، مرغولة

Mergusus alio (S).

Mergule nain (F), Little auk, Dovekie (E).
جنسها صغير القد ، يطول من ٢٠ الى ٢٢ سم . رأسها محتلا جرم ، قصير المتقاد الاسود . حلقه منها كسنية اللون . ذنبها غريرتي الشكل . قصير . وسماها الى السمرة الصفراء اللواح . ثوبها الصفي اسود الرأس ورياء والذنب والصفحة العليا من الجناح ، ابيض الصدر والبطن والصفحة السفلى من الجناح . ايلها يبيض الاطراف . ثوبها الشتوي يتقلص فيه الاسود ليل على الاكعب || الانثى امير قدما من الذكر وتحتل بنفس الثوب . موكلها نفرة بين حضور المهادح . الانثى تحضن بمناوبة الذكر بيضة واحدة شبه اجاصية الشكل ، اصفر من بيضة الدجاجة . الترخيم يستمر نحو اربعة اسابيع والصغير يموه على سطح اليم بعد التفق ياسيرج .

٢٦٣٢٤ - مرغوي

Casarca (F).

هو الشهران ، طائر من الدليل مشهور باسم ابو فرقة .

٢٦٣٢٥ - مرغوي

Felis tigris (S).
Margay, Chat tigré (F), Margay (E).

حيوان لاسم مغريين من فصيلة السنوريات . موطنه بعض اصفاغ امريكة الوسطى والبرازيل . يأنف الاسراج ولا يتعد من الماء حيث يكثر قصه . ملجئه الحياتي غري اي أن الذكر يكوم عدة اناث || جسمه احيف القوام رشيقا يطول نحو ٨٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٢٨ سم . رأسه محتل الجرم . اذناه صغيرتان ، مستديرتان كاسيتان . عيناه صغيرتان كاسيتان . ثوبه الى الصبغة الصفراء يملوها بتيجج وتتميز اسود . صدره الى الصبغة البتراء المشيرة بالاسود . بطنه الى الصبغة الحطية المرقشة والاسمر . ذنبه متعاقب الاطراف السود || سريره دجوي . يتسلق الاشجار بخفة ويمد على الارض بسرعة . قوته الطير والبردان والقدار والرشاقاة والفضاح .

٢٦٣٢٥ - مرغيط

Erodium à feuilles de bryone
هو الجراب الفاشري الورق ، اطلبه .

٢٦٣٢٦ - مرلق

Groe (F), Crane (E).
آلة رافعة ، تهبس الالتقال وتنقلها .

٢٦٣٢٧ - مرلق

Élévateur (F), Elevator, Lift (E).
جهاز ثابت او نقال يستعمل في رفع وتنفيذ الجرايل والصاديق والبالات الخ .

٢٦٣٢٨ - مرلق

Coudé (F), Elbow (E).
موصل اللزاح من المعدن . ج مرلق .

٢٦٣٢٩ - مرلق

المرق نجم ثير من كوكبة سيوس .

٢٦٣٣٠ - مرلق الثريا

مرلق الثريا نجم من كوكبة الجبار .

٢٦٣٣١ - مرلقية

Coudé (F), Elbowed (E).
شكل من الثرياتي ، قائم اقزافية ، يشبه المرقق .

٢٦٣٣٢ - مرلقين ، مورلقين

Morphine (F).
Morphia (E).
مادة شبه قلوية غدة ويسكنة تستخرج من الافيون .



مرغول



مرغوي

Composante (F). **مُرْكَبَة** ٢٦٣٤٩
Component (E). وهي قد تكون اقلية أو راسية .

Centre, Point central (F). **مُرْكَز** ٢٦٣٥٠
Centre, Middle (E). هي نقطة الدائرة .

Centre de gravité (F). **مُرْكَزَ الجِثَالِ** ٢٦٣٥١
Centre of gravity (E).

مُرْكَز الدَّائِرَة ، نُقْطَة الدَّائِرَة ٢٦٣٥٢
Centre d'un cercle (F). Centre of circle (E).

Centre astatique (F). **مُرْكَز مُطْلَق** ٢٦٣٥٣
Astatic centre (E).

Accumulateur (F). **مُرْكَم** ٢٦٣٥٤
Accumulator (storage cell or battery) (E).

Pot (F). **مُرْكَن ، قَارُوْرَة** ٢٦٣٥٥
وعاء من فخار تزرع فيه النباتات أو تستنبت ريشاً تغزل
ال مستقرها . ج مرآكن وقوارير .

Investi (F). Invest (E). **مُرْكُون** ٢٦٣٥٦
نعت ترميزي يطلق عل الاموال ، اخصها غير التقفية ،
المبسوطة لعل ما او المفعول معين .

Merlus, Merluccius (S). **مُرْمُوش** ٢٦٣٥٧
Merlucho (F). Hake (E).

جنس اسماك بحرية بيوضه من فصيلة الفاصيات . اصطنها
بحار البلاد الحارة والمتوسطة الحرارة || اجسامها اهليجية
رؤوسها كبيرة . اشدافها مسلحة باسنان قوية هربية
الشكل . زعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة الشكل ،
خالية من المناسخ الشائكة || انواعها المعروفة اثنان المرلوش
البطل الذي يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط
والمرلوش الامريكى المعروف ايضاً بمرلوش الشطى .

مُرْمُوش صَبْدَلُون ٢٦٣٥٨
Merluccius merluccius (S).

Merlucho commune, Merlu (F). Common Hake (E).
نوع من المرلوش . سمكة بحرية بيوض مقشرة نعمة يكثر
وجودها في البحر الابيض المتوسط || مرمرها واقر الممد .
سرعها عرض البحر خارج المياه الاقليمية ، لا تقرب
من المهاد الا في زمن التفرقة || جسمها شبه اهليجي
الشكل ، يطول من ١٠٠ الى ١٣٠ سم . رأسها كبير
الجرم . ثوبها الى الطحلة الثراء السعداء الموج . خطها
الجانبي اسود . بطنها الى البرة البيضاء || زعانفها الظهرية
اثنان . زعنفتها الشرجية واحدة || لحمها جيد الصنف .
كبدها وافر المادة الزيتية الجيدة .

Amaraque (F). **مُرْمَحُور** ٢٦٣٥٩
هو المروء ، اطلبه .

Germandrée ambrée (F). **مُرْمَحُور** ٢٦٣٦٠
هو الطورقون الكوربي ، نبات حطري مدي مقو
للأصصاب ويغيد لها . وهو منه وراقب ومضاد للتشنج .

Babine, Babouine (F). **مُرْمَة** ٢٦٣٦١
Lip (pendulous) (E).
المرة والمرة : شفة البقرة وكل ذات ظلف لانها ترتم بها .

Barbe du blé (F). Beard (E). **مُرْق** ٢٦٣٣٣
هي سمكة السبله وتسمى سفا وشعاع . ج أمراق .

Puccinia **مُرْق** ٢٦٣٣٤
وصم نظري يمتري النبات ويؤذي ، اطلب سمح .

Progression (F). **مُرْقَة** ٢٦٣٣٥
هي للتوالي وقد وضعها لانها تلوي سنى التوالي والمزيد
ودو المطلوب .

Uranomètre (F). **مُرْقَاع** ٢٦٣٣٦
Uranometer (E).
جهاز يستعمل في تقدير المساحات الفضائية ان بين
الكواكب او بينها وبين الارض .

Aplatisseur (F). **مُرْقَقَة** ٢٦٣٣٧
Grain-crushing mill (E).

آلة تريق الحبوب الملفية ، مركبة من اسطوانتين تكونان
في اتجاهين مراكين تسحق الحبوب التي يمر بينها دون
ان تكسرها .

Apode (F). Apod (E). **مُرْقَال** ٢٦٣٣٨
هي الحشرة العديمة الارجل . ج مرقاليل .

Télescope (F). **مُرْقَب** ، **رَاصِدَة** ٢٦٣٣٩
Telescope (E).
آلة مجهزة لرصد كواكب الفلك وسياراته ونجومه .

Stalle (F). Stall (E). **مُرْقَد** ٢٦٣٤٠
شقة الفرس الواحد في الاصطبل .

Pyrite (F). Pyrites (E). **مُرْقَشِيْتَا** ٢٦٣٤١
هو كبريتور الحديد ويكون اصفر اللون او ابيض .
راجع بيريت .

مُرْقَى عَشْرِي ، مَقْبَس عَشْرِي ٢٦٣٤٢
Echelle décimale (F). Decimal scale (E).

Dosser (F). **مُرْكَاو** ، **مِنْشَاع** ٢٦٣٤٣
Dosimeter (E). جهاز المراكزة او قياس التركيز .

Sarcloir (F). Spud (E). **مُرْكَاش** ٢٦٣٤٤
اداة لركش التربة ، يستعمل باليد .

مُرْكَب القُرْس ٢٦٣٤٥
مركب القرس غير ثيم من كوكبية السفينة .

Composé (F). Composed (E). **مُرْكَب** ٢٦٣٤٦

Multiple (F). **مُرْكَب** ٢٦٣٤٧

Compositae (S) **مُرْكَبَات** ٢٦٣٤٨
Composées (F). Compositae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وسمية القمامة سفلية
الاسدية . تتميز من اكبر الفصائل النباتية ، انواعها عدة
آلاف تجسمها ثلاثة اسباط : الشعاعية وانبوية الزهر
ولسبينية الزهر . منها الاجنار والشجيرات والجنات والاعشاب .
عصارتها مائلة او لينة . اولفها متعاقبة او متعاقبة .



مرقا



مرقب



مرلوش مبدول

٢٦٣٧٣ - مَرْمَرُوطُ الْقُطْب ، مَرْمَرُوطُ كَنْدَا

Arctomys monax, A. empetra (S). Marmotta monax, M. de Québec, Monax (F). Canadian marmot, Monax (E).

نوع من المرموط، موطنه يمتد من كندا إلى كاليفورنيا. جسمه يطول نحو ٣٧ سم. وذنبه ١٧ سم. وبره كثيف التجميع، متوسط الطول. ثوبه إلى اللعلة السوداء، بطنه أصفر المالح.

٢٦٣٧٤ - مَرْمَرُوطُ بُولُونِيَا

Arctomys bobac (S). Marmotta bobac, M. de Pologne, Bobac (F). Polish marmot, Bobac (E).

نوع من المرموط، موطنه يشمل بلاد بولونية وبغالبية وروسيا الجنوبية. جسمه يطول نحو ٣٧ سم. وذنبه ٩ سم. ثوبه إلى الصبغة، حنار عينيه إلى السمر، طرف ذنبه إلى السواد. وبره ليد التجميع متوسط الطول.

٢٦٣٧٥ - مَرْمَرُوطُ حِمَالِيَا

Arctomys himalayanus (S). Marmotta de l'Himalaya (F). Himalayan marmot (E).

نوع من المرموط، صغير القد، كثيف الور الثام المتوسط الطول. موطنه جبالا حتى ارتفاع ٤٠٠٠ م. من سطح البحر.

٢٦٣٧٦ - مَرْمَرُوطُ شَالَع

Arctomys marmotta (S). Marmotta commune (F). Common marmot (E).

نوع من المرموط يعيش من ٩ إلى ١٠ سنوات. موطنه جبال أوروبية. جسمه يطول من ٢٨ إلى ٤٥ سم. وذنبه ١٦ إلى ١٨ سم. وزنه في الخريف قبل بيانه الشتوي يراوح من ٧ إلى ٨ كيلو. ثوبه إلى الصبغة الخفيفة يطول موج صناعي يتحول إلى الأحمر الغني مع استطالة العمر. رأسه وأطراف قوائم وذنبه إلى السمر. انفا تفتح جروين في أواسط شهر حزيران.

٢٦٣٧٧ - مَرْمَرُوطُ مَدْهَب

Arctomys aureus (S). Marmotta dorée (F). Golden marmot (E).

نوع من المرموط صغير القد كثيف الور الثام، ثوبه إلى الصبغة الصفانية اللطيفة. موطنه بعض جبال الهند والباير.

٢٦٣٧٨ - مَرْمَرِيْزَكَة

Meromyza (S). Meromyza (F). Meromyza (E).

جنس حشرات من فصيلة الخراشيات وربة ذوات الجناتحين. أنواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المحتلة الحارة || أجسامها صغيرة، خلاء، طول من ٣ إلى ٦ سم. رؤوسها مكورة، عيناها كبيرة، قاذرة عند الشقين، قرونها الاستشادية قصيرة، تنتهي بنسيلة دقيقة، ملاصقا صغيرة. أظفارها متدلة الجرم. كواسلها مستطيلة، مرققة. بطونها أنشائية الشكل. رواشنها كبيرة، قسطانية التخفيف. أفاعذها الخلفية ضخمة تمكئها من التغرز || الحشرة الجبلية واثمة المرمقا البراري والمروج. البرقة تمشي على سيق النجيليات وقد تركب القمح والأرز فتسبب أضرار زهر السائل.

٢٦٣٧٩ - مَرْمِيْش

Rhinoceros (F). هو الكركدن، أظله.

٢٦٣٨٠ - مَرْمَرُوط

Surmulot (F). هو جرد الماشاب، أظله.

Marbre (F).

٢٦٣٨١ - مَرْمَر

هو الرخام، أظله.

٢٦٣٨٢ - مَرْمَرِيْ

Marbré (F). Marbled (E). نعت ترميزي يطلق على ما كان يشبه المرم.

٢٦٣٨٣ - مَرْمِيْسِيَّات

Myrmicidae (S). Myrmicidae (F). Myrmicidae (E).

فصيلة حشرات من عشائيات الاجنحة المضمومة وثمة الحشرات. أجسامها وأنواعها المعروفة قليلة العدد موطنها بعض اصقاع البلاد الباردة والقطبية || أجسامها شبيهة بأجسام النمل، أوفاها إلى الجلوة المتفاوتة المجات. جميعها مجنحة. حاما دقيقة، ذرية، معتلة الطول || أشهر أجناسها المرمس (Myrmique).

٢٦٣٨٤ - مَرْمِيْلَة

Arinscé (F). Sandy (E).

نعت ترميزي يطلق على كل ثرية خضراء كثرت فيها نسبة العنصر الرمي.

٢٦٣٨٥ - مَرْمِيْلَة ، مَرْمِيْلَة

Sablère, Carrière de sable (F). Sand-pit, Gravel-pit (E).

منتجم يستخرج منه الرمل.

٢٦٣٨٦ - مَرْمِيْلَة

Jardin de granadiers (F).

هي بستان الزمان.

٢٦٣٨٧ - مَرْمَرُوطَة

Pagei marbré (F).

المرمرة سمكة بحرية تدعى فريدي مسج، أظله.

٢٦٣٨٨ - مَرْمَرُوطَة

Marmoset (F).

هو الحبال من القرود اللبية.

٢٦٣٨٩ - مَرْمَرُوطَة ، مَرْمَرُوطَة ، مَرْمَرُوطَة

Calceolaria (S). Calceolaria (F). Slipperwort (E). Pantoffelblume, Schuhblume (D). Calceolaria (I).

جنس نباتات عشبية ليفية وعشوية من فصيلة الخنازريات. أنواعها عديدة، منها الحولية والهمولة والمصرى، معظمها يري وبعضها ترابي كثير الضروب والأصرام. سوقها زينة. أوراقها متقابلية كاملة. أزهارها خريبة الشكل تشبه الخف. ألوانها متباينة عديدة تراوح من الأبيض إلى الأحمر الغامق.

٢٦٣٩٠ - مَرْمَرُوط

Arctomys (S). Marmotte (F). Marmot (E). Marmelotier (D).

جنس حيوانات لينة قاضية من فصيلة السنجلانيات. أنواعها المعروفة ١٥، جميعها متوسطة القد بطيئة الحركة. رؤوسها مستديرة. أذانها صغيرة مستديرة. أذنانها قصيرة جللة. صولها متوسط النعومة || أظفارها الجبال العالية. بيئاتها الشتوي يدوم نحو أربعة أشهر. تمشي جهات في أجسام تحفرها في الجرم على أعماق تراوح من ٩٠ إلى ١٢٠ سم. جسرهما نفق قطره نحو ١٥٠ سم. وطولها من ٨ إلى ١٠ أمتار ينتهي برعدة عرضها ٢٠٠ سم. أعرف أنواله وأشهرها ما يتبع.

٢٦٣٩١ - مَرْمَرُوطُ التَّبَت

Arctomys robustus (S). Tibetan marmot (E).

أكبر أنواع المرموط، موطنه جبال التبت، ثوبه إلى السمر الخفيفة. وبره كثيف، لين، مستطيل.



مرموزة



مرموط شالغ

Palimpestit or, * مَرُوشِ الحَمْرُ ٢٦٤٠٨
Cymatophora or (S). Cymatophora or, l'Or (F).
Palimpestit or (E).

حشرة من فصيلة الشروقيات وذبة حشرقيات الاجنحة .
موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا . فراشها واسعة
قوتها رقيق الانزعار . سرتها تمشي على اوراق الخور
والصفاصفا . جسمها وبني الشكل يطول نحو ١١ م .
يسقطها نحو ٣٤ م . رأسها حلي الكون . حشاها كيرتان .
زباناها غطيانا . سرتها مثل الخليل . جوشها وبها
الى الحنطلي المذهب المالح . ورشها الاضواء الى الحنطلي
الاثير تملو رقة الى الصخرة وخطوط معتزلة الى السرة .
ورشها الخلفيان الى الحنطلي الكالكف المذهب المالح
تملوه حدة وسطى هلالية بمراء . لما جيلان في الحط .
تظهر فرائة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل
الثاني في تموز . تسرح من العصر الى فحة الليل . تماطل
بد ظهريها ينمو اربعة اسابيع وتفتح المكن لطفا على
الصفاصفا السفلى من نصال الاوراق . السرة عند بلوغها
الكال تطول نحو ٢٦ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ،
مائل للقتار . ثوبا الى الخضار البشري الجلع بالابيض
والاصفر . رأسها جزوي الكون . مدنها ورواجها الى
السرة . طول الاكمام الذي ينمو نحو ١٥ يوما
ينقضي ضمن صلجة تحببها السرة تحت القشور او بين
شقوق الحاء .



مَرُوشِ التبع

Ballota (S). * مَرُوبِ ٢٦٤٠٠
Ballote, Marrube (F).
جلس نباتات عشبية بوية معمرة من فصيلة الشفويات .
انواعه المعروفة متوسطة المدد . اصطناعها تشمل بعض مناطق
الشرق الاوسط والاخذ واروبة وافريقية الشالية . سفيها
عقالية فراءه تملو من ٣٠ الى ٨٠ سم . اوراقها متعاقبة ،
اهليجية النصال الخشنة المسنة الختار . ازهارها محوري
الاكتاز . ازهارها بياض الكون وبها الابيض الاصفر
المواج . ازهارها واوراقها فوطة العرف للاستصحب .
تؤديها صفي .

Eventail (F). Fan-shaped (E). * مَرُوبِ ٢٦٤٠١
شكل من اشكال تقليم الشجر ، يشبه المروسة .

Palmier éventail (F). * مَرُوبِ ٢٦٤٠٢
هي القل نوع من النخل التريسي .

Flabellé, Flabelliforme (F). * مَرُوبِ ٢٦٤٠٣
Flabelliform (E).
لمت وصفي يطلق على ما كان شكله كالمروسة .

Stylot (F). * مَرُوبِ ٢٦٤٠٤
كل انبوب من مجموعة الانابيب التي تشكل قلم اللقطة
في الزهرة . وهو محور البكرة والحديدة التي تدور في التلام
وكل نصل دقيق مثلث . ج مراد .

Xiphosures (F). * مَرُوبِ ٢٦٤٠٥
رعية من المصليات الشيفيات المرتويات . نصالها
واجناسها وانواعها كثيرة المدد . منظما الساق من
متحجرات الاحقاب الاول . المعاصر منها الآن فصيلة
واحدة تدهي لميطيات .

Epithrix parvula (S). * مَرُوشِ الشبع ٢٦٤٠٦
Flea beetle (E).

حشرة من مدندات الاجنحة وفصيلة الخضاريات . جسمها
صغير القد يطول نحو ٣ م . ثوبا الى السرة المايقة .
وفي من الحشرات التي تطير وتقتصر حسب تقني الحماجة .
اجسامها الحولية تراوح من ٢ الى ٣ . اناتها تمتع المكن
على الاحصاب البرية فينتفخ من رقات دقيقة تحلة غبار
اللون يبلغ طوطا عند كمال تطورها نحو ٤ م . . ازهارها
تمدد الى الحفرة والبرقة . الحشرة تقضم نصال التبغ على
صفحاتها العليا في المشل وتطعم صفحتها السفلى بالخلق
تقتوه الاوراق وتخت من قبتها . اما البرية التي تمشي
على المواد الضوية في التربة فانها لا تتأخر من قرض
جلود الشيفيات الثلاثة . مكافحتها نظرا لسرعة حركتها
واختباها في التربة وبين الاحصاب تبدأ بتنظيف المشل
او الخلق من جميع الاحصاب البرية واذا كان لا بد من
دواء فيجب ان يكون شديد الفعالية كاخضر باريس
وزرنيخات الرصاص والروتينون .

Rejet, Rejeton (F). * مَرُوشِ ٢٦٤٠٧
Shoot, Sprout (E).
هو الرود والفصيلة والبتلة والقرع وقد يحسن تخصيصه
بركة النبات المخشوب .

Laté (F). Soft-rod (E). * مَرُوبِ ٢٦٤٠٩
كل سمكة ذكر لا يزال جرابها الشفوي ملء بالارول
تمت بالارول . كوكاك طرموج مردل .

Irrigée (F). * مَرُوبِ ٢٦٤١٠
Irrigated (E). * مَرُوبِ ٢٦٤١١
هو النبات او الزرع الذي يسقى .

Œsophage (F). * مَرُوبِ ٢٦٤١١
Œsophagus, Gullet (E).
جزء من انبوب الهضم مركز بين البلوم والمعدة .

Baromètre (F). * مَرُوبِ ٢٦٤١٢
Anémomètre (F). Anémometer (E).
جهاز يحدد مهب الريح وسرعته وشظها .

Rentable (F). * مَرُوبِ ٢٦٤١٣
Profit-earning (E).
كل استثمار يعود على صاحبه بايراد سنوي يغطي الاكلاف
ويؤتي بعض الدخل الصافي .

Prolifère (F). * مَرُوبِ ٢٦٤١٤
Proliferous (E).
صفة الشيء الذي يتكاثر . ونعت تعريفي توصف به الازهار
والثآليل التي تنمو باطن موزقة .

Mars (F). Mars (E). * مَرُوبِ ٢٦٤١٥
كوكب سيار من المجلس يتنفي الى مجموعة النظام الشمسي .
يمد من الشمس يأتي بمد الارض . لونه الى الصفار الاحمر .
جره يقل عن جرم الارض نحو ٧ مرات وكتله نحو
عشر مرات . مرة دورته الانتقالية في الفضاء نحو
٨٦٧٩٦ كيلومتر بالساعة . دوره الفلكية حول الشمس
تستغرق نحو ٦٨٧ يوما . دوره المحورية الذاتية تستمر



مَرُوشِ الخور



مرباج

سرعية في المساف، عارضة في الغابات حيث يبلغ طولها نحو ٥٠ سم. ثمارها وشية الجراب الذي يطير من ٣٠ إلى ٤٠ سم. ويعرض نحو ٤ سم. بزورها كثيرة العدد، صغيرة القد، مستطيلة الشكل، لونها إلى السرة الصنائية يعلوها تبييض ذهبي. رائحتها سرعية، مقسة. طعمها يسود كطعم البنلق ثم يتحول فوراً إلى مرارة العظم يستخرج منها نحو ٣٢٪ من الدهن الجمالي الطبي الاخضر اللون.

٢٦٤٢١ - مريضة الغابون، مريضة لطيفة

Strophantus gratus (S). *Strophante agréable* (F). نوع من المريضة. مهدا الغابون وبعض مناطق نيجيريا الجنوبية والكنغو. جنبها داسية أو سرعية في المساف، عارضة في الغابات. ثمارها متوسطة الحجم. بزورها اهلجية الشكل، تطول من ١٢ إلى ١٥ سم. وتعرض من ٣ إلى ٥ سم. لونها إلى السرة الكستانية الزيتية المزاج. رائحتها سرعية، مقسة، لا تقلل الالتباس. طعمها شديد المرارة منذ الاول. يستخرج من بزورها نحو ٣٤٪ من الدهن الجمالي الطبي الاخضر اللون.

٢٦٤٢٢ - مريضة تشاد، مريضة كعب

Strophantus Kombe (S). *Strophante de Kombe* (F). نوع من المريضة، مهدا مناطق تشاد وبجيرات افريقية الوسطى. جنبها داسية في المساف، عارضة في الغابات. ثمارها اصفر قدماً من ثمار مريضة السودان اما بزورها فاجسم وقه يبلغ طولها نحو ٢٠ سم. لونها إلى السرة المخضرة المزاج. رائحتها قليلة الصراحة النوعية. طعمها شديد المرارة يستخرج من بزورها نحو ٣٠٪ من الدهن الجمالي الطبي الاخضر اللون.

٢٦٤٢٣ - مريضة

Histioteuthis (S). *Histioteuthis* (F). جنس حيوانات بحرية من الرخويات وأسياد الابلج وفصيلة الراسيات. انواعها المعروفة قليلة العدد اصحابها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي. اجسامها جرابية الشكل مستعدة الاعقاب. عيونها كبيرة ماسحة. زعانفها طرفية نصف دائرية الشكل. رؤوسها اسطوانية كبيرة متدججة مع الاجسام. جرابها متباعدة الاشكال منها ستة حلبة مصحبة متساوية الطول واثنان طليقتان محصمتان واثنان مستطيلتان تشبهان برصي ستانية الشكل عادمة الحاصم.

٢٦٤٢٤ - مريضة

Myrris (F). هو السرفل الطري، اطله.

٢٦٤٢٥ - مريضة

Fertile (F). *Fertile, Fruitful, Rich, Fat* (E).

صفة الحصب في التاج والانتاج والثمار والالات.

٢٦٤٢٦ - مريضة

Laemargus (S). *Laimargus* (F). جنس اسماك بحرية ولودة من فصيلة السمنديات. انواعها المعروفة اربعة، منها لوامان بحريان بحار الشمال المتوسط المحبوط المحيط الهندي والاربع يحبب البحر الابيض المتوسط وهو اصفر قدماً لانه لا يعطى اكثر من متر بينا الانواع الاخرى تطول من ٤ إلى ٦ امتار. وتعيش مريضة

نحو ٢٤ ساعة و٣٠ دقيقة. والمربيع كالارض له بحار وجو ويور في ذلك قران «فريس» و«دوسوس»، دورة الاول تستمر نحو ٧ ساعات و٣٠ دقيقة. ودورة الثاني نحو ٣٠ ساعة و٢١٠ دقيقة. والمربيع يسمنه النمس الاصفر لانه دون زمل في التحوية. واغصافا اليه البقل والقتل والتهير.

٢٦٤٢٦ - مريضة

المادة الصلبة البيضاء الكاثية في جوف القرن.

٢٦٤٢٧ - مريضة

Picris (S). *Picride* (F). *Yellow succory* (E). *Bitarich* (D). *Picride* (I). جنس نباتات عشبية طرية من فصيلة المركبات اللبينية الزهر. انواعها عديدة جميعها برية. سورها فراء غزيرة الصمارة اللينة المرة الطعم. اوراقها متعاقبة، لاطئة، متناوبة الشكل صغيرة القد. تصلها منشاري الحافة، خلي البشرة حل صفحية، بحري اللان. ازهارها رؤسية جميلة الصفار. والمرير يزيل الجرب والحكة ويور البيل وينعش من غصف الكبد والقنصة وأذا اخذ مع التفرقة فتت الحصى وتطلق البيل وهو يصدح وتصلحه الكثيراء.

٢٦٤٢٨ - مريضة

Chondrilla (F). *Chondrilla* (E). هي الخنثويل، نبات طبي، اطله.

٢٦٤٢٩ - مريضة

Strophantus (S). *Strophante* (F). جنس نباتات برية، طرية، مسرة، من فصيلة الدفليات. انواعها المعروفة ٤٥ مهدا المناطق الاستوائية والاقليم المتاخمة من البلاد الاريقية والمختلة. تتجعد انواعها وراثتها الطوية هو التالي:

افريقية الشرقية والوسطى	تثبت ١٥ نوعاً
افريقية الثالية	تثبت ١١ نوعاً
افريقية الجنوبية	تثبت ٤ انواع
مدفكر	تثبت ٣ انواع
اخذ وبالريضة	تثبت ١٢ نوعاً

سوفها رها كلها متباعدة الاشكال، منها الشجيرات والجنات والعرش والسرمة الفروع والداسية. يبدو ان شكلاتها الرئيسية تعود الى بعض العوامل التنوعية، اخصها الضع. اوراقها اهلجية، بمقعة، لاقياسية الانظام، منها المتعاقبة والمتعاقبة والقصية ومنها الماسلة النصال والمزجية. ازهارها طبقية التجميع، طرفية الارتكاز، مخلفة الالوان. كروها قمية، حامية الالتفاف. بتلاتها قدية مستطيلة. مآبرها سمية، مديدة الاغراف. ثمارها مركبة من جرابين متقابلين. بزورها مستطيلة، متكية الطرف، تنتمي بقنزة من الحلب المستطيل الدقيق النعام. يستخرج من بزورها، باستثناء القنزة، مادة جميلة طرية شديدة المرارة تدعى سرفنتين (*Strophantine*) كانت ولا تزال تستعمل من قبل بعض قبائل جاهل افريقية في طلاء التيسال السامة. وتستعمل طبياً في علاجات القلب واقتباسه وفي تحسين القدرة الدموية واستقرار النبض والقضاء على غثيق التنفس. اشهر انواعها الطبية الثلاثة التالية.

٢٦٤٢٠ - مريضة السودان، مريضة مريضة

Strophantus hispidus (S). *Strophante hirsuta* (F). نوع من المريضة. مهدا السودان وغيبه وليجيري. جنبها



مريضة



مريضة



مريضة



مريضة

المختص باستغالة عظمها ويؤمها الأطول الأزرق الموج الذي يقم مع اقترابه من الظهر ويبيض عند البطن ٥
سوكها فاخرة الصنف مرقوب بها . طويها مأكولة
متوسطة الصنف ، ويستخرج من أكبادها الفضضة مادة
ما يتجمد في شائعة الاستعمال .

٢٦٤٢٧ - مَرِينَة * Margaritana (S). - مَرِينَة صَفَرَاء الزَّهَر

Morina couteriana (S). **Morine de Couter** (F). **مورينا كوتريانا** (S). **مورين د كوتر** (F).
 بحلة زرقية تعلو من ٦٠ إلى ٩٠ سم. ساقها برصاء
 فناء. أورفاها خفيفة، يظل نحو ٢ سم. يفرش
 نحو ٢ سم. أزهارها صفراء اللون، ثنائية التجميع، أبوية
 وتاجية الارتكاز. أزهارها يستمر من نحو إلى اليل.

Morina bulleyana (S). **مورينا بوليانا** (S).
Morine de China (F). **مورين د شين** (F).
 بحلة مرقية زرقية تعلو نحو ٩٠ سم. ساقها فراء

Margaritana (F). **Margaritana** (E).
 جنس حيوانات مائية من الرخويات فضيحية الخياشيم
 وفضلية الياذات. أنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم
 أنهر وبحيرات إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا. أصلها
 من بقية الشكل، معدية، مستطيلة، لامتناهية
 المصادر والأضلع. ينش أنواعها بين الكال، القشرة
 تعيش بين الصخور أو في الرمال والأملاك. حولها مأكلة
 بواسطة الصنف.

Carthame (F). ٢٦٤٢٨ - هريق ٦ فوق

هو القرم ، ليات من فصيلة المركبات ، اطلبه .

Murad * ۲۶۴۲۹ - ۲۶۴۲۹

جلس حيوانات بحرية من الرخويات الملعقات ذات
الاصيداف. انماه عديدة اشهرها المريق الفينيقي (ابو
دينار) والمريق اليوناني || اصداؤه مذهبة شائعة. كانها
يستخرجون منه في الزمان القادر خضاباً ارجوانياً ثابتاً
يستعمل في صبغ انفس الثياب.

Muricidae (S). ۲۶۴۳ - مُرِیْقَات

مُحْرِضَات (F). مُحْرِضَات (E).
 فصيلة حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات مهديات
 الأرجل وحيدات الأجهزة. أجنتها وأولمها الحرة
 متوسطة العدد أعطتها بحار البلاد الحارة والمتعددة الحرارة.
 كان لها شهرة في الزمان الغابر أيام الفيلسوفين إذ كانوا
 يستخرجون من بعض الأنواع الصباغ الابيض المشهور ||
 يعرف احتباسا واسمها الحريق والفسفرة والكليس.

Marica (5). ۲۶۴۳۱ - مریکا

جنس نباتات عشبية جلمورية سريرية من فصيلة السوسنيات . منتهى البرازيل . ثمارها منتصبه ، رقيقة . اوراقها صيقة المتصل ، بحلة الخضار الزاهي . أزهارها زرقاء اللون أو بيضاء || تزرع للترزين في الحدائق . انماها المروفة قليلة العدد شهرها الزواق .

۲۶۱۳۲ - مَرِيكَة زَرْقَاء - *Marica corulea* (S).

نوع من المريكة . منبها البرازيل . شراعها مستطيل الجرم يرتفع من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها صغيرة الحجم ، ضيقة التصل ، جميلة الخضار الزاهي . ازهارها كبيرة القذ ، قطرها نحو ١٠ سم . لونها ال ازرقة الالوانية المالح تندها يستمر من ايار الى سزيان .

Sauge officinale (F). **سَوْدِيَّة** - ٢٦٤٣٣

نبات طير ، يعرف بالقويسة المخزنية ، اطلها .

Morina (S). ۲۶۴۳۴ - مَرِيْنَةُ ، مُورِيْنُ

عنبر، ثباتات، زينة معصرة، فصيلة الدباسيات، أنواعها

٢٦٤٣٥ - مَرِيْنَةُ صَفْرَاءِ الزَّهْرِ

Morina coultieriana (S.). *Morina de Coulter* (F.).
 بجلة تزيينية تملو من ٦٠ الى ٩٠ سم. ساقها فراءه
 فناء. أوراقها عيطية، نصلها بطول نحو ٢٠ سم. ويمرض
 نحو ٢ سم. ازهارها صفراء اللون، ثنائية التجميع، ابطية
 وتاجية الارتكاز || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول.

Morina bulleyana (S). ۲۶۴۳۶ - مَرْنَه مَنِيْ

بحلة سبر ودية تزيينية تملو نحو ٩٠ سم. ساقها فراء تملوها
خطوط مستطيلة من الذهب الاطلس. اوراقها سنانية
تطول من ١٢ الى ١٥ سم. ازهارها يفضاء اللون، نورية
التجميع، طرية الازهار. || ازهارها يستمر من حزيران
الى تموز.

Morine persica (5) - ۲۶۱۳۷ - مَرِيْنَةُ فَارِسِيَّةٌ

جنية سرورية تربيتة تعلم من ١٠٠ الى ١٥٠ سم.
ساقها فراء. اوراثها متقابلة خفيفة، لصلها يطول نحو
١٥ سم. وعرص نحو ٣ سم. صفحت خلية البشرة متبادعة
الاستن للحي الحشف. ازوارها ابطية وطرفية الارتكاز،
وردي اللون، خلية الصفعة || ازوارها يستمر من
نحو الى ابطيل.

٢٦٤٣٨ - مَن يَنْتَظِرْ مُنْقَلَبَهُ الْوَدَّاعِي

Morina longifolia (S). *Morina* à longues feuilles (F).
جنية ترينية تملو من ٨٥ الى ١٢٥ سم. ساقها فرواء،
اوراقها شبيهة، تصلها عظام من ١٥ الى ٣٥ سم. ويثمر
من ٢ الى ٤ سم. حباتها صاوخ الحافة، دقيق الحسف
ازهارها متجمعة القند، ابطية وطرية الارتكاز، تلبو يضا
الذين تم تتصرف الى الوردي وتقتصر على الحمرة الفاتنة
ازهارها يستمر من تموز الى آب.

Mérinos (F). ٢٦٤٣٩ - مَرِينُوسُ *

ضأن بني مرين ، سلالة من الضأن المشهور بفزارة صو
ونميته وحيدة صنفه .

۲۶۴۴ - مَوْنِيَّات

هـ. فصيلة الشقبات ، اطلها .

Marlone (F). ٧٦٤٤١ - مَرْوَن •

هو الذي يبدؤا عليه

libila (F), Nutritiva (E). ٧٦٤٤٧ - مَافِ

المادة أو المواد الغذائية القابلة التمثيل المباشر في الجسم

٢٦٤٤٣ - مز، مزاء

الخمر اللذيذة الطعم .

٢٦٤٤٤ - مزاد الائتمار

هو المزداد الذي يخضع لاتفاق قوم تأمروا على ان
يقنأسوا في المزاينة العلنية وذلك ليرسو الطروح بش



عن أبيه



1999



2.



مړینو

٢٦٤٥٧ - مَزَادَة (F). Enchère (F). Auction (E).
هي عرض مبلغ أجل من الثمن الأساسي أو من المبالغ التي سبق عرضها في أثناء المزاد .

٢٦٤٥٨ - مَزَادَة (F). Beurrierie (F). Butter factory (E).
هي معمل الزبدة، بناء خصص لصنع الزبدة ويصحبها .

٢٦٤٥٩ - مَزَادَة (F). هي الخفاة ، أطلبها .

٢٦٤٦٠ - مَزَادَة (F). Mazus (S). Maze (F). Mazus (E).
جنس نباتات عشبية معمرة بيرة وتزيينية من فصيلة الخنازيريات . أنواعها المروعة قليلة العدد بعضها من نباتات الحد والبعض الآخر من استرالية وتسانية || سوقها قصيرة أو جعدة أو مدادة . أوراقها اهليلجية ملتوية . أزهارها حنقودي التجميع ، شمراخي الإزهار || أعرف أنواعها وأشهرها النيران التالية .

٢٦٤٦١ - مَزَادَة عَصِيكَة (S). Mazus rugosus (S).
Maze rude (F).
نوع من المَزَادَة . ساقها فروع قصيرة تملأ من ١٠ إلى ٢٠ سم . أوراقها شرملة غشنة . حناقيدها الزهرية تطول من ٨ إلى ١٥ سم . أزهارها إلى الزهرة الباهتة الجميلة || تنويرها يستمر من أيار إلى أيلول .

٢٦٤٦٢ - مَزَادَة قَرْمَة (S). Mazus pumillo (S).
Maze pygmée (F).
نوع من المَزَادَة . ساقها جعدة . أوراقها خمسية مستتة النصال . شماديتها الزهرية قصيرة . أزهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من أيار إلى حزيران .

٢٦٤٦٣ - مَزَادَة (F). Amandier amer (F).
هي شجرة اللوز المر . ج. مزج ، أطلبها .

٢٦٤٦٤ - مَزَادَة (F). Mazyer (F).
الزبدل : الموضع الذي يرسل منه الحوام الزاجل الهادي .

٢٦٤٦٥ - مَزَادَة حَامِيَة (F). Concurrentiel (F).
Competitive (E).
نمت تعريفي يطلق على ما هو قابل للمزاخة .

٢٦٤٦٦ - مَزَادَة (F). Sep (F). Frame of plough (E).
قطعة من الحراثة ترخف في قعر التلم عند الحراثة .

٢٦٤٦٧ - مَزَادَة (F). Terroir (F). Soil (E).
هو المصيص ، أطلبه .

٢٦٤٦٨ - مَزَادَة (F). Binaire (F). Binary (E).
هو كل مركب من تعصيرين .

٢٦٤٦٩ - مَزَادَة الْأَطْرَاف (F). Bilatéral (F).
Bilateral (E).
هو كل اتفاق أو عقد ملزم للجانبين المتعاقبين .

٢٦٤٧٠ - مَزَادَاتُ الْأَذْيَانِ (F). Diotocardes (F).
قسم من الرغويات المدية .

٢٦٤٧١ - مَزَادَاتُ الْأَرْجُلِ (F). Amphipodes (F).
Amphipoda (E).
رتبة من القشريات .

جنس حل أحدم فيبيونه ويتقسمون الفرق بين الثنتين وهو من الاعمال غير المشروعة التي يقاتبها القانون .

٢٦٤٤٥ - مَزَادُ النَّهْوَ ، مَزَادُ الْأَسْتِرْسَالِ (F). Adjudication sur folle enchère (F).
هو ما يبرم بإعادة المزاد على دمة الملتزم .

٢٦٤٤٦ - مَزَادُ النَّافِصَةِ ، مَزَادَة (F). Adjudication au rabais (F).
هو أن يرسو الالتزام أو المبيع على من يعرض أدنى ثمن يلتزم به القيام بالمسل على الوجه المفصل والمشروح في دفتر الشروط وفي البيان التفصيلي للمروض لتنافس المتنافسين .

٢٦٤٤٧ - مَزَادُ جَبْثِي (F). Adjudication sur saisie immobilière (F).
هو المزاد الذي يتم تحبب الحيز العقاري بعد الإجراءات القانونية المروعة من تسجيل ونشر .

٢٦٤٤٨ - مَزَادُ قَضَائِي (F). Adjudication judiciaire (F).
هو الذي يجري في المحكمة وفقاً لنص قانوني أو امر رسمي بعد استكمال الإجراءات القانونية .

٢٦٤٤٩ - مَزَادُ تَعَدُّرِ الْبَيْسَةِ (F). Adjudication sur licitation (F).
هو مزاد يتم على مقدار شائع بين ملاك كائنا أشتروا أو وروثوه ولا يمكن قسمته شيئاً .

٢٦٤٥٠ - مَزَادَة (F). Blatissement, Blatissure (F).
Becoming over-ripe or sleepy (E).
المزارة كالقوب والفلول هو زيادة نضج الثمر أو ابتداء ذبوله بعد تمام نضجه .

٢٦٤٥١ - مَزَادَة ، مَزَادَة ، مَزَادَة (F). Mécayer (F). Metayer (E).
هو من استعمل الأرض بالمزارة .

٢٦٤٥٢ - مَزَادَة ، مَزَادَة (F). Métayage, Colonage (F). Metayage (E).
هي أجرة مزيرة إلى أجل ما يبلغ المستأجر بمقتضاها إلى المزارع قسماً من حاصلاتها بنسبة يتفقان عليها . ويقال للمستأجر مَزَادَة . وهذه المزارعة قد تكون :

مَزَارَة الْحَامَةِ (F). Colonage partiaire (F).
مَزَارَة مَسْتَدِيمَة (F). Colonage perpétuel (F).

٢٦٤٥٣ - مَزَادَة بِالْتَوَكُّلِ (F). Absentéisme (F).
Absentoolism (E).
استغلال الأرض بالمزارة على أن يتحمل صاحب الأرض بتوكيل .

٢٦٤٥٤ - مَزَادَة (F). Hérisson (F).
هو القنفذ ، أطلبه .

٢٦٤٥٥ - مَزَادَة الْعَمَلِ (F). Vacation (F).
هو الوقت الذي يقضيه بعض الأشخاص للمنوط بهم عمل معين في القيام بأعمال هذا العمل أو المهمة .

٢٦٤٥٦ - مَزَادَة حَقِيقِي (F). Command (F).
هو الذي يستمر يوم المزايدة حتى يرسو المزاد على سواه ظاهراً في حين أنه صاحب الصفقة .

٢٦٤٧٢ - مُزْدَوِجَات الأصابع

Artiodactyles (F). Artiodactyla (E).
رَبِية من الِبلونات مِها المِخْزَات والمِجْشِيَات .

٢٦٤٧٣ - مُزْدَوِجَات التَّنَفُّس

Dipnès, Dipneustes (F). Dipnoi (E).
طائفة من الِاسماك تَعتَبَرُ حَلَقَةَ الِانْتِصَالِ بَينَ الِاسماكِ وَالقُرَازِبِ .

٢٦٤٧٤ - مُزْدَوِجَات التَّخْطِيطُوم

Dibranches (F).
رَبِية حَيَوَانَات من الرَعِيَوَات الرَاسِيَات الِارْبِلِ .

٢٦٤٧٥ - مُزْدَوِجَةُ التَّطْعِيق

Décussée (F).
Decussate (E).
هي الِاوراق المُتَاطَعة الثَلاثين الثَلاثين تَقاطَعُ عَمُودِيًّا .

٢٦٤٧٦ - مُزْدَوِجَةُ الفَلَكَلَة

Dicotylédone (F).
Dicotyledon (E).
أحد قِسمي مِستَوِرات البُزُر من الثَينَات . رَاجِع ثَلاثِيَةُ الفَلَكَلَة .

٢٦٤٧٧ - مُزْدَوِجَةُ التَلَم

Distyle (F).
Distyle (E).
نَمَت تَعرِيفِي يَطلِقُ عَلى كُلِّ نَبَات أَزْهَارُهُ مُزْدَوِجَةُ أَقْلامِ السَّهَاتِ .

٢٦٤٧٨ - مُزْدَوِجَةُ المِيسَم

Distigmate (F).
Distigmat (E).
نَمَت تَعرِيفِي يَطلِقُ عَلى كُلِّ نَبَات أَزْهَارُهُ مُزْدَوِجَةُ المِيسَمِ .

٢٦٤٧٩ - مِزْرُور

Bière (F). Beer (E).
هو الجِنة تَحْصِيصًا وَهو القَندِيهِ المُخْضَلَص من سائرِ الحِبوبِ التَّشْوِيعِي كَالشَّعِيرِ وَالْحَنَظَةِ وَالذَّرَّةِ ...

٢٦٤٨٠ - مِزْرُورِ اخْتِزَارِ

Porcherie (F).
رَاجِع زَبِية الخَازِيرِ .

٢٦٤٨١ - مُزْرَدَة * ، مُدْرَع جَبَّار

Pridontes giganteus (S).
Pridonte, Tatou géant (F).
حَيَوَان لَبُون أَهْدَر وَحِيد الجِلسِ والنَّوع من فَصِيلَةِ المُرْخَآت .

مِزْنَةُ مِطْمَ غَابَات أَمْرِيكَة الجَنُوبِيَّة . يَأْتِي المَوَاقِفُ القَرِيبَةُ من المَاءِ . مِسرَحُهُ دَجَوِي يَستَمِر من الغُروبِ إِلَى الفَجْرِ . مِلْجَتُهُ الحَيَاتِي فَرْدِي إِلَّا فِي زَينِ التَّسَافِدِ وَالْحَضَانَةِ الَّتِي تَستَمِر نَحْوَ سِتِّ أَشْهُرٍ . وَجَارُهُ نَقَق فَسِجٍ مُسْتَطِيلٌ يَحْتَفِرُهُ بَينَ دُجُورِ الِانْجِشَارِ . قُوَّتُهُ المِطَاءُ وَالْحَيَاتِ وَالزُّورُجُ وَالْقِثْرَانُ وَبِضْضُ المَوَادِّ النَّبَاتِيَّةِ ۥ جِسمُهُ فِيهِ أَطْلُجِيهِ الشَّكْلِ ، قَلِيلُ الفَلَمْلَعَةِ ، يَطلِقُ نَحْوَ ١٦٠ سَم . بِمَا فِيهِ الذَّلْبُ الَّذِي يَبلُغُ ٥٠ سَم . رَأْسُهُ خَرُوبِي الشَّكْلِ . أَذْنَاهُ يَوْقِيتَانِ مُصْغِرَتَانِ جَرَامِزُهُ قَصِيرَةٌ خَاسِيَةُ الأصَابِعِ الِامْتِصَارِيَةِ الطَّوِيلِ المِلسَةِ بِالظَّاهِرِ حَادَّةٍ أَغْصَاهَا ظَافِرُ الأصَابِعِ الثَلاثَةِ وَالرَّابِعَةِ من الجَرَامِزِ الِامَامِيَّةِ . رَأْسُهُ وَجِسمُهُ وَفِيهِ مَلْطُوعَةٌ بِدَرَجٍ من الِزَرْدِ العَظِيمِ المَادَّةِ . لَوْبُهُ أَسَدٌ أَلْبَنِي بَاسْتِثْنَاءِ الرَأْسِ وَالْبَطْنِ وَالذَّلْبِ لِإِنَّهَا إِلَى البَيَاضِ الِاخْثَرِ .

٢٦٤٨٢ - مِزْرُوعَةٌ ، مِشَارَكَةٌ ، جَوِيتَةٌ ، كُرْدَةٌ ، عَزَبِكَةٌ

Ferme, Mécairie (F).
Lease, Farming, Land, Small farm (E).

٢٦٤٨٣ - مِزْرَلَة

المِزْرَلَة . ج. مِزْرَاف . هي المِجْشَات فِي الثَّرْبَةِ وَهِيَ سَاحِلَتُهَا الثَّرْبَةُ يَعبَسُ نِهَا المَاءُ حَتَّى تَختَلِّقَ ثُمَّ يَستَاقُ المَاءُ إِلَى فِجْهَرِهَا .

٢٦٤٨٤ - مِزْرُوق

Cloaque (F). Cloaca (E).
فُجَّةُ المِالِكَةِ البُولِيَّةِ وَالْمَعْوِيَّةِ وَالتَّنَاسُلِيَّةِ عِنْدَ بَعْضِ القِطَارِيَّاتِ وَأَخْصَاهَا الطَّيْرُ .

٢٦٤٨٥ - مِزْعَامِيَّاتٌ *

Boinés (F).
عَارَةٌ من فَصِيلَةِ البُولِيَّاتِ . أَجْنَاسُهَا وَأَنْوَاعُهَا عَدِيدَةٌ . مُنْظَمُهَا من عَلمِ المَنَاطِقِ الِاسْتَوَائِيَةِ الِامْرِيكَِيَّةِ وَيَميزُ المِخِيطَ المَهادِي ، أَغْصَاهَا مُشْكَرٌ . وَبَعْضُهَا أَسِيوِيٌّ وَأَفْرِيْقِي ۥ أَجْنَاسُهَا مُتَبَايِنَةٌ الِاطْوَالِ الَّتِي تَرَاوَحُ من مِترٍ إِلَى عَشْرَةِ أَمْتَارٍ ۥ أَشْهُرُ أَنْوَاعُهَا :

٢٦٤٨٦ - مِزْرَقٌ *

Epinette (F).
Spinet, Box for fattening poultry (E).
قَفْصٌ يُزْبَدُ فِيهِ الِالِدَاجُ المُدَلِّسِينَ .

٢٦٤٨٧ - مِزْرُكَةٌ * ، مُسْهِرٌ

Luscinia svecica (S).
Gorge-bleue à miroir roux (F).
طَائِرٌ من المِزَارِ وَفَصِيلَةُ التَّحْلِيَّاتِ . صَغِيرُ الجِلْفَةِ طَرْدٌ نَحْوَ ١٥ سَم . ثَوْبُهُ مِزَارَكٌ الِالْوَانِ الجَمِيلَةُ الِانْتِشِيقُ وَالزَّخْرَفَةُ . صَوْتُهُ مَقْلَدٌ بِالْأَزْرَقِ ۥ وَهُوَ من أَقْوَاعِ حِبوبِ البِلَادِ فِي طَلَبِ الرُّزْقِ . قُوَّتُهُ المِشْرَافُ وَالْبِيدَانُ وَبِضْضُ النَّارِ العَنِيَّةِ الَّتِي تَتلَكُّ فِي الخُرَيْفِ . يَأْتِي المِخْلَافُ وَجَارِيهِ المَاءِ وَصُفَاتُ الحِجِرَاتِ . يَفتَنُ أَقْصَمَهُ بَينَ الِادْفَالِ وَفِي المَاقِصِ . انْتَاهُ تَحْضَنُ من ٤ إِلَى ٦ بَيْضَاتٍ نَحْوَ ١٥ يَوْمًا .

٢٦٤٨٨ - مِزْرُكَةٌ

Gaveuse (F).
Cranming apparatus (E).
أَدَاةُ لَزَقِ الطَّيْرِ .

٢٦٤٨٩ - مِزْرُكُوبٌ *

Hybride (F).
Hybrid, Mongrel (E).
الْمِزْكَوبُ كَالْمِشْجَلِ ، نَمَتٌ تَعرِيفِي يَطلِقُ عَلى كُلِّ حَيَوَانٍ أَوْ نَبَاتٍ جَبِينٍ .

٢٦٤٩٠ - مِزْرُكُومٌ *

Fécondé, imprégné (F).
Impregnate (E).
نَمَتٌ تَعرِيفِي يَوصِفُ بِهِ الثَّيْبُضُ المَكُونُ الصَّالِحَ الِاتْرَاشِ .

٢٦٤٩١ - مِزْرَاقٌ

Glaiseur (F). Slide (E).
مِزْمَارُ

٢٦٤٩٢ - مِزْمَار

Glotte (F). Glottis (E).
هو فَمُ المِخْرَجَةِ أَوْ فَمُ قِصْبَةِ الرِّقَّةِ .

٢٦٤٩٣ - مِزْمَارُ الرَّاعِي * ، مَسْكَسٌ

Allama (S). Allame, Flûteau (F). Water plantain (E).
Froschhölle, Wasserflesch (D). Allamo (I).
جِلسُ نَبَاتَاتٍ جِلْمُورِيَّةٍ مَالِيَةِ مَعْمَرَةٍ من فَصِيلَةِ اللِّزَامِيَّاتِ .

أَنْوَاعُهُ عَدِيدَةٌ مُنْظَمُهَا يَعبَسُ فِي الِأَهْوَارِ وَالنَّائِضِ المِشْمُورَةِ



مِزْدَة



مِزْق



مِزْقَة



مِزْمَارُ الرَّاعِي

٢٦٥٠٢ - مَزُونَاة Parallax (F). Parallax (E).
المزواة زاوية عند كل نجم أو كوكب يقابلها قطر الفلك الأرضي أو نصفه .

٢٦٥٠٣ - مَزُونَاة Pantomètre (F).
Pantometer (E).
جهاز يستعمل في قياس جميع الزوايا والأبعاد .

٢٦٥٠٤ - مَزُونَاوَة Clinomètre (F).
Clinometer, Inclinator (E).
المزواو جهاز يستعمل في قياس الميل الحاصل بين خط مستقيم وخطًا أفقي .

٢٦٥٠٥ - مَزُونَاة Gonlomètre (F).
Gonliometer (E).
هو المنقل، جهاز يستعمل في قياس زاوية الأرض عند مسعها .

٢٦٥٠٦ - مَزُونَاوِي Anguleux (F). Angulous (E).
نمت تعريفي وصي يطلق على ما كان شكله كالأزوية .

٢٦٥٠٧ - مَزُونَاوَة Crèche (F). Manger (E).
هو وعاء الزاد .

٢٦٥٠٨ - مَزُونَاوَة
المزوة والملحف والثرة ثلاثة أسماء لنجم لير واحد من كوكبية برج السرطان .

٢٦٥٠٩ - مَزُونَاوَة Masoreus (S).
Masorée (F). Masoreus (E).

جنس حشرات من فصيلة المزوريات ورتبة غلخيات الاجنحة . أنواعها المعروفة عشرة أعضائها بعض مناطق أفريقية والهند وأروبية . بعض أنواعها أصبح سكانا لانتقاله مع الفستق السوداني إلى جميع مرفأ العالم || أجسامها صغيرة ، معتدلة التنبطيط ، طولها من ٤ إلى ٦ مم رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها صغيرة ، بارزة . قرونها الاستشعارية قلابية الشكل . تأكلها وفكوكها وبلاسمها قياسية . كواسلها صيقة القواعد . بطونها ملطحة . اغامها لاسعة ، سباعية الاغادي النجيلية القاطية ، يملوها بعض الحلب . غنائبها قوائمها بمهززة بخاخس مشارية التستين || الحشرة الجلجلة مفترسة ودائمة البرقة أيضا .

٢٦٥١٠ - مَزُونَاوِيَّات Masoreidae (S).
Masoreidae (F). Masoreidae (E).

فصيلة حشرات من مجذيات الاجنحة . أجناسها وأنواعها المعروفة متصلة للدند ، منتشرة في بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || أجسامها صغيرة طولها من ٤ إلى ١٠ مم . رؤوسها صغيرة ، مستعرضة القطن . عيونها ناشرة . تأكلها وفكوكها قياسية . قرونها الاستشعارية غشبية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها مستعرضة ، غشبية القواعد المنصورة . اغامها سباعية الاغادي النجيلية القاطية ، يملوها في حنارها بعض الحلب . قوائمها نشطة . غنائبها كثيرة الحلب الشالكة ومجهزة بتماخس كبيرة ، مشارية التستين || تألف الحلق المزدودة وريال السواحل جميعها دامتة ومفترسة || أشهر أجناسها المزور الذي يكثر وجوده في زراعات الفستق السوداني .

وبعضها يكثر على غشاف البحيرات والأنهر . أوراثها أروبية الانتشاب ، لا قياسية الشكل والحجم . انزادها ضمية التجميع صغيرة القد سريعة السلب . قال الانطاني : « نباتاته طيبة الرائحة يزورها تحمل الارام والسموم مطلقا وأرجاع الارام وتدر البقل وتقت الحصى وتخلل الانتفاخ والمغص مع يدر الجذر والسسل . وإذا شغل به الشمر طوله ويحب رائحة الرأس . »

٢٦٦٩٤ - مَزُونَاوَة الرّاعي المائي* ، أَذَان العَتر Allama plantago (S). Flötewe plantain, Plantain d'eau (F). Mad-dog weed (E). Echter Froschhölzl (D). Plantaggine aquatica, Barba silvana (I).
نوع من مزار الراعي تكثر زراعته في أحواض للماء لقرنين . حشيتة تملو من ٣ إلى ١٠٠ سم . أوراقه كبيرة القد بيضية الشكل ، تعلها قلمي القاطعة ذلك الزام الاعين . ازهاره كثيرة العدد صغيرة الحجم لويسا إلى البياض المخش بالوردي . وهو نبات طبي حصره مرطب خافض لحرارة ويدر قبيل .

٢٦٦٩٥ - مَزُونَاوِيَّات Allisaceae (S).
Allisacées (F). Allisaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقة . أجناسها وأنواعها كثيرة العدد، جميعها نباتات جلمورية متخمية أو مائية . أوراقها أروبية الانتشاب معتقة . انزادها عتقودية التجميع مستطيلة الزناد المنقصب .

٢٦٦٩٦ - مَزُونَاوِيَّات Luxuriant (F). Luxuriant (E).
نمت تعريفي يطلق على النباتات الريان الشمر الرخم .

٢٦٦٩٧ - مَزُونَاوَة Myzomela (S).
Myzomèle, Mismotie (F).
جنس طير من الجوارث رقيقيات المناقير وفصيلة المغتريات . أنواعها المعروفة نحو ١٥ موطنا يمتد من استراليا إلى ماليزية . مطنها أحيائي جامي . جامعاتها قليلة العدد . تألف البراري والأدغال . قوتها الحشرات الجلمونة والديدان وريحق الأزهار || أجسامها صغيرة القد طولها من ١٢ إلى ١٥ سم . مناقيرها مدبة الاطراف المدبة . اجنحتها معتدلة الجرم . أذنانها مقلوبة . أطرافها متباعدة الألوان جميعها زاهية الخصب || أنثاها ايت غشبا من ذكورها . تدرن أحشائها في الأدغال . أنثاها تحض متبارية الذكور ، على مزيين في الحول ، من ٤ إلى ٦ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٣ يوما .

٢٦٦٩٨ - مَزُونَاوَة Intrusif (F). Intrusive (E).
نمت تعريفي يطلق على ما كان له صفة التزم .

٢٦٦٩٩ - مَزُونَاوَة Multiflore (F). Multiflorous (E).
نمت تعريفي يوصف به كل نبات كثير الأزهار .

٢٦٧٠٠ - مَزُونَاوِيَّات Anthozoaires (F).
Anthozoa (E).
فئة حيوانات بحرية من المجفوات تتميز بمدخلها المشابة بالازهار البسرية .

٢٦٧٠١ - مَزُونَاوَة Florifère (F). Floriferous (E).
نمت تعريفي يطلق على كل نبات مزهر أو كثير الزهر .



مزار الراعي المائي



مزون



مزون



مزور

٢٦٥١١ - مَرْوَزَّة * ، كَيْدَمَة مَرْوَزَّة

Labrus turdus (S). Labre tourd, Tourd (F).
Labrus turdus, Wrasse (E).

نوع من الكيديم . سمكة بحرية بيوض . أصلها معتم
لقاليم البحر الأبيض المتوسط . تتميز من أسماك الجناح
والخشاف . جسمها اهليلجي الشكل ، يطول من ٢٢
الى ٣٠ سم . قوتها قليل التباين بين الشقين . اللون السالك
غوا الاخير يمتد وتشت لهته عند الظهر ويغير عند البلوغ .
غضاب الذكر اميق واللع من غضاب الانثى . رأسها
مخروطي الشوذن . فكها متعادلان . شفتها متحوس
الانفراج . اسنانها كبيرة ، حادة . عيناها كبيرتان
جاسطتان . زعنفتها الظهرية مستطيلة ، ارجوانية اللون
يعلوها تبييج ازرق واخضر . زعانفها الصدرية والشرجية
تتحل بخشاب الظهرية . الحوضية جوية اللون اما
الذيلية فسنانية الشكل ، جوية اللون يعلوها كالظهرية
تبييج ازرق واخضر . لها جيد الصف ، مرغوب فيه .

٢٦٥١٢ - مَرْوَزَّة * Gnomon, Cadran solaire (F).

Sun-dial, Gnomon (E).
هي الساعة الشمسية ، قولها قضيب عمودي ميل ظله
يحدد الوقت .

٢٦٥١٣ - مَرْوَزَّة ° Goniométrie (F).

Goniometry (E).
هي علم قياس الزوايا .

٢٦٥١٤ - مَرْوَزَّة Dasyphylla (F).

من الادراك ما كانت نصالها كثيفة الزوبر .

٢٦٥١٥ - مَرْوَزَّة ° هو المعداد او مقياس الاعداد .

٢٦٥١٦ - مَرْوَزَّة ° Oléagineux (F).

Oleaginous, Oily (E).
هي الاغضاء النباتية ، اغصنها البزور والثمار ، الغنية
بالمواد الزيتية .

٢٦٥١٧ - مَسَاح ، مَسَاح Arpenteur, Géomètre (F).

Surveyor, Geometer (E).
الذي يمسح الارض فيقيس طولها وعرضا لحفرة مساحتها .
راجع ارني .

٢٦٥١٨ - مِسَاح Superficie (F).

Superficies, Area (E).
قياس سطح الشيء .

٢٦٥١٩ - مِسَاح Cadastre (F).

Cadastral survey, Survey (E).
المساحة هي مجموعة الوثائق والرسوم والخرائط التي تفل
على مساحة الاراضي الزراعية وغير الزراعية وبيان الالوية
والعقارات وتخطيطها وتعبئها على وجه التفصيل في البلد .

وبراد بها ايضا الاموال نفسها التي يقوم بها الاختصاصيين
الذين تنوط بهم الادارة هذه المهمة . لغرض الرئيسي من
هذه الاموال هو تحديد الملكية العقارية بالثقة الواجبة
ثم تقدير الضرائب التي تقوى الملاك على دفعها منظورا
فيها الى ثمن الاملاك ودخلها .

٢٦٥٢٠ - مَسَاحَة ° Harpyia (S).

Harpe céphalote
جنس سيوان من فصيلة البطاطيات . انزلته المعرفة
لثلاثة ، موطنها للقرق يبرز المحيط الهادي حتى استراليا .
اجسامها صغيرة للقد ، طولها يراوح من ١١ الى ١٢ سم .

يسلطا من ٤٠ الى ٤٥ سم . وروصها مستوية ، غناياتها
انثوية الشكل فارقة . تنيش جوامات قليلة البعد .
تأثت الانجبار الحربية الطويلة . مسرعا من النسق الى
الغبر . قوتها الجار على اختلاف انواعها .

٢٦٥٢١ - مَسَاد Pot (F).

تحي السنن أو السلل .

٢٦٥٢٢ - مَسَاد مَسَامِيَة Paramètres climatiques (F).

Climatic parameters (E).
المساعد المناخية مجموعة العوامل الواجب معرفتها في تحديد
اقليم معين أو كورة أو بقعة . اهمها ملجن الاطوار
وكثتها وتوزيعها . التبخر . الاشعاع الشمسي . الحرارة
القوى والذوا والرياح . الرطوبة الجوية النسبية .
الرياح . الضغط الجوي .

٢٦٥٢٣ - مَسَار Electrode

هو للالاح ، اطلية .

٢٦٥٢٤ - مَسَارِي ، مَسَارِيَة Mésentère (F).

Mesentery (E).
هي طبقات الصفاق .

٢٦٥٢٥ - مَسَارِي الْخَصْمِيَة Mesorchium

٢٦٥٢٦ - مَسَارِي الْمَبِيح Mesovarium

٢٦٥٢٧ - مَسَاس Alisme (F).

نبات طبي جلدوري مائي يعرف بملار الرابي ، اطلية .

٢٦٥٢٨ - مَسَاسَة Anrodera (S). Anrôdère (F).

جلس نباتات معمرة عارضة من فصيلة السرمقيات . انواعه
قليلة نسا البرية والزراعية الفريينية . اصلها البلاد الحارة .
انزادها جملة الشكل ملونة .

٢٦٥٢٩ - مَسَاعِدَة Assistance (F).

هي الاسماء ، راجعه .

٢٦٥٣٠ - مَسَاقِلَة ، مَسَاسَة Ball à complant

هي ان يلحق المالك مزدرة مفروشا أو غير مفروش
فيلزم المستاجر اما يتعهد افراشه او يفرسه مقابل مقدار
معين من الثمار . ويشترط فيه وجوب قيام المستاجر بالترامه
على اكل وجهه والا تلحق الاجارة حقا بكون مقاضاة .

٢٦٥٣١ - مَسَالِف Passéiste (F).

المساليف المشايح المعجب بالمناهي .

٢٦٥٣٢ - مَسَالِك تَسَالِيَة Conduites génitales (F).

Genital ducts (E).
هي الموادر التناسلية .

٢٦٥٣٣ - مَسَكَمِي Poreux (F).

Porous (E).
ذو مسام .

٢٦٥٣٤ - مَسَامِيَة Porosité (F).

Porosity (E).
كون الشيء ذا مسام .

٢٦٥٣٥ - مَسَاهِم Actionnaire (F).

Shareholder (E).
هو كل من يملك سهما في شركة سامية .



مَرْوَزَّة



مَرْوَزَّة



مَسَاحَة

Intimé (F). مُصَنَّفَاتٌ عَلَيْهِ
Respondent, Defendant (E).
هو المتداعي الذي استأنف الحكم الصادر بحقه .

Néophyte (F). مُصَنَّفٌ
Neophyte (E).
التحق حديثاً .

Mire à œufs (F). مُصَنَّفِي *
إداة غاصة بفصوص البيض حل الضوء الصناعي تمييزاً
للمزكوم من غير المزكوم .

Creux (F). مُصَنَّفُوف
نمت تعريض يخلق حل التبرؤغ العادية الطعم المألوف أو
التي يتميز عليها بسبب فاضح يجبه للزوق .

Lapidifique (F). Lapidific (E). مُصَنَّفُوجِر
صالح لتجسير .

Bénéficiaire (F). Beneficiary (E). مُصَنَّفِيق ، مُصَنَّفِيْد
Emulsion مُصَنَّفَلِب

Emulsion مُصَنَّفَلِب
سائل دائع يحمل رذاذاً من المواد النعنية أو الراتنجية
المعلقة .

Sensitive (F). مُصَنَّفِيْة
حفية زينة مركبة تلمس حساسة ، أطلها .

Employeur (F). Employer (E). مُصَنَّفِدُوم ، مُصَنَّفِدُوم
رب العمل الذي يستعين على عمله بالذين يستعملهم .

Employé (F). مُصَنَّفِدُوم
Employed, Servant (E). كل من أدى الخدمة المنوطة به .

Extrait (F). Extract (E). مُصَنَّفُوجِر ، مُصَنَّفُوجِر ، مُصَنَّفُوجِر
هو جزء من عقد رسمي أو حكم يسلخ بحرفه ويسلم إلى
طالبه ويكون له قوة الاتبات التي لقسند الأصلي .

Polygalées (F). مُصَنَّفِدَات
هي البولوغانيات ، أطلها .

Latier (F). مُصَنَّفِدُوكَة
هي البولوغانيات ، أطلها .

Echauffant (F). Heating (E). مُصَنَّفِيْط
نمت تعريض يخلق حل الاصلاح والحجوب التي تلشط حرارة
الجسم وتسبب الادفاء .

Commodataire (F). مُصَنَّفِيْجِر
هو الذي يأخذ العين المارة من المير في عقد العارية .

Firme (F). Firm (E). مُصَنَّفَل
Firme agricole. مُصَنَّفَل زراعي *
Exploitation agricole (F). Farming (E).

Futurisme (F). مُصَنَّفِيْكيْة
Futurism (E).
المضيقية نظرية حديثة في فلسفة الفن قولها مزيج من

٢٦٥٣٦ - مُصَانَفَةٌ ، مُصَانَفَةٌ المُصَانَفَة
Contribution
هو أن يسام كل واحد من الزموا دفع دين مشترك في
دفع حصة من هذا الدين من الجميع .

Equivalent مُصَانَفُوف ، مُصَانَفُوف
Egalité (F). Equality, Parity (E). مُصَانَفَاة

Limnomètre (F). مُصَانَفَاخ *
Limnimeter (E).
هو الكتياف جهاز يستعمل في تقدير ارتفاع مستوى
البحيرات .

Sonde (F). مُصَانَفَاك * ، مُصَانَفَاك
Sounding-line, Lead (E).
أداة السبر ، تقع حل اشكال مختلفة . تستعمل في الطب
والزراعة والأرض .

٢٦٥٤١ - مُصَانَفَاك * ، مُصَانَفَاك * ، مُصَانَفَاك
المُصَانَفَاك *
Panurus (S).
Panure, Mélange des roseaux (F).

جنس طير من فصيلة القرقيفيات . أنواعه المرفوعة قليلة
العدد ، أصلها الشرق الاوسط وأوروبية الجنوبية والشرقية .
اجسامها وأذناها مسطحة . اجنتها محتلة للقد ،
منفرجة الأطراف . منقريها قصيرة مستقيمة المقواعد ،
مسطحة أطراف الخافض العليا البيضة للتجسين || أعراف
أنواعه وأشهرها السيل الفضي .

٢٦٥٤٢ - مُصَانَفَاك لَفِي *
Panurus biarmicus (S). Panure à moustaches (F).
Bearded titmouse (E).

طائر من السيل . طوله نحو ١٧ سم . سباله لطفة سوداء
خلية تمتد من الزند وقاعدة الجفن إلى طرف العنق . رأسه
إلى الزنقة الرمادية الموج . عنقه وجيشته إلى البياض
الفضي . ظهره إلى الصبهة الصنائية . جناياه إلى السرة
الخطية الجذبة بالبياض . بطنه إلى الصبهة الغامقة ، ذنبه
ورقبي الریش المتراكب ، أصغر اللون ، حنطلي الموج .
منقاره وحيدة حية إلى الصفار المايق . ريشه وأصابعه إلى
الزبد الرصاصية || أصلها الشرق الاوسط وأوروبية الجنوبية
والشرقية بألف المناطق للمقاصب وجماري الماء || قوته
الحشرات ونبوت الثباتات المتغذية والمالية || يذئن في
الادغال والأشجار . عشه كالحجرب تقع فيه الاثن من ٦
إلى ٨ بيضات تحضنها بمنارة الذكر نحو ١٣ يوماً .

٢٦٥٤٣ - مُصَانَفَاك ، مُصَانَفَاك
Fonderie (F).
Foundry (E).
لعمل المعز لتطوب المعادن وسبها .

٢٦٥٤٤ - مُصَانَفَاك ، مُصَانَفَاك
Organe mâle des insectes (F). Manly organ of in-
sects (E).
المضو الذكري في الحشرات .

٢٦٥٤٥ - مُصَانَفَاك
Locataire (F).
Tenant, Lodger (E).
هو الذي تنقذ الاجارة من مالك العين باسمه .

٢٦٥٤٦ - مُصَانَفَاك
Appelant (F). Appealing (E). مُصَانَفَاك
هو المتداعي الذي يستأنف الحكم الصادر .



مِسَار (١)



مِسَار (٢)



مِسَال لَفِي



مِسْتَل

Aréomètre, Densimètre (F). Áraeometer, Densimeter (E). مقياس الكثافة.



Triangulation ٢٦٦٠٣ - مَسْتَحْكَمَةٌ
عملية تأريخ وديم بواسطة المثلثات تمهيداً لكليل المساحة.

Ossaire (F), Ossier-bed (E). ٢٦٦٠٤ - مَسْحَرَكَةٌ
منبت السور اي المصفاة .

Broyeur (F). ٢٦٦٠٥ - مَسْحَقٌ
Braking machine (E).
آلة تستعمل لسحق المسالك والكتب وما اشبه .

Broyeur-effibreux (F). ٢٦٦٠٦ - مَسْحَقٌ مِهْشَقٌ
آلة لسحق وألشف أكل من المسحق المادي .

Broie (F), Brake (E). ٢٦٦٠٧ - مَسْحَكَةٌ
آلة لسحق بيا سوق القنب والكتان قبل مشطها .

Gourmette (F). ٢٦٦٠٨ - مَسْحَلٌ
Curb, Curb-chain (E).
سلسلة صغيرة متصلة بطري الشكبة تكون تحت جهنفة الفرس السفل .

Catalyse (F), Catalysis (E). ٢٦٦٠٩ - مَسْحَلَةٌ
هي التحليل بالاماسة او الانحلال بمجرد ملامسة مادة اخرى لا تنثير .

Catalytique (F). ٢٦٦١٠ - مَسْحَلِيٌّ
Catalytic (E).
هو ما يتميز بالانحلال اللسي .

Poudre de sang (F). ٢٦٦١١ - مَسْحُوقُ الدَّمِ
مركب عضوي تجدد فيه السنج النباتية الجوارينية مغلف المواد الغذائية اللازمة لجهاثها . وهو يستعمل من الدم بعد تجفيفه ومعالجته فقصاء على رائحته الكريهة . مظهره الخارجى حبيبات دقيقة حمراء اللون سواء المواجه للامع . يستعمل في اعلاف الدواجن على اختلاف انواعها ويستعمل في الزراعة كمهاد أزوتي عضوي لانه يحوي من ١٠ الى ١٤ ٪ من الأزوت . وهو من انشط الاسمدة الطبيعية لكنه بطيء الاندماج والتأدية .

Poudre d'os (F). ٢٦٦١٢ - مَسْحُوقُ الْعَظْمِ
سماد فسفوري عضوي يستعمل من العظم الذي يحوي الكثير من سفات الكلس وكر بوات الكلس || اشكاله التجارية المستعملة ثلاثة : الخام والاشجيمي واللاصقي .

Poudre d'os brut (F). ٢٦٦١٣ - مَسْحُوقُ الْعَظْمِ الْخام
هو الخثاقى من سحق العظام كما هي دون معالجتها وهو يحوي :

من ١٥ الى ٢٥ ٪ من الجافس الفسفوري
ومن ٣ الى ٥ ٪ من الأزوت

غير أن ما يحوي من شحم ، يؤثر فاعلية الحسب ويشط بعض الاوصام البكتيرية المؤذية ، يجعله محدود الاستعمال .

٢٦٦١٤ - مَسْحُوقُ الْعَظْمِ الْأَشْجَمِيِّ
هو الخثاقى من سحق العظام بعد استخلاص ما فيها من شحم . وهو يحوي :

من ١٥ الى ٢٥ ٪ من الجافس الفسفوري
ومن ٣ الى ٥ ٪ من الأزوت

وهو قليل الاستعمال كمحرق العظم الخام .

٢٦٥٨٨ - مَسْتَوَاتَاتُ الْبُزُورِ ، وَهَكَايَاتُ الْبُزُورِ
Angiospermes (F), Angiosperms (E).

أحد قسمي باديات الزهر وهو يشمل النباتات التي تكون بيضها في مبيض وبزرها في ثمرة || تقسم مستورات البزور الى قسمين : وحيدات القلفة وذوات القلقتين .

٢٦٥٨٩ - مَسْتَوَاتَاتُ الزَّهْرِ ، وَهَكَايَاتُ الْوَلَعِ
Cryptogames (F), Cryptogams (E).
قسم من المملكة النباتية ، نباتاته مستورة اعضاء التناسل تتوضع الى ثلاثة صفوف : مستورات الزهر الوائعية ، الفلجيات والمشريات .

٢٦٥٩٠ - مَسْتَوَاتَاتُ الزَّهْرِ الْوَعَايَةِ
Cryptogames vasculaires, Pteridophytes (F). Vascular cryptogams, Pteridophyta (E).
صف من النباتات الخفيات الاعضاء التناسلية . اشهر نباتاتها السراخس والقبائيات التي تحمل ثلاثة اعضاء فقط وهي الجنود والسوق والاوراق .

٢٦٥٩١ - مَسْتَبِكٌ ، مَسْتَبِجُونُ التَّطْعِمِ
Mastic à greffer (F), Mastic for graft (E).
مادة مركبة عازلة يستعملها البستاني في ستر جروح التطعيم او لتقليم لجهاثها من الهواء والحرارة .

Marnière (F), Mari-pit (E). ٢٦٥٩٢ - مَسْتَبَاكَةٌ
المسبالة هي مقلع السجيل .

Marnière (F). ٢٦٥٩٣ - مَسْتَبَاكَةٌ
هي المسبالة

Arpentage (F). ٢٦٥٩٤ - مَسْبَحٌ
Land-measuring (E).
قياس مساحة الارض .

Terre plate (F), Flat land (E). ٢٦٥٩٥ - مَسْبَحَاءٌ
ارض مستوية ذات حصى صفار . ج. مسطح وسلي .

Néphoscope (F). ٢٦٥٩٦ - مَسْتَبَاكٌ
Nephoscope (E).
جهاز يستعمل لدرس تحركات السحب .

Niveleur (F), Leveler (E). ٢٦٥٩٧ - مَسْبَاكَةٌ
أداة يستعملها البستاني لتسطيح الاكواد وسنغ اعضاءها .

Ravale (F). ٢٦٥٩٨ - مَسْبَاكَةُ الْآبَةِ
آلة زراعية مجرورة تستعمل لبسط التراب وتوسيعه .


Anémographe (F). ٢٦٥٩٩ - مَسْبَاكَةٌ
Anemograph (E).
جهاز يسجل سرعة الريح واتجاهها ومقدارها .

٢٦٦٠٠ - مَسْبَاكٌ
هو الهواء ، اطلية .

Aéifère (F). ٢٦٦٠١ - مَسْبَاكِيٌّ
Aeriferous (E).

نمت تعريفى يطلق على ما هو غصن ينقل الهواء اللازم لتنفس هذه النباتات والحويون . نسيج مسامي ، فيمرات مسامية ...

٢٦٦٠٢ - مَسْبَاكٌ ، وَسِطٌ
Catalyseur
جسم يحدث التحليل بالاماسة .



مسحاج

٢٦٦١٥ - مَسْحُوقُ الْعَطَمِ الْأَهْلَامِيِّ (F).

هو الماتر من سحق العظام بعد استخلاص ما فيها من شحم ودهان . مظهره الخارجى مسحوق ناعم ابيض اللون يحوي :
من ٢٦ الى ٣٤ ٪ من الحامض الكلسوري
ومن ١٥ الى ١٥ ٪ من الازوت
وهو جزيلى القابلة شائع الاستعمال .

٢٦٦١٦ - مَسْحُوقُ الْقَرْنِ (F).

سماد عضوي يتنجم من سحق القرون والظلوف بعد تحميمها او معالجتها بالبخار . وهو يحوي :

من ١٠ الى ١٥ ٪ من الازوت
من ٤ الى ٦ ٪ من الحامض الكلسوري
من ٦ الى ٧ ٪ من الكلس

يعتبر من الاسمدة الجزيلة النفع الطويلة الاجل لانه يغذي من التربة اكثر من سولين .

٢٦٦١٧ - مَسِخ (F).

ج. مسوخ . ثلثه عارضة او وراثية تطوره الشكل المألوف .

٢٦٦١٨ - مَسِخَكَة (F).

آلة تستعمل لقرع السليح لتفك التربة دون ان تقلبها ويكثر ذراتها .

٢٦٦١٩ - مَسْمُوح (F).

نمت ثمرتي يوصف به كل حيوان او نبات ثلث بعض افضال من قاعدة الانفراد الذاتي كما في خروف البحر الذي تنحدر ببلده . وكما هي حال القمامة في النبات .

٢٦٦٢٠ - مَسَد (F).

ج. ساد وأساد .

٢٦٦٢١ - مَسَدَاس (F).

جهاز يمكن من قياس الابعاد الموزانية وتحديد ارتفاع الكواكب عن الأفق .

٢٦٦٢٢ - مَسَدَاس (F).

المسداس كوكبية نجوم جنوبية الموقع شكلها يشبه المسداس || نجوما قليلة العدد جميعها من المرتبة الخامسة وما دونها .

٢٦٦٢٣ - مَسَدَاس (F).

اداة آلة تستخدم في ذر المساحيق فتشدها كالهباب .

٢٦٦٢٤ - مَسَدَّس (F).

شكل منتظم سدس التوازي والاضلاع .

٢٦٦٢٥ - مَسَدَّسُ السُّطُوح (F).

Hexaèdre (F). Hexahedron (E).

٢٦٦٢٦ - مَسَدُوم (F).

نمت تعريفية يطلق على الاشياء التي يشاهد القباب او الغمام او الدخان ...

٢٦٦٢٧ - مَسَدِي (F).

Fibreux (F). Fibrous (E).

٢٦٦٢٨ - مَسَرَّ (F).

Fraysère (F).
Spawning place or season (E).
المكان حيث يبيض السمك .

٢٦٦٢٩ - مَسَرَكَة (F).

Oviducta (F). Oviduct (E).
المراء قناة البيض .

٢٦٦٣٠ - مَسَرَكَة (F).

Poil glanduleux (F).
Glandulous down (E).
عضو ليفاني خلي ادب يتفك على مختلف اجناس الفئان .
ج. مسارب .

٢٦٦٣١ - مَسَرَط ، مَسَرَط (F).

Esophage (F).
Esophagus (E).
هو مجرى الطعام في الحلق ويصاحبه البلم والري .

٢٦٦٣٢ - مَسَرُول (F).

Balzane haut-chassée (F).
الدرس مسرول اذا بلغ التجيب الركبتين او المرقبين .

٢٦٦٣٣ - مَسَرِي (F).

Régime (F) Rule (E).
هو مجموعة القواعد المفروضة او المتبعة .

٢٦٦٣٤ - مَسَطَّاح (F).

Pianmètre (F).
Pianimeter (E).
جهاز يستعمل في قياس السطح .

٢٦٦٣٥ - مَسَطَّار ، مَسَطَّارَة (F).

Moët (F). Must (E).
عصير العنب الجديد قبل ان يستعمل الى اخر .

٢٦٦٣٦ - مَسَطَّابَة (F).

Banquette (F).
Bench terrace (E).
سطح من الارض كفافه من التراب او احجاره يصنع في المواقع المنحدرة منحا لانجراف التربة .

٢٦٦٣٧ - مَسَطَّاح ، مَسَطَّابَة (F).

Palier (F).
Landing, Stair-head (E).

٢٦٦٣٨ - مَسَطَّاحُ مَسَطَّاحِي الْأَضلاع (F).

Parallélogramme (F). Parallelogram (E).

٢٦٦٣٩ - مَسَطَّاحُ مَسَطَّاحِي (F).

Parallélogramme rectangle (F). Rectangular parallelogram (E).

٢٦٦٤٠ - مَسَطَّاحُ مَسَطَّاحِي (F).

Parallélogramme oblique (F). Oblique parallelogram (E).

٢٦٦٤١ - مَسَطَّابَة ، مَسَطَّابَة (F).

Echantillon (F).
Sample, Pattern (E).
هي النية والنية .

٢٦٦٤٢ - مَسَطَّابَة الإرتفاع (F).

Mire (F). Sight (E).
هي المير ، جهاز يمكن من تحديد الارتفاع النسبي .

٢٦٦٤٣ - مَسَطَّابَة (F).

Calorimètre (F).
Calorimeter (E).
جهاز يستعمل في قياس كيات الحرارة الناتجة والصادرة والواردة .

٢٦٦٤٤ - مَسَطَّابَة ، مَسَطَّابَة (F).

Calorifique (F).
Calorific (E).
نمت تعريفية تصف به الاشياء التي تولد الحرارة .

٢٦٦٤٥ - مَسَطَّابَات (F).

Calorimétrie (F).
Calorimetry (E).
درس طبيعي يبحث في قياسات الحرارة .



مسففة



سداس



مسطاح



مسار

Arrhes (F). **سَمَكَا** ٢٦٦٦٣
Earnest, Deposit (E).
هو البرين الذي يدفعه احد طرفي العقد الى الآخر
ساعة التعاقد .

٢٦٦٦٤ - **سَمَكِيَة ، كَوْد**
Planche à semis, Planche surélevée, Plate-bande (F).
Border, Bed, Seed-bed (E).
مستطيل من التراب ارفع من سطح التربة مستقيم الاضواء
محاط بجرم ضيق .

Bouillon blanc (F). **سَمَكِر الحَوْت** ٢٦٦٦٥
هو البوصير ، اطلية .

Local d'habitation (F). **سَمَكَن** ٢٦٦٦٦
Dwelling-local (E).
المسكن او محل السكن هو المكان الذي يختصه المرء
لسكنه .

Habitation rurale (F). **سَمَكَن زُرَاحِي** ٢٦٦٦٧
Rural residence (E).
كل بناء او بيت ريفي يسكنه من اقام في الريف او
توجد حل الريف بها كانت طبقة الاجتماعية . راجع
بيت زراحي .

Massicot **سَمَكُوت** ٢٦٦٦٨
هو بروكسيد الرصاص الاصفر اللون .

Moschifère (F). **سَمِكِي** ٢٦٦٦٩
Moschiferous (E).
لعت تعريف يطلق على الاجهزة الخاصة التي تتركز مادة
المسك وتجمعها عند الحيوان .

Muscat (F). **سَمَكَا ، سَمَكَا** ٢٦٦٧٠
صفة العنب المسكي المعروف وفي الكرونة غروب حديقة
مشهورة بهذا العرف المذاقي .

Moschinas (F). **سَمَكِيَات** ٢٦٦٧١
نفة من فصيلة الأليات تشمل جنساً واحداً يدعى أيل
المسك .

٢٦٦٧٢ - **سَمَلَاخ**
النخلة التي ينتشر سهرها وهو اخضر . وفي حديث مسا
يشتره المشتري على البائع انه ليس له سملاخ ولا محصار .

Erode (F). **سَمَلَة** ٢٦٦٧٣
لوع من الجزأب ، مشهور باسم أبو مشقة ، اطلية .

٢٦٦٧٤ - **سَمَلِيح ، مَهْمِيح**
المكان الذي يكثر فيه سلح الطير .

Abattoir (F). **سَمَلِيح** ٢٦٦٧٥
Slaughter-house (E).
المكان المخصص لشر وبقاة الحيوانات ويحيط المجزر .

٢٦٦٧٦ - **سَمَلِيكَة ، مَشَقَن**
Scarificateur (F). Scarificator, Hoeing-machine (E).
اداة تبشر ذرات التراب وتسوي سطح التربة وتقلع
الاعشاب .

Malcolmia (S). Malcolmia (F). **سَمَلَاخ** ٢٦٦٧٧
جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة الصليبيات .

Pal injecteur (F). **سَمَلِيكَة** ٢٦٦٤٦
Soil injector, Root injector (E).
أداة زراعية تستعمل في حقن التربة لمكافحة بعض الحشرات
والاصنام النباتية .

Homéotherme (F). **سَمَلُور** ٢٦٦٤٧
Homœothermal (E).
لعت تعريف يطلق على كل حيوان ثابت الحرارة المستقرة .

Courbine (F). **سَمَلَار** ٢٦٦٤٨
سمكة بحرية تدعى مصفار ، اطلية .

Masca (F). **سَمَلَة** ٢٦٦٤٩
سمكة بحرية تدعى ايضاً غليو ، اطلية .

Projection **سَمَلُط** ٢٦٦٥٠

Projection horizontale (F). Horizontal projection (E). **سَمَلُط اَافِي** ٢٦٦٥١

Projection verticale, Élévation (F). Vertical projection, Elevation (E). **سَمَلُط اَافِي** ٢٦٦٥٢

Projection orthogonale (F). Orthogonal projection (E). **سَمَلُط عَمُودِي** ٢٦٦٥٣

Cypress (E). **سَمَلَكَة ، وَدَعَة** ٢٦٦٥٤
Porcelaine (F).
جلس حيوانات بحرية من الرضويات المندبات . اولوها
مدينة . اسدانها صغيرة اللد ، شبه بيضية ، مبطلة .
تكثر في بحار البلاد الحارة . تستعمل لتزيين القواب .

Irrigué (F). Irrigata (E). **سَمَلُوتِي** ٢٦٦٥٥
المسقوي او المروي هو كل زرع يسقى .

Peau de poisson (F). **سَمَلَك** ٢٦٦٥٦
Fish skin (E).
المسك هو جلده المسك . ج سوك .

Musc (F). Musk (E). **سَمَلَك** ٢٦٦٥٧
مادة دهنية عطرية سمره اللون يفرزها أيل المسك .

٢٦٦٥٨ - **سَمَلَك الجَن**
اسم يطلق على عدة نباتات انصها حفيشة الريح
والنيموم .

٢٦٦٥٩ - **سَمَلَك اللَه قَاتِر** هي الهابة .

Tubéreuse (F). **سَمَلَك زُومِي** ٢٦٦٦٠
هو الزنبق نبات زينة من الترنجيات .

Saccharimètre (F). **سَمَلَاكِر** ٢٦٦٦١
Saccharimeter (E).
جهاز يستعمل في قياس مقادير السكر الموجودة في
الموائل . ويحيط ايضاً بقياس السكر ومغفار .

٢٦٦٦٢ - **سَمَلَاكَة** هو الهبوة ، اطلية .



سَفَلَة



سَمَكَا



سَمَلَة

Brousse (F). Bush (E). ٢٦٦٨٨ - مِسْتَب ٥

المسك كل فلاة أو فيض أو سهب تملؤها بعض الاشجار الميترية التجميع . ج سائت .

Odontoglosses (F). مِسْكَنَات الأَسْبَكَة ٢٦٦٨٩

فئة من الرخويات تحمل في أطراف السنبا بعض الانسان الصغيرة الذرية .

Courant d'air (F). مَسْبَح ٢٦٦٩٠

Wind current (E).
مر الريح ويحركها في اي مكان أو موضع كان .

Gorge-bleue (F). مَسْبَر ٢٦٦٩١

هو المزة ، طائر من السليبات ، اطلبا .

Aristoloe siphon (F). مَسْبُورَة ٢٦٦٩٢

هو زراوله سيلو ، اطلبا .

Courant d'air (F). مَسْبَك ٢٦٦٩٣

Air current (E).
هو المسح اي مر الريح أو مجرى الهواء .

Purgatif (F). مَسْبِل ٢٦٦٩٤

Purgative, Purgig (E).
دواء يطلق البطن . اشهر مسلات الحيوان : سلات السردا و سلات المنيترزا وزيت الخروع .

Cheval demi-sang (F). مَسْبَم ٢٦٦٩٥

Half-bred horse (E).
الفرس المجين .

Spatula (F). مَسْوَاط ٢٦٦٩٦

Spatula, Palette-knife (E).
أداة من خشب تستعمل لطبق الزينة و سائر الحيوانات .

Cudran (F). مَسْوَاق ٢٦٦٩٧

Dial-plato, Dial (E). ٢٦٦٩٨ - مَسْوَاك ٥

Oldenlandia (S). ٢٦٦٩٨ - مَسْوَاك ٥

Oldenlandia (F). Indian madder (E). Oldenlandia (D). Oldenlandia (I).

جلس نباتات عشبية وجنية من فصيلة القويوات ، أنواعها ٢٠٠ ، اطلبا البلاد الحارة . مسطها بري وبعضها زراعي صنعي يستخرج من جلود مادة صينية حمراء اللون .

Paseorage (F). مَسْوَاك الزاهي ٢٦٦٩٩

هو التصاب ، نبات من فصيلة السليبات ، اطلبا .

٢٦٧٠٠ - مَسْوَكة ، مَسْبَكَة ، مَسْبَكَة

Présure (F). Rannet (E).

خيرة قابلة للذوبان تستخرج من منقة الجدي الرقيق .

تستعمل في تجميد الحليب .

Dominé (F). مَسْوَدة ، مَسْوَدة ٢٦٧٠١

Dominated (E).

نمت تمرير يطلق على كل شجرة لا يزيد ارتفاع سننها

عقب قمة الشجرة السالفة .

Eau saumâtre (F). Briny (E). مَسْوس ٢٦٧٠٢

المسوس الماء بين الطيب والمالح . قال الجارج :

لو كنت ملاك كنت لا طيب المالح ولا مسوا ٥

أنواعها عديدة منها حوض البحر المتوسط . سفيها فرماء تملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم . أوراقها متناقبة أحليجية مقطوعة . نصلها خلي البثرة سنن الحافة . ازهارها طرفي الاركان ، عنقودي التجميع . ازهارها صغيرة القد يكثر فيها الايض والاحمر والقنريزي || اشهر أنواعها الزينية ما يتبع .

Malcolmia maritima (S).

Malcolmia bicolor (S).

Malcolmia littorea (S).

مساح مجري

مساح لثالي ألقون

مساح جديحي

٢٦٦٧٨ - مَسْكَك ٥

Paissau (F). Vine-stick (E).

هو المرح ، مسك يستعمل لدم الكمية أو لرطها من التربة .

٢٦٦٧٩ - مَسْس ٥

Acanthe-uraine (F).

نبات يدمي اقتنا رهلة ، اطلبا .

٢٦٦٨٠ - مَسْكَك ، مَسْكَك ، مَسْكَك

Aristoloe cotoneuse (F).

هو الزراوله الزايف ، اطلبا .

٢٦٦٨١ - مَسْكَك ٥

Piscine, Vivier (F).

Fish-pond, Fish-wall, Stew (E).

حوض كبير ترب في الاسماك .

٢٦٦٨٢ - مَسْكَك ٥

Digue (F). Dike, Embankment (E).

حاجز يقام في وجه المياه لتحول جزء منها أو لتخفيف سرعة انسيابها .

٢٦٦٨٣ - مَسْج ٥

Bigarré, Rayé (F).

Motley, Streaked, Striped (E).

صفة النشء المجهج .

٢٦٦٨٤ - مَسْجَل ٥

Anargié (F).

نمت تعريف يطلق على من اخصمت فيه عوارض الانهاض .

٢٦٦٨٥ - مَسْجَد ٥

Tuteur (F). Prop (E).

هو كل حود يوضع بجانب القرية أو الشجيرة لتسند اليه .

لذلك يحسن ان يكون مستقيماً وان لا يقل متوسط قطره

من ٤ سم . افضله اصلية كالسنديان والمثلوث... تقطع

المساند في اواخر الربيع فتكف وتكثر اطرافها العليا

بالمشمار وتثبت اطرافها السفلى التي تستعمل التربة بالمنجل

أو بالقدوم ثم تقطع بمحلول سلفات النحاس وتثبت

كذلك حتى ينشج المحلول من قة المسك . والمحلول يتركب

من كيلو سلفات النحاس في عشرة لتر ماء . وهو يحفظ

المساند من النثر نحو سبعة احوام . ويحسب من الخريان

الذي ان اصحابا تقش الى جميع الاغراس والاشجار .

٢٦٦٨٦ - مَسْجَد ٥

Espalier (F).

أخط من الاشجار المشرفة القائمة على جدار . ج مسندات .

٢٦٦٨٧ - مَسْجَد ٥

Mussanda (S). Mussende (F).

جلس نباتات جنينة من فصيلة القويوات . انواعها المعروفة

زهاء ٥٥ . جميعها من نباتات العالم القديم . اطلبا البلاد

الاستوائية والحارة . سفيها فرعاء . أوراقها متناقبة أحليجية .

ازهارها طرفي التجميع ، تاجي الاركان . ازهارها خماسية

التركيب ، مسطلة الانابيب . لحاء سفيها وفادها حافسة .

أوراقها تملد الخروع . ازهارها تنفع الصدر وتذهب بالسعال

وتقلل الجروح .



مسكة



مسوك

٢٦٧١٧ - مَسْأَلَة * ، شَجَرَة الجِرْح ، نِيْسَج
Nicotiana glauca (S).

نوع من نيج وسبكا وهو بجنة برية معمرة في المناطق الحارة ، حولية في المتدلة . يعيش على السواحل اللبنانية . ساقه خشبية متعصبة فراء تملأ من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقه متعاقبة ، متبادعة الاوتكاز ، معققة ، مستطيلة الزناد . نصلها رمي الشكل ، جامد الصنفه ، بحري اللون . ازهاره خماسية التركيب ، طرفية الاوتكاز ، صفراء اللون . ثماره جرداء رايعة اللق تلتف بعض البذور الحقيقية ، الكروية ، الكستانية اللون || يقال ان اوراقه طيبة تفيد الجراح وتطالها .

٢٦٧١٣ - مَسْجِكَة
Terre imperméable (F).
Impermeable soil (E).

المسكينة من الارضين التي تملك الماء وتمنع انصرافه .
٢٦٧١٤ - مَسْجِكَة
Armoise dorée (F).

هي القيصوم الكافوري ، اطليه .
٢٦٧١٥ - مَسْجِكَة
Erodium mosqu岸 (F).

هي الجذاب المسكي ، اطليه .
٢٦٧١٦ - مَسْجِل
Hydromètre (F).

مقياس كثافة السوائل وقوة انطباعها .
Hydrometer (E).

٢٦٧١٧ - مَسْجِل
Baradine (F).

هو الخنثى الذي يصنع في الارض الجبلية المتعددة طبع الامطار وتربيتها خفوا من اضرارها .
٢٦٧١٨ - مَسْكَ
Baradine (F).

هو الجزر وقيل نبت يشبهه .
٢٦٧١٩ - مَسْأَلَة
Péripatéticien (F).

المشاه من اتيق فلسفة ارسطو .
Peripatetic (E).

٢٦٧٢٠ - مَسْأَلَة ، تَرْمِدْ كَالِي
Pépinieriste (F).

هو من تعاطى استنار المشاتل .
Nurseryman (E).

٢٦٧٢١ - مَسْأَلَة
Apomixis (F).

هو التكاثر آتيل العاد الاخصاب .
٢٦٧٢٢ - مَسْأَلَة
Ferme, Métairie (F).

ارض زراعية يجريها صاحبها بمقد .
Farm, Small farm (E).

٢٦٧٢٣ - مَسْأَلَة ، إِشْتِرَاط
Sculpation (F).

هي كل شرط او اتفاق او قيد ينص عليه في العقد .
٢٦٧٢٤ - مَسْأَلَة التَحْكِيم
Clause compromissoire (F).

Stipulating arbitration of clause (E).

Solarium (S).

Solarium, Cadran (F). Solarium (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مغميات الارجل وفضيلة المسقيات . انواعها الماصرة المعروفة نحو ١٥ منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اصداؤها مدورة محززة الحمار والمنتفخة ، ملوكة ومرفوقة اجسامها مستطيلة . رؤوسها قصيرة حادة الاطام ثنائية القواس المعروفة . اطامها قرينة المادة .

٢٦٧٠٤ - مَسْجِلِيَّات
Solarilidae (S).

Solarilidae (F). Solarilidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مغميات الارجل اماميات الخياشيم . اجسامها وانواعها المعروفة قليلة العدد اطامها بحار البلاد الحارة || اصداؤها مدورة ، صابغة الطع ، محززة الحمار ، ملوكة ، مرفوقة ، متساوية الزعوق والرفقة || اعرف اجسامها واشهرها المسقة .

٢٦٧٠٥ - مَسْؤَلِيَّة
Responsabilité (F).

Responsability (E).

هي الالتزام بازالة الضرر الواقع على الغير بفعل المرء او بسببه او بفعل غيره . وتتمثل في الصبح التالية :

مسؤولية الاضرار (F).

مسؤولية المرء عن فعل غيره
Responsabilité du fait d'autrui (F).

مسؤولية المرء عن فعل حيوانه
Responsabilité du fait des animaux (F).

مسؤولية المرء عن الاجادات
Responsabilité du fait des choses inanimées (F).

مسؤولية المرء عن مبانها
Responsabilité du fait des bâtiments (F).

مسؤولية تعاقدية
Responsabilité contractuelle (F).

مسؤولية قانونية
Responsabilité légale (F).

مسؤولية مخلفة
Responsabilité atténuée (F).

مسؤولية مدنية
Responsabilité civile (F).

مسؤولية مشتركة
Responsabilité partagée (F).

٢٦٧٠٦ - مَسْجِع
Capacimètre (F).

Capacimeter (E).



مسقة



ميس

Haras (F).

٢٦٧٢٨ - مُشَبَّكَة

٢٦٧٢٧ - مُشَاش هو النظم الطويل ، اطليه .

Breeding-stud, Stud (E).

موسسة تربي يكثرهم للحيال المبددة للزرو .

٢٦٧٢٨ - مُشَاشَة Cartilage de l'extrémité des os

Caniveau, Emissaire (F).

٢٦٧٢٩ - مُشَبَّرَكَة

٢٦٧٢٩ - مُشَاش * Notopterus (S).

Channel stone, Gutter, Overflow channel (E).

Notoptère (F). Notopterus (E).

قناة لصرف المياه ، وهي قناة الصرف الاساسية التي تنهي اليها مياه الاسراب وما شبه .

جنس اسماك بحرية من فصيلة المشاطيات . انواعها الممرقية قليلة العدد منتشرة في بعض الانهر الاسيرية اخضعتا لنهر واخوار العراق وادنت . جميعها كبيرة القد تطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم . زعانفها الظهرية صغيرة ضيقة . زعانفها البطنية والشرجية متباعدة كالمشط . لحويها مأكولة متوسطة الصنفت || اشهر انواعها مشطاش شيلاتا (Notop-terus chilata) الذي لا يقل طوله عن ١٠٠ سم . والذي يكثر وجوده في اخوار الهند ومليزيا .

Amentifère (F).

٢٦٧٣٠ - مُشَبَّرَق *

٢٦٧٣٠ - مُشَاشِيَّات * Notopteridae (S).

من النبات ما كان ازهاره قد نفي الشكل كالشجرة .

٢٦٧٣٠ - مُشَاشِيَّات (E).

Rassasiant (F).

٢٦٧٤١ - مُشَبَّع

٢٦٧٣١ - مُشَاش indivia (F). Undivided (E).

نمت تحريتي يطلق على كل تبيع ملجم الصفات الملائمية التي تتركز دون اللقاعة وفوق الموزونة .

فصيلة اسماك بحرية من فصيلة المشاطيات . اجناسها وانواعها الممرقية قليلة العدد جميعها من اسماك مناطق البلاد الحارة || اشهر اجناسها المشطاش .

٢٦٧٤٢ - مُشَبَّع ، مُشَرَّب ، مُعَمَّم

٢٦٧٣٢ - مُشَاش * Pecten (S).

Imprégné (F). Impregnated (E).

٢٦٧٣٢ - مُشَاش * Pecten (E).

Prévenu (F).

٢٦٧٤٣ - مُشَبَّو ، فَتِين

٢٦٧٣٣ - مُشَاش ، مُشَقَّة ، مُجَرَّ

Accused (E).

هو الذي تلقى عليه شبه اقتراف الجريمة .

٢٦٧٣٣ - مُشَاش ، مُشَقَّة ، مُجَرَّ

٢٦٧٤٤ - مُشَبَّات Dispersif (F). Dispersive (E).

٢٦٧٣٤ - مُشَاشَة Tille, Taille (F). Hamp-harb (E).

٢٦٧٤٥ - مُشَبَّار Extracteur (F). Extractor (E).

٢٦٧٣٥ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (S).

جهاز آلي يستعمل لاستخراج العسل من النحلاريب وذلك بتأثير القوة التائبة .

٢٦٧٣٥ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

٢٦٧٤٦ - مُشَبَّع ، مُشَاش ، مُشَاش عَلَى الشُّيُوع

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (F).

Indivisaire (F). Co-partancer (E).

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

هو ما يملك مع غيره مال على الشيوع .

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

٢٦٧٤٧ - مُشَبَّرَكَة Collectif (F). Collective (E).

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

٢٦٧٤٨ - مُشَبَّرَكَات Hamamelidaceae (S).

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

٢٦٧٤٩ - مُشَبَّرَكَة Hamamelidaceae (F). Hamamelidaceae (E).

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . نباتها اشجار وشجيرات .

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

اوراقها معتقة اذنينة . ازهارها خشوية . ثمارها جراه صغيرة .

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

مظم انواعها بري وبعضها طيب وزيطي .

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

٢٦٧٥٠ - مُشَبَّرَكَة عَمَلِيَّة Hamamelis mollis (S). Hamamelis veloucé (F).

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

شجرة متوسطة القد غائرة تعلو نحو ١٠ امتار . موطنها الصين .

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

اوراقها خلية البشرة على صفحاتها السفلى . ازهارها كبيرة للقد ، خافتة الورد ، لها الى الصفرة الزرقاء ،

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

كوكوها خوية عابقة || ازهارها يستمر من اواخر

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

كانون الى اواخر اذار .

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

٢٦٧٥٠ - مُشَبَّرَكَة عَمَلِيَّة Hamamelis mollis (S). Hamamelis veloucé (F).

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

شجرة متوسطة القد غائرة تعلو نحو ١٠ امتار . موطنها الصين .

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

اوراقها خلية البشرة على صفحاتها السفلى . ازهارها كبيرة للقد ، خافتة الورد ، لها الى الصفرة الزرقاء ،

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

كوكوها خوية عابقة || ازهارها يستمر من اواخر

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

كانون الى اواخر اذار .

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

٢٦٧٥٠ - مُشَبَّرَكَة عَمَلِيَّة Hamamelis mollis (S). Hamamelis veloucé (F).

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

شجرة متوسطة القد غائرة تعلو نحو ١٠ امتار . موطنها الصين .

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

اوراقها خلية البشرة على صفحاتها السفلى . ازهارها كبيرة للقد ، خافتة الورد ، لها الى الصفرة الزرقاء ،

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

كوكوها خوية عابقة || ازهارها يستمر من اواخر

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

كانون الى اواخر اذار .

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

٢٦٧٥٠ - مُشَبَّرَكَة عَمَلِيَّة Hamamelis mollis (S). Hamamelis veloucé (F).

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

شجرة متوسطة القد غائرة تعلو نحو ١٠ امتار . موطنها الصين .

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

اوراقها خلية البشرة على صفحاتها السفلى . ازهارها كبيرة للقد ، خافتة الورد ، لها الى الصفرة الزرقاء ،

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

كوكوها خوية عابقة || ازهارها يستمر من اواخر

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

كانون الى اواخر اذار .

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

٢٦٧٥٠ - مُشَبَّرَكَة عَمَلِيَّة Hamamelis mollis (S). Hamamelis veloucé (F).

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

شجرة متوسطة القد غائرة تعلو نحو ١٠ امتار . موطنها الصين .

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

اوراقها خلية البشرة على صفحاتها السفلى . ازهارها كبيرة للقد ، خافتة الورد ، لها الى الصفرة الزرقاء ،

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

كوكوها خوية عابقة || ازهارها يستمر من اواخر

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

كانون الى اواخر اذار .

٢٦٧٣٦ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (E).

217561 - **مُسْتَرْكَة رَيْبِيَّة**
Dendromètre (F). **مِشْجَار** °
Dendrometer (E).
أداة تستعمل في قياس الانحجار لتقدير الطول والحجم .

217570 - **مِشْجَر**
Bols (F). Wood, Forest (E).
موضع الشجر ونبتته الطبيعي .

217561 - **مِشْجَارَة**
Nigrospora (S).
جنس فطور مجهرية من الدخيات ونسيلة الطحنيات. تتميز
بجذعها الثلاثي التكوين والشكل . الخشب منها بسيط
التركيب ، فردي التجميع ، منتصب الارتفاع ، عايق
للون . أما الماقر ففسي التجميع مداد . كئالها
كروية ، متتابة ، كثيرة العدد || أحرف أنوعها مشحارة
الذرة ومشحارة الموز .

217562 - **مِشْجَارَة الذُّرَّة**
Nigrospora oryzae (S).
فطر مجهرى يركب عرائس الذرة قرب ادراك حباتها فيفسد
الالوان بعد ان يسبب انحلالاً وأسودادها مما يؤدي من
تساقط الحب قبل الانعاش والغلاف || يذرك باجتباب
المواقع الرطبة ويكافح باستعمال مسحوق ثيرلان تطهيراً
حل النبات .

217563 - **مِشْجَارَة المَوْز** °
Nigrospora musae (S).
فطر مجهرى يركب ثمار الموز المحفوظة ليُسبب للباب
ويقوده إلى الانحلال دون أن يبدو حل القشرة ما يتم من
الاصابة || يكافح عند ظهور اول اصابع الكيانات
المحفوظة بسائل ثيرلان المركز من ١ الى ٢ ٪ .

217564 - **مِشْجَب**
Racloir (F). Scraper (E).

217565 - **مِشْجَحَة**
Tainte (F).
Tint, Shade, Hue (E).

217566 - **مِشْجَحَة**
Fauille (F).

217567 - **مِشْجَحَة**
Charasson, Pisseau
هو المرحض أي المموك، عود يوضع تحت قضيب الكرم
يرفعه عن التربة .

217568 - **مِشْجَحَاب** °
Lactomètre, Pèse-lait (F).
Lactometer (E).
هو ميزان الحليب، جهاز يستعمل لتقدير نسبة المواد
السمية المرسدة في الحليب .

217569 - **مِشْجَحَل**
Baliveau (F).
Staddle (E).
كل فرع أو شجرة من الخشب تركت بدون قطع لتكبر
وتصير حجرة . ج. اعجاز .

217570 - **مِشْجَدَب** °
Serpette (F).
Pruning-knif, Serpette (F).
سكين خاص يستعمل في قطع القروع والقضبان المرصية
وفي التطعيم .

217571 - **مِشْجَر**
مشر ويشتر الشجر: مخرج ورقه واكتس خضرة .

217561 - **مُسْتَرْكَة رَيْبِيَّة**
Hamamelis vernalis (S). Hamamelis prinatiler (F).
جنية سبروتية تملو نحو ٢٠٠ سم. مهدا البلاد الامريكية.
ساقها فراء . فروعها منتصبه . اوراقها تطول نحو ٦ سم.
نصلها مائل الصفحة . ازهارها حلوية الرائحة ، حمر
الكروس ، صفرا البلات || ازهارها يستمر من
كانون الثاني الى اواخر اذار .

217572 - **مُسْتَرْكَة فِيرْجِينِيَّة**
Hamamelis virginiana (S). Hamamelis de Virginie (F).
جنية سبروتية تملو من ٣ الى ٤ أمتار . مهدا امريكا
الشالية . اوراقها مائلة الصفحة تطول من ٥ الى ٨ سم.
ازهارها صفراء اللون . ازهارها يتنوء عند اقبال الورق
ويستمر من اواسط ايلول الى اواسط كانون .

217573 - **مُسْتَرْكَة يَابَانِيَّة**
Hamamelis japonica (S). Hamamelis japonica (E).
شجرة سبروتية صغيرة القد فائضة تملو من ٤ الى ٧ أمتار .
مهدا اليابان . فروعها الزرقية اربعة . الزمان ازهارها
تختلف باختلاف فروعها منها الاصفر الخصب والكبريتي
والبيروني والبرتقالي . جميعها حلوة مستحبة المرق .
ازهارها يستمر من شباط الى نيسان .

217574 - **مُسْتَرْي** ، **بِرْجيس**
Jupiter (F).
Jupiter (E).

المشتري أو البرجيس اكبر كوكب في مجموعة النظام
الشمسي . يجتر المم كوكب بعد الزهرة . يقسم بين المريخ
وزحل . جرم كتلته يفوق جرم الارض نحو ١٢٩٥ مرة
وقطره يفوق قطر الارض نحو ١١ مرة . سرعة دورته
الانقلابية في الفضاء نحو ٤٦٩٨٠ كيلومتر بالساعة .
دورته المحورية حول الشمس تستمر نحو ١٢ سنة . مدة
اليوم البرجيسي نحو عشر ساعات . ويدور في فلكه اربعة
القار كبيرة وعمانية صغيرة . اسماء الكبيرة : ليو ، ادرابه ،
غاميد ، كليم . أما الصغيرة فاقامها من ٥ الى ١٢
لانها لا تحمل اسماء || والمشتري يستمر المشتري السد
الأكبر لانه فوق الزهرة في السعادة واضافوا اليه الخيرات
الكثيرة والسعادات العظيمة .

217575 - **مُسْتَرْق**
Dérivé (F).
Derivative, Drifted (E).

217576 - **مُسْتَحْل** ، **مُسْتَحْتَب** ، **دَلْدَالَة**
Pépinière (F). Nursery (E).
مكان تستنبت فيه للفراس والنباتات المختلفة فتنشأ فيه
وتكثف فترة من الزمن الى ان تنقل وتروى في مستقرا .

217577 - **مِشْجَلُون** ° ، **شَاوِل**
Plantoir (F).
Dibble (E).
أداة من حديد أو خشب تتصل في التشتيل أي غرس
الشجر .

217578 - **مِشْشَن** °
Filère (F). Spinneret (E).
المشّن القومَة التي يخرج منها الخيط عند نفس المشرات
كمشيط الحرير عند دودة القز وكالتواي عند الرقباد ||
وهو أيضاً جهاز من القفلاذ يستعمل في جذب المادد
ومدها وتحويلها الى اسلاك .



مشتلون



مشحارة الموز



مشخاب



مشذب



مشط



مشط الزامي



مشط الزامي البري



مشط الزهراء

عشب فيها انسان تسمى بها التصاب ويطلى بها الحب .
وللمشط اشكال ، اهمها استعمال :

Herse en bois (F).	مشط خشبي
Herse rotative (F).	مشط دوّار
Herse trépanante (F).	مشط زاحف
Herse canadienne (F).	مشط كندي
Herse émoussue (F).	مشط مدري
Herse souple (F).	مشط مرن
Herse articulée (F).	مشط مفصل
Herse norvégienne (F).	مشط زوجي

Herbage (F). - **مُشَطّ** ، **تَمَشِيط**

Harrowing (E).
حرّاة سطحية بالمشط، التعمد منها تنجم التربة وتظليلها من الاحشاب .

Chromis (F). - **مُشَطّ**
هو البلطي، جنس اسماك بحرية ونهرية من فصيلة المشطيات.

2٦٧٩١ - **مُشَطّ الذئب**
« نبت صغير طيب الرائحة يقارب الكزبرة » .

2٦٧٩٢ - **مُشَطّ الراعي *** ، **شَوَلَة الدَّرَاج**
Dipsacus fullonum (S). Chardon à foulon (F). Bonnetier, Cardère à foulon (F). Draper's teasel, Fuller's teasel, Teazle (E). Weberkardes, Kardendistel (D). Cardo dei lanaioli, Dissaco, Lattugoni (I).
نبات حشوي زواحي صناعي من فصيلة الدبسيات .
رؤوساته الزهرية حوافث شائكة متراكبة متراصة منبسطة الاطراف تولّد اكراناً اسطوانية تستعمل في تذيب الصوف.

2٦٧٩٣ - **مُشَطّ الراعي البرّي ***
Dipsacus sylvestris (S). Cardère sauvage, Cabaret des oiseaux, Baignoire de Vénus (F). Wild teasel, Shepherd's rod, Barber's brushes (E). Schuttkarde (D). Dissaco salvatico, Erba messella, Varga da pastore (I).
نبات حشوي بري شائك من فصيلة الدبسيات . يزود ماكل المصانير انصها الحشون ولهاجم . يعتبر من النباتات الضارة لانه يغطي على سائر النباتات التي تنبش بقره .

Métatarses (F). - **مُشَطّ الرجل**
Metatarsus (E).

2٦٧٩٥ - **مُشَطّ الزَهْرَاء *** ، **مُشَيِّطَة**
Scandix
جنس نباتات عشبية من فصيلة البنيانيات . اولاده المعروفة ١٠ ، جميعها برية . اولها نباتة مركبة طويلة الزناد . ازهارها غميّة تتجمع فيغصاء اللين . تكثر بين الزروع ويوجد في جميع البلاد . انشورها واعمها مشط الزهراء الطويل.

2٦٧٩٦ - **مُشَطّ الزَهْرَاء الطويل**
Scandix pecten-veneris (S). Scandix peigne de Vénus, Aiguille de berger (F). Shepherd's needle, Venus' comb (E). Echter Nadelkerbel, Venus-kamm (D). Scandica, Forsacco, Pettine di venera (I).
نوع من مشط الزهراء يكثر في الارض البور وبين الزروع فيجمعها ويؤخذها .

Liquemètre (F). - **مُشْرَاب ***
Liquometer (E).
المشرب هو ميزان المشروبات، جهاز يستعمل لقياس درجة الكحول في المشروبات الروحية .

Thalle (F). Thallus (E). - **مُشْرَكَة**
هي جهاز شجاع خليايات الزهر كالظهور والالاع .

2٦٧٧٤ - **مُشْرَكَة**
طائر صغير مديح كان ثوب وبني (اللسان) .

2٦٧٧٥ - **مُشْرَكَة**
Couleuvre à échelons (F).
هي الخلت الاقصر ، اطلبه .

2٦٧٧٦ - **مُشْرَب على الوسي**
Subrogatuteur (F). Deputy-guardian (E).
هو الذي يقدم مقام الوصي على التماس اذا تضاربت مصالحها ، أما مهمته الاصلية فهي مراقبة اعمال الوصي .

2٦٧٧٧ - **مُشْرَفَة**
Ecmeuse (F).
هي المصفاة، آلة تحشّ الزرع عالياً عشية من الحشجان .

2٦٧٧٨ - **مُشْرُوب**
Boisson (F).
Drink, Beverage (E).

2٦٧٧٩ - **مُشْرُوج ، لاشيقي**
Agane (F).
Agamous (E).

2٦٧٨٠ - **مُشْرُوع ، تصميم**
Projet (F).
Project (E).

2٦٧٨١ - **مُشْرُوع استيعالي**
Projet préalable (F).
Previous project (E).

2٦٧٨٢ - **مُشْرُوع إهند ادي**
Avant-projet (F).
Advance project (E).

2٦٧٨٣ - **مُشْرُوع العكّد**
Avant-contrat (F).
Advance contract (E).
راجع عقد الولد .

2٦٧٨٤ - **مُشْرُوع قانُون**
Projet de loi (F).
Draft bill (E).
هو المشروع الذي تقدمه الحكومة وتقدمه الى المجلس اللبناني باسم رئيس الجمهورية ليقره ويصبح قانوناً .

2٦٧٨٥ - **مُشْرُوبات المتأقير ، منبّيات المتأقير**
Dentrostres (F). Sickblabl (E).
رقية من الطيور الجاهل تشبه بعض الفصائل ، اشهرها الدغليات والذهريات والشعوريات والصرديات .

2٦٧٨٦ - **مُشْرِيَّات ، نباتات عكّويّة**
Thallophytes (F). Thallophyta (E).
صف من المملكة النباتية . نباتاته تتكون من جرم ينش فطراً او ذلاً . وهي عادمة الجذور والسوق والاوراق والازهار . امتناسها وانواعها تعد بغصّة الاف جميعها ثلاث شعب : البكتريات والخليايات والفطريات .

2٦٧٨٧ - **مُشْتَش**
Suros (F). Splint, Tumeur (E).
حلة تترى الخيل وهي تربيات في الزلف .

2٦٧٨٨ - **مُشَطّ ***
Herse (F). Harrow (E).
اداة تستعمل لتشيط التربة . يعني « شبة من حديد او

Actinales ٢٦٨١١ - **مُشَعَّات**
رَبِيَّةٌ مِنَ الْمَرْجَانِيَّاتِ تُشَعِّلُ الْعَدِيدَ مِنَ الْفَسَائِلِ وَالْإِنْسَائِلِ
وَالْأَنْوَاعِ .

Indicateur (F). ٢٦٨١٢ - **مِشْعَار**
Indicator, Indicatory (E).

Radiomètre (F). ٢٦٨١٣ - **مِشْعَاع**
Radiometer (E).
أَلْشَاعُ جِهَازٌ يُعَمَلُ فِيهِ لِبَاسٌ شَدَّةُ النُّورِ .

Compte-gouttes (F). ٢٦٨١٤ - **مِشْعَال**
Dropper, Drop-tube (E).

Terebellum (S). ٢٦٨١٥ - **مِشْعَبَكَة**
Térébelle, Tàrèlè (F). Terebellum (E).
جَنْسٌ حَيَوَانَاتٍ بَحْرِيَّةٌ مِنَ الرُّضَوِيَّاتِ مَعْدِيَّاتِ الْإِرْبَجِلِ
وَفَصِيلَةُ الدَّلَاحِيَّاتِ . أَنْوَاعُهَا الْمَعْرُوفَةُ عَدِيدَةٌ ، بَعْضُهَا مِنْ
مَتَحَجِرَاتِ الْأَحْقَابِ الثَّالِثَةِ وَالْبَعْضُ الْآخَرُ مَعَاوِرُ
مُنْتَشِرٌ فِي بَعْضِ بَحَارِ الْبِلَادِ الْحَارَةِ أَخَصُّهَا الْهَيْطُ الْهَنْدِيُّ ||
أَصْدَافُهَا صَارُونِيَّةُ الشَّكْلِ ، مُسْتَطِيلَةُ الْفُرْعَةِ الْغَلِيَّةِ
الْأَلْفَرَجِ . أَجْسَامُهَا صَغِيرَةٌ الْقَدِّ ، غُرُوطِيَّةُ الْإِعْطَامِ
الْمُسْتَطِيلَةِ .

Fané (F). Faded (E). ٢٦٨١٦ - **مِشْعُون**
نَمَتْ تَرَمِيحُ تَرُوصَفُ بِهِ الْأَصْغَارُ لِلنَّبَاتِيَّةِ الْذَالِيَّةِ .

Atelier, Local de travail (F). ٢٦٨١٧ - **مِشْعَل**
Work shop (E).
هُوَ الْمَكَانُ الْمَدُّ الشَّغْلِ .

Enanthe (F). ٢٦٨١٨ - **مِشْعِيل**
هو الرَّاظِيَّةُ ، نَبَاتٌ مِنَ الصِّيْرَانِيَّاتِ ، أَطْلُبُهَا .

Phellandre (F). ٢٦٨١٩ - **مِشْعِيل مَالِي**
أَطْلُبُ رَازِيَّانَةَ مَالِيَّةٍ .

Pneumatique (F). ٢٦٨٢٠ - **مِشْعَاط**
Pneumatic (E).

Diaphanomètre (F). ٢٦٨٢١ - **مِشْعَاف**
Diaphanometer (E).
جِهَازٌ يُمْكِنُ مِنْ دَرَسِ وَتَحْدِيدِ شَفِيفِ الْأَجْسَامِ وَالسَّوَالِكِ .

Babine du chameau (F). ٢٦٨٢٢ - **مِشْقَر** ، **مِشْقَر**
المَشْقَرُ مِنَ الْهَيْمِ كَالْجِلْفَةِ مِنَ الْفَرَسِ . ج. مَشْفَر .

٢٦٨٢٣ - **مِشْقِي** سَمَكَةٌ بَحْرِيَّةٌ مَشْهُورَةٌ بِاسْمِ مَدَجٍّ .

٢٦٨٢٤ - **مِشْقِي مَبْدُول**

Notacanthé commun (F).
سَمَكَةٌ بَحْرِيَّةٌ تَدْعَى مَدَجٍّ مَبْدُولَ ، أَطْلُبُهَا .

٢٦٨٢٥ - **مِشْقِي** ، **تَقْشِير**

Tailage (F). Stripping (E).
غُصْلُ الْمَشَاقَةِ أَيْ الْقَشْرَةِ مِنْ سَوَاقِ الْقُشْبِ وَالْكُتَانِ وَمَا
أَشْبَهَ .

Ebroutage ٢٦٨٢٦ - **مِشْقِي** ، **مِشْقَاق** ، **هَتَّ**
فُصْلُ وَرَقِ التَّبْوَنِ مِنْ أَسْوَاقِهِ قَبْلَ تَقْدِيمِهِ إِلَى دَوْدِ الْقَزِّ .

Dérayure (F). Water-furrow (E). ٢٦٨٢٧ - **مِشْقِي**
مَنْخَفِضٌ يَتَرَكُ بَيْنَ الْكَيْسَيْنِ فِي الْحَرَاثَةِ تَسْهِيْلًا لَصَرْفِ
الْمَاءِ .

Méscarpe (F). ٢٦٦٩٧ - **مُشَطِّبُ الْيَدِ**
Metacarpus (E).

Fissifolié (F). ٢٦٦٩٨ - **مُشَطَّرُورُ التَّصَلِّ**
Fissifoliat (E).

نَمَتْ تَرَمِيحُ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ نَبَاتٍ يَحْمِلُ أَوْرَاقًا نَحَاثًا
مُشَطَّرَةً الْأَطْرَافِ .

Diatomaceae (S). ٢٦٦٩٩ - **مُشَطَّرُورَات**
Diatomacées (F). Diatomaceae (E).

فَصِيلَةٌ مِنَ أَلْسِنَةِ السَّمْرِ . أَجْسَامُهَا وَأَنْوَاعُهَا كَثِيرَةٌ الْعَدَدِ
جَمِيعُهَا نَبَاتَاتٌ مَجْهَرِيَّةٌ مِنْ صَعِيدَاتِ الْخَلِيَّةِ . تَعْيِشُ فِي
أَلْيَاءِ الْمَلْحَةِ وَالْمَلْحَةِ .

Kigélie (F). ٢٦٨٠٠ - **مُشَطَّرُورَة**
هي الْكَيْجِيلِيَّةُ ، أَطْلُبُهَا .

Pinnal, Pinné (F). Pinnate (E). ٢٦٨٠١ - **مُشَطَّي**
شَكْلٌ مِنْ أَشْكَالِ أَوْرَاقِ النَّبَاتِ يُشَبِّهُ الْمَشَطَّ .

Pectiné (F). Pectinate (E). ٢٦٨٠٢ - **مُشَطَّي**
شَكْلٌ مِنَ الزُّبُرُكِيِّ يُشَبِّهُ الْمَشَطَّ .

Ctenodonte (F). ٢٦٨٠٣ - **مُشَطَّي الْأَسْنَانِ**
Ctenodonte (E).
مِنْ الْخَيْوَانِ وَالْأَسْمَاكِ مَنْ كَانَتْ أَسْنَانُهُ كَالْمَشَطِّ .

Bipectiné (F). ٢٦٨٠٤ - **مُشَطَّي مُزْدَوِج**
Bipectinate (E).
شَكْلٌ مِنَ الزُّبُرُكِيِّ يُشَبِّهُ الْمَشَطَّ الْمَزْدَوِجَ مِنْ جِهَتَيْ الطُّولِ .

Chromidae (S). ٢٦٨٠٥ - **مُشَطَّيَات**
Chromidés (F). Chromidae (E).
فَصِيلَةٌ أَسْمَاكِ مِنَ رَبِيَّةِ شَالِكَاكَاتِ الْأَمْعَانِ .

Ctenophores (F). ٢٦٨٠٦ - **مِشَطَّيَات**
Ctenophora (E).
رَبِيَّةٌ حَيَوَانَاتٍ دَلِيًّا مِنْ شُعْبَةِ مَجْمُوعَاتِ الْبِلُطُونِ .

٢٦٨٠٧ - **مِشَطَّيَاتُ الْخَيْطَامِ**
Ctenobranches (F). Ctenobranches (E).

رَبِيَّةٌ مِنَ الرُّضَوِيَّاتِ مَعْدِيَّاتِ الْأَوْبِلِ أَمَامِيَّاتِ الْخَيْطَامِ .
نَحَاثَتُهَا وَأَنْوَاعُهَا وَأَنْوَاعُهَا عَدِيدَةٌ . جَمِيعُهَا وَسَائِدَةُ الْمَشَطِّ
الْخَيْطَامِيِّ وَالْأَلْبَنِ وَالْخَفَرِ . وَجَمِيعُهَا أَيْضًا يَمْلِكِيَّةُ الْأَعْضَاءِ
لَأَنَّ الْأَعْضَاءَ الْبَسَادِيَّةَ الْمُقَابِلَةَ حَامِرَةٌ لَا عَمَلَ لَهَا .

Rétribution (F). ٢٦٨٠٨ - **مِشْع**
Remuneration, Reward (E).

الْمِشْعُ حِمَاةٌ تَدْفَعُ أَجْرًا أَوْ مَكَاثِفًا لِمَنْ يَقْرُمُ بِسَلِّ
فَالْمَشَاقِ وَالرَّائِبِ وَالْجَزَائِرِ وَالشَّكْمِ وَالْإِتْمَانِ وَالْبَسَلَةِ وَالْمَالَةِ
وَالْتَوْبِخِصِ جَمِيعُهَا تَجْتَمِعُ مِنْ الْأَشْعَاقِ .

Radiomètre (F). ٢٦٨٠٩ - **مِشْع** ، **مِشْعَاع**
Radiometer (E).
مِقْيَاسُ شَدَّةِ أَضْوَاءِ النُّورِ .

Flustra (S). ٢٦٨١٠ - **مِشْعَاب**
Flustrelle (F). Flustra (E).

جَنْسٌ حَيَوَانَاتٍ طَلْعِيَّةٌ بَحْرِيَّةٌ ثَلَاثِيَّةُ التَّجْمِيعِ مُتَعَمِّمَةٌ تَعْيِشُ
عَلَى الْفُرُوسِ .



مِشْعَة

البشرة، من الحافة. ازدهارها غشوية كبيرة اللد، يضاء اللون، وريدة الموالج. ثمارها لحمية السويك، لا قرياسة الشكل، خلية البشرة، قصيرة الاذن، للذلة العلم، مستحبة البرف والنكهة. صمغها بيضية غشوية طيبة ويفلطة تخضن ريزة جامدة للساب الايش. وثمره المشمش توكل طازية ورطب وتجفف ويصنع من صمغها رطب ناشف لدن يملك الاجزاء صمغي الشكل يلى قر اللين يكثر استهلاكه في البلاد العربية.

٢٦٨٢٨ - **مُشَقَّاسِي** ° Commensurable
نعت تعريفي يطلق على ما يمكن قياسه هو وغيره بقياس واحد مشترك.

٢٦٨٢٩ - **مُشَقَّاسِيَّة** ° Commensurabilité (F).
Commensurabilité (E).
امكان قياس كيتين او اكثر بقياس واحد.

٢٦٨٣٠ - **مُشَقَّة** Filasse (F). Tow (E).
هي المادة التي ما غلص بالمشق من لحاء النباتات اللينة كالقنب والكتان.

٢٦٨٣١ - **مُشَقَّن** Scarificateur (F).
المسلفة تسوي بها التربة المبلورة.

٢٦٨٣٢ - **مُشَقَّقُ الْجَنَاح** Fistipenne (F).
Fistipinna (E).
نعت تعريفي يطلق على كل طائر مشقوق الجناح.

٢٦٨٣٣ - **مُشَقَّقَاتُ الْأَرْجُل** Schizopodes, Fistipèdes (E).
رتبة حيوانات من الفشريات.

٢٦٨٣٤ - **مُشَقَّقَاتُ الْأَنْسَنَة** Fissilingues
رؤية من المطالبات تشمل بعض الفصائل. تتميز بالسنبا المستطيلة المشرفة الفارقة الاعادة.

٢٦٨٣٥ - **مُشَقَّقَاتُ الْمَتَايِر** Fissirostres (F).
Fissirostros (E).
رؤية من الطيور الجواثم.

٢٦٨٣٦ - **مُشَكَّالَة** Guirlande (F).
Garland, Wreath (E).

٢٦٨٣٧ - **مُشَكَّال** Allotropique (F).
Alloctropic (E).

صفة بعض الاجسام كالكربون والفسفور وغيرها التي تتصل بأشكال حكيمة مختلفة دون ان يتبدل شيئاً من تركيبها الجزيئي.

٢٦٨٣٨ - **مُشَكَّرَا** Mentha aquatica (F).
هو الفوتنج المائي، اطلبه.

٢٦٨٣٩ - **مُشَكَّكَة** Fraîtière (F).
Strawberry-bed (E).
قطعة ارض مفروسة شيلكاً ج مثلك.

٢٦٨٤٠ - **مُشَقَّلُوز**
هو المشمش اللوزي المحلو المخ. الواحدة مشقولة.

٢٦٨٤١ - **مُشَمَّاس** Mélioscope (F). Helioscope (E).
منظار الشمس.

٢٦٨٤٢ - **مُشَمَّاسِي** Mélioscopique (F).
Helioscopic (E).

٢٦٨٤٣ - **مُشَمِّش** °
Prunus armenica, Armenica vulgaris (S). Abricotier (F). Apricot tree (E). Aprikosen, Echta Aprikose (D). Albicocco, Armellini, Melico (I).
شجرة مشمرة من فصيلة الورديات. ثمارها من ٧ الى ١٥ م. ساقها قصيرة. اغصانها وفروها منسقة. ثمرها تكون في اول صيفها ملءاً ثم تتشقق مع مرور الزمن. اوراقها حابلة، متعاقبة، مسقة، غليظة الشكل. لصلها مائل

مهد:
قبل انه من نبوت السجم او ادينيا وقد اختلفوا اخيراً على انه من نبوت الصين لانهم عرفوه واستقروه منذ زهاء ٢٠٠ سنة قبل الميلاد، وقد أدخل من الصين بالتتالي الى الهند فالسجم فالسراق فالروميا فتركيا فالبلقان فالإيطاليا.

الليم:
لو لم يكن المشمش من النباتات البكرية الاقترار ولو لم يكن ازدهار يشق الاوراق ويتأثر من صقيع الربيع لكانت سائر النباتات المختلة توافقه. لذلك فهو رطب في الاماكن الدافئة والمعارض الجنوبية والمواقع التي لا تكثر فيها الريح المحسنة.

تربسه:
ينمو ويحيد في جميع الارية ولا يألف من كثرة الحمى اما يحض شدة الالتصاق والطرورية المستحكة || وهو من الاجنار المسقوية التي تتطلب الري المنتظم وقد تنضرو من الجلف.

تكيه:
يتكاثر بالبذر وبالعلم. والتعلم يتم عادة بالريقة، مطروح في. أما الاجنار التي يحسن تغذيتها كاهيات فهي اللوز في الاربة الكلسية والخوخ في الاربة المشبعة والدراق في الاربة السميكة القليلة الرطوبة والمشمس الكلالي في سائر الاربة.

فروبه:
فروبه عديدة تقسم الى فئتين: فئة المشمش الكلالي وهو ما كانت بلوره مرة العلم غنية بالحامض السينيديني وفئة المشمش اللوزي (المشوز) وهو ما كانت بلوره مأكولة عادمة الحامض السينيديني || أشهر فروبه الوطنية ما يتبع:

- **السوي:** ثمرته متوسطة القد غاشية. ساقها جوية اللون قليل التشقق. اوراقها مابقة الاخضر صغيرة اللد. ثمارها كبيرة الحجم ضاربة الى الحمرة وهي للذلة العلم غاشية البرف والنكهة. يزورها حلو مأكولة.

- **اليلقي:** اسرامه عديدة، اشهرها الماردي وانغاشي. ثمرته متوسطة القد كروية الشكل. ساقها جوية اللون عيقة الشقوق. فروها منسقة متراصة. اوراقها كبيرة اللد زاهية الاخضر. ثمارها كبيرة الحجم برفاقلة اللون للذلة العلم يكثر استهلاكها في النقرع. يزورها حلو مأكولة.

- **الحوي:** له صرمان «الكير» و «القوس» ثمرته كبيرة القد ساقها مرارة كثيرة الشقوق. اغصانها منسقة متراصة. اوراقها زاهية الاخضر. ثمارها متوسطة الحجم للذلة العلم ذكية البرف والنكهة لغيا الى الصفرة القدية. يزورها حلو العلم مأكولة.

- **السنهالي:** ثمرته كبيرة القد شائعة. ساقها كهية اللون مرارة الموالج. اوراقها صغيرة الصفحة مستطيلة البت



مشمش

٢٦٨٥٣ - مشوشية *
Hypogée (F).
Hypogaeal, Hypogean (E).
لمت تعريفي يطلق على البزور التي تستقر زباراتها ، عند
الاتئاش ، تحت سطح التربة وهي تكاسن بذلك البزور
المربانية التي ترتفع زباراتها فوق سطح التربة .

٢٦٨٥٤ - مشوش * ، مشوش الغراب
Achrostichum (S). Acrostic, Acrostique (F). Full-
fern, Horn-fern (E). Füllfarn (D). Acrostico (I).
جلس نباتات برية وزيدنية من البرسيميات البسباجيات .
انواعه للمروفة قليلة ، ترفب في المنائق والمواقع الرطبة الظليلة .
اوراقها قرصية الالتشاب تطول من ٣٠ الى ١٠٠ سم .
تصغيرها لا يتعدى حدود ازام الثالث ، تشرعها مشاري
الشكل ، مستدير السن .

٢٦٨٥٥ - مشوش
Estrape, Estrapoe (F).
Small sickle (E).
منجل خاص يستعمل في تشويل الجملام .

٢٦٨٥٦ - مشيشاط *
Hétérois (F). Heterosis (E).
المشيط هو حلاج السب الاول اي السلالة الاول عندما
يكون حطم القدر . ويحيث ان صفات المشيط صفات
اتفاقية لا مستقرة ولا وراثية فهلاج السب الثاني لا
يكون مشيطا لانه يرثه الى صفات دحه وهله . ج. مشايط .

٢٦٨٥٧ - مشيشاطي *
Hétéroistique (F).
Heterotic (E).
لمت تعريفي يطلق على بعض العوامل او الصفات المميزة
التي تقود الهجن الى الشطالة او الطوق الشيطاني .

٢٦٨٥٨ - مشيناع *
Diagmètre (F).
Diagmeter (E).
جهاز يستعمل في قياس الاصلية اي قابلية النقل
الحراري في الاجسام .

٢٦٨٥٩ - مشيكة
Allure (F). Carriage (E).
طريقة سير أنجيل واثار الدواب كالخطوط والمطبعة وانخب
والعدو .

٢٦٨٦٠ - مشيكة
Muschia (S). Musschie (F).
جلس نباتات تربينية عشية عشوشية معمرة من فصيلة
الجرسيات . انواعها المعروفة قليلة البلد ، مهدها حوض
البحر المتوسط . سفلها متصصة فراء . اوراقها كبيرة ،
فارشة ، مسننة الاطراف . فصلها ريلة مسترعية تطول
من ٣٠ الى ٦٠ سم . ازهارها حثكولي التجميع ، هري
الشكل . ازهارها صفراء اللون او حراء تطول من ٤
٥ سم . || تنورها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٦٨٦١ - مشيكة الفطر
Mycélium (F).
Mycelium (E).
خيوط دقيقة متشابكة كثيفة التجميع نامية تحمل البوغ
في التطور . ج. امشاج .

٢٦٨٦٢ - مشيطة
Plantain triomphe (F).
هي لقمة التنبه ، اطلبه .

٢٦٨٦٣ - مشيطة
Scandix (F).
هي مشط الزهراء ، اطلبه .

باعت الحصار . ثمارها الى السفرة اللامعة وهي قرية الشبه
من الحسوي لكنها دونه لذة وذكاة . بزورها حلوة مأكولة .

الحمي : شجرته كبيرة الله شائعة . سفلها جزوية
سراء قليلة التشقيق . اقصاها فارشة منبسة . اوراقها
بيضية المسنحة ، قلبية القاعدة ، حيلة الحصار القائم .
ثمارها كبيرة الله حيلة الشكل صفراء اللون غصراء الملوخ
لباها جاند المكسر سكري طعمه غالث العرف والتكة .
- الكلاوي ، الكلبسي : اقصاها عديدة . اشجاره شائعة ،
سفلها جزوية اللون متوسطة الحشونة والتشقيق . اقصاها
منفرجة . اوراقه قلبية مدببة المقص . فصلها قليل الاغصان
والزودة . ثماره كروية الشكل صفيرة الله غزيرة الصدارة
تتسلى في صناعة قر الدين . بزور مرة طعم .

- اللوزي ، المشلوز ، القيسي : شجرته متوسطة الله
قارضة ، اوراقها شديدة الحصار . ثمارها كروية الشكل
متوسطة الله حيلة اللون الابيض تشوبه حرة وردية .
لباها غزير الصدارة ليلد لطمم ذكي العرف والتكة .
بزورها حلوة مأكولة .

٢٦٨٤٤ - مشمش اليابان
Kaki (F).
هو الكاكي ، اطلبه .

٢٦٨٤٥ - مشيش أمريكية
Mammée d'Amérique
شجرة عمرة مشهورة باسم جباس أمريكية ، اطلبه .

٢٦٨٤٦ - مشمشكة
Abricot (F). Apricot (E).
هي ثمرة المشش . راجع جدول الفيتانينات .

٢٦٨٤٧ - مشمشكة
Mespilus (S). Néflier (F).
جلس شجيرات برية وزراعية من فصيلة الورديات . انواعها
قليلة العدد ، البرية منها شائكة والزراعية سرسة . اوراقها
عابلة منقطة اطليلية ، فصلها يارز المروق عشن للمسس
خلل البشرة . ازهارها كبيرة الله بيضاء اللون . ثمارها
كبار الاكيدنيا لكنها اصفر حسيما واقل سديقا ، لونها
الى السرة الكستنية . اشهر انواعها المشملة الميولة .

٢٦٨٤٨ - مشمشكة مبدولة *
Mespilus germanica (S). Néflier commun, N. ger-
manique, Marlier, Nêle (F). Medlar tree, Dutch
medlar (E). Deutsche Mispel (D). Neapolo (I).
نوع من المشملة هي شجيرة زراعية تملو من ٢٥٠ الى ٤٠٠
سم . سفلها سرسة . اوراقها اطليلية مستطيلة
لفصلها يارز المروق ، خلل البشرة ، اصل اللون .
ازهارها كبيرة الله تطول نحر ٤ سم . ثمارها كستنية اللون
شديدة الحسوة الحامضة تؤكل بعد تمام كبرها .

٢٦٨٤٩ - مشمشكة يابانية
Néflier du Japon (F).
هي الاكيدنيا ، اطلبه .

٢٦٨٥٠ - مشن
الشن هي الجندوش او الحشوش او التزيق التي يسبحا
البرد في الثار والاوراق || ثمار المشوشة هي الثار التي
عليها البرد .

٢٦٨٥١ - مشن
مشن البقرة والناقة : حلب ما في ضرعها .

٢٦٨٥٢ - مششوق *
Local de pente (F).
هو المشدوع المذ لتفتيق مشاكلك التبخ او عيطره وديا
يحين وقت التصغير والرزم .



مشملة مبدولة



مشش



مشوش

2٦٨٧٥ - مصاصية
Plantain majeur (F).
في لسان الحمل الكبير - ج. مصاص.

2٦٨٧٦ - مصاصية صغيرة
Plantain moyen (F).
في لسان الحمل المتوسط - اعطيه.

2٦٨٧٧ - مصاص
Pleospora (S).
جنس فطور مجهرية من السعفيات وفصيلة السعفيات.
تتميز بأصنافها البسيطة التي تبتدئ غائرة في نسج النبات
للمتأخر ثم تظهر منتصبة ملطخة. يونها يبيغ الشكل ملون
تفصله الوتر الممتدرة المشطية || أنواعه عديدة أمثلها
ما يتبع.

2٦٨٧٨ - مصاص البرنقار
Pleospora hesperiderum, Macrosporium hesperiderum, Sporodesmium piliforme (S). Noir de l'oranger, Nébula (F).

فطر مجهرى يصيب ثمار البرتقال فيسلبها || مظهره
الخارجي يقع خلية تلو باءة اللون ثم يميل الى السرة
والسواد ركب الثمار تفحش تشربا وتصلب كالسفن.
وهو حل نصل الاوراق نكت مر كالنمش || يكافح
بإستعمال أحد الفواطير القلابة.

2٦٨٧٩ - مصاص البقول
Pleospora herbarum, Stemphylium botryosum, Macrosporium commune, M. parasiticum, M. allorum (S).

فطر مجهرى يؤذي البندى من البقول، نحو : د. فوسا
منها بعض النباتات الغريبة والصليبية والسيوانية، كما يصيب
البندى وورق الشاي وثمار الحنظل الخضرية || مظهره
الخارجي نكت مر كثيفة تملأ نصل الاوراق فتؤذيها
وتؤثر ثمار الحنظل تسبب الطفن الاسود الذي يقضي
عليها || يكافح بإستعمال الفواطير المادية.

2٦٨٨٠ - مصاص التفاح
Pleospora mali, Hendersonia mali (S).
فطر مجهرى يصيب اوراق التفاح لفيضيا || مظهره
الخارجي يقع مر مهدية الاطراف البشجي، ركب نصل
اوراق التفاح فتسلبه وتتمه عن التليام يملأ الحويرو على
الوجه الاكل || يكافح ان طوى، غصبا من تلقا
شبه، بإستعمال أحد الفواطير وأخصاصا حائل بوريو.

2٦٨٨١ - مصاص الجرون
Pleospora hyacinthi, Cladosporium fasciculare (S).
فطر مجهرى يصيب الجرون على اختلاف أنواعه لفيضيه
وكه يصيب جلفاه || مظهره الخارجي يقع مستديرة لنيان
الى الجالوة يملأها ورشح من الخمل الاسمر ركب اسفاد
البصل الخارجية || أضراره غادعة اذا لامته السوائل
الجوية ورطوبة التربة لانه يسبب انحلال الخلايا ومغضا
يكافح بإتلاخ البصل عند ادراكه ويصريفه للشمس مدة
من الزمن، خارج المكان المروي، قبل جمعه وغزله.

2٦٨٨٢ - مصاص الخشخاش
Pleospora papaveracea, Helminthosporium papaveris, Dendryphium penicillatum (S). Helminthosporiose de l'aillette (F).
فطر مجهرى يصيب الخشخاش لفيضيه وكه يصيب يلهه.
مظهره الخارجي يكون على الشتول الحديثة العهد يقع مر
ركب شبح السوق فظبها وتلفي على النبات. ويكون
على الشتول البالغة يقع حنطية ركب نصل الاوراق تسبب

2٦٨٦٤ - مشيك
Brunia (S). Brunnie (F).
الواسدة مشيكة، جنس نباتات جنية يرية وتزيينية
من فصيلة الشيكيات. انواعها المعروفة نحو مشرة. اما
ضروبها التزيينية فعديدة. سوقها منتصبة معتدلة التفتيد.
اوراقها متعاقبة، صغيرة النصل، ازهارها خاصة التركيب،
عديدة الالوان، يكثر فيها الازرق والاصفر والوردي.

2٦٨٦٥ - مشيكيات
Bruniaceae (S).
Bruniades (F). bruniceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلتين عديدة الفصائل، اجناسها
وانواعها المعروفة متوسطة العدد، منتبها بعض اسفاد
افريقية الجنوبية || جميعها جنات ممره. سوقها فراء.
اوراقها متعاقبة شكلية. نصلها خلية البشرة. ازهارها
خاصة التركيب. بزورها صغيرة كثر فيها الاستدرة ||
الشهر اجناسها المشك.

2٦٨٦٦ - مشيكيات
Piscantales (F).
Piscantilla (E).
شعبة من صف القصرحات. فصائلها واجناسها كثيرة
العدد تجتمع الى ١٢ رتبة : البدر والخرقيات ومفردات
الاصابع ويزوجيات الاصابع والخرقيات والقوائم
والخرقيات والخرقيات الاقدام واللوامس ومجنحات الايدي
والليموريات والرتليات.

2٦٨٦٧ - مشيكة
Piscanta, Arrière-faix (F).
Piscanta (E).
الجلب الغشائي الذي يتكون في الجنين داخل الرحم ويخرج
معه عند الوضع.

2٦٨٦٨ - مشيكة
Chorofide (F). Choroid (E).
غشاء العين القائم بين الصلبة والشبكية.

2٦٨٦٩ - مص
Exuccion, Exuccion (F).
Sucking up or out (E).

2٦٨٧٠ - مصاص
نبت له قشور كابصل بعضها فوق بعض كلما قشرت
امصرفة ظهرت اخرى (اللسان).

2٦٨٧١ - مصاص
Cohabitation
حقبة موضوعها استعمال مال المحكوم واستيلاء الحكوة
عليه.

2٦٨٧٢ - مصاصات كيدية
Frais frustratoires (F). Frustratoire expenses (E).
هي التي تنفق دون وجه في العمى فتبقى على حائق منقلا.

2٦٨٧٣ - مصاص
Glossophagi (S).
Glossophagae, Mange-langue (F).
جنس خفاش من فصيلة الخروقيات. انواعه عديدة،
موطنها البلاد الحارة. اقوامها الى السرة الفاحة. اجناسها
صغيرة القد. فرائطها متعطلة، ضيقة، ذلقة. ألبنتها
فالقة الطول منقطة سلسلة. عجليات منقطة الى
الوراء || تبين منقطة. ذكرورها تقرب انانها عند
الكرم. تألت تجاوير الاجار واقلاب الصخور. سرسها
يدوم طولا الليل. قريبا الحشرات والحلازين.

2٦٨٧٤ - مصاصية
Absorptivité (F).
Absorptiveness, Absorptivity (E).
هي قوة الامصاص



مصاص



مصاص البرتقال



مصاص البقول



مصاص التفاح



مصاص الجرون

٢٦٨٩٣ - مصفت
المصت هو ادخال اليد في رحم الانثى لمصته واستخراج
مسا فيه .

٢٦٨٩٤ - مصح ، مصوح ، Virescence (F).
هو التبدل الطارئ في لون الزهر .

٢٦٨٩٥ - مصحفات القشك Placophores (F).
رتبة من الرخويات اصدانها مصفحة القشك . فصائلها
واجناسها وانواعها عديدة معظمها من المتحجرات والمعاصر
منها منتشر في جميع بحار العالم .

٢٦٨٩٦ - مصحك Saxatilis
نمت ترميزي يطلق على كل نبات يعيش وينمو على الصخور
وفي الهامجر .

٢٦٨٩٧ - مصد
المصد والمصد : الحفصة العالية ، وقيل اهل الجبال .

٢٦٨٩٨ - مصدز ، مفتح ، منشأ
Origine, Source (F). Origin, Spring (E).

٢٦٨٩٩ - مصرب Lacto-fermentateur (F).
جهاز يستعمل في قياس حموضة اللبن الرائب .

٢٦٩٠٠ - مصرد Frilieux (F).
لا يصبر على البرد .

٢٦٩٠١ - مصراع Valve (F). Vaive, Clack (E).
احد اجزاء الغلاف الثري في الآبار المغتصبة .

٢٦٩٠٢ - مصركي Valvulaire (F). Valvular (E).
٢٦٩٠٣ - مصرد

Ciste à gravier, C. à sable, Tamis (F). Wachte,
Screen, Sieve, Sifter, Strainer (E).
غربال يفصل الرمل عن الحصى والحجارة .

٢٦٩٠٤ - مصروف Drain, Bardeau (F).
Drain, Drain-pipe, Shingle (E).
سيل ماء تنصرف فيه المياه التي ترشح من الارض الزراعية
عقب دحا ، وقد شاع استعمال انابيب الأجر لهذه الغاية .
والمصارف تنتهي بالسرب . والمصارف تنتهي بالمشيرة .

٢٦٩٠٥ - مصرك Banque (F). Bank (E). بنك
هو كل محل ائتمني المتاجرة بالنقد او الاوراق ذات
البدل المالي .

٢٦٩٠٦ - مصرك الإصدار Banque d'émission (F). Issuing house (E).
هو المصرف الممنوح له امتياز اصدار اوراق النقد من
الحكومة .

٢٦٩٠٧ - مصرك زراعي ، بنك زراعي
Banque agricole (F). Agricultural bank (E).
مصرف يختص بامداد ارباب المزارع الزراعية بالمال
على سبيل القروض الطويلة الاجل .

٢٦٩٠٨ - مصرك عقاري ، بنك عقاري
Crédit foncier (F). Loan society (E).
مصرف يقرض المال لاجال طويلة لقاء رهن العقار .

جفاف التسج || يكافح بتطهير البذار بمادة الفوربول
المركزة ٢٥ .. / او قمعرا باحدى المركبات الزئبقية .

٢٦٨٨٣ - مصاع الشوندر *
Pleospora betae, Phoma betae, Ph. tabifica, Ph.
sphaerosperma, Phyllosticta tabifica (S).

فطر مجهرى يصيب اوراق الشوندر فيؤذيها ويسبب ذبولها .
مظهره الخارجى يقع صغيرة مستديرة حطية اللون ، تركب
الاوراق فتسبب جفاف التسج ببقية اللبل ثم العطب .
يكافح عند ظهوره باستعمال احد الفوطاير المعتدلة المنصر
الانفعال .

٢٦٨٨٤ - مصاع العنكب *
Pleospora putrefaciens, Clasterosporium putrefa-
ciens, Sporodesmium putrefaciens (S).

فطر مجهرى يركب اوراق الشوندر في اواخر معهما اي
قبيل الانقلاص بدء وجيرة || مظهره الخارجى يقع مهدبة لا
قياسية يملوها خل اسمر تركب القسم الاكبر من النصل
لا يفضيها منه الا المتق والارام الاول || اضراره زهيدة الا
اذا استحكم في كامل الزراعة وهذا لا يكون الا في مواقع
خاصة || يكافح باستعمال احد الفوطاير المادية المتوسطة
المادة الفعالة .

٢٦٨٨٥ - مصاع الهندية *
Pleospora albicans, Phoma albicans (S).

فطر مجهرى يركب جهاز الهندية فيؤذيها ويسبب
انحلاص اثمارها ومظهرها || مظهره الخارجى يقع مهدبة
لا قياسية الشكل والحجم ، لونها الى الصبغة ، اطرافها
المهدب ينحرف من المحطى الى الاسود ومعه وصولها الى
هذا الطور يعلوها في وسطها شحمة حليلة بيضاء . تركب
نصل الاوراق وسوقها الاثمار || يكافح عند ظهوره
على الاوراق باستعمال احد الفوطاير المادية المعتدلة المنصر
الانفعال .

٢٦٨٨٦ - مصاعة *
Botryomycose (F). Botryomycosis (E).

المصاعة مرض جلدي يمتري الحيوان . مظهره الخارجى
دمايل صغيرة متفكة شبيهة بالمصع تسببها بعض الميكروبات
انحصا الكروية .

٢٦٨٨٧ - مصالكة Sérologie (F). Serology (E).
هي درس الامصال وعناصرها المختلفة وانفعالاتها ونتائجها .

٢٦٨٨٨ - مصالكة ، مصفل Paie lait (F). Whey (E).
الماء الذي يخرج من الحليب المخبين عند اصطناع الجبن .

٢٦٨٨٩ - مصالحة ، تسوية Transaction
هو الاتفاق الذي يقدّمه المتنازعون ليفرضا به نزاعاً قائماً
او متحقاً ينزول كل منهم من شيء من مطالبه .

٢٦٨٩٠ - مصليكي Sérologique (F). Serologic (E).
منوط بالمصل او مختص به .

٢٦٨٩١ - مصان Canne à sucre (F).
هو قصب السكر ، اطلبه .

٢٦٨٩٢ - مصب ، مغور Embouchure (F).
مفتى مياه الأنهر بالبحر . (E). Embouchure, Mouth



مصاع الشوندر

Laminoir (F). **مِصْفَاح** ٢٦٩٢٦ -Flattening-mill, Rolling-mill (E).
الآلة الخاصة بتصفيح المعادن .Dolichocephale (F). **مُصَنِّعُ الرَّأْس** ٢٦٩٢٧ -Dolichocephalic (E).
لمت تصنيص يميز يوصف به الرأس المستطيل عند بعض الحيوانات الأهلية كالإبقار والأغنام .Conchacé (F). **مُصَفِّد** ٢٦٩٢٨ -

لمت تصريفي يطلق على الإصداق الثنائية المصراع .

Courbine (F). **مِصْفَاوَر** ، **مِصْفَاوَر** ٢٦٩٢٩ -

مكة بحرية تدمي لوت المتوسط ، أطلجا .

Sérum (F). Serum (E). **مَصَل** ٢٦٩٣٠ -Petit lait (F). **مَصَل** ٢٦٩٣١ -

هو المصالة ، أطلجا .

Tuberculine (F). Tuberculin (E). **مَصَلُ الْكُوش** ٢٦٩٣٢ -

مصل كاشف تحقن به الإبقار تيقن من أنها مصابة أو غير مصابة بالسل البقري .

Bec-croché (F). **مُصَلِّب** ٢٦٩٣٣ -

هو الصيق ، طائر من الشرشوريات ، أطله .

Amendements agricoles (F). Improvement, Manuring of ground (E). **مُصَلِّحَاتُ زُرَاعِيَّة** ٢٦٩٣٤ -

هي التي تصلح التربة لتزيد خصبا . والمصلحات عديدة منها التسميد العضوي والخصري والمعدني والإسماء والصفرة والتربيل والتدليل الخ .

Intérêt (F). Interest (E). **مَصَلِّحَة** ٢٦٩٣٥ -

هو كل ما يصلح به المرء من شأنه بمنفعة تأتبه إذا هو زائل حقا أو أقام دعوى .

Service des haras, S. de remonte **مَصَلِّحَة الْخُصَايَا** ، **مَصَلِّحَة عَجَل** ٢٦٩٣٦ -

دائرة حكومية تابعة للبلدية البيطرية في وزارة الزراعة تعني بشؤون عجل النزر .

Plein (F). Full (E). **مُصَنَّبَت** ، **مُثَلَّثَة** ٢٦٩٣٧ -

لمت وصفي يطلق على ما لا جوف له كالقنن مثلا .

Cervicornes (F). **مُصَنَّبَاتُ الْقُرُون** ٢٦٩٣٨ -

لثة من الحشرات ، قرونها مصمتة غير مجوفة كالآليل .

Gummifère (F). **مُصَنِّع** ٢٦٩٣٩ -Gummiferous (E).
ينتج الصمغ أو يحوي الصمغ ويصلطه .Réservoir (F). Reservoir (E). **مَصْنَع** ٢٦٩٤٠ -

خوض تجمع فيه المياه للاستعمال الصناعي ويعرف أيضا باسم حاووز .

Cynomoir (F). **مُصَرَّر** ٢٦٩٤١ -

هو الطروث ، أطله .

Cynomorides (F). **مُصَرَّرَات** ٢٦٩٤٢ -

سبط من الطروثيات يشمل بعض الاجناس والأتواع .

Dépense (F). Expenditure (E). **مُصَرَّرَف** ٢٦٩٤٣ -

هو المال المفقود .

Faux frais, Menus frais (F). Incidental expenses, Petty expenses (E). **مُصَرَّرَاتُ نَشْرِبَة** ٢٦٩٤٤ -Faux frais, Menus frais (F). Incidental expenses, Petty expenses (E).
بناء من زجاج ، يلحف أو يستر عنه الحاجة ، تستتبت فيه نباتات البلاد الحارة التي لا تتحمل البرد .Serre (F). **مِصْرَى** ، **وَام** ٢٦٩٤٥ -Greenhouse (E).
هي التي يمكن فيها بجمرة الشمس داخل الزجاج .Serre froide (F). **مِصْرَى بَارِدَة** ٢٦٩٤٦ -Conservatory (E).
هي التي تستعد حراوتها بطريقة ثابتة حيث يراوح مغطا من ٢٤ إلى ٢٨ شخ في زمن البرد والشتاء .Serre chaude (F). **مِصْرَى حَارَة** ٢٦٩٤٧ -Hot-house (E).
هي التي تستعد حراوتها بطريقة ثابتة حيث يراوح مغطا من ٢٤ إلى ٢٨ شخ في زمن البرد والشتاء .Trieur (F). **مُصْطَفِيَّة** ، **فَرَاكَة** ٢٦٩٤٨ -Sorting-machine (E).
آلة تفرك الفلك عن الحب والحب عن بعضه بعض بالنسبة الى حجمه .Lantique (F). **مُصْطَفَاة** ٢٦٩٤٩ -

هو البطم الشرقي ، أطله .

Mère de ronce (F). **مُصْعَة** ، **مُصْعَة** ٢٦٩٥٠ -Blackberry (E).
ثمرة المليق وأتباعه من عوج وغيره وهي حواء اللون لؤلؤ .Anode **مُصْعَد** ، **أَنُودَة** ٢٦٩٥١ -

هو لاجب التيار الكهربائي في المفلط .

Ascenseur (F). Lift, Elevator (E). **مُصْعَد** ٢٦٩٥٢ -

جهاز يستعمل في رفع الاشخاص والأتاقل .

Sublimé (F). Sublimace (E). **مُصْعَد** ٢٦٩٥٣ -Paratonnerre (F). **مُصْعَكَة** ٢٦٩٥٤ -Lightning-conductor (E).
راسع دافع الصاعقة .Liquideur (F). Liquidator (E). **مُصَفِّ** ٢٦٩٥٥ -

من تتأط به احوال التصفية .

Raffinerie (F). Refinery (E). **مُصَفِّكَة** ٢٦٩٥٦ -

معمل مجهز بالآلة للآرة لتصفية .

Filtre (F). Filtre (E). **مِصْفَاة** ، **وَالِصَح** ٢٦٩٥٧ -

أداة تصفى بها السوائل ، وله تكوين من عروق او دمل او فحم الخ ...

٢٦٩٥٢ - مَصْنُوعَةٌ أَمْرِيكِي

Evonymus americana (S). Fusain d'Amérique (F).
نوع من المصناعات ، جنته صغيرة القند تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. فرومها منتصبه ماله. اوراقها عابله تطول من ٤ الى ٨ سم. وتعرض من ٢ الى ٣ ، نصلها خلي الصفحة السفلى عامد التسنين . ازهارها وردية اللون رباعية البتلات ، حقلها مستديرة جوزية اللون رباعية الفلق || ازهارها يستمر طول شهر حزيران .

٢٦٩٥٣ - مَصْنُوعَةٌ حَرِيصُ الْوَرَق

Evonymus latifolia (S). Fusain à larges feuilles (F).
نوع من المصناعات المبلول ، جنته تملو من ٢ الى ٥ متر. فرومها ماله. اوراقها عابله تطول من ٨ الى ١٤ سم. وتعرض من ٤ الى ٦. نصلها جانب الصفحة ، مسنن الحافة . ازهارها خماسية البتلات الحمر . حقلها قمرية خماسية الفلق || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٦٩٥٤ - مَصْنُوعَةٌ قَرْم

Evonymus nana (S). Fusain nain (F).
نوع من المصناعات ، جنته صغيرة القند مشوشة تملو من ٥٠ الى ٨٠ سم. فرومها مجذارية مستقيمة . اوراقها عابله متبادعة سنالية . نصلها لاسع الصفحة يطول نحو ٥ سم. ويعرض نحو ١ . ازهارها رباعية البتلات والاسدية ، ثلاثية التجميع لونها الى الخضرة احمراد المروج . حقلها وردية اللون رباعية الفلق || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٦٩٥٥ - مَصْنُوعَةٌ مَبْدُولُ * ، مَصْنُوعَةٌ أُرْبُي

Evonymus vulgaris, E. europaeus (S). Fusain commun, F. d'Europe, Bonnet de prêtre, Bois à lardoir (F).
نوع من المصناعات المبلول ، جنته تملو من ٣ الى ٦ متر. فرومها رباعية التصلب ماله. اوراقها عابله سنالية تطول من ٧ الى ١٠ سم. وتعرض من ٣ الى ٤ ، نصلها مائل الصفحة الجاحفة ، مسنن الحافة . ازهارها الى الخضار الاصفر . حقلها رباعية الفلق الحمر . بزورها وردية . ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

٢٦٩٥٦ - مَصْنُوعَةٌ مَجْدَر

Evonymus radicans (S). Fusain radicans (F).
نوع من المصناعات ، جنته مشوشة صغيرة القند. ساقها مجذارية. فرومها دقيقة بحرية اللون . اوراقها ابيدة تطول نحو ٥ سم. وتعرض نحو ٢ ، نصلها جامد الصفحة المسنجة بالايش والوردي . ازهارها رباعية البتلات والاسدية ، زينة اللون ، حقلها وردية رباعية الفلق || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٦٩٥٧ - مَصْنُوعَةٌ يَابَانِي

Evonymus japonica (S). Fusain du Japon (F).
نوع من المصناعات ، جنته منتصبه تملو من ٣ الى ٨ متر. فرومها مسننة خشن اللحاء . اوراقها ابيدة تطول من ٧ الى ١٠ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ ، نصلها جامد الصفحة المسنجة والمزركشة بالايش والاصفر . ازهارها رباعية البتلات والاسدية لونها الى الخضار الفسفي . حقلها حمر رباعية الفلق || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٦٩٥٨ - مَصْنُوعَةٌ * Intégration (F). Intégration (E).

المصنعة الحلق شيء بأخر لإمامه أو إمام كاله .

٢٦٩٤١ - مَصْنُوعَةٌ * Sépiophora (F).

المصنعة والمصنوعات فئة من الرغويات ثنائيات الخياشيم ، عشاريات الارجل ، مجهزة بصنخ كالحباز وأمثاله .

٢٦٩٤٢ - مَصْنُوعَةٌ Haut-fourneau (F).

Blast-furnace (E).
موقد غاس عمودي الارتكاز يستعمل لتلويب الحديد تحت تأثير الحرارة المرتفعة .

٢٦٩٤٣ - مَصْنُوعَةٌ Sonomètre (F). Sonomètre (E).

جهاز يستعمل في قياس الاصوات ومقابلتها وتصنيفها .

٢٦٩٤٤ - مَصْنُوعَةٌ Virescence (F).

هو المصح ، التبدل الطارئ الذي يغير لون الزهر الطبيعي .

٢٦٩٤٥ - مَصْنُوعَةٌ الْحَمِيْرِيَّةُ ، مَصْنُوعَةٌ * Antibiologique (F). Antibiotique (E).

مادة ينتجها كائن معين تمارس نحو غيره من الكائنات : المضادات الحمرية المروفة حتى الآن تقسم الى فئتين : - فئة التجهيزات كالبكتيسين والستريبتوميسين والترايسكلين . - وفئة البكتيريات كالتيوتريسين والباستراتسين .

٢٦٩٤٦ - مَصْنُوعَةٌ السَّكَّالُ Béchique (F). Bechic (E).

٢٦٩٤٧ - مَصْنُوعَةٌ * Polygamie (F). Polygamy (E).

المضارة تمدد الزوجيات عند الرجل .

٢٦٩٤٨ - مَصْنُوعَةٌ Eau caustique (F).

Brackish water (E).
المصنات : لمان لا يطلق ملحوشه وضده القطع وهو الصافي الزلال .

٢٦٩٤٩ - مَصْنُوعَةٌ Evonymus (S).

Fusain (F). Spindle tree (E). Spindelbaum, Pfaffen-hütchen (D). Fusano, Evonimo (I).
جلس اشجار وجنات برية وزيينية من فصيلة القاتيات. ازولاه عديدة ، اصطاتها فسيحة الارجاء تشبه الشرق والغرب وامريكا . اوراقها متبادعة مسننة كاملة مرطاه . ازهارها متكونية التجميع ابطية الارتكاز . ثمارها جرداء مستديرة مفصصة . بزورها مرة الطعم مقيية وسهلة اخذها صفراء اللون شفيدة الصلابة شائعة الاستعمال الصلبي . نحلها يستعمل في التصوير وفي صناعة البارود || اعرف ازولاه واشهرها ما يتبع .

٢٦٩٥٠ - مَصْنُوعَةٌ أَسَدُ * Evonymus atropurpurea (S). Fusain noir (F).

نوع من المصناعات ، جنته تملو من ٣ الى ٧ متر . فرومها ماله . اوراقها عابله تطول نحو ١٢ سم. وتعرض نحو ٦ . نصلها مسنن الحافة خالي الصفحة السفلى . ازهارها رباعية البتلات الارجوانية . حقلها الى الجوزة السوداء المروج . ازهارها يستمر طول شهر حزيران .

٢٦٩٥١ - مَصْنُوعَةٌ * Evonymus verrucosus (S). Fusain varruqueux (F).

نوع من المصناعات ، جنته تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. فرومها ثملوية اللحاء . اوراقها عابله يفضية ذرية ، نصلها مسنن الحافة يطول نحو ٦ سم. ويعرض نحو ٣ . ازهارها جوزية اللون رباعية البتلات . ثمارها برتقالية اللون ، رباعية الفلق || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .



مصنوع أسود



مصنوع مبلول



مصنوع ياباني

Embryon humain (F). **مُضَيِّع** ٢٦٩٧٣
Human embryo (E). هي الملقحة البشرية.

Embryonnaire (F). **مُضَيِّع**، **جَنِين** ٢٦٩٧٤
Embryonic (E).
نمت تعريفني يطلق حل ما هو مختص بالصفة أو الجنين.

Polygone (F). Polygon (E). **مُضَلَّع** ٢٦٩٧٥

٢٦٩٧٦ - **مُضَلَّع دَائِرِي**، **مُضَلَّع مستدير**
Polygone circulaire (F). Circular polygon (E).

Quadrilatère (F). **مُضَلَّع رُباعِي** ٢٦٩٧٧
Quadrilateral (E). شبه مربع رباعي اضلاع.

Polygone régulier (F). **مُضَلَّع مُنتَظِم** ٢٦٩٧٨
Regular polygon (E).

Manège (F). **مُضَمَك** ٢٦٩٧٩
Polygone circulaire (F). Circular polygon (E). للبدان المد لتفسير الخيل.

٢٦٩٨٠ - **مُضَمَّكَة**. صوت الحية من لسانها.

Acasence, Piqure (F). **مُضَوْر** ٢٦٩٨١
Acasence (E). رسم فطري يصيب الخسر تسببه خيرة الحلل الخطاطية.

Photomètre (F). **مُضَيَّاه** ٢٦٩٨٢
Photometer (E). جهاز يستعمل في قياس حدة الضوء أو قوته.

Entomophyte (F). **مُضَيَّاف** ٢٦٩٨٣
Entomophyte (E). نمت تعريفني يطلق حل كل نبات من غطيات الربيع
تتطفل عليه الحشرات.

Hampe (F). Stem, Flower-stalk (E). **مُطَا** ٢٦٩٨٤
الطا هو الشراخ. مشاة مطوان. ج. أسطاه.

٢٦٩٨٥ - **مُطَاوَكَة**. الأرض لكثيرة الطير.

Caoutchouc (F). **مُطَاط** ٢٦٩٨٦

Phanérogame parasites (F). **مُطَاوِل** ٢٦٩٨٧
في النباتات الطفيلية من باديات الزهر كالجنين والكمشوث.

Fine (F). **مُطَايَل** ٢٦٩٨٨
راجع اغراض.

Réclamation (F). **مُطَايَلَة** ٢٦٩٨٩
Complaint, Request, Claim (E). الاتماس أو الادعاء بقرار حق أو حالة.

Revendication (F). **مُطَايَلَة** ٢٦٩٩٠
Claiming (E).

رفع دعوى يطلب رافعها الاعتراف له بحق الملكية حل
مال معين.

Plastique (F). **مُطَاوِج**، **مُطَيَّاع** ٢٦٩٩١
Plastic (E). هو ما كان قابلاً للشكل والتشكل.

Pompe (F). Pump (E). **مُضَخَّة** ٢٦٩٩٢
آلة تستعمل في رفع أو دفع المياه والسوائل وقد تكون يدوية
أو محركية. أما اشكالها فثلاثة وهي :

Pompe foulante (F). Force-pump (E). **مُضَخَّة دافعة**
Pompe aspirante (F). Suction-pump (E). **مُضَخَّة رافعة**
Pompe aspirante foulante (F). Suction-force pump (E). **مُضَخَّة رافعة ودافعة**

٢٦٩٩٠ - **مُضَخَّر**
Acasence (F).
ابتداء الحموضة في كل مادة.

٢٦٩٩١ - **مُضَخَّر**، **مُضَخَّر**
Piqué (F). Sour (E). ما كانت قسوة الحموضة من غير وجبة وما شبه.

٢٦٩٩٢ - **مُضَخَّر**
Harpagus (S).
Diodon, Harpagus (F).

جنس طير من حمارة البراة لفضيلة الصقريات. انولعه
قليلة جميعها ريشة الغرام صغيرة القند. اثوابها مشقة تلبس
فيها الجلالة الخطية للملوك. بطونها غير حمرة. ازوارها
بيض. ارسافها سم. || مولها الدابات الكثيفة. تعيش
منفردة، قوتها القوامم والصائير والحشرات. تدفن في
الاخجار الرملية، اثابها تحضن من ٣ الى ٥ وثلثات مدة
٤ اسابيع.

٢٦٩٩٣ - **مُضَخَّر**
Pyromètre (F). Pyrometer (E). جهاز يستعمل في قياس الحرارة العالية.

٢٦٩٩٤ - **مُضَخَّر** **به**
Multiplicande (F).
Muiplicand (E).

٢٦٩٩٥ - **مُضَخَّر** **فيه**
Multiplieateur (F).
Multiplier (E).

٢٦٩٩٦ - **مُضَخَّر** **كلها**
Factorielle (F).
Factorial (E).

٢٦٩٩٧ - **مُضَخَّرَة**
Himantalia (S).
Himantalia (F).

جنس نباتات بحرية من الخفيات السم. اثوابها المعروفة
قليلة البدن اسطانيا. جميع بحار البلاد الحارة والمتعددة
الحرارة || كلابها شديدة القصر. قوامها فضية الشكل
ينشعب في قمرها خمسة من السيور الفرة يراوح طوطا من
متر الى ثلاثة امتار.

٢٦٩٩٨ - **مُضَخَّر**
Diplostémone (F).
نمت تعريفني يطلق حل كل حليل أو جش يكون عدد
اسديته ضعف عدد القنالات أو الفصل.

٢٦٩٩٩ - **مُضَخَّر**
Narcisse tazette (F).
هو الزجرج الشرقي، اطليه.

٢٦٩٩٠ - **مُضَخَّر**
Mastication

٢٦٩٩١ - **مُضَخَّر**
Chiquer (F).
To chew tobacco (E).

٢٦٩٩٢ - **مُضَخَّر**
Compresseur (F).
Compressor (E).

اسم يطلق حل مختلف الاجهزة الضاغطة اخصها الملامسات
ومضاميط الغاز.



مضخ



مضرم

Tourbière (F). **٢٧٠٠٣ - مِطْبَخَة**
 Peat-bog, Peat-moss (E).
 هي التربة ، منجم التراب العضوي .

Gaufrier (F). **٢٧٠٠٤ - مِطْبَخَة**
 Waffle-iron (E).
 جهاز معدني كائس يصنع رقائق الشمع الملمدة لتجهيز
 القفدير اي خلية النحل .

Pluvial (F). **٢٧٠٠٥ - مِطْرِي ، شَتَوِي**
 Pluvial, Raining (E).

Porte-greffe, Sujet (F). Stock (E). **٢٧٠٠٦ - مِطْعَم**
 الاصل الذي يركب فيه الطعم او الاصل الذي يفرس
 في الارض .

Pantogreffe (F). **٢٧٠٠٧ - مِطْعَمَة**
 أداة للتطعيم تطعم بضعة قصبان في آن واحد .

Billot à pesée (F). Clog (E). **٢٧٠٠٨ - مِطْعَمِيَة**

Greffon (F). Graft (E). **٢٧٠٠٩ - مِطْعُوم**
 هو الطعم ، اطلبه .

Parasite (F). **٢٧٠١٠ - مِطْفَال**
 Parasite, Hanger-on (E).
 نبت تمرين يعلق على كل نبات يعيش طليقاً على غيره
 من النباتات .

Argillière (F). Clay-pit (E). **٢٧٠١١ - مِطْفَلَة**
 الميخ الذي يستخرج منه الطين اي الصلصال .

Diplodia (S). **٢٧٠١٢ - مِطْق**
 جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنبيات . يكتنفاته
 فردية كروية تنشأ محفونة ثم ترقى وتثرف . جوفها
 سميك اللثاف ، حنطلي اللون يملؤ مَق صغير . بويغاته
 حنطية اعليجية ، طولها نحو ١٥ ميكرون . غلبتها لثائية ،
 غنوة الكثيرة الفاصلة || انزاعه قليلة ، جميعها مؤذية ،
 اضرها .

Diplodia griffoni (S). **٢٧٠١٣ - مِطْق الاجاص**
 فطر مجهري يركب اخضار وانساد الاجاص والتفاح
 ينطفاها ويهيئها || مظهره الخارضي يشور كيفية التسجيع
 تركيب الحماة فتصدع البشرة بعد ان تقرر الادمة وتشوهها
 يكالغ بتقاطع الاضغان الموصومة ويظهر الجروح مع
 العلم ان هذا الفطر يتسدى على الانجوار الضعيفة دون سواها .

٢٧٠١٤ - مِطْق الدَّرَّة الصَّفراء

Diplodia zeae (S). Dry-rot du maïs, Pourriture sèche
 des épis (F).

فطر مجهري يصيب الدرة الصفراء في سبوتها ويظهرها
 ويصفها . مظهره الخارضي يقع لا يقياسه الحجم والشكل
 جراه اللون سريمة الاتساع تركيب المصف فتؤذيه . وهو
 في السبال والامطار مشيج اضر البكت ثم ينحرف الى السرة
 فينبو كالغفن الاسود الجاف || يكالغ بتظهر البذار
 بواسطة املاح الزئبق . ومن المسجن اجتناب الزراعة في
 المواقع الرطبة والتخلي عن زراعة الدرة في الاربة المويومة
 نحو ثلاث سنوات .

Dams (F). Dam (E). **٢٦٩٩٢ - مِطْبَة**
 اداة من خشب أو حديد تقرب بها الارض لخرس .

Plecoptera (S). **٢٦٩٩٣ - مِطْبَخَة الأجنحة**
 Plécoptères (F). Plecoptera (E).
 هي اللؤلؤيات ، رتبة من الحشرات ، اطلبها .

٢٦٩٩٤ - مِطْبَخَة
 المطة هي مؤخر ظلف الشاة وقيل دنة كالفلكة في رجلها
 تسجح بها الارض .

Minotarie (F). **٢٦٩٩٥ - مِطْبَخَة**
 Flour-mill, Flour-store (E).
 البناء الملمد لمستع الطحين وهو يحوي جميع أجهزة الطحن
 ومستودعات التيق .

Pluie (F). Rain (E). **٢٦٩٩٦ - مِطْر**
 المطر هو الماء المنهمر من السحاب . ج امطار . والمطر
 هي الدفعة من المطر .

Rafle (F). **٢٦٩٩٧ - مِطْر**
 Head of maize stripped of all its fruit (E).
 سنبل الذرة والدغن واشباهها . ج امطار .

٢٦٩٩٨ - مِطْرَاق
 الاثني المطراق هي القرنية المهد بطرق النحل اياها .
 تستعمل في النجعة والمزعة والبقرة .

٢٦٩٩٩ - مِطْرَاق البَحْر * ، نَقَار
 Sphyrna (S). Requin-marteau, Squal-marteau, Mar-
 teau (F). Hammer-head (E).

من اسمائها : أبو مطرقة ومكة الاسكتور . جنس اسماك
 بحرية بيوض ولين من فصيلة القرشيات ورتبة الاثناح .
 انواعها المعروفة ستة جميعها من الاسماك المفترسة القشرية
 الخفيفة . قوتها الاسماك والقشريات وكل ما تستطيع اليه
 سبيلا في البحر || اصطناعها مياه مجاذع واخوار البلاد
 الحارة || اجسامها وشية الشكل تغطى من ٣ الى ٥ امتار .
 اتواها الى الكهبة تيق او زهر وتغير مع اختلاف الانواع .
 رؤوسها كطرفة النحات ، اسطوانية الشكل ، مفرقة الانكاز
 ويلق طولها ربع طول الجسم . صيها كبيرة ، مستديرة ،
 بارزة ، تحتل اطراف المطارقة المقنونة . اصطناعها لاطة
 لكنها كبيرة الشدق وسلمة بثلاثة صفوف من الاسنان
 الدرية الحادة القوية للشركة . زعانفها سبع تمكها من
 سرعة الانقلاب والحركة . زعنفتها الشرجية فارقة حالية
 الشكل || اهرق انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

٢٦٩٩٩ - مِطْرَاق البَحْر الأعْلَسِي

Sphyrna zygaena (S).
 نوع من مطراق البحر ، تكثر في المحيط الاطلسي ، اصطناعها
 مجاذع البلاد الحارة . طولها يراوح من ٣ الى ٥ امتار .

٢٦٩٩٩ - مِطْرَاق البَحْر المِمْصِط

Sphyrna tudes (S). Maillet (F).
 نوع من مطراق البحر . اصطناعها مجاذع البحر الابيض
 المتوسط . طولها يراوح من مترين الى اربعة امتار .

٢٦٩٩٩ - مِطْرَاق البَحْر المِمْصِط
 Sphyrna blochi (S).
 نوع من مطراق البحر . اصطناعها تحت مجاذع الهند
 الى الخليج الفارسي فالبحر الاحمر فصيق زنجبار . طولها
 يراوح من ٣ الى ٤ امتار .



مطارق البحر



مطرقة



مطق الاجاص

٢٧٠٢٦ - مَطَهَرَات

Antiseptiques, Désinfectants (F). Antiseptic, Disinfecting (E).
مواد فعالة بسيطة أو مركبة تقضي على الجراثيم المرضية مثلًا حامض الفينيك والليزول . الخ.

Polyphasé (F). مَطَوَّر ٢٧٠٢٧
Polyphase, Multiphase (E). كثير الأطوار .

Montacuta (S). مَطَوَّلَة ٢٧٠٢٨
Montacuta (F). Montacuta (E).

جنس حيوانات بحرية من الرضويات فصليتها الخناشيم وصليتها اليرسويات . أنواعها المعروفة قليلة العدد ، بعضها من صم بجار المناطق الشالية . أجسامها صغيرة القذ . أصدانها بيضيه اللون ، قليلة الأصدان ، ناشرة السن للصراعية . ألوانها سوية تزاوج من الأبيض التبي إلى المصفر .

Calandre (F). مَطَوَّق ٢٧٠٢٩

طائر من فصيلة القطريات يدعى طعل ، اطلية .

Couleur & collier (F). مَطَوَّلَة ٢٧٠٣٠

هي الحفّات الملوك ، اطلية .

Aspius (S). مَطَوَّلَة ، أم حَمَرَة ٢٧٠٣١

Aspe (F).
جنس اسماك بحرية ونهرية من الشبليات . أنواعها المعروفة قليلة بكثير يوجد بها في البحر الاسود وفي بحيرات وأهر الشرق الاوسط وأروية الجنوبية . أجسامها مستطيلة الشكل طولها يراوح من ٢٠ الى ٥٠ سم . زعانفها الظهرية صغيرة القد عادمة الحشف . اسنانها الامامية السفلية عمجة كغالب الطير . لحويها مأكولة متوسطة الصنف .

Longe (F). Lunge, Tether (E). مَطَوَّل ٢٧٠٣٢

المقود أو الخيل الذي يربط من مرسن الدابة لجرها .

٢٧٠٣٣ - مَطَى ، طَعَامُ الْأَرْتَب

Phagnalon rupestre (S). Phagnale (F).

نبات عشبي يري طبي من فصيلة المركبات . مهد البلاد المتصلة بالحارة . يوجد في المواق الرطبة من الوسط البنائية . أوراقه متعاقبة ، لسة ، صغيرة القد . ازهاره ذمبة التجميع ، حامية الايتكاز ، مستطيلة المالحق الفقيقة . تنويره ربي . مثله الطبية حمية .

Tropophyta (F). مَطِيْع ٢٧٠٣٤

Tropophyta (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات يتكيف مع حوامل البيت حيث يعيش فلا يخشى جفاف ولا تكدبه رطوبة .

Plastique (F). Plastic (E). مَطِيْع ٢٧٠٣٥

هو المطاوع ، ما كان قابلا الشكل واتشكل .

Spectromètre, Spectroscope (F). Spectrometer, Spectroscope (E). مَطِيْعَات ٢٧٠٣٦

مطاز طلي ، مجلة الاشباح .

Oisellerie (F). مَطِيرَة ٢٧٠٣٧

Bird-catching, Bird-shop (E).

هي صيد الطيور وتربيتها وهي ايضا محل تربية الطيور .

Diptodia pinex (S). مَطَقُ الصَّنَوِير ٢٧٠١٥

فطر مجهري يركب اعداب الصنوبر فيعملها ويقود البياض الي قعدت اعدابها الى الذبول واليباس .

Diptodia natalensis (S). مَطَقُ نَاطَل ٢٧٠١٦

فطر مجهري يصيب التفل في كربه واصل سغه . مظهره الخارجي بقع فسيحة مستطيلة غيرة اللون ثم سمراء تركيب بشرة النسخ فتؤذي وتعزري اليسر تصطب || يكالغ عند ظهوره باستمال سائل يورده الحلو نحو ١ ٪ يضاف اليه محلول النسبة اي ما يساود نحو ١ ٪ من الزيتون للشوية .

Problème (F). Problem (E). مَطَلَب ٢٧٠١٧

Débit (F). Sale, Retail (E). مَطَلُوب ٢٧٠١٨

ما حل المرء من حساب او ما هو مطلوب منه .

Fil du maçon (F). مَطِير ، زِيْق ٢٧٠١٩

Mason-line (E). خيط البناء .

٢٧٠٢٠ - مَطِيرَة هي المفضة ، اطلية .

Silo (F). Silo, Store-pit (E). مَطْمُورَة ٢٧٠٢١

هي السيرة بناء خاص تحفظ فيه الحبوب والاعلاف .

Momot (F). Motmot (E). مَطْمُوط ٢٧٠٢٢

جنس طير من فصيلة المطوطيات . انواعه المعروفة ٢٠ اصنافها البلاد الامريكية الحارة . تألف الاخراج والفايات . تتميز باستطاعة اذانها الرتاجية التركيب الثنائية الرقال الخريطة قدر ثلاثة اصابع قبل الاطراف . مناقرها خفيفة مستطيلة شاربة الحامل اعليا المستكة الطفا || قوتها الحشرات والعدويات والفوزغ والقران . ثلاث اوكارها في اوقاب الصخور . تضع الاش من بضتين الى ثلاث بيضات تحضنها بمنوبة الاكر نحو ثلاثة اصابع || اشهر انواعه المطوط المبزل .

٢٧٠٢٣ - مَطْمُوط مَبْذُل

Prionites motmota (S). Momot vulgaire (F).

نوع من المطوط . اصنائه تشمل معظم مناطق البرازيل والفيوان . طول نحو ٥٠ سم . قوته متباين الالوان . ظهره واعالي جناحيه الى الخضار الزيتي . مناكبه الى الزرق السستجينة . عنقه وذوده وجيشه ويطنه الى الصبغة النحاسية الحواج . صمراء وقله رأسه سود . جبهة خضراء اللون يقابلها من الوراء حثار اخضر يطق القفن . حياته الى الجوزة . متفاره اسود . رساء الى الريدة السمراء || يألف الاخراج البعيدة من كل حمران . قوته الحشرات والفوزغ والقران .

٢٧٠٢٤ - مَطْمُوطِيَّات

Momotidae (S). Momotidae, Prionitidae (F). Momotidae (E).

فصيلة طير من الجوامت منيات المتأخر . انواعها المعروفة عديدة يجمعها جنس واحد يدعى مطوط || مهدها معظم اصراج امريكة الوسطى والجنوبية . قوتها الحشرات والفوزغ والفار .

٢٧٠٢٥ - مَطْمُور

Autoclave (F).

Autoclave, Vacuum-pan (E).

مرجل عمك اليد ترتفع فيه الحرارة والبخار للمطوط ، يستعمل لتطهير .



مطوط ملول



مطاهر

٢٧٠٤٩ - مُعَادَلَة بَيَانِيَّة ، مُعَادَلَة تَقْصِيصِيَّة
Equation graphique (F). Graphic equation (E).

Formule dentale (F). مُعَادَلَة سِنِيَّة
Dental formula (E).

٢٧٠٥١ - مُعَار ٥
Aptère (F).
Apterous, Wingless (E).
هي كل حشرة عديمة الروشن أو الفلد .

٢٧٠٥٢ - مُعَارَض شرعي
Contradictoire légitime (F). Legitimate adversary (E).
« هو ما كان يمثل في قضية من قضايا النسب جميع خصوم
المتنازع في نسبة المويدين والاحتاليين » .

٢٧٠٥٣ - مُعَارَضَة من الغير
Tierce-opposition
« هي إحدى طرق الطعن غير العادية في حكم لا يكون
المرض طرفاً أو مثلاً فيه ولكنه يكون قد اجنب بمقتضى » .

٢٧٠٥٤ - مُعَاص ٥
Milieu (F). Medium (E).
هو البيئة ، اطلبها .

٢٧٠٥٥ - مُعَالَة ٥
Ligne de conduite (F).
Ligne of conduct (E).
الملك ينبج السلوك المتبع .

٢٧٠٥٦ - مُعَال كَسْتِي *
Hylactes castaneus (S). Mégalyonx châtain (F).

طائر من الجوارث سنيات الخنايير وفضيلة لاقتات التسل .
موطنه بلاد القليل . سلجه الحيثاني زويجي . يألف البراري
الأنفلة ، يغلس قصص فيره من الغير . قوته الحشرات
والتمل || جسمه ربة يطول نحو ٢٢ سم . يتميز بصغر
المنقاد والجناح والذنب . سقاء وأصابعه شديدة الشط
تمكته من العدو السريع . ثوبه كستني الرأس والرداء
والجناح وأطراف الذنب ، اشهب الزور والصدر والبطن .
بطنه مخدج بالكستني . متفاد وسقاء الى الطحلة السوداء ||
الانثى تحمل بفرط الذكر .

٢٧٠٥٧ - مُعَالَجَة ، مُدَاوَلَة ، مُعَالَج
Traitement (F). Treatment (E).

حلة وسائل العناية بالخيل أو النبات لاقتاء الامراض
أو لمداواتها . لذلك فالمعالجة قد تكون واقية أو شافية .

٢٧٠٥٨ - مُعَالَجَة بِاتَّصِل
Sérothérapie (F).
Serothrapy (E).

٢٧٠٥٩ - مُعَالِم الْأَرْض
Abouissants et tenants (F). Adjacent lands (E).
هي قطع الأرض المجاورة للسك من جهتي الطريق والبرض .

٢٧٠٦٠ - مُعَالِنَة
Informatique (F).
هي الاستقصائية ، اطلبها .

٢٧٠٦١ - مُعَالَجَة ، مُسَالِكَة ٥
Alternative (F). Alternative, Alternate (E).
نعت تعريفي يطلق حل كل شجرة تحمل عاماً وتختلف آخر .

٢٧٠٦٢ - مُعَالِيَّات ، فَطُور مُعَدِيَّة
Gastéromycètes (F). Gasteromycetes (E).
فضيلة فطور من ادماعيات .

٢٧٠٣٨ - مُطَجَّرَة
Volière (F). Large bird-cage (E).
البناء للعد تربية الطير .

٢٧٠٣٩ - مُطْبِيع ٥
Chambre à humidification (F).
Damping room (E).
حجرة رطبة يوضع فيها التبع الجاف ليلين .

٢٧٠٤٠ - مُطْبِيل
Ductile (F).
ما كان يتصف بخاصة المط .

٢٧٠٤١ - مُطَّ ٥
Grenadier sauvage (F).
Wild pomegranate-tree (E).
هو الزمان البري ، جلناره مغربي يحرسه التحل فيكثر عمله .

٢٧٠٤٢ - مُطَاعَة *
Umbrella (S).
Ombrell (F). Umbrella (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل
سقيات الخياشيم وفضيلة المظايعات . انواعها المعروفة
قليلة البد اشهرها مظاعة المحت ومظاعة المتوسط || اصداها
مظلية الشكل ، قليلة الارتفاع ، تغلف القليل من الجسم .
اجسامها بيضية الفرون ، مسامكة . صوبها كبيرة
قاعية . ارجلها فضفاضة ، شحبيها سفلية ، ورقية
الشكل . ارجلها ورسيدة ، كبيرة ، مبطقة ، ماسة
الصنعة السفل .

٢٧٠٤٣ - مُطَاعِيَّات ٥
Umbrellidae (S).
Umbrellidés (F). Umbrellidés (E).
فضيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل
سقيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة البد
منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اصداها صغيرة
مظلية الشكل ، ارجلها فارقة بيضية الفرون او مستديرة ||
أحرف اجناسها المظاعة والتيلودين .

٢٧٠٤٤ - مُطْعَمَائِي ، مُطْعَمِي
Culture sèche (F).
Dry farming (E).
الذي تسقيه الساء من الزرع .

٢٧٠٤٥ - مُطَاع ٥
Expédient (F). Expédient (E).
الحايات الطريقة المناسبة .

٢٧٠٤٦ - مُطَاعِل ، مُطْعِم
Pair (F).
Equal, Even (E).

٢٧٠٤٧ - مُعَادَلَة
Equipollence
التصادل في القوة او القيمة .

٢٧٠٤٨ - مُعَادَلَة
Equation .
المعادلة في علم الرياضيات هي مائلة الشيء أن في النسبة
أو في القيمة . والمعادلات عديدة منها :

المعادلة التفاضلية (F).
المعادلة الثانية (F).
المعادلة الزمنية (F).
المعادلة السنوية (F).
المعادلة المتكسبة (F).
المعادلة المتية (F).
المعادلة المتالية (F).



مُطَاعَة



مُطَاعِل كَسْتِي

- 27080 Rhéostat (F). **مُعَدِّلَة ، رِيصَات**
Rheostat (E).
جهاز يزيد أو ينقص المقاومة في التيار الكهربائي المقصود تقويته أو تخفيفه .
- 27081 Mineral, Métal (F). **مُعَدَّن** (E). Metal (E).
المعادن اجسام طبيعية تتميز بصفاتها الكيميائية الفيزيائية وخواصها الفارقة عنها الصلابة وقابلية الصهر والسحب والترك بامتلاء التزيين الناتج في الحرارة العادية .
- 27082 Eplureur (F). **مُعَدَّن ، صَالُور**
Cleanser (E).
آلة تقلع الحجارة من الارض وتجمعها .
- 27083 Minéralisation (F). **مُعَدِّلَة**
Mineralization (E).
المدة والتبدين واحد .
- 27084 Minéral (F). **مُعَدِّلِي** (E). Mineral (E).
نمت .
- 27085 Minéralogie (F). **مُعَدِّلِيَة**
Mineralogy (E).
علم المعادن وهو يبحث في تكوينها وتركيبها الكيميائي والكيفي وطرق استغلالها واستعمالها وفوائدها .
- 27086 **مُعَدِّيَات ، مُعَدِّيَات الأَوْجُل**
Gastéropodes (F). Gastropoda (E).
صف حيوانات من الرخويات .
- 27087 **مُعَدِّيَات رُلُونِيَة**
Gastéropodes pulmonés (F). Pulmonate gastropods (E).
صنيف من الرخويات المعوية .
- 27088 Erminette, Harminette (F). **مُعَدِّي ***
Adze, Hovel (E).
أداة تسفل لمرق التربة وفتح الاشجار الفسدة .
- 27089 **مُعِير** (F). Little deep (E).
Pau profond (F).
تربة عمرة : قليلة العمق قليلة النبات .
- 27090 **مُعِير** (F). Pelede, Fox-evil (E).
Pelede (F).
المر : سقوط الشعر والريش .
- 27091 **مُعِيرَاك**
قال القزويني : دابة عظيمة صبيبة مثل الابل صفراء اللون حل رأسها قرن واحد اسود لم يرها شيء من السباع والقباب الا حرب (الجاحظ) .
- 27092 **مُعِيرِيَة**
Hibernie (F).
هي معيرة الشجر ، اطلبها .
- 27093 **مُعِيرَة ، عُرَّة**
Tic
كل حادة مستقيمة يمتدحها الفرس كسكك الانسان وبلغ الحمار ونفس الجدران والاربعاج يمتد ويسرة النع ...
- 27094 **مُعِيرَة** (F).
هي المشرقة ، اطلبها .
- 27095 **مُعْرِض** (F). Exposition (E).
Exposition (F).
مركز الرأس أو بالقرب منه .
- 27096 **مُعَارِبَة**
Enlronnage (F).
Gauging, Standardization (E).
Symbiose (F). Symbiosis (E).
هي الاشتراك التين في المصلحة بين فردين مختلفين وهو لا يسري على الذكر والانثى والاب والابن والقتيل وصائله .
- 27097 **مُعَارِبَة**
Visite (F). Visit, Search (E).
هي الجيتكو ، اطلبها .
- 27098 **مُعَارِشَة ، مُعَارِشَة**
Liane (F). Liana (E).
كل جنبه متسلقة مستطيلة الساق كثيرة الفروع .
- 27099 **مُعَاتِب**
Herbivora (F).
Herbivora, Herbivorous (E).
ما كان قوته الشب .
- 27100 **مُعَاتِق**
Elus (F).
كل مادة تنفصل عن غيرها بواسطة عائق قلبي متحركة .
- 27101 **مُعَاتِن**
Fumigant (F).
Hilif, Précoco (F).
Early, Precocious, Forward (E).
صفة النبات الذي ينمو ويؤكل سريعاً .
- 27102 **مُعَاتِن ، مُعَاتِنَة**
Pétrin (F).
Kneading-trough (E).
Mastic à greffer (F).
Graft mastic (E).
ويسمى سمع التطعيم وطلاء التطعيم ، اطلب = سميكة .
- 27103 **مُعَات**
هو البقل الرخص والثير الغص .
- 27104 **مُعَاتَات لِرَاهِيَة**
Matériel agricole (F).
Agricultural material (E).
هي الادوات والاجهزة الزراعية الآلية .
- 27105 **مُعَاتَال**
Statoscope (F).
Statoscope (E).
المعدل مرزاز تفاضل يتأثر بانخفاض تقلبات الضغط الجوي . يستعمل في الملاحة الجوية خاصة عند الارتفاع او الهبوط .
- 27106 **مُعَاتَة ، مُعَاتَة**
Estomac (F).
Stomach (E).
جزء من جهاز الهضم في الحيوان . والمعدة انواع فهي بسيطة عند اليليات بركية عند الميراث حيث تمكن اصحابها من اعادة الطعام الى الفم لمضغه || أما اقسام المعدة المركبة فاربعة وهي : أم التلافيف والأنفحة والقلنسوة والكروش .
- 27107 **مُعَات**
Taux (F).
راجع حق .
- 27108 **مُعَات**
Statocyste (F). Statocyste (E).
المعدل جهازان التوازن عند الرخويات . مركزه الرأس أو بالقرب منه .

مرة حاملة لها استعمالها الطبي || أشهر أنواعه المزروع
الميلول.

٢٧١٠١ - مَغْرُورٌ مَبْدُولٌ *

Cneorum tricoccum (S). Camélé commun (F).
نوع من المغرورين وهو جنبة سبوتية مبدولة تملو من
٦٠ إلى ١٢٠ سم. ساقها فراء. أوراقها أبيض زيتونية
الشكل. نصلها وصيد البرق، ملتصق الحمار، لأمع
الصفحة البحرية اللون. أزهارها صغيرة اللون ثلاثية التجميع
صفراء اللون. ثمارها إلى الخضرة الشديدة الاسمرار.
يستخرج من أوراقها وبزورها عصارة مرة حاملة مسهلة.

Cneoraceae (S). مَغْرُورِيَّاتٌ *
Cnéoracées (F). Cneoraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلات القممالات
مرفعات المبيض. أجناسها وأنواعها عديدة، أصلها
اللاتيني المقتلة. أشهر أجناسها المغرورين.

Blieuse (F). Hoer (E). مَغْرُوقٌ، مَغْرُوكَةٌ *
جهاز زراعي يستعمل في حرق التربة تجره العوالب أو
الحركات.

Caprinés (F). Caprinæ (E). مَغْرُوكَةٌ *
أحد قسي فصيلة الفئيات.

Lait (F). Milk (E). مَغْسٌ *
المس هو اللبن، يقال ما في النسجة مس.

Tubériss (F). مَغْسَلٌ *
٢٧١٠٦

Désèrbant (F). مَغْسَابٌ *
كل مادة عاقوبة تقضي على بعض الأشباب الضارة
تلحق مشابهاً.

Herbier du littoral (F). Herbier of littoral (E). مَغْسَابِيَّةٌ مَجْدُوحِيَّةٌ *
المغساب المدحجية هي المواقف القريبة من المجادق
والتي تكثر فيها النبوت والأشباب البحرية.

Décagone (F). Decagon (E). مَعْشَرٌ *
٢٧١٠٩

Pressoir (F). Press (E). مَعْصَرٌ، مَعْصَرَةٌ *
كل آلة تستعمل لقص من عصر الثمار إلى الحبوب لذلك
فالمصاصر حديد الأشكال والأحجام.

Brancmètre (F). Brancmester (E). مَعْصَافٌ *
٢٧١١١

جهاز آلي يسجل الأمراض والظواهر الجوية (الترولوجية)
أثناء الزوايا والمواسم والأصاوير. من البرق والصاعقة
والرعد إلى هبوب الرياح وسرعتها الخفية والزلزلة إلى الأمطار
وغزاراتها إلى البرد وحجمه إلى الضغط الجوي.

Echenilloir (F). Branch-opper (E). مَعْصَالٌ *
٢٧١١٢

أداة تستعمل في الاتصال تمكن العامل من الوصول والقضاء
على الأساريع والديدان الخفية في أعالي الأشجار.

Nimbus مَعْصَرَةٌ *
٢٧١١٣
هي الدجعة نوع من الغيوم، أصلها.

Exposition agricole (F). مَغْرَضٌ زِرَاعِي *
Agricultural exhibition (E).

مكان يمرض فيه كل ما له علاقة بالزراعة من النباتات
والثآليل والحيوان والادوية والمعدات.

Déchaussé (F). مَغْرَضٌ *
٢٧٠٩٧

Hibernia defoliari, Erannis defoliari (S). Hibernia
défoliante, Phalène effeuillante (F). Mottied-
umber moth (E). Grosser Frostspanner (D).

حشرة من فصيلة الذرافعات، ذكرها صغير القد أصفر
الجسم والوراشن المسجلة والمزركشة بالاحمر والأسمر.
انثاء ممداء البراءة اللون مستطيلة الجرازم والزباني والأشعة.
تمتص كمها في أوائل الخريف عند انتشاب الاقنات فيقت
في أوائل الربيع من رقات نمة تلثم البراعم والأوراق
التيه || تتركب منظم الأشجار الحرجية وبعض الأشعة
كالستيان والتدريار والقران والتزيتلا والتزيتون والخلص
والزعرور والبنق والتفاح والأجاص || تكلف في الشتاء
باستعمال أحد المراكين الفعالة.

Hibernia leucophaearia, Erannis leucophaearia (S).
Hibernia grisâtre, Phalène du chêne (F).
Hibernia leucophaearia (E).

حشرة من الأرقيات حرشفيات الاجنحة. ذكرها مجنحة
انثاء ممداء. موطنها البلاد المعتدلة الحارة من الشرق
الاسوط إلى أوروبا. فراشها صفعة تعيش على غزورها
الاماني. سرقتها تعيش على أوراق الستيان والفص ||
جسم الذكر صغير قصيف يطول نحو ٩ سم. بسطة نحو
٣٤ سم. رأسه إلى الربعة. عينا صغيرتان. زبانه
مسطبان. جوشه ويته إلى الربعة السوداء المواج. رواشته
رادية اللون يملؤها تبقج جوري وتسلج اسمر. أصلها
إلى الربعة القفصية || الآن ممرعة. جسمها اهليجي
الشكل يطول نحو ١٠ سم. ويتنهي بمزج حاد. ثوبها
إلى الربعة السوداء تملؤها رقة ممداء. جرابها مستطيلة
فصيلة تمكثها من الانتقال بسرعة وين تعلق الاشجار ||
ها جبل واحد في الجول. تظهر في نيسان. تسرح في
الليل. تماثل بعد ظهورها بنحو ثلاث ساعات وتمتص
المكن ممداء على اباط الأوراق || السرفة عند بلوغها
الكمال تطول نحو ١٨ سم. جسمها اسطواني الشكل
مبهر اطلب النقيع القصير. ثوبها إلى الكهبة تملؤها ثلاثة
خطوط سودا قاطبة منها خط ثنجي مضاعف العرض. رأسها
إلى الجفوة. شرجها عموديب الشكل ينتهي بزايدة ذقة.
رؤاها البنية الوسطى شديدة القصير مما يجعلها تقرب
عند الانتقال || طور الانكامل يستمر نحو ٣٨ اسبوعا
وينقضي في التربة ضمن غلاف من الطين والبراز المصمون
بالريال.

Cneorum (S). مَغْرُورٌ *
٢٧١٠٠

Camélé, Chamélé, Garousse (F). Spurge olive,
Widow-wall (E). Knester Knopspricke (D). Ca-
meles, Calmolea (I).

جنس شجيرات وجنيات برية من فصيلة المغروريات.
أنواعها عديدة، بعضها من نباتات المناطق المعتدلة. أوراقها
أبيض متعاقبة. أزهارها خشوية أبطية الارتكاز وسيدة
أو ثلاثية التجميع. ثمارها ثلاثية الفلقات النافقة بزورها

Cneorum (S). مَغْرُورٌ *
٢٧١٠٠

Camélé, Chamélé, Garousse (F). Spurge olive,
Widow-wall (E). Knester Knopspricke (D). Ca-
meles, Calmolea (I).

جنس شجيرات وجنيات برية من فصيلة المغروريات.
أنواعها عديدة، بعضها من نباتات المناطق المعتدلة. أوراقها
أبيض متعاقبة. أزهارها خشوية أبطية الارتكاز وسيدة
أو ثلاثية التجميع. ثمارها ثلاثية الفلقات النافقة بزورها



مغرية الشجر



مغرية رداء



مغرون مبدول



مصاصر



مصمال



مقام



ملاط الروج



ممل

٢٧١٢٨ - مَعْقِم - البرحة الطقية في ساق النبات الحولي .

٢٧١٢٩ - مَعْقِمِيَّات ° Articules (F).

Articulata (E).

شعبة من ستورات الزهر الوعائية . رتبها وفصلها وأجناسها المعروفة عديدة ، معظمها من أحافير الصور الخالية أعضاها الحلقية الكربونية . الحاصل منها الآن ينسج إلى فضيلة الاسوسيات . سفها معقبة التركيب . أرواقها شديدة الصغر ، غصية التجميع . أجهزة البويضة سبيلات محورية متغايرة الطول .

٢٧١٣٠ - مِعْكَاس ° Commutateur (F).

Commutator, Switch (E).

أداة تمكس التيار الكهربائي .

٢٧١٣١ - مِعْلَاط المَرْوَج °

Glaucoispyche cyllarus (S). Glaucoispyche des prairies (F). Glaucoispyche cyllarus (E).

حشرة من فصيلة القنليات ورتبة حرشليات الأجنحة . موطنها مغر الاصقاع المعتدلة الحرارة من العالم القديم . فراشها وأشعة قوتها رقيق الانوار . سرقتها تمسح على أرواق النباتات المرعوية وأعضاها النمل || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٢ م . بسطها نحو ٣٢ م . رأسها صغير الجرم . صيها كيرتان . زباناها شبه صيغليان . مرشها دقيق الجرم . جسيها أزرق اللون تعلو بقعة سوداء . يطها إلى الزرقاة || ورائش الذكر إلى الزرقاة البنفسجية جبل واحد في الحلق . تظهر القراشة في حزيران . تسرح في البهار . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة أسابيع وتضع المكن مبيحادها على الصفحات السفلى من نعال الأوراق || السرعة عند بلوغها الكمال تطول نحو ١٥ م . جسمها مقوس الشكل ، مستقيم المقدم والمؤخر . فوها إلى الزرقاة الخفراء تعلما حصة خطوط قاطبة جوية وأطواق سكية سوداء اللون . رأسها أسود . مدنها وردياها إلى الطلعة الرصاصية || طور الاكتمال ينشمر نحو ثلاثة أسابيع تقريبا المخادرة متدلية برباط بمنطقها كالحزام تضده الحصفية .

٢٧١٣٢ - مِعْلَاق Pédoncle (F). Peduncle (E).

جسم دقيق مستطيل يحمل زهرة أو بعض اجزاء .

٢٧١٣٣ - مِعْلَاقِيَّة Podocarpa (F).

في القشع ، أطلية .

٢٧١٣٤ - مِعْكَس ° Expérimenté (F).

Experienced (E).

٢٧١٣٥ - مِعْكَف °

Mangeoire (F).

Manger, Crib (E).

وعاء من خشب أو باطن أو حجارة توضع فيه الأعلاف للخيول والبقر وغيرها .

٢٧١٣٦ - مِعْكَف

الملف بمجموعة كواكب .

٢٧١٣٧ - مِعْكَفِيَّة Informatique (F).

في الاستقصائية ، اطلها .

٢٧١٤٤ - مَقْصَرَة Hullerie (F).

عمل استخراج الزيت . Oil-works, Oil-shop (E).

٢٧١١٥ - مَقْصَرَة التَفْخَاج Cidrerie (F).

Cider making, Cider-factory (E).

المكان المد لمصر وصنع خمر التفاح مع ما يشل من مختلف التجهيزات .

٢٧١١٦ - مَقْصَرَة Ecimeuse (F). Pollarder (E).

آلة تقصرت أشجار حاليًا قبل الإسهال غصية الضمبان .

٢٧١١٧ - مَقْصَد Emondair, Serpe (F).

أداة المقصد ويدي المقصب . Pruning-hook (E).

٢٧١١٨ - مَقْصُودِيَّات Brachionidés (F).

Brachionidae (E).

فئة دوبيات مائية من دوبرات المياه العذبة . تتميز باستطالة لإرجل الشديدة المرونة .

٢٧١١٩ - مَقْصِي Scissipare (F). Schizogenous (E).

متناسل بالانقسام إلى شطرين .

٢٧١٢٠ - مَقْصِيَّات Amblycephalidae (S).

Amblycephalidae (F). Amblycephalidae (E).

فصيلة حيوات بيوضة من ماعدات السموم . أجناسها المعروفة خمسة ، جيسان يمشان في مناطق جنوب آسيا وثلاثة أجناس تعيش في البلاد الأمريكية || أجسامها متوسطة النلاظة ، شبه اسطوانية الشكل ، تطول من ٩٥ إلى ٧٥ سم . رؤوسها مستديرة الاغظام ، رجة الاشفاق ذكروها مستنة . صيرها صغيرة . احنائها لا ملحوظة . اذنها قصيرة . ألونها مبلقة أو مرقوشة || انواعها المعروفة ٤٢ . تألف الغابات والمراعي الجبلية . تسرح في الليل . قوتها الفئران والجربوع والظباء والثعابين الصغيرة .

٢٧١٢١ - مَقْصَن Routoir (F).

Retting-pond, Retting-pit (E).

مصنع أو حوض أو بركة أو غدير يطن فيه القنب والكتان .

٢٧١٢٢ - مَقْصَان ° Putrescible (F).

صفة التي ، القابل للتلفن . Liable to putrefaction (E).

٢٧١٢٣ - مَقْصِي Franc (F). Exempt (E).

خالص الاجرة أو طليق من الكس .

٢٧١٢٤ - مَقْصِيَّة ° Stérilisateur (F).

Stérilisateur (F). Sterilizer (E).

جهاز لتعقيم رنكز على الحرارة المرتفعة .

٢٧١٢٥ - مَقْصِيَّة Drageonnante (F).

في النباتات كثيرة السنان والمملوح كالتين والخرور والورد والرومان .

٢٧١٢٦ - مَقْصَد Pancréas (F).

Pancreas (E).

هو الحولة ، أطلها .

٢٧١٢٧ - مَقْصِم Articulation, jointure (F).

Articulation, joint, joining (E).

المحاق من الخيل في المفاصل . فالروغ عند الحافر معقم والركبة معقم والمعقوب معقم || يقال فرس شديد المعاتم .

Hydroscope (F). **مِعْيَان** ٢٧١٥٤
Water-diviner (E).
هو الذي يستكشف البنايع ويمن موائعها .

Terrair (F). Soil, Ground (E). **مِعْيَاس** ٢٧١٥٥
صفة الارض بالنسبة الى الزراعة كقولك ميس جيد
الاتاء ، ويميس كرم ، وطعم الميس .

Losange, Rhombe (F). **مُعْيَن** ٢٧١٥٦
Lozange, Rhomb, Rhombus (E).
جسم رباعي الاضلاع المتساوية .

Hydroscope (F). **مِعْيَنَة** ٢٧١٥٧
Water-divining (E).
علم استكشاف البنايع وتعين موائعها .

Rhomboidal (F). Rhomboidal (E). **مُعْيَنِي** ٢٧١٥٨
Oculifère (F). **مِعْيُون** ٢٧١٥٩
المعِين من كان يعمل شيئاً . راجع جاح .

Misuler (F). To mew (E). **مُعَا** ٢٧١٦٠
معا وباع وباء السور : صَوَّرَ .

Glossostemon (S). **مُعَات** ٢٧١٦١
Glossostémon (F).
جنس نباتات عشبية برية مصرية من فصيلة الخبائيات ،
انواعها قليلة العدد ، اوراقها الشكل احرى المادسة اسود القلفة .
ساقها ووردها زياء اللحاء . اوراقها مستطيلة الاحيان
منقطة متناوبة كلية . ازهارها صغيرة القد فردية || اشهر
انواعها المئات المعجمي .

Glossostemon brugueri (S). Glossostémon de
Perse (F). **مُعَات عَجَمِي** ٢٧١٦٢
نوع من المئات وهو عشبة برية طيبة تملو من ٥٠ الى
١٠٠ سم . جذورها حنزابي الشكل احرى المادسة اسود القلفة .
ساقها ووردها زياء اللحاء . اوراقها مستطيلة الاحيان
خلية النصل . ازهارها صغيرة القد يضاء اللون || جلوره
تستعمل مسحوقة وتدخل في عدة مركبات تقي المرأة النساء .

Avaries (F). **مُعَاوَم** ٢٧١٦٣
Damages, Averages (E).
هي التوار ، راجع .

Magas (S). **مُعَاَس** ٢٧١٦٤
Magas (F). Magas (E).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات فضيات الاجرل
وفصيلة الثفيليت || انواعها المعروفة عديدة جميعها من
متسحرات الاباح الاول .

Magas (S). **مُعَاوَم** ٢٧١٦٣
Damages, Averages (E).
هي التوار ، راجع .

Magas (S). **مُعَاَس** ٢٧١٦٤
Magas (F). Magas (E).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات فضيات الاجرل
وفصيلة الثفيليت || انواعها المعروفة عديدة جميعها من
متسحرات الاباح الاول .

Magas (S). **مُعَاوَم** ٢٧١٦٣
Damages, Averages (E).
هي التوار ، راجع .

Magas (S). **مُعَاوَم** ٢٧١٦٣
Damages, Averages (E).
هي التوار ، راجع .

Hétérotrope (F). **مُعَاوَم** ٢٧١٦٣
Heterotropous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نثيط (ملقوسة نباتية) رأس
طرفه لا يقابل انقور البزرة .

Néphélomètre (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٦٧
Nephelometer (E).
جهاز يمكن من درس الغبش وتحديده .

Vivace (F). Perennal (E). **مُعَمَّر** ٢٧١٦٨
نعت تعريفي يوصف به النبات الذي يعيش أكثر من
سنتين .

Novale (F). **مُعَمَّر** ، **مُعَمَّرُوكَة** ٢٧١٦٩
Newly broken-up (E).
كل ارض حيرة مستعدة .

Fabrique, Manufacture (F). Fabric, Manufactory (E). **مُعَمَّل** ، **مُعَمَّلَة** ٢٧١٧٠
Brasserie (F). Brewery, Brewhouse (E).
معمل تصنع فيه البيرة اي البيرة .

Glucoserie (F). **مُعَمَّلُ الْغُلُوكُوز** ٢٧١٧٢
Glucose-house (E).
معمل يحول فيه النشا الى غلوكوز .

Grapperie (F). **مُعَمَّيَة** ٢٧١٧٣
Grasery, Vinery (E).
هي دفيئة العنب ، بناء زجاجي السقف ويبنى الجوانب
بجهاز يندة الكثافة يستعمل لدرس الكرمه وانتاج العنب
غلاتاً لزمان الانتاج الطبيعي .

Insectarium **مُعَمَّيَة الْحَشَرَات** ٢٧١٧٤
مؤسسة علمية مجهزة بالوسائل الخاصة التي تمكن من تربية
الحشرات لدرس اطوارها وبيوتها .

Fiduciaire (F). Fiduciary (E). **مُعَمَّيَة لَهُ** ٢٧١٧٥
هو الذي اوصى له مال وفرض عليه دفعه المستحق
المهدي .

Mécanisme (F). **مُعَمَّوَل** ، **مُعَمَّل** ٢٧١٧٦
نعت تعريفي يطلق على الاعضاء المماثلة المتباعدة في كامل
الجسم او في جزء منه .

Pioche (F). Pickaxe (E). **مُعَمَّوَل** ٢٧١٧٧
اداة زراعية تستعمل في ركاش التربة . اشكاله واحجامه
عديدة تختلف باختلاف الاعمال المطلوبة .

Collaque (F). Collic, Coliac (E). **مُعَمَّوَل** ٢٧١٧٨
Intestin (F). **مُعَمَّوَل** ٢٧١٧٩
Intestina, Bowel, Gut (E).
عضو من جهاز الهضم يمتد من المعدة الى الاست وهو
يقسم الى عدة اقسام انحصارها المعى النقيظ والمعى الغليظ .

Intestin grêle (F). **مُعَمَّوَل دَقِيق** ، **عَجَف** ٢٧١٨٠
Small intestine (E).
القسم الوسطي من الامعاء .

Jéjunum (F). Jejunum (E). **مُعَمَّوَل صَالِح** ٢٧١٨١
المعنى الصائم جزء من المعى النقيظ مركزه بين الفلج وبين
المعنى الغليظ .

Côlon (F). **مُعَمَّوَل عَظِيم** ، **مُعَمَّرَان** ٢٧١٨٢
Colon (E).
القسم الاخير من الامعاء ينتهي في الاست .

Iléon, Iléum (F). Ileum (E). **مُعَمَّوَل لَقِيف** ٢٧١٨٣
المعنى اللقيظ هو القسم الثالث والاطول من المعى النقيظ ،
مركزه بين المعى الصائم والاخضر .




محول




مقاس

هي البقرة الغلظة المستديمة الوداق أو الاستحرام .




المفتوم من النيات : الذي لفحه الحر.

نوع من الفستق الحلبي . فربيون عديدة نطو من ٥ إلى ٣٥ م. منها المتاع وتجاري الماء . سوقها جالسة تشورها إلى السرة السوداء . فروصها زباه . أوراها ثلاثية أو خاسية التفصيص . نصلها عديد للعروق الدبكة ، لامع البشرة المائلة على صفحتيه .




جنس نباتات بحرية وجنينة من فصيلة البليات . انواعه
ع ١٦ ، اعطاهم البلاد المحتلة . تعيش على ضفاف
البحيرات وبحاري الماء . اوراقها حاملة . ازهارها قدية ،
الذكورة منها تظهر في الخريف والانثوية تنفتح في الربيع .
اغشائها شائعة الاستعمال الصناعي لها عطيها الى . فحمها
يستخدم في صناعة البارود . قشورها وافرّة السطان تصلح
للدباغة || اشهر انواعه ما يتبع .

نوع من الخث، شجيرة صغيرة القند تملو من ٨ الى ١٠ أمتار، فروصها مائلة، اوراقها قلبية الشكل تطول من ٥ الى ١٢ سم، وتعرض من ٤ الى ١٠ سم. نصلها مسنن، الحافة خلية الصفحة السفلى. غاريطها فردية التجميع جوزية القند.




نوع من الماش وهو شجيرة جبلية مملوءة تلو من ٢ الى ٦ أمتار. أوراقي بيضية ذلقة. نصلها بطول من ٣ الى ٨ سم. ويعرض من ٢ الى ٥ سم. وهو ثنائي التسنين. الأخضر الصفحة العليا خال السفلى.

Nectarinidae (S). ٢٧١٧٩ - مِثْرِيَّات



Aune grisâtre, A. de montagne, Aune blanchâtre (F). Black alder, Hoary alder, Speckled alder (E). Weisserle, Grauerle (D). Auxano, Marassols, Ontanella (I).

Melica (S). Mélisque (F). * ٢٧١٨ - ميفرية



Alnus japonica (S). مَثَث اليابان ٢٧١٧٣

Mélongène (F). مَلُونْجُونْ - ٧٧١٨١



٢٧١٧٤ - مَدَنِي بَحْرِيّ *Alnus maritima* (S).

Pluvioscope (E).




وتعرض من ٣ الى ٦ سم. نصلها مالم الصفحة العليا خلي
السفل لا قياسي التسنين ينتهي بهذة قصيرة || وهو يرغب
في المواقف الرطبة الساحلية ويحيد قرب الماء.

٢٧١٨٤ - مَخْدَلِيسُ الْكَرَرِ *



مختلص الكرز

٢٧١٨٤ - مَغْدَلِيسُ الْكَرَرِ *



2٧١٩٨ - **مِغْرَلَةٌ** (F). Scoop, Ladle (E).
رشف مقعر يستعمل في اغتراف الماء والمواد المائعة .

2٧١٩٩ - **مِغْرُودٌ** (F).
هو الكرم الأحمر ، اطبله .

2٧٢٠٠ - **مِغْرُوي** (F).
نوع من الفجل الزراعي المأكول يعرف بفجل الهند أو فجل جاوا .

2٧٢٠١ - **مِغْرُوكٌ** (F). Distaff (E).
هو المردن ، شكل من اشكال تشذيب الشجر .

2٧٢٠٢ - **مِغْشِيلُ الْوَرْدِ** *
Megachiles centuncularis (S). Megachile (F).

حشرة من المِغْشِيلِيَّات طولها نحو ١٢ سم . تركيب الوردة والفلل تنقسم نصل الارواق وتنقل الفتحات الى غشائها وتلقيه في بعض التجاويف الخفية حيث تروى الفتحات منفذاً متتابعة يتخللها المكان ، يشاهد ويحيط به شيء من العمل || يعتبر من الحشرات الضارة لانه يذوي اوراق الورد والفلل .

2٧٢٠٣ - **مِغْشِيلِيَّاتٌ** *
Megachilidae (F). Megachilidae (E).
فصيلة حشرات غاصلة جارية من رتبة غشائيات الاجنحة . اجناسها وانواعها قليلة العدد ، قريبة الشيء من النحل . جميعها صغيرة القدر ، طولها يراوح من ١٠ الى ١٥ سم . تقم غشائياتها في تجاويف الاعشاب اليابسة .

2٧٢٠٤ - **مِغْضٌ** (F).
Colic, Stomach-ache (E).
عارض يعترى بعض الحيوانات كالخيل والبقر . اسبابه مختلفة وانواعه ايضاً اغصها الكولري والعوي .

2٧٢٠٥ - **مِغْضَنٌ ، مِغْضَدٌ ، مِغْضَبٌ**
Ebranchoir (F). Pruning-tool (E).
اداة تستعمل في قطع الاغصان والافئاد .

2٧٢٠٦ - **مِغْضِي** (F). Momordique (S).
جنس نباتات عشبية مفردة وعارضة من فصيلة القتليات ، انواعه ١٢ منها الحولية والمعمرة . اوراقها متعاقبة ، منقطة ، كفية ، زغبية ، خشنة . ازهارها فردية التجميع ، كبيرة القدر ، وسيدة للمسكن . ثمارها بيضية الشكل ، لثولية القشور . يزورها مبطلة ، حنطية اللون ، بارزة للتسبيح والازراكش || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

2٧٢٠٧ - **مِغْضِي الْكُوْشْنَشِينِ**
Momordica cochinchinensis (S). Momordique de Cochinchine (F).

نوع من المغض المسر ، منته الكوشنشين والهند . جذوره عشقولة . ساقه تطول نحو ٨ امتار . سوائقه بسيطة . اوراقه ثلاثية او خاسية التفصيص . ازهاره كبيرة القدر تطورها نحو ١٠ سم . لونها الى الصفرة الباهتة ، بتلاتها سنانية الشكل ، مضلة بالاسود . ثماره بيضية حمراء اللون تطول من ١٠ الى ١٨ سم .

2٧٢٠٨ - **مِغْضِي بِلْسَمِي** *
Momordica balsamina (S). Momordique baumier, M. balsamina, Pomme de merveille, Pomme de Jérusalem (F). Apple of Jerusalem, Balsam apple (E). Balsampfel, Wunderapfel (D). Momordica, Pomo balsamo, P. di meraviglia (I).
اشهر انواع المغض . اصطناعه فسيحة الاجزاء تمتد من الشرق

الى الغرب فسلطيا وتكثرت || جسمها صغير القدر يطول من ٣ الى ٤ م . ثوبها الى السواد الكامد . رأسها كبير الجرم ينتهي بملك قاضم ثاقب . عينها كبيرتان . زهابها سوطانيان . ظهراها مستدير المؤخر اللامع القارق الطرف . ارساغها رباعية المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع . تسرح في الليل . تساقط بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع . قرر المكان في ليل الافئاد والافئان في ثقبوت تخليجها بملكها || البرقة مرقاة تطول عند تمام الادراك من ٦ الى ٧ م . جسمها اهليلجي الشكل ، حنطي اللون ، اصفر الملوخ ، اسمر الرأس والقرع || طود الكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينتهي في طرف اللق الذي احفرته البرقة .

2٧١٨٥ - **مِغْدٌ**
Nutritif (F).
Nutritive, Nourishing (E).
نعت تعريفي توصف به المواد المغذية او التي لها علاقة بالتغذية .

2٧١٨٦ - **مِغْرَاسٌ** *
Transplantoir (F). Garden trowel (E).
اداة شتلة الشكل والحجم تستعمل في تحجوب التربة لتسكيرها من اقبال الشتول المطلوب غرسها .

2٧١٨٧ - **مِغْرَاسٌ كَلِي** *
Transplantoir mécanique (F). Transplanting-machine (E).
جهاز كالي يوفن غرس الشتول في التربة على ابعاد متساوية .

2٧١٨٨ - **مِغْرَبٌ**
Albinos (F).
هو الأسب ، اطبله .

2٧١٨٩ - **مِغْرَكَةٌ**
Ocre (F). Ochre (E).
تراب صلبالي يستعمل في التخضيب .

2٧١٩٠ - **مِغْرَكَةٌ حَمْرَاءُ**
Ocre rouge (F).
تراب صلبالي احمر الخضاب .

2٧١٩١ - **مِغْرَكَةٌ صَفْرَاءُ**
Ocre jaune (F).
تراب صلبالي اصفر الخضاب .

2٧١٩٢ - **مِغْرَدٌ**
Scare birds (F).
راجع ابو مقار ديك البحر .

2٧١٩٣ - **مِغْرُوزٌ**
المغز او مغز الذهب نجم ثير من كوكبة الدب الاكبر .

2٧١٩٤ - **مِغْرُوزٌ**
Empatement (F). Footing (E).
مغز نصاب امخرات .

2٧١٩٥ - **مِغْرُوزُ السَيْبِ**
Ecamousseure (F).
مغز نصاب امخرات .

2٧١٩٦ - **مِغْرُوزُ الطَّعْمِ**
Enture (F).
الموضع الذي يوضع فيه الطعم من المظلم .

2٧١٩٧ - **مِغْرُوسٌ**
Biron, Haque (F). Truck (E).
اداة من حديد مخروطية الطرف تغرز في التربة لتفتح حفرة توضع فيها التربة .



مغراس



مغشيل الورد



مغض بلسمي

- ٢٧٢١٦ - **مِفْغَرِيَّةٌ مَذَكَبَةٌ** Serpette (F). هي قرمزية فويرنزا ، اطلبها .
- ٢٧٢١٧ - **مِفْغُورٌ** هو للفُر ، اطلبه .
- ٢٧٢١٨ - **مَعَلَّةٌ** النسبة والمتر التي تنتج في علم مرتين . ج . فال .



مغنص خلبي الورق

- ٢٧٢١٩ - **مُعَلَّقٌ** Indehiscent (F). Indehiscent (E). تمت تمرير يوسف به ما لا يفتح أو لا يتشقق من البرور وغيرها .
- ٢٧٢٢٠ - **مِعْلِمٌ** راجع منفصلة .
- ٢٧٢٢١ - **مَعْنَاً ، صَهَارَةٌ** Magma (F). Magma (E). الماء ، فيزيائياً وكيمياً ، كل مادة رقيقة شبه مائعة كالزجاج المصهور أو كالصانع الذي يقلت به البركان عند ثورانه .

- ٢٧٢٢٢ - **مُعْتَدَّةُ الْأَجْنَحَةِ** Coléoptères (F). Coléoptera (E). رتبة من الحشرات تعرف بصفة الاجنحة ، اطلبها .
- ٢٧٢٢٣ - **مَعْنَمٌ** Ensaeur (F). Sacking (E). أداة تجمل الكيس قائماً مفتوحاً فيسهل ملو حياً .
- ٢٧٢٢٤ - **مِعْنَاطٌ** Magnétomètre (F). Magnetometer (E). جهاز يستعمل في قياس الاضطراب المغنطية .

- ٢٧٢٢٥ - **مَغْنَطِيسِيٌّ ، مَغْنَطِيسِيٌّ** Magnétique (F). Magnétique (E). المغر والمغفيرة حشرة واحدة مشهورة باسم قرمزية .

- ٢٧٢٢٦ - **مَعْنَةٌ ، مَوْغْنُو ، مَاهُونٌ** Swietenia mahogoni (S). Mahogony (F). Mahogony (E). أجرة أو موهوب . اجناسها وانواعها كثيرة البعد تتميز بصغر قدها وبازدهاجها الشكل والشي وبافرازاتها الشمية أو اللكية || ذكروها تحية الجسم بحسنه . انائها معار بصفة الفكك او مكورة تميز حل النسج النباتية فتشبهها وتمتص عصارتها .

- ٢٧٢٢٧ - **مَغْفَرِيَّةُ التَّلَاحِ المَذَكَبَةُ** هي قرمزية التلحاح ، اطلبها .

- ٢٧٢٢٨ - **مَغْفَرِيَّةُ الحُمْضِيَّاتِ** Pseudococcus citri (S). Cochenille farineuse des agrumes (F). حشرة من القرمزيات ، بصفة الشكل ، صغيرة القد ، مبطلة الجسم ، عذبة الطعم ، صفراء اللون ، تحية التلحاح الشمي البتوني التركيب || تركيب الحفصيات والمغزو وبعض نباتات الزينة . انصرارها مفعودة . تكاثرها كثيرا من القرمزيات .

- ٢٧٢٢٩ - **مَغْنَطِيَّةٌ حَيَوَانِيَّةٌ** Zoomagnétisme (F). Zoomagnetism (E). علم يبحث في تأثير المغنطية على الاحياء .

- ٢٧٢٣٠ - **مَغْنَطِيسٌ ، مَغْنَطِيسٌ** Aimant (F). Magnét (E).

- ٢٧٢٣١ - **مَغْنَطِيسٌ كَهْرَبَائِيٌّ** Electro-aimant (F). Electro-magnétique (E).

- ٢٧٢٣٢ - **مَغْنَطِيسِيٌّ كَهْرَبَائِيٌّ** Magnéto-électrique (F). Electro-magnétique (E). وغيرها من نباتات الزينة || تكاثر كثر القرمزيات .



مغنص

٢٧٧٤٠ - مَغْنُولِيَّةٌ كَبِيرَةُ الزَّهَرِ

Magnolia grandiflora (S). *Magnolia à grandes fleurs* (F).

نوع من المغنولية الأزينية . جفرتها كبيرة القد هربية الشكل تملو من ٢٠ إلى ٣٠ م . أوراقها أبيضه تطلو من ١٢ إلى ٢٥ سم . وتعرض من ٦ إلى ١٢ سم . نصلها لامع البشرة عابق الخضار حل صفحته العليا ، أسف اللون الزنجاري على صفحته السفلى . أزهارها مكسبة تلبية اللون ، عطرية العرف ، قطرها يراوح من ١٨ إلى ٣٠ سم . يتلاتها تند من ٩ إلى ١٢ ، أقلام اسديتها اريشوانية || أزهارها يستمر طول شهر حزيران .

٢٧٧٤١ - مَغْنُولِيَّةٌ كَبِيرَةُ الْوَرَقِ

Magnolia macrophylla (S). *Magnolia à grandes feuilles* (F).

نوع من المغنولية الأزينية . جفرتها متوسطه الحجم تملو من ٨ إلى ١٨ م . ألقانها وزمعاتها خلية البشرة . أوراقها عابله كبيرة مستطيلة ، طولها يراوح من ٣٠ إلى ١٠٠ سم . وعرضها من ١٠ إلى ٣٠ سم . نصلها أحليجي الشكل مقطوم القاعده . أزهارها عظيمة القدر ، قطرها يراوح من ٢٠ إلى ٣٢ سم . وهي فواحه العرف ، بيضاء اللون ، سداسية البتلات المستديرة || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران .

٢٧٧٤٢ - مَغْنُولِيَّةٌ مَقْدُونِيَّةٌ

Magnolia coco, *M. pumila*, *Talauma pumila* (S). *Magnolia coco* (F).

نوع من المغنولية الأزينية . جفرتها مشدولة تملو من ٢ إلى ٤ أمتار . أوراقها أبيضه سنانية درية تطلو من ٨ إلى ١٥ سم . نصلها أخضر الصفحة العليا ، بحري السفلى . أزهارها صغيرة القده قطرها نحو ٣ سم . وهي ثلاثية الفصل الخضر ، سداسية البتلات ، فواحه العرف الطوري ، حاجية اللون . أزهارها يستمر طول السنة .

٢٧٧٤٣ - مَغْنُولِيَّةٌ مَحْرِشِيَّةٌ

Magnolia officinalis (S). *Magnolia officinal* (F).

نوع من المغنولية الطيبة والزراعية ، منها الصين . جفرتها هربية الشكل تملو من ٦ إلى ١٦ م . أوراقها عابله كبيرة تطلو من ٣٥ إلى ٤٥ سم . وتعرض من ١٢ إلى ٢٠ سم . نصلها أخضر الصفحة العليا ، خلي السفلى البسرية اللون . أزهارها مكسبة كبيرة القده قطرها يراوح من ٥ إلى ٢٠ سم . يتلاتها بيض اللون ، أقلام اسديتها قمرية . || أزهارها يستمر طول فصل الربيع .

٢٧٧٤٤ - مَغْنُولِيَّةٌ مَطْلِيَّةٌ

Magnolia tripetala, *M. umbrell* (S). *Magnolia parasol* (F).

نوع من المغنولية الأزينية . جفرتها مظلة الشكل تملو من ٥ إلى ١٠ أمتار . أوراقها عابله أحليجية مستطيلة ، طولها يراوح من ١٢ إلى ٦٠ سم . نصلها مائل البشرة جبل الخضار الزاهي . أزهارها بيضاء اللون . مستبجة العرف ، تساجية البتلات المستطيلة ، قطرها يراوح من ٨ إلى ١٢ سم . || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران .

٢٧٧٤٥ - مَغْنُولِيَّةٌ مُؤَلَّفَةٌ

Magnolia acuminata (S). *Magnolia acuminé* (F).

نوع من المغنولية الأزينية . جنبها سريرية تملو من ٨٠ إلى ١٥٠ سم . وهي في أقلها وبديتها شجرة شائعة تملو نحو ٣٠ م . أوراقها عابله بيضيه درية ، نصلها يطلو من ١٢ إلى ٢٢ سم . ويعرض من ٦ إلى ١٢ سم .

Magnétisme (F).

Magnetism, Mesmerism (E).

٢٧٧٣٣ - مَغْنُولِيَّةٌ

Magnolia (S).

Magnolier, *Magnolia* (F). *Magnolia* (E). *Magnolie*, *Lilienbaum* (D). *Magnolia* (I).

جنس اشجار وشجيرات وجنات برية طيبة وزينية من فصيلة المغنوليات . أنواعها عديدة . أوراقها متعاقبة ، كاملة ، جلدية النصل اللامع . أزهارها كبيرة القده ، ثلاثية الفصل ، عديدة البتلات المتركة ، كثيرة الاسدية ، فواحه العرف الطوري . ثمارها غاريط مصبرة القده ناضجة || أشهر أنواعها ما يلي :

٢٧٧٣٥ - مَغْنُولِيَّةٌ بَحْرِيَّةُ الْوَلَدِ

Magnolia glauca, *M. virginiana* (S). *Magnolia glauque*, *M. de Virginie* (F).

نوع من المغنولية ، جفرتها تملو من ٥ إلى ٢٠ م . أوراقها أبيضه بحرية اللون خلية الصفحة السفلى . نصلها يطلو نحو ١٨ سم . ويعرض نحو ٦ . أزهارها عطرية ، مكسبة ، عديدة البتلات البيض || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران .

٢٧٧٣٦ - مَغْنُولِيَّةٌ بَهِيَّةٌ

Magnolia denudata, *M. conspicua*, *M. praecox* (S). *Magnolia magnifque*, *M. yulan* (F).

نوع من المغنولية الأزينية . جفرتها تملو من ١٠ إلى ١٥ م . أوراقها عابله ، لامة الصفحة ، تطلو من ٧ إلى ٢٠ سم . وتعرض من ٥ إلى ١٢ سم . أزهارها عطرية ، تساجية البتلات المنصبة ، قطرها يراوح من ١٠ إلى ١٥ سم . لوها إلى البياض اللثلي ونها ضررب وريدي اللون أو حوله . أزهارها يستمر طول شهر نيسان .

٢٧٧٣٧ - مَغْنُولِيَّةٌ زَنْبُكِيَّةُ الزَّهَرِ

Magnolia liliflora (S). *Magnolia à fleurs de lis* (F).

نوع من المغنولية الأزينية . ضرربه وأضرابه عديدة ، جميعها جنات فرها تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم . أوراقها عابله بيضية ، نصلها مقطوم القاعده ضرب الطرف يطلو من ١٠ إلى ١٥ سم . ويعرض من ٦ إلى ١٠ سم . أزهارها زنبكية الشكل ، سداسية البتلات الملوقة ، فواحه العرف الطوري . أزهارها يستمر من نيسان إلى أيار .

٢٧٧٣٨ - مَغْنُولِيَّةٌ صَغِيرَةُ الزَّهَرِ

Magnolia parviflora (S). *Magnolia à petites fleurs* (F).

نوع من المغنولية الأزينية . جفرتها تملو من ٣ إلى ٦ أمتار . أوراقها عابله تطلو من ٦ إلى ١٢ سم . وتعرض من ٤ إلى ٨ سم . نصلها مائل البشرة كثير العروق الواضحة . أزهارها بيضاء اللون ، عطرية العرف ، سداسية البتلات ، قطرها يراوح من ٨ إلى ١٠ سم . || أزهارها يستمر طول شهر حزيران .

٢٧٧٣٩ - مَغْنُولِيَّةٌ صَفْصَافِيَّةُ الْوَرَقِ

Magnolia salicifolia (S). *Magnolia à feuilles de saule* (F).

نوع من المغنولية الأزينية . جفرتها هربية الشكل تملو من ٣ إلى ٦ أمتار . أوراقها عابله ، صفصافية الشكل ، بحرية اللون تطلو من ٦ إلى ١٦ سم . وتعرض من ٣ إلى ٩ أزهارها عطرية العرف ، بيضاء اللون ، ثلاثية الفصل ، سداسية البتلات ، قطرها يراوح من ٨ إلى ١٢ سم . أزهارها يستمر طول شهر نيسان .



مغنولية

٢٧٢٥٦ - مُفَاخَصَةٌ ، مُبَايَعَةٌ

Dédifférenciation (F). Dedifferentiation (E).

المفاصلة أو المايعة الارتدادية ، بيولوجياً ، رجوع الحبيبات أو الخلايا إلى الحالة المضيئة عند زرع الانسجة.

٢٧٢٥٧ - مُفْتَحِ التَّابِين

Apéritaur (F). هو الموزن الذي يفتح عند التابيين بطنهم والزمانه يبلغ معين . وهو الذي يفاوض رطوس على الموزنين الآخرين الذين يقوضون البعد أو الأطلاق القبول .

٢٧٢٥٨ - مُفْتَرَفَةٌ ، فَارِسَةٌ

Etalée (F). Spread (E). تمت تعريفها توصف به النباتات التي تلحف أثره بأوراقها والأشياء المنبسطة الصلصات الكبيرة .

٢٧٢٥٩ - مُفْتَوَسَّاتُ الْمَكَائِلَات

Physoctomes (F). رتبة من الأسماك تعرف أيضاً بلبينات الزمائف .

٢٧٢٦٠ - مُفْتَحٌ

Carbonifère (F). Carboniferous (E).

٢٧٢٦١ - مُفْرَدُ التَّحْدُبِ

Plan convexe (F). Convex plane (E).

٢٧٢٦٢ - مُفْرَدُ التَّكَوُّرِ

Plan concave (F). Concave plane (E).

٢٧٢٦٣ - مُفْرَدُ الدَّوَرِ

Monophasé (F). Monophasis (E).

٢٧٢٦٤ - مُفْرَدَات

Simplex (F). هي النباتات الطبية التي يعالج بها بعض الأمراض .

٢٧٢٦٥ - مُفْرَدَاتُ الْأَصَابِعِ

Périostodactyles (F). Peristodactyla (E).

رتبة حيوانات تشمل ثلاث فصائل : الحلييات والكركتنيات والتابريات .

٢٧٢٦٦ - مُفْرَصَدٌ

Acinaire (F). Actinous (E). تمت تعريفها يطلق على كل نبات تطلو لحاء سائله أو أغصانه حوصلات صغيرة تشبه القرميد ، وهي تزيانها طبعية لا علاقة لها بأي وصف كان .

٢٧٢٦٧ - مُفَرَّقٌ

Potentiomètre (F). Potentiometer (E).

مقياس فروق الجهد الكهربائي .

٢٧٢٦٨ - مُفَرَّقَةٌ

Hachoir (F). هي الخفحة ، رابحها .

٢٧٢٦٩ - مُفْصَاصٌ ، مِفْلَاقٌ

Multilobé (F). Multilobata (E).

ما كان كثير الفصوص أو الفلق .

٢٧٢٧٠ - مُفَصَّغَةٌ

Ecossema (F). Shellier (E).

آلة تستعمل لآلترايع زور القرنيات من سفلها .

٢٧٢٧١ - مُفْصَصٌ ، مَكْلُوقٌ

Lobé, Lobulé (F). Lobate, Lobed (E).

٢٧٢٧٢ - مِفْصَلَةٌ ، فَمَصَاةٌ

Seringue (F). Syringe (E).

صفحة البليا بحرية اللون لامة ، صفحة السفل خلية طلاء . انزاعها غامدة العرف ، فستقية اللون ، تطرها نحو ١٠ سم . ثمارها كالتأخير الصغير تيلو بحرية الخضار ثم تحمر شيئاً فشيئاً حتى الإدراك || انزاعها يستمر من أيار إلى تموز .

٢٧٢٦٩ - مُتَوَلِّدَةٌ نَجْمِيَّةٌ

Magnolia stellata (S). Magnolia étoilée (F). نوع من المتولدة النجمية . ثمرتها هرمية الشكل تملو من ٣ إلى ٥ امتار . أوراقها حاملة مالملة زاحية أخضر تطلو من ١٢ إلى ١٤ سم . وتعرض من ٢ إلى ٤ سم . انزاعها مكينة نجمة الشكل تمتد من ١٢ إلى ١٨ بطة ، قطرها نحو ٨ سم . بتلاتها عطرية العرف ، يفضاء اللون ، قدية الصلصة ، مدنية الطرف ، منسطة الارتكاز || انزاعها يستمر من آذار إلى نيسان .

٢٧٢٦٧ - مُتَوَلِّدَات

Magnoliaceae (S). Magnoliaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القمالات . اجناسها ٢٢ ، تشمل زهاء ١٥٠ نوعاً جميعها أشجار ونباتات . أوراقها متعاقبة بسيطة جلدية متصل . انزاعها خشوية أو وسدية المسكن ، فردية أو عنقودية التجميع . منبها البلاد الحارة ، فيها الطبية والصناعية والزراعية .

٢٧٢٦٨ - مُتَشَى

Villa (F). هي للدار ، أطليا .

٢٧٢٦٩ - مُتَشَبِّهٌ

Magnolie (F). Magnesia (E). هي اكسيد المغنيزيوم ، ويترى في تصنيف العناصر الغذائية النباتية من العناصر الأولية .

٢٧٢٥٠ - مُتَشَبِّهٌ

Magnesium (F). Magnesium (E).

معدن صلب ، لونه إلى البياض الفضي ، رمزه (Mg-) وزنه الذري ٢٤.٣٢ ، ثقله الذري ١٧.٥ ، ينصهر في ٦٥٠°م ، وهو يمتزج في الهواء الطلق ، اشغاله بأهر اللهبية الناجية . يستعمل في عدة مركبات صناعية . أما ملحه فسهل شديداً القاعدية .

٢٧٢٥١ - مُتَشَابِهٌ

Hygrophile . تمت تعريفها يوصف به كل نبات لا يعيش إلا في المواتج الرطبة .

٢٧٢٥٢ - مُتَشَابِلٌ

Touffu (arbre) (F). Thick (tree) (E).

الشجرة الملتفة الأغصان الكثيرة الورقة .

٢٧٢٥٣ - مُتَشَبِّهَةٌ ، حَشَبَشَةُ الْبَسَاطِ

Mollugo (S). Mollugine (F). Mollugo, Carpet-weed (E).

Welchkrut (D). Mollugo (I). جنس اشباب برية حولية من المتغيرات . أنواعه نحو ٣٠ ، أصلها البلاد المعتدلة الحارة . جميعها مرصوة تستحبها الماشية .

٢٧٢٥٤ - مُتَشَبِّهَات

Molluginas (S). Molluginées (F). Molluginas (E).

فصيلة نباتية قريبة الشبه من الرجلية . اجناسها وأنواعها قليلة العدد ، جميعها برية مرصوة .

٢٧٢٥٥ - مُتَشَبِّسٌ

Mare (F). Pool, Pond (E).



مليرة

مَعَارِ التَّعَلُّقِ

27308 - **مُتَاوِل رَاكِف** (F). Sous-entrepreneur (F).
Sub-contractor (E).
هو الذي يعمل على المقاول في جزء من العمل .

27309 - **مُقَاوِمَة** (F). Résistivité (F). Resistivity (E).
27310 - **مُقَايَسَة ، مَبْكَان تَفْصِيلِي** (F). Devils (F).
Estimate (E).
بيان مفصل بالأعمال المقصودة مقروناً بشحن كلفتها .

27311 - **مُقَايَضَة ، قِيَاض** (F). Echange, Troc (F).
Exchange, Barter, Truck (E).
مقد يطلع احد طرفيه الى الآخر شيئاً أو يتنازل له عن حق مقابل من احدى أو سق آخر . وفي كانت المقايضة بيع اعيان أو حقوق باعيان أو حقوق فهي القياض .

27312 - **مُقَايَلَة** (F). Rétrocession (F).
Retrocession (E).
التنازل الى الغير عن صفقة بما لها وما عليها .

27313 - **مُقَايِس** (F). Mesures (F). Measure (E).
27314 - **مُقْبَض ، مِقْوَم** (F). Mancheron (F).
Selt (E).
من اجزاء المحراث ، الخشب التي يقبض عليها الفلاح لضبط التلم .

27315 - **مُقَبِّط** (F). Mélangeur (F). Mixer (E).
آلة تستعمل لتلط الاشياء كالاسمنت وغيرها .

27316 - **مُقْبِرَات** (F). Recettes (F).
Receipts, Raturas (E).
27317 - **مُقْبَرَة** (F).
المقبوطة نجم ثير من كوكبة برج التوأين مركزه على الركنة اليسرى من التوأم المؤخر .

27318 - **مُقْبِي** (F).
هو القضاء ، اطلبه .

27319 - **مُقْبِرَة** (F). Mactra (S).
Mactra (F). Mactra (E).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحات الخواشيم وقصيلة المقتربات . انواعها المعاصرة المعروفة نحو 150 متنترة في معظم بحار العالم || اصداها شبه هريبة الشفون مائلة السطح . مثلبها متنتلة الطول مزدوجة || تعيش في الرمال المنصورة بالمال قرب المصبات والاعوار || لحومها مأكولة ، جيدة الصنف .

27320 - **مُقْبِرِيَّات** (F). Mactridae (S).
Mactridae (F). Mactridae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفيحات الخواشيم اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة المدججها متنتلة اللحم ، متنتلة الرباطات الفاضلية || اصطلها منظم بحار العالم اخصها بحار المناطق المتنتلة الحاررة || أشهر اجناسها المقترير والاصمراع والسلمحة والكومنجية .

27321 - **مُقْبَلَة** (F). Culture de concombre fleuveux (F).
زراعة القثاء وموضع هذه الزراعة كالبيطخة اللطبخ .

27298 - **مُقَارَض ، مُقَارِب** (F). Commanditaire (F). Sleeping partner (E).

هو الشريك في احدى شركات القراض أو المضاربة فلا يفرض من ديون الشركة الا قدرأ يوزي حصته فاذا كانت شركة القراض بالسهم اطلق على المقارض اسم المساهم .

27299 - **مُقَاَسَمَة الْمُتَنَازِع فِيْهِ** (F). Pacte de quota litis (F).

شرط يتنقذ بين المتقاضين والمحامى على أن أتأب القضية تكون جزءاً من كسبه وهو محظور في اللوائح المهنية .

27300 - **مُقَاَصَة** (F). Compensation (F).
Compensation (E).
وهي احدى وسائل البقاء ، تعريفها الشامل أن يتوافق التزامان متبادلان بين شخصين ويكون عمل الاتزامين مبلغاً من النقد أو اشياء مثلية من نوع واحد . ويكونان مستحقين الدفع خالين من النزاع وأجبي البقاء في مكان واحد . وإذا ادى احد الاتزامين على الآخر كانت المقاصة في المبلغ الأول فقط || والمقاصة قد تكون :

مقاصة تامة
Compensation totale (F).
Total compensation (E).

مقاصة تعاقدية - بالتراضي
Compensation conventionnelle (F). Conventional compensation (E).

مقاصة جزئية
Compensation partielle (F).
Partial compensation (E).

مقاصة قانونية
Compensation légale (F).
Legal compensation (E).

مقاصة قضائية
Compensation judiciaire (F).
Judicial compensation (E).

27301 - **مُقَاَصَاة** (F). Poursuite (F).
Sute, Proceedings (E).
وهي القيام بالمساعي والتدابير القانونية للحصول على قرار قضائي أو سكر . وهي في القانون الجنائي الإجماعات والتحقيقات التي تجري لكشف عن الجاني أو المجرم .

27302 - **مُقَاَصَاة الضَامِن** (F). Appel en garantie (F).
إدخال الضامن في الدعوى وهو إجراء خاص يراد به ادخال من يتكهن عليه ضمان في دعوى لم يكن داخلها فيها حق يعمل من الضمون له ما يمكن أن يحكم به عليه .

27303 - **مُقَاَط** (F). Colporteur (F).
Hawker, Pedlar (E).
هو البائع الجوال .

27304 - **مُقَاَطَع** (F). Tâcheron (F).
One working by the job (E).
هو العامل المتقبل .

27305 - **مُقَاَم** (F). Dénominateur (F).
Denominator (E).

27306 - **مُقَاوِس** (F). Jockey (F).
هو الجوكي الذي يركب جواد الرهان .

27307 - **مُقَاوِل ، مُقْتَرِم ، مُتَعَدِّد** (F). Entrepreneur (F). Contractor (E).
هو الذي يرتبط بمقدد للمقاول ويأخذ على عاتقه القيام بعمل معين يساعده فيه عمال مأجورون .



مقبير

٢٧٣٣٧ - مَقْرَأَس * مَقْصَصُ السُّتَانِي، مِقْصَصُ التَّقْلِيم، مِقْصَصُ الشَّجَر. Sécateur (F).
مقص تقليم به أغصان الشجر. Pruning-scissors (E).

٢٧٣٣٨ - مَقْرَدُون * Macrodon (S).
Macrodon (F). Macrodon (E).

جنس اسماك نهري من مفصليات الثلاثة وفصيلة القرصانيات
أنواعها المعروفة أربعة أعطانها أنهر وبحيرات المناطق
الاستوائية الامريكية || أجسامها مستطيلة الشكل،
متعددة الطول الذي يراوح من ٢٥ الى ٣٥ سم. رؤوسها
متوسطة الحجم. أشداقها رصية. أسنانها كبيرة، ذرية،
فردية الصف في الفكين. زعانفها الظهرية محدلة الخيم
يغلب فيها الشكل المربع. زعانفها الخوضية غليظة
الارتكاز، صغيرة القد، تقابل الظهرية. زعانفها
الذيلية مستقيمة الأطراف عند جميع الأنواع. أطوارها تزاوج
من الرتبة إلى النكحية. رؤوسها وفطورها أعين خطابا
من بطونها || لحونها متوسطة الصفت، مأكولة || أعرف
أنواعها وأشهرها مقردون ترانيرا (Macrodon trahira)
الذي يكثر وجوده في أنهر البرازيل والفويانا.

٢٧٣٣٩ - مَقْرَط Pincause-rogneuse (F).
أداة تستعمل لقطع سروع الكروية.

٢٧٣٤٠ - مَقْرَعَة Courgerie (F).
منبت القرع ويوضع زراعته.

٢٧٣٤١ - مَقْرَعَات Ascoceratidae (S).
Ascoceratidae (F). Ascoceratidae (E).
مجموعة من الرغويات تنتمي إلى رتبة رباعيات الخياشيم
ضفائلا وأجناسها وأنواعها كثيرة العدد جميعها من
متصغيرات الازمنة النائية.

٢٧٣٤٢ - مَقْرَنَس * Macrorrhinus (S).
Macrorrhine (F). Macrorrhinus (E).

جنس حيوانات لبونة مائية، من فصيلة الققييات.
أنواعها المعروفة قليلة العدد، أعطانها بعض مناطق المحيط
المحادي || أجسامها كبيرة القد. ذكورها أكبر من أنثاها
وأضخم. رأس الذكر عضوب القدّم، غليظ الشكل،
ينتهي بنظم اسحن فكه العلوي يشرف على اللسان. عنقه
وقوائم قصيرة || قشبا الاسماك والرغويات والقشريات.
الأنثى تقص جروا واحدا في العام || تعبد من أجل جلبوها
وزيوتها وضللها || أعرف أنواعها القرطاني والضيق
العلم.

٢٧٣٤٣ - مَقْرَنَسُ غِيرَهَامِي * Macrorrhinus leoninus (S).
Macrorrhine leonin (F).

نوع من المقرنيس. أعطانها مناطق جنوب المحيط المحادي.
طوله نحو ٩ أمتار. فوهه كسني اللون يبقى عند الظهر
ويصفر عند البطن.

٢٧٣٤٤ - مَقْرَنَسُ صَبَّحُ الخُطَم * Macrorrhinus angustirostris (S).
Macrorrhine à rostre droit (F).

نوع من المقرنيس. أعطانها مجامح المكسيك وكليفورنية.
طوله نحو سبعة أمتار. فوهه إلى الجوف السفلاء المواجه
تتبع عند الظهر وتضفر وتبتر عند البطن.

٢٧٣٣٧ - مِقْصَصَة * Ratissoire (F).
Scraper (E).
نصل عريض قاطع مركب حل حضا تحط به الأقدار
والأصابع.

٢٧٣٣٨ - مِقْدَفُ خَارُجِي * Exopodite (F).
المقدف الخارجي، جزء مفصل من الفك
مركزي في الجانب الخارجي من المرفقة حيث يشرف على
الركبية || والمقدف الخارجي، زوولوجيا، جزء من
زوائد المفصليات يملأ، مع المقدف الداخلي، القسم
القاعدي.

٢٧٣٣٩ - مِقْدَفُ دَاخِلِي * Endopodite (F).
المقدف الداخلي، زوولوجيا، جزء من زوائد المفصليات
يملأ القسم القاعدي.

٢٧٣٤٥ - مَقْدَمُ الإِرْت Avancement d'hoirie (F).
هو التبرع لاحد الوترة الإستانلين بجزء من نصيبه
تركة التبرع.

٢٧٣٤٦ - مَقْدَمُ الجِمَم * Avant-main (F). Fore hand (E).
في الخيل والنام وما أشبه.

٢٧٣٤٧ - مَقْدَمُ الجَوْشَن Prothorax
هو في الحشرات القسم الأول من الجوشن أو الحلقة
الصدرية الأولى.

٢٧٣٤٨ - مَقْدَمُ المِحْرَات * Avant-train (F). Wheels (E).
أجزاء الامامي من المحرات حيث يوجد التناظم والتبديلان.

٢٧٣٤٩ - مَقْدَمَات * Primates
هي الرئيسات، رتبة من الثدييات تشمل مراتب البشرات
والقرديات والليموريات.

٢٧٣٥٠ - مَقْدَمُورُ القِسْمَة، قَابِلُ القِسْمَة، مَقْسِم Divisible
هو ما كانت قسمته جائزة.

٢٧٣٥١ - مَقْدَمُوتَس * Persil (F).
نبات بقلي مشهور باسم بقندوس، أعليته.

٢٧٣٥٢ - مَقِير * Amer (F). Bizar, Harsh (E).
مقر الشيء: صار مرأ فهو مقر.

٢٧٣٥٣ - مَقِير * Aloes (F).
هو الألوة، نبات صنائي وزخني.

٢٧٣٥٤ - مَقِير * Acaule (F). Acaulous, Stemless (E).
النبات العديم الساق ويعدى أيضا نجمة.

٢٧٣٥٥ - مَقِيرَاسُ، مِقْرَاكَة Réfrigérateur (F).
Refrigerator (E).

٢٧٣٥٦ - مَقِيرَاسُ * Greffoir (F).
Grafting-knife (E).
سكين خاصة منقطة الطرف تستعمل في التطعيم.



مِقْصَصَة



مَقْرَأَس




مَقْرَعَة



مَقْرَنَس



مَقْرَنَسُ شَرْهَامِي



مَقْب



مَقْب



مَقِي



مَقْل

Cotonnerie (F). **مَقْنَنَة** - ٢٧٣٦٣
Cotton-plantation (E).
الأرض التي تزرع فيها القطن . ج مقطن .

Chapon (F). Capon (E). **مَقْفُوش** - ٢٧٣٦٤
هو الطير أي فرخ الدجاج الحضي . ج مقافيش .

Tronqué (F). Truncate (E). **مَقْفُوم** - ٢٧٣٦٥

Epicyrus (S). Epicyrte (F). **مَقْطِي** * - ٢٧٣٦٦
جنس اسماء نهرية من مفتوحات القناة وصيد السمكيات.
أنواعه المعروفة قليلة العدد . أصلها بعض أنهر البلاد
الحارة الآسيوية والأمريكية || أجسامها اهليجية مبطنة
تطول من ٣٠ الى ٥٠ سم . رؤوسها مستطيلة . قصيرة .
عينها كبيرة جاحظة . أشفاتها رحيبة . ظهرها ربيعة .
مقمنها يشرف على الرأس . تتميز بزغاتها الترسجية
المستطيلة وبالظهريّة الثلاثية العدد المتطابقة الحجم . أذواها
الى الريكة يملؤها مزاج نقي || غوبها مأكولة .

Alois (F). **مَقْعَدَان** - ٢٧٣٦٧
هو الآلة والقر .

Gibbeux (F). Gibbous (E). **مَقْعَر** - ٢٧٣٦٨
نعت تعريفي توصف به الأشياء المقعرة السطوح ومنها
الأوراق والأجزاء .

Concaville (F). **مَقْعَر الْأَطْرَاف** - ٢٧٣٦٩
Concaviline (E).
نعت تعريفي وصفي يستعمل في تصنيف النواصير أصحها
الحبل والأبقار . ويكون مقعر الأطراف ذا جهة مقعرة
وسجاج بارز وكفل منحني الخ...

مَقْل * - ٢٧٣٧٠
Balsamodendron africanum, Haudelotia africanum
(S). Balsamé d'Afrique, Arbre à baume (F). Bal-
samodendron krs, Bdellium tree (E). Afrikanischer
Balsambaum (D). Albero balsamo d'Africa,
Bdelio (I).
نوع من البلسان وفصيلة البخوريات ، منته البلاد الأفريقية .
يكثر في تمام حوض البحر الاحمر . شجرته متوسطة القد
فرعاه . أوراقه مركبة ثلاثية الوريقات البيضية الشكل
المغطية الاطراف . أزهاره فردية محورية رباعية التركيب .
ثمارة جرداء رباعية القلق . يستخرج من ساقه عصارة
ورائجة بخورية فائضة الصفن ويستعمل من زهره صلب
حزري .

Marrube blanc (F). **مَقْل الصَيْف** - ٢٧٣٧١
هو القراسيم الأبيض . أصله .

Bdellium Indicum (S). **مَقْل الْبَهْد** - ٢٧٣٧٢
Balsamé de l'Inde (F). Indian bdellium tree, False
myrrh, gale (E). Indisches Bdelliumbaum (D).
Bdelio (I).
نوع من البلسان وفصيلة البخوريات . يكثر في بعض
الاسواق الهندية . شجرته صغيرة القد . أوراقه مركبة
ثلاثية أو خنسية الوريقات . أزهاره رباعية التركيب
قوادة العرف || يستخرج من ساقه عصارة رائجة بخورية
تستعمل في المايه ويستعمل من أزهاره دهن عطري
مغروب فيه .

Malaxage (F). **مَقْس** - ٢٧٣٤٥
Kneading, Working (E).
مقس الزبدة بعد فصلها عن الخيض وعلفها لتجانس
أجزائها بعد طرد الهواء منها .

Sébastien (F). **مَقْسَاس** - ٢٧٣٤٦
هو الديق ، شجرة حرجية صناعية .

Crémomètre (F). **مَقْسَاد** - ٢٧٣٤٧
Crémometer (E).
مقياس القشدة .

Ebouguse (F). **مَقَشَر** - ٢٧٣٤٨
آلة تنزع القشور الشائكة التي تطفل ثمار الكستنا .

Décortiqueur (F). **مَقَشَرَة** - ٢٧٣٤٩
Disbarbed (E).
أداة من حديد تستعمل في تنظيف سوق بعض الأشجار
من القشور اليابسة .

Sécateur (F). **مَقْصَ الْبُسْتَانِي** - ٢٧٣٥٠
Pruning-shears (E).
مقص البستاني . ومقص التقليم ومقص الشجر والمقراض
واحد .

مَقْصَ الْخَضِير هو المبر ، أصله . - ٢٧٣٥١
Cannse, Roselière (F). **مَقْصَبَة** - ٢٧٣٥٢
Cane-plantation, Reed-bed (E).
كل مكان زرع فيه القصب بكثرة أو ليت طبييا .

Faux (F). Scythe (E). **مَقْصَب** * - ٢٧٣٥٣
أداة كالسجل كبيرة الشفرة المستطيلة تستعمل في الحصد
والخش .

Luzernière (F). **مَقْصَبَة** - ٢٧٣٥٤
Lucerne-field (E).
الكان الخصص لزراعة القصب أي القصة .

مَقْط - ٢٧٣٥٥
عيط يصاد به الطير .
Colportage (F). Hawking (E). **مَقْط** - ٢٧٣٥٦
هو بيع التجوال .

Multipolaire (F). **مَقْطَاب** * - ٢٧٣٥٧
Multipolar (E).
كثير الاقطاب .

Microtome * ، **مِقْطَاع** * ، ميكروكوم - ٢٧٣٥٨

Distillerie (F). **مِقْطَرَة** * - ٢٧٣٥٩
Distillery, Still-house (E).
صناعة التقطير وسبل انتاجه .

Section **مِقْطَع** - ٢٧٣٦٠
Soc (F). Ploughshare (E). **مِقْطَع** - ٢٧٣٦١
جزء رئيسي من المحراث مكانه وراء السكين وظيفته قطع
كتلة التراب انقيا .

Griffe (F). Root (E). **مِقْطَم** - ٢٧٣٦٢
القطم ج مقاط : هي الفروع الناشئة من أروية الخليلين
وأشباذه من النبات .

Lippe (F). **٢٧٢٨٥ - مَقْتَمَة ، مِقْتَمَة**

Thick lower lip (E).
هي الحمة أي شفة الحيوانات الهيمّة كالإبقار والأغنام وللماعز .

Patte (F). Paw (E). **٢٧٢٨٦ - مَقْتَب**

كف الإسد ، غلب الإسد في مقبّه . ج قنوب .

Chènevière (F). Hemp-field (E). **٢٧٢٨٧ - مَقْتَبِيَة**

مزدرع القنب منها اتسع .

Mimule (F). **٢٧٢٨٨ - مَقْتَبِيَة**

هي الدنلد ، أطلية .

Calyptraes (S). **٢٧٢٨٩ - مَقْتَبِيَة ٥**

Calyptrée (F). Calyptraes (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مئبلات الأربيل وسيدات الأجهزة وصفيحة القروحيات . الأنواع المعروفة عديدة بعضها من متحشرات الطبقة الطباشيرية والثالثة والبعض الآخر معاصر منتشر في جميع بحار العالم ، جميع أنواعها تحفر الشلق على الصخور ملحوظاً بأرجلها ٥ أصدانها يرمية الشكل . رؤوسها قصيرة مغلقة المقدم . أقوافها مستديرة . لواسها مسطيلة . عيونها صغيرة قاعدية . غشائيمها حلبيّة الشكل ، قاسية .

Miconia (S). Miconie (F). **٢٧٢٩٠ - مَقُونِيَة**

Indian bush (E). Miconie (D). Miconia (I).
جنس أشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة القترانيات . أنواعها زهاء ٥٥٠ جميعها من نباتات المناطق الاستوائية . أوراقتها لا قياسية الشكل والترتيب . أزهارها أبطية وطفرة الأريكتاز . محارها حلبيّة مستديرة قاسية القشور . منها أنواع حمية . أوراقتها عطرة تستعمل استعمال الشاي ومنها بطية يمتصون محارها في معالجة حلى المرارة . ومنها صناعية صباغية غشايها أصفر اللون جيد الصنف .

Licol, Licou (F). Heiter (E). **٢٧٢٩١ - مَقُونَد**

أداة من جلد أو حبل تستعمل لقيادة الدواب .

Starter **٢٧٢٩٢ - مَقُونَس**

حبل تصف عليه الخيل عند السبال . ج مقاروس .

Bouleté, Juché (F). **٢٧٢٩٣ - مَقُونَس الحَقْوَشِب**

Upright on fedlock-joint (E).
تقويس في حوشب القرس يستمر من حوشب الخيل القاصصة .

Arqué, Brassicourt (F). **٢٧٢٩٤ - مَقُونَس الرَكْبَة**

Bandy-legged, Knee-sprung, Arched (E).
نعت يوصف به القرس المقوس الركبّة طبيعياً لا من مرض ولا عن هرم .

٢٧٢٩٥ - مَقُونَس

وطائر معروف مغلق سواده في البياض كالحمام . (الجاسط) .

Machon (F). **٢٧٢٩٦ - مَقُون**

فراشة من المذانيات ، يرتقا تمش على أوراق الجزر والشيار . راجع مذئاب مقون .

٢٧٢٧٣ - مِقْلَاب ٥ ، دَالِرَة الانقلاب

Tropique (F). Tropic (E).

المقلاب أو دائرة الانقلاب الحزام القائم بين دائرتي الانقلاب الصيفي والشتوي أي دائرة السرطان ودائرة الجدي .

Tropical (F). Tropical (E). **٢٧٢٧٤ - مِقْلَابِي ٥**

نعت تعريفية يطلق على كل ما له صلة بالمقلاب كدورق المناخ المقلابي والأمطار المقلابية والمنطقة المقلابية وهي أحر مناطق الكون .

Atmomètre (F). **٢٧٢٧٥ - مِقْلَاص ٥**

Atmometer (E).
جهاز خاص تقاس بولسته مقادير سوائل تبخرت في مدة معينة .

Versoir (F). Mould-board (E). **٢٧٢٧٦ - مِقْلَب**

جزء المحراث الذي يقبب كتلة التراب بعد أن يقطعها المقطع .

٢٧٢٧٧ - مِقْلَبِي ٥ ، تَمَقْلَب ٥

Tropicalisation (F).
المقلبة جعل المواد والاوزام الصناعية وغيرها لا تتأثر بالمناخ المقلابي .

٢٧٢٧٨ - مَقْلَة القاصي ٥ ، يَطِيخ شَرَكِي

Melocactus (S). Mélocacta, Mélocactus, Melon-cardon (F). Melon-thistle, Turk's-cap cactus (E). Melon-enkaktus (D). Papone spinoso (I).
جنس نباتات لحمية شائكة من فصيلة الصباريات . أنواعه نحو ٣٠ منظرها تزييني . أصلها البلاد الحارة . سوقها بطيئة الشكل ، مخززة ، شائكة ، عادمة الورق . أزهارها أوصوصية الأريكتاز ، كبيرة القد ، جميلة القالب والألوان الأزاهي . ثمارها ، صنية حراء الكون ، ملساء البشرة .

Fauchard (F). Slash-hook (E). **٢٧٢٧٩ - مَقْلَد**

المنجل يقطع به القث والشب .

Carrière (F). Quarry (E). **٢٧٢٨٠ - مَقْلَع**

ويدهى الحجر والمقطع ، هو المكان الذي تستخرج منه الحجارة .

Déplantoir (F). **٢٧٢٨١ - مَقْلَع**

Garden-crowel (E).
أداة تستعمل للتع النباتات الصغيرة مع ثي من التراب يحفظ شروشها ديباً تنرس في مكان آخر .

Dégazonneuse (F). **٢٧٢٨٢ - مَقْلَعَة الخَصِير**

Unturfier (E).
محراث مقلع للمقطع الرعيف القصير ، له سكينان ، يستعمل في اقتلاع الخضر .

Conserves (F). **٢٧٢٨٣ - مَقْلَعَات ٥**

Conserves, Preserves (E).
هي الاطعمة المحفوظة المقطوع منها الهواء . ويهتم من سائما معلبات . ويدهن سائما ، في مصر ، الكنسرة والكنسرات .

٢٧٢٨٤ - مَقْلَم

تضيب الثود والتيس وأجلد . والمقلعة : وهاء التضيب .



مَقْلَة القاصي



مَقْلَة

٢٧٤١٠ - مِقْيَاسُ الْغُلُوكُوزِ ، مِيزَانُ الْغُلُوكُوزِ

Pèse-mûlt, Glucomètre, Glucomètre (F). Glucometer (E).

أداة تقاس بها المواد السكرية في عصير العنب أو في الخمر .

٢٧٤١١ - مِقْيَاسُ الْغَلْيَانِ

Ebullimètre, Ebulliscope (F). Ebullimeter (E).

جهاز يمكن من معرفة درجة الحرارة اللازمة لغلان كل جسم أو مائع .

٢٧٤١٢ - مِقْيَاسُ الْقَشْدَكَةِ ، مِيزَانُ الْقَشْدَكَةِ

Butyroscope, Crémomètre (F). Creamometer (E).

هو المكتأة ، أداة تقاس بها نسبة القشدة في الحليب .

٢٧٤١٣ - مِقْيَاسُ الْقُوَّةِ

Dynamomètre (F). Dynamometer (E).

هو للمنشاط ، أطلبه .

٢٧٤١٤ - مِقْيَاسُ الْكُحُولِ

Pèse-aspirits (F).

هو للمكحال ، أطلبه .

٢٧٤١٥ - مِقْيَاسُ الْكِلْسِ

Calcimètre (F). Calcimeter (E).

هو للمكلاس ، جهاز يبين مقدار كربونات الكلس في التراب .

٢٧٤١٦ - مِقْيَاسُ الْكَلَسِ

Glossomètre, Glottomètre (F). Glossometer (E).

هو للمسان ، جهاز يقاس به غرطوم النمل لصفة الانواع الاصلح من غيرها في أرشاش رسيق الزهر .

٢٧٤١٧ - مِقْيَاسُ الْقَلْوَنِ

Colorimètre (F). Colorimeter (E).

هو للملوان ، جهاز يقاس به مقدار تلوين السوائل والمائات لا سياً الخمر ، أطلب ملوان .

٢٧٤١٨ - مِقْيَاسُ مِثْوِيٍّ

Centésimal (F). Centesimal (E).

٢٧٤١٩ - مَقْيَرٌ ، مَقْيَرٌ

Makaira (S). Makaire (F).

جنس اسمك بحمرية كبيرة اللقد من ثنائيات الزصائف فضيلة الاقترينات . انواعها المعروفة ثلاثة جميعها قريبة الشيء من مياث البحر ، اشهرها المقير الاسود الذي لا يقل طوله عن اربعة امتار وهو يتميز بكثر زعنفة الظهرية التي تشبه للشرائح وبجهازه المظلي الذي يمتد من فكه الاصل على شكل السيف .

٢٧٤٢٠ - مِقْيَافٌ

Ehretia (S). Ehredia,

Cabrillet (F). Ehretia (E). Ehretia (D). Ehretia (I).

جنس اشجار وبخيرات من فصيلة الحمصيات . انواعه نحو ٦٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والاستوائية . اوراقها متعقبة ، متعاقبة او متناوبة . ازهارها عسكوكية للتجميع ، ابطية الارتكاز وطولية . ثمارها مأكولة لكنها تقهه وهي نورية ، حلوة ، قدرها قدر الحمصة الكبيرة || اشهر انواعه ما يلي .

٢٧٤٢١ - مِقْيَافُ كَبِيرِ الْوَرَقِ

Ehretia macrophylla (S). Ehretia à grandes feuilles, Cabrillet à grandes feuilles (F).

نوع من المقياف ، ثمرته سبروتية تظل من ٥ الى ٨ امتار .

Mucuna (S).

Mucuna, Pois à gratter, Pois poulilleux (F). Cowitch, Cowage (E). Jackfasel, Steechende Echte Fasel (D). Fagiolo di Nero (I).

جنس نباتات عارضة من فصيلة البقوليات القرشائية . انواعها نحو ٢٥ ، اعطائها البلاد الاستوائية والحارة . سوقها لولية التريش ، سواقلها ثنائية ، اوراقها مركبة ، طويلة الزناد ثلاثية الوريقات . ازهارها كبيرة اللقد حمراء اللون ، سنفاتها مملطسة عميقة مستطيلة الحدية الطرفية الشائكة . بزورها مستديرة ، مبطلة ، هلبة البثرة ، تغفل عند لسها ما يفتح القراس .

Echelle, Mesure (F).

Ladder, Scale (E).

٢٧٤٢٢ - مِقْيَاسُ إِعْتِمَارِ اللَّبَنِ ، مِضْرَابٌ

Lacto-fermentateur (F).

أداة تدرف بوساقتها جودة اللبن . اسماها ان الحليب الرديء يربوب قبل الحليب الجيد في سؤارة معلومة .

٢٧٤٢٣ - مِقْيَاسُ الْأَدْهَانِ

Oléomètre (F). Oleometer (E).

أداة تقاس بها كثافة الادهان وتسمى مدخان .

٢٧٤٢٤ - مِقْيَاسُ الْأَسْتَوَاءِ

Niveau (F). Level (E).

هو القادان ، أطلبه .

٢٧٤٢٥ - مِقْيَاسُ الْأَشْعَةِ

Actinométre (F). Actinometer (E).

آلة تقاس بها قوة الاشعة لا سياً الاشعة الشمسية .

٢٧٤٢٦ - مِقْيَاسُ الْأَمْلَاحِ

Pèse-sels (F). Araeometer for salt liquids (E).

ستكشف يبين بصرمة درجة كثافة الاملاح .

٢٧٤٢٧ - مِقْيَاسُ الْجِبْرِ

Gypsomètre (F). Gypsumeter (E).

هو المقياس ، أداة تستعمل لقياس كبريتات البوتاس في الخمر .

٢٧٤٢٨ - مِقْيَاسُ الْخَبَبِ

Aphromètre (F). Aphrometer (E).

هو للمفقاع ، جهاز يقاس به ضغط الغاز الكربوني في قناني الخمر التؤارة .

٢٧٤٢٩ - مِقْيَاسُ الرُّطُوبَةِ

Hygromètre (F). Hygrometer (E).

هو المرطاب ، أطلبه .

٢٧٤٣٠ - مِقْيَاسُ السُّوُوحِ

Planimètre (F). Planimeter (E).

هو المساطح ، أطلبه .

٢٧٤٣١ - مِقْيَاسُ السُّكَّرِ

Saccharimètre (F). Saccharimeter (E).

هو المسكار والمسقار ، أداة تبن مقدار السكر المذاب في السائل المقصود .

٢٧٤٣٢ - مِقْيَاسُ الشَّجَرِ

Dendromètre (F). Dendrometer (E).

هو للشجار ، أداة تستعمل لتقدير طول الشجرة وحجمها .



مقونة



مقيز

Imperméable (F).

Impermeable, Impervious (E).

صفة التربة التي تملك الماء .

Acquis (F).

Acquired, Secured (E).

نمت تعريفى تمت به الصفة المكتسبة من الحيوان او النبات حسنة كانت ام سيئة . وكلمة مكتسب هي نقيض علي اي فريقي .

Acquies (F).

An acquisition (E).

هي الاموال التي يكتسبها الزوجان في اثناء الزواج .

مِفْيَت مُدْبِب الْوَرَق - مِكْتِيل ، سَلْ

Vendangeoir, Vendangerat (E). Grape-basket (E). وعاء ينقل فيه العنب من الكرم الى المصرة .

Bréviligne (F). Breviline (E).

لمت تصغرت يطلق على الحيوانات القصيرة الجال المحكي بالنسبة الى متوسط جال نوعها او سلالته .

Enclave (F).

Enclave, Gore (E).

كل ارض لا طريق لها ، واقتانون يعطي صاحبها حق المرور .

Mycterus (S).

Myctère (F). Mycterus (E).

جنس حشرات من فصيلة السليبيات ورتبة خمديات الاجنحة . انواعها المعروفة سبعة منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة والباردة || اجسامها صغيرة ، اعليجية الشكل ، تطول من ٦ الى ١٠ سم . رؤوسها صغيرة ، مستطيلة الاعظام . هيئتها بارزة . تقشيرها وفكوكها وملابسها نظامية . قرونها الاستشارية ثلاثية . كواسلها معدنية . احمادها لاحقة . قوائمها نشطة . اوتواها وسيدة اللون ، تكثر فيها السمرة الفحمة والجلوة . كواسلها واحمادها مغلقة بحبل دقيق اشبه اللون او اخضر . تألف الحواجر والباراري والحدائق . جميعها واسعة ، اما البرقة فنادية .

Mycceria (S). مِكْتِير ، شَيْبِرُو

جنس طير من اللقائ ، انواعه المعروفة ثلاثة : المِكْتِير اِفْرِيقِي والامريكي والاسرائلي . جميعها كبيرة القد ، تتميز بمنقارها اللظيفة المستطيلة المرسومة القاعدة . اجنحتها رافعة . اذناها قصيرة مربعة . ارساغها رفيعة . اصابعها كبيرة القد صغيرة الخطاب والخال || اعرف انواعه واشهرها المِكْتِير اِفْرِيقِي .

مِفْيَت مُدْبِب الْوَرَق - مِكْتِير اِفْرِيقِي ، مِكْتِير السِّنْفَال ،

لَقْلَق مَسْرُوح السِّنْفَال ، اَبُو مَيَّة ،

مِفْيَت مُدْبِب الْوَرَق - مِكْتِير اِفْرِيقِي ، مِكْتِير السِّنْفَال ،

مِفْيَت مُدْبِب الْوَرَق - مِكْتِير اِفْرِيقِي ، مِكْتِير السِّنْفَال ،

مِفْيَت مُدْبِب الْوَرَق - مِكْتِير اِفْرِيقِي ، مِكْتِير السِّنْفَال ،

مِفْيَت مُدْبِب الْوَرَق - مِكْتِير اِفْرِيقِي ، مِكْتِير السِّنْفَال ،

مِفْيَت مُدْبِب الْوَرَق - مِكْتِير اِفْرِيقِي ، مِكْتِير السِّنْفَال ،

مِفْيَت مُدْبِب الْوَرَق - مِكْتِير اِفْرِيقِي ، مِكْتِير السِّنْفَال ،

مِفْيَت مُدْبِب الْوَرَق - مِكْتِير اِفْرِيقِي ، مِكْتِير السِّنْفَال ،

مِفْيَت مُدْبِب الْوَرَق - مِكْتِير اِفْرِيقِي ، مِكْتِير السِّنْفَال ،

اسطوانة فسيحة الارباع تمتد من الخند الى اليا بان . ساقتها اسطوانية . فرووها مضغلة زياء اللحاء . اوراقها متماقية ، بيضية ، مقطوعة الطرف ، تطول نحو ٢٠ سم . ازهارها بيضاء اللون . ثمارها مأكولة .

مِفْيَت مُدْبِب الْوَرَق - مِفْيَت مُدْبِب الْوَرَق

Ehretia acuminata (S). Ehrelio à feuilles acuminées, Cab. illet à feuilles acuminées (F).

نوع من المقيف وهو شجرة جادة تطول من ١ الى ٦ امتار . مهددا الخند . ساقتها وفروعها اسطوانية ملسة . اوراقها متعاقبة ، سنانية الشكل ، ذرية وبديية . نصلها يطول من ١ الى ١٠ سم . ويبرس من ٢ الى ٤ سم . وهو مستطيل البتق ، مستن الحافة ، لامع الصفحة || ازهارها بيضاء اللون . ثمارها مأكولة .

Emétique (F). Emetic (E).

هو جسر القزح اي الارنب البري ونحو . ج امكاه .

Terrier (F).

Burrow, Hole (E).

هو جسر القزح اي الارنب البري ونحو . ج امكاه .

Lepidium meyenii (S). Maca (F).

نبات حولي يقل من فصيلة السليبيات . مهدد بعض مرتفعات جبال الاله الامريكية . ساقه لغتية الشكل ، والقد ، مأكولة . اوراقه قوسية الانتساب ، مركبة ، ورشية . شمرانه الزهري يطول نحو ٤٠ سم . ازهاره حشوكي . ازهاره صغيرة القد ، وردية اللون . غريثاته بحيلة مستطيلة . يزوره كروية دقيقة || يتكاثر بالبر . منته الاقاليم الجردية . يرغ في الازرة الحارة الوفرة العناصر الغذائية .

Certhilauda (S). Sirli (F).

Bifasciated lark (E).

جنس طير من فصيلة القتريرات . انواعها ستة ، بعضها صحراوي وبعضها من طيور الشرق الادف واروبة ولسا جميعها تصيد في الجو ويهوي وهي في ذلك تمكو وتصفر . اجسامها صغيرة القد تطول من ٢٢ الى ٢٤ سم . اوتواها متعادلة الاوان يكثر فيها الانسراج والاضطل . صدورها مشوشة . احناها بيض . منقارها قوية مستطيلة منقروة الطرف . خالها نشيطة ، حادة الاظافر ، تمكها من استنار التربة || تألف الغياب والاراضي الملساة . قوتها الحشرات والبرور البرية || تلتش عنها في افصوص بين الدغال والحش . حشيتها حولية تتألف من ٤ او ٥ بياض تحشها بمناوبة الاكر .

Emoluments (F).

Remuneration (E).

هي ما يمنح من توفيس من القيام بأمد لتأدية .

Moelle (F). Pith (E).

القسم الداخلي المركزي من ساق النبات .

Médullaire (F).

Medullary, Medulla (E).

Presso (F).

Pressure, Throng (E).

آلة خاضعة مختلفة الاشكال والاجسام تستعمل في عدة صناعات لغايات معينة .



مكا



مكا



مكير



مكير افرقي



مِكْنَاة



مِكْنَال



مِكْنَال الحمر



مَك



مَكْرَة مَبُولَة



مَكْرُور نَفِي



مَكْرُور مَبُول

القائمة ذوب الزام الاخير، يبدو احمر اللون ويستقر حل
الخضار البحري تملوه حلة كثيفة . بتلات ازهارها صغيرة
ضخمة تطول نحو ٢ سم. ثمارها حامضة لا تتوكل .

٢٧٤٥٤ - مَكْرَة مَبُولَة * ، بُشْمَلَة

Amelanchia rotundifolia, *A. vulgaris* (S). *Amélan-*
chier commun (F). *Savoy medlar*, *Service-berry* (E).
Felsenbeer, *Felsenbirne*, *Gemeine Felsenbeer*,
Traubenbirne (D). *Aronia* (I).

نوع من المكر وهي جنبة مبدولة تطول من ١٠٠ الى
٢٠٠ سم. اوراقها فضية مستديرة الطرف تطول نحو
٤ سم. وتعرض نحو ٣ سم. نصلها يبدو قطبي الصفعة
السفل ثم يستقر حل الحسلة. بتلات ازهارها خلية البشعة .
ثمارها سكرية الطعم مأكولة قطرها نحو ١ سم.

٢٧٤٥٥ - مَكْرَة يَابَانِيَّة

Amelanchia asiatica (S). *Amélan-*
chier du Japon (F). نوع من المكر وهي شجرة دائمة
الخضرة متوسطة القد تطول من ٥ الى ١٢ م. اوراقها
ستانية ، نصلها حلي الصفعة مسنن
الحافة بطول نحو ٧ سم. ويمرض نحو ٤ م. بتلات
ازهارها قدية الشكل خلية الصفعة الخارجية . ثمارها
سكرية الطعم مأكولة قطرها نحو ٢ سم.

Carlisle (S). **مَكْرُوكَة** *
Cherry-orchard (E). هي مزرع الكرز .

٢٧٤٥٧ - مَكْرُوكُوم السُفْل

هو زعفران السفل ، اطليه .

٢٧٤٥٨ - مَكْرُور

Macrusa (S).
Macroure, *Lépidolèpre*, *Grenadier* (F).
Macrusa, *Rat-tail* (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة المَكْرُورِيَّات . انواعه
المبرقة ثمانية منتشرة في معظم بحار المناطق الحارة . جميعها
مستطيلة الاضطام اللالفة ، قصيرة الاشداق السفلي ،
كبيرة العين الجاسقة ، مستطيلة القدم ، مستديرة المؤخر
المامد الزنفة . سهلها مثلث الزوايا ، مستطيل الطرف
الشائك || اشهر انواعه المَكْرُور المبدول والقفهي .

٢٧٤٥٩ - مَكْرُور لَفِي

Macrusa trachyrhynchus (S).
Macroure argenté, *Lépidolèpre argenté* (F).
نوع من المَكْرُور يكثر وجوده قرب الساحل الافريقي
في البحر المتوسط والخليج الاطلسي . طوله نحو ٤٠ سم .
ثوبه الى الطحلة النفسية المواج يقيم مع اقترابه من الظهر
ويبيض عند البطن . لحمه متوسط الصنف مأكول .

٢٧٤٦٠ - مَكْرُور مَبُول

Macrusa calcarhynchus (S). *Macroure commun* (F).
Lépidolèpre commun (F). *Common Rat-tail* (E).
نوع من المَكْرُور يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط .
طوله نحو ٣٠ سم . ثوبه الى الريدة البنفسجية المواج يقيم
عند الظهر ويميل الى الفضي عند البطن . لحمه متوسط
الصنف مأكول .

٢٧٤٦١ - مَكْرُورِيَّات

Macrouridae (S). *Macrouridés*, *Macruridés* (F). *Macrouridae* (E).
فصيلة اسماك بحرية من المملسات شالكات الزعانف .
اجناسها وانواعها متوسطة البدن . اطرافها بحار المناطق

سواء . اساقه الى الكعبة الباقية يطولها مواج احمر || يعيش
ذكراً وانثى لا يفترقا . يأنث مجاري للماء وعضلات الأخرى
وشواطئ البحر . قوته الخشرات والنظام والحيات والاسماك .
يتم في الانجاب . انتفا تحسن اربع بيضات .

٢٧٤٦٠ - مِكْنَاة *

Crémomètre (F).
Creamometer (E).
اداة تقاس بواسطتها نسبة القشدة في الحليب .

٢٧٤٦١ - مِكْنَال

Densimètre (F).
Densimeter (E).
اداة تستعمل لخدمة الثقل النوعي في كل جسم .

٢٧٤٦٢ - مِكْنَف

Condenseur (F). *Condenser* (E). **مِكْنَفَة** *
Condensateur (F). *Condenser* (E).

٢٧٤٦٤ - مِكْنَحَال

Alcoolomètre (F).
Alcoholometer (E).
هو ميزان الكحول ، جهاز يقيس في السائل الكحولي
ليبين نسبة ما يجره من كحول .

٢٧٤٦٥ - مِكْنَحَال النَمْر

Vinomètre, *Vinoscope* (F). *Vinometer* (E).
جهاز يستعمل لقياس درجة الكحول في الخمر .

٢٧٤٦٦ - مِكْنَمَلَة

Jacinthe muguet (F). نبات زينة يلقى جانبا شرقى ، اطليه .

٢٧٤٦٧ - مَكْد

Receau (F). *Rake* (E). اداة تستعمل لتطهير التربة .

٢٧٤٦٨ - مَكْدَس

Grange (F). هو السقيفة ، اطليه .

٢٧٤٦٩ - مَكْدَسَة

Botteuse (F). *Binder*, *Sheaf-binding machine* (E).
جهاز يدوي أو آلي يستعمل لكس اللش وانثى وما شبه .

٢٧٤٥٠ - مَكْر

Irriguer (F). *To irrigate* (E). مكر الارض : سقاها . امكروا الارض فها صلبة ثم
اسرفوها ، والمكرو هي السقية . ج مكر ومكرو .

٢٧٤٥١ - مَكْرَاكَة ، مَكْرُوكَة

Rectificateur (F). *Rectifying* (E).
جهاز خاص يستعمل لتكرير الكحول وذلك بإعادة
التقطير .

٢٧٤٥٢ - مَكْرَة

Amelanchia (S). *Amélan-*
chier (F). جنس شجيرات ويبنات برية ويزينية من فصيلة الورديات .
انواعها عديدة اعطائها بالأم . سرقها فراه . اوراقها بسيطة
عابطة ، نصلها كثيفة البروق . ازهارها عتقوي التجميع
محوري الارتكاز . ازهارها قليلة العدد مستطيلة البتلات
البشعة . ثمارها لوزية ، مستديرة القد ، بنفسجية اللون || اصرف
الواحد منها لي .

٢٧٤٥٣ - مَكْرَة كَنْدِيَة

Amelanchia canadensis (S). *Amélan-*
chier du Canada (F).
نوع من المكر وهي شجرة متوسطة القد تطول من ٥ الى ١٠
امتار . اوراقها مستطيلة ، نصلها يبيض الشكل قطبي

٢٧٤٦٨ - مَكْرُوبُورِيوم المُرَّ *
Macrophoma musae, Phoma musae (S).

وصم يسمي المُرَّ سببه فطر مجهري ركب الاوراق والثمار || مظهره الخارجي يقع مستديرة متنامية حنطية او سمراء اللون تقطع النصل من الضلع الى الحافة . وهو ان الثمار يقع سود صغيرة متنامية تشبه القشور دون ان تؤذي اللب || يكافح باستعمال سائل بورودو ويتغلغل سلائق الكيماة عند اكتمال امشاطها بالورق الابيض او المستعمل من اي صنف كان .

٢٧٤٦٩ - مَكْرُوبُورِيوم ٥
Mucron
من صغيرة بارزة مختلفة الاشكال ترتكز عليها يقص الاغصان الفطرية او النباتية كارتكازها على محور او على وثيرة . ج . مكان .

٢٧٤٧٠ - مَكْرُوبُورِيوم
Macronyx (F).
هو الرعدل ، الطليه .

٢٧٤٧١ - مَكْس ، جُمْرُوك
Douane (F).
Customs, Custom-house (E).

٢٧٤٧٢ - مَكْس المُرَّ
Péage (F). Toll (E).
رسم محدد تفرضه السلطة على كل شخص او سيارة تمر في مكان معين .

٢٧٤٧٣ - مَكْسَان ٥
Trigonocephalus piscivorus, *
Ancistronodon piscivorus (S). Trigonocéphale piscivore, Moccasin d'eau (F). Motton-mouth (E).

حية سرلودة سامة من الانواع الهوائية الاغادي . موطنها يشمل امريكا الوسطى والمكسيك . تألف صغاف مجاري الماء والمناقع والممرات || جسمها يطول نحو ١٥٠ سم . رأسها حرسائي الشكل . عنقها دقيق وذنبها كذلك . قريبة الشبه بالصنعية لكنها عادمة الجهاز الحركي والصوتي || تعتبر من الانواع الشرسة الخبيثة الشديدة الاذى .

٢٧٤٧٤ - مَكْسَحَة
Ratissoire (F). Scraper (E).
اداة يدوية تستعمل في تسوية التربة وتنظيفها من الاعشاب .

٢٧٤٧٥ - مَكْسُورِيَة الارنب
Myxomatose (F).
Myxoma (E).
تزيد حجروي يصيب الارنب فيعطى النسيج التي يتسخر فيها .

٢٧٤٧٦ - مَكْسُوف ٥
Thermoscope
محرار هوائي يستعمل في درس الفوارق الحرارية بين وسطين او يمتين .

٢٧٤٧٧ - مَكْسُوف الجلكة ، مَكْسُوف
Pagoscope
جهاز يدل على المقيم وهو من ادوات الهوائيات يستدل به على اماكن حصول المقيم ليزا . راجع مجلد .

٢٧٤٧٨ - مَكْشَط
Avant-soc, Rasette (F).
Tuning-knife (E).
قلعة من المخرات تتقدم السكة وتطبخها كشر التربة .

٢٧٤٧٩ - مَكْشَط ٥
Emoussoir (F).
Moss-scraper (E).
صفحة معدنية مسنة او قفاز من قريط يستعمل في كشط الطحلب عن الشجر .

الحارة . جميعها سامة تألف اللجاج ولها تقترب من الجاحد والسطوط || اجسامها شبه رحيمة الشكل ، مستنقة الاذيال الماعدة الزعانف . مخروطية الرؤوس الذلقة ، كبيرة البون المستديرة الجاحضة ، قصيرة الاذيال السفلى المنخفضة . حراشها مثلثة الزوايا ، مستنقة الاطراف الشائكة . زعانفها الفطرية والشرجية تمتد كالتناخس المتنامية القصيرة حتى اطراف الاذيال || اعرف اجناسها واظهرها المحرور .

٢٧٤٦٢ - مَكْرُوبُورِيوم ٥
Macrosporium (S).
جنس فطور مجهري من عارة الزايات وقصيلة للطحليات . كانت اقوامه فيا مضى عديدة ومختلفة الاشكال فأتى العلم الحديث ضرورة ابحاثها بالاجناس والاهارات التي تشبهها فلم يبق منها سوى النوع المعروف بمكروبوريوم الشام .

٢٧٤٦٣ - مَكْرُوبُورِيوم الشام ٥
Macrosporium cucumerinum (S).
فطر مجهري يتطفل على اوراق وثمار الثمام والبطيخ . مظهره الخارجي يقع صغيرة متراكبة سمراء اللون تملس الاوراق والثمار وتغطيتها بهالات متنامية هابطة اللون تسبب يباس التسج للثمارة ثم ذبول نصال الاوراق وتقريح قشور الثمار || يكافح بتطهير البذار قبل زروعه وفيه يحسن نضج المبطعة عند ظهور الموسم . بأحد املاح النحاس المركز او المحلول من ٥ الى ١٠ ٪ .

٢٧٤٦٤ - مَكْرُوبُورِيوم
Macrocyllis (S).
Macrostyle (F).
جنس شجيرات ونباتات برية ورييانية من فصيلة السلايات . مشهورة بازهارها المستطيلة الالام الرقيقة البات .

٢٧٤٦٥ - مَكْرُوبُورِيوم ٥
Macrophoma (S).
جنس فطور مجهري من فصيلة الصفيقيات . يتميز بكتائده المستطيلة القائمة ضمن بكتيدات مميكة الجول ، صبغة المقي الصغير || انواعه التي تهم الاقتصاد الزراعي قليلة ، اعرلها :
٢٧٤٦٦ - مَكْرُوبُورِيوم الشاي ٥

Macrophoma theicola (S).
لفطر مجهري يصيب الشاي في افناده واوراقه . مظهره الخارجي بفور قرصية مستطيلة تركب لاه الانداد خففي على تمها . ويقع حنطية تصيب نصل الاوراق في زامها الاخير فتلوها || يكافح بتقليم الانداد الموصية ونضج الجنبات بسائل بورودو او بغيره من الفوطاير الفخرية .

٢٧٤٦٧ - مَكْرُوبُورِيوم القاصولي ٥
Macrophoma phaseoli, M. corchori, M. cajani, M. sesami (S).

فطر مجهري نام ، واسع الانتشار ، يوجد في جميع البلاد الحارة . يركب جلور وسوق ومجار حدة نباتات مختلفة اغصان القاصوليا والطنق والبطاطا الخلسرة والحنضيات والبن والكافور والبطاطا والسند || يصيب القاصوليا بجلورها وجنتها وساقها فيعفن الجذور والجنث ويمنطق الساق بنشاد ليد اسمر اللون || وهو على القطن عفن اسمر يركب الجذور ويقع قرصية لونها الى الجلوة تملو الساق فوق التربة || ومنسما يصيب البطاطا الحلية بحول كيانها الى مادة اسفنجية سوداء اللون || وهو في الحنضيات عفن اسود يركب الجذور ووصم على لسان السوق فيسبب جفافها وانسدادها ورنج صبارة صفية تفقد الشجرة بعض حيوتها وتذويها نحو القحمة || يكافح باستعمال اسود الفوطاير الفعالة غير المركزة على النحاس .



مكروبوريوم الشام



مكروبوريوم المُرَّ



مكان



مكشط



مكنانة مخزلية



مكرو



مكودة

٢٧٤٩٣ - **مِكْنَة الاسْتِرْدَاك** ، **حَبَار الاسْتِرْدَاك**
Faculté de rachat
هو حق ارتجاع المبيع بموجب شرط الفداء .

٢٧٤٩٤ - **مَكْنَس** ، **كِنَاس**
Retraite (F).
Retiring (E).
مولج الرشح من النطايه والبقير تستكن فيه من الحر .

٢٧٤٩٥ - **مِكْنَس**
Sorgho à balais (F).
نبات زراعي مشهور باسم ذرة المكاس .

٢٧٤٩٦ - **مَكْنَسَة الْأَنْدَر**
Molène blanche (F).
هي البوسير الأبيض ، اطليه .

٢٧٤٩٧ - **مَكْنَسَة الْجَنَة**
Kochie (F).
هي الحشم ، نبات تزييني جميل القالب والخضار .

٢٧٤٩٨ - **مَكْنَسَة السَّاحِرَة**
Balais de sorcière (F). Broom of the sorceress (E).
تعريف وصفي يطلق على اثنان متشابهة مريضة تكون في بعض الانجبار الثمرة والحرجية منها فطور مجهرية غطفة .

٢٧٤٩٩ - **مَكْنَسَة**
Mécanisation (F).
Mechanization (E).

٢٧٥٠٠ - **مَكْرِن**
Potentiel (F). Potential (E).
صفة القوة الكامنة .

٢٧٥٠١ - **مَكْرُو**
Terrier du lièvre (F).
Hole of the hare (E).
جحر القروح اي الارنب الوشي .

٢٧٥٠٢ - **مَكُونَة**
Manucodia (S).
Manucodia (F). Manucodia (E).
جنس طير من الجلائم وفصيلة الترزوويات . اذناه المرفوعة نحو ١٠ جميعها من طيور استرالية والجزر المجاورة . ملجها الحياتي جامي . جامعاتها متوسطة العدد . تألف الثبايات . قوتها الحشرات والثمار والبلور || اجسامها ريمية تطول من ٢٠ الى ٢٦ سم . اذولها قرابح بين الازرق والخضر والاسود جميعها سفاه المراج . رؤسها مكللة بريش نام صلب لونهُ مختلف من لون الرأس والوجه . اجنتها متدلة الحجم . اذناها مستديرة الاطراف . انثاها تتسلق بنس الاقواب || تدفن اعشاشها في الانجبار قرفيية . الاناث تحضن بمناوبة الذكور من ٤ الى ٦ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٥ يوما .

٢٧٥٠٣ - **مَكُونَة**
Limacoda (S).
Limacode (F). Limacoda (E).
حشرة من فصيلة المكوديات ورتبة حرشفيات الاجنحة . اصطلحتا بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تألف المراج التي تكثر فيها الانجبار الابيدة الازرق || جسمها صلب القند ، كثيف الخمل الناعم . بسطها نحو ٢١ مم . رأسها شبه مزاوي الشكل . صبيها صفتزان . خطها شديد القصر . ملمسها دقيقان ، مستطيلان . زياتها غيطيان . كوسلها متكاثف الخمل . يلقبها متراكب السهف والخمل || سرقها قريبة القبة بالخلازير وتنتقل ببطء مثله . وهي غاصلة تعيش على اوراق السديان وغيره من الانجبار الابيدة .

٢٧٤٨٠ - **مَكْمَب**
Cube (F). Cube, Cubic (E).

٢٧٤٨١ - **مَكْمَبِي**
Cuboïde (F). Cuboid (E).

٢٧٤٨٢ - **مَكْمَبَر**
Cumulo-nimbus
هو الركام ، نوع من الغيوم ، اطليه .

٢٧٤٨٣ - **مَكْمَلَص**
Calcmètre (F). Calcmeter (E).
هو مقياس الكلس ، جهاز يبين مقدار كربونات الكلس في التراب .

٢٧٤٨٤ - **مَكْمَلَف** ، **مَعْمَدُ لَه**
Grevé (F).
Burdened, Encumbered (E).

٢٧٤٨٥ - **مَكْمَلُورَة**
Maclure (F).
هي الفانة ، ثمرة فراج من القراصيات .

٢٧٤٨٦ - **مَكْمَلَة**
Truffière (F).
Truffie-ground (E).
ارض تثبت الكم ويستنبث الكم .

٢٧٤٨٧ - **مَكْمَلَة** ، **مَخْتَالَة**
Butteuse, Burtoir (F).
Ridging-plough (E).
محراث خاص يستعمل لكم اي تخسيس المزروعات التي تتطلب هذه الحالة .

٢٧٤٨٨ - **مَكْن**
Œufs d'insectes (F).
Eggs of the insects (E).
المكن هو بيض الحشرات . الراجعة مكنة .

٢٧٤٨٩ - **مَكْنَان**
Oryssac
جراب المكن في بعض الحشرات وقد يكون في الباطن أو شربتي الانكاز .

٢٧٤٩٠ - **مَكْنَانَة** ، **مُدْرَة**
Galaga (S).
Galaga, Lavanèse (F). Goat's rue (E). Geiss-raute (D). Galaga, Lavanese (I).
جنس نباتات عشبية رية حولية ومعمرة من فصيلة القرنيات الفراسية . انزاعها عديدة جميعها طليقة لتلطس اللد . اوراقها متعاقبة ، مركبة ، ريشية ، وريية . ازهارها عتقودية التجميع ، ابطية الارتكاز ، زرقاء اللون أو بنفسجية || اشهر انواعها ما يلي .

٢٧٤٩١ - **مَكْنَانَة شَرْقِيَّة**
Galaga orientalis (S).
Galaga oriental (F).
نوع من المكناة وهي عشبة معمرة مبلولة تطول من ٦٠ الى ١٢٠ سم . ارضها مدادة . ساقها فراج خلية . اوراقها تعد من ١١ الى ١٧ وريقة . وريقاتها بيضيه مديبة تطول من ٣ الى ٥ سم . صلها خلي البشرة على صفتحه . انزاعها بنفسجية اللون . انزاعها يستمر من حزيران الى آب . يقال انهم تحمل خوص المكناة الحزفية ولكنها دونها منفة .

٢٧٤٩٢ - **مَكْنَانَة مَحْزَنْوِيَّة** * ، **سَدَاب المَاحِز**
Galaga officinalis (S). Galaga officinal, Rue des chèvres (F).
نوع من المكناة وهي عشبة مبلولة معمرة تطول من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ساقها فراج . اوراقها تعد من ٩ الى ١٣ وريقة ، وريقاتها سائبة تطول من ٢ الى ٤ سم . نسلها مالم الصفعة مهذب الصفعة . انزاعها زرقاء اللون . انزاعها يستمر من حزيران الى آب . وهي صباغية يقتبر من النباتات الطبية المنوية تدخل في عدة علاجات اخصها علاج السلس .

٢٧٥١٢ - مَلَاة

بقلة طيبة ورخصة تسمى كشمخة (السان). الواحدة ملاحة.

Resumurie (S).

Résumure, Résumurie (F).

جنس نباتات بحولية وجنية من فصيلة الالبيات. انواعه المرفوعة سبعة منها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط والشرق الاوسط || سوقها منتسبة رقيقة فراء تعلو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم. اورلقها متعاقبة، متقاربة الارتكاز، خطية النصال الصغيرة القد البحرية اللون. ازهارها فردية التجميع، ابضية وطفرة الارتكاز، خاصة التركيب، يتكرر فيها اللون الابيض. ثمارها خلاصة القلق. تنويرها صيفي || اعرف انواعه واشهرها الملاح البودي المرفوف بحشيشة الحصف.

٢٧٥١٤ - مَلَاة دُرْدِي

Résumurie vermiculée (F).

نبات بري طبي مشهور باسم حشيشة الحصف، اطلها.

Saline (F).

Salt-marsh, S.-mine, S.-pit (E).

الكان المد لاسطناح الملح وشبه الملح.

٢٧٥١٥ - مَلَاة

٢٧٥١٦ - مَلَاة

مزدوج اللوز وكل ارض تكثر فيها اشجار اللوز.

Malles (S).

Marteau (F), Malles (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صليحيات الخياشيم، عادات الخشاب وفصيلة الاطريات. انواعه المرفوعة عديدة منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة اغصانها المحيط الهندي || اصداقها لانظامية، متباينة الاشكال، لاقائية المصاريع، بعضها قريب الشبه بالمطاس. مفصلاتها عادية التسنين || تعيش لاصقة بصخور المجاح على اعماق تراوح من ١٥ م.

Crenatula (S).

Crenatula (F), Crenatula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صليحيات الخياشيم عادات الخشاب وفصيلة الاطريات. انواعه المرفوعة ثمانية جميعها من عظم البحر الاحمر والمحيط الهندي || اصداقها شبه مروحية الشكل، رقيقة القدم، ورفقة المصاريع اللامتساوية، تحلة التضديد للؤلؤة الداخل || تعيش لاصقة بالاسفنج.

٢٧٥١٩ - مَلَاة، مِلَاة، مَلَق، مِلَاة

Rouleau (F), Roll, Roller (E).

معدلة اسطوانية تستعمل في حقل التربة للزراعة. اشكالها واحجامها عديدة تختلف باختلاف الغاية من استعمالها. اهمها:

Rouleau plombre (F).

ملاصة واحدة

Rouleau ondulé (F).

ملاصة متوازية

Rouleau à bécettes (F).

ملاصة خطاطية

Rouleau marqueur (F).

ملاصة غطاطية

Rouleau brise-mottes (F).

ملاصة مفتحة المد

Limacodidae,

Cochlididae (S), Limacodidae, Cochlididae (F).

Limacodidae, Cochlididae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المرفوعة نحو ١٠٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم اغصانها المناطق الحارة والاستوائية || اجسامها صغيرة. يغطيها تراوح من ٢٠ الى ٢٥ م. رؤوسها معتدلة الجرم. عيونها صغيرة. اعظامها شديدة القصر. ملاسها مسطحة، تحلة. قرونها الاستشعارية غيطية. بطونها متراكبة الصفن التقيق والحمل الناعم. اجنسها مستعرضة، عادمة التهديد || تسرح في الليل. اساربعها شبه بيضبة الشوزن، قصيرة الجرامز الصدرية، ثلثة الجرامز البطنية. جميعها غاضلة || اشهر اجناسها المكودة.

٢٧٥٥٥ - مَكُونِيَّات - مَلَاة

Module, Mesure de capacité (F), Modulus, Dry measure (E).

اسم شامل يطلق على كل وحدة كيلية من اي حجم كانت او سمة.

٢٧٥٠٦ - مَكُونِيَّات - مَلَاة

هو اللقيز، اطلها.

٢٧٥٠٧ - مَلَاة

كل صخر مالح.

٢٧٥٠٨ - مَلَاة * مَكُونِيَّات

Malpighia (S), Malpighie, Malpighier (F), Barbados cherry (E), Barbadoschirschen (D), Malpighia (I).

جنس نباتات شجرية من فصيلة الملاليات، مهدا البلاد الاستوائية. انواعها نحو ٢٠ اوراقها متعاقبة متحدة اهليجية. نصلها على البصرة سنن الحافة الشالكة. ازهارها متفرقة او نورية التجميع منها الاخر والوردي والابيض. اعرف انواعه واشهرها:

ملاط حريف. Malpighie brillante, Bois capitaine (F).
شجرة امريكية المنبت، قشورها حامزة كايوية طيبة وصناعية.

ملاط كروي. Malpighie glabra,
Cerisier des Antilles, Moureiller, Xocot (F).

شجرة تكثر في المكسيك، ثمارها كرزوية مأكولة لا تخلو من الحسوة وقد تزرع للزينة.

٢٧٥٠٩ - مَلَاة

Epinard de Malabar (F).

بقلة زراعية تسمى بازيلا يضاء، اوراقها تستعمل استعمال الاسبانج.

٢٧٥١٠ - مَكُونِيَّات

Malpighiaceae (S).

Malpighiacées (F), Malpighiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القعالات. اجناسها ٥٠ وانواعها ٦٠٠ منطها من نباتات المناطق الاستوائية الامريكية. جميعها اشجار وشجيرات وجنيات. اوراقها متعاقبة معتقة بسيطة او مركبة. ازهارها خاصة التعلات والبلات، متفرقة التجميع، صفراء اللون او يضاء او حمراء. ثمارها جرد مكبرة عديدة البزور.

٢٧٥١١ - مَلَاة، مَكُونِيَّات

Géide, Givre (F).

هو جرد نقي الماء على سطح التربة والنبات من جلود درجة الحرارة الى ما دون الصفر.



ملاط



ملاة

Féculerie (F).

٢٧٥٢٢ - **مَلْبَجَة**

Manufacture of faecula (E).

الملبة أو مصنع اللبوب أو منشأة البطاطا هي المصنع المخصص باستخراج اللبوب.

Laiterie (F).

٢٧٥٣٣ - **مَلْبَجَة**

Dairy-farm (E).

المسل الذي يمالج فيه الحليب رُحْبًا يباع.

٢٧٥٣٤ - **مَلْبَجِيَا**

في الملاب ، الملبه .

Malt

٢٧٥٣٥ - **مَلْت**

هي الحبوب الناضجة صناعياً لا سيما حبوب الشعير التي تستعمل في صناعة البيرة .

Maltage (F).

٢٧٥٣٦ - **مَلْتَاج**

الملتاج أي صنع الملت، هو عمل استمالة الشعير وتحويله من الحبوب إلى ملت أي حبوب ناضجة .

Maltase

٢٧٥٣٧ - **مَلْتَاز**

خيرة قابلة للهبوان تحول الملتوز إلى غلوكوز قابل الاختار .

Manducable (F).

٢٧٥٣٨ - **مَلْتَاك**

Verdoyant (F).

٢٧٥٣٩ - **مَلْتَج**

الملتج الأرض أجمع فيها وكثر . والأرض الملتجة : الكثيره الخضرة .

Conjonctive (F).

٢٧٥٤٠ - **مَلْتَجَمَة**

Conjunctiva (E).

ملتجمة العين ، غشاء يلفح صفحة المقلة الخارجية وصفحة الاقناب الداخلية .

٢٧٥٤١ - **مَلْتَجَرَم**

هو المقابل ، اطله .

٢٧٥٤٢ - **مَلْتَمِقات الأصابع ، مَلْتَمِقات**

Syndactyles (F).

Syndactyls (E).

أحد قسمي الطيور الجوارح ، يشمل فصلي الخفاشيات والقرليات .

Volubile (F).

٢٧٥٤٣ - **مَلْتَف**

Voluble, Volubile, Twining (E).

صفة النباتات البارز الذي يلتف بأي جسم كان فينتلفه ويلتف حوله حلزورياً .

Circinal

٢٧٥٤٤ - **مَلْتَف**

نمت تعريفي يطلق ، في علم النبات ، على كل عضو ، إن ورقة أو غيرها دائرية الالتفاف .

Convergent

٢٧٥٤٥ - **مَلْتَق**

Plain (F).

٢٧٥٤٦ - **مَلْتَق**

الملتك والمصمت : ما لا جوف له .

Maltose

٢٧٥٤٧ - **مَلْتَوُز**

نوع من السكر القابل للاختار ، يحصل من تكسير النشا بالملت .

Contiguité (F).

Contiguity (E).

٢٧٥٢١ - **مِلَاظ**

Ciment (F).

٢٧٥٢٢ - **مِلَاعِب ظِلَّة**

اسم يطلق على طائر ين مختلفين هما الزراف والقرنفل الشائع ، اطلها .

Platalea (S).

٢٧٥٢٣ - **مِلَاعِقي***

Spatule (F).

جنس طيور مائية من طوالب الساق القواطع . أنواعه المعروفة ٨ ، تتميز بمناقيرها الكبيرة المنحنية الشكل ، بسوقها الضخمة اللدبة ، بأرغاها المستطيلة وبشائرها المقرفة . تعيش قرب الماء . قوتها السمك والديدان والحشرات والرخويات . لتثن أوكها في الاشجار وبين القصب . اناتها تضع من بيضتين إلى أربع بيضات مستطيلة تحضنها ثلاثة أسابيع || أشهر أنواعه ما يلي .

٢٧٥٢٤ - **مِلَاعِقي أَبْيَض ، أَبْر مِلْعَكَة ، دَوَّاس**

Platalea leucorodia (S).

Spatule blanche (F).

نوع من الملاحين وهو طائر كبير الجفط طوله نحو ٧٠ سم . ثوبه إلى البيضاء الناصع باستثناء مناقره ورشبه السد ، ونحوه وزفده وطرف مناقره الصفرة . أرياش رأسه مستطيلة مهدلة . يعيش بجماعات كبيرة تثن في مكان واحد . يحوي البلاد في طلب المصيف والمشي . يكثر على شواطئ الخليج الفارسي والبيسر الاسود وعلى ضفاف الدلتا وفي هولندا .

٢٧٥٢٥ - **مِلَاعِقي زَرْدي ، أَبومِسْط ، مِدَوَّاس**

Platalea ajaja (S).

Spatule rose (F).

نوع من الملاحين طوله نحو ٦٠ سم . ثوبه وردي اللون . اصطاله شطوط وشفاف الشرق وغربية الشرقية . جماعته متوسطة الكبر ، عدد أفرادها يراوح من ٦ إلى ٢٤ ، وهي لتثن في مكان واحد .

٢٧٥٢٦ - **مِلَاعِقيَة**

Cattloys (F).

نبات حليبي من الجوزليات يدعى قِطْلَة ، اطلها .

٢٧٥٢٧ - **مِلَاك**

Terrien (F).

Landed, Proprietor (E).

هو صاحب الاملاك أي الأراضي الزراعية والحرجية .

٢٧٥٢٨ - **مِلَاك البَهِر**

Ange de mer (F).

سمكة بحرية ولده مقترنة مشهورة باسم سقطين ، اطلها .

٢٧٥٢٩ - **مِلَاكس**

Palpes (F).

Palpi, Feelers (E).

زوائد مفصليّة فكية تلمس الحشرات بواسطة ما أكلها وربما ميدها .

٢٧٥٣٠ - **مِلْبَاب**

Féculomètre (F).

Faeculometer (E).

جهاز يستعمل في تحديده محتوى اللبوب الناشئ الموجود في مادة معينة .

٢٧٥٣١ - **مِلْبَان**

Galactomètre (F).

Galactometer (E).

جهاز تقاس بواسطة المواد السكرية والسمينة والجينية والجلالة الموجودة في الحليب .



ملاتي

Régime (F).

٢٧٥٥٨ - مُتَجَنِّ ٥

هو مجموعة الموائل والانفعالات الطبيعية التي تسبب الشيء.
المنى . كقولك ملحن الاطوار وملحن الرياح الخ .
ج ملحنين .

٢٧٥٥٩ - مُتَح

الملح : ورم في قروب الفرس دون الجرد فاذا اشتد
فهر الجرد .

Sel (F). Sale (E).

٢٧٥٦٠ - مُتَح

الاملاح ، كياويا ، مواد ناتجة عن احلال مددن محل
الهيدروجين في حامض . فاذا اضيف مثلاً الحامض الكبريتي
المخفف الى الزنك يتصاعد غاز الهيدروجين ويختفي المعدن
ويتكون ملح كبريتات الزنك .

٢٧٥٦١ - مُتَح البَارُود ، تَطْرُون ، بَوْرَقِ اَوْسِي
Nitre, Salpêtre (F). Nitre, Saltpetre (E).

هو كياويا ليزترات البوتاس، يحصل ويتجمع طبيعياً على
الصخور الكلسية وعلى جدران الاقياء الزرقية ويستعمل
في صنع البارود .

٢٧٥٦٢ - مُتَح الطَعَام

Sel de cuisine, Chlorure de sodium (F). Kitchen
salt (E).

تعريفه الكيماوي كلوريد الصوديوم . يستخرج بأكثرية
من مياه البحر بعد ترقيدها وتصفيرها في الملاحات ثم معالجة
بلوراتها ضمن مجافئ خاصة .

Janvier (F). January (E).

٢٧٥٦٣ - مُتَحَان

هو شهر كانون الثاني .

Halimodendron (S).

٢٧٥٦٤ - مُتَحَان

Halimodendro (F).

جس نباتات برية ويزينية من فصيلة القزليات . انواعه
المعروفة قليلة العدد ، جميعها اسبوية المهد ، تنبت في رمال
الشواطئ البحرية . معظمها جني وبعضها شجر . اوراقها
مركبة عابلة . ثمارها قرنية ، بزورها مغلطمة || اشهر
انواعه الزيزينية للملحان الفضي .

٢٧٥٦٥ - مُتَحَان فِيْهِ

Halimodendron argenteum (S). Halimodendro argentea (F).

نوع من للملحان يعيش في الاربة الرملية الناحلة . جنينه
شائكة فارشة تملو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها عابلة ، مركبة ،
شعرية . وريقاتها رباعية العدد ، اهليلجية الشكل ،
مغطوة النصل البحري اللون الفضي المواج . ازهارها كبيرة
القد ، سباً التناثية التجميع وسباً الثلاثية ، معاليها مسطيلة
متدلية . لبوا الى الحرة البشفسجية المواج || تنوره يستمر
من ايار الى حزيران .

Feuillus (F).

٢٧٥٦٦ - مُتَحَاوَات ، تَحْيِيْطُهُ

Leavy (E).

هي الاشجار الحرجية والزيزينية التي يسقط ورقها في الشتاء .
تفيضها العروات والايادية أي الدائمة الخضرة التي لا يسقط
ورقها . واحدها لمحاء .

Annexe (F).

٢٧٥٦٧ - مُتَحَق

هو كل تابع خلق بأصل .
Annexed, Appended (E) .

٢٧٥٤٨ - مُتَوَرِّثَاتُ الْأَجْنَحَةِ ٥ ، مُتَحَفَّات

الأَجْنَحَةِ ٥

Strepisptères, Rhipiptères (F). Strepisptera, Rhipiptera (E).

رتبة حشرات من طبقة عشايات الجناح . اجناسها وانواعها
المعروفة قليلة العدد جميعها فصيلة الحَشَيَّيَات .

Latanier (F).

٢٧٥٤٩ - مُتَوَرِّثِيَّة

هي الحشف ، اطليه .

٢٧٥٥٠ - مُتَتِين ٥ ، مَتَاتِين ، مَتَسِين ٥

Maltine, Maltine (F).

المُتَتِين أي كسب اللذة الصفراء هو النخل الناتج عمن
صناعة تقطير الدرة ، ويصير من اعلاف الماشية .

٢٧٥٥١ - مُتَشَوِّد ، تَشِيد

Synanthérique (F). Synantheric (E).

المشور والمُتَتِين من الازهار ما كانت اسديتها ملتصقة بالآبار .

٢٧٥٥٢ - مُتَج

هو ثوى المقل . ج املاج .

Abri (F). Refuge, Shelter (E).

٢٧٥٥٣ - مُتَجَا

٢٧٥٥٤ - مُتَجَدَّة ٥ Mulgedium (S). Mulgédie (F).

جنس نباتات عشبية ممرية من فصيلة المركبات . انواعها
المعروفة عديدة . اطلسها بعض مناطق الشرق الاوسط
واروپة || ساقها فروع تملو من ٥٠ الى ٢٠٠ سم .
اوراقها كبيرة مفردة لامتماوية التفرع . ازهارها عشكوي
التجميع . ازهارها متباينة الالوان يكثر فيها الازرق ||
اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

٢٧٥٥٥ - مُتَجَدَّة تَقْرِئِيَّة ٥

Mulgedium tataricum (S).

Mulgédie de Tartarie (F).

نوع من المجلدة التيزينية . مهدها بلاد التتر . ساقها قليلة
الفروع تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها حافسة
بحرية اللون . ازهارها عذقي التجميع . ازهارها الى الزرق
الساجونية || تنورها يستمر من حزيران الى آب .

٢٧٥٥٦ - مُتَجَدَّة جَبَلِيَّة ٥

Mulgedium alpinum (S). Mulgédie alpine (F).

نوع من المجلدة التيزينية السبروتية تعيش في جميع الاتربة
ومختلف الموائل . مهدها جبال الشرق الأدنى ويضغ جبال
اروپة . ساقها فروع تملو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها حافسة
كبيرة النصل المرطاه . ازهارها عشكوي التجميع ، مثل
الكثافة . ازهارها الى الزرق الباهة || تنورها يستمر
من تموز الى ايلول .

٢٧٥٥٧ - مُتَجَدَّة كَبِيرَةُ الزَوَقِ ٥

Mulgedium macrophyllum (S).

Mulgédie à grandes feuilles (F).

نوع من المجلدة التيزينية . مهدها بعض المناطق التركية
والقوقاز . ساقها فروع ، خلية الساه ، تملو من ١٠٠
الى ١٥٠ سم . اوراقها كبيرة القد ، قليلة النصل ،
مألسة الصنفحات العليا ، مزقبة السفلى . ازهارها عشكوي
التجميع ، كبير القد . ازهارها الى الزرق الزاهية ||
تنورها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٧٥٦٨ - ملحق التامين

Avenant (F).

Modification (E).

عقد كتابي يضاف الى وثيقة التأمين الدلالة هل تعديل وقع في بعض شرائطها .

٢٧٥٦٩ - ملحق الوصية

Codicille (F).

Codicil (E).

هو الملحق الذي يحرره الموصي بعد تحريره وصيته إما لاتمامها او لتعديلها او لافائها .

٢٧٥٧٠ - ملحوظ و ملحوظ

Prévisible (F).

Foreseeable (E).

٢٧٥٧١ - ملحوبات الفك

Plectognathes (F).

رتبة من الاسماك الضفاريات .

٢٧٥٧٢ - ملخ

Dragon (F). Sucker (E).

الملح والمعان : قصب ينمو من برصة عرضية نشأت على جذر نبات مق .

٢٧٥٧٣ - ملحيات

Malachidés (S).

Malachidés (F). Malachidés (E).

فصيلة حشرات وائمة وقاصفة من رتبة عُمديات الجناح || اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها من حشرات البلاد الحارة وبعضها يألف مناطق البلاد المعتدلة الحرارة مرتبها النباتات المثنية والادغال وتُرشف رقيق الاثمار وتفتس الحشرات الدنيا التي تقترب منها . وبعض اجناسها يتميز بجهاز خاص يمكنه من دفع حويصلات جانبية حراء اللون تطلق منها رائحة اثيرة تفرز الاصاب ، قليلة الاثى || اجسامها صغيرة القصد ، مستطيلة الشكل ، مستعرضة الرؤوس . مستقلة الزبالي المستطيلة المركبة من ١١ فصلة . ارسافها خامية العقل || يرقاتها تعيش تحت الماء وفي الاخشاب المنخورة سابعة رواد اساريع الحشرات الخالصة لانتزاعها || اظهر اجناسها اللطيفة والمداشقة والوسعة .

٢٧٥٧٤ - ملحية ثنائية البؤور

Malachius bipustulatus (S). Malachie bipustulés (F).

Malachius bipustulatus (E).

حشرة وائمة جاذبة قاصفة من فصيلة الملحيات ورتبة مُمديات الاجنحة . تألف الحقل المزروعة والمزاري . خنافسها تُرشف رقيق الاثمار وتفتس الحشرات الدنيا . عند الحاجة ، فيلدو احر اللون يفرز مادة اثيرة نافذة تفرز الاصاب تكفي لشل مقاومة الغرم . يرقاتها تعيش على جلود التحيليات وعلى ما تقتربه من اساريع الحشرات التاربة والادانة || جسمها صغير اللد يطيل نحو ٦ م . رأسها مستعرض الجرم ، قصير الخيط ، اخضر اللون . منايها كبرتات . زباناتها خيطيان . فكها ضليمان . كولسها شبه مربع الشكل ، اخضر اللون . ظهراتها الى الخضر الالامس اما الاطراف الخلفية فال الحمرة . غداها خيفتها التحزيز من الميم المخطوط . ارسافها خامية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتعيش حتى آب . انماها تهريق ولكن قرب سوق نبات وتحت الارراق التي تلامس التربة || البرقة عند الادراك التام تطول نحو ٩ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، سداسي الرواجب القصيرة ، حنكي اللون ، اسمر الملاج ،

اسفنج الرأس الاسود ، مستطيل للزعر والسكة الشرجية || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوماً ينقضي في التربة ضمن جلاب من الطين والبراز وتغلق عند انطلاق الحشرة .

٢٧٥٧٥ - ملحية حمراء

Malachius rufus (S).

Malachie rouge (F). Malachius rufus (E).

حشرة وائمة قاصفة من فصيلة الملحيات ورتبة مُمديات الاجنحة . تألف البراري والمزاري والاحراج الغلة . خنافسها تُرشف رقيق الاثمار وتفتس الحشرات الدنيا . تتميز بجهازها الحويصلي القامح الاثري الرائحة التي تفرز الاصاب . يرقاتها تعيش تحت لحاء الاشجار وفي الاخشاب النخرة قوتها اساريع الحشرات الخالصة || جسمها صغير اللد يطول من ٦ الى ٧ م . رأسها مستطيل الجرم اسمر اللون . زباناتها مستطيلة مستطان . منايها كبرتات . فكها ضليمان . كولسها صناعي اللون يتوسط بقية غضار . ظهراتها مستطير الطرف اللصق ، احر اللون . ارسافها خامية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل نيسان وتعيش حتى اواخر حزيران . تسرح في النهار . تساف بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع . تمنح المكان تحت لحاء الاشجار ويحت الانقراض || البرقة عند بلوغها الادراك التام تطول من ١٠ الى ١٢ م . جسمها شبه اسطواني الشكل مستطيل الرأس ، مستطيل الطرف ، سداسي الرواجب القصيرة ، اسمر اللون ، اصفر الملاج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوماً ينقضي في آخر سرداب دخلته البرقة .

٢٧٥٧٦ - ملدكان

Flectomètre (F).

Flectometer (E).

جهاز يستعمل في قياس لدانة المادان تحت ضغط معين .

٢٧٥٧٧ - ملدكان

Pellicule (F). Pellicle (E).

صفحة او عصابة سليولوزية رقيقة منسوبة السطح تستعمل في غش الصناعات اخصها صناعة الافلام السينمائية حيث تطل على احدى جهتيها مادة سيلاتينية حساسة بؤر لها النور .

٢٧٥٧٨ - ملدكان

Pelliculé (F).

ملقى بالملدن .

٢٧٥٧٩ - ملز

Mélèze (F).

شجرة حرجية تسمى لاويس ، اطليا .

٢٧٥٨٠ - ملز كاذب

Faux-mélèze (F).

شجرة حرجية وزينية تسمى لاويس كاذب ، اطليا .

٢٧٥٨١ - ملزكان

Gonocytisus (S). Gonocytise (F).

جنس نباتات ثيمية ، متوسطة الارتفاع ، برقة ، مبرعة ، من فصيلة التريبات القراضية . انواعه المعروفة قليلة العدد ، منتبها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط ، اخصها تهم لبنان والمملكة السورية || سوقها متسعة ، فرعاء ، عادمة الشوك . اوراقها مركبة ، وثرية العدد . وريقاتها شبه يضيبة النصال المستطيلة . ازهارها ابطية الانتشاد ، مستطيلة الزناد ، صفراء اللون ، مستعينة العرف ، يحرمها النحل .



ملحية ثنائية البؤور



ملحية حمراء

Lin commun (F).

٢٧٥٩٢ - مَلَسَج

هو الكتان الشائع ، اطليه .

Melasmia (S).

٢٧٥٩٣ - مَلَسْمِيَّة

جنس فطور مجهرية من فصيلة الهذكيات . انواعه قليلة
عامة القيمة الاقتصادية . بكنبداته ديمية التركيب ،
فحمية اللون ، ترتكز حل ونية قارشة فرجية الانفلاق .
بويناته غروطية منقطة ، شفافة ، وسيدة الخلية .

Mylesinus (S). Mylésine (F). * ٢٧٥٩٤ - مَلْسِين

الواحدة ملسية . جنس اسماك نهريه من مفصوات المائنة
وفصيلة القرصانيات . انواعه المعروفة ثلاثة موطنها انهر
البرازيل والفيونان || اجسامها بيضيه الشوزن ، مسطحة
الجرم ، صلبة القذ ، تقطون من ١٦ الى ٢٠ سم . زعانفها
الظهرية وللرجية كبيرة متقابلة . اما الذيلية فهلاية
الشكل . اذواها الى الخمسار المتلغوات المجاهات || حولها
مأكولة ، متوسطة الصنف .

٢٧٥٩٥ - مَلْسِيَّت السَّحْم

هي وذعة السَّحْم ، اطليا .

٢٧٥٩٦ - مَلْسِيَّت المَلْفُوف

هي وذعة المَلْفُوف ، اطليا .

Fluoroscope (F).

٢٧٥٩٧ - مَلَصَّاف

جهاز يستعمل في تشعيع اللاصف اي الفلورور الموجد
في المواد المنلنية .

Dugong (F).

٢٧٥٩٨ - مَلَكَّة

هي الاطوم ، سيوان بحري غليظ الجلد ، اطليه .

Compresseur à pistolet (F). ٢٧٥٩٩ - مَلَطَّاس

جهاز آلي يستخدم في تقطيع المواد الصلبة كالصخور
وغيرها .

Malchusianisme (F). ٢٧٦٠٠ - مَلَطَّوْسِيَّة

الملطوسية ملهب الاقتصادي اجتماعي نادى به الاقتصادي
الانكليزي «ملطوس» ملخصه ضرورة كبح الانجاب
لان التكاثر البشري يزداد والمواد الغذائية الضرورية
تنضب .

Tissu sous-cutané (F).

٢٧٦٠١ - مَلَطِّي

Subcutaneous tissue
قشرة رقيقة بين العظم والدم .

Cochléaire, Cochléiforme (F). ٢٧٦٠٢ - مَلَعَقِي

Cochleiform (E).
ما كان شكله شكل الملعقة .

Cochléaria officinal (F). ٢٧٦٠٣ - مَلَعَقِيَّة

هي حشيشة الملاحق ، من النباتات الطبية ، اطليا .

Clematidae (S). ٢٧٦٠٤ - مَلَعُوبَات

Clematides (F).
مجسوة نباتية من فصيلة الشقيقيات . اطليها البلاد الحارة
والمعتدلة . انواعها كثيرة المدد منظما مداد مارش . سوفها
لغية . اوراقها متقابلة طويلة الارجيول ، صماترنا سامة
محرة . ازهارها عادية التلات كبيرة الفصل الملوثة .

Malesherbia (S).

٢٧٥٨٢ - مَلَزُورْبَة

Malesherbie (F).

جنس نباتات عاوشة ، ممررة ، برية وتربينية من فصيلة
الملزوربات . انواعها المعروفة خمسة . منبتها الطوي بعض
مناطق الشيل والبيرو || تزودق للزرين في المراكب وفي
المواقع التي لا تخشى الصقيع في الشتاء .

Malesherbiaceae (S). ٢٧٥٨٣ - مَلَزُورْبِيَّات

Malesherbiaceae (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلتقنين عديدة القمالات . اجناسها
وانواعها المعروفة قليلة المدد . منبتها الطوي بعض اصناع
امريكية الجنوبية || نباتاتها ممررة ، عاوشة ، قريبة الشبه
بالالاميات . اوراقها متعاقبة . ازهارها خشوية ، كبيرة
القد ، جميلة الالوان ، سننية الارتكاز . تتميز باستطالة
انبوب الكرم وباسديتها المتدوجة في قاعدة الوزم ||
اشهر اجناسها الملزوربة .

Synallagmatic (F). ٢٧٥٨٤ - مَلَزُوم لِطَرَفَيْن

Synallagmatic, Reciprocal (E).

هو العقد الذي يلتزم به كل فريق من المتعاقبين نحو
الفريق الآخر .

Coobligé (F).

٢٧٥٨٥ - مَلَزُوم مع هَيْرِه

Coobligant (E).

٢٧٥٨٦ - مَلَزُورِي

Amygdalaire (F).

Amygdaloid (E).

نمت تعريفي يطلق على كل صخر يحوي بعض الحجمات
للشجرة او بعض الحصيات .

Châtrer (F).

٢٧٥٨٧ - مَلَس

To castrate, To geld (E).

ملس الخسنة : استلها بعروقها . وملس الكباش : سل
خصيتيه بعروقها فهو ملس والكباش علس .

Glossomètre (F).

٢٧٥٨٨ - مِلْسَان

Glossometer (E).

هو مقياس اللسان ، جهاز تقاس به غراطين التحصيل
لعرفة الاتواع الاصغر من غيرها في جرس رقيق الازهار .

Anacanthiniens (F). ٢٧٥٨٩ - مَلَسَاوَات

رئة من الاسماك المطليات .

٢٧٥٩٠ - مَلَسُومَة * ، سَلْجَ هِنْدِي

Melastoma (S). Mélastome (F). American goose-
berry (E). Schwarzmund (D). Melastoma (I).

جنس مجمرات وسنبات برية وزراعية من فصيلة الملسويات .
مهاذا المناطق الاستوائية . انواعها مدنية . اوراقها منقطة ،
متقابلة سنانية للتصل . ازهارها محورية الارتكاز او هاجية .
ثمراها لوبرية مستحبة العرف والطعم ، صبيرها اسود اللون
يدبخ اللسان والقلم .

Melastomaceae (S). ٢٧٥٩١ - مَلَسُومِيَّات

Mélastomacées (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلتقنين ، مستقلة القمالات ،
منخفضات المبيض . اجناسها وانواعها زمام ١٨٥٠ ، جميعها
من نباتات المناطق الاستوائية . اوراقها كاملة متقابلة .
ازهارها خاسية التركيب .



ملسومة



ملسين



ملئى ارجوانى



ملئى جبلىة



ملئى زرقاء



ملئى سامة



ملئى صفراء

٢٧٦١٧ - ملئى شَرْيَّة (S). *Clematis orientalis* (S).
Clématite d'Orient (F).
 جنبية عارضة عديدة الفروع طولها من ٣ الى ٦ امتار.
 اصنافها الشرق من شط بحر قزوين الى منشوريا. اوراقها
 مركبة، ثلاثية القصوص القليلة الشكل، المسنة الحافة.
 تصلها بحري اللون. ازهارها رباعية الفصول، قطرها نحو
 ٣ سم. || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

* ملئى صفراء *

٢٧٦١٣ - ملئى صفراء (S). *Clematis ochroleuca* (S).
Clématite jaune (F).
 بجلة فراء منتصبه تملو نحو ٦٠ سم. مهدا البلاد الايركية.
 اوراقها بسيطة لاطئة متعاقبة. تصلها يبيض الشكل مالى
 الصفحة. ازهارها حامية الارتكاز، رباعية، صفراء اللون،
 زيتية اللون، لالوج، اجائبة الشكل، متدلية || ازهارها يستمر
 من ايار الى حزيران.

* ملئى قَيْفَةُ الْوَرْق، و قَيْان *

٢٧٦١٤ - ملئى قَيْفَةُ الْوَرْق، و قَيْان (S). *Clematis angustifolia* (S).
Clématite à feuilles étroites (F).
 جنبية دخلقة مثنونة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها منتصبه.
 اوراقها مركبة. وريقاتها خيشية بسيطة اولالدية للفرع،
 مصانعة سامة. ازهارها كثيفة التجميع، خافتة الورد،
 يبيض اللون. تكثر في بعض الاسراج الربطية. تجلجها
 الماعز ولا تنضج منها.

* ملئى عُنْكَوَلِيَّة

٢٧٦١٥ - ملئى عُنْكَوَلِيَّة (S). *Clematis paniculata* (S).
Clématite à panicules (F).
 جنبية سرپوتية عارضة طولها نحو ٤ امتار. مهدا اليابان
 وكوريا. اوراقها مركبة. وريقاتها خيشية او سباحية
 الازواج، ريشية التركيب. تصلها بطولها من ٥ الى ٨ سم.
 ويغرس من ٢ الى ٤. ازهارها حنكولية التجميع، رباعية
 الفصول القليلة، قطرها نحو ٣ سم. || ازهارها يستمر
 طول شهر ايلول.

٢٧٦١٦ - ملئى عَنَمِي، مَرْحَان، حَبَل مَسْكِي (S). *Clematis cirrosa* (S).
Clématite à vrilles, C. tou-jours verte (F).
 جنبية عارضة برية زربينية تملو من ٣ الى ٤ امتار.
 حوافها مركبة ثلاثية. اوراقها ابيدة بسيطة لا قياسية
 الشكل. ازهارها قمية رباعية الفصول التحلية البشرة
 لونها الى البياض الاخير تملو مائة وريدي || مصارة
 اوراقها قليلة المادة القلوية السامة لكثيرا حريفة محرق
 الجله || ازهارها يستمر من اذار الى كانون.

٢٧٦١٧ - ملئى قَلْبِيَّة الْوَرْق (S). *Clematis cordata* (S).
Clématite à feuilles en coeur (F).
 جنبية عارضة طولها نحو ٦ امتار. اوراقها مركبة مشطية.
 وريقاتها تد من ٥ الى ٧ ازواج، تصلها قلبي الشكل
 مسن الحافة. ازهارها خلية الفصول البياض || ازهارها
 يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

* ملئى كَرْشِيَّة الْوَرْق

٢٧٦١٨ - ملئى كَرْشِيَّة الْوَرْق (S). *Clematis patrifolia* (S).
Clématite à feuilles d'ache (F).
 جنبية سرپوتية عارضة طولها نحو ٣ امتار. اصنافها الصين
 واليابان. اوراقها مركبة كرسية الشكل. تصلها اخضر
 اللون مسن الحافة. ازهارها عتقودية التجميع، صفيرة
 اللند، رباعية الفصول، يبيض اللون، قطرها نحو ١٠ سم.
 ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الاول.

٢٧٦١٥ - ملئى (S). *Clematis* (S).
Clématide, Clématide (F). *Clematis* (E). *Waldrebe* (D). *Clématide* (I).
 جنبى نباتات معمرة عارضة من المعلومات. انواعها عديدة.
 اوراقها لا نظامية تكثر فيها الاشكال المركبة الريشية.
 ازهارها عادمة البتلات تستعصى حيا بالفصل الملونة المختلفة
 الاحجام والاشكال || اعرف انواعها واشهرها ما يلي.

* ملئى اَرْجَوَانِيَّة *

٢٧٦١٦ - ملئى اَرْجَوَانِيَّة (S). *Clematis carlatea* (F).
Clématite carlatea (F).
 جنبية فراء منتصبه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. فروعها
 جزوية اللون. اوراقها متعاقبة، لاطئة، بسيطة. تصلها
 سائي الشكل، بارز العروق، خلى البشرة. ازهارها
 ارجوانية اللون، اجائبة الشكل تطلو نحو ٤ سم.
 ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

* ملئى بَحْرِيَّة

٢٧٦١٧ - ملئى بَحْرِيَّة (S). *Clematis maritima* (F).
Clématite maritime (F).
 جنبية فراء منتصبه تملو نحو ١٢٠ سم. منبها الشطوط
 البحرية. اوراقها مركبة، وريقاتها قمية التفرع
 بحرية اللون. ازهارها صغيرة اللند تبتية البياض || ازهارها
 يستمر من ايار الى تموز.

* ملئى جَبِيَّة *

٢٧٦١٨ - ملئى جَبِيَّة (S). *Clematis montagnarde* (F).
Clématite montagnarde (F).
 جنبية سرپوتية عارضة طولها من ٤ الى ٦ امتار. ساقها
 وفروعها جزوية اللون. اوراقها مركبة مشطية. وريقاتها
 اطلالية الشكل، عاتقة الحصار. ازهارها يبيض اللون،
 اجلية الارتكاز، مستطيلة المالحق، كبيرة اللند، قطرها
 يراوح من ٥ الى ٩ سم. || ازهارها يستمر من ايار
 الى حزيران.

* ملئى جَمْرِيَّة

٢٧٦١٩ - ملئى جَمْرِيَّة (S). *Clematis campaniflora* (S).
Clématite en cloche (F).
 جنبية سرپوتية عارضة طولها من ٣ الى ٤ امتار. اوراقها
 مركبة ثلاثية. تصلها اخضر اللون حامد التنتين. ازهارها
 جرسية الشكل، رباعية الفصول الزرق، مستطيلة المالحق،
 متدلية || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٧٦١٠ - ملئى زَرْقَاء * (S). *Clematis viticella* (S).
Clématite bleue (F).
 جنبية سرپوتية عارضة طولها من ٤ الى ٦ امتار. اوراقها
 مركبة ثنائية التثليث، وريقاتها صفيرة عادمة التنتين.
 ازهارها كبيرة اللند، زرقاء اللون، قمية الشكل، رباعية
 الفصول، قطرها يراوح من ٥ الى ١٢ سم. || ازهارها
 يستمر من حزيران الى ايلول.

* ملئى سَامَّة، و فَرْج *

٢٧٦١١ - ملئى سَامَّة، و فَرْج (S). *Clematis vitalba* (S). *Clématide des haies, C. brûlante, Herbe aux yeux, Berceau de la Vierge, Vigne blanche* (F).
 جنبية مبلولة عارضة طولها من ١٠ الى ٢٠ م. اوراقها
 مركبة مشطية. وريقاتها تد من ٥ الى ٩ ازواج، تصلها
 حبل الخصار الزاوي. ازهارها رباعية الفصول الحلية
 البياض اللون، قطرها نحو ٣ سم. اسديتها وريقاتها يبيض.
 ازهارها يستمر من حزيران الى تموز. وهي تكثر في المالحق
 الربطية اعصها السباحات. مصارتها خيرة المادة السامة
 النشيطه.

٢٧١٢٨ - مَلْمُوسُون * Sicana odorifera (S).

Melocoton (F).

نبات زراعي حولي وحيد الجنس والنوع من فصيلة القرعيات. مهد بعض مناطق امريكا الجنوبية. يستعمل كخضار انواع القرع في الطبخ ويستعمل ايضا في تغذية المنازل والقطاعات الباعة لانه فواح العرف المستحب. ساقه عارضة تطلو نحو عشرة امتار. حوائطها مجوهر بمحاجر تمكها من الالتصاق بأي سطح كان. اوراقه معتقة كثيفة، سباعية الفصوص. ازهاره صفراء اللون، كبيرة القد، خاسية البتلات. ثماره قرعية الشكل تطلو من ٢٥ الى ٣٥ سم. لونها، عند الادراك، الى الحمرة البرتقالية. تؤكل الثمار مطبوخة قبل دغوبها في طور الادراك لان لبابها يتصلب عند الادراك ويذوق منه اربع عطر ثابت يستقر بعض الوقت.

٢٧١٢٩ - مَلْمُوسَة Embryon (F). Embryo (E).

المادة الحية المكونة الناشئة التي يستمر بها الحيوان والنبات. وهي في الانسان مضغة وفي الحيوان لعة وفي النبات نيتش.

٢٧١٣٠ - مَلِكُ الْعُقْبَانِ Aigle Impérial (F).

هو العقاب القيصري، اطلبا.

٢٧١٣١ - مَلِكِيَّةُ التَحَلِّ Reine des abeilles (F).

Queen-bee (E). هي النحلة الانثى البيضاء واسيرة ثول التحل والحلية والقيصر.

٢٧١٣٢ - مَلِكُورِيَّة Malacologie (F).

Malacology (E). فرع من الزولوجية يبحث في شعبة اللافقريات.

٢٧١٣٣ - مَلِكُوك * Melicoccus (S).

Mélicouque (F). Melicoccus (E). جنس الشجر وشجيرات برية عروق من فصيلة السابنديات. انواعها المعروفة قليلة المدد موطنها بعض المناطق الاستوائية من البلاد الامريكية، اغصانها جبيكة. اوراقها منتسبة كثيرة الفروع تطلو من ٣ الى ١٥ امتار اوراقها ابيدة، مركبة، متعاقبة. وريقاتها شغيفة المدد، ثنائية او ثلاثية الازواج. نصلها جامدة الولل، يضيء الشكل. ازهارها متكولي التجميع، طرفي الاوتكاز. ازهارها صغيرة يضيء اللون او وردية، عطرية العرف. ثمارها نوية مأكولة اللباب والصبغات.

٢٧١٣٤ - مَلِكِيَّة Propriété (F).

Property, Ownership (E). هي حق الاستعمال والاستمتاع والتصرف في الشيء اطلاقا في نطاق القانون.

٢٧١٣٥ - مَلِكِيَّة مُشْتَرَكَة Copropriété (F).

Joint property (E). هي حق ملكية مال منقول او ثابت موزع على افراد متعددين. وقد تكون الملكية المشتركة شائعة او غير شائعة.

٢٧١٣٦ - مَلِكِسُ رُومِي Dracodéphale moldavique (F).

هو رأس التين اللطاني، اطلبا.

٢٧١٣٧ - مَلْمُوس * Melampus (S).

Mélampe (F). Melampus (E). جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدميات الأرجل وفصيلة الحفصيات. انواعه المعاصرة المعروفة نحو ١٠٠

٢٧١٣٩ - مَلْمِي لَهَب، مَلْمِي عَطِرَة، قَمِيص

بِنْتُ الْمَلِك، عَنَصَرَة

Clématis flammula (S). Clématis odorante, C. flammette (F).

جنية مبلولة عارضة تطلو نحو ٤ امتار. اصلها حوض البحر المتوسط. اوراقها مركبة شطبية. وريقاتها ضيقة كثيرة المدد. نصلها لا قياسي الشكل. صهارته سامة حريفة كالوية تحرق الجلد. ازهارها صغيرة القد غبراء اللون. ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

٢٧١٤٠ - مَلْمِي مُنْقَصِيَّة Clématis recta (S).

Clématite dressée, Téterin (F). جنية جصاصة دفلة مبلولة تطلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. ساقها منتصبة جوفاء. اوراقها مركبة ثنائية او ثلاثية الازواج. وريقاتها يضيء النصل، بحرية اللون. صهارتها لا تكوي. ازهارها مكسبة، عطرية، يضاء اللون. ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

٢٧١٤١ - مَلْمَم Périsme (F). Peristome (E).

ما يكتنف القم في الحيوانات الدنيا وما يحرق لفرة الفطور ج ملامح.

٢٧١٤٢ - مَلْمَف، مَحْنَرِيَّة Treuil (F).

Windless, Hand-winch (E). آلة بسيطة تستعمل لرفع بعض الانقال.

٢٧١٤٣ - مَلْمُوس *، كُرُوب، لَحْنَة Brassica oleracea capitata (S).

Chou, Chou cabus, Chou potager (F). Cabbage, Drum head cabbage (E). Kraut, Kopfkohl (D). Cavolo, Cavolo cappucco (I). بقلة زراعية من فصيلة الصليبيات. ضرورها واصرارها كثيرة المدد. جميعها ملطاة الازراق المأكولة اثنى بعض النياتينات الصحية. تحليلها الوسطي يحلي:

٣٧.٠ ٪ من المواد الازوتية
٥.٠ ٪ من المواد الدعنية
٢٥.٠ ٪ من المواد الهيدروكربونية

٢٧١٤٤ - مَلْمُوسُ بَرُوكْسِل * Brassica oleracea gemmifera (S).

Chou de Bruxelles (F). Brussels sprout (E). Brüsseler kohl, Rosenkohl (D). Cavolo di Brusselle (I). نوع من الملموس الزراعي للمأكول. تشابيه فمية الشكل، صغيرة القد، تعد ٦ الى ٢٠ اذراكها تدريجي يتنقش من الاسفل.

٢٧١٤٥ - مَلْمُوح Gravid (F).

Gravid, Pregnant (E). الملقاح الحامل من الاناث او من كانت طالتها تمكها من ذلك.

٢٧١٤٦ - مَلْمُاحْر Malachra (S).

Malachre (F). Wild ochra (E). Malachra, Weichmalve (D). Gombo salvatico (I). جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الجوزيات. انواعه المعروفة خمسة، جميعها مدروسة، اصلها البلاد الامريكية. اوراقها متعاقبة لا قياسية الشكل والتفصيص. ازهارها رويسية منها الابيض والليالي والوردية والاحمر.

٢٧١٤٧ - مَلْمُط Pointe du bec (F).

Point (of the beak) (E). هو طرف منقار كل طائر إلا الكاسر.



ملمي منتسبة



ملفوف



ملفوف بروكسل



ملفوف



ملوك

منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة || اصدها شبه مخروطية الشكل، طرفية القولية المنسوبة الخطوط. فوجاتها مسطحة مسنة الخلفات .

٢٧٦٣٨ - **نَمَح** °
Profil (F).
Mظهر الشئ الجانبي .

٢٧٦٣٩ - **نَمَس** °
Palpe (F). Palp (E).

٢٧٦٤٠ - **نَمَس شَفَوِي** °
Palpe labial (F).
Labial palp (E).

٢٧٦٤١ - **نَمَس فَكِي** °
Palpe maxillaire (F).
Maxillary palp (E).

٢٧٦٤٢ - **نَمَسِي** °
Palpifère, Palpifère (F).
Palpifer (E).

نمت تمريني يطلق على كل عضو حشري أو لثائي يحمل لمساً أو يقوم بوظيفة اللمس أو يشبه اللمس .

٢٧٦٤٣ - **نَمَح** °
Aile (F). Wing (E).
ملح الطائر جناحه . ويقال لجناحي الطائر **نَمَحاً** .

٢٧٦٤٤ - **نَمَكَة** °
Trompe de l'éléphant (F).
Trunk (E).

هي خرطوم الفيل يتلمس به الطعام ولها ويستعمله في الدفاع عن النفس وفي نقل الاثقال .

٢٧٦٤٥ - **نَمَسِيوم** °
Melanthium (S).
Mélante (F). Melanthium, Bunch flower (E).
Braunblümchen (D). Melanthio (I).

جنس نباتات صفولية معمرة من السورنجاتيات . أزواحه المرفوعة ثلاثة ترهب في المواقع الرطبة الظليلة . سوقها نخلة تعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم . تنتهي بالعتايد الزهرية التي يراوح ارتفاعها من ٥ إلى ١٠ سم . أزواكها قديمة ، ضمية ، كثيرة العدد تطول من ٢٠ إلى ٣٠ سم . وتعرض من ٦ إلى ١٨ م . انزادها الى البياض الاضر المالح || انزادها ينضج من ايار الى تموز . وصغير صقلها مع مطلق المواد السكرية ، يشغل اللباب .

٢٧٦٤٦ - **نَمَسَكُونيس** °
Melanconis (S).
جنس فطور مجهرية من الرغيات ، راجع رفة .

٢٧٦٤٧ - **نَمَهَاب** ° ، **أَلْهَب** °
Lance-flammes (F). Flame thrower (E).
آلة تصدر اللهب وتلقفه وهي تستعمل خاصة في مكافحة الجراد .

٢٧٦٤٨ - **نَمَهَب** °
Pyracanthus (S).
Pyracanthus (F).
جنس طير من الجوارث سليات المتناثر وفضيلة القسويات . انواعه المرفوعة نحو ٦٠ أصنافاً تمتد من المكسيك الى البرازيل || اجسامها صغيرة . رؤوسها متوسعة بطوار تشرف على التفتن . ألوانها متراكبة الالوان الزاهية الجميلة يكثر فيها الاحمر الصانق الشبيه بلهب النار || قوتها الحشرات الصغيرة والنبات والحوار .

٢٧٦٤٩ - **نَمُونَا** °
Colorimètre (F).
Colorimeter (E).

هو مقياس اللون ، جهاز تقاس به ألوان السوائل لا سيما المحر اذ يمتزجها نور النهار .

٢٧٦٥٠ - **نَمُورَة** °
Salinité, Salure (F).

Salinity, Saltiness (E).

٢٧٦٥١ - **نَمُورِيَة** °
Corchorus olitorius (S).

Corète potagère, Corète potagère, Guimauve potagère, Mauve des juis, Mélochie (F). Jew's-mallow, Nalta jute (E). Judenmalve, Meluchie (D). Corcoro ortense, Mahla del giardino (I).
ويهم من قال « ملوكة » . نبات حشبي يقلى حولي من فصيلة الرزفريات . يزرع لأوراقه المطبوخة التامة التي تقيد المسقة والامعاء . عتابلات زراجه تربة مروية غرارة خصبة يكثر فيها حصر الأوزت الغصوي أو اللعني .

٢٧٦٥٢ - **نَمُود** °
Melo (S). Mélé (F).

Oil beetles (E). Mäurwürmer, Ölkäfer (D).

جنس حشرات من الملويدات . انواعه المرفوعة ١٢ أصنافاً المناطق المعتدلة الحارة من العالم القديم . اجسامها تطول من ١٠ الى ٤٠ م . ذكورها اصغر قدماً من انثاها . أثوابها تراوح من الزرقة الى السواد الغصبي . يكثر وجودها في المراعي على الاعشاب البرية من نيسان الى حزيران .

٢٧٦٥٣ - **نَمُود مَلُون** °
Melo variiegatus (S).

Méléo variable (F).

نوع من الملوذ ، ثوبه الى الزرقة الخضراء الملوحة ، حشرات رأسه وكعوله وسك بطة الى الحفرة السوداء . الأكار طويل نحو ١٢ م . والأناث نحو ٣ م . || يكثر وجوده في نيسان وايار . مسره الاعشاب والمراعي والازهار البرية .

٢٧٦٥٤ - **نَمُودِيَات** °
Meloidae (S). Méléoïdes (F).

Meloidae, Blister beetles (E). Blasenkäfer, Pflanzentkifer (D).

فصيلة حشرات من مخفيات الاجنحة . اجسامها وانواعها عديدة ، جميعها ملوذة صغيرة اللثة أو متوسعة ، بعضها طلي . مرتفعها الإفتقار والازهار والاعشاب . تفرز ، عنه لسها ، مادة صفراء اللون كريهة الرائحة . شواربها ويهازها للسوي يحويان مادة نافذة تنج الجلد وتثير الياء || قرنسها الاستشعارية صولجانية ، مركبة من ٩ الى ١١ فاسلة . ارسلها خمسة التركيب باستثناء الخلفية فاتها رباعية المغاسل .

٢٧٦٥٥ - **نَمُور** ° ، **نَمُورُون** °
Malurus (S).

Malure, Mérion (F). Malurus (E).

جنس طير من الجوارث سليات المتناثر . انواعه المرفوعة نحو ١٥ أصنافاً بلاد استرالية . ملجتها الحياتي جامي . جاماتها قليلة العدد . جميعها من الارباب تألف الاجراج الميمرة الاشجار والبراري النفضة . قوتها الحشرات اصعب الحنطة والذئب والذئبان وبعض الثآليل البرية || اجسامها صغيرة تطول من ١٢ الى ١٦ م . تتميز بانساخته اذناها وبكثافة سبالها . ألوانها متباينة الالوان فيها الاسود والاعضر والامس والاعضر الزهري والجزوي والكتني والاشهب والاطمل والاشمع . أثواب الاناث لا تختلف عن اثواب الذكور لكنها اقل زهاء ولعة || تدفن امشاشها في الاذغال . انثاها تحضن نحو ٦ بيضات على مرتين في الحول . الذكور تتارب الاناث في الحضن .

٢٧٦٥٦ - **نَمُور** °
Chêne égllops (F).

هو السفيان الروسي ، اطلبه .



مليوس



ملهب



ملوشية



ملون ملون



نمور

اعطائها بحيرات وانهار الهند الصينية وقد انتشرت تربيتها في الاكوادور يوم نظراً لجمالها وصغر قدمها لانها لا تطول اكثر من ١٠ سم. ثوبها زبرجدي اللون مجزج بالاصفر والاخر. الذكر يجمع مره الاثني تحت قبة عاتمة يصنعها من التسلالة والماء ويحافظ عليه دون انقطاع حتى التفت والانسلاخ.

٢٧٦٦٩ - ملكيك Régulus (F). Regulus (E). الملكيك نجم ثير من كوكبة الاسد الاصفر. يوجد من الارض نحو ٦٥ سنة ضوئية.

٢٧٦٧٠ - ملكيكة ، جمل Abeille mère, Ab. femelle, Reine (F). Queen bee (E). الملكيكة او الجمل الانثى الكاملة الشوار لشقي من النحل. تتميز بجسمها الابيض المستطيل. وظيفتها منع المازن للمحافظة على استمرار النسل والتكاثر النوعي || تساند مرة واحدة في حياتها وتعيش نحو خمس سنوات تمتع بخلها ملايين المازن.

٢٧٦٧١ - ميليتر Millimètre (F). Millimetre (E). جزء من الف من المتر.

٢٧٦٧٢ - ميليكرن Millimicron هو جزء من اصل مليون جزء قسم اليها المليمتر الواحد.

٢٧٦٧٣ - مكن Melléine (F). سائل يتسخر من تكثير قصبات الروام ويستعمل في تشخيص هذا المرض في الحبل.

٢٧٦٧٤ - مكن Laxatif (F). Laxative, Opening (E). سهل خفيف.

٢٧٦٧٥ - مكنية Mélinet (F). هي السرته، عشية مدبرة طيبة ، اطليها.

٢٧٦٧٦ - مكيولا * Meliola (S). جنس فطور مجهرية من فصيلة الوثنيات. انواعه عديدة معظمها من فطور المناطق الاستوائية. مشيها غليظ الشكل اسمر اللون دقيق الاهداب المشعشة اطراف يدب على بشرة الانسان والافان والاورق ويتركز بمراشف ينقلها في النسيج. اصابته الخارجية مكررة الشكل تلحف ازقاً عديدة تحضن البويضات. بويضاته ، عند الادراك ، سمراء اللون اهليجية الشكل لا قياسية الانقسام الجوي المتفرس.

٢٧٦٧٧ - مكنين Million المليون : الف الف.

٢٧٦٧٨ - مكنين متر Mégamètre (F). Mégaméter (E).

٢٧٦٧٩ - مكنانة ، شوكية Mimétisme (F). Mimesis, Mimicry (E). راجع شوكية.

٢٧٦٨٠ - مكنال Identique (F). Identical (E).

٢٧٦٨١ - مُماد الماء : المروي من النبات.

٢٧٦٥٧ - ميلاف Filandreux (F). Fibrous, Stringy, Thready (E). نمت تعريف يطلق على ما كان كثير الالياف من التار واللحم وغيرها.

٢٧٦٥٨ - ميليب * Maeliben (S). Méléibe (F). Maeliben (E).

جنس دويبات بحرية من الرخويات مديات الازبل وفصيلة التيتيسيات. انواعه الماصرة المعروفة قليلة العدد اعطائها معظم بحار البلاد احارة || اجسامها هراطة مستطيلة مبطلة ، تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. رؤوسها كبيرة محجمة الشكل يملوها في نغمها من منتصف الرأس الى طرف الجسم بعض الحليقات النقيقة || لونها الى الشبهة السمر. حليقاتها شديدة السمر. اولها صغيرة ، قليلة العرض ، مستديرة الاطراف.

٢٧٦٥٩ - ميليت سفث شجر المرخ.

٢٧٦٦٠ - ميليت * Meleto (S). Meleto (F). Melet (E).

جنس اسماك بحرية من مفتوحات المثانة وفصيلة الصابونيات. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها صغيرة ، شبه وشمية الشكل ، تطول من ١٠ الى ١٨ سم. رؤوسها معتدلة الجرم ، صغيرة الاضطام والاشداق. زعانفها الظهرية فردية تتوسط الظهر. الخوضية شديدة الصغر تقابل الظهرية. اما الذيلية فطاقة. انوثها تراوح من الزيدة الفضية الموانج الى الشبهة الرصاصية. اشهر انواعها الثلاثة التالية :

٢٧٦٦١ - ميليت المتوسط Meleto phalerica (S). Meleto de la méditerranée (F). نوع من المليات. يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط. لحمها جيد الصفت || تستعمل استهلاك السردين.

٢٧٦٦٢ - ميليت مبدولة Meleto spratus (S). Meleto commune (F). نوع من المليات. يكثر وجودها في المحيط الاطلسي. تستعمل استهلاك السردين والبلح.

٢٧٦٦٣ - ميليت سافنة Meleto venenosa (S). Meleto vénéneuse (F). نوع من المليات. يكثر وجودها في المحيط الهندي. لحمها ذائب الدم ميت.

٢٧٦٦٤ - مليمج الجدي الرضيع. ج. ملح.

٢٧٦٦٥ - مليعكة Blongios nain (F). هي الواق الصغير ، الحلبه.

٢٧٦٦٦ - ميليغرام Milligramme (F). Milligram (E). جزء من الف من الغرام.

٢٧٦٦٧ - ميكياف Poisson-cheville (F). المكياف سمكة بحرية تدعى سقره ، اطليها.

٢٧٦٦٨ - ميكيكة * Macropodus (S). Macropode, Poisson de paradis (F). Paradis fish (E). سمكة نهريه وصيلة الجنس والنوع من كثرات الزمانف.



ميت



مليكة



مليولا

Retenus (F). Reserved (E). **مَمْسُك** ٢٧٧٠٠
حاجز طبيعي أو اصطناعي قليل الارتفاع يترسّس بجري
مسح الماء. ج. مَسْك .

Cocher (F). Auriga (E). **مَمْسُك الأَعرِنة** ٢٧٧٠١
مسك الاعنة كوكبة نجوم خالية الموضع تسمى أيضاً ذو
الاعنة ، اطلها . ومنهم من سماها الثائر .



مسح

Râteau (F). Rake (E). **مِمْسَاط** ٢٧٧٠٢
أداة يدوية تستعمل في تمهيط التربة قبل سفلها .

Telleuse, Tillieuse (F). **مِمْسُكَة** ٢٧٧٠٣
Scutcher, Scutching-machine (E).
آلة تقشر سوق القنب والكتان فتفصل عنها المشقة .

Pholadidae (S). **مِمْسَآت ٥** ٢٧٧٠٤
Pholadidés (F). Pholadidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم .
اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد موطنها جيع بحار
العالم . اصداؤها صغيرة لاقامية الشكل يكثر فيها اللون
الابيض والافير والبني . اجسامها مجهزة بمصمات
اسطوانية الشكل . تعيش لاصقة بالاشعاب والصخور ||
اعرف انواعها واشهرها الميمسكة .

Pholas (S). **مِمْسَكَة ٥** ٢٧٧٠٥
Pholade (F). Pholas (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم ،
وفصيلة المصمات . انواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة
في معظم بحار العالم . تعيش على الصخور والاشعاب
المعمورة ومن ميزاتنا انها مجهزة بصد لسفورية تمكها في
الاشعاع || حولها مأكولة جيدة الصنف وقد تكون شائعة .

Siphonae (S). **مِمْسَآت** ٢٧٧٠٦
Siphonées (F). Siphonae (E).
هي للتصبيات ، فصيلة من الخفيات الخضر .

٢٧٧٠٧ **مِمْسَاط** ، **مِمْسَاط المطر** ،
Pluviomètre (F). **مِقْبَاس المطر**
Pluviometer (E).

جهاز يستعمل لقياس ارتفاع المطر الساقط في مكان ما .

Ductilité (F). **مِمْسُولِيَّة** ٢٧٧٠٨
Ductility (E).
قابلية المثل .

Irrigué (F). **مِمْسُون** ٢٧٧٠٩
Irrigase (E).
يسقى بالماء الجاري . يقال شجر يمّون وزراعة ميمونة .

٢٧٧١٠ **مِمْسُك** للثعلب الحمراء الثمر .

Bifère (F). **مِمْسِيل ٥** ٢٧٧١١
Biferos (E).
نمت ثمريني يطلق على كل نبات يزهر ويثمر في عام
واحد مرتين .

Salaisons (F). **مِمْسَلَات** ٢٧٧١٢
Salt provisions (E).
المأكولات التي تحفظ بطريقة التليح .

Rouleau (F). **مِمْسَلَة ، مِمْسَلَة** ٢٧٧١٣
المسلة والمعلقة هما للآلة ، اطلها .

Croisement (F). **مِمْسَاكَة** ٢٧٧١٢
Crossing (E).
هي التصاب والكوفة ، راجعها .

Tangente (F). **مِمْسَاس** ٢٧٧١٣
Tangent (E).

٢٧٧١٤ **مِمْسَاس التمام ، نظير التمام**
Cotangente (F). Cotangent (E).

Tangential (F). **مِمْسَاسِي** ٢٧٧١٥
Tangencial (E).

Gradient **مِمَال** ٢٧٧١٦
هو فرق الصلص الجوي الحاصل بين نقطة ما معينة وبين
محور الاصهار . ج. مالات || الممال الضيف يبيب
الزوايح .

Dédifférenciation (F). **مِمَالِيَّة ٥** ٢٧٧١٧
في المغالسة ، اطلها .

٢٧٧١٨ **مِمْسَخَاس ، مِمْسَخَس ، مِمْسَخَكَة**
Délaiteuse, Baratte (F). Churn (E).
آلة نابذة تفصل الكثرة من الخيض . راجع ابريج .

Bécard (F). **مِمْسَكِر** ٢٧٧١٩
Bastard (E).
كل حيوان يتحل بخلق أو صفات نوحية دون خلق أو
صفات اباله واجلأده .

Paracel (F). **مِمْسَر** ٢٧٧٢٠
Paracel (E).
فلج رجب بين الخشاف البحرية متدل القود أو يميده
يسمع بمرور البواخر والسفن .

Hâtit (F). **مِمْسَاح** ٢٧٧٢١
Forward (E).
هي صفة التربة التي تسوق النباتات ليسرع في ادراكها .

Coulard (F). **مِمْسَاط** ٢٧٧٢٢
المراط والمصفاة والمشار هو كل نبات معرض لسقوط
الزهر أو اعملاص الثمر بعد العقد .

٢٧٧٢٣ **مِمْسَاط** راجع خصب .

Grande chéldoine (F). **مِمْسَرَان** ٢٧٧٢٤
هو حروق الصباين ، اطلها .

Macréteur (F). **مِمْسَرْت ، مِمْسَرَس** ٢٧٧٢٥
Macerator (E).
آلة لمرث تستعمل في معامل النشا والسكر والتعليق .

Souille (F). **مِمْسَرَح ٥ ، مِمْسَرَح ٥** ٢٧٧٢٦
Wallowing-place (E).
كل مكان مستنقع تتصرف فيه الايائل والظباء والخنازير .

٢٧٧٢٧ **مِمْسَرَعَة**
المسرعة هي المي الاهور ، اطلها اهور .

Brasserie (F). **مِمْسَرَّة** ٢٧٧٢٨
Brew house (E).
هي المعمل الذي تصنع فيه البيرة .

Graphomètre (F). **مِمْسَاح ٥** ٢٧٧٢٩
Graphometer (E).
مقياس المساحة ، جهاز يمكن من قياس الزوايا والمساحة .



ممسكة



مطار

٢٧٧٤٦ - مَنَازِلُ القمر (F). Nucleola (F). Nucleolus (E).

النواة النورية الرئيسية. وضو التمثال في الخليات.

٢٧٧٤٧ - مَنَازِلُ القمر (F). Monine, Guenon (F).

She-monkey (E).

لثة اثنى القرد. ومن اسمائها القردة والدمية والالفة.

٢٧٧٤٨ - مَنَازِلُ القمر (F). Munna (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات العليا متساويات الاصل وبصيلة النوبريات. انواعها المدروسة قليلة العدد منتشرة في البحار الشالية || اجسامها صغيرة مبططة، مستعرضة الرؤوس، كبيرة العين الجاحظة. قوائمها متساوية الشكل والبطيل باستثناء الزوج الامامي الاول المتحول الى ملاحظ فكية.

٢٧٧٤٩ - مَنَازِلُ القمر (F). Pâturage (F).

هو المصنع، اي المرعى الطبيعي.

٢٧٧٥٠ - مَنَازِلُ القمر (F). Pore de la peau (F).

Pore of skin (E).

ج سنانع. والمناخ هي المناظ المحيرة الطبيعية الموجودة في بشرة الجلد عند الانسان والحيرلن.

٢٧٧٥١ - مَنَازِلُ القمر (F). Gerموir (F). Hot-bed (E).

اذاذ ومعالجة توضع فيها البزور المطلوب انتاشها.

٢٧٧٥٢ - مَنَازِلُ القمر (F). Usufruitier (F).

Usufructuary (E).

هو الذي يملك حق الانتفاع.

٢٧٧٥٣ - مَنَازِلُ القمر (F). Falsances (F).

Dues (E).

ما يزداد من المنافع حل حصة صاحب الارض.

٢٧٧٥٤ - مَنَازِلُ القمر (F). Chenopodium vulvaris (S).

Vulvaire, Anserine folide, Arroche puaute (F). Stinking goose-foot, Dog's orache (E). Stinkender Gäusefuss (D). Chenopodio fecido, Atriplices puzzolans (I).

نبات كبريه الرائحة من فصيلة السرمقيات. اوراقه متداقية متفكة كالطهارة اللون. ازهارها عنقودية التجميع تحوي مع اوراقه بعض المواد الصمغية والشمعية القليلة ككربونات الامونيوك ونيترات البوتاس التي تلغض فيها الرائحة الكريهة.

٢٧٧٥٥ - مَنَازِلُ القمر (F). Prégermée (F).

صفة البزور التي دخلت في طور التصعد او البروز قبل وضعها في التربة.

٢٧٧٥٦ - مَنَازِلُ القمر (F). Coulard (F).

هو المرطاب، راجعه.

٢٧٧٥٧ - مَنَازِلُ القمر (F). Cheiranthus (S).

Giroflée (F). Gilliflower (E).

الاسم العلمي من العربي. والحريي جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الصليبيات. النواحه ١٢ منها الحولية والحولية والمعمرة. سوقها خشية خشوية. اوراقها متداقية بسيطة سنائية. ازهارها عنقودية التجميع صفراء اللون او حمراء || والمنتشر اسم شامل يطلق ايضاً على اللتيلو الشبيه به.

٢٧٧٤٥ - مَنَازِلُ القمر (F). Etapes de la lune (F).

Stage of the moon (E).

منازل القمر ثمانية وعشرون. ينزل القمر كل ليلة بواحد منها من مستهل الى ثمانية وعشرين ليلة من الشهر. ثم يكون الحاقق. فان كان الشهر تسماً وعشرين يوماً استمر ليلة ثمان وعشرين وان كان ثلاثين استمر ليلة تسع وعشرين. والعرب تقسم هذه المنازل الى قسمين وقسم اربعة عشر منها شامية وارابعة عشر بجانية. فالشامية، بترتيب قولها، تبعد في الشهر ثم البطين والثرى والدبران والمهقة والهمدة والذراع والثرثرة والطرف والجبهة والزريرة والصرقة والمواء والسالك اما البانية فارها للفرق ثم الزبانا والاكليل والقلب والثرثرة والتمام والبلدة وسعد الدايح وسعد بلع وسعد السعد وسعد الاخبية والفرع الاول والفرع الثاني وتنتهي ببطن الحوت المعروف ايضاً بالرشاء.

٢٧٧٤٥ - مَنَازِلُ القمر (F). Organes reproducteurs (F).

Reproductive organs, Sire organs (E).

هي الاعضاء التناسلية في الحيوان عامة.

٢٧٧٤٦ - مَنَازِلُ القمر (F). Immunité (F). Immunity (E).

سلامة الجسم من الامراض وقوته الدفاعية. والمناعة قد تكون طبيعية او اكتسابية. راجع حصانة.

٢٧٧٤٧ - مَنَازِلُ القمر (F). Résistance (F).

Resistance (E).

٢٧٧٤٨ - مَنَازِلُ القمر (F). Adjudication au rabais (F).

راجع مزاد المنافسة.

٢٧٧٤٩ - مَنَازِلُ القمر (F). Restrained allocation (E).

Adjudication restreinte (F). Restrained allocation (E). نوع من المناقصات لا يكون باب التنافس فيها مفتوحاً لكل راقب بل يقتصر فيها على بعض المتنافسين من تتفهم الادارة بعد استبعاد الآخرين.

٢٧٧٥٠ - مَنَازِلُ القمر (F). Hélophyte (F). Helophyte (E).

نمت تعريي يطلق على كل نبات يعيش وينمو في اوسال المستنقعات غير المالحة.

٢٧٧٥١ - مَنَازِلُ القمر (F). Réimés secondaires, Favillons (F).

Wing secondaries (E).

من ريش جناح الطائر ما يتبع صف القوائم ويتقدم الخواوي. الواحد منكب.

٢٧٧٥٢ - مَنَازِلُ القمر (F). Praticabilité (F).

Praticability (E).

هي التيسير في النج والعمل تسهلاً لائمية.

٢٧٧٥٣ - مَنَازِلُ القمر (F). Manœuvres dolosives (F).

Swindling (E).

اعمال خارجية مادية يخدع بها فاعلها شخصاً آخر. وهي من طرق النش والخداع التي ينص عليها القانون.

٢٧٧٥٤ - مَنَازِلُ القمر (F). Habitat (F).

المكان الذي يلائم هذا النبات فيعيش فيه طويلاً او طويلاً.

٢٧٧٥٥ - مَنَازِلُ القمر (F). Source (F). Spring (E).

المكان الذي ينبع منه الشيء كالماء والنفط الخ...



متة

27768 - منجك
Faucille (F).
Sickle, Reaping-hook (E). أداة يدوية تستعمل الحش .

27769 - منجك ماني
Faucard (F).
Long-handed scythe (E). منجل خاص مستطيل المقبض يستعمل في حش النباتات للمساكنة .

27770 - منجكي
Falciforme (F).
Falcate, Falciform (E). نمت وصني يطلق عل ما كان شكله شكل المنجل .

27771 - منجم
Gisement, Mine (F).
Lie, Loyer, Mine (E). مقلع المدن في جوف الارض .

27772 - منجلكة
Rucher (F).
Stand or shed for bees (E). المنجلكة والصبرة والنحيتة هي مجموعة القران او الخلايا التي يتسكنها النحال .

27773 - منمنع , أزور
Courbe (F).
Graph, Graphic curve (E).

27774 - منمنعي الانفعال
Curvifline (F).
Curvilinear (E).

27775 - منمنحيات الارتفاع
Courbes de niveau (F). Contour lines (E). هي خطوط الراء , راسها .

27776 - منمخاب
Calibreur (F). Jiggerer (E). آلة تشب آثار اي تقريبا وتوزعها بحسب احجامها .

27777 - منمخر
Naseau (F). Nostril (E).

27778 - منمخربات
Foraminifères (F).
Foraminifera (E). رتبة حيوانات دنيا من الجذريات .

27779 - منمخس
Aiguillon (F). Goad, Sting (E). عصا طويلة مسارية الطرف ينخس بها بقر الحراثة .

27780 - منمخسيات
Porte-aiguillons (F). هي المويات , راسها .

27781 - منمخضفة المبيض
Inférovariés (F).
Inferovariés (E). نمت تعريفي توصف به ازهار النبات المنخفضة المبيض من فئة المتحدات القلمات .

27782 - منمخل , منقطف
Blutoir (F).
Botter (E).

27783 - منمذآة
Vaporisateur (F).
Vaporizer, Sprayer (E). جهاز يستعمل لنفخ السوائل وفزها كالكندى .

27784 - منمذآة
Conocéphalus mandibularis (S). Conocéphale (F). حشرة من الجنادب وفصيلة القبطيات . ثوبها ثنائي اللون , اعصر الكوسل والبطن والقران , اسمر الرأس والفرج والسيقان . جسمها صغير اللد يطول من ١٩ الى ٢٢ م . جناحها ملحفان الجسم والسررك والمز . ساقها طولان من ١٦ الى ٢٠ م . مرزها وسرركها مستطيلان جالسان

27788 - منثور أصفر * , خيبري أصفر
Chelranthus chelri (S). Girofée commune, G. jaune, G. de muraille, Carafée, Violier jaune, Ravelle (F). Bleedingheart, Wall-flower, Yellow gillflower (E). Goldlack, Leucoje (D). Violacciocco giallo, Bastone d'oro, Ramo d'oro (I).

نوع من المنثور الأرجبي . مجله سرورية , ممره , فراء , تمل من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقه كاملة منقطة , نصلها بحري اللون , ساني الشكل , خلي البشرة حل صفحته . ازهاره متقودية التجميع , تاجي الايتكان . ازهاره عطرية العرف , صفراء اللون || ازهاره يستمر طوال الربيع والصيف .

27789 - منثور برّي * , شمنم , خيخيم
Matthiola livida (S). Matthiola livide, Girofée livide (F). Gillflower (E). Levkoje (D). Violacciocco (I). نوع من الخيولا البرية الملبارة يظل من ٢٠ الى ٣٠ سم . ازهاره متقودية , طرفية , منقرقة , قليلة العدد , لونها الى الصفرة الزيتية اللامعة يعلوها تليخ شيق اسمر || ازهاره يستمر طوال الربيع .

27790 - منثور شتوي *
Chelranthus Incanus, Matthiola incana (S). Girofée quarantaine, G. d'hiver, Cocardeau, Violier (F). Gillflower, Queen's stock, Stock (E). Gemeine Gartenlevkoje, Winterlevkoje (D). Viola, Fior barco, Fior bono (I).

نوع من المنثور المحولي والحرل وهو بالحققة نوع من الخيولا . سروره واسمره كثيرة العدد . نباتاته تمل من ٣٠ الى ٨٠ سم . سيقها مخشيشة فراء . اوراقها منقطة احليبية الشكل . نصلها بحري اللون , اطحل المولج , خلي البشرة حل صفحته . ازهارها متقودية التجميع يكثر فيها المكس وفي عطرية العرف مختلفة الالوان منها الاحمر والبنياسي والوردي والايض والاصفر والمزق والمخ . ازهاره يستمر من اذار الى تموز .

27791 - منثور قشبي
Girofée des jardins (F). هو الخيولا المكبة , اطليا .

27792 - منج المنج : الماش الاخضر .

27793 - منجا , منجر , منكو , مندا
Manglier (F). Mango tree (E). هي شجرة الايج , اطليا .

27794 - منجآة * , منكآبة , منجآبة
Mangue (F). Mango (E). هي ثمرة الايج , تعتبر من اشد ثمار البلاد الحارة ويقال انها تشط اللم وتفيد الامعاء .

27795 - منجبي
Mangabey (F). هو الحيدل , من القرد البالة , اطليا .

27796 - منجبحركات
Orycteropidae (S). Orycteropidae (F). هي فصيلة الحافرات من رتبة البرد .

27797 - منمجب
Pâturage (F).
Pasture, Grazing (E). هو المتجب , مرج طبيعي اقل حشبا من المرعى .



منثور اصفر



منثور برّي



منثور شتوي



* منجآة

* ٢٧٧٩٧ - منڈوسه البيكيه *

Bruchus brachialis (S). Bruche de la visca (F).
Vetch weevil (E). Zottelwickenkäfer (D).



مثال

لما السرك فسن الحافه الداخليه || وهو من الجنادب التي تألف المراعي والاماكز المشبهه . قوته المواد النباتية اخصها النصف والاوراق .

Appontement (F).

* ٢٧٧٩٨ - منڈوخ *

Flying-bridge (E).

صقالة بحرية تقوم على الركائز تستعمل لشد السفن ، بقلوها ، اليها منه الشحن او التفريغ . ج . منذخ .

Menodora scabra (S). منڈوركة حشيشه

Ménodore scabra (F).

جنبه سمرة وحيدة الجلس والنوع من فصيلة الزيتونيات . مدها المكسك والمناطق المجاورة من الولايات المتحدة الامريكية تزود الثلاثين || سابقا قصيرة تملو من ٢٥ الى ٤٠ سم . فروعها مزواية اوراقها صغيرة شريطية النصل طولها نحو ٢٠ سم . وعرصها ٣ سم . لونها الى اخضر الاسفر اثمارها بويقة صفراء اللون قطرها نحو ٢ سم . || تنمو في يستمر طوال فصل الصيف .

Mandarinier (F).

* ٢٧٧٩٧ - منڈارين *

Mandarin orange tree, Tangerine orange tree (E).
هي شجرة الليمون الاندي اي اليوسني ، اطليها .

Mandarine (F).

* ٢٧٧٩٨ - منڈارينكه *

Mandarin, Tangerine (E).

ثمرة للمندرين اي اليوسني او الليمون الاندي .

Adné (F). *Adnsta* (E).

* ٢٧٧٩٩ - منڈاهيم *

Zygomorpha (F). منڈاهيم الراسيات

Zygomorphus (E).

لعت تمريني يوصف به كل نبات زواكه الزهرية متشابهة متحدة .

Protractor (F). *Protractor* (E). منڈكع

Amaranta tricolore (F).

* ٢٧٧٩٢ - منڈكفور *

هو الظيفة الثلاثية الالوان ، اطليها .

Mendélien (F). *Mendelian* (E).

* ٢٧٧٩٢ - منڈلي *

لعت تمريني يطلق حل كل قاعدة او عملية منتظمة من ملهب مندل الوراثي .

Mendélieme (F). *Mendelliem* (E).

* ٢٧٧٩٤ - منڈليكه *

هي ملهب مندل في الوراثة ، مخلصه ان النبات يتوارث صفات معينة دون غيرها وذلك يقسب بمعدود منضبط لا شذوذ فيها .

Monodora (F).

* ٢٧٧٩٥ - منڈودرة *

ثمرة تسمى حيدلان ، اطليها .

* ٢٧٧٩٦ - منڈوسه البازلاء *

Bruchus pisorum (S). *Bruche du pois* (F). *Pas beetle* (E). *Erbsenkäfer* (D).

حشرة من المنوسيات . طولها يراوح من ٤ الى ٥ سم . ثوبها الى السمرة ، ظهرها مخطط بالابخر ، زفيا حشطي . جيلها الحولي واحد . تركيب البازلاء دون سواها فتشخر الحية وتقيم فيها ولا يربود في الحية الواحدة سوى حشرة او بقعة .

Bruchidius trifolii (S). *Bruche des tréfois* (F).

* ٢٧٨٠١ - منڈوسه النفل *

حشرة من المنوسيات طولها ٢ سم . ثوبها اسود اللون ، ظهرها مخطط بالابخر . قوائمها وزباناها سود || جيلها الحولي واحد ، تركيب مع ريقاتها يطرؤ النفل حل انواحه .

Callosobruchus sinensis (S). *Bruche chinolse* (F).

* ٢٧٨٠٢ - منڈوسه حشيشه *

Cowpea weevil (E). *Chinesischer Bohnenkäfer, Kundkäfer* (D).

حشرة من المنوسيات طولها يراوح من ٢ الى ٣ سم . ثوبها



منڈوسه البازلاء



منڈوسه البيكيه



منڈوسه العدس



منڈوسه الفول



منڈوسه اللوبيه

بحرية اللون. ازهارها ضمنى الشكل ، خاسي التجميع .
ازهارها صغيرة المالحق يضاء اللون ، صناعية الملوحة ،
قطرها يراوح من ٢ الى ٣ سم. تنويرها يستمر طوال
شهر ايار .

٢٧٨١٣ - **مَنْزِيلِيَّة** *
Mentzelia (S).
Mentzelie (F). Mentzelia (E).

جنس نباتات عشبية برية وثرثريية من فصيلة المورزيات .
منها بعض مناطق امريكا ، الشمالية . بعضها فراء تملو
من ٣٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها لاطنة ، متعاقبة . خاسية
التفرع ، مدبة الفلق . ازهارها خشوية ، خاسية
الفصل ، خاسية او حشوية البتلات ، عديدة الاسدية ،
عطرة العرف ، عاجية اللون او صفراء ، تنبلج في الليل
ابتداء من الغروب الى انوارها المرفقة قليلة المدد اشهرها
التالية :

٢٧٨١٤ - **مَنْزِيلِيَّة عَشْرَايَّة البتلات** *
Mentzelia decapetala (S). Mentzelie à 10 pétales (F).

نوع من المَنْزِيلِيَّة . عشية بحولة تملو من ٦٠ الى ١٠٠
سم. ساقها وفروعها كثيفة الاهداب القصيرة . اوراقها
تطول نحو ١٥ سم. ازهارها عاجية اللون ، كبيرة القد ،
قطرها من ١٠ الى ١٢ سم. وهي حشوية البتلات تضم
نحو ٣٠٠ بذلة الى تنويرها يستمر من غمز الى ايلول .

٢٧٨١٥ - **مَنْزِيلِيَّة ليندلي** *
Mentzelia Lindleyi (S). Mentzelie de Lindley (F).

نوع من المَنْزِيلِيَّة . عشية حولية تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم.
ساقها فراء مالة السماء . اوراقها تطول نحو ٧ سم.
نصالحا حلية على الصفحتين . ازهارها بحولة الصفار
الزاهي ، قطرها نحو ٨ سم. وهي خاسية البتلات ، عديدة
الاسدية نحو ١٥٠ الى تنويرها يستمر من غمز الى آب .

٢٧٨١٦ - **مَنْس** *
Méristème (F). Meristème (E).

هو اللسج الانشائي في النبات .

٢٧٨١٧ - **مِنْشَاب** *
Compas de proportion (F).
Proportional compasses (E).

٢٧٨١٨ - **مِنْشَاح** * ، **بولنوز**
Bulldozer
جراة آلية يتسع بها التراب والصخور فتدفع بها جرفاً
من مكان الى مكان .

٢٧٨١٩ - **مِنْشَاخ** *
Pantographe (F).
Pantograph (E).

جهاز يستعمل في نقل الرسوم وتكبيرها وتقليصها .

٢٧٨٢٠ - **مِنْشَر** *
Bec d'oiseau de proie (F).
Bill of the prey (E).

هو منقار كوابس الطير ، يتميز بقوته وانفتاح بصره للبرية
احادة الطوف .

٢٧٨٢١ - **مِنْشَكَة** *
Lame (F). Scale (E).

٢٧٨٢٢ - **مِنْشَف** ، **مِنْشَكَة** *
Van (F).
Winnowing-basket, W.-machine (E).

جهاز يفرغ او آلي يستعمل في نفس الحبوب . لتخليصها
من الاجرام .

اسود اللون يملو بقع بيض جليلة الارتسام الى جيلها
الحولي واحد . تركيب مع رققات القندس والحصى ولقاصواليا
فتنشر الحب وتعلبه .

٢٧٨٠٣ - **مَنْدُوسِيَّات** *
Bruchidea (S).

Bruchidea (F). Bruchidea (E).
فصيلة حشرات من رتبة تمديدات الاجنحة . اجناسها
وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد ، زياء الجسم ، خشبية
الترك . قرونها الاستشعارية مركبة من ١١ فاصلة لكنها
غثيفة الاشكال يكثر فيها انجيلي وللشاري والشلطي
والصولياني . اجماعها لا تلتصق كآمال الجسم . ارسافها
خاسية تتكون ، رباعية المظهر الخارجي . مكها ذري
القدر ، يضي للشكل ، اصفر اللون ، تمتصه الانثى على
الازهار والثمار والحبوب فينتف عن رققات دقيقة غبراء
اللون تمتص على البار والحبوب فتنتشرها وتنتسج فيها وتتحوّل
الى حوريات فحشرات كاملة .

٢٧٨٠٤ - **مَنْدُولِي** *
Mansa (S). Mendole (F).

جلس اسماء بحرية من فصيلة المنطويات . انواعها المرفقة
اصحابها المتوسط . جميعها صغيرة القد تملو من ١٨ الى ٢٢ سم
تتميز بزمارتها الظهريّة الفردية للسقطلة وزمارتها الشربية
القارعة الى اشهر انواعها المتنوعة المبلولة ، اطباء .

٢٧٨٠٥ - **مَنْدُولَة مِيدُولَة** *
Mansa vulgaris (S). Mendole commun, Amendoula,
Matasoudale (F).

نوع من المنطول وهي سمكة مبلولة في المتوسط . جسمها
اهليلجي الاشكال يملو نحو ٢٠ سم. قرونها فصي اللون ،
ظهورها حابق للتضيض تملو خطوط سم .

٢٧٨٠٦ - **مَنْدُولِيَّات** *
Ménidas (S).
Ménidas (F). Menidas (E).

فصيلة اسماء بحرية من شالكان الزعانف ، اجناسها
وانواعها عديدة . اشهرها المنطول والشمادام .

٢٧٨٠٧ - **مَنْدِي** *
Sennopithèque (F).

نوع من القرد المقتمة يمدى حيار ، اطباء .

٢٧٨٠٨ - **مَنْدِيلِيَّة** * ، **مي قيمان المروج** ، اطباء .

٢٧٨٠٩ - **مِنْزَحَة** ، **مِنْزَع** *
Drain (F).

Drain-pipe (E).
منزعة . ج. منازح ، قناة تستعمل لتضيض التربة اي
لصرف مياهها الزائدة .

٢٧٨١٠ - **مِنْزَع** ، **مِنْزَل** *
Tendance (F).
Tendency (E).

٢٧٨١١ - **مِنْزُوع المَلِكِيَّة** *
Exproprié (F).
Expropriate (E).

هو البقار التي زعت ملكيته من يد صاحبه .

٢٧٨١٢ - **مِنْزِرَة** *
Menziesia (S).
Menziesie (F). Menziesia (E).

نبات معقود التعريف على اسم العلامة الانكليزي وارشيلا
منزي . جنس جنات صغيرة معمرة من فصيلة الملتحيات
مهدا امريكة للثالية . انواعها المرفقة قليلة العدد الى
سوقها فراء تملو من ٥٠ الى ١٨٠ سم. اوراقها عابطة
متعاقبة . نصالحا اهليلجية مسطيلة . صفاتها السفلى



منطولة مبلولة



منزلية



منشاح

٢٧٨٢٣ - منسل ، عُدَّة فتاسيَّة

Gonade (F). Gonad (E).

هي العدة التي تلجج الفلمات وتفرز الهرمونات . لك
خاصية هي المنسل الذكري والمبيض هو المنسل الانثوي
ج منسل .

٢٧٨٢٤ - منسل

Narine de poisson (F).

Nostril of the fish (E).

المنسل ج مناس . هو منخر الاسماك خاصة .

٢٧٨٢٥ - منسل

Aspidium lonchitis (S).

Aspidie (F). Holly fern, Shield fern (E). Schilfern (D). Capelvenere doppio (I).

نوع من السراخس البسيجات المصرة . ضرره عديدة
سبا البرية والزرعيية . يرغب في الارربة الرملية وفي المواقع
الرطبة . اروعته مدادة . اوراقه منتصبه ، مراحه مثله
الزوايا ، زكاته مادمة الغشاء ، لونه الى الخضار الاصفر .
يزرع في المراكب فيجود .

٢٧٨٢٦ - منسيلة

Mancenillier (F).

هي الصابة ، اطبا .

٢٧٨٢٧ - منسوب

Homogène (F).

Homogenous (E).

٢٧٨٢٨ - منسوبية

Relativisme (F).

Relativism (E).

المنسوبية مذهب فلسفي يقول بنسبية المعرفة حتى في
الزمان والمكان .

٢٧٨٢٩ - منشوح

Lizardé (F). Cracked (F).

ما كان التلاح حيه .

٢٧٨٣٠ - منسوي

Méristématique (F).

Meristematic (E).

منطقة التكاثر الخليوي حيث التلج الانشائية .

٢٧٨٣١ - منسية

Trucherau (F).

هي الميفاريقون المعروف ، اطليه .

٢٧٨٣٢ - منشأ

Origine, Source (F).

Origin, Spring (E).

هو مصدر الشيء او منبجه .

٢٧٨٣٣ - منشاة

Amidonnerie (F).

Starch-works (E).

هي العمل الذي يصنع فيه انشا .

٢٧٨٣٤ - منشاح

Plastotype

نعت تعريفي يطلق على كل جزء التي يتأثر بالهبط
فيتطور .

٢٧٨٣٥ - منشكار

Scie (F).

سمكة بحرية من الاشلاق ، مشهورة باسم ابو منشكار .

٢٧٨٣٦ - منشكار

Scie (F). Saw (E).

اداة يدوية أو آلية تستعمل في نشر الاخشاب والمواد
والحجارة الخ .

٢٧٨٣٧ - منشكاري

Serriforme, Serrulé (F).

Serriform (E).

نعت تعريفي وصفي يطلق على كل ما كان تفريص حالته
يشبه اسنان المنشار .

٢٧٨٣٨ - منشكاريات

Pristidae (S).

Pristidae (F). Pristidae (E).

فصيلة اسماءك من رتبة الاشلاق .

٢٧٨٣٩ - منشكاريات

Tenthréonidae (S).

Tenthréonidae (F). Tenthréonidae, Sawflies (E).

Blattwespen, Sägewespen (D).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة . اجناسها
وانواعها كثيرة العدد ، جميعها صغيرة للحد طولا يراوح من
٣ الى ١٥ سم . اولياها مختلفة الالوان . قربها الاستعمارية
خفيفة ١١ ريقاتها دودية عديدة الاربل تحمل عادة دون
البائية او اكثر من ١٦ وهي باكريتها خائبة ومنها
الرائحة والكامرة .

٢٧٨٤٠ - منشكارية ، ذباب منشكاري

Tentredo (S). Tenthrède, Mouche à scie (F).

جنس حشرات من فصيلة المنشاريات ، انواعه نحو ٢٠٠
اكثرها من الحشرات الضارة ، شذام مرزاها منسل كالمنشار
يخرق اصلب اللحاء . ريقاتها ناعمة لا تصف من شيء .
اشهر انواعه اللؤذية ما يتبع :

٢٧٨٤١ - منشكارية السوسن

Rhadinocarsaea micans (S). Tenthrède des iris (F).

نوع من المنشارية ، لها جيلان في الحول ، طولها يراوح من
٧ الى ٩ سم . ثوبها الى السواد اللامع . زباناها قصيرتان .
تظهر في اوائل حزيران ١١ ريقتها اسطوانية الجسم المماس
الاشهب الزيتي . رأسها مستدير الشكل جوزي اللون .
تركب اوراق السوسن لتفذيها اشد الاذى .

٢٧٨٤٢ - منشكارية الكشميش

Pteronidea ribesii (S). Tenthrède du grosellier (F).

Imported currant-worm (E). Gelbe Stachelbeer-
blattwespe (D).

نوع من المنشارية ، اجيالها الحولية ثلاثة . طولها يراوح
من ٦ الى ٨ سم . ذكورها سيد الاطواب لانها صفر .
ريقاتها خضر الاطواب المنشبة بنكت سود . تركب
الكشميش فتلهم كامل نصل الورقة وقد لا تصف من العروق .

٢٧٨٤٣ - منشكارية الفت

Athalie colibri (S). Tenthrède de la rave (F).

Turnip sawfly (E). Kohlrübenblattwespe, Rüben-
blattwespe (D).

نوع من المنشارية ، اجيالها الحولية ثلاثة . طولها يراوح من
٧ الى ٨ سم . ثوبها الى الصفرة . رأسها والقمم الخلفي من
جوشيا الى السمرة . ريقها عمرا ، اللون غيرة المالح يحمل
١٦ زويبا من الاربل . تركب تخلف اوراق الصليبيات
احصها الفت .

٢٧٨٤٤ - منشكارية الورد

Arge rosae, Hylatomia rosae (S). Tenthrède du

rosier (F). Arge rosae (E). Rosenbüschthorn-
wespe (D).

نوع من المنشارية ، لها جيلان في الحول . طولها يراوح من
٧ الى ١٠ سم . رأسها وزباناها سود . جوشيا اسود اصفر ،
بطها وابجها صفر . اجنتها شفافة دودية المالح .
ريقها الى الخضرة الزاهية . تركب اوراق الورد فتفقي
عليها .



منسل



منشارية السوسن



منشارية الكشميش



منشارية الفت



منشارية الورد

Clivé (F). Cleavat (E). ٢٧٨٥٥ - مِشَارِيَّة

Phénomène (F). ٢٧٨٥٦ - مِشَارِيَّة
Phenomenon (E). هو الظاهرة . ج مناشع .

Phénoménisme (F). ٢٧٨٥٧ - مِشَارِيَّة
المنشعية ملعب فلسفي يدعى أيضاً الظاهرية والظهورية .
اطلب ظاهرة .

Narina d'oiseau (F). ٢٧٨٥٨ - مِشَارِيَّة
Nostril of the bird (E). هو المنخر عامة ومنخر الطير خاصة وهما مشقان .

Bisectrice (F). Bisecting (E). ٢٧٨٥٩ - مِشَارِيَّة

Germandrée sauvage (F). ٢٧٨٦٠ - مِشَارِيَّة
هو الاسقرودين البري ، اطلبه .

٢٧٨٦١ - مِشَارِيَّة ، مِشَارِيَّة
Pulvérisateur (F). Pulverisator, Vaporizer (E).
آلة تستعمل لنضج الادوية السائلة على النبات . ولماضيج
مختلفة الاشكال والاحجام ولتصاميم وقد تكون آلية أو
يدوية .

Schiste (F). Schist, Slaty rock (E). ٢٧٨٦٢ - مِشَارِيَّة
هو حجر الشيست . راجع شيست .

Coercible ٢٧٨٦٣ - مِشَارِيَّة
ما كان قابلاً لفصل كالبخار وغيره .

Megaderma (S). ٢٧٨٦٤ - مِشَارِيَّة
Mégaderme (F).

جلس حيوان من فصيلة الحوريات . انواعه اربعة تتميز
بفراطيسها الطويلة الذلقة ، وزوالها المنخرية الشافرة ،
بامتطالها ورجاحة بساطها الغشائي ويغطوها من الذنب الظاهر .
كما انها عادمة التناثا العلوية ، أما نواجلها فمخمس .
اجسامها صغيرة القند طولها يراوح من ٨ الى ١١ سم .
وسطحها من ٣٥ الى ٤٥ سم . أثوابا ربادية اللون يملوها
مربع اصفر يمتد مع اقترابه من ثيج الظهر ١١ مؤلفا
الفرقية الشرقية وسرنديب والهند . تألف الكهوف والملاوير
واليابوت الحربية . تعيش جهامات قليلة العدد . قوتها الحشرات
والديدانيات والضفادع والاسماك الصغيرة .

Polyplodie (F). Polyplod (E). ٢٧٨٦٥ - مِشَارِيَّة
كل خلية تتألف مجموعة نشبا المتشابهة من عدة مناشع .

Aérostatique (F). ٢٧٨٦٦ - مِشَارِيَّة
Aerostatics (E). هي علم توازن الهواء .

Gamme ٢٧٨٦٧ - مِشَارِيَّة
هو سلم سياق الانغام المتتابعة المتناسقة ان صادرة او
هابطة . وهو مدرج تتابع الألوان والمذاقات الخ...

Génome, Haplome (F). ٢٧٨٦٨ - مِشَارِيَّة
مجموعة نطاش او نشب العامة الواحدة .

Zone ٢٧٨٦٩ - مِشَارِيَّة
مساحات من الارضين تخضع لنظام طبيعي واحد وموالم
جوية واحدة .

٢٧٨٦٥ - مِشَارِيَّة بَرَّاقَة

Calliroa limacina (S). Tenthrède limace (F).
Pear slug, Cherry slug (E). Schwarze Kirschtblatt-
wespe (D).

نوع من المِشَارِيَّة ، طولها نحو ٥ سم . ثوبها الى السرة
السوداء ، اجنحتها شفافة . مرزها مستطيل الشفام . اناتها
اكثر حداً من ذكورها تمتد كنها في بشرة النصل فينتفج
من يرقاتها تشبه الزئاق ، لوها الى الحفرة السوداء . تركيب
اوراق معظم الانجسار للشرة قمرى النصل وتنف من
البروق .

٢٧٨٦٦ - مِشَارِيَّة دَمِيحَة

Tenthrède difformis (S). Tenthrède difforme (F).
نوع من المِشَارِيَّة ، متوسطة القند ، غليظة الشكل . طولها
يرواح من ٦ الى ٧ سم . ثوبها الى السرة . اجيالها الحولية
ثلاثة . يرقاتها مؤدية تقضم اوراق الورديات والصليبيات .

٢٧٨٦٧ - مِشَارِيَّة سَوْدَاة

Tenthrède aethiops (S). Tenthrède noire (F).
نوع من المِشَارِيَّة ، صغيرة القند ، طولها يراوح من ٥ الى
٦ سم . ثوبها الى السرة السوداء . اجيالها الحولية ثلاثة .
يرقاتها مؤدية تقطع خضيب النصل على صفحتها العليا .
والبرقة تبدو صفراء اللون غصراء الموالج ثم تتحول رويداً
رويداً الى السرة الخطية فالداكنة .

٢٧٨٦٨ - مِشَارِيَّة مِزْرَقَة

Emphytus cinctus (S). Tenthrède à ceinture (F).
نوع من المِشَارِيَّة ، متوسطة القند ، طولها نحو ٨ سم . ثوبها
الى السرة المِزْرَقَة بالاصفر . اجيالها الحولية تراوح من
٢ الى ٣ . يرقاتها ممرء اللون تعيش في الانابيب المَكَاكِ
تدخلها من مواضع القطع على اثر الاشذيب والتقليم .

٢٧٨٦٩ - مِشَارِيَّة مِشَارِيَّة

Tenthrède zonata (S). Tenthrède zonée (F).
نوع من المِشَارِيَّة ، صغيرة القند ، طولها نحو ٥ سم . ثوبها
الى السرة اللامعة المخططة بالاصفر . يرقاتها مؤدية تقضم
اوراق نباتات الفصيلة الوردية اغصانها الورد .

٢٧٨٧٠ - مِشَارِيَّة ، مِشَارِيَّة

Dynamomètre (F). Dynamometer (E).
جهاز تقاس به قوة الانسان والحيوان والآلات الميكانيكية .

٢٧٨٧١ - مِشَارِيَّة كَهْرَبَائِيَّة

Electrodynamomètre (F). Electrodynamomètre (E).
جهاز يركز على ما تمارسه اللقطة من تأثير في التيار
الثابت والمتحرك .

Doseur (F). Dosimeter (E). ٢٧٨٧٢ - مِشَارِيَّة
جهاز يستعمل في التفتيح او التركيز .

Séchoir (F). Drying-sun (E). ٢٧٨٧٣ - مِشَارِيَّة

المكان المهد لنشر وتجفيف اوراق التبغ في الشمس وهو
يعني أيضاً الاجهزة المختلفة التي تنشر عليها مشاكيل التبغ
الاخضر رويداً تجف الاوراق اغصانها المناسخ الطويلة
والملبوجة والتمالة .

Sierie (F). Saw-mill (E). ٢٧٨٧٤ - مِشَارِيَّة

هي معمل نشر الخشب وصناعتها .



مِشَارِيَّة بَرَّاقَة



مِشَارِيَّة سَوْدَاة



مِشَارِيَّة مِزْرَقَة



مِشَارِيَّة مِشَارِيَّة



مِشَارِيَّة يَدَوِيَّة



مِشَارِيَّة آليَّة



مِشَارِيَّة

Manguier (F).

٢٧٨٨٤ - منقاع

هي شجرة الانج ، اطبا .

Manganate

٢٧٨٨٥ - منقاعات ، منقعات

المنقات هي املاح الحامض المنتيكي .

٢٧٨٨٦ - منقبيزا ، منقبنيس ، منقبنيز

Mangandao (F). Manganose (E).

مدن اشهب اللون شديد الصلابة واللعة قابل الصقل.

وزنه (Mn - م) وزنه الانج ٤٤,٩٣ غم قلته الانج ٧,٢

يحلل الماء في ١٠٠ سم. يصهر في ١٢٢٥ سم. ويحل

في ١٩٠٠ سم. وهو يوجد في الطبيعة حل هيئة مركبات

كهاوية اخصها الاوكسيدات والكرونيات ، ويوجد انفساً

في معظم التبعج النباتية ولكن بمقادير ضئيلة كما يوجد في

جميع الارربة بلذات للتب الضئيلة || يستعمل ويستعمل

صناعياً في عدة تراكيب اخصها الصلب .

٢٧٨٨٧ - منقو

هو الانج ، اطبا .

Mangifera (S).

٢٧٨٨٨ - منقيبات

Mangifera (F). Mangifera (E).

سبط من البلميات ويهم من جعلها فصيلة مستقلة .

Soufflet (F). Ballows (E).

٢٧٨٨٩ - منقاع

اداة ينفخه تستعمل في ذر المساق الزراعية .

Soufreuse (F).

٢٧٨٩٠ - منقاع كبريت

Sulphurator (E).

اداة تستعمل في ذر مساق الكبريت .

Callette (F).

٢٧٨٩١ - منقحة ، فون

Rennet (E).

جزء من معدة الفترات .

Préure (F). Rennet (E).

٢٧٨٩٢ - منقحة

هي المسوة ، خيرة قابلة للربان ، تستخرج من منقحة الجدي

الرضيع ، تستعمل في تجبن الحليب .

Exécuteur (F). Executor (E).

٢٧٨٩٣ - منقذ

هو من قام بالتنفيذ .

Exécuteur testamentaire (F). Executor (E).

٢٧٨٩٤ - منقذ الوصية

هو الذي يمتص الوصية في الوصية ليضد ما جاء فيها .

Déodactyles (F).

٢٧٨٩٥ - منقصلات الاصابع

احد قسي الطيور الجوارح ، يشل عدة رتيبات والميدي

من القصاصات والجناس والافواج .

٢٧٨٩٦ - منقش

لعت تعريف توصف به الدجاجة التي كفت عن البيض .

Egrenouse, Egreulor (F).

٢٧٨٩٧ - منقش

آلة تفصل حب الذرة وبزور تخلف نباتات الكلا من

سطرها ورائيسها وسابها وسفها .

Déhiscant (F). Déhiscant (E).

٢٧٨٩٨ - منقش

لعت تعريف توصف به الاعضاء النباتية التي ينفلق درزها

عند الادراك .

Bec (F). Beak, Bill (E).

٢٧٨٩٩ - منقار ، منقار

الجزء القوي الامامي البارز من رؤس الطير .

Ressort (F).

٢٧٨٩٠ - منطقة الإخصاص

Province (E).

هي المنطقة التي يشغلها اختصاص احدى المحاكم وهي
ايضاً تبين درجة الاختصاص .

Baudrier d'Orion (F).

٢٧٨٩١ - منطقة الجوزاء

Orion's belt (E).

ثلاثة نجوم مستقيمة الصف مركزها في وسط كوكبة الجبار

أي الجوزاء . يندى ايضاً النطاق ولطاق الجوزاء وطاق

الجوزاء ويد الجوزاء .

Zone franche (F).

٢٧٨٩٢ - منطقة حررة

Franked zone (E).

منطقة اقليمية معينة لا تخضع لرسوم الجمركية .

Circonscription foncière (F). Ground circumscription

(E).

٢٧٨٩٣ - منطقة عقارية

٢٧٨٩٤ - منقليات

Castodes (F). Castoda (E).

صف من الدرة الرتيبات .

٢٧٨٩٥ - منقليات

Mniotiltidae (S).

Mniotiltidae (F). Mniotiltidae (E).

فصيلة طير من الجوارح سيات المناقر . اجناسها وانواعها

عديدة اعطاهن تعد من اشد ال امركة الجنوبية والشيالة ||

اجسامها صغيرة قريبة الشبه بالقرقف . اثنائها ملوثة

تكثر فيها الطلعة والياض || ملجها الحياتي زوجي في

زمن التناقص والحسن ثم جامي || قتها الحشرات ويكثا

ويرقاتها واثار البانعة والبنور || تدن في تجاويف الاشجار

من مزين الى ثلاث مرات في الحبل . حفتها اربع

بيضات .

٢٧٨٩٦ - منقاع

Isotherme (F). Isotherm (E).

منظام او ايزوترم . ج منالم : خطوط الحرارة الاقليمية

او العالمية المتساوية التوزيع .

٢٧٨٩٧ - منقش

Détargent, Désertif (F).

Detergent, Deterative (E).

٢٧٨٩٨ - منقش

Perspective linéaire (F). Linear perspective (E).

٢٧٨٩٩ - منق

Crabe (F). Crab (E).

حيوان مائي من القشريات يعرف بالسرطان .

٢٧٩٠٠ - منق

Crabe à laine (F).

هو الخيول دويبة بحرية من القشريات ، اطبا .

٢٧٩٠١ - منقش

منقش النهر ثلاثة انجم ثيرة متتالية من كوكبة النهر

المرفقة ايضاً بكوكبة اريادانس . موقعها في المنقش

الذي قلهر .

٢٧٩٠٢ - منقش

٢٧٩٠٣ - منقش

راجع ملتويات الاجنحة .



منقاع



منقاع كبريت

مترابكة اللؤلؤ الساطعة. قوتها الثَّار والبذور وبعض الحشرات || اعرف انواعها واشهرها المتكان الطويل الذهب والمتكان الزاهب .

٢٧٩١٤ - مَنَكَّان رَاهِب * (S). Pipra monacus
(F). Manakin moine (F).

طائر من المتكان . موطنه بعض مناطق البرازيل . يألف الثَّبات . فوجه لا يتجاوز ٢٠ زوجاً || جسمه صغير اللد ، ربة ، يطول نحو ١٥ سم . ثوبه الملوي الى السواد الاصفر الملاج . ثوبه السفلي الى البياض الاصفر . يتميز بقلده صوته التي تتنفع وتنتفش عند الطلب فتبدو كاللحن وهو ما دعي الى كنيته بالراهب . متقاده صغير الحجم ، ذلق الطرف السن . حقله عينه عسلية اللون . جناحه قصير وذنبه كذلك . رصده دقيقان ، ربهان ، احمران || اخلاقه ربة لكنه كثير الرجل وشدي الحلو . قوته الثَّار البانمة وبعض الحشرات || يذبح صف في الاشجار القليلة الارتفاع . الاثنى قضع من ٢ الى ٥ بيضات تحضنها بمنابرة الذكر نحو ١٥ يوما .

٢٧٩١٥ - مَنَكَّان طَوِيل الذَّئِب * (S).

Pipra candata (S). Manakin à longue queue (F). طائر من المتكان . موطنه بعض مناطق البرازيل . يألف الثَّبات الرطبة . فوجه لا يتجاوز ٢٠ زوجاً || جسمه صغير اللد ، ربة ، يطول نحو ١٧ سم . ثوبه الى الزرقة البياوية . جبهة ولق رأسه الى الحمرة الزاهرة . حمراء وعتقه ويتاحاه وذنبه الى السواد الاسم اللامع . ذنبه مستطيل الشكل ، مستدير الطرف . حقله عينه الى الحمرة القزونية . متقاده صغير الحجم ، ذلق الطرف السن . رصده دقيقان ربهان ، حقله عينه الى ثوب الاثنى الى الخفسار الزهبي السوي . ثوب الصغار حق التسخير الاثى لا يختلف عن ثوب الاثنى || اخلاقه هنية لكنه كثير الرجل والحلو . قوته الثَّار البرية والزراعية والحشرات . طيرانه قصير الشوط يكثر فيه السيف والتصعيد والتبسط || يذبح صف في الاشجار القليلة الارتفاع عند اطراف الاغصان . الاثنى قضع من ٢ الى ٥ بيضات تحضنها بمنابرة الذكر نحو ١٥ يوما .

٢٧٩١٦ - مَنَكِب الْجَوَاز * (F). Bétégeuse (F).
(E). Bétégeuse (E).

منكب الجواز نجم ثَّار يرتقالي القرن من المرتبة الاولى . مركزه حل منكب الجبال البني اي الشرقية . يبعد عن الارض نحو ٣٠٠ سنة غربية .

٢٧٩١٧ - مَنَكِبُ الفَرَس * (F).

منكب الفرس نجم ثَّار من كوكبة نجوم الفرس الاعظم .

٢٧٩١٨ - مَنَكِب ذِي العِثَان * (F).

كوكب .

٢٧٩١٩ - مَنَكَّة * (F).

Brunfelsia hopeana, Franescea uniflora (S). Manaca (F). Manaca tree (E). Manakakraut (D).

الاسم العربي كالفربي واللاتكليزي واللاتي ترمب الاسم البرازيلي . شجرة طيبة برية وتربيتية من فصيلة الباذنجانيات . مهدا بعض مناطق امريكا الجنوبية اغصانها البرازيل || ساقها فروعا تملو نحو اربعة امتار . اوراقها متعاقبة ،

٢٧٩٠٠ - مَنَقَار الدَّجَاجَةِ * (F).

منقار الدجاجة نجم ثَّار من كوكبة الدجاجة .

٢٧٩٠١ - مَنَقَار الفُرَاب * (F).

منقار الفراب نجم من كوكبة الفراب المعروفة ايضا بانحاء البالي .



منقارية

٢٧٩٠٢ - مَنَقَارِيَّات * (S). Limnanthaceae (S).

Limnanthaceae (F). Limnanthaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلتين . اجناسها وانواعها قليلة العدد ، جميعها احشاب متعمية ، معظمها حولي ، اوراقها مركبة مستطيلة الزناد . ازهارها فردية ، خاسية البتلات ، عشارية الاسدية . ثمارها حنينة صغيرة القد .

٢٧٩٠٣ - مَنَقَارِيَّة * (S). Limnanthes (S).

Limnanthe, Cresson fleuri (F). Meadow-foam (E). Rosenrote Sumpfbiume (D). Limnanto (I). جنس نباتات عشبية متعمية من لفيلة المنقاريات . انواعها قليلة العدد ، جميعها برية ، سوقها قطول ٢٠ الى ٧٠ سم . معظمها ينبت على الارض . اوراقها مركبة ريشية مخبرية . ازهارها كثيرة العدد منها الاصفر والابيض والوردي .



منقل

٢٧٩٠٤ - مَنَقِب * (F).

المنقب نجم ثَّار من كوكبة قيطس مركزه في الرأس .

٢٧٩٠٥ - مَنَقِبَة * (F). Palmeria (F).

Palm-plantation (E). هي الحائش اي بستان النخل العامر .

٢٧٩٠٦ - مَنَقِيس ، مَنَقَدُور القِسْمَة * (F).

Divisible (F). Déperditeur (F).

٢٧٩٠٧ - مَنَقِيس * (F). تمت تعريفي يطلق على كل مادة او عنصر يسبب نقصاً في طاقة الجهد اي الطاقة الكامنة في الجسم .

٢٧٩٠٨ - مَنَقِطَع * (F). Discontin (F).

Discontinuous (E). هو المنقطع اي غير المستمر او المتواصل .

٢٧٩٠٩ - مَنَقِطَع * (F). Mersal, Mardage (F).

Marsh, Bog, Fen, Swamp, Morass (E). ارض منخفضة يستنقع فيها الماء .

٢٧٩١٠ - مَنَقِيع * (F). Palustre (F). Paludal (E).

منقي ويطراني وقديري : تمت تعريفي يطلق على النباتات التي تعيش في المنابع .

٢٧٩١١ - مَنَقِل * ، مَزُون * (F). Gontomètre (F).

آلة لقيس ، تقاس بها زوايا الارض . (E). Gontometar (E).

٢٧٩١٢ - مَنَكَّاش * (F). Binette (F). Hoe (E).

اداة العزق الخفيف تستعمل باليد .

٢٧٩١٣ - مَنَكَّان * (F). Pipra (S).

Manakin (F). Manakin (E). جنس طير من فصيلة البيريمات . انواعه المعروفة عديدة . موطنها بعض مناطق امريكا الوسطى والجنوبية . تألف ارياض والغابات الرطبة . نظامها الحياتي جماعي . افواجها تمتد من ١٥ الى ٢٠ زوجاً || اجسامها صغيرة ، ربة ،



منكان راهب



منورنة

Manorina (S). **مَنُورِنَة** * ٢٧٩٣٣
Manorina (F). Manorina (E).
جنس طير من فصيلة المغرقات . أنواعه المعروفة خمسة
موطنها أستراليا وأجزاء القارية منها . لونها البني
جاءي قوتها رقيق الاذيار والذات البانمة والحوام || أجسامها
صغيرة . اذنانها مستطيلة ، مستديرة الاطراف . مناقبها
خضوية . السنتها عظيمة منطقة . تجرس الزهر كالنمل .
اثوابها متراكبة الاألوان الزاهية || تدفن في الانفاق القليلة
الارتفاع . اناتها تضع من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بتناوبة
الذكور نحو ١٣ يوما .

Mannose ٢٧٩٣٤ - **مَنُور**
سكر غلوكوزي ، بلورزي التركيب ، سريع الذوبان في
الماء ، ينتج بجمرة البيرا ، يوجد في بعض النباتات انحصا
نحار الخروب وقشور البرتقال .

Monaul (F). **مَنُولى** ٢٧٩٣٥
هو المخطط البني ، اطلبه .

Narcotique (F). **مَنُوم** ، **مُحَدَّر** ٢٧٩٣٦
Narcotic (E).
نمت تعريفي يطلق على المواد شبه قلوية المخدرة الموجودة
في بعض النباتات ، وله يطلق تسمية على كل نبات
يسوي هذه المادة أو المواد .

Sperme (F). Sperm (E). **مَنِي** ٢٧٩٣٧
مادة مركبة مائنة لزجة تتكون سيلة الحورن المنوي تفرزها
خصيتا الذكر وتغذيها الحويصلات المنوية عند وجودها
ويدهنها القشيب عند الاندفاع .

Aphidiidae (S). **مَنِيَّات** ٢٧٩٣٨
Aphidiidae (F). Aphidiidae (E).
هي فصيلة الأقيات ، اطلها .

Sarcelle marbrée (F). **مَنِيَّة** ٢٧٩٣٩
هي الحلف الجليل ، اطلبه .

Spermatisme (F). **مَنِيَّة** * ٢٧٩٤٠
Spermatism (E).
المنية ملعبه الذين يمتدرون أن مني الذكر يحوي جميع
أجزاء الملقحة . وأن ما تقدمه الاثنى منوط بالنشو والنوطة
فقط .

Mania maura (S). **مَنِيَّة مُورَا** * ٢٧٩٤١
Mania maura, la Maura (F). Mania maura (E).
حشرة من فصيلة النسيقات وربية حرقفيات الاجنحة .
موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبا وافريقية الشمالية .
فراشتها جارية قوتها رقيق الاذيار . سرتها تبيض على
اوراق النباتات المرعوية والحولية والحولة || جسمها
كبير القد يطول نحو ٢٣ مم . بعطها نحو ٦٢ مم . وأنها
صغير الجسم حطلي اللون . عيناها كبيرتان . ذباناها
عظيمان . جوشنها وبعطها الى الحطلي الكسني الملوحي ||
رواشنها عند الشقن الى الحطلي الاسمر الملوحي تملو في
الزوج الامامي زوجة كسنية وتعيش وتبيض ويرادح
من الجؤوة الى السمرة الكسنية . وتلوي في الزوج الخلفي
مشحان مغرشتان لونها الى السمرة الكسنية . حنارها



منية مورَا

منمقة ، مستطيلة الزناد ، خلية الصل الاقايبي التصميص
خلفه البشرة على صفحتها || اذعاها فردية ، محورية
الاوتكاز ، مستطيلة المائلين ، صغيرة الحجم ، ليلكية
الون || ثمارها عنبية ، بجعالية المادة ، تبدو خضراء
وتنهي ، عند النضج ، بالبنفسجي المائل .

Hacha fourrage (F). **مَنَكَّة** ٢٧٩٤٠
Fodder-cutter (E).
آلة تستعمل في فرم ورق التوت والكلأ وما اشبه .

Décalcifié (F). **مُنَكَّيس** * ٢٧٩٤١
Decalcified (E).
فقد كله .

Serfouette (F). Small hoe (E). **مُنَكَّيفَة** ٢٧٩٤٢
أداة تستعمل في حرق تربة حقائق الزهور والمباتل .

Masticable (F). **مُنَمَّع** ٢٧٩٤٣
Fourmillière (F). **مُنَمَّكَة** ٢٧٩٤٤
Ant-hill, Ant's nest (E).
هي قرية النمل .

Butyromètre (F). **مُنَهَكَة** ٢٧٩٤٥
Butyrometer (E).
هو ميزان الحليب ، جهاز يستعمل لمرقة مقدار السن
في الحليب .

Méthode (F). **مُنَهَج** ، **مُنَهَج** ٢٧٩٤٦
Method (E).
هو الاسلوب المتبع ، راجع طريقة .

Allergique (F). Allergic (E). **مُنَهَدَف** ٢٧٩٤٧
الهدف من كان جهازه العضوي عرضة لانهاداف .

Ebauche (F). Rough Shape (E). **مُنَهَر** * ٢٧٩٤٨
الرسم الامجاري للشي وبداية تكوين الشيء . ج مناهر .

Shénique (F). Schenic (E). **مُنَهْش** * ٢٧٩٤٩
نمت تعريفي يطلق على كل مادة من عقاقير وغيرها تنشط
فاعلية الاعضاء .

Menhir (F). Menhir (E). **مُنَهْشَر** ٢٧٩٥٠
المنبر حجر ضخم مستطيل منتصب يمد الى عصور
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى القلوب المعبد
كاستر الاستقام . ويقال انه كان بمثابة تمثال || المنابر
كثيرة العدد ، متفارة الحجم والطول ، اطولها يبلغ
نحو ٢١ مترا ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

Menhir (F). Menhir (E). **مُنَهْشَر** ٢٧٩٥١
المنبر حجر ضخم مستطيل منتصب يمد الى عصور
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى القلوب المعبد
كاستر الاستقام . ويقال انه كان بمثابة تمثال || المنابر
كثيرة العدد ، متفارة الحجم والطول ، اطولها يبلغ
نحو ٢١ مترا ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

Menhir (F). Menhir (E). **مُنَهْشَر** ٢٧٩٥٢
المنبر حجر ضخم مستطيل منتصب يمد الى عصور
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى القلوب المعبد
كاستر الاستقام . ويقال انه كان بمثابة تمثال || المنابر
كثيرة العدد ، متفارة الحجم والطول ، اطولها يبلغ
نحو ٢١ مترا ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

Menhir (F). Menhir (E). **مُنَهْشَر** ٢٧٩٥٣
المنبر حجر ضخم مستطيل منتصب يمد الى عصور
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى القلوب المعبد
كاستر الاستقام . ويقال انه كان بمثابة تمثال || المنابر
كثيرة العدد ، متفارة الحجم والطول ، اطولها يبلغ
نحو ٢١ مترا ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

Menhir (F). Menhir (E). **مُنَهْشَر** ٢٧٩٥٤
المنبر حجر ضخم مستطيل منتصب يمد الى عصور
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى القلوب المعبد
كاستر الاستقام . ويقال انه كان بمثابة تمثال || المنابر
كثيرة العدد ، متفارة الحجم والطول ، اطولها يبلغ
نحو ٢١ مترا ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

Menhir (F). Menhir (E). **مُنَهْشَر** ٢٧٩٥٥
المنبر حجر ضخم مستطيل منتصب يمد الى عصور
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى القلوب المعبد
كاستر الاستقام . ويقال انه كان بمثابة تمثال || المنابر
كثيرة العدد ، متفارة الحجم والطول ، اطولها يبلغ
نحو ٢١ مترا ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

Menhir (F). Menhir (E). **مُنَهْشَر** ٢٧٩٥٦
المنبر حجر ضخم مستطيل منتصب يمد الى عصور
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى القلوب المعبد
كاستر الاستقام . ويقال انه كان بمثابة تمثال || المنابر
كثيرة العدد ، متفارة الحجم والطول ، اطولها يبلغ
نحو ٢١ مترا ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

Menhir (F). Menhir (E). **مُنَهْشَر** ٢٧٩٥٧
المنبر حجر ضخم مستطيل منتصب يمد الى عصور
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى القلوب المعبد
كاستر الاستقام . ويقال انه كان بمثابة تمثال || المنابر
كثيرة العدد ، متفارة الحجم والطول ، اطولها يبلغ
نحو ٢١ مترا ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

Menhir (F). Menhir (E). **مُنَهْشَر** ٢٧٩٥٨
المنبر حجر ضخم مستطيل منتصب يمد الى عصور
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى القلوب المعبد
كاستر الاستقام . ويقال انه كان بمثابة تمثال || المنابر
كثيرة العدد ، متفارة الحجم والطول ، اطولها يبلغ
نحو ٢١ مترا ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

بعد النقع والغلي في الماء ، لاثاب غنية بالعناصر المرة السامة ، لبوب نشوي غذائي شائع الاستعمال يدهى تيبوكا أو قساوا . ولبوبها هذا يحوي ما قدره نحو :

٣,٦٨ ٪ من المواد الازوتية

١,٩٨ ٪ من المواد الدهنية

٩١,٤٤ ٪ من المواد النشوية

وهو كالكثيوت الحلو يرغب في الارربة الخفيفة البهائية الغنية المروية ، يتكاثر بالقلع .

٢٧٩٤٩ - مَنبَتَة
Tannerie (F).
هي المندبة ، اطلبا .

٢٧٩٥٠ - مَنبَتَة * ، مَنبَا
Addax nasomaculata (S). Addax, Antelope de Nubie, A. de Mendès (F). Addax (E).

الجسم موهات . والمهابة بقرة وحشية قوية جامسة رفيعة الحاروك وسيدة الجنس والنوع . ثوبها الى البياض الاغبر . رأسها حادق اللون مستطيل الشكل يحصل قرنين كبريين لولبيين ، راوح طويلا من ٥٠ الى ٧٠ سم . صياها كبرتان مكشطان . عنقها اخضر من حلق الظلياء طول جثتها نحو ٢١٠ سم . وازنقاعها ٩٠ سم . اناثها رباعية الاغلاط || تدبش ارباط متوسطة العدد ، موطنا الصغار والفياني توبد في الجزيرة وسورية والثوبة وليبيا وتونس و الجزائر ومراكش .

٢٧٩٥١ - مَنبَا سَبَكَا
Antelope saiga (F).
نوع من الظباء يدهى سَبَكَا ، اطلبا .

٢٧٩٥٢ - مَنبَاب * ، مَنبَابَط *
Atomiseur (F).
آلة خاصة بالمساحيق والسوائل تدرها كالبناير .

٢٧٩٥٣ - مَنبَرَط
Cathode (F).
٢٧٩٥٤ - مَنبَرَط الطير
Remise (F).
Lighting-place (E).
المكان الذي يأوى اليه الطير عند الجفوم أو الاستراحة .

٢٧٩٥٥ - مَنبَرِل
Vagin (F). Vagina (E).
من اعضاء التناسل في الحيوان وهو القناة التي تصل الشفر بمقت الرم .

٢٧٩٥٦ - مَنبَرِلِي
Vaginal

٢٧٩٥٧ - مَنبَرَن
Potomètre (F) Potometer (E).
المهتان جهاز يستعمل في قياس ما يمتصه النبات من ماء .

٢٧٩٥٨ - مَنبَرَات
Turbellariés (F).
Turbellaria (E).
صف من البود المرض .

٢٧٩٥٩ - مَنبَرَجَة
Tératologie (F).
Teratology (E).
علم غرائب الخلقة والتعاجيب .

٢٧٩٦٠ - مَنبَرَجِي
Tératologique (F).
Teratologic (E).

٢٧٩٦١ - مَنبَد
Habitat (F).
هي البلاد التي يعيش فيها الحيوان المعين منذ الاعتدال اليه .

التعاجيب مذبذب الاطراف || لها جيل واحد في الجيل . تظهر القرعشة في سزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنمو خمسة اسابيع وتحتسح الممكن لطفا مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرعة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٤٥ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل مستطيل المقدم والمؤخر . ثوبها الى الخضار الالاس تملو خطوط جانبية متعرجة يضاء اللون وسط تجبي اسيد قاطب . مدنها ورواجها الى السودة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي في التربة حيث تنفد السرعة لمتلفه بجلباب من العين .

٢٧٩٤٢ - مَنبَت
Mannite (F).
مادة سكرية قابلة للتبلور تستخرج من بعض النباتات والفطور .

٢٧٩٤٣ - مَنبَرَا
Magnésio (F).
هي المتعزرا اي اكسيد المغنيزيوم .

٢٧٩٤٤ - مَنبَرِج
Résistance (F). Unyielding (E).

٢٧٩٤٥ - مَنبَرِن
Spermine (F). Spermin (E).
شبه قلوي غير سام يكثر في الخفي ويوجد في البصا .

٢٧٩٤٦ - مَنبَرِث
Manihot (S).

Manihot, Manioc, Magnoc (F). Mandioc plant, Cassava plant (E). Bittere Manioka, Kassavawurzel (D). Manioc, Mandiocca, Jatropha officinale (I).
جنس نباتات معمرة من فصيلة الفربيثيات . انواعه نحو ٤٠ جميعها جنبية منها البيرة والزرابية الغذائية : اطلها البلاد الاستوائية . سوقها تملو من ٢٠٠ الى ٥٠٠ سم . اوراقها متعاقبة ، معتقة ، اذنية ، كفية النصل ، خاسية او سباعية المقصوص . انوارها لفضية اللون ، صغيرة القند ، عشوية التجميع ، محورية وطولية الارتكاز . ثمارها جراد ثلاثية الاضحية تنفلق من ٦ صرايح || تزرع من اجل جلورها المقشرية اللطيفة المستطيلة التي يستخرج منها لبوب نشوي غذائي يدهى تيبوكا || اشهر انواعه الزراعية ساعلي .

٢٧٩٤٧ - مَنبَرِث حَلُو *
Manihot dulcis, M. alpi, M. palmata (S). Manioc doux, Camagnot, Cassave (F).

نوع من المنهوت الزراعي ، ضرابه كثيرة العدد . جلوره قليلة المواد المرة السامة . سوقه منصبة عادمة التضلع ، اوراقه مستطيلة الاذنيات والامناق الخضراء ، مستعرضة المقصوص . جرادها حادة المنحاج . جلوره نشوية غذائية تحوي ما قدره نحو :

٣,٢٥ ٪ من المواد الازوتية

١,٥٦ ٪ من المواد الدهنية

٨٨,١٢ ٪ من المواد النشوية

رغب في الارربة الخفيفة المروية ويتكاثر بالتعجيل .

٢٧٩٤٨ - مَنبَرِث حُر *
Manihot utilisima (S).

Manioc amer, Cassave amère (F).
نوع من المنهوت الزراعي ، ضرابه كثيرة العدد . جنباته كبيرة القند تملو من ٣ الى ٥ امتار . سوقها مضطمة . اوراقها مضطمة قصيرة الاعناق الجلوية اللون ، اذنياتها جلدة . مقصوص نصلها مستطيلة ضيقة . جرادها مجنحة || حاقها غليظة كبيرة تستعمل في صناعة الكحول ويستخرج منها



منهوت حلو



منهوت مر



مهابة

ازهارها قمويلة مغلوقة الكأس تنمو كخثالب اللبدية الاطراف .

٢٧٩٧٦ - مَهْمَزِيَّة *

Dicentra, Dielytra, Bicuella (S). Diélytra, Diélytra, Dicentra, Bicuclée (F). Seal flower, Bleeding heart, Locket flower (E). Flammendes, Fliegendes Harz, Tränendoppelsporn (D). Dielitra (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة الخشخاشيات . ازوارها للمرأة ١٢ مظهرها بري وبضها طلي ينخل في حلجات السفسلس وبضها تريسي . اوراقها متعاقبة ، متفكة ، مفرقة . ازهارها جميلة الشكل مهبازية || اشهر انواعها واعرفها سالي .

٢٧٩٧٧ - مَهْمَزِيَّة اُنَيْكَة

Dicentra eximia (S). Diélytra d'élite, D. distingué (F). بجلة تريينية مثدونة معمرة تملو من ٢٥ الى ٣٥ سم . اوراقها بحرية اللون . عناقيدها الزهرية حورية الشكل منتصبه . ازهارها حراء اللون قصيرة المهابيز || ازهارها يستمر من اواسط الربيع الى اواخر الصيف .

٢٧٩٧٨ - مَهْمَزِيَّة جَمِيلَة

Dicentra formosa (S). Diélytra gracieux, D. à belles fleurs (F). بجلة معمرة طيبة مثدونة تملو من ٢٥ الى ٣٥ سم . اوراقها جميلة الخضار الزاهي . نصلها قندي التشرم . عناقيدها الزهرية مخروطية الشكل . ازهارها وردية اللون ، قصيرة المهابيز || جلودها غنية بمادة الكورديالين الشائعة الاستعمال الطبي || ازهارها يستمر من ايار الى اواسط الخريف .

٢٧٩٧٩ - مَهْمَزِيَّة ذَهَبِيَّة

Dicentra chrysantha (S). Diélytra jaune d'or (F). بجلة تريينية معمرة تملو من ٦٥ الى ١٠٠ سم . ساقها فرعاء مورقة . اوراقها كثيفة التجميع خيطية التشرم . عناقيدها الزهرية منتصبه . ازهارها صغيرة القند والمهابيز ، ذهبي اللون || ازهارها يستمر طول فصل الخريف .

٢٧٩٨٠ - مَهْمَزِيَّة رَائِحَة

Dicentra spectabilis (S). Diélytra remarquable, Cœur de Marie, Cœur de Jeannette (F). بجلة تريينية معمرة تملو من ٦٥ الى ٩٠ سم . ساقها فرعاء مورقة . عناقيدها الزهرية كبيرة القند متدلية . ازهارها تلبية الشكل ، مستطيلة المهابيز ، قوزمية اللون || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٧٩٨١ - مَهْمَزِيَّة عَارِشَة

Dicentra torulosa (S). Diélytra grimant (F). جنبة تريينية عارشة تملو من ٣ الى ٥ امتار . ساقها وفروها نحيلة . سواقلها بسيطة . اوراقها تدية التشرم . عناقيدها الزهرية كبيرة القند متدلية . ازهارها قرنية الشكل ، صفراء اللون ، عطرية || ازهارها يستمر طول فصل الخريف .

٢٧٩٨٢ - مَهْمَتُون

Aristolochie (F). هو الزرأوند ، من النباتات الطبية ، اطبله .

٢٧٩٨٣ - مَهْمِي *

Subdesertique (F). Subdesertic (E). هو البلقعي ، نمت ترعفي وسمي للاقليم شبه صحراوي .

2٧٩٦٢ - مَهْد To level, To smooth (E). اصلح وبسط التفر من الارض او ما انتقص منها في سهولة واستواء . ويقال مهد الارض وقند التربة .

2٧٩٦٣ - مَهْدَاَج Vent précurseur de pluie (F). الريح الخنون تستيق المطر .

2٧٩٦٤ - مَهْدَاَب Cénolide (F). Ctenoid (E). نمت ترعفي يطلق على الحراشف الاربعة او المسنة الحمار الطليق . راجع مبراش .

2٧٩٦٥ - مَهْر، فُلُو، فِلُو Poulain (F). Fosl, Yearling (E). ولد الفرس ثبل بروز ثنيته الثابتين . ج مهاد ومهاد ومهارة وفلاء والفاء .

2٧٩٦٦ - مَهْرُ الْجَنَّة Iris orateur (F). حشرة من السرعويات تدعى قسطية ، اطبلها .

2٧٩٦٧ - مَهْرَة، فُلُوْرَة، فِلُوْرَة Pouliche (F). Filly (E). هي انثى اللولو والمهر .

2٧٩٦٨ - مَهْرَسُ الْعَنْب * Fouloir (F). Beater (E). مهريس العنب او الماصرة ، آلة يسمق فيها العنب لاستخراج عصارتها .

2٧٩٦٩ - مَهْرَمَة Hachoir (F). هي الخدعة ، اطبلها .

2٧٩٧٠ - مَهْرِي Méhari (F). Haiiri (E). سلالة من الابل الركائب السريعة منسوبة الى مهري من شيان . يقال ابل مهري .

2٧٩٧١ - مَهْمَشَرَة Trayeuse mécanique (F). Milking machine (E). هي الماصرة ، جهاز آلي يستخرج الحليب من الفسرع .

2٧٩٧٢ - مَهْنَلَس Arracheuse (F). Drawer, Spud (E). جنس طير من المازوريات . انواحه قليلة المده . موطن البلاد الاسيوية ، يألف مجاري الماء وأنشوط والنباتات اجسام هذه الطيور متوصلة القند تملو نحو ٢٧ سم . انواها مراكبة الاولان لها الابيض والاخضر والازرق والجلوي والاسمر والاسود || قوتها الاسماك الصغيرة والحشرات .

2٧٩٧٣ - مَهْمَشَرَة Todi ramphus (S). Todi rampha. جنس طير من المازوريات . انواحه قليلة المده . موطن البلاد الاسيوية ، يألف مجاري الماء وأنشوط والنباتات اجسام هذه الطيور متوصلة القند تملو نحو ٢٧ سم . انواها مراكبة الاولان لها الابيض والاخضر والازرق والجلوي والاسمر والاسود || قوتها الاسماك الصغيرة والحشرات .

2٧٩٧٤ - مَهْمَشَر Dauphinelle des jardins (F). نبات ترييني يعرف بمائق الحدائق ، اطبله .

2٧٩٧٥ - مَهْمَشَرَات Dicanaceae (S). Dicanacées (F). سبط من فصيلة الحليبيات ، اجناسه وانواعه نحو ١٠٥ منها الغابات الظليلة . جلودها نحيلة قليلة العدد والامتداد . سواقلها خيطية كثيفة تكسو كامل الساق .



مهريس العنب



مهليل



مهبازية

٢٧٩٩٩ - **مُؤَاد زَيْتِيَّة** (F). Matières huileuses (F).
توجد في المادَن كالنُفُط مثلاً . (E). Oily material

٢٨٠٠٠ - **مُؤَاد شَحِيحِيَّة** (F). Matières grasses (F).
توجد في الحيوان . (E). Greasy material

٢٨٠٠١ - **مُؤَاد عَازِلِيَّة** (F). Matières enrobantes (F).
Wrapping material (E).

٢٨٠٠٢ - **مُؤَاد عَصْرِيَّة** (F). Matières organiques (F).
Organic material (E).
هي المَادُّ البَسِيطَةُ المُتَرَجِّمَةُ الَّتِي تُتَرَكَّبُ مِنْهَا نَسِجُ الْحَيَوَانِ وَالنبات .

٢٨٠٠٣ - **مُؤَاد غِذَايَّة** (F). Matières alimentaires (F).
Alimentary material (E).
هي جَمِيعُ المَادِّ الصَالِحَةِ لِغِذَاءِ الْحَيَوَانِ . وَقَدْ وَضَعْنَا فِي ذَٰلِكَ جُلُوداً أُخْذَاهُ عَنْ «كَثْرَةِ» ذِكْرِ فِيهِ تَرْكِيبُ الْأَعْلَافِ الْبَاطِنِي وَعَالَمُهَا مِنَ المَادِّ الْأَحْمَامِ وَالْمُنَهَضَةِ مَعَ تَقْسِمِهَا الْغَذَائِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّشَا . اطْبَلْ عِلْف .

٢٨٠٠٤ - **مُؤَاد مَصْصِيَّة** (F). Substances hygroscopiques (F).
Hygroscopic substances (E).
هي المَادُّ الَّتِي تَمْتَصُّ الرُّطُوبَةَ كَالنِّتْرَاتِ الَّتِي يَمْتَصُّ رُطُوبَةَ الْهَوَاءِ وَالْهَالِ الَّتِي يَمْتَصُّ رُطُوبَةَ التُّرَابِ .

٢٨٠٠٥ - **مُؤَاد مُدَّعَوَرَّة ، مُؤَاد اِحْتِيَاطِيَّة** (F). Matières de réserve (F).
Reservation material (E).
مَادُّ غِذَائِيَّةٌ يَخْزِنُهَا النِّبَاتُ كَالْأَدْعَانِ فِي النِّبَاتَاتِ الزَّيْتِيَّةِ ، وَالسُّكَّرِ فِي التَّنَوُّنِ وَالْمَصَانِ ، وَالنَّشَا فِي الْبَطَايَا .

٢٨٠٠٦ - **مُؤَاد مَعْدِنِيَّة** (F). Matières minérales (F).
Mineral material (E).
هي الْأَجْسَامُ غَيْرُ الْمُتَمَصِّصَةِ كَالْأَزُوتِ وَالْأَكْسِجِينِ وَالْفُسْفُورِ وَالْكَلسِ وَالْحَدِيدِ وَالْبَرَازِ وَالصُّوْدِيُومَ الْبَحْرِيَّ .

٢٨٠٠٧ - **مُؤَاد مُغْدِيَّة** (F). Matières nutritives (F).
Nutritive material (E).
هي جَمِيعُ المَادِّ الصَالِحَةِ لِتَغْلِيَةِ النِّبَاتِ .

٢٨٠٠٨ - **مُؤَاد لَشْوِيَّة** (F). Matières amyliacées (F).
Amylaceous material (E).
أَسْوَءُ مَرْكَبَةٍ ، أَسَاسُهَا النَّشَا ، تَوَجَدُ فِي أَغْصَانِ النِّبَاتَاتِ .

٢٨٠٠٩ - **مُؤَاد هَيْدُرُوكَرْبُونِيَّة ، هَيْدُرَات الْكَرْبُون** (F). Matières hydrocarbonées (F).
Hydrates de carbone (F).
مَرْكَبَاتُ عَضْوِيَّةٌ مِنَ الْكَرْبُونِ وَالْأَكْسِجِينِ وَالْهَيْدُرُوجِينِ مِنْهَا الْخَلَاصَاتُ الْأَزُوتِيَّةُ كَالنَّشَا وَالسُّكَّرِ وَالصَّمْغِ ... وَبِهَا المَادُّ الدَّهْنِيَّةُ وَبِهَا الْهَالُوسُ أَيْ السَّلِيلُوزُ .

٢٨٠١٠ - **مُؤَادَر** (F). Tropomètre (F).
Tropometer (E).
المَوَازِ مِقْيَتٌ شَدِيدُ الْإِقْتَانِ وَالنَّقْطَةُ يَسْتَعْمَلُ فِي تَحْدِيدِ دَائِرَةِ الطُّولِ فِي الْبَحْرِ .

٢٨٠١١ - **مُؤَاوِل ، مُتَوَاوِل** (F). Parallèle (F).
Parallèle (E).

٢٧٩٨٤ - **مَهْو ، نَارَهَنْدِي ، نَارَهَنْك** (S). Mesua (S).
Mésua, Bois de fer (F). Iron wood, Indian rose chestnut (E). Eisenbaum, Kastanien Rose (D).
Albero della ferro (I).

الوَاحِدَةُ مَهْوٌ . جُلِسَ أَشْجَارُ حَرَبِيَّةٍ وَزُرَاعِيَّةٍ مِنْ لُصْبَةِ الْكُلُوزِيَّاتِ ، مِنْهَا الْمَهْدُ . أَوْ رَاقَتِهَا كَامِلَةٌ مُتَقَابِلَةٌ مَعْقَةٌ مُسْتَقِيلَةُ النِّصْلِ . أَزْهَارُهَا نَوْرِيَّةٌ تَتَجَمَّعُ أَوْ فَرْدِيَّةٌ ، أَبْيَضَةٌ الْإِرْتِكَازُ أَوْ تَاجِيَّةٌ وَفِي ذِكَاةِ الْعُرْفِ لِلْمُسْتَحَبِّ . ثَمَارُهَا جَرَاهُ تَقْلَفُ زُرَّةٍ كَبِيرَةٍ ، تَشْبَهُ الْكَمْتَانَةِ طَبَقَةُ الرَّاحَةِ ، مَأْكُولَةُ اللَّبَابِ . لَمُتَشَابَهَاتُ شَدِيدَةُ الصَّلَابَةِ مَرْغُوبٌ فِيهَا .

٢٧٩٨٥ - **مَهْوِي** (F). Périgée (F).
Perigee (E).
اَقْرَبُ مَحَلِّ لِسَيَارَةِ مِنَ الْأَرْضِ .

٢٧٩٨٦ - **مَهْيَات** (F). Multiforme (F).
Multiform (E).
كَثِيرُ الْمَهْيَاتِ وَالْأَشْكَالِ .

٢٧٩٨٧ - **مَهْيَكَة ، كَنْدُرِيُوم** (F). Chondriome (F).

٢٧٩٨٨ - **مَهْيَدَة ، مَهْيَدَكَة** (F). Plonnière (F).
Pioneer (E).

هو النَّبَاتُ الطَّرِيقِيُّ الَّذِي يَكْتَسِبُ التُّرَابَ الْخَدِيدِيَّةَ الْإِسْتِصْلَاحَ وَهُوَ أَيْضًا كُلُّ نَبَاتٍ يَزُرُّ أَوْ غَرَسَ لِهَيْئَةِ الظُّرُوفِ الْمُنَاسِبَةِ لِنَبَاتٍ لِاسْتِغْنَى .

٢٧٩٨٩ - **مَهْيَس** هو مَسْلُحُ الطَّيْرِ . ج. مَهَايَس .

٢٧٩٩٠ - **مَهْيَلِك** هو النِّصْلُ الَّذِي إِذَا ضَرَبَ لَمْ يَلْقَ .

٢٧٩٩١ - **مَهْيِم** (F). Asoofé (F).
Thirsting (E).
لَمْتُ تَعْرِينِي يَوْصَفُ بِهِ مَنْ كَانَ شَدِيدَ الْمَطْشِ .

٢٧٩٩٢ - **مَوْ** (F). Aneth sauvage (F).
هو الثَّنِيثُ الْبَرِّيُّ ، أَطْلَبُهُ .

٢٧٩٩٣ - **مَوْء** (F). Mialement (F).
Mawing (E).
صَوْتُ الْمَرْ .

٢٧٩٩٤ - **مُؤَاد أَمِيَّة ، مُؤَاد أَلْبُومِينِيَّة** (F). Albuminoïdes, Substances protéiques (F).
Albuminoid, Proteinic substances (E).
مَادُّ تَرْكِيبِيَّةٌ يَتَوَّصَفُ بِمُتَوَاسُطِ كَرْكِيبِ بِيَّاضِ الْبَيْضَةِ .

٢٧٩٩٥ - **مُؤَاد اِسْتِخْرَاجِيَّة ، مُؤَاد اِسْتِخْلَاصِيَّة** (F). Matières extractives (F).
Extractive material (E).
هي مَا يُمْكِنُ أَنْ يَبْقَى مِنْ مَادٍّ بَعْدَ تَبْيِغِهِ مَوَالِغُهَا .

٢٧٩٩٦ - **مُؤَاد ثَلَاثِيَّة** (F). Substances ternaires (F).
Ternary substances (E).
مَادُّ غَذَائِيَّةٌ مَرْكَبَةٌ مِنْ ثَلَاثَةِ عُنَاوِينَ وَفِي الْأَكْسِجِينِ وَالْهَيْدُرُوجِينِ وَالْكَرْبُونِ .

٢٧٩٩٧ - **مُؤَاد دَهْنِيَّة** (F). Matières sébacées (F).
Sebaceous material (E).

٢٧٩٩٨ - **مُؤَاد رُبَاعِيَّة** (F). Matières quaternaires (F).
Quaternary material (E).
مَادُّ عَضْوِيَّةٌ مَرْكَبَةٌ مِنْ أَرْبَعَةِ عُنَاوِينَ وَفِي الْكَرْبُونِ وَالْهَيْدُرُوجِينِ وَالْأَكْسِجِينِ وَالْأَزُوتِ كَالنَّشَا .

٢٨٠١٢ - مَوَاز * Musophaga (S).

Musophaga (F). Musophaga (E).

جنس طير من فصيلة المَوَازِيات . اصطناعه البلاد الافريقية اعصها افريقية الشمالية || انواعه المَعْرُوفَة قليلة العدد تتميز باستطالة الجسم وبكبر الذنب الاطليحي الشكل . مناقبها غمرولية ، قوية ، مستنة الطفاف ، صفراء اللون . جياها ملحوظة بصيغة قرنية المادة ، صفراء ، تبدو كأنها امتداد المخالف نحو الرأس || طيراتها خفيف الحركة سريع . تدفن في تجاويف الاشجار القديمة المهده . اعرف انواعه واشهرها المَوَاز البنفسجي .

٢٨٠١٣ - مَوَازٍ بَنَفْسَجِيَّةٌ * Musophaga violacea (S). Musophaga violet (F).

نوع من المَوَاز . اصطناعه تمتد من تونس والغرب الى اطراف غنية الجنوبية . يألف الحراج ويقرب من المزارع والبساتين اعصها بساتين الموز || جسمه بطول نحو ٥٥ سم . قوته الى السراد البنفسجي تملو ماجة ارجوانية || قوته التآر على اختلاف انواعها واعصها الموز الذي يفضل على كل شيء || الاثني تحضن بمجانبة الذكر من ٥ الى ٦ بيضات البرغم ينمشر نحو ١٥ يوما .

٢٨٠١٤ - مَوَازِيَّةٌ * Parallélisme (F). Parallelism (E).

هي تَوَازِي الخطوط أو السطوح .

٢٨٠١٥ - مَوَازِيَّةٌ * Balance (F).

٢٨٠١٦ - مَوَازِيَّةٌ حِسَابٌ * Balance d'un compte (F). Balance of an account (E).

٢٨٠١٧ - مَوَازِيَّاتٌ * Musophagidae (S).

Musophagidae (F). Musophagidae (E).

فصيلة طير من الجروام سنيات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها افريقية المهد || تتميز باستطالة الجسم ، بقصر العنق ، باحتدال الاجنحة واستطالة الذنب . مناقبها غمرولية الشكل ، مستعرضة الاشداق . اثوابها جميلة الالوان المتراكبة القاعة || ملجئها الحياتي جماعي . سرها لا يقل عن ٥٥ زوباً . تألف مجاري الماء والمناقع الرطبة . قوتها جميع المواد النباتية من البراعم والتواقي الى الثمار والحبوب || اعرف اجناسها المَوَاز والطروق .

٢٨٠١٨ - مَوَاسِطِيَّةٌ * Gymnastictus (S).

Gymnastictus (F). Gymnastictus (E).

بعض صيادي سمك طرابلس يسبحا بلشفيك وأبو شوكة . جنس اسماك بحرية يبروض من شاكات الزعانف وفصيلة الجلاخيات || انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جميعها صغيرة الحجم ، شاككة الزعانف الظهريّة السامة المؤذية || اثوابها تختلف مع الانواع منها الاسمر والاطحل والوردي والاحمر الغتالي الكؤود بالاسود || لحومها كاتمة الصنف قل من يرشها فيها .

٢٨٠١٩ - مَوَاصِلَةٌ * Consanguinité (F).

Consanguinity (E).

الموصول من الدواب الذي لم يتر على امه غير ابيه . والمواصلة هي اشتراك اواسر القرابة اي الصلة الدموية بين الاولاد والاباء والاولاد . الناية منها استمرار تحمسين النسل .

٢٨٠٢٠ - مَوَالِفَةٌ * Congruité (F). Congruity (E).

٢٨٠٢١ - مَوَالِفَةٌ * Approbation, Entérinement (F). موَالِفَةٌ

Approbation, Ratification (E).

٢٨٠٢٢ - مَوَاقٍ * Grallaria (S).

Grallaria (F). Grallaria (E).

جنس طير من الجروام سنيات المناقير وفصيلة الجلاخيات . انواعه المعروفة نحو ٣٠ جميعها من طيور امريكة الجنوبية . تألف الرياش واللهايات الرطبة . ملجئها الحياتي جماعي . جماعاتها قليلة العدد . قوتها الحشرات واعصها النمل السيار الذي تكثر قواظه الجرارة في معظم تلك الاسواق || اجسامها صغيرة تقارب من ١٢ الى ١٨ سم . اثوابها مختلفة الالوان تكثر فيها الشقعة والشببة . تحورها وصنوبرها وبلوطها صفراء اللون او خراء تملجها رقة سراد او يضاء وتنبج حنلي . رؤوسها ومناقبها واجنحتها متمثلة الاسجام . اذناها قصيرة غمرولية الشكل . قوتها رقيقة تحمكها من العدو بسرعة || تدفن اعشاشها في الادغال على ارتفاع قليل لا يتجاوز ثلاثة اطار . الاثان تحضن بمجانبة الذكر من ٤ الى ٥ بيضات على مرتين في الحيل .

٢٨٠٢٣ - مَوَازِيرٌ * Métyer (F). Farmer (E).

٢٨٠٢٤ - مَوَازِكَةٌ * Métyage, Colonage (F).

هي المَازعة ، راجعها .

٢٨٠٢٥ - مَوَالِسَةٌ * Connivence (F).

Connivence (E).

شيء من التواطؤ أو الاشتراك في عمل ما .

٢٨٠٢٦ - مَوَالِيْدِي * Naturaliste (F).

Naturalist (E).

العالم يعلم المواليد .

٢٨٠٢٧ - مَوَاتَانٌ ، وَمَيَّةٌ حَيَوَالِي * Epizootie (F).

Murrain, Epizooty (E).

هو كل مرض يمد سريع الانتشار الشامل .

٢٨٠٢٨ - مَوَرَكَةٌ * Raidisseur (F). Wire-acralner (E).

اداة تستعمل لتوتر الاشلاك .

٢٨٠٢٩ - مَوَتَمَرٌ * Congrès (F). Congress (E).

٢٨٠٣٠ - مَوْتِيْلٌ * Mutilla (S).

Mutille (F). Mutilla (E).

جنس حشرات من غشائيات الاجنحة المنصورة وفصيلة الموتيليات . انواعها المعروفة كثيرة العدد ، نحو ١٦٠٠ منتشرة في معظم اقطار العالم . تألف الير والناطق الجرواء . تصطف في طورها البري على جميع انواع غشائيات الاجنحة المشابهة || اجسامها صغيرة أو متوسطة القد . اثوابها ميلة . الوانها زاهية ، سعاد المراج || ذكورها مجنسة . اناها عادة الجناح ، مسطحة الحيات القوية .

٢٨٠٣١ - مَوْتِيْلِيَّاتٌ * Mutillidae (S).

Mutillidae (F). Mutillidae (E).

فصيلة حشرات من غشائيات الاجنحة المنصورة ونفة الحمويات . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد ، منتشرة في معظم اقطار العالم || جميع اجناسها طفيلية في



مَوَازٍ



مَوَازِيَّةٌ



مَوَاتَانٌ



مَوْتِيلٌ

مزقية. اوراقها مفصصة، نصلها رطل النسيج، خلى البشرة، مسن الحافة. ازهارها حمراء اللون متدلية مستطيلة. ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

٢٨٠٤٧ - **مورندية متوردة** *

Maurandia semperflorens (S). *Maurandie toujours fleurie* (F).

جنية ترينيدية عارشة تطول نحو ثلاثة أمتار. غبروها واصرارها عديدة. اوراقها قليلة مزوانية، نصلها مالى البشرة متصبع الصفحة. ازهارها كبيرة القذ تطرها راوح من ٣ الى ٥ سم. لونها تختلف باختلاف غبروها، اشبهها الابيض والقرط والبفسجي || ازهارها يستمر من ايار الى تشرين.

٢٨٠٤٨ - **مورندية مكسيكية** *، **مورندية كبيرة الزهر** *

Maurandia grandiflora (S). *Maurandie du Mexique* (F).

جنية ترينيدية عارشة تطول من ٣ الى ٤ أمتار. جلورها وساقها ليفية. اوراقها شبه قلبية. نصلها مالى الصفحة. ازهارها كبيرة القذ تطرها نحو ٥ سم. لونها الى الازرق والى اعلمو ملوج بنفسجي || ازهارها يستمر من ايار الى ايلول.

٢٨٠٤٩ - **موريسية** *

Mauritia (S). *Mauricie, Mauritie, Palmier bâche* (F). *Mauritia, Moriche palm, Carana palm* (E). *Mauritia-Palme, Moritz-Palme* (D). *Palma mirici, Palma ita* (I).

جنس اشجار غليظة، اعطائها المناطق الاستوائية الامريكية. انواعها ثمانية، جلورها منتصب مستقيمة تملو من صبة الى ثمانية أمتار. يستخرج من بعض انواعها لوبو نشوية غذائية ومن البعض الآخر مصارة سكرية قابلة التخمير تستعمل في صناعة الخمر والكحول.

٢٨٠٥٠ - **موريكاندية**

Moricandia (F). نبات يدهى الخمر، اطلبه.

٢٨٠٥١ - **مورين**

Morine (F). اطلب مرينه، نبات ترينيدى من الادبيات.

٢٨٠٥٢ - **موريتية، عقاب البحر**

Mylobatis (S). *Mylobate, Mourine, Alge de mer* (F).

جنس اسماك مذنية بحرية من فصيلة الشفنيات. انواعها المعروفة ٧: جميعها كبيرة القذ مبطلة مستعرضة تشبه العقاب الباسطة جناحها. اذناها مستطيلة كالسياط تحمها عند قواعدها مناس مستنة سادة. قربها الاسماك. تألف المياه الاقليمية الضيقة الغور || اشهر انواعها واعرفها ما على.

٢٨٠٥٣ - **موريتية جودرية، عقاب البحر**

Mylobatis bovina (S). *القبيمار*

Mylobate vachette, Mourine vachette (F). نوع من الموريتية متوسطة القذ والتبطيط، ثوبها اغبر اللون اشهل المولج. اعطائها البحر المتوسط والاسود والاحمر. وهي اقل مسلوقة من الجفاعة.

طورها البرقي. ذكورها مجنحة. اناثها عادمة الجناح مجهزة بحصى ذرية متباعدة الاطوال || اشهر اجناسها الموليل.

٢٨٠٣٢ - **موتة**

Prostate جسم غدي التركيب يلف عند الذكور ثقب المثانة ويبرز من الحالب.

٢٨٠٣٣ - **موتلوج**

Tissu lâche (F). *Loose tissu* (E).

٢٨٠٣٤ - **مولجر**

Bailleur (F). *Lessor* (E).

٢٨٠٣٥ - **مولجل**

Différé (F). *Deferred* (E).

٢٨٠٣٦ - **مولجرن**

Urnigère (F). نمت ترميني يطلق، في علم النبات، على الطحالب المجهزة بابيضات اي اجرة لحفظ البويضات.

٢٨٠٣٧ - **مولجور**

Cuniculé (F). *Cuniculate* (E). الموحور ما حوى حفرة مستطيلة بعيدة الغور.

٢٨٠٣٨ - **مولجور الجوف**

Post-abdomen (F). *Postabdomen* (E). مؤخر الجوف عند الحشرات هو الخس حلقات الاخرة من بطن الحشرة اي جوفها || وهو زوولوجياً ذنب القشرية ومؤخر جسم التريلوبيت.

٢٨٠٣٩ - **مولدنة**

طويلة صغيرة قصيرة المتى نحو القبرة (السان).

٢٨٠٤٠ - **مورة**

Mora (F). سمكة بحرية تدهى جنة المتوسط، اطلبها.

٢٨٠٤١ - **مورث**

De cibus هو الذي مات من مال يورث من يمنه.

٢٨٠٤٢ - **موردة**

Roseraie (F). حديقة الورد وزراعتها الاستارية.

٢٨٠٤٣ - **مورق**

Fronclifère (F). *Froncliferous* (E). المورق ماكان يحمل ورقاً.

٢٨٠٤٤ - **مولرنية**

Lapinière (F). *Hutch* (E). هي الهرة، اطلبها.

٢٨٠٤٥ - **مورندية** *

Maurandia (S). *Maurandie* (F).

جنس نباتات عارشة مصرة من فصيلة الخنازريات. انواعها المعروفة ١٢. سقها متسلقة. اوراقها قليلة النصل. ازهارها كبيرة القذ محورية الاركانز. توحيها انبوبي الشكل، خاسي النصوص الاستوائية || اشهر انواعها ما على.

٢٨٠٤٦ - **مورندية حمراء**

Maurandia erubescans (S). *Maurandie rougeâtre* (F). جنية ترينيدية عارشة تطول نحو ٤ أمتار. ساقها وقرونها



مورانية



موريسية

كباشه متجنسة متدلية. ثمارها صغيرة ناشقة لا تؤكل ، يزودها كروية كاملة صالحة لتفككتار || وهو يزود من اجل لباب ساقه الذي يستعمل استعمال الدقيق . زراعت تقوم ٤ سنوات تنتهي بكبح الساق لاستخراج لبابها وقد يجري ذلك قبل تبشير الاثمار بنحو ٥ اسابيع .

Musa religiosa (S).

٢٨٠٥٩ - موز السعد

Bananier fétiche (F).

نوع من الموز البري الاثري، مهدد المناطق الاسيائية، ارويته مئة . ساقه تنمو نحو ١٥ امتار . اوراقها كبيرة القند متدلية الاطراف . نصلها جامد الصفحة المائلة ، بحري الخضار . كباشه كبيرة القند ، نارية القنابات ، ارجوانية الطوب . ثماره دقيقة ، مستطيلة ، ناشقة لا تؤكل .

Musa sissensis (S).

٢٨٠٦٠ - موز الصين

Bananier de Chine (F).

ويسمى موز الهند ، ثماره مأكولة . مهدد الزراعية المشهورة خمسة . ارويته مئة . ساقه تنمو من ٤ الى ٨ امتار . اوراقها اعليجية الشكل ، متوسطة القند ، نظيفة الانتساب . نصلها فارش الصفعة المنبسطة الماددة الاثراء ، لونه الى الخضر الباهت . كباشه متدلية عديدة الاشاط . ثماره خضرة صغيرة مأكولة متوسطة الصف .

٢٨٠٦١ - موز اليابان

Musa japonica, *M. Basjoo* (S). *Bananier japonais* (F).

نوع من الموز الزراعي المأكول البار . مهدد اليابان وقد انتشرت زراعت في معظم المناطق الحارة نظرا لقلة متطلباته المناخية وضلابة ما يلزمه من سرات حرارية يستهلكها نمو ويتفشي ادراك ثماره || ارويته مئة . ساقه خرا اللين تنمو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . اوراقه تنمو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . وترى من ٦٠ الى ٨٠ ، نصلها جامد الصفعة الناعمة ، حابق الخضر . كباشه منتفخة متدلية عديدة الاشاط . قناباته ارجوانية ، طرفه غروي الشكل بنفسي اللين . ثماره مأكولة مستحبة الطعم مستقلة التلافة والطول .

Bananier caecilia,

٢٨٠٦٢ - موز ليغية

B. d'Amboine

هو الابن ، اظله .

٢٨٠٦٣ - موز مبدولة * ، موز الرش

Musa sapientum (S). *Bananier commun*, *B. des sages* (F).

نوع من الموز الزراعي المأكول البار . ضروري المعرفة زهاء ٨٠٠ منتشرة في جميع الاسواق الحارة . ارويته مئة . ساقه تنمو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . اوراقه كبيرة القند . نصلها جامد الصفعة الزاوية الخضر . كباشه مستطيلة متدلية كثيرة الاشاط التي يراوح عددها من ٩ الى ٢٥ ، ثماره مستطيلة ، مضطمة ، سكرية الطعم ، مستحبة اللذاق والبرق .

Banane, *Figue-banane* (F).

٢٨٠٦٤ - موزة

Banana (E).

ثمرة الموز المأكولة وهي تحوي العناصر التالية :
نحو ٧٢,٤٠ ٪ من الماء
١,٤٤ ٪ من المواد الاوتية
٠,٠٩ ٪ من المواد البنية
٢٣,٩٣ ٪ من المواد الهيدروكربونية



مورينه مبدولة



موز الجنة



موز مبدولة

٢٨٠٥٤ - مورينه مبدولة * ، عقاب البحر

الجفافة

Myliobatis aquila (S).

Myliobate commune, *Mourine commune*, *Mourine glorieuse* (F).

نوع من المورينه كبيرة الجفة توبيا الى البني الاسود المواج . اصطنها جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة . وهي شرمة بطاقة شديدة الطوة .

Myliobatis (S).

٢٨٠٥٥ - مورينيات

Myliobatis (F). *Myliobatis* (E).

فصيلة اسماك بحرية من السنفقيات ورتبة الاشلاق . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اصطنها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . قربتها الاسماك والمارح || اجناسها مضطمة ، مضطمة ، ملتحمة الزعانيف الصدرية الكبيرة المستعرضة تشبه الغلاب الباسطة جناحها . رؤوسها مخروطية شاربة . اذنانها متوسطة الانفتاح اسنانها مسطحة ، سباعية الصفوف . صيرتها جانبيية الارتكاز . اذنانها متوسطة كالسباد كعبها ، عند قواعدها عناصر كبيرة مسنة حادة || اظهر اجناسها واعرفها المورينه .

Musa (S), *Bananier* (F).

٢٨٠٥٦ - موز

Banana-tree (E). *Echte Banane* (D). *Banano* (I).

جنس نباتات عشبية لينة من فصيلة الموزيات . انواعها عديدة ، اصطنها البلاد الحارة والاستوائية . جميعها مائدة البروق الخلفية . ارويها مئة مئة . طولها لينة افقية الانحناء . سوقها مجعومة من الاتحاد الليفية المنفطة المتراكبة القرصية الانتساب . تنتهي بنصل فارشة اعليجية الشكل جامدة الصفعة الجنبية الخضر . انفرارها منبل التجميع ، حامي الارتكاز ، كبير القند . ثمارها لينة ، مستطيلة ، كثيرة العدد ، تؤلف كباشه مركبة من عدة اشاط متعاقبة || والحوزة اي ساق الموزة تشر مرة واحدة وتموت ، أما الأروبة التي تحتفظ الساق فهي معمرة وتتكاثر بالفسائل حل من الاغصان || والحوز يوجد في جميع الارربة المتوسطة الانحناء الفتية بالمواد اللبالية والناتسرة النذالية وهو من النباتات المروية التي تلتزم الاسماء المنظم || أما انواعها المشهورة فهي ما يتبع .

Musa paradisica (S).

٢٨٠٥٧ - موز الجنة *

Bananier du Paradis, *Figuler d'Adam*, *Bananier légume* (F).

نوع من الموز الزراعي . ضروري المشهورة نحو ٥٠٠ ، اصطنها البلاد الاستوائية . ارويها مئة . سوقها اسطوانية الشكل خضراء اللون تنمو من ٣ الى ٥ امتار . اوراقها كبيرة القند جامدة الصفعة . كباشتها متدلية عديدة الاشاط . ثمارها مستطيلة ، غليظة ، محبة الاطراف . لبابها غزير المادة التشريفة اللذالية يصنع منه بعد التجفيف والسحق دقيق شائع الاستعمال يمدى دقيق الموز .

Musa ensata (S).

٢٨٠٥٨ - موز الحبشة

Bananier d'Abyssinie (F).

نوع من الموز ، يتكاثر بالبذر ، مهدد الحبشة . ارويته لا تنق ، ساقه تنمو من ٣ الى ٧ امتار وهي خضرة الجذع حل حلوذ زانها الاول . اوراقها اعليجية الشكل تنمو من ٤ الى ٦ امتار وترى من ٨٠ الى ١٢٠ سم . نصلها مائلة جامدة جبيلة الخضر ، ضلوحها غليظة جزوية اللون . انفرارها منبل التجميع . انفرارها بنفسجية كبيرة القند ،

Canthus ٢٨٠٨٠ - **موق**
هو ملتقى الجفتين وهما اثنان: الموق الاكبر والموق الاصغر. فالأكبر ما كان من جهة الانثى والاصغر من جهة الذن.

Réchaud (F). Chafing-dish (E). ٢٨٠٨١ - **موقد**

Apogée (F). Apogee (E). ٢٨٠٨٢ - **موقبل**
البد الاقصى لنجم من الارض.

Mandant (F). Employer (E). ٢٨٠٨٣ - **موسكل**
هو الذي يصدّر منه التوكيل الى شخص يدهي وكيل.

Eleveuse (F). Raiser (E). ٢٨٠٨٤ - **موسين**
دفينة اصطناعية تستعمل لحسن القوب.

Mull ٢٨٠٨٥ - **موقل**
ساف من الطبقة الدنياية يرتكز على التربة المدنية، يشتر بحبيباته الرملة وبكثرة ديدانه وحشرات وبجافيته النسبية وبوفرة مواده الغذائية.

Financier (F). To finance (E). ٢٨٠٨٦ - **موقل**

Araignée (F). Spider (E). ٢٨٠٨٧ - **موقلة**
المول اسم للمكبوت. الواحدة مولة.

Zeus (S). ٢٨٠٨٨ - **موقلك**
Zée, Dorée, Poisson de St Pierre (F).

سمكة بحرية وسيدة الجنس والنوع من شائكات الزعانف وفصيلة المولكيات. اصطناع البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي جسمها شبه بيضى الشوزن بطول من ٤٠ الى ٥٠ سم. رأسها مستطيل الجرم، كبير الخلق الرب. عيناها ماحتان. زعنفتها الظهرية كبيرة مستطيلة، منخشة القسم الامامي، سرحة الخلفي. ويدلونها في القسم الامامي نحو ١٢ حكة مستطيلة دقيقة غشوية التركيب. زعنفتها الخرجية ثلاثية المفاصل الحادة. الذيلية شبه مربعة مقطوعة. ثوبها الى الصفار المذهب. يدلونها في اعلى عروشها نقطة سوداء مستديرة || لحنها مأكول متوسط الصنف.

Zeldas (S). ٢٨٠٨٩ - **موقكيات**
Zeldés (F). Zeldes (E).

فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزعانف. اجناسها وانواعها المرفوعة قليلة البدن، اعطائها بحار العالم اجسامها متباينة القد، منها الصغيرة والوسطى والكبرى. جميعها بيضة الشوزن او اهليلجية. رؤوسها مستفصنة. زعانفها الظهرية كبيرة مزينة || لحنها مأكولة لكنها من الاصناف المجذلة.

Molannidae (S). ٢٨٠٩٠ - **موقنسيات**
Molannidae (F). Molannidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جملونات الاجنحة. اجناسها وانواعها المرفوعة قليلة البدن منتشرة في بعض جبال البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد، عمراء اللون. يسط اجنتها قراوح من ١٨ الى ٢٨ م. اجنتها مستطيلة الشكل، ضيقة. الامامية منها كثيفة الخمل، الخلفية شفاقة || تألف الجسريات والمنساق والفردان. اساريها تعيش في المياه الراكدة ضمن جلايب ريلة

١٥٢٢ ٪ من السليلوز
٩٢ ٪ رباد

Mouzaibi (F). ٢٨٠٩٥ - **موزعبي**
هو التليكة من البساتين البقلية، اطلبها.

Equilibré (F). Balanced (E). ٢٨٠٩٦ - **موزون**
نمت تمريني يطلق على كل تبغ يمثل الطعم لا يتصور نقص.

Musaceae (S). ٢٨٠٩٧ - **موزيات**
Musacées (F). Musaceae (E).

فصيلة نباتية من سيدات الفلقة. انواعها عديدة تجمعها ثلاثة اجناس: للوز والهل والوشيج. اصطناع السيلاد الاستوائية والحارة. نباتاتها شبيهة عادمة الجروع الحشوية. سوقها انحدار ليفة، مراكية، فرصية الانتشاب، ترتكز على اروية.

Muscardino (F). ٢٨٠٩٨ - **موسكردين**
Silkworm disease (E).
مرض يصيب دود القز يدهي الشلل الوردي، اطلبها.

Thérrophyte (F). ٢٨٠٩٩ - **موسسي**
Therophyte (E).
كل نبات يزري للمسا دورته الحياتية تطول مؤبداً ولا يتمنى الحول.

Prisme (F). Prism (E). ٢٨٠٩٠ - **موشور**
جسم متوازي الحروف الجمانية المتساوية العمودية على كل من قاعدتيه || والموشور قد يكون قائماً ومزججاً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً الخ... || يستخدم الموشور الزجاجي الثلاثي البصري في علم القصور وهو يتكون من وسط شفاف محصور بين سطحين مائلين تحدهما زاوية تدعى زاوية الانكسار.

Prismatique (F). ٢٨٠٩١ - **موشوري**
Prismatic (E).
نمت تعريفي يطلق على ما كان شكله كاللمشور.

Paille (F). Straw (E). ٢٨٠٩٢ - **موش، قش**

Commissure ٢٨٠٩٣ - **موشيل**
موضع اتصال بعض اجزاء الجسم.

Efférent (F). Efferent (E). ٢٨٠٩٤ - **موشيل**

Inducteur (F). ٢٨٠٩٥ - **موشيل كهربائي**
Inductor, Field-magnet (E).

Légataire (F). Legatee (E). ٢٨٠٩٦ - **موشى له**
هو الذي يستحق له الموصى به.

Hétérozygote (F). ٢٨٠٩٧ - **موشوت**
Heterozygote (E).
هو الاثيب، راجعه.

Mahogon (F). ٢٨٠٩٨ - **موشوت**
هو الخلف، راجعه.

Fourmis allées (F). ٢٨٠٩٩ - **موق**
Winged ants (E).
هو النمل الجتح.



مركن

شبه مخروطية الشكل يطولها مجرّ رقيق قاسي الشكل ، من التركيب ذاته يمينها على الانتقال . أشهر أجناسها :

Molans (S).

المولنة

٢٨٠٩١ - مُولَات ٥ Laemobochronidae (S).

Laemobochronidae (F). Laemobochronidae (E). فصيلة حشرات جلدية من رتبة القلاذيات وطبقة التليبات . أزعاجها عديدة يجمعها جنس واحد . جميعها صغيرة القد مفلطحة الجسم المستطيل ، طولهاراوح من ٥ الى ١٠ م . ألوانها الى الكهبة البهراء يملوها تخطيط اسمر . وهي تعيش على الطيور الكراسر فتضيقها . وأشدتها مولة والجمع مول .

٢٨٠٩٢ - مُولَات قَرْنَاء Molyta (F).

في خنفساء الجزر ، وأجمها .

٢٨٠٩٣ - مُولِيرَة Mulleria (S).

Mulleria (F). Mulleria (E). جنس حيوانات مائية من الرخويات صفيحات الخياشيم وفصيلة النبادات . أنواعها المعاصرة المروفة قليلة العدد أعطتها ابنر ومناعل وفردان أمريكا الاصولية ٥ أصدافها لانظامية الاشكال والأحجام ، لامتساوية المصارم ، ملحوظة بأدمة سبكة بأدمة الخضار ٥ تعيش منفردة في الاحمال . طعمها كاتمة الصنف .

٢٨٠٩٤ - مُولِيرِيَّة Mollie (F).

في الخوطاية الزرقاء ، أطلبها .

٢٨٠٩٥ - مُم Meum (F).

هو الشبث البري ، أطلبه .

٢٨٠٩٦ - مُمَزَّة Bananera (F).

Banana-plantation (E). في بستان الموز .

٢٨٠٩٧ - مُمَزَّة ٥ ، أَسْتِيْن Monarda (S).

Monarda (F). Bee-balm (E). Etagenblume (D).

Monarda, Menta americana (I). جنس نباتات حشوية معمرة من فصيلة الشفويات . أنواعها سبعة . سورها فروع قصيرة . أوراقها كاملة مسننة متعاقبة . أزهارها غصية التجميع ، أبيلة الارتكاز أو طرفية . أوراقها وزاها غنية بمادة التينول ٥ أشهر أنواعها شاي بلسلانيه وتعتبر الخليل والثاسورية والمرقطة .

٢٨٠٩٨ - مُمَزَّة مَرْقَطة Monarda punctata (S).

Monarda (F). Bee-balm (E). Etagenblume (D).

Monarda punctata (S). Monarda punctata (F). نوع من الموردة وهي بجلة تريينية معمرة تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم . ساقها فروع . أوراقها سنائية . نصلها خلى البشرة سنن الحلقه . أزهارها الى الصفرة المرقطة بالحمرة . أزهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

٢٨٠٩٩ - مُمَزَّة نَاسُورِيَّة ٥ ، بَرَقَمَت بَرِّي ، فَعْنَت الفَرَس ، فَعْنَت الخَيْل

Monarda fistulosa (S). Monarda fistulosa (F). Wild Bergamot, Horse Mint (E). Pferdeminze (D). Monarda

pelosa, Menta rossa (I).

نوع من الموردة وهي بجلة تريينية معمرة تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . ساقها سقة فروع . أوراقها بيضيه ذرية . نصلها خلى الصفرة سنن الحلقه . لون أزهارها يختلف

باختلاف القروب . منها الابيض والبني والاصفر والوردي والاحمر ٥ أزهارها يستمر من حزيران الى آب . أوراقها عطرية فواحة العرف تستعمل في صناعة العطور ويستخرج منها من الاثمار ، بالتقطير ، زيت طيار له رائحة الكافور وهو منه ، طارد للرياح ، مضاد للتشنج ، مفو للاعصاب خافض للحرارة . أوراقها الجافة تستعمل استمال الشاي .

٢٨١٠٠ - مُمَزَّة Acuminé (F). Acuminata (E).

نمت وصني يطلق على الورقة أو الشرة المدنية الطرف .

٢٨١٠١ - مُمَزَّة ٥ Monilla (S).

جنس فطور مجهرية من التوتيات وفصيلة الفوطيات . جربها الكنديدة واضحة الهيئة . كتالها لبينية الشكل ، سبحة للتجميع ٥ أنواعها عديدة معظمها مقبل بشكل الطور الكندي في اللبن ٥ أعرف أنواعها وأشهرها الثلاثة التالية .

٢٨١٠٢ - مُمَزَّة بَيْضَاء Monilla candida (S).

ظفر من المونيلية يركب القش والأعشاب النحلة والساورة الى الاثقال والثمار السكرية المخمونة والعصير والحلاص كتالها سبحة التجميع . قياس الكتيبة ٥×٧ م .

٢٨١٠٣ - مُمَزَّة ذَهَبِيَّة Monilla aurea (S).

ظفر من المونيلية يركب لاه الجذوع والأغصان اليابسة . يندر كالتراصة . كتالها لبينية الشكل صفراء اللون مدنية الملوح قياسها ١١×٢٠ م .

٢٨١٠٤ - مُمَزَّة مَهْلَاء Monilla finicola (S).

نوع من المونيلية ظفرا يركب حرم المطاط فينبطها ويومها يشبهه الامهق اللون ، البليد التجميع ، الذي يقضي على التطور المرئية الناشئة ٥ يكافئ بنضغ الفورة الحاصبة بالمخاض الخلي حيار ٣٣ ٪ المركز ١ على ٧ أي جزء واحد من المخاض في سبعة اجزاء ماء .

٢٨١٠٥ - مُمَزَّة مُونِيلُوبسيس Monillopsis (S).

جنس فطور مجهرية من التوتيات . شبيهة قدي الشكل ، لب التجميع ، يسرح على الاعضاء النباتية عند سطح التربة . هيئة اسطوانتي الشكل ، دقيق الحبل ، كثير الفروع ، مراكب القوامس ٥ أنواعها قليلة المدد والأذى أضرها سالي .

٢٨١٠٦ - مُمَزَّة مُونِيلُوبسيس أَدْرُهُولْدِي Monillopsis adarholdi (S).

ظفر من المونيلوبسيس يركب سوق وأوراق الارنقندية والتعليه والكرويتيم ويخمر مروج والسراخس أفرادها في الأوراق عادية لا تتسبب المكائفة . أما اذا تمكن من السوق تاته يقضي على الصلاء عند سطح التربة . لذلك تحسن المكائفة .

٢٨١٠٧ - مُمَزَّة مُونِيلُوبسيس قَاسِي Monillopsis fagi (S).

نوع من المونيلوبسيس ظفرو يركب أوراق الزان فيؤذيها لانه يسبب يباس النسيج .

٢٨١٠٨ - مُمَزَّة مُونِيلُوبسيس فُولِكُولَا Monillopsis follicola (S).

نوع من المونيلوبسيس ظفرو يركب أوراق الاكينسيا . والبثق والأجاص فيشبعها بفس الشهي دون أن يؤذيها .



موردة لاسورية



مونيلية



مُونِيْمَة



مُونِيْمَة غُوْلِيْمَة



مُووَر



أَبْرَ خَتْلَفَة



مَنْتَل



مَنْدَل

٢٨١١٩ - مُونِيْمِيْمَة *

جنس نباتات جنسية من فصيلة المونيميئات . أنواعها عديدة أصنافها البلاد الحارة أعصها الهند والجزر . أوراقها مستطبة متقابلة بيضية . فصلها جاهد الصفحة الزائفة ، بارز المروق . أزهارها ثنائية السكون . ثمارها كالتين شكلًا وكذا وهي مأكولة سكرية العلم لا تحفل من الحفصة . لحاء سقيها حامزة طيبة كانت ولا تزال تستعمل دسده الحبيبات

٢٨١١٠ - مُونِيْمَة غُوْلِيْمَة *

Monimia gothica (S). *Monimia gothica* (E). حشرة من النسقيات حرشيات الاجنحة . موطنها بعض اقالم موص البحر الابيض المتوسط والمناطق الداخلية المتاخة . فراشها واسعة قوتها رقيق الأزهار . سرقها تعيش على أوراق السنديان وغيره من الأشجار المروء والمدايلة || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٢ م . بطنها نحو ٣٦ م . رأسها حنطي اللون . عينها نازرة . زباناها عيطيان . رشفها منعد الجرم والطول . جوشها وبطنها الى الحنطي الاصفر المواج || ورشهاا الاماميان الى الحنطي يملوه تبيض وتفتيح وتبيض وزرقة خضابها اصفر . ويملوه ايضا بقعة مربعة واخرى مستطبة لونها الى الكسني القاتم . ورشهاا الخلفيان الى الحنطي الاصفر يطوه حنار تبي يتنهي بالاعذاب || لها جيل واحد في الحول . تظهر القراشة في آذار وتبقى حتى ايار . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتدح المكان لطفاً مستطبة على الصفحات السفلى من نصال الأوراق || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٥ م . جسمها اسطواني الشكل ، واضح الحيد . قوتها الى انخسار الاطحل المواج يملوه خط لثبي اسود وثلاثة خطوط جانبية حمراء مراء . رأسها اسود . منها الى الفتحة الرصاصية . رواجبها الى السرفة القاتنة || طور الاكمال الذي يستمر من ١٥ الى ١٧ يوما ينتفي في التربة حيث تنتمن السرفة ملتصقة بجلباب من الطين .

٢٨١١١ - مُونِيْمَة مَنِيْمِيْمَة *

Monimia ambigua (F). *Monimia stabilis* (E). حشرة من النسقيات حرشيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اورو وافريقية الشمالية . فراشها واسعة قوتها رقيق الأزهار . سرقها تعيش على أوراق السنديان وغيره من الأشجار المروء || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٢ م . بطنها نحو ٣٣ م . رأسها حنطي اللون . عينها كيرتزان . زباناها مشطيان عند الذكر ، عيطيان عند الانثى . جوشها وبطنها الى الحنطي الاشعث المواج || ورشهاا الاماميان الى الحنطي الاشعث تملوه دائرتان متاستان وسط متعرج وتفتيح حناري . جيمها الى الحنطي لشديد السرة . ورشهاا الخلفيان الى الربعة الغبراء تملوها ماجة قضيعة وسط اسمر يستيق الحنار خارجي || لها جيل واحد في الحول . تظهر القراشة في آذار وتبقى حتى ايار . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتدح المكان لطفاً مستطبة على الصفحات السفلى من نصال الأوراق || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٥ م . جسمها اسطواني الشكل . قوتها الى السرفة الزينية المواج يملوه خط لثبي جزوي وثلاثة خطوط جانبية منها خطان اسودان والخط الوسطي اصفر . رأسها احر . منها الى الفتحة الغبراء . رواجبها الى السرفة ||

طور الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع ينتفي في التربة حيث تنتمن السرفة ملتصقة بجلباب من الطين .

٢٨١١٢ - مُونِيْمِيْمِيَّت *

Monimiaceae (S). *Monimiaceae* (F). *Monimiaceae* (E). فصيلة نباتية من ذرات الفلقتين . اجناسها وأزهارها عديدة . جميعها اشجار وبجنيات . أوراقها متقابلة بسيطة . أزهارها وسيدة الشق . اشهر اجناسها المونيمية .

٢٨١١٣ - مُووَر *

Moho (S). *Moho* (F). *Moho* (E). جنس طير من الجواثم رقيقات المناقر . وفصيلة المفترقات . انواعها المعروفة ثلاثة موطنها جزر الهندونيش . ملجتها الحياتي جامي . جماعتها قليلة العدد . قوتها رقيق الأزهار والحولم ... || اجسامها صغيرة مستطبة المناقد القليلة التفوق . اذنانها رقابية مستطبة . اثريها لثائية الاوران فيها الاسود والاصفر والابيض . بطنها دائما صفراء اللون او بيضاء ويملوها في اياطها بطب دقيق نام || تدنق في الادغال . انثاها تفح من ء الى ء يهضات تحضها بمناوبة الذكور نحو ١٣ يوما .

٢٨١١٤ - مَوُوْب لَه *

Donataire (F). *Donee, Receiver* (E). هو الذي يقبض الهبة .

٢٨١١٥ - مَوُوْبَة *

Provision (F). *٢٨١١٦ - مِيْبَار * ، مِيْبَر مَقْلَق* *Anthère* (F). *Anther* (E). العضو الذكري في النبات وهو الجزء العلوي من السداة يرتكز على الحويطة ، اليه تنتهي جذرات الطلع وله تنصع منه لتتفر .

٢٨١١٧ - مِيْقَل *

Manomètre (F). *Manometer* (E). جهاز خاص يستعمل في قياس ضغط الغازات والبخرة .

٢٨١١٨ - مِيْقَب *

Affluent (F). *Falling into, Running into* (E). الجدل الذي يصب في البحر . ج مأكب .

٢٨١١٩ - مِيْقَحَر ، لَقِيْس *

Tardif (F). *Tardy* (E). هو ما طال زمن نموه ان في الحيران او في النبات .

٢٨١٢٠ - مِيْقَدَل *

Acidimètre (F). *Acidimeter* (E). مقياس الحموضة . يستعمل لمعولة مقدار مسا في بعض السوائل كالحجر والحليب وما اشبه من حوامض .

٢٨١٢١ - مِيْقَاق *

Périscopie (F). *Periscope* (E). *٢٨١٢٢ - مِيْاَح ** *Afférent* (F). *Afferent* (E). ناقل السائل الى العضو او الى المركز .

٢٨١٢٣ - مِيْاَط *

Marée descendante (F). *Falling-tide* (E). هو ما يدمونه الجزر اي تباعد مياه البحر من الشط ورجوعها الى ما كانت عليه قبل الهياط .

٢٨١٢٤ - مِيْاَع *

Vasculose (F). مادة تنسج الوعائية .



مير للك



ميشة الرنس



ميشة مقلنة



ميشة غنية



ميشة وردية



ميج

٢٨١٣٣ - مَيْحَان ، مَيْحَان Methane (F). غاز مئطب عديم اللون .
Marsh gas (E).
٢٨١٣٤ - مَيْوَكُولَرِي Mitochondrie
وَأَج كَوْنَدِيوزوم .

٢٨١٣٥ - مَيْسَنَة Mycena (S).
Mycène (F). Mycena (E).
جنس فطور من فصيلة الفاريقونيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد أعطتها غابات مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تتميز بنكهاتها الصنيرة وبطراستها الحادة الأطراف الملونة . بعض أنواعها جيد الصنف مأكول والبعض الآخر كاعن الصنف غير مرغوب فيه || اعرف أنواعها واشهرها الاربعة التالية .

٢٨١٣٦ - مَيْسَنَة السَرْحَس Mycena epipterygia (S). Mycène des fougères (F).
توجد في المواقع الرطبة بين الرنس . ساقها دقيقة ، رقيقة ، لزجة . لكننها قبة الشكل ، صفيرة اللد ، قطرها نحو ١ سم . لونها الى الصفار الميوني || لحينها كاعن الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢٨١٣٧ - مَيْسَنَة مَقْلَنَة Mycena galericulata (S). Mycène à bonnet (F).
توجد في الغابات على الجبلوع النضرة القريبة من التربة . ساقها دقيقة ، مستدلة الانفتاح ، تبنية اللون . لكننها قلنسوية الشكل ، قطرها نحو ٥ سم . لونها الى الكمية الصفراء . اطراسها وردية اللون || لحينها مأكولة ، للذبة الطم ، مرغوب فيها .

٢٨١٣٨ - مَيْسَنَة لَكِيَة Mycena pura (S). Mycène pur (F).
توجد في المواقع الرطبة . تعيش على اللبال . رانحتها راحة الفيل . ساقها مستدلة الانفتاح والانتفاضة . لكننها صافية الشكل ، صفراء اللون يعلوها موج ليكني هابن . اطراسها وردية اللون || لحينها كاعن الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢٨١٣٩ - مَيْسَنَة وَرْدِيَة Mycena rosella (S). Mycène rosé (F).
توجد في المواقع الرطبة بين الصنوبر . ساقها رقيقة ، دقيقة ، وردية اللون . اوسرتها صاجية الشكل ، صفيرة اللد ، قطرها نحو ١ سم . لونها الى الوردي العانيق || لحينها كاعن الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢٨١٤٠ - مَيْج Dactylopterus volitans (S).
Dactyloptère, Grondin rouge (F). Flying-fish (E).
جنس اسماك بحرية طيارة زائغة الاالوان من فصيلة الميجيات . وديتها شاككات الزائفات الاصبمية . انواعها قليلة العدد ، اشهرها ميج المتوسط الذي يبلغ طول نحو ٥٠ سم . له زعنفتان مجنحتان طول الواحدة نحو ٣٠ سم . يمكنه من الارتفاع والسير فوق الماء فيطير نحو نصف دقيقة على ارتفاع متر .

٢٨١٤١ - مَيْج مَبْدُول ، مَيْج المَبْدُول Dactylopterus volitans communis (S).
Dactyloptère, Grondin rouge (F). Flying-fish (E).
جنس اسماك بحرية طيارة زائغة الاالوان من فصيلة الميجيات . وديتها شاككات الزائفات الاصبمية . انواعها قليلة العدد ، اشهرها ميج المتوسط الذي يبلغ طول نحو ٥٠ سم . له زعنفتان مجنحتان طول الواحدة نحو ٣٠ سم . يمكنه من الارتفاع والسير فوق الماء فيطير نحو نصف دقيقة على ارتفاع متر .

٢٨١٤٢ - مَيْج مَبْدُول ، مَيْج المَبْدُول Dactylopterus volitans communis (S).
Dactyloptère, Grondin rouge (F). Flying-fish (E).
جنس اسماك بحرية طيارة زائغة الاالوان من فصيلة الميجيات . وديتها شاككات الزائفات الاصبمية . انواعها قليلة العدد ، اشهرها ميج المتوسط الذي يبلغ طول نحو ٥٠ سم . له زعنفتان مجنحتان طول الواحدة نحو ٣٠ سم . يمكنه من الارتفاع والسير فوق الماء فيطير نحو نصف دقيقة على ارتفاع متر .

٢٨١٤٥ - مَيْحَة Fluidiste (F). Fluidiste (E).
الميح من شايح النظرية القائلة بان الخناطيس الحيواني يميد الى جاذبية خاصة .

٢٨١٤٦ - مَيْيَاكَة ، مَيْيَاكَة Collecta (S).
Collectie, Mayaca (F). Mayaka (E).
مياكة هو الاسم الشلي . جنس نباتات برية معمرة ، طيبة من فصيلة النبقيات . انواعها المعروفة نحو ٢٠ منبتها يبع مناطق امريكا الجنوبية اغصنها الشلي والبروي || جميع انواعها شجيرات ونباتات قراء . معطها شالك الانقاد والافقان . اورلتها متعاقبة ، مستقة ، اهليجية النصال الصغيرة . ازهارها فردية ، ابطية الانزكاز ، عطرية العرف ، يكثر فيها اللون الاليفس . ثمارها عنابية الشكل والقد ، مأكولة لكننها تسهل المدة .

٢٨١٤٧ - مَيْيَا رَاكْدَكَة ، مَيْيَا رَاكْدَكَة Eaux stagnantes (F). Stagnant water (E).
Hydrométrie (F).
Hydrometry (E).
علم كل ما هو يخص بالماء كالكثافة والضغط والسرعة الخ .

٢٨١٤٨ - مَيْيَاكَة Jes de coing (F).
Juice of the quince (E).
صمير السفرجل .

٢٨١٤٩ - مَيْبَة Blédus littoralis (S).
Blédie armée, Blédie du littoral (F).
Blédus littoralis (E).
حشرة جاسة زائجة من فصيلة الدنليات ودية غدييات الاجسنة . موطنها حوض البحر الاليفس المتوسط . تألف المواقع الرطبة واغصنها البساتين . خناتها وبرقاتها تعيش على المواد العضوية وكل ما تستطيع اغراسه من الحشرات الدنليا || جسمها صغير اللد ، نحيل ، يطول من ٦ الى ٧ م . ثوبا ثنائي اللون ، اسود الجسم ، جروي النمدن والجرارمز . رأسه صغير الجرم قصير الخطم ينتهي بفكين ضليعين . ورأس الذكر مسلح بقترنين خديين . زبانه مرفقيان

مينا صغيرتان . ظهرانه حاد التميزيز يلحف نحو خني البطن || يدعي مير المسك نسبة الى ما تفرزه سكت البطنية الثامنة من مادة عطرية قريبة الشبه بعرف المسك || الذكر اميز قدام من الانثى وابع ثوبا منها واطول زبانا وراق بطنا || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجسلانة في اوزال الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في الليل وتبيت في النهار || البرقة بطيئة النمو لا تدرك الكمال الجسدي قبل اواسط شباط . جسمها يطول من ١٢ الى ١٥ م . وهو مستطيل المقدم والرأس ، مستدق الطرف غير اللون ، اسمر الرأس والشرج ، منقط الجانين الامين والاييسر بملون سود متوسط السمك || طور الاكمال يستمر من اواسط شباط الى اواخر آذار .

٢٨١٤١ - مَيْبَة Guenon (F). She-monkey (E).
لمبة القردة الغنية وقدي قيشة . اما التي بلغت القسبة فتدعى زئامة .

٢٨١٤٢ - مَيْيَا فَيْزِيك ، مَيْيَا فَيْزِيك Métaphysique (F). Metaphysic (E).
علم ما وراء المادة او الطبيعية من المعتقدات .



مَيْجَة



مَيْجَل



مَيْجَة الْبَطَا



مَيْجَة الْفَارِيقُون



مَيْجَة خَيْبِيَّة



مَيْدَاس



مَيْدَع

شائكات الزعانف الاصبعية || اعطائها بحار البلاد الحارة
وبها المتوسط . يكثر وجودها في المياه العذبة والبيئية ويقف
في المياه الجبلية || جسمها شبه وشعي الشكل يطول من
٤٠ الى ٦٠ سم . رأسها معتدل الحجم ، غروي الشكل .
فكها الاعلى يتقدم الاسفل قليلا . عيناها كبيرتان ،
مستديرتان ، فاشترتان . ريشتا الارتكاز . ثوبها يراوح

بين الاحمر والوردي الزاهي يطولو موج اصفر وبمجمعي ||
زعانفها متباينة الاشكال والاحجام . الظهرية مستطيلة
الشاكفة . الصدرية كبيرة جناحية الشكل يطولها عند قاعدتها
شعاع . مقوس الطرف || زعنفتها الصدرية
مجتنحتان تمكناهما من الارتفاع فوق سطح الماء والطيران
بحور نصف دقيقة واكثر || لحمها متوسط الصنف ، مأكل .

٢٨١٢٢ - مَيْجَة *
Meja, Maia (F). Spider crab (E).
جلس منع من القشريات المعروفة بئساب البحر . انزاهه
عديدة ، اعطائها بحار البلاد الحارة . يكثر وجودها بين
الحث وصل الصخور || اشهر انواعها المأكولة الميضية
المجلولة التي يراوح طولها من ١٨ الى ٢٢ سم .

٢٨١٢٣ - مَيْجَل *
Amela (S). Amela (E).
جنس حيرانات زعافه من العطاء وفصيلة التديتات . انواعه
المعروفة نحو ٢٠ موطنها امريكة الوسطى والاكوادور .
تألف البراري والقياني الرملية . قوتها الحشرات واساريتها
والديدان || اجسامها تطول من ٢٥ الى ٣٧ سم . اثوابها
تختلف مع الانواع تكثر فيها الركة السوداء .

٢٨١٤٤ - مَيْجِيَّات *
Dactylopteridae (S). Dactylopteridae (E).
فصيلة اسماك بحرية يبروشه من رتبة المطويات شائكات
الزعانف الاصبعية || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة
العدد . معظمها من اسماك المحيط الهادي والغندي والبحر
الاحمر || اجسامها وشعي الشكل تطول من ١٥ الى ٧٠ سم .
رؤوسها كبيرة . مخاضها قصيرة . زعانفها الصدرية
مستطيلة ، جناحية الشكل ، تمكنها من الطيران فوق
سطح الماء || اشهر انواعها واعرفها الميج المجلول .

٢٨١٤٥ - مَيْجَع *
Meja (F). Meja (E).
للشجرة او الاكّة المنفردة الباتنة عن اشواها . ج . مواسيد .

٢٨١٤٧ - مَيْجَة *
Hypomyces (S).
جنس فطور مجهرية من السانغيات فصيلة المطويات .
انواعها عديدة معظمها من الفطور التي تنطفل على خبثا
من الزرقيات والذعنات وبعضها يعيش على النباتات العليا .
اصنافها وتكاثرها دقيقة ، نكاهها اروسية الشكل متراكبة .
بوطها متتابع الخلايا وردي اللون || انواعها اللؤوية ثلاثة
نوع :

٢٨١٤٨ - مَيْجَة الْبَطَا *
Hypomyces haematococcus, Nectria citri, Fusarium solani esumarti (S).
لفطر مجهرى يصيب عدة نباتات انحصا البطاطا والخمضيات
والبن والكاكاو الخ . . . || يركب بطور البطاطا ودوناتها .
مظهره الخارجى يقع سمع لا قياسية تنفى البشرة واللبن
فتسبب فيها دون ان تؤذي البعوض || ويركب سق

الاشجار من الخمضيات وغيرها فيسب قروحاً لونها الى
السررة تبدو كالخوش المسجلة ثم تنتشر تصطب اللحاء
والشكر والخشب وتقود الجذع الى العصرم || يكافح
بالكروزل الحمول ١٠ ٪ الى ان يباد التطهير مرة ثانية
بمد الاول باربعة او خمسة ايام .

٢٨١٤٩ - مَيْجَة الْفَارِيقُون *
Hypomyces rosellus, Dactylium dendroides (S).
فطر مجهرى يتطفل على الفاريقون لؤويه . مظهره الخارجى
يقع خلية ، لونها الى البياض الاخر ، قطرها يراوح من
١٠ الى ٣٠ سم . تملو الفطرة حثا وهنك ثم يركب
الفاريقون وقد تصيب نكته فتسببها وتسرهم يد ان
تختلها بمسح خاص ، نواسه كنف القطن لونه الى
الصبغة الزرقاء || يكافح باستعمال الليزول الحمول ٢ ٪
او الفورمول التجارى الحمول ايضا ٢ ٪ .

٢٨١٥٠ - مَيْجَة خَيْبِيَّة *
Hypomyces perniciosus, Mycogone perniciosus, Verticillium, Cephalosporium (S). Môle du champignon de couche (F).
فطر مجهرى يتطفل على بعض انواع الفطور المأكولة واخصه
الفاريقون للرؤ || مظهره الخارجى يقع خلية لونها الى
الرماد تملو سطح الفطرة ثم تمتد الى الفطور فتسببها
وتسهرها || يكافح باستعمال الليزول الحمول من ٢ الى
٢٥ ٪ .

٢٨١٥١ - مَيْجَعِي *
Unvolitin (F).
نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تبيض موسمياً واحداً
متتابعاً لاستقطاً في دورتها الحياتية الحولية .

٢٨١٥٢ - مَيْجَعَة *
Style (F).
يقال بنؤا يبروشه على مياه واحد اي على طريقة واحدة .

٢٨١٥٣ - مَيْجَعَس * || مَيْجَعَس *
Midas (S). Tamarin
جنس قرود امريكية من فصيلة القرود الدبية . انواعه ٢١ .
موطنها كستارياكا وباناما وكوليبيا والبيرو والبرازيل
والفريانا || اجسامها صغيرة القند ، حيلة الشكل ،
مستطيلة الشعر الناعم اللثري . رؤوسها مستديرة ، اذانها
عامة الور . اذانها مستطيلة حيلة . اثوابها سوية الالوان
التيانية الموج || تعيش بين الاغلال وفي الروع القريبة
من الغابات . قوتها الحشرات والعطاء والصفادع والعصافير
وبعض الثمار والحبوب .

٢٨١٥٤ - مَيْجَعَان ، مَيْجَعَان *
Hippodrome, Champ de courses (F). Hippodrome, Race-course, Race-ground (E).
مكان سباق الخيل .

٢٨١٥٥ - مَيْجَعَس *
Fluviographe, Fluviomètre (F). Fluvimeter (E).
جهاز يستعمل في قياس مياه الانهار ونسبة اعتدالها .

٢٨١٥٦ - مَيْجَع *
Pentapus (S). Pentapode (F).
جنس اسماك بحرية من فصيلة القشريات . انواعه المعروفة
قليلة ، جميعها من اسماك بحار البلاد الحارة والمتدلة . اجسامها
الهلجينة الشكل متوسطة القند . زعانفها الظهرية مستطيلة
شائكة || زعانفها الشرجية فارقة . اثوابها فضية اللون يطولو
تخطيط مذهب قاطب .



ميدوس



ميديه



ميه



ميرسين



ميف



ميدوس

٢٨١٦٣ - مير ، مِسْطَرَة الإرتشاع

Mire (F) Sight (R).
مسطرة مرقية تستعمل لقرعة الإرتشاعات في مسح الأرض .

٢٨١٦٤ - ميرآ - ميرآ

Mira (F) Mira (E).
ميرا نجم ثير من كوكبة قيطس مشهور باسم أصبوية ، اطلها .

٢٨١٦٥ - ميراث

Héritage, Hoir, Succession (F). Heritage, Inheritance, Succession (E).
هو التركة ، اطلها .

٢٨١٦٦ - ميرورة * ٥

Mira (S). Mira (F).
جنس حشرات ناعمة من فصيلة التشرقيات ورتبة قشائيات الاجنحة المضمورة . أنواعها عديدة موطنها بعض مناطق البلاد المتصلة الحارة ، جميعها تتطفل على الحشرات النافقة من الحرشيات وذوات الجناحين || أجسامها صغيرة اللد تطلو نحو ١ م . رؤوسها نصف دائرية الشكل . قوتها الاستعمارية مرقية ، صغيفة ، كبيرة . جوارثها مستطيلة . بطونها قصيرة يرمية الشكل . مرزاتها قصيرة . اجنتها بملع عند الشقين . ألوانها تراوح من الوردي إلى الصنابي الاصفر الموج .

٢٨١٦٧ - ميرسين * ، قتم

Myrsina (S).
Myrsine (F) Myrsine (E). Trugmyrce (D). Mirsine (I).
جنس نباتات شجيرة ممرمة من فصيلة الميرسينيات . أنواعها عديدة ، اطلها البلاد الحارة المشهورة نحو الاستوائية . جميعها تشبه الآس ، بعضها زراعي ثماره نورية صغيرة اللد مأكولة .

٢٨١٦٨ - ميرسينيات ، قشيات ، جنجيات

Myrsinaceae (S). Myrsinacées (F). Myrsinaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وأنواعها كثيرة . معظمها من نباتات المناطق الاستوائية ، فيها الاشجار والشجيرات والجنبات . أوراقها متعاقبة . ازهارها صغيرة اللد ، منها الخشوية ومنها وحيدة السكن . ثمارها نورية مأكولة في بعض الانواع .

٢٨١٦٩ - ميرقي *

Myrage perfolié (F).
نبات عشبي بري حولي من فصيلة الميرسينيات . ينتج البلاد المتصلة الحارة من الشرق الاوسط واروپة . ساقه فروع . اوراقه متعاقبة ، ريمية النصل ، بحرية اللون . ازهاره ناجي الارتكاز عشوي التجميع . أزهاره صغيرة اللد صفراء اللون دقيقة المالحق . ينبت بين الزرع ، كثرته مؤذية .

٢٨١٧٠ - ميروس *

Myrus (S).
Myre (F). Myrus (E).
جنس اسماك بحرية من مفتوحات الحانة وفصيلة الشقيبات . انواعها المرقية اثنتان ، واحد منها الميرين الملبول يعيش في البحر الابيض المتوسط والثاني من اسماك بحار الصين واليابان || جسمه مستطيل الشكل كالانكليش ، طوله يراوح من ٦٠ الى ١٢٠ سم . جلده امرب عادم المرافش . رأسه مخروطي ، ذائق الخطم ، واسع اللدق ، واسع صفتان . صامتات . زعفتها الظهرية قاطبة ، غيقة تقابلها الشرجية التي تمتد من اواسط البطن الى طرف الذيل . ثوبه الى

٢٨١٧٠ - مِسْطَرَة مِسْشِير

Pentapus vittatus (S).
Pentapode rayé (F). Sea rough (E).

سمكة بحرية يروس من فصيلة الفرغيات ورتبة شاكيات الزعانف . اطلها بحار البلاد الحارة والمتصلة الحارة ومنها البحر الابيض المتوسط . تنبت من اسماك التفتاق المتوسطة الذور || جسمها اهليجي الشكل ، يطلو من ١٥ الى ٢٥ سم . لونها الى الزرقاء الفضية الموج يبق عند الرأس والظهر وبني وبني عند البطن ويملوها في جانبها ستة خطوط ذهبية قاطبة . زعانفها زرقاء اللون ، الصدرية والظهرية والشرجية والذيلية حر القواعد . رأسها مخروطي الشكل ، ذائق الخطم . شفها معتدل الانفراج . اسنانها صغيرة ذرية . عيناها كبيرتان ، ناشزتان ، صليتان . زعفتها الظهرية واحدة مستطيلة . زعفتها الذيلية فارقة || لحمها جيد الصنف ، مرقوب فيه .

٢٨١٥٨ - مِسْشِير * ٥

Parafieu (F). Firebrack (E).
حاجر طبيعي او صنيعي جردت منه جميع المواد القابلة للاشتعال منها لاستاد الحريق في الغابات والاحراج .

٢٨١٥٩ - مِسْشِير * ٥

Mydaus (S).
Mydaus (F). Mydaus (E).
حيوان لبني مفرس من فصيلة السوريات . موطن الهند الصينية ونيوزيا . جسمه قريب الشبه بحجم الفريز . رأسه مخروطي الشكل ، ذائق الخطم . قوتاه قصيرة . اظافيره مستطيلة ، شديدة الصلابة ، هلبة عشن . ثوبه الى السمرة الكستنية يعلوه خط ابيض يمتد من الفخذ الى مفترق الذنب . ذنبه جذعة كستنية اللون يدها الطرف || من ميزاته انه يبري عدوه بسائل كافر كرهه للرائحة فترزه اللد الشرجية ويبدده بفقبعيه على ابعد من متر .

٢٨١٦٠ - مِسْشِير يات

Mytilidae (S).
Mytilides (F). Mytilidae (E).
فصيلة من الرخويات صفحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع بحار العالم . اشهرها الميدي .

٢٨١٦١ - مِسْشِير * ، بَلَح البحر

Mytilus (S). Moule (F). Mussel (E).
جنس بحار من فصيلة الميديات . انواعها المرقية نحو ٧٠ معظمها مأكول مشحب اللحم . يعيش على الصخور التي يصرها الماء ويزن في احواس بحرية خاصة صار تجهيزها في هذا السيل .

٢٨١٦٢ - مِسْشِير * ٥

Hemicentetes (S).
Hémicentète, Hémicentrec (F).
جنس حيوانات لينة حارشة من فصيلة المائلات . انواعها المرقية قليلة اللد موطنها الساحل الشرقي من جزيرة مدغشقر . تألف السلياب والاماكن التي يكثر فيها الاعشاب البرية . مسرها دجوي . قوتها الحشرات والديدان || أجسامها صغيرة مكرومة تطلو من ٢٠ الى ٢٥ سم . اطلها مستطيلة . هليها معتدل الشفاعة تتخلله سال متباينة الطول تكثر في ثوب الظهر . ألوانها الى اسود البوداء يعلوها تسنج قاطب اصفر . وثبا نوح اسود الرأس || انثاها ثوروة تضع في كل رمص من ١٠ الى ١٢ جروا || يابثا الشوي يستمر نحو اربعة اشهر .

٢٨١٨٣ - ميزان الغلو كوز
Glucometre (F).
Glucometer (E). هو مقياس الغلو كوز ، اطلبه .

٢٨١٨٤ - ميزان القشدة
Butyroscope (F).
هو مقياس القشدة ، اطلبه .

٢٨١٨٥ - ميزان الكحول ، مقياس الكحول ،
ميكحال
Alcomètre, Alcoolomètre (F).
Alcoholometer (E).

جهاز ينطس في السائل الكحولي فيبين نسبة الكحول فيه .

٢٨١٨٦ - ميزان المشروبات ، مقياس
المشروبات ، مشرباب
Liquomètre (F). Liquometer (E).

جهاز يستعمل في قياس درجة الكحول في المشروبات
الروسية .

٢٨١٨٧ - ميزان المطر
Pluviomètre (F).
Pluviometer, Rain-gauge (E).

هو المطار ، جهاز يستعمل في قياس كمية المطر أو الأمطار
الساقطة في مكان معين .

٢٨١٨٨ - ميزانية
Budget
وثيقة تدون فيها ، عن طريق التخمين الصحيح ، مقادير
الدخل والخارج السنوية .

٢٨١٨٩ - ميزانية
Mésophyte (F).
Mesophyte (E).
اسم يطلق على الجزء النباتي من البزرة حيث تنشب الساق
والجذور .

٢٨١٩٠ - ميزان
Mésophylle (F).
Mesophylle (E).
هو الجزء الداخلي من الورق ، مركزه تحت البشرة الخارجية ،
يتبين بتفصيله .

٢٨١٩١ - ميزو كروب
Mésocarp (F).
Mesocarp (E).
هو السطح ، اطلبه .

٢٨١٩٢ - ميزول
Mésote (F).
هو الفيروليت ضرب من السيليكات ، اطلبه .

٢٨١٩٣ - ميزوليتي
Mésolithique (F).
Mesolithic (E).

اسم يطلق على أحد النصور الثلاثة التي سبقت التاريخ
ويدهى أيضاً عصر الحجر . يتميز هذا العصر قبل التاريخ
ببدء انتشار الحضارة البشرية إذ أنه يأتي مباشرة بعد
عصر الظلمان المعروف أيضاً باسم « ليوليتي » وقبل عصر
الحجر المصقول المعروف باسم « ليوليتي » .

٢٨١٩٤ - ميزيس
Mysis (S).
Mysis (F). Mysis (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات العليا مشقوقات
الأرجل . أنواعه المعروفة قليلة العدد . جميعها مية لا
تتربط من الشطوط . تعيش في أكثر بحار البلاد المعتدلة
الحارة || اجسامها صغيرة القد . الخشبات تغلف معظم
السكم الصدرية . قوائم الناهيا الخلفية مجهزة بمجربوب
صفينية تستعمل لحسن السمع .

الخضار الاصفر عند الميوس المبدل يفر في البطن
وتملوه نقط بيض تمتد من الرأس الى الذيل . رأسه الى
الخضار العايق يطوى مواء بنفسي . ميوس الصين
واليابان جزوي اللون مجذاج بالابيض || لحم النويين جيد
الصنف .

٢٨١٧١ - ميز ، حثول
Dialyse (F). Dialysis (E).
هو الانتشار التحليلي أو الانتزاع التحليلي .

٢٨١٧٢ - ميزاب
Sillon (anat.) (F). Groove (E).

٢٨١٧٣ - ميزانية
Hindsiella (S).
Hindsiella (F). Hindsiella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم
وفصيلة القلويات . انزاعها الماصرة المعروفة قليلة العدد
اغطائها بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض
المتوسط || اجسامها صغيرة . اصداؤها شبه قلبية الشوزن
يقطعها اخمدود غائر شبيه بالميزاب .

٢٨١٧٤ - ميزان
Balance (F). Balance, Scales (E).
اداة تستعمل في وزن الاشياء . وهو يقع على عدة اشكال
وانواع منها البادي والذقيق والشديد الدقة والصغير والكبير .

٢٨١٧٥ - ميزان ، ناظم
Régulateur, Palonnier (F). Swing-bar (E).

قطعة من خشب او من سلهيد مركزها في مقدمة العربة
او الخمرات تعلق بها سبور الجر .

٢٨١٧٦ - ميزان الارتفاع
Altimètre (F).
Altimeter (E).
هو البلسط ، جهاز يبين ارتفاع المكان باللبية الى سطح
البحر .

٢٨١٧٧ - ميزان الاستواء
Niveau (F). Level (E).
هو القادح ، اطلبه .

٢٨١٧٨ - ميزان الحركة
Thermomètre (F).
Thermometer (E).
اداة تقاس بها الحرارة . ومن اسمائه الخمرار والحر .

٢٨١٧٩ - ميزان الحليب ، مقياس السمن ،
مشخاب
Butyromètre, Lactomètre, Pèse-lait, Acido-butyromètre (F). Butyrometer, Lactometer (E).

اسم شامل يطلق على مختلف مقاييس القشدة التي تبين
نسبة المواد السنية الموجودة في الحليب .

٢٨١٨٠ - ميزان الحموضة ، مقياس الحموضة
Acidimètre (F). Acidimeter (E).
اداة تستعمل في معرفة مقدار حموضة السوائل كالحمر
والحليب وغيرها .

٢٨١٨١ - ميزان الحوامض ، مقياس الحوامض
Pâte-acides (F). Acetometer (E).

٢٨١٨٢ - ميزان العصير ، مقياس العصير
Mustimètre (F). Mustimeter (E).
اداة يقاس بها مقدار السكر في العصير .



ميزانية



موازين مختلفة



موازين حرارة



ميزيس

٢٨١٩٥ - ميس Libration (F), Libration (E).

الميس الارتجاج القاهر لكل كوكب حول قطبه وشاشة القمر .

٢٨١٩٦ - ميس * ، نتم Celtis (S).

Micocoulier (F), Lote tree, Nettle tree (E), Zügelbaum (D), Melicocchio, Baciolo, Perlaro (I).
جنس اشجار سرجية من فصيلة اليوقسيات . انواعه نحو ٩٠ منها الاصقاع المعتدة الحرارة . اوراقها متعاقبة متعقبة . ازهارها ابطية خضراء اللون . ثمارها عنبية ، صغرة اللد ، حلوة الطعم ، عديمة البزرة . اغصانها صلبة قوية صناعية . يستخرج من لحائها وجذورها مادة صباغية صفراء اللون || اشهر انواعه ما يلي .

٢٨١٩٧ - ميس جيتي ، ميس جنوبي ، نتم ابيض Celtis australis (S).

Micocoulier austral, M. de Provence, Falabregulier, Fabreoulier, Bois de Perpignan (F), South European hackberry (E), Zügelbaum, Triesterholz (D), Bagolaro, Arcidiavolo, Spaccasassi (I).

شجرة سبروتية تعيش في جميع المواقع والاربية . تطلو من ه الى ٢٥ م . ساقها مائلة للحاء . اوراقها قصيرة الاعتدال . تصلها بطول من ه الى ١٥ سم . ويمرض من ٢ الى ٦ م . وورمالس الصفحة العليا القاعية الخضار ، خلي السفل المظلم اللون . ثمارها مجسم الكرز الصغير . وفي بنفسجية اللون سوداء المواج مستحبة الطعم .

٢٨١٩٨ - ميس دكودي ، نتم دكودي Celtis davidiana (S), Micocoulier du Père David (F).

شجرة متوسطة القد فناء . مهدا الصين . تطلو من ١٠ الى ١٥ م . نصل اوراقها مائل البشرة للامعة تطلو نمطة شغافة . ثمارها حصى اللد سوداء اللون . وفي من الاشجار السبروتية السريعة النمو التي تصلح للتزيين والتربيع .

٢٨١٩٩ - ميس شرقي ، نتم شرقي Celtis orientalis (S), Micocoulier oriental (F).

شجرة سبروتية صغيرة القد تطلو من ه الى ٧ امتار ، مهدا الشرق الاوسط . اوراقها قليلة الشكل يصلها بطول من ٣ الى ٨ سم . ويمرض من ٢ الى ٥ سم . صفحته باضة الخضار الاخضر المواج . ثمارها حصى اللد ، حطية اللون ، صفر المواج .

٢٨٢٠٠ - ميس صيني ، نتم صيني Celtis sinensis (S), Micocoulier de China (F).

شجرة متوسطة القد جميلة الشكل مهدا الصين تطلو من ١٥ الى ٢٠ م . اوراقها بحرية اللون زرقاء المواج ، تصلها بطول نحو ٧ سم . ويمرض نحو ٥ سم . ثمارها برتقالية اللون ، صغرتها سرجية الشكل . وفي من الاشجار السريعة النمو لكنها جادة رغب في بعض المواقع والاربية الخاصة .

٢٨٢٠١ - ميس فيرجينيكية ، نتم فيرجينيكية Celtis occidentalis (S), Micocoulier de Virginie, M. occidental (F), Western hackberry (E), Abendländer Zügelbaum (D), Bagolaro occidentale (I).

شجرة كبيرة القد تطلو من ٢٠ الى ٣٠ م . ساقها مثاقفة للحاء . ثاليها مستديرة ، كبيرة ، قرنية النسيج . اغصانها منفردة قريبة من الانبساط . اوراقها قصيرة الاعتدال ، تصلها مائل الصفحة العليا الامعة ، خلي السفل الباهتة . وفي من الاشجار المتوسطة النمو التي رغب في المواقع الرطبة والارربة الجيدة النور .

٢٨٢٠٢ - ميسان

الميسان نجم من برج الجوزاء يدعى انور الهنعة ، اطلبه .

٢٨٢٠٣ - ميساني MIOCÈNE (F), MIOCÈNE (E).

اسم عصور الحقبة الثالثة التي تمتد اربعة . يقال انه صغر ظهور القرود .

٢٨٢٠٤ - ميسم Stigmate (F), Stigma (E).

هو السمة ، اطلها .

٢٨٢٠٥ - ميسم ، ميسم مكركة Cautère (F), Cautery (E).

٢٨٢٠٦ - ميسون

الميسون احد كوكبي الهنعة .

٢٨٢٠٧ - ميسيات Celcides (F), Celcides (E).

سبط من فصيلة الانجريات .

٢٨٢٠٨ - ميسيل الشوان Cécidomyie de l'avoine

هو طيار الشوان ، اطلبه .

٢٨٢٠٩ - ميسشاك Egoïne, Egoïne (F).

مشلر مزدوج الانسان ، صغير اللد ، يستعمل لنشر فروع وانفان الانجبار .

٢٨٢١٠ - ميسفارة Pristiophorus (S).

Pristiophora (F), Pristiophorus (E).

جنس اسماك بحرية سرلوفة مفترسة من فصيلة المشاريات . انواعها المعروفة ثلاثة ، جميعها من اسماك الهنك واليمن واليابان واستراليا || اجسامها كبيرة ، شبه رشيكية الشكل ، تطلو من ١٨٥ الى ٢٢٥ سم . تتميز بظفر فكها العلوي الذي يستخدم الرأس كالمشار المنحني النصل ، المنحن الحدين . الذوب الانسان . ويغليها من الافحية السادة . ويكثر الاذنانف الذيلية المستطيلة || لحومها كاهنة الصنف قل من يربط فيها .

٢٨٢١١ - ميسفاريات Pristiophoridae (S).

Pristiophoridae (F), Pristiophoridae (E).

فصيلة اسماك بحرية سرلوفة وحيدة الجنس من السلفقيات القرشيات . انواعها المعروفة ثلاثة اعطائها تمتد من الهنك الى اليابان واستراليا || اجسامها وشية مستطيلة . رؤوسها مجوزة بمواشير كبيرة مسنة الحدين || جلسها الوحيد يدعى المشار .

٢٨٢١٢ - ميسفان هو سن المفتاح . ج مواشير .

٢٨٢١٣ - ميسالكية Michela (S), Michélie (F).

جنس اشجار ونباتات برية من فصيلة المنثليات . انواعه عديدة منها الشرق الاقصى والهند والجزر . جميعها نباتات عطرية مقوية شايقة || اشهر انواعها الشبيب ، اطلبه .

٢٨٢١٤ - ميسفان Mithan (F).

هو الجبل ، من بقر الوحش ، اطلبه .

٢٨٢١٥ - ميسفلة Dame en fer (F), Iron dam (E).

مطبة من حديد تقرب بها الارض لتصلب .



ميس



مشار



مشار

Myochama (S). - **مِيخَم** * ٢٨٢٢٨

Myocame, Myochame (F). Myochama (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وقصيلة البندريات. أنواعه المعروفة خمسة جميعها من عظم الجحاح الأستراتي || أجسامها صغيرة ، مثاقبة قصيرة مهدبة الأطراف . أصدانها شبه بيضيه الشوزن لا متساوية المصارع والأضلع ، وريدية اللون ، لؤلؤية || تعيش في أول عهدها على الأصداف المهجورة ثم على الصخور .

Mica (F). - **مِيكَنا** ٢٨٢٢٩
هي الطلق ، الطلق .

Micaschiste (F). - **مِيكَاشيست** ٢٨٢٣٠
هي الطلق المضد ، الطلق .

Mikanla (S). Mikanle (F). - **مِيكَانِيَا** * ٢٨٢٣١
جنس نباتات ليلية عارضة من المركبات . سيقها أسطوانية فرعاء تطول من ٤ الى ٨ أمتار . أوراقها معنقة متقابلة ، نصلها قلبي الشكل مائل البشرة . أزهارها وريدية ، صفيرة ، بيضاء اللون أو وردية || أزهارها يستمر طوال الصيف . وهي من نباتات البلاد الأستراتية لا تعيش في الأقاليم المعتدلة إلا داخل المنازل وفي المصاري .

Mécanique (F). Mechanical (E). - **مِيكَانيك** ٢٨٢٣٢

Microbe - **مِيكروب** ٢٨٢٣٣
هي مجهرى وحيد الخلية ذري القيد .

٢٨٢٣٤ - **مِيكروب كروي** ، **ميكروكوك**
Micrococcus (F). Micrococcus (E).
جنس ميكروبات كروية الشكل .

Micropeplus (S). - **مِيكروبيبلوس** * ٢٨٢٣٥
Micropéple (F). Micropeplus (E).

جنس حشرات من فصيلة الميكروبيولوجيات وريدية غمديات الاجنحة . أنواعه المعروفة نحو ٢٠ أعطائها المناطق الجبلية والباردة من المالمين القديم والجديد || أجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٤ سم . رؤوسها مستعرضة . هيئتها بارزة . قرونها الاستشعارية دويبة . تأثيرها وفكوكها قياسية . أعماحها كواسلها مستعرضة ، نائقة الختار الجانبي . أعماحها مضلعة ، تلتحف نصف البطن . سطوح بطونها منتظمة النقر الناجمة عن تصالب الاغادي التي تملأها . قوائمها منتدلة النشط . أطرافها تتراوح من الجانب الى الاوسط الأسف || جميعها ، أن جلولة أو يوق ، غاردة ودائمة .

Micropeplidae (S). - **ميكروبيبلوسيات** * ٢٨٢٣٦
Micropeplidés (F). Micropeplidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . أجسامها وأزواها المعروفة متوسطة البدن منتشرة في معظم أقطار البلاد المعتدلة الحرارة || أجسامها صغيرة ، تطول من ٢ الى ٤ سم . رؤوسها شبه مكورة . هيئتها صغيرة ، بارزة . تأثيرها وفكوكها قياسية . قرونها الاستشعارية دويبة الشكل ، تساعية الفصيل . كواسلها وأعماحها مضلعة . أعماحها تلتحف نصف البطن . سطوح بطونها منتظمة النقر الناجمة عن تصالب الاغادي التي تملأ البطن || جميعها دامت تعيش على المواد النباتية المنحلة وأعضائها الفطور || أشهر أجناسها الميكروبيبلوس .

Eoclimat (F). Eoclimata (E). - **مِيخَم** * ٢٨٢١٦
هو المناخ المقيم باعتباره عاملاً يثياً . وهو جاع العوامل المناخية في مكان معين صفاً واستندق أو اتسع وترأس .

Délai (F). Delay (E). - **مِيخَال** ٢٨٢١٧
الميلاد أو الأجل هو الفترة من الزمن يوقها المتعاقدون لاجل القيام بعمل ما .

Alibouffer (F). - **مِيخَمَة** ٢٨٢١٨
هي الاصطرك وهي صنفه المشهور الذي يستعمل في تثبيت الطور .

Fluidimètre (F). - **مِيخَم** * ٢٨٢١٩
Fluidimeter (E).
جهاز يستعمل في قياس دويعة الاجسام السائلة .

Ebulliomètre (F). - **مِيخَار** * ٢٨٢٢٠
Ebullimeter (E).
مقياس الغليان .

Intarcial (F) Intarcial (E). - **مِيخَمِي** * ٢٨٢٢١
نمت تعريفه يطلق على الجحاح والشطوط البحرية التي يكتشفها تقلص العياجة عند الجزر .

Myophoneus (S). - **مِيخُون** * ٢٨٢٢٢
Myophone (F).

جنس طير من الجوامد سنيات المناقير وقصيلة الشمروريات. انواده المعروفة قليلة موطئها جميع المناطق الحارة من القارة الاسيوية والجزر المتاخمة . ملجئها الخيالي جماعي الا في زين التساند والحضنة . قوتها الحشرات والديدان والثرار . تأثت الغابات والحراج . تفريدها مستحب الانعام || أجسامها شبيهة بالشمرور . أطولها تتراوح من ٢٦ الى ٣٢ سم . أذناها مستديرة الأطراف . مناقيدها ضلعية صفراء اللون . ألوانها الى السواد الاسفع وبعضها الى المركبة السوداء اللونج || تدثر في الانجار الرقمية . أناتها تقسم من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمثابة الككور نحو ١٥ يوماً .

Terme - **مِيخَات** ٢٨٢٢٣

Productif (F). Productive (E) - **مِيخَار** ٢٨٢٢٤
كثير الحمل . شجرة ميقار : كثيرة الحمل . ج موقير .

Pyrula (S). Pyrule (F). Pyrule (E). - **مِيخَب** ٢٨٢٢٥
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مغليات الايجل ، أمانيات الخياشيم المشطية ، وقصيلة الدويحات || أنواعه المعاصرة المعروفة قليلة البدن منتشرة في معظم سائر البلاد الحارة || أصدافها صغيرة ، شبه بيضيه الشكل ، عادية المصارع والحلانة ، مسفولة السطوح ، مستطيلة الفرجات المتصعبة الختار المسن .

Chronomètre (F). - **مِيخَت** ٢٨٢٢٦
Chronometer (E).
نوع من الساعات أو بالاحرى جهاز مرفه الدقة يستعمل في تحديد الوقت .

Colonis d'oiseaux (F) - **مِيخَمَة** ٢٨٢٢٧
Birds rookery (E).
مكان تألفه الطير وتعيش فيه اسراباً .



ميرن



ميش



ميكروبيوس

٢٨٢٣٧ - ميكروبيولوجية (F).
Microbiology (E).
هي علم الميكروبات بجميع فروعها وأبحاثها.

٢٨٢٣٨ - ميكروتروم
Microtome
هو المقطاع ، أطلبه .

٢٨٢٣٩ - ميكروستروم
Microstroma (S).
جنس فطور مجهرية من عارة الزيكيات فضيلة الطحنيات، أنواعه قليلة تتميز بمشيمها الذي ينشأ ويتكاثر في التسج الورقية حيث ينشأ خيطه الاسطوانية التي يستقر بها المطاف داخل الفقا السية . شعراته شععية التركيب تحمل بويغات فردية الارتكاز ، بضية الشكل ، شفافة . احرف أنواعه وأشهرها ما يلي .

٢٨٢٤٠ - ميكروستروم الجوز

Microstroma juglandis (S).
فطر مجهرى يركب أوراق الجوز . مظهره الخارجي يقع مقرنة الأزباى تنمى في الأوراق على صفحاتها السفلى فتضيقها وقد تسيء الى النش .

٢٨٢٤١ - ميكروستروم السنديان
Microstroma album (S).
فطر مجهرى يركب أوراق السنديان . مظهره الخارجي تغطين أبيض يشبه الاكناخ يركب للتصال على صفحاتها السفلى || أضراره زهيدة لا تستوجب الكفاية .

٢٨٢٤٢ - ميكروستروم
Microstome (F).
نمت تعريفي توصف به الأفواه المستصرفة المستفحة .

٢٨٢٤٣ - ميكروستروم
Microstome (F).
سمكة بحرية مشهورة باسم عنبر ، أطلبه .

٢٨٢٤٤ - ميكروسكوب
Microscope
هو المجهر ، جهاز بصري يستخدم في تكبير المرفيات ونوحيها .

٢٨٢٤٥ - ميكروسيب
Microcebus (S).
Microcèbe (F).
حيوان لبون حاشر ثامر من القموريات . ومن العلماء من يعتبره كنوع من الثرغال رغم اختلاف المعادلات السنية . موطنه أراج مدغسكر . ملجئه الحياتي جامي ، بجاساته قليلة المدد || جسمه صلب اللد ، يطول نحو ٢٧ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ١٥ سم . رأسه شبه مخروطي الشكل ، كثيف السبال . عيناه مطوقتان بالاسود . ثوبه الى الطحلة السراة يعلوها سواج خطي . يله تني اللون || يعيش على الاشجار وينام عليها ملتصقاً كالكرة . مسرعه دجوي يستمر من فصحة الليل الى الفجر . قوته الحشرات والديدان والآثار البانعة . يباه الشوي لا يتجاوز ١٠٠ يوم || يدين بسهولة ويصطاد الفار كالسنور .

٢٨٢٤٦ - ميكروغال
Microgales (S).
Microgale (F).
جنس حيوانات لبونة حاشرة من فصيلة المذليات . أنواعه المرفوعة ست . موطنها بعض المناطق الداخلية من جزيرة مدغسكر . تألف المروج والمرابي الطبيعية . مسرعا دجوي . قوتها الحشرات والديدان || أجسامها صغيرة اللد قريبة الشبه بأجسام الجرادات . أطولها تراوح من ٢٤

الى ٣٢ سم . بما فيه الذناب . رؤوسها ضخمة . اغطائها مستطيلة . عيونها وأذناها صغيرة . أنوثها تختلف مع الأنواع جميعها سوية الألوان . أوبارها دقيقة ناعمة || أنثاه تنزرة تضع في كل وهن من ٨ الى ١٠ جراء || بيأها الشوي يستمر نحو ١٤ اسبوعا .

٢٨٢٤٧ - ميكروغراف
Micrographie (F).
من تامل الاعمال الميكروسكوبية اي المجهرية .

٢٨٢٤٨ - ميكروغرافية
Micrographie (F).
Micrography (E).
علم يبحث في كيفية الاعمال المجهرية وطرق تنفيذها .

٢٨٢٤٩ - ميكروغرام
Microgramme (F).
Microgram (E).
الميكروغرام جزء من مليون من الفرام .

٢٨٢٥٠ - ميكروفر
Microfrad
وحدة الطاقة أو السعة الكهربائية .

٢٨٢٥١ - ميكروفيث
Microphyte
هو النبات ألتناي المجهرى وهو غالباً يسيد الخلية .

٢٨٢٥٢ - ميكرومتر
Micromètre (F).
Micrometer (E).
مقياس الاشياء أو المسافات الدقيقة .

٢٨٢٥٣ - ميكرومتر
Micromérie (F).
هي الشمسية ، أطلبه .

٢٨٢٥٤ - ميكرون
Micron
الجزء الواحد من ألف جزء يقسم عليها المليمتر .

٢٨٢٥٥ - ميكسبوريوم
Myxosporium (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرغيفات . أنواعه قليلة المدد تنمى في بعض الاشجار اخضها البين . تركب السرق والأضغان فتقع بها بعض الاثنى || تضاهي مقرة الشكل تنشأ مخضونة في اللحاء ثم ترق سى سطح البشرة فتصدها .

٢٨٢٥٦ - ميكسين
Myxine
جنس اسماك بحرية غضروفية ، دودية الشكل ، عمية ، لزجة ، من فصيلة الحماطيات . أنواعها المرفوعة ثلاثة منتشرة في جميع البحار باستثناء الاستوائية || تتميز بكون جهازها الشقي ثنائي التركيب . فهو ذكري الشق ويفرز الرولا الى ان يبلغ طول السمكة نحو ٣٠ سم . وهذا يصبح طولاً من ٣٢ سم . وما فوق ، يتصلب شقها الى اثري ولا يمدد يفرز سوى السرة .

٢٨٢٥٧ - ميككة
Vomer .
المظم البارز الذي يتألف منه الجزء الاحل من وثيرة القواب المنخرية .

٢٨٢٥٨ - ميككة
Mécanisme (F).
Mechanism, Machinery (E).
الميكنة مجموعة اعضاء او قطع موقفة بالطريقة الفضل لتأدية التانية المطلوبة . مثالا ميكنة الجسم البشري ميكنة الساعة || والميكنة نظرية فلسفية تميذ الحياة الى مجموعة اعضاء متحركة تملك كالاته .



ميكروسوم الجوز



ميكروب



ميكسين

٢٨٢٧٢ - **مينتات** * ، **كراكولة** Gracula (S).
Meinace (F).

طائر من فصيلة الزروريات طول نحو ٢٧ سم. ثوبه الى السواد اللامع يطغى مواع اخضر. محسه اصفر اللون صفرة تمتد حتى القن. بعض فوائده يبيض ما يحمله ميتج الجناح. متقار ورسناه ومخاله صفر. صباه الى السمرة الخفيفة || موطنه الهند وميرتديب. سره قليل المدد يتألف من ٣ ل و ٤ ازواج. قوته الحشرات والتار. يثن في صدوع الاشجار وفي الاطلال، اثناء تحفن وسعها من ٤ الى ٥ بويضات مرتين في السنة.

٢٨٢٧٤ - **مينتاج**

طائر من الصافير الافريقية.

٢٨٢٧٥ - **مينتج** * ، **هوككل** Microclimast (F).
Microclimata (E).

هو المناخ الموسمي وقد يختلف من المناخ الاكسي. ويعتبر المينج من العوامل الرئيسية في توجيه مكافحة الحشرات.

٢٨٢٧٦ - **مينتس** * Acridotherus tristis (S).
Acridothera tristis (F).

مينس هو الاسم الهندي. طائر من الجرام مشروبات المتأثير وفصيلة الزروريات، موطنه الهند. قوته الحشرات على اختلاف انواعها واعصها الجراد || جسمه معتدل القد، يطول نحو ٢٧ سم. ثوبه العلوي الى السواد اللامع. ثوبه السفلي من الجرش الى الالنيك اغير اللون، اشعث الموج. رأسه متوج بقنعة صفرة شديدة السواد الفضي. متقار غرزي الشكل، مشروم الطرف. رسناه اسود اللون. ذنبه معتدل الطول، مستدير الطرف. رسناه الى السمرة القائمة || سره واخر المدد. يثن حبه في صدوع الاشجار، اثناء تحفن وحدها من ٤ الى ٥ بويضات مرتين في السنة.

٢٨٢٧٧ - **مينتو** *

Mina lobata, Quamoclit mina, Ipomaea versicolor (S).
Mina lobé (F).

نبات عايش من البلبليات. ساقه تطول نحو ٥ امتار. اوراقه معتقة، متعاقبة، قلبية النصل، مستطيلة النقص الرسلي. ازهاره محوري الارتكاز، وري او شامي التجميع. ازهاره كبيرة القد تبدو برتقالية اللون ثم تتصرف نحو الفدرة الصفراء || تنوره يستمر طوول فصل الصيف.

٢٨٢٧٨ - **مينفوس** * Minous (S).
Minous (F). Minous (E).

جنس اسماك بحرية من شاكيات الزعانف وفصيلة الجلاخيات. انواعه المعروفة قليلة المدد اعطائها تمتد من المحيط الهندي الى بحار اليابان || اجسامها صغيرة شبه اهليلجية الشكل، معتدلة التبييط. رؤوسها مزبثرة، مدورة، شاذكة. عيونها جاحظسة، ناشزة الاقاب. زعانفها الظهرية فردية قاطبة، عديدة المناسخ الحادة. للذيلية مقطوعة. الخوصية تحمل مذبة جامدة مستطيلة || طومها كاعنة الصنف وقد تكون سامة في بعض فصول السنة.

٢٨٢٧٩ - **ميوزة** * Méiose (F). Meiosis (E).

شكل من الانقسام غير المباشر يرتكز على تجزئة الجيلة

٢٨٢٧٩ - **ميكودرمة** Mycoderm (F).
Mycoderma (E).

هي الغميرة الخاطئة لها ثومان يتريان الحمر والخل.

٢٨٢٨٠ - **ميكوز** Mycoza (F). Mycois (E).

اسم شامل يطلق على كل حلة يسببها احد الفطور.

٢٨٢٨١ - **ميكولوجية** Mycologie, Mycétologie (F).
Mycology (E).

هي علم الفطريات، يبحث في ماهيتها وتصنيفها واحوالها ومنافعها واضرارها.

٢٨٢٨٢ - **ميكوميعة** * Mycomyia (S).
Mycomyia (F). Mycomyia (E).

جلس حشرات من فصيلة المرقصيات ورتبة ذوات الجناحين. انواعها المعروفة ٣٩ منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها هيقاء تطول من ٥ الى ٨ سم. رؤوسها غرورية صغيرة. عيونها متباعدة عند الفقين. قرونها الاستشعارية خيطية، مركبة من ١١ فصلة. ملابسها رباعية المقل. مراشها نقيطة. كواسلها شبه اهليلجية الشكل، بطونها دقيقة القاعدة والآخر. انوارها لينة يطغى تجميع قاطب ومعتري. روافها قليلة الغضاب. قوائمها مستطيلة || تألف الحراج والنايات اعصها التي تكثر فيها الراتنجيات من ستوبر وفيه || اساربعها دامة ونجاة.

٢٨٢٨٣ - **ميتل** Déclinaison (F). Declination (E).

٢٨٢٨٤ - **ميتلازية** * Malasia (S).

خساف من فصيلة النشيات. جسمها مبهر القد مستطيل الشكل. طولها يراوح من ٩ الى ١٢ سم. الانثى اكبر قدًا من الذكر. ثوبها الى الجلوة السفاه الموج. تعيش مع رفاقها في السرايد التي تحفرها بين قصور ولها الصنوبر. اضرارها زعيمة لا تستوجب المكافاة.

٢٨٢٨٥ - **ميتلوي** Mildew (F). Mildew (E).

هو التسة، اطلبا.

٢٨٢٨٦ - **ميتلوي الكرمة** Mildiou de la vigne (F).

هو تسة الكرمة، اطلبا.

٢٨٢٨٧ - **ميتلوي القتم** Mélophage du mouton (F).

هو قلية القتم، اطلبا.

٢٨٢٨٨ - **ميتلوي** Mimosae commun (F).

هي السط المنبري، اطلبا.

٢٨٢٨٩ - **ميتلوي** Mimulus (F).

هو اللندل، اطلبا.

٢٨٢٩٠ - **ميتلون** Papion mandrill (F).

هو القردوس المزواج، اطلبا.

٢٨٢٩١ - **مينتا** Email (F). Enamel (E).

٢٨٢٩٢ - **مينتانه** Dentine (F). Dentine (E).

للادة الخاصة التي يتركب منها غضن الاسنان.



ميلازية



مينات



مينس



ميوس

- ٢٨٧٨١ - ميوزين Myosine (F), Myosin (E).
 الى اربعة السطر في دفتين متواليتين بينما تقسم النخشة
 الى سطرين في دفعة واحدة .
 هو الاحسن المفضل ، اعليه .
- ٢٨٧٨٢ - ميوزج ، زيبيج الجبل
 « نبات له ورق شبيه بورد الكرم البري مشرف وقصبان
 قاعمة سود ومعمه في غلف خضر مثل ما الحمص » (اللسان).
- ٢٨٧٨٠ - ميوزفيس Myosotis
 هي اذان الفأر ، جس نباتات عشبية برية وزرينية .



جبل الخصار الزلي . ازهارها فردية التجميع ، لا قياسية
الارتكار ، كبيرة اللد ، مستدرة الشكل . بتلاتها مزوجية
الصف ، زرقاء اللون . اسديتها متراسة نودلية الانقسام
مطوقة بصفيين من السينات الوردية اللون || تزرع
للزينة ، تربى في الاتربة الخفيفة .

Perspirable (F).

٢٨٢٩٢ - نَاسِب

الناتج السام بمرور التس .

Putrivoire (F).

٢٨٢٩٣ - نَاسِن

التائق الذي يعيش على المواد الحيوانية المنحلة .

Prognathe (F). Prognathous (E).

٢٨٢٩٤ - نَاسِي

نمت تعريفي توصف به الاعضاء الناشئة الشاذة حسن
المأثوف .

Coprophage (bousier) (F).

٢٨٢٩٥ - نَاسِل

Coprophagous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل حشرة تتغذى من براز الحيوان .

٢٨٢٩٦ - نَاسِج

هو الفرس ، اطلبه .

Mois d'été (F).

٢٨٢٩٧ - نَاسِج

كل شهر من شهور الصيف .

Summer month (E).

٢٨٢٩٨ - نَاسِج

هو السليج ، اطلبه .

Dame-jeanne (F).

٢٨٢٩٩ - نَاسُور

هو الدجاجة ، اطلها .

Canine (F). Canine tooth (E).

٢٨٢٩٣ - نَاب

السن خلف الرابعة .

Crochet (F). Fang (E).

٢٨٢٩٤ - نَاب

سن الانسي وهي سادة متعقبة مخروقة . وللانسي ناياتان
يجعلان يأتي السم اليهما من غدد في الجسم تنقله قناة دقيقة
تخترق كلا منهما .

Adonide automnale (F).

٢٨٢٩٥ - نَاب الجمل

هو الادونيس الخريفي ، اطلبه .

Centrifuge (F). Centrifugal (E).

٢٨٢٩٦ - نَابِد

Bellatrix (F).

٢٨٢٩٧ - نَابِد ، ميرزَم

Bellatrix (E).

النابِد والمرزَم ويرزَم الجبار ثلاثة اسماء لتيم نير واحد
من المروية الاول على المنكب اليسرى من الجوزاء .

Contractile

٢٨٢٩٨ - نَابِص

Contractilité (F).

٢٨٢٩٩ - نَابِصِيَّة

Contractility (E).

Népenche (F).

٢٨٢٩٠ - نَابِطُط

هو السلوس ، اطلبه .

Napoleona (S).

٢٨٢٩١ - نَابُولِيُونَة

Napoléone (F).

نبات معقود التعريف على اسم الامبراطور نابوليون وهو
جنية معمرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الالسيات .
ساقها فروع تملو من قعر الى ثلاثة اثمار . اوراقها كاملة
متعقبة متعاقبة ، تصلها اهليلجي الشكل . جامد الصلصة ،



نابوليونه



نخس

٢٨٣٠٠ - ناتيس * ، ناردون

Tragelaphus spekel (S). Tragelaphe de Speke (F). Nakong (E).

نوع من الجبل، قدرة قدر القنار، له قرنات جالسان ثوبه إلى السرة يملوه بجمع ابيض. اطلانه اواسط افريقية. يالاف الحشاش والقياني ويرتاد المناقع وضفاف مجاري الماء. قوته الاشباب. اجله يد من ٥ الى ٢٠ نفراً.

Máua (F).

٢٨٣٠١ - ناردون

هو المهر، الحلب.

Naranio (S).

٢٨٣٠٢ - ناردون

Naranio (F). Naranio (E).

نارانيو هو الاسم الهندي. جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم وفصيلة التقييات. انواعها المعروفة قليلة العدد بعضها هندي والآخر استرالي || اجسامها صغيرة. مثاقيب بارزة و طليقة. اصداؤها صيوانية الشكل || تعيش في ائناق تنقيا في الصخور المغمورة بالماء قرب مصبات الانهر || ليفها غزير المادة، جيد الصنف.

Cocos (S).

٢٨٣٠٣ - نارجيل

Cocotier (F). Cocoa-nut palm (E).

جنس اشجار ليفة الجذع من فصيلة النخلات. انواره المعروفة ٣٠، اطلانها المناطق الاستوائية والحارة. معظما بري وتربي ويغرس بعضها زراعي صناعي. اشهر انواره النارجيل المعروف (اطلة). اما الانواع الاخرى التي تعيش في بعض المواقف الخافتة من الاقاليم المعتدلة فهي:

Cocos erythrosaptha

Cocos eriosaptha

Cocos australis

Cocos lapidea

Cocos leiosaptha

Cocos datil

Cocos coronata

Cocos campestris

Cocos elegantissima

Cocos romanzoffiana

Cocos plumosa

Cocos flexuosa

Cocos capitata

Cocos weddelliana

Cocos yatey

Cocos yatey

Cocos yatey

Cocos yatey

Cocos yatey

Cocos yatey

Cocos yatey

Cocos yatey

Cocos yatey

Cocos yatey

Cocos yatey

Cocos yatey

Cocos yatey

Cocos yatey

Cocos yatey

Cocos yatey

Cocos yatey

Cocos yatey

٢٨٣٠٥ - نارجيل شيلي

Jubée (F).

هو الجيوه، اطلها.

٢٨٣٠٦ - نارجيل موزون * ، جوز الهند

رائح، شغور، حشرج

Cocos nudifera (S). Cocotier commun (F). Cocoa-nut palm (E). Kokospalme, Indischer Nussbaum (D). Cocco, Albero del caco, Noca d'India (I).

نوع من النارجيل الزراعي. ساقه اسطوانية متعصبة تملو نحو ٣٥ م. اطلانه بعض المناطق الاستوائية. يمش قرب الماء ويجود على الشطوط البحرية. ثماره يفسية الشكل تطول من ١٦ الى ٢٢ سم. قشورها غشبية تغلفها الالياف. لباها جاهد المكسر، حاجي اللون، مستحب الطعم، شائع الاستهلاك الغذائي والصناعي.

٢٨٣٠٧ - نارجيل * ، جوز الهند، جوزة

النارجيل

Coco, Noix de coco (F).

Coco-nut (E).

ثمرة النارجيل، لباها يتفح من البلفم والسوداء وضف الكبد والكلل والمثانة وقروح الباطن. ويزيل اوجاع الظهر واليدان والرباسير ويهيج افرة الجفنة ويمنع تقطير البول. صصارته مع السكر تنشط الدم وتقوي القريرة. رباد قشوره يحلل الانسان ويزيل الكلف والتمش والحكة ويشد الشعر اذا استعمل مع الحناء.

٢٨٣٠٨ - ناردون، سنبل

Valeriana (S). Valériane (F). Valerian (E). Baldrian (D). Valeriana (I).

جنس نباتات طبية برية وزراعية من فصيلة الناردنيات. انواعه زهاء ١٥٠ جميعها اشباح حولية او معمرة. اوراقها متعاقبة مركبة وشية. ازهارها نوري او مشكوية التجميع، ابطي وتناجي الانكاز. ازهارها غشبية جميلة الشكل يكثر فيها الابيض والنودي || اشهر انواعه الطبية والزراعية والبرية ما يتبع.

٢٨٣٠٩ - ناردون ازرقي * ، سنبل ازرقي

Valeriana wallichii (S). Valériane Indienne, Nard indien (F). Indian valerian (E). Indische Narde (D). Spiganardi (I).

نوع من الناردون البري والزراعي. جذاميره مفلطحة. ساقه غشدة. اوراقه عاقبة الخشار. ازهاره كثيفة التجميع، زرقاء اللون، مستحبة العرف. جذاميره طبية و اذا استعمل مسحوقا مع الافسترون والصندل ثم يشرب صاحبه يشبع من شدة قفرته المدة. ويظهر اللون ويزيل البرقان والكبد والحصى. واذا طلى بالخل قطع العرق وطيب رائحة البدن وان طين بالبحر حتى يتقزم وظل به الشعر سوده وطوله ٥.

٢٨٣١٠ - ناردون اقليطي * ، سنبل رومي، عطار

Valeriana celtica (S). Valériane celtique, Nard celtique, Spic celtique (F). Celtic valerian, Celtic spikenard (E). Alpenbaldrian, Nardenbaldrian (D). Nardo celtico, Salicina, Spiga celtica (I).

نوع من الناردون البري الطبي الممر. ينبت في الاربة الرملية الجبلية. جذاميره مستقيمة مستطيلة لوانة العرف. ساقه نحيلة تملو من ١٠ الى ٢٠ سم. اوراقه السفلى كاملة اطيالية. اوراقه الوسطى والعلوية مركبة. ازهاره عتقودية التجميع بياض اللون. ثماره يفسية الشكل، صغيرة القد



نارجيل ميشل



نارجيل معروف



نارجيلة



ناردون ازرقي



ناردون اقليطي

Valeriana saluina (S). **ناردين عطر** ٢٨٣١٧
Valériane odorante (F).

نوع من الناريين البري والزراعي المعمر. ساقه مغطاة بتلو من ٥ إلى ١٥ سم. تحمل ورقتين صغيرتين ثلاثية التركيب. ازهاره نوري التجميع. ازهاره صغيرة القذ، وردية اللون. جلوره فواحة العرف يستخرج منها دهن عطري فاخر الصنف || تنوره يستمر من عوز الى آب.

٢٨٣١٨ - **ناردين مخزني***، **حبيشة القط***
Valeriana officinalis (S). **بكتلة الهر**

Valériane officinale, Herbe aux chats (F). Common valerian, All-heal, Cat's valerian (E). Echter Baldrian (D). Valeriana minore, Amanetilla (I).

نوع من الناريين الطبي البري المعمر المجلول. ساقه مغطاة متصبة بتلو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. اوراقه مركبة، وريقاتها سنائية النصل، سنفة الحافة، ورتبة التجميع تعد من ٢ إلى ٢٢. ازهاره نوري. ازهاره صغيرة القذ، وردية اللون. جنوره طيبة وطرية يستخرج منها عطر الناريين وهي معلقة مقوية للاصصاب، مفيدة لتكبد والكلى والطحال، منبهة للقرية الجلبية، مضادة للتشنج، تنظم الحضم وتزيل الانتفاخ. جرعة المسحوق منه تراوح من غرام الى خمسة.

٢٨٣١٩ - **ناردين نباتات**
Valerianaceae (S). Valérianacées (F). Valerianaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة الفعالات. اوراقها كثيرة تجتمع الى عدة اجناس، نباتاتها شبيهة وجنبية. اوراقها مركبة متقابلة. ازهارها لا قياس التجميع والارتكاز. ازهارها لا نظامية || اشهر اجناسها الناريين والوشمة والتركوك والكرول.

٢٨٣٢٠ - **ناردين**
Pavot blanc (F). هو رمان السالك أي الخشخاش الابيض.

٢٨٣٢١ - **ناردينك**، **ناردينك**
|| الناردينك والناردينك: رمانة صغيرة مفتحة كأنها وردة لونها الى البياض والحمرة والصفرة في وسطها نوار، لونه كذلك وسطه مخض ورائحته طيبة (أ.م.) || هو الرمان البري، يحبس التئف والاسهال. شربه دواء. .

٢٨٣٢٢ - **ناردينك***، **ناردينك***، **أبر صمير**
Citrus amara, C. vulgaris (S). Bigaradier, Oranger amer (F). Sour orange, Bitter orange (E). Bitter-orangenbaum (D). Arancio agro, Arancio amaro (I). نوع من الحمضيات والفصيلة النارجية. منبهة المقدر بلاد الصين أو الهند الصينية ثم ادخل الى الهند فبلاد المصم والغرب كانوا اول من ادخلوه الى افريقية الشالية واروبة (المسودي) || ثمرته شاككة فناء ورائحة تلو من ٣ الى ٧ اثمار. اوراقه معتقة متعاقبة. نصلها متنج العنق، ايليجي الصفحة الجامدة الجميلة الخضار. ازهاره خاسية البتلات البيض، عديدة الاسدية، فواحة العرف الادي المتصب. ثماره مستديرة الشكل برتقالية القذ واللون، غليظة القشور المرة الحامزة. عصارة فصوصها شديدة الحوضنة والمرارة المستنكرة. قشور ثماره ترب بالسكر بعد معالجها بالملح والكلس وهي صعبة، نافعة، غنية، يبيض اللثيامينات، خافضة الحرارة، مضادة للتشنج. يستعطر من زهره المرفوف بالقداح دهن يدهي السطر الليروي ويستقطر ايضاً من زهره واوراده ماء الزهر المشهور

حسية البشرة. || جلوره صناعية يستخرج منها عطر الناريين ويستعمل في الطب استعمال الناريين الهزلي الا انها اقل فعالية منه.

٢٨٣١١ - **ناردين الجبل**
Valériane de montagne (F).

نوع من الناريين البري المعمر المجلول. ساقه تلو من ١٠ الى ٥٠ سم. اوراقه الجلبية اعليجية النصل المسن الحافة. اوراقه العليا مركبة ريشية. ازهاره عشكولي التجميع، مستطيل الشكل. ازهاره صغيرة القذ خضر القنابات وردية البتلات || تنوره يستمر من نيسان الى تموز.

٢٨٣١٢ - **ناردين الحدائق***، **ناردين**
الحدائق، **فرو**

Valeriana phu, V. discorsis (S). Valériane phu, V. des jardins (F). Cretan spikenard, Garden valerian (E). Grosser Baldrian (D). Valeriana maggiore, Fu pontico, Nardo agreste (I).

نوع من الناريين الزراعي المعمر. جلوره مدادة، اسطوانية، متعصبة. ساقه حاملة متعصبة تلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه السفلى اعليجية كاملة. اوراقه الوسطى والعليا مركبة مشطية. ازهاره عشكولية التجميع، كبيرة القذ، يضاء اللون او وردية، فواحة العرف العطري المتصب. جلوره طيبة لكنها قليلة المواد الفعالة || ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

٢٨٣١٣ - **ناردين الصخور**
Valeriana saxatilis (S). Valériane des rochers (F).

نوع من الناريين البري المعمر. يعيش بين الصخور ويرقب في الاثرية الكلسية. ساقه نحلة تلو من ١٠ الى ٣٠ سم. اوراقه الجلبية سنائية النصل. اوراقه العليا مركبة ريشية. ازهاره عشكولية التجميع. ازهاره يضاء اللون || تنوره يستمر من حزيران الى تموز

٢٨٣١٤ - **ناردين الطيب***، **ناردين هندي***
Valeriana spica (S). Valériane des Indes, Nard des Indes, Spikanard (F). Indische Nardo, Echte Nardenshire (D). Spignardi (I).

نوع من الناريين البري الطبي المعمر. اعطاه بلاد الهند. جلوره غليظة مغلقة ورائحة المادة العطرية. ساقه متعصبة مغطاة بتلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. اوراقه مركبة. وريقاتها شبيهة النصل المسن الحافة. ازهاره عشكولية التجميع، صغيرة القذ، فواحة العرف. يستخرج من جلوره دهن عطري ينثر من اجود انواع الطيب.

٢٨٣١٥ - **ناردين المروج***
Nardus stricta (S). Nard des prés, Nard bécarré (F). Nard, Mat-grass, Wire bent-grass (E). Straffes Borstengrass (D). Nardo, Cervino, Fieno del monti, Spigo fitto (I). نبات عشبي بري معمر من فصيلة النجيليات. ساقه نحلة متعصبة فرماد. اوراقه شقيقة مستطيلة. ازهاره سنيلية التجميع صغيرة القذ ووردية اللون || وهو من اللبانات المروية التي يحود عليها الدرو ويطيب.

٢٨٣١٦ - **ناردين بري***
Nard sauvage (F). هو الاساورون، الحلب.



ناردين الحدائق



ناردين الطيب



ناردين المروج



ناردين هندي



ناردين

٢٨٣٢٩ - نارية الحمص الجفيفة

في نملسة التبغ ، أطلبها .



نار

٢٨٣٣٠ - نارية الحنطة * ، صنف الشعير

Plodia interpunctella (S). Teigne orientale des dandrées (F). Indian meal moth, Meal worm moth (E). Dörrobasmotte (D).

حشرة من التاربات، صغيرة اللد . رواشها مقلبة فيها الابيض والخلفي والاسمر الاسفج المواج . ريقها دقيقة نحيلة تركيب الجيوب المخزونة على اختلاف انواعها كالحنطة والشعير والذرة والشوفان والسلت ...



نارية البرتقال

٢٨٣٣١ - نارية الخروب *

Myelois ceratoniae (S). Pyrale des caroubes, Teigne des caroubes et des figues (F). *Myelois ceratoniae* (E).

حشرة صغيرة من فصيلة التاربات وربة حشريات الاجنحة . موطنها معظم اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قوتها وسيق الازهار . سرقها نارية قوتها لياب قرون الخروب وثمار اللين || جسمها نحيل امهيت بطول نحو ٨ م . يسقطها نحو ٢١ م . رأسها مستدل الجرم . عينها صغيرتان . زباناها خيطيان . مشرقها مستدل الطول . جوشنها وبطنها الى الشبهة || رواشها الاماميان الى الشبهة الحديدية يملونها بتقيج ابيض وصف من النقط البيض يستيق المختار الخاريجي . وروشهاا الخلفيان الى الشبهة السمر . اهدابها الى الشبهة خفيفة . لها جبل واحد في الحول . تظهر القراشة في حزيران . تسرح في النهار . تعاطل بمد ظهورها ينحو ثلاثة اسابيع ورز للمكن مسجداً في قرون الخروب || السرة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٩ م . جسمها اسطواني الشكل . رأسها شديد السمر . ثوبها الى اليباض اللين تملوه ماجة ودية . وواجبها الى السمر || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي نسمن صلجة تحببها السرة تحت القشور او بين شقوق السماء .



نارية الحنطة



نارية الخروب

٢٨٣٣٢ - نارية الدقيق *
Asopia furinella (S). *Asopie*, Teigne des farines (F). Meal snout moth (E). Mehlzünsler (D).

فراشة صغيرة القند من فصيلة التاربات ، فوئها الى الصوبة الصائية . رواشها مزركمة . زباناها غبيلة مستطيلة . تظهر من ايار الى تشرين ، تألف البيت والمطبخ والافران . ابيهاا الحولية ثلاثة . ريقها تسمى دودة الدقيق تمش على الدقيق والكسب والذرة الجافة الخ...



نارية الدقيق

٢٨٣٣٣ - نارية الدقيق الغراء

في نملسة الدقيق ، أطلبها .

٢٨٣٣٤ - نارية اللوز *
Pyrusta nubilalis (S). *Pyrale du mals* (F). Corn moth (E). Malszünsler, Hirszzünsler (D).

حشرة من التاربات ، ريقها غليظة الشكل تطول نحو ٢٥ م . ظهورها اسمر اللون يملوه خطوط قزوين . منحها الى السرة الحنطية || تحمل من جانبيها نقط سمر داكنة يملوها حلب مستطيل || تركيب سوق الذرة تنخرها وتسبب قصها .



نارية اللوز

وهو يفيد الفص والمضغ || تصوب التاراج تستعمل كعلم تختلج انواع الحفصيات وذلك لانها قوية المناحة الجفينة ولا تخشى الارربة المنحدبة التي تنفر منها انواع الليون المزدرة .

٢٨٣٣٣ - ناتنج مرسيني

Oranger à feuilles de myrte (F).

هو الليون المرسيني ، أطلب .

٢٨٣٣٤ - نارية *

Acanthosicyos horrida (S).

Nara (F).

اسما الاثري نار ويحي جنة من فصيلة القرصيات منبتها مصري افريقية الشالية . ساقها ليفية فروعها تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . فروعها القية الانتشاب ، مسبقة ، متدلية ، تطول نحو ٤ امار ويحي عادمة الورق كثيرة الشوك . جلوسها تدور في الزمان من ٢٠ الى ٤٠ م . انزعاجها كبيرة القند . ثمارها يرتقياا الحميم واللين ، قشورها مخشكة ، هرية التول . لها مسحب العلم مأكول وهو ادم وأصل وألد من البليغ . يزورها مأكولة طازجة ومطبوخة . لها مومنان في تمام الواحد . وهي من التاربات العزرة الكثيرة النفع .

٢٨٣٣٥ - ناريات
Pyralidae, *Pyralididae* (S). *Pyralidae* (F). *Pyralidae*, *Pyralin moths*, *Snout moths* (E). *Zünsler* (D).

فصيلة حشرات من ربة حشريات الاجنحة . ابيهاا ١١١ اجناسها واثارهاا زهاء ١٠٠٠٠ . جميعها فراشات ليلية صغيرة القند ، دقيقة الاجسام ، اربعة الاصطام ، واضحة التاكثير . رواشها صغيرة ، مهدبة الاطراف ، متداخلة الاالوان . ابيهاا الحولية لا يواسية . ريقاتها ملوكة . عذارهاا تلحف بأفشي حريرية التماس .

٢٨٣٣٦ - نارية الباذنجان

في ينظفرو الباذنجان ، أطلبها .

٢٨٣٣٧ - نارية البرتقال *

Prays cleri (S).

Teigne des fleurs d'oranger (F).

حشرة من التاربات ، صغيرة القند ، نحيلة الجسم ، قريبة اللين من قوبة الزيتون . يسقطها تراوح من ٩ الى ١٠ م . ريشهاا الاماميان الى الكمية النفية المولج تملوها رشقة رمداء لا مسقارية اللث . وروشهاا الخلفيان الى القربة الزاجية السوية يحرقها اطار من الهذب الكثيف المسخروض . ابيهاا الحولية تراوح من ٣ الى ٥ . تمتع الاقن مكبها على الازهار والثمار القليلة ينقث من ريقاا دقيقة تراوح طولها عند اكتمال نموها ، من ٥ الى ٦ م . فوئها الى الكمية الزاجية يملوها ثلاثة خطوط قاطبة واحد يكثف الظهور من الرأس الى الفرج واثنان جانبيان . رأسها الى السرة الباقية . منها الى السمر الحنطية يركز على حشة ازواج من الجرارز السمر || اسطهاا القلم البرتقال الذي عند من الهند الى كامل حوض البحر المتوسط || اقصرأهاا قد تكون مؤذية فبا كثر عددها ذلك لانها تقضم بتلات الازهار واسديتها واقلام مقلات وقد تعطب في ظروف خاصة قشور الثمار التي تقضمها وتسردب لابلها || تكافح بالوروتين الذي يقضي عليها .

٢٨٣٣٨ - نارية البسر ، نارية البتج

في نملسة البسر ، أطلبها .

Stalactite ٢٨٣٤٦ - نازلة ٥
نازلة ج نازل : رواسب كلسية متحجرة في سقف
الغارو الرولية .

٢٨٣٤٧ - نازون قصير الزبان ٥
Nasonia brevicornis (S). Nasonie brévicorne (F).

حشرة ناعمة من فصيلة الطليطيات ورتبة غشائيات الاجنحة
المنصورة . موطنها بعض مناطق البلاد الحارة المنحرفة نحو
المتدلة . تتطفل على ذوات الجناحين انحصا الذباب ||
جسمها صغير القد بطول نحو ١ سم . واربية خطوط .
رأسها مستعرض الشكل . زباناها صوبانيان صغيران .
جوشنها ضيق المؤخر بعليا شبه بيضي الشكل . مرتزها
قصيرة مستقيمة . اجنحتها ودية اللون . ثوبها الى الخضار
الاليس .

Fistula (F). Fistula (E). ٢٨٣٤٨ - ناسور

٢٨٣٤٩ - ناسير هو الصل المصري ، اطلبه .

Diffuseur (F). Diffuser, ٢٨٣٥٠ - ناسيرة
Mixing cone (E).
اداة الانتشار ، تستعمل في عدة صناعات انحصا صناعة
السكر ، راجع انتشار .

Lymexylon (S). ٢٨٣٥١ - ناسيرة الخشب
Lymexylon, Lime-bois (F).

جنس حشرات خاشية من مدمدات الاجنحة . انواعها
ثلاثة ، جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، رنوة الجسم .
يرقاتها تنفك بانشاب الاشجار القائمة والمقطوعة تقتردها
وتستطيع .

Exsert ٢٨٣٥٢ - ناسير
نعت تعريفي يوصف به الشيء المرتفع عن سطح محيطه .

Assez fort (F). ٢٨٣٥٣ - ناسط
نعت تعريفي يملق على التبرع التي تتحمل بسورة ناشطة
مركزها التصنيفي دون المانعة وفوق المتدلة .

Oryx de Nubie (F). ٢٨٣٥٤ - ناسط
هو الارخ السوداني ، اطلبه .

٢٨٣٥٥ - ناسفة
هي مجرى السيل الى الوادي . ج نواشع .

٢٨٣٥٦ - ناصيات ، زقنبريات ٥ ، نالخت

Buprestidae (S). Buprestidae, البقتر
«Richardson (F). Buprestidae, Flatheaded beetles (E).
Prachtkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة مدميات الاجنحة . اجناسها وانواعها
كثيرة العدد . معظمها من حشرات المناطق المتدلة والحارة .
اشكالها مانوسة ، الالوان عابقة زاهية ، ولوسها قصيرة ،
قرونها الاستشعارية مركبة من ١١ فاعلة ، اراسها
خامسة ، اخمادها مستطيلة . جميعها تسرح في النهار وهي
سريعة الحركة والطرائق . || يرقاتها خاضعة تعيش على
جنود وصوق واوراق مختلف النباتات . كثرها على بعض
اعشاب المراعي تسبب الحياط اي التلف في الايقار التي
تتلفها مع الشب .

٢٨٣٥٥ - نارية السمين *
Antigatra catalaunalis (S). Antigatre du
Sésame (F).

حشرة من الناريات . يرقتها صغيرة القد بطول نحو ١٢ م .
لونها الى الخضرة الرمدا المواجه لتعلوها رقشة سوداء || تركيب
السمن من ساقه الى اذهاره وثماره .

٢٨٣٦١ - نارية الشمع الصغيرة
Alveicole, Teigne de la cire (F).

هي صمل النحل الصغير ، اطلبه .

٢٨٣٣٧ - نارية الشمع الكبيرة
Gallérie de la cire (F). اطلبه .

Pionex forficatis (S). ٢٨٣٣٨ - نارية الصليبيات
Pyrale des crucifères (F).

حشرة من الناريات ، يرقتها صغيرة ، دقيقة ، حمراء اللون ،
سريعة الحركة . تركيب اوراق الصليبيات على صفحتها
السفل .

Mecyna gilvata (S). ٢٨٣٣٩ - نارية الخمان *
Pyrale des cannes à sucre (F).

حشرة من الناريات متوسطة القد غبراء اللون مزركشة
الرواشن . يرقتها بطول نحو ٢٢ م . لونها الى الحمرة تحمل
على ظهرها وبجانبيها خمسة خطوط ارجوانية || تركيب
المصان فتشتر الساق وتذهب فيه صمدا حتى القشة .
وتركب اللزق فتضل فيها ذات التي وتركب الارز فتتلف
السوق والسنايل .

٢٨٣٤٠ - نارية اللوبيا *
Etiella zinckenella (S). Etielle du haricot, Pyrale
des haricots (F). Lima bean pod borer (E).

حشرة من الناريات ، يرقتها بطول نحو ٢٥ م . وهي
ارجوانية الظهر غبراء المذب || تركيب اذهار وثمار
وصوب اللوبيا تستطيع .

Myeloides cribrella (S). ٢٨٣٤١ - نارية الوريم
Myeloides des fleurs (F).

حشرة من الناريات ، يرقتها دقيقة نحيلة حنطية اللون
تميش داخل وزم وصوق نباتات الفصيلة المركبة .

٢٨٣٤٢ - نارية الساسمين *
Glyphodes unionalis (S). Pyrale du jasmin (F).

حشرة من الناريات ، حنطية اللون سوداء الزواكش . يرقتها
صغيرة القد مستطيلة الجسم ، غبراء اللون ، حمراء الملوخ .
تركيب برام وازهار الياسمين وسنايل الازريقن .

٢٨٣٤٣ - نارية البخضور *
Pachyzancla licaresalis (S). Pyrale des gazons (F).

حشرة من الناريات ، يرقتها مستطيلة بطول نحو ٢٥ م .
ثوبها الى السمرة يملوها تنقيط اسود متظم الترتيب وحيد
الحلبة المستطيلة || تركيب مختلف اوراق الاعشاب الفتية
انحصا النجيلية فتتلفها .

Pyrausta surata (S). ٢٨٣٤٤ - نارية ذهبيّة
Pyrale dorée (F).

حشرة من الناريات ، رواشها ذهبية اللون . يرقتها صغيرة
القد غبراء اللون . تركيب برام وازهار النباتات السطرية
انحصا الننع .

Pyrale grise (F). ٢٨٣٤٥ - نارية شهباء
فراشة مؤذية تسمى طينية الخشان ، اطلها .



نارية السمن



نارية المصن



نارية اللوبيا



نارية الياسمين



نارية البخضور



نازون قصير الزبان



نارية الخشب

Maille (F). Stitch (E). **نَاطِيَّة** - ٢٨٣٦٨
ج. ناطب. والناطب هي خروق المصاصة.

نَاطِيط - ٢٨٣٦٩

الناطيط نجم نير من كوكبة برج الثور ويسمى قرن الثور الشمالي.

Eprouvette graduée (F). **نَاطِيط** - ٢٨٣٧٠
عشار مدرج تكلل به الوسائل.

Aiguardier (F). **نَاطِيطُ الْمَاء** - ٢٨٣٧١
Freshwater guardian (E).
هو الثاوي الذي يحافظ على مياه الري ويوزعها على مستعقبا بالقلع.

Tarbophis **نَاطِيطٌ * ، وَكَبِيب** - ٢٨٣٧٢
جنس حيات سامة من فصيلة الحفشيات. أنواعه عديدة. أعطائها البلاد الحارة الإفريقية والاسيوية. شكلها كالحفث، مستطيلة الجسم، دقيقة النعق، سريعة الحركة. انشواها الى السمرة الثنراء الموقنة.

نَاطِيطٌ مَكْرَ ، وَكَبِيبٌ خَدْعَانِ - ٢٨٣٧٣

Tarbophis fallax (S). **نَاطِيطُ الْوَرْدِ * ، وَكَبِيبُ الْوَرْدِ** - ٢٨٣٧٤
جنس بيوض من البواغيات وفصيلة الحفشيات غلخيات الاغنادي || جسمها مستدل الخانة يطول نحو ١٠٠ سم. ثوبا الى السمرة الخطية المواج يطولها يتبعج ثلاثي الالوان لاقباسي الزاويقي ، يكثر فيه الرمادي والجوي والاصفر ، يمتد من الرأس الى الذنب ، رأسها بيض الشوزن. عتقها متوسطة الطول. عينها كيرتان. عدد اسناتها ٥٤ منها ٣٠ في الفك الاسفل ٢٤ في الفك الاعلى من اصلها اربعة عتاق عتدة ، ثابتة ، شلقية الارتكاز تبح السم في كل عضو تصببه عتسا يرق حتى مستواها الداخلي || تتألف البراري والاطلال. قوتها كل ما دب وطار. تنفض على فريستها انتفضاض السنور على الفأرة || تسرح في الثمار وفي اوائل الليل. بياتها الشوي يسمر نحو خمسة اشهر. تبلغ كامل نموها بمر ١٥ سنة وتعيش نحو ١٢٠ سنة || الانثى تسلف بمر خمس سنوات وتبيض من ١٦ الى ٣٢ بيضة مجمعة في سبحتين تطسرها في الرمل || تعتبر من التاميين المؤذية.

Palonnier (F). Swing-bar, Pole (E). **نَاطِيط** - ٢٨٣٧٤
هو المزان ، قطعة من خشب أو من حديد مركها في مقدمة آلة الحرت أو البرية ، تعلق بها السيور فجير .

Culcivore (F). Culicivorous (E). **نَاطِيطُ الْوَرْدِ** - ٢٨٣٧٥
الناتر من الطير والحيوان من كان قوته السم وما شبه .

Aphrodisiaque (F). **نَاطِيطُ** - ٢٨٣٧٦
Aphrodisiac (E).

نَاطِيطَانِ - ٢٨٣٧٧

الناتقان كوكبان من كواكب الجوزاء اي الجبار يتقدمان الرجل .

نَاطِيطَةٌ - ٢٨٣٧٨
هي القوقبة ، اطبا .

Bupreste (f) Buprestis (E) **نَاطِيطَةٌ** - ٢٨٣٥٧
هي الرقبتين ، اطبا .

Bupreste du chêne (F). **نَاطِيطَةُ الْبَلْطُ** - ٢٨٣٥٨
اطلب رقتين السنديان .

نَاطِيطَةُ الْخَوْخ * ، وَكَبِيبُ الْخَوْخ - ٢٨٣٥٩
Prosima undecimmaculata (S). Bupreste du prunier (F).
حشرة من الناصحات. طولها نحو ١٠ م. لوها الى السواد الاصفر ، نمداها رباعية الخطوط المنترعة النارية اللون . رقتها شديدة الاذى تسردب سوق معظم اشجار الفصيلة الوردية اعصها الموح والمشمش .

نَاطِيطَةُ الدَّرَّالَيْنِ السَّوْدَاء * ، وَكَبِيبُ الدَّرَّالَيْنِ - ٢٨٣٦٠
Capnodis cenebrionis (S). Bupreste noir du pêcheur (F). Pesch capnodis (E). Capnodis tenebrionis (D).

حشرة من الناصحات، طولها نحو ١٨ م. لوها الى السواد المحمي تملو ماجة غبراء . رقتها تسردب سوق القوزيات اعصها الدراق تنضبها وتوقع بها اشد الاذى .

Bupreste des pins (F). **نَاطِيطَةُ الصَّنَوْبَرِ** - ٢٨٣٦١
اطلب رقتين الصنوبر .

نَاطِيطَةُ الْوَرْدِ * ، وَكَبِيبُ الْوَرْدِ - ٢٨٣٦٢
Corsebus rubi (S). Bupreste du rosier (F).
حشرة من الناصحات، طولها نحو ١٠ م. لوها الى السواد الازرق المالح . نمداها مجاهتان بخطوط غبراء منترعة . رقتها تنشر سوق الورد واغصانه .

Bupreste vert (F). **نَاطِيطَةُ خَضْرَاء** - ٢٨٣٦٣
اطلب رقتين اخضر .

Spondyliocladium (S). **نَاصِرُورَةٌ** - ٢٨٣٦٤
جنس فطور مجهرية من الريدانيات وفصيلة الطمليات . جريه الكيدية حنطية ، قضية التجميع . كنانده طلبة الشكل ، مستندقة الاطراف ، ومنها حلزونية . || انواعه قليلة اخرها ناصورة البطاطا .

نَاصِرُورَةُ الْبَطَاطَا ، وَكَبِيبُ الْبَطَاطَا - ٢٨٣٦٥
Spondyliocladium atrovirens (S). Gale argentée de la pomme de terre (F).
فطر مجهرية يتطفل على البطاطا في طور نموها الاسمر ، قرب ادراك الثروت . || مظهره الخارجي بقع مستديرة ، غبراء اللون ، قضية المراج ، تنطللها بنور ثولولية صغيرة مصنوعة الثلاث الاسود الشق ، تركب الدودة تضطب البشرة مع قليل من الالباب || يكاتنج بتطهير البذار قبل الزرع وذلك بنقع النصف مدة ٢٠ دقيقة باحدى املاح الزئبق المحلولة ٥ ٪ .

Toupet (F). Foretop (E). **نَاصِيَةٌ** - ٢٨٣٦٦
غصلة الشمر اللدلية على جبهة الفرس .

Trop mûr (F). Overmature (E). **نَاصِيَةٌ** - ٢٨٣٦٧
نعت تمرين توصف به جميع المحاصيل الزراعية بعد اجيائها دور الانبعاث ودخولها في دور التفسج .



ناصة الموح



ناصة الدراق السواد



ناصة الورد



ناطر

Vertex ٢٨٣٩١ - نَاقُورُخ
الناقورخ هو قرة الرأس في تشريح الحشرات .

Chamele (F). She-camel (E). ٢٨٣٩٢ - نَاقِة
الناقلة هي الانثى من الابل . ج. نوق . كنيها ام بن وام
حائل وام حواز وام السبق وام مسعود || يحلبها يستقيم
سنة واملاج حوارها يستمر سنة .

Dugong (F). ٢٨٣٩٣ - نَاقِة البَحر
هي الاطوم ، راجعه .

Acidiphile (F). ٢٨٣٩٤ - نَاقِس
تتمتع بخصائص توصف به النباتات التي تنمو في الاربة
الحضبية التي يراوح دالها من ٦٥ الى ٥٠ هـ .

Afférent (F). ٢٨٣٩٥ - نَاقِل ، مُرسِل
Afférent (E).

Contage (F). ٢٨٣٩٦ - نَاقِلَة العَدَوِي
Contagium (E). مادة تنقل ميكروب المرض المعدي .

Conductibilité (F). ٢٨٣٩٧ - نَاقِلِيَّة
هي الايسالية ، اطلبها .

Pic (F). ٢٨٣٩٨ - نَاقُوبَة
هي النكار ، اطلبه .

Regressif (F). ٢٨٣٩٩ - نَاقِص
الناقص من اقله الى ما كان عليه . راجع اشيم .

٢٨٤٠٠ - نَاقِيس الكُتُب * ، مُنَل الكُتُب
Atropos
حشرة من فصيلة الناسيات، طولها نحو ٢ م. نوبها الى
النيرة. اصطناعها العالم. قوتها المواد السيلوزية، تفرس اوراق
الكتب فتعطها .

Atropidae (S). ٢٨٤٠١ - نَاقِسيَّات
Atropidés (F). Atropidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة القهليليات، انواعها عديدة، جميعها
صغيرة القد، طول اجسامها يراوح من ١ الى ٣ م.
اقولها الى الصغرة البتراء . قوتها المواد الصخرية والشمعية .
نوع منها يدعى ناس الكتب يمتري اوراق الكتب
والقراطين فينخرها ويعطها .

Formicivore (F). ٢٨٤٠٢ - نَاقِيل
Formicivorous (E).
تتمتع بخصائص يطلق على كل حيوان او طائر قوته النمل .

Myrmecophagidae (S). ٢٨٤٠٣ - نَاقِيلات
Myrmecophagidae (F). Myrmecophagidae (E).
فصيلة حيوانات من رتبة الدرد الحشرات . قوتها النمل .
راجع آكلات النمل .

Culcín (F). ٢٨٤٠٤ - نَاقِوس
هو البومض ، اطلبه .

Formicide ٢٨٤٠٥ - نَاقِيل
تتمتع بخصائص يطلق على جميع الادوية الموضوعة للقضاء
على النمل .

Roue hydraulique (F). ٢٨٣٩٧ - نَاقُورٌ ، نَاقُورَة
Water-wheel (E).
دولاب مائي مركب من قواديس تحركه سرعة جري الماء
فينرخ ما غرقه القواديس في جدول يأخذ الماء الى حيث
الحاجة .

٢٨٣٨٠ - نَاقُورٌ هَوَلي ، نَاقُورَة هَوَليَّة
Eolienne (F). Aeolian (E).
آلة لرفع الماء تحركها الريح . وتسمى ايضا دولاب هوا .

Galliard (F). ٢٨٣٨١ - نَاقُورَة
هي الفريديا ، اطلبها .

Noria (F). ٢٨٣٨٢ - نَاقُورَة ، سَاقِية
Noria, Chain-pump (E).
آلة رافعة الماء تدور بوسطة الدواب او المحركات .

Nagana ٢٨٣٨٣ - نَاقَانَة
مرض يصيب الحيوانات الداجنة سببه شقبيّة تنقلها اللشاة
اللاسمة .

Naja indien (F). ٢٨٣٨٤ - نَاقِيران
Indian cobra (E).
هو الصل الهندي ويدعى ايضا افسى هندية وناسر هندي .

Vessie du musc (F). ٢٨٣٨٥ - نَاقِيجَة
Musk-bladder (E).
جراب المسك في الحيوانات التي تفرز هذه المادة .

٢٨٣٨٦ - نَاقِيجَة البَقر * ، أَغْرِيل الزَوَال
Agrilus cinctus (S). Agrile des genétes, Bupreste
vert (F).
حشرة من الناصعات، طولها نحو ٨ م. لونها الى الخضار
الاسقم المروج . تعيش على رصيف ازهار الفصيلة القرنية .
تتمتع كنها على جذوع الزوال فينتفخ من رقات خاضلة
تقضي على القضايا والافانان . || اما تسميتها بنافجة
البقر فذلك لانها عندما تكثر في بطون البقر من جراء
اقتلاعها مع العشب ، تسبب الحباط وهو نفخة في الخوض
قد تكون مؤذية .

٢٨٣٨٧ - نَاقِل المَلْعُول ، تَنَقِيدِي
Exécutoire (F). Executory (E).
ما كان يحمل الصيغة التنقيدية من اسكاف او اواصر او
مفرد .

Cadéque, Caducifolié (F). ٢٨٣٨٨ - نَاقِيس
Deciduous (E).
اسم حال يوصف به النبات الذي ينفض ورقه كل سنة .
راجع عايل .

Vésicants (F). Vésicants (E). ٢٨٣٨٩ - نَاقِيعَات
فئة حشرات من ممدات الاجنحة تشمل النواظف والذرايع
والورقيات .

Mylabris (S). Mylabre (F). ٢٨٣٩٠ - نَاقِطَة
جنس حشرات من النواظف الممدات الاجنحة . انواعها
زهاء ٣٠٠ تعيش في المناطق الحارة والمعتدلة . جميعها من
الحشرات النافقة ، تتمتع مكها في مدارز الجراد واشباهه
فينفخ من رقات همة تلهم السوء .



ناقفة البقر



ناس الكتب

٢٨٤١٢ - **ثَبَات** ، **ثَبَّت** (F). **Végétal** (F). **Plant** (E).
كلمة شاملة تعني العشب والجلينة والشجرة . الواحدة نبتة
والجمع نباتات وأنبث || والنبات هو احدى المملكين
اللتين تنقسم اليها الكائنات الحية وهما الحيوان والنبات .
ويقسم النبات الى وسيدات الخلية وهي كائنات دنيا
ترتكز على خلية واحدة تقوم بجميع الوظائف الحياتية .
والى عديدات الخلايا وهي كائنات راقية تتكون من جنود
وسوق وأوراق خضر وأزهار وثمار وبلور .

٢٨٤١٣ - **ثَبَاتُ الْمِلْح** (F). **Plante salicole** (F).
Salt-producing plant (E).
كل نبات يعيش في الارربة المالحة .

٢٨٤١٤ - **ثَبَاتُ النَّار** (F). **Plant** (E).
هو القرامس الكرسي ، اطليه .

٢٨٤١٥ - **ثَبَاتٌ بَرِّيٌّ** (F). **Plante agreste** (F).
Uncultivated plant (E).
كل نبات تنبته الطبيعة في الاراضي غير المزروعة .

٢٨٤١٦ - **ثَبَاتٌ جَبَلِيٌّ** ، **ثَبَاتٌ جَبَلِيٌّ** (F). **Plante alpestre** (F).
Alpine plant (E).
كل نبات يعيش طويلاً في الجبال العالية .

٢٨٤١٧ - **ثَبَاتٌ رُحَاقِيٌّ** ، **ثَبَاتٌ رُحَاقِيٌّ** (F). **Plant** (E).
Mollifère (F). **Molliferous plant** (E).
النبات الرحاقي كل نبات يفرز الرقيق من أزهاره او
ينضج المغفر من مسام اوراقه ليجبرسه التحل ويحول الى
صل || اشهر النباتات الرحاقية ما جاء في الجدل التابع .

٢٨٤١٦ - **ثَامِيَّة** (F). **Drageon** (F).
Sucker (E).
شُطْ او قصب في ديان نشأ على جلع او جذرالنبات .

٢٨٤١٧ - **ثَاه** (F). **Végéter** (F). **To vegetate** (E).
ناه النبات نما وارتفع .

٢٨٤١٨ - **ثَاهِر** (F). **Raisin blanc** (F). **White grapes** (E).
لمت تعريفي يطلق على كل صنب ابيض من اي ضرب
كان .

٢٨٤١٩ - **ثَاهِيض** (F). **Sommet de l'omoplate** (F).
Extremity of shoulder-blade (E).
رأس المنكب في الحيوان وهما ناعضان . ج نواضس .

٢٨٤٢٠ - **ثَاهِيض** (F). **Polyphage** (F). **Polyphagous** (E).
لمت توصف به كل حشرة آكلة تقتل عواد شديدة
الاستلاب .

٢٨٤٢١ - **ثَاهُور** (S). **Ovis nahoar** (S).
Mouflon bharal (F). **Bharal** (E).
نوع من الاراري موطنه جبال التبت وهضابها . يألف
المراعي المكشوفة الاطراف . وهو ربع الجفة ،
كبير القرن خيلفه عند الذكور ، دقيقه عند الاناث .
لويه الى الريدة الشهداء يمين عند ثيج الظاهر ويبيض عند
البطن . اجله يراوح من ٧ الى ١٥ انفار يقوده نيزب
مدح .

جدول النباتات الرحاقية

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
بَرَبَرِس ، عُوْدُ الرِنَج	Barberry, Pipperidge	Berberis, Epine vinette
بَجَاص ، كَمَثَرِي	Pear tree	Poirier
لَعْدَرِيَّة	Evening primrose	Aenothère, Enothère
أَصْبُون	Viper's bugloss	Vipérine
أَذْرِيُون المَاء ، سُرْمُوس	Water butter-cup	Populage, Calthe
أَرَلِيَّة	Angelica tree	Angélique sauvage
أَرْطَمُون	Burdock	Bardane
أَرْسِيْمُون	Erysimum	Erysimum, Vêlar
أَسْطَر ، نَجِيَّة	Starwort	Aster
أَلْفَاقِي ، دُنْدُرَان	Tufted vetch	Vesce craque
أَيْبَغْفَس	Eppactis	Epipactis, Héliéborine
أَكُونِيْت ، بَشَر ، أَتْلَه	Aconite	Aconit
أَكُونِيْت ، مُشَكَّة بَاكَايِيَّة	Japan medlar	Néflier du Japon, Bibacrer
أَكِيلَاجِيَا ، كَرْلَمِين	Columbine	Ancolie, Colombine
إِبْرُوس ، كَرُوَلَا	Coronilla	Coronille
أَنْشُوْرَة	Bugloss	Buglosse
بَاقِيَّة ، بَقَّة	Common vetch, Lints	Vesce, Pasquier
بُرْلَا ، سَنْدَر	Birch	Bouleau

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
بَرْيَلَا ، بَرْزَة	Common pea	Petit pois, Pois vert
بَسَلَة بَرْزَة	Wild pea	Pois sauvage
بَصَل	Onion	Oignon
بَطَاط ، حَنْطَر ، شَيْط العُور	Knot-grass	Renouée des oiseaux
طَبِيخ - جَنَس	Water-melon	Pastèque
نَقَس ، شَمَشَاد	Box tree	Buis
بُذْق ، حُلُوز	Hazel-tree, Filbert	Noisetier, Coudrier
بُرْقِيصَا ، دُودَاو ، عَرُغَاء	Elm-tree	Orme
لُرْمُس	Lupine	Lupin
لُرْمُحَان ، حَشِيَّة النَحْل	Bee-balm	Mélisse
لُرْمُشَاء ، لُرْمُشَان	Blue-bottle, Bachelor button	Bleuet, Aubifoin
نَعَا ح	Apple-tree	Pommier
نُوب	Fir-tree, Silver fir	Sapin
جُرْجِير ، رُمَّة ، إِيْهَان	Rocket	Roquette
جُرْجِير بَرِّي ، إِيْهَان	Wild rocket	Roquette sauvage
جَلْبَان	Vetch	Gesse
جَنْجُل ، حَشِيَّة اللَّيْبَار	Hop, Bine	Houblon
جُولِيَانَا	Gilliflower	Julienne
جِيرَانِيُوم ، عُرُونُف	Geranium, Shepherd's needle	Geranium, Gêranier
حُرُف المَاء	Buck's horn	Sénébière
حَشِيَّة الرُّقَّة	Lung-wort	Pulmonaire
حَشِيَّة السَّعَال ، دُوسَة الجِمَار ، فَرْقَاة	Cough-wort	Tussilage
حَشِيَّة المَلَاك	Angelica	Angélique
حَصَا الْبَان ، أَكْلِيل الجَبَل ، نَدَى الْبَحْر	Common rosemary, Oldman	Romarin, Encensier
حَضَض ، عَرُود ، أَطَد	Boxthorn	Lyciet
حَلِيلَار	Hare's-ear	Buplèvre
حِشِيم	Borag	Bourrache
حِشِي	Chick-pea, Gram	Cicérole, Pois chiche
حَنْبَل ، قَاوُوقِيَاء	Kidney-bean	Haricot
حَنْدَقُوق	Sweet-clover	Mélilot
حُود (جميع الأنواع)	Poplar	Peuplier
حَيَّي المَاء ، حَيُون ، وَدَنَة	Orpine, Stonecrop	Orpin, Sedum
حَبَارِي ، حَبَارَة	Mallow	Mauve
حَرْبِي	Hellebore	Hellébore, Ellébore
حَرْدَل	Mustard	Moutarde, Sénévé
حَرَام	Reseda	Réséda
حُورَمِي ، لَانْدَة	Lavander	Lavande
حَلْتَج ، شَنْطَلَف	Heath, Heather	Bruyère
حَلُود ، عَمِير	Jupiter's beard	Joubarbe
حَنَازِيرِيَّة	Figwort	Scrofulaire
حُورَج	Prune tree, Plum tree	Prunier
حَبَّار ، قَدَد	Cucumber	Concombre
حَبِيرِي ، مَتُور	Stock, Gilliflower	Groflée
دَنَاب ، نَعَم الحَقْل	Pudding grass	Pouliot
دَبَع	Scorzonera	Scorzonère

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
دَحْرَج	Spurred vetch	Vesce éperonnée
دَرَّالين ، دَرَّاق ، دُرْمِك	Peach tree	Pêcher
دَهْنَةُ مُودِ الْفَار	Spurge laurel, Dwarf bay	Daphné lauréele
دِيحِيَّال ، زَهْر الْكَمَّاشِين ، مُعَيْيَّة	Finger flower	Digitale, Gautcelet
رَاسَن دُيْن ، طَبَّاق ، طَبُون	Rock flea-bane	Inule conyze
رَبِيَّان ، رِبْجَل الْمُصْفُور	Bird's-foot	Ornithope
زَعْرَاع	Common flea-bane	Pulicaire
رَبْعِي الْحَمَام	Vervain	Verveine
رُوبِيَّة سَبِيَّة ، سُنْط كَاذِب	Locust acacia, False acacia	Robinier faux-acacia
زَبَاد ، زَبَاوِي ، سَحَاء	Starwort	Pallénis, Petit mugue
زَفْرِين	Alaternus	Alaterns
زَوْفَا ، جِسْمِي ، حَسَل ، زَرْفُون	Common Hystop	Husope officinale
	Linden	Tilleul
بَيْت الْحُسْن ، بِلَادُون	Dwale, Banewort	Atrope, Belladone
سَرْتَه . (لِسَان الضُّفُور)	Hony wort	Cérinthe, Mélinet
سُرُو	Cypress tree	Cyprés
سَطَّاقِس ، سَطَّاقِس	Stachys	Epiaire
سَفَرَجَل	Quince tree	Cognassier
سَقْدَر لَامِع	Knee holly	Fragon piquant
سَلْسِيل	Saleify	Salsifis
سَمَارَة . تَوْدَرِيح ، رِبْجَل الْجِمَال	Hedge mustard	Sisymbre
سَمِيرِم	Common ling	Callune vulgaire
سِينْدِيَان	Oak tree	Chêne
سُنْط	Acacia	Acacia
سِنْدَاوُون	Skirret	Chervis
سَبَسَم	Snapdragon	Mufflier
سَبْت ، سَبْت	Anet, Dill-seed	Aneth, Fenouil bâtard
سَكَاغِي ، اَلْقُسُون	Scotch thistle	Onoporde
سَمَار . شَمَرَة . شَمَار	Fennel	Fenouil
سَمَام	Melon	Melon
سِينْدَاب	Eryngo	Panicaut, Erynge
شَوْلَك ، سَهْيَاء	Thistle	Chardon
شَوْلَك الْجَمَال	Globe thistle	Cardère
شَوْنِيَز ، شِينِيَز	Black cumin	Nigelle
سُرِيْمَة الْبَنَدِي	Casprifoly	Chèvrefeuille
سَعْتَر . سَعْتَر (جَمِيع الْأَوَاع)	Thyme & Marjoram	Thym et Origan
سَعْتَرَاء ، سَوْرُو	Willow	Saule
سُفَيْرَاء	Sophora	Sophora
سُفْلَاب	Silk cotton	Asclépiade
سَوْنُوَر	Pine-tree	Pin
سَمْعَة	Echinops	Echinopse
سَمِيرَان ، نَعْتَعِ الْاِه	Water mint	Menthe aquatique
طَرَشْمَقُون ، هِنْدَب	Blow-ball	Pissenlit officinal
طَوْنُوَرُون	Germander	Germadrée
طَبَّاقَان ، كَرَاتِ الْبَر	Crow garlic	Porette

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
طَيم ، بَومِيَّة البَرِّي	Holly, Christmas	Houx commun
عَلْفَاء ، نَمِيع بَرِّي	Wild mint	Menthe sauvage
عَالِق	Delphinium	Dauphinelle
عَرَاوَة	Spiraea	Spirée
عَرَن ، سَفُون ، سَلَّة زُرَابِيَّة	Holy clover	Sainfoin, Esparcette
عَسَلِيَّة ، زُفَرَة العَسَل	Honey flower	Mélanthe
عَشَقَّة	Ivy	Lierre
عَصَا الرَاسِي ، قَرْدَب	Persicaria	Persicaire
جَنَاز	Lily grass	Butome
خَوَسَج	Bramble	Ronce
خَسْرَاء ، صَرَبَة	Service tree	Sorbier
خَشَت	Eupatorium	Eupatoire
خَاشِرَا ، فَاشِر ، فَس	Bryony	Bryone
خَرَابِيُون ، بَاكَوَرُون	Horehound	Marrube
خَرَبِيُون ، بَنُوع ، عَجَبَد	Spurge	Euphorbe
يَصَّة ، يَطِيصَة ، قُصَب	Lucern	Luzerne
يَصَّة مَنُورِيَّة	Silver tree	Protée mellifère
فُودَنج	Wild marjoram	Fausse marjolaine
فُول ، بَالِيْلِي ، جُمِي	Broad bean	Fève
فِينَتَمَة ، فُونُومَا	Rampion	Raiponce
فِيرُونِيكَا	Veronica	Veronique
قَت ، يَصَة بَرِيَّة	Sea hedgehog medick	Lazerne sauvage
قَرطَم ، إِخْرِيض ، بَهْرَم ، مَرُوق	Safflower	Carthame
قَرَع	Gourd	Courge
قَرَاوِس ، قَرَايَا	Cornel-tree	Cornouiller
قُشُورَان	Horse-thistle	Cirse
قُصِيب اللَّذَب ، عَصَا اللَّذَب	Golden-rod	Solidage, Verge d'or
قَلَّاح	Self-heal	Brunelle
قُصِيط ، قَرْتِيط	Cauliflower	Chou-fleur
قُذَل	Horse-chestnut-tree	Marronnier
قُطْرُبُون ، قُطْرَارِيُون	Centaury	Centaurée
قُطْرُول	Canavalia	Canavale
قُوسِيَّة ، قُوسِيَّة ، نَاسِيَّة	Sage	Sauge
قُيْب ، اُسْتَنْدَان	Maple-tree	Erable
كَاوَشِير ، جَرْد بَرِّي	Opopanax	Opopanax
كَرَاث مَعْرُوف	Leek	Poireau
كَرَر	Cherry tree	Cerisier
كَرْسَنَة	Ers, Ervil	Ers, Ervillier
كَرَلِن	Carlina	Carline
كَرَب	Kohi-rabi	Chou-rave
كَشَمَتَة ، قُطْلَة ، شَاة بَلُوط	Chestnut-tree	Châtaignier
كَشِيش	Currant-bush	Groseillier
كَشِي	Bitter vetch	Orobe
كَشَّة مَنَادَة ، كِلَاب أَرِيصِي	Ground ivy	Gléhome bédéracé
كَشَس	Gypsophile	Gypsophile

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
كوسى	Vegetable marrow	Courgette
كوسى	Ptoughman's spikenard	Conyze
لأريس ، مكر	Common laech	Larix
لزان	Broom	Cytise
لسان الكلب ، آذان الأوترب	Gipsy flower	Cynoglosse
لغت	Rape	Rave, Navet
لثام ، ننع أخضر	Spearmint	Menthe verte
لوياء	Black eyed delichos	Dolique
لوز	Almond tree	Amandier
لوطس ، لوتس	Lotus	Lotier
ليون (جميع الأنواع)	Citrus	Citrus
ليبارية ، حجاب	Linaria	Linnaire
مازريون ، آثم ، دقة سامة	Mezereon	Daphné mézérion
مخلب	Parfumed cherry	Mahaleb
مران ، لسان العصفور	Ash-tree	Frêne
مرقاويلا ، رحي البيل	Echinops	Echinope
مسط الرابعي ، شوك الدراج	Teazle	Cardère à foulon
مشوش	Apricot tree	Abricotier
مشملة	Medlar tree	Néflier, Merier
مشرقة	Melick	Mélique
مفلوف ، كرتب ، لخته	Cabbage	Chou
ناردين ، سبل	Valerian	Valériane
نق	Alder	Nerprun
نذ ، حبيزة	Willow-herb	Epilobe
ندع	Savory	Sarriette
ننع	Mint	Menthe
ننع البر	Cat-mint	Calament
نفل	Clover	Tréfle
نذال	Common mistletoe	Gui
هرثية	Heracleum, Parsnip	Berce
هليون	Asparagus	Asperge
جندباء	Endive	Chicorée endive
قوية	Phacelia	Phacélie
قزال ، جندع ، جوق	Furze	Ajone
وسنة الصافين	Woad	Guède, Pastel
وسنة حمران	Red spur-valerian	Centranthe rouge
باسم ، فلو ، وثاية	Privet, Privy	Troène, Pruène
بغبيد ، بيمبيش	Lion's tooth	Léontodon, Dent de lion
بطيخين اقرق ، قلاوون المير	Squash	Pâtisson

٢٨٤١٨ - نبات طبي
 Plante médicinale (F).
 Medicinal plant (E).
 النباتات الطبية كل نبات حوى بعض العناصر الفعالة
 النافعة الصالحة للتطبيق . النباتات الطبية كثيرة العدد ،
 معظمها مشهور وبعضها لا يزال في دور التطبيق
 الاعتباري || أشهر هذه النباتات ما جاء في الجدول التالى .

جدول النباتات الطبية

النبات	التحليل
أبست، شبح رومي	عشب معمر فراء. اوراقها مركبة ريشية. ازهارها عطرية صفراء اللون
أبست بحري	عشب معمر متسلق الساق. اوراقها مفصصة. ازهارها قليلة العرف باهنة الصفار
أخيليا أم ألف ورقة	عشب معمر فراء. اوراقها مركبة مشطية. ازهارها الى البياض الوردية
أدونيس ربيعي، حين الثور	عشب معمر فراء. جلداه عسقلي. ازهارها فردية كبيرة صفراء اللون
آذرين غزلي	عشب حولي فراء. اوراقها ريشية خصلية النصال. ازهارها صغيرة
إرله، سراسد	جنية معمر فراء. اوراقها كثيفة النصال. ازهارها عطرية زرقاء. ثمارها صغيرة كالفلفل
أرضي شوكي، غرشوف	عشب معمر، اوراقها كبيرة مقرضة ومشرمة، ازهارها رئيسية طرفية
أوطاة، ياسين اصفر	جنية معمر متسلق. اوراقها عروبة سنانية. ازهارها بويضة عطرية صفراء
أرطاسية جبليّة	عشب معمر غشوشية الساق. اوراقها سنانية. ازهارها رئيسية خضراء
أرطالون	بجلة حولية. اوراقها كبيرة قلبية. ازهارها ارجوانية. تتميز بجنتها الغليظ
أرنكا جبليّة، زهرة المطاس	عشب معمر مستقلقة الجذر. اوراقها سنانية. رؤسائها الزهرية الى الصفار البرتقالي
أروم، تريفاي ابيض	عشب دوفضية. اوراقها قرصية الانتشاب سهمية كبيرة. ضبتها صفراء المواج
أروم ثلاثي الورق	عشب دوفضية. اوراقها قرصية الانتشاب ثلاثية الوريقات. ضبتها موضحة
أسارون، ناردين بري	عشب جلمورية معمر. اوراقها لحمية كلوية الشكل. ازهارها صغيرة ارجوانية
اشنة بحرية	ضمة من الخيوط والحزم الدوفضية سمراء اللون زيتية المواج
اطريل نفل	عشب جلمورية معمر. اوراقها قرصية الانتشاب مركبة. ازهارها صغيرة بيضاء
أقنى متوقفة	جنية معمر فراء خليقة الدوملة. اوراقها مركبة. ازهارها الى الخضار الباهت
أقنوع حنين	عشب حولية. ساقها ضعيفة. اوراقها صغيرة مشرمة. رؤسائها الزهرية صفراء
إكليل الجبل، حصا لبنان	جنية معمر فراء. اوراقها صغيرة لسة. ازهارها زرقاء اللون
أثاير، انجبار	عشب جلمورية معمر. اوراقها قرصية الانتشاب. ازهارها صغيرة وردية
أثورة غزلية	عشب معمر او حولي. اوراقها لسة مستحشفة. ازهارها الى الزرقاء البنفسجية
أنيسون	عشب حولي فراء. اوراقها مركبة. ازهارها بيضاء. ثمارها يزور عطرية خضراء اللون
أنيسون بحمي	شجيرة فراء. اوراقها ابيدة جامدة. ازهارها صفراء. ثمارها لوزية دهنية اللباب
أوكالبتوس حرمي الورق	شجرة ضخمة باسفة. اوراقها سنانية جامدة، بحرية الخضار
ايوبه	جنية معمر فراء. اوراقها اهليجية. ازهارها بيضاء. ثمارها حنابل لثائية البلور
بايون عطري	عشب معمر مستقلق فراء. اوراقها مركبة عيطية. ازهارها رئيسية صفراء
بايون عطري	عشب حولي صغيرة. اوراقها ثنائية التظليل الريشي. ازهارها رئيسية صفراء
باروسه غوليتا	جنية معمر فراء. اوراقها سنانية جامدة النصال. ازهارها بيضاء اللون
بياط زراعي، دباء الهند	شجرة عادمة الفروع. اوراقها قلبية كبيرة سباعية التفصيص. ثمارها قرصية
بتولا بيضاء	شجرة فراء. اوراقها قلبية كبيرة. ازهارها خيزاء. ثمارها جوزية
بربريس، حود الريح	جنية معمر فراء. اوراقها يفيضة جامدة. ازهارها صفراء. ثمارها صمغية
برقوق شالك	شجيرة شائكة فراء. اوراقها يفيضة مسننة. ازهارها بيضاء. ثمارها خوخية
برق عصلي	جنية معمر فراء. اوراقها يفيضة جامدة. ازهارها حمراء. ثمارها نووية جوية
برزوطنة، عنب البراق	عشب صغيرة معمر. اوراقها قرصية الانتشاب. ازهارها شمراخية. ثمارها يزور صغيرة
بطباط، شبط الفول	عشب حولي فراء. اوراقها صغيرة. ازهارها بيضاء او وردية ثمارها يزور صغيرة
بطونقا طيبة	عشب معمر. اوراقها سنانية مسننة. ازهارها عطرية حمراء اللون
بقندوس	عشب حولي. اوراقها مركبة. وريقاتها ثلاثية التفصيص. ازهارها خضراء اللون
بقس، ششاد اخضر	جنية معمر. اوراقها صغيرة ابيدة جامدة. ازهارها وردية. ثمارها عنبية
بقلة الاوجاج	عشب جلمورية معمر. اوراقها سنانية مزغبة ومسننة. ازهارها صغيرة ليلكية
بقلة القريس	عشب جلمورية شمراخية. اوراقها مركبة خماسية. ازهارها بيضاء. يزورها دقيقة
بلاذون، ست الحسن	جنية معمر فراء. اوراقها كبيرة متمشجة. ازهارها وردية. ثمارها عنبية
بلاذر شرقي	شجرة معمرة للساق. اوراقها سنانية جامدة. ازهارها بيضاء. ثمارها قلبية لحمية مأكولة

الاجزاء الصالحة	المنافع والاستعمال
الأوراق والأزهار	مغلي الأوراق والأزهار ينشط الحضم والابلاع والطمث ويدفع الحثيات
الأوراق والأزهار	يستعمل مغلي الأوراق والأزهار كطارد للبلدان. وينشط الحضم
الأوراق والأزهار	مستحباً مغز، منقي، مضاد للتشنج، وفيه للمعدة والامعاء
العشبة برتبها	تنظم التشنج، ترفع الضغط الدموي، تزيد ادرار البول
العشبة برتبها	تقيحها يسكن آلام الحصى. مستحب الأزهار يفيد البثنة عند الذكور
الأزهار وأثمار	اثار عمدة للقوة الجنسية. الأزهار وأثمار هاضمة، طاردة للغازات وتدر البول
الأوراق وصلوصعها	عصيرها يفيد الحفر والاستسقاء واليرقان واحتقان الكبد ويتر البول
الأرومة والجذور	مغسلة للضغط الشرياني، تدفع الحمى والأمراض العصبية. استعمالها خطر لأنها سامة
اليزور والعشبة برتبها	مقوية تفيد الصدر والمعدة. مدرة للحصى
الجثث والأوراق الغضة	خارجياً تعيد الأمراض الجلدية والدمامل. داخلياً منقعة ومقوية للدم
الأزهار والجذر	مضادة للالتهابات والربو. تشي جروح الاوعية الدموية
الدرن والأوراق الغضة	عصيرها سهل، ممتد للحصى الكلوية. استعمالها خطر لأنها سامة
الدرن والأوراق الغضة	من الداخل تفيد الربو والتلات الرئمة والتمل العصبية. من الخارج منقعة
الجذامير والأوراق	تقيحها واسحقوها سهل شديد الوبخ. ويستعمل كمغلي
النبات برتبها	يستعمل كطارد للور خاصة عند الأطفال
الأوراق	مقوية. تفيد المعدة. تدفع الحمى. تدر الطمث
الارمولة	مقوية للمعدة. تفيد الرقن الزنجي والروماتيزم للفصل والقرص
العشبة برتبها	مضادة للتشنج. مطبحة. دافعة للحثيات. طاردة للور
الأوراق العليا والأزهار	تقيح الأزهار تاحوط. تقيح الأوراق يقضي على الصفراء. الأوراق والأزهار تنشط الاعصاب والذاكرة
الأوراق والأزهار والجذامير	قابضة نشيطة لا تضر الجهاز الهضمي
العشبة برتبها	مترقة وسقيفة للدم. تفيد الأمراض الصدرية والحلقية
اليزور	مغلي اليزور ينشط الحضم ويسكن الحصى ويزيل الانتفاخ ويتر البول
الأوراق وأثمار	تستعمل استعمال التيسون
الأوراق	منقيا منقش، مغز، مضاد للحمى وفيه الطل الرئوية والمالك البولية
الأوراق والأزهار وأثمار	مقوية للقلب، منقعة، مشهية
العشبة برتبها	تفيد المعدة وتطرد الغازات وتغذي الاعصاب. مضادة للتشنج
الأزهار	مضادة للتشنج تدفع الحمى والريح. تقوي الاعصاب
الأوراق	مقوية. هاضمة. هاضمة. مدرة للبول
اثار	عصارة اثار قبل الادراك تخفف من سرعة خفقان القلب وتفيد الحضم والمعدة
الأوراق	اوراقها من الخارج تفيد الروماتيزم المصلي والمفصل والقرص. عصيرها يفيد الكل والكبد
الأوراق وأثمار واللحاء	تفيد المعدة وامراض الرئة واليرقان
الأزهار وأثمار	مستحب الأزهار يفيد التهاب اللسان وصعوبة التبول. عصير اثار يفيد الرعاف وفروح القم
اثار	مستحب اثمار طارده للور لاسيما الدودة الرجيدة
الأوراق والشرايين واليزور	منقيا يقضي على الامساك
العشبة برتبها	منقيا يقطع الاسهال وفيه الحضم والجهاز البول. التشنج باوراقها المهرومة يفيد القروح
الأوراق	دافعة للحمى وتفيد ضعف الاعصاب والطحال والكبد
اليزور والجذور والأوراق	يقضي اليزور يقي الدم ويتر البول. الجذور مشهية. والأوراق منقعة
الأوراق واللحاء والجذور	مترقة. دافعة للحمى. تفيد الطل العصبية
الجذامير والأوراق	مقوية للقلب والمعدة. مضادة للتشنج. خداد اوراقها يزيل الوجاع
الجذامير	مشهية، منقعة، هاضمة وتفيد الربو
الأوراق والأزهار والجذور	مضادة للتشنج والافرازات. تمدد حقة العين - مسحوق او صفة
اثار القيقبة	تستعمل الثور والقيوة استعمالاً خارجياً

النبات	الصيغة
بلدس ، شجرة الكبد	شجرة صغيرة فرعاء. أوراقها بيضيّة أبيضّة جامدة. ثمارها كاذورورسكية مأكولة
بلسم مكّة	جنية معمرة فرعاء. أوراقها مركّبة وثريّة. ورقاتها صميكة. ازهارها خيراء اللون
بنّ	شجيرة فرعاء. أوراقها متقابلة أبيضّة. ثمارها نويّة ثنائيّة الحب
بنج اسود	بغلة حوليّة. أوراقها مفرّعة كريمة القزاحة. ازهارها كبيرة. يزورها مفلطحة
بندق هندي	جنية معمرة داسية. أوراقها مركّبة شغيفيّة. ازهارها بيضاء. ثمارها حنابل. يزورها كروية
بنفسج عطر	عشب رليديّ معمر. أوراقها قرصيّة الانتشاب معقّة. ازهارها بنفسجيّة عطرة
بشّية اللبّاق ، عود الخير	شجرة فرعاء. أوراقها جامدة أبيضّة سننّة شاكّة. ازهارها صغيرة. ثمارها عنيّة
بشّية الشاي	شجرة كبيرة فرعاء. أوراقها بيضيّة. ازهارها صفراء اللون. ثمارها الى الحمرة
بورير أبيض	عشب ليفيّة عولة. أوراقها بيضيّة خمليّة البشرة. ازهارها عطريّة صفراء اللون
بولوطان مَرّ ، حشيشة اللبن المرّة	عشب حزنيّة معمرة. أوراقها صغيرة رعيّة. ازهارها جلجلية زرقاء اللون
بوش ، أكوييت هرمي	عشب معمر. أوراقها ريشيّة شديدة الخضار. ازهارها الى الزرقاء العاقبة
بيلسان اسود	شجيرة معمرة فرعاء. أوراقها مركّبة خناسيّة. ازهارها صغيرة صفراء اللون
تافنست ، ملكة الحشايش	عشب جلمويرة معمر. أوراقها مركّبة خناسيّة. ازهارها صغيرة كبيرة يسهل اللون
ترنجان	بغلة معمرة. أوراقها بيضيّة بارزة المروق. ازهارها بيضاء فواحة العبير
ترنشا	عشب حوليّة. أوراقها ضميّة الاتصال لانظمايّة. رؤسائها الزهرية زرقاء اللون
توت اسود ، توت شامي	شجرة دالحة. أوراقها قلييّة خشنة عابلة. ثمارها حسلّة جثويرة للبيدة العلم
لثان حلومرّ	جنية معمرة متسلّقة. أوراقها معقّة شديدة الخضار. ازهارها بيضاء بنفسجيّة المواج
تولاء أكمله	عشب حوليّة فرعاء. أوراقها قليّة بحريّة اللون. رؤسائها وردية
جرجير حقلي	عشب حوليّة فرعاء. أوراقها شديدة التطريش. ازهارها وردية. ثمارها يزور بحيلة
جرومية ترسيّة	شجرة سدّاعة جوفاء الساق. أوراقها ترسيّة مفصّصة. ازهارها حاميّة صفراء
جزر الرعاة ، دولس	عشب معمر. حشيشة الجندر. أوراقها مركّبة ريشيّة. ازهارها صغيرة خيراء اللون
جكرته بروسيرا	شجرة فرعاء. أوراقها مركّبة ريشيّة. ازهارها كبيرة زرقاء اللون. ثمارها لحميّة مأكولة
جلاب	عشب صقوليّة متسلّقة معمر. أوراقها قليّة. ازهارها كبيرة قرمزيّة.
جملج صنيّ	عشب حوليّة مزهية فرعاء. أوراقها سنائيّة سننّة. ازهارها بيضاء مستحيّة العرف
جنجل شائع	عشب معمر عارشة. أوراقها مفصّصة. ازهارها وحيدة للسكن
جنس	جنية فرعاء مستطيلة الجذور. أوراقها مركّبة خناسيّة. ازهارها وردية اللون
جوز عادي	شجرة كبيرة دالحة. أوراقها مركّبة وثريّة. ازهارها قلنيّة. ثمارها مأكولة اللباب
جينكو	شجرة ضخمة دالحة. أوراقها مروحيّة مشقوقة. ثمارها لوزيّة لحميّة السودقي جمحاليّة
حبّ السك	عشب حوليّة زياء. أوراقها خناسيّة اوسباعيّة الفصوص. ازهارها كبريتيّة اللون. يزورها بلسنيّة
حبّ معروف	عشب حوليّة فرعاء. أوراقها لسنّة ملنيّة. ازهارها بيضاء. يزورها دقيقة كروية
حمرل	بغلة معمرة ملكدة. أوراقها مفرّعة ريشيّة التشمير. ازهارها بيضاء. يزورها صغيرة
حشيشة الحفر	عشب معمر فرعاء. أوراقها مستطيلة مفرّعة. ازهارها صفراء. يزورها دقيقة سمراء
حشيشة الطغاف	عشب معمر. درنيّة الجندر. أوراقها قرصيّة مزرقاقية. ازهارها صفراء
حشيشة القرّة المخزنية	عشب معمر لحميّة زياء. أوراقها رعيّة مزهية. ازهارها وردية لم بنفسجيّة
حشيشة الثرجاج	عشب معمر فرعاء. أوراقها لسنّة زياء. ازهارها خضراء اللون
حشيشة السحال ، فزارة	عشب جلمويرة معمر. أوراقها قليّة مزهية. ازهارها صفراء اللون
حشيشة القزاز	عشب حوليّة فرعاء زياء. أوراقها يفيض مزهية. ازهارها يسهاء اللون
حشيشة الملايح	عشب حوليّة صغيرة. أوراقها ملحيّة الشكل درماء الاتصال. ازهارها بيضاء
حشيشة الملاك	عشب معمر فرعاء. أوراقها مركّبة وثريّة. ازهارها بيضاء اللون. يزورها منجمّة
حشيشة مباركة	عشب جلمويرة معمر. أوراقها القرصيّة ريشيّة اما العليا مفصّصة. ازهارها برتقالية اللون
حلب رويّة	عشب حوليّة. أوراقها مركّبة ثلاثيّة الورقات. ثمارها حنابل. يزورها شبه كروية
حليب حولي	عشب حوليّة صغيرة. أوراقها سنائيّة. ازهارها خضراء اللون
حمحم غزني	عشب حوليّة زياء. أوراقها سنائيّة خشنة. ازهارها زرقاء اللون
حشيشة الحفل	عشب معمر فرعاء. أوراقها سنائيّة مستطيلة داكنة الخضار
حشيشة زراعي	عشب معمر فرعاء. أوراقها رعيّة قائمة الخضار. ازهارها خضراء اللون

الاجزاء الصالحة	المنافع والاستعمال
الأوراق	تستعمل في علاجات الكبد، مقوية، هاضمة
صنع يستخرج بالحر من الساق	يسكن السعال، يقوي المعدة
الحب	مسحوق الحب المحمص ويغلي ينضج الاعصاب
الأوراق واليزور	مسحوقها او صيتها ممتدة، مضادة للتشنج، تعيد للنفس الكثرى، تمدد حدة العين
الأوراق واليزور	مغليها مقو، مضاد لزيات الحمى المتقطعة
الازهار والاوراق والرواكب	تقع الازهار الجافة لماني ويضع الصدر والسعال. الاوراق والرواكب ممتدة
الأوراق	تقع الاوراق او مغليا يبيد الرشح المستحي
الأوراق	مغلي الاوراق الجافة منفي وعاضم
الازهار	يستعمل الازهار بقطع السعال الجاف والتهاب الحنجرة. صيتها تنفع التهاب الجفون
الجذور والاوراق والازهار	مغليا ينشط ذو اللبن عند المرضع. مضادة للسعال. تعيد الحضم
الأوراق والازهار والجذور	العصية والمستعمل المثبر مسكن نشيط. يدر البول، مضاد للاحتقان
الأوراق واللحاء	مغليا يبيد التزلات الصدرية والتهاب الفورتين والصداع
الجذور	مسحوقها منفي، معرق، يساعد الحضم، يطلع الريح ويذر البول
الأوراق	مغليا مني، يبيد الآلام العصبية والصداع
الازهار	تقيمها يقوي العين ويغني عن الرمد
انجار	عصيرها كالبخس. يبيد للحمى والاعضاء
الفروع الهزلة	مسحوقها الجفاف يبيد الامراض الرئوية والعصية والقرص
الأوراق	عصيرها ينشط افراز الكلى ويغلي للثة ولحاء الدم
الأوراق واليزور	عصير الاوراق منفي ومضاد للحفر. مسحوق البذور ناطق وينشط الباه
الأوراق والجذور	مغليا يبيد الريو والاستقاء وامراض الكبد
الجذور واليزور	مغليا منفي نشيط. يبيد الحمى، يدر البول
الأوراق واللحاء	اوراقها تعيد الأمراض الجلدية. اللحاء مرقق ومدر للبول
المسائل	مسحوق المسائل سهل فكال
العصية برستها	مغليا يبيد التشنج الرئوي ويغلي الريو والتهاب الحنجرة
المخاريط الانثوية	مغليا يسكن الاعصاب والاضطرابات. مضاد للحفر والامراض الجلدية
الجذور	مسحوقها منفي نشيط او شاي حسب الاستعمال. لا يسيء الى الجهاز العصبي.
الأوراق وقرفة الثمار الخضراء	مغلي الاوراق يبيد الآفات الجلدية. صبة قرفة الثمار منهضة
اليزور	طاردة للدود
اليزور	مستعملها مضاد للتشنج
الأوراق والازهار	مغليا مقو، شه، هاضم، يزيل الصداع، مضاد للتشنج
اليزور	مسحوقها ومغليا يدر الطمث ويغني. استعمالها خطر ويوجب الحذر
الأوراق والازهار	مغليا دواء للحفر ومضاد للسعال. تقيمها يبيد البحة والتهاب الحنجرة
العصية برستها مع الجذور	تستعمل في معالجة البواسير مزوجة ببعض المساحق او للرام
الساق والاوراق	مغليا يبيد الصدر والالتهابات الشعبية والرئوية
العصية برستها	مغليا ملين ويذر البول
الأوراق والازهار	مستعملها مضاد للسعال والتهاب الحنجرة
العصية المقصية برستها	مستعملها يبيد ضعف القلب ويغني عن التزلات الصدرية الخفيفة
العصية برستها	شرايبها او صيتها منشطة، محرقة، مضادة للحفر، منقية للدم، تدر البول
الجذور	مغليا يبيد الجهاض التنفي واللحمه ويقطع للنفس
الجذور	مغلي المسحوق يبيد القلب والاضغاط والذاكرة والاعضاء التناسلية
اليزور	مغليا يبيد الالتهابات الرئوية والاسماك والبواسير وينشط السنة
الأوراق	مغليا ملين وسهل
الأوراق والازهار	مغليا معرق، يدر البول، مضاد للسعال والامراض الصدرية والعصية
الجذور والاوراق	مغليا مقو، يقي الدم، يبيد الامراض الجلدية
الأوراق	عصاريتها منهضة، تنقي الدم، تقضي على الاسماك

النبات	الصليب
حنطوق حقل	عشب حولي فراء. اوراقها مركبة ثلاثية. ازهارها صفراء اللون كثيرة العدد
حنظل	عشب حولي مدادة. اوراقها كبيرة خشنة مزغبة. ازهارها صفراء. ثمارها قرعية
عنب الرمال	عشب جذموريه معمرة. اوراقها عصبية حشوية البشرة مهدبة الحار
خيازة برية	عشب ليفية حولي او محولة. اوراقها مفصصة. ازهارها بنفسجية كبيرة
خيزرة عذرية	عشب ليفية معمرة. اوراقها ثلاثية او خنسية القصوص. ازهارها وردية
خدرية، وجل اللذب	عشب معمرة. اوراقها خيطية مزركية. ازهارها غبراء سنبله الجميع
خيرن اسود	عشب صغيرة معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب مركبة وثرة. ازهارها بوقية بيضاء اللون
خريق ابيض	عشب جذموريه معمرة. اوراقها سنائية زياء. ازهارها بيضاء يطوها موج اخضر
خردل اسود	عشب حولي فراء. اوراقها كبيرة زياء. ازهارها صغيرة صفراء. يزورها دقيقة
خز الصمغور	من النباتات الدنيا. جامد البشرة. يعيش في المواد العضوية حل الصمغور الرطبة
خروب هندي	شجرة داحلة. اوراقها مركبة وثرة ابيدة. ازهارها خضراء اللون. ثمارها قرنية كثيرة البذور
خزاي خيزية	عشب معمرة فراء. اوراقها لسنة خيطية خيطية. ازهارها زرقاء اللون
خشخاش ابيض	عشب حولي عشوية الساق. اوراقها جذعية مقرضة. ازهارها كبيرة. ثمارها جراء
خشخاش اصمى	عشب حولي صغيرة حشفة. اوراقها مقرضة. ازهارها كبيرة حمراء. ثمارها جراء
خلة	عشب حولي فراء. اوراقها مركبة مقرضة. ازهارها عطرية بيضاء اللون
خلود السطوح	عشب لحمية معمرة عادمة الفروع. اوراقها لحمية قرصية الانتشاب. ازهارها الى الحمرة الوردية
خولجان غزلي	عشب جذموريه معمرة. اوراقها سنائية. ازهارها بيضاء اللون
داني رومي	عشب معمرة. اوراقها الحليمية كثيرة الجيوب المدببة. ازهارها صفراء. ثمارها جراء
دقسون ابيض	عشب معمرة فراء. اوراقها مركبة وثرة. ازهارها بيضاء مفصصة بالارجواني
دند اللوك	جنية معمرة. اوراقها اصبحة مقرضة. ازهارها غبراء. يزورها شبيهة يزور الخروع
دجيتال ارجواني	عشب حولي ليفية سرحة. اوراقها يضيئة. ازهارها قمية ارجوانية
ديش مشوك	شجرة صغيرة فراء. اوراقها مركبة وثرة عطرية. ازهارها خضراء اللون
ذرة صفراء	عشب حولي متصبية. اوراقها عصبية سنائية مستطيلة
ذرة، زبن الوادي	عشب جذموريه معمرة. اوراقها سنائية. ازهارها بلجالية بيضاء
راسن طبي	عشب معمرة فراء. اوراقها قليلة كبيرة. رؤسائها الزهرية صفراء اللون
راوند غزلي	عشب جذموريه معمرة. اوراقها كبيرة مفصصة. ازهارها كثيرة خضراء اللون
ريرق	جنية معمرة. ساقها شالكة فراء. اوراقها كبيرة مفصصة. ازهارها بنفسجية او بيضاء
رجل القط الشائع	عشب معمرة جنتية الجذر. اوراقها ملوكة. ازهارها رؤسية
رصاصة اوروبية	بجلة فراء. اوراقها ملقطة مسنة. ازهارها بوقية بنفسجية
رعي الحمام الغزلي	عشب معمرة فراء. اوراقها يضيئة مقرضة الحراشي. ازهارها عطرية وردية اللون
رمان	شجرة معمرة فراء. اوراقها رحيمة. ازهارها ارجوانية. ثمارها كروية
زداع شايين	جنية معمرة فراء. اوراقها جامدة. ازهارها بيضاء. ثمارها حطية. يزورها مستطيلة
زراوند لباني	عشب عارشة معمرة. اوراقها كبيرة رحيمة. ازهارها بوقية غبراء اللون
زراوند قطني	عشب معمرة فراء. اوراقها ظلية. ازهارها قمية صفراء. ثمارها كمامير
زراوند فيرجية	شجيرة داحلة. اوراقها سنائية النصال الجامدة. ازهارها صفراء اللون عطرية
زعرور شالك	شجرة فراء شالكة. اوراقها مفصصة مسنة. ازهارها بيضاء. ثمارها كروية
زعفران غزلي	نبات دقيقي حولي. اوراقه خيطية ضمية. ازهاره عطرية
زغدة غزلية	عشب نجمية معمرة. اوراقها سنائية قرصية الانتشاب. ازهارها جرسية. ثمارها حطية
زنجبيل غزلي	عشب جذموريه عقده. اوراقها كبيرة سنائية. ازهارها صفراء برتقالية البتلات
زوقا	عشب معمرة فراء. اوراقها عطرية سنائية. ازهارها عطرية عديدة الالوان
زيزوفون	شجرة كبيرة. اوراقها متقة ظلية. ازهارها عطرية تبينة اللون
ستريكوس ابناس	جنية عارشة معمرة. اوراقها يضيئة. ازهارها بيضاء. ثمارها كروية
سذاب غزلي	عشب معمرة فراء. اوراقها مركبة مقرضة. ازهارها فستية اللون
سرخس ذكر	عشب جذموريه معمرة. اوراقها كبيرة مستطيلة. مرجعتها حرشية
سرفل بغلي	عشب حولي فراء. اوراقها مركبة شديدة التفريغ. ازهارها بيضاء يزورها صغيرة

الاجزاء الصالحة	التأثير والاستعمال
الأوراق العليا والأزهار	منفلياً قابض، مضادٌ للسمال. مرهم العنبة الغضة يحل الروم الجاحد.
لب الثمار	سهول شديد الريح. لا يستعمل إلا بأمر الطبيب
الجذومور	منفلياً مرقق ويتر البول ويفيد الروماتيزم
لساق والأوراق والأزهار	منفلياً مضاد للسمال ويفيد التلذات الصدرية والتهاب اللوزتين
الأزهار والجذومور	منفلياً مسكن للسمال والأمراض الصدرية وسرعة البول. غرغرة في التهاب اللوزتين
الطلع	مضادٌ لداء القفاصل والصرع والتفتحة. يفيد الاكتزاً الرطبة عند الأطفال
الجذومور	منفلياً سهول عنيف، مطبخت، طارد للدمود
العنبة يرتبها	منفلياً يفيد القفرس ويسكن الآلام العصبية
البزور	منفلياً حريف، ناطق، مرقق، ينه الحضم والقلب
الثبات برتمه	مسحوقه ومنفلياً مضادٌ للقيء، مثقه، يفيد الصدر
لباب البزور	تقيحها ومنفلياً ملين يناسب الأطفال
الأوراق والأزهار	منفلياً يسكن الأعصاب ويفيد اضطرابات المعدة
عصارة الساق والجراه	منفلياً يفتلر الأعصاب أو يسكنها
عصارة الساق	مسكنة، مفرقة، تقيد السعال النيكبي. مژونة
البزور	منفلياً مقو، مضاد لداء القفاصل، يفيد الحضم ويتر البول
عصير الأوراق	يفيد القروح والساير والتآليل والتهاب الثدي
الجذومور	مسحوقه منقطع شايق إذا نفع في الحليب. منفلياً يفيد المعدة والحضم ويطرد الغازات
الأوراق والأزهار	لحم الجروح وتنفي الحروق وتوقف بصر الدم وتقيد الصرع العصبي
الجذومور	منفلياً مضاد للصرع، مرقق، طارد للدمود
لساق والأوراق والبزور	القليل منها منفي ملين محمود
الأوراق	منفلياً يلقي القلب وينظم خفقانه. استعمالها خطر لأنها سامة
القحاء والأوراق	مسحوقها ومنفلياً منبه، منفض، يفيد داء القفاصل ووجع الأسنان
شوشة العنوس	منفلياً يفيد التهابات الكلى والمثانة
الأزهار	منفلياً ينشط القلب ويخفف سرعة النبض ويفيد الددة الدرقية
الجذومور	منفلياً مقو، منبه، مرقق. منفلياً يشفي الجروح والقروح
الجذومور	الجرعة الصغيرة من التليغ تقوي المعدة وتفيد الحضم. الجرعة الكبيرة مسهلة
الأوراق	منفلياً مسكن وملين
الأزهار	منفلياً مضادٌ للسمال وملين
الجذومور	مسحوقها ومنفلياً انتيبيرتيك. يفيد وجع الأسنان والجرب والقروح
الأوراق والأزهار	منفلياً يفيد الرين والصفص واحتقان الكبد. منفلياً يفيد التهاب اللوزتين
الأزهار ولحاء الجذومور	منفلياً طارد للدمود. استعمالها حذر
الأوراق والأزهار	القليل مقو الكثير سهول. تستعمل منفلياً
الجذومور	مسحوقها ومنفلياً وتقيحها مقو، منفض، مرقق. وتفيد الربو
الجذومور	مسحوقها مطحس. تقيحها ومنفلياً مقو، يفيد القروح والتعامل
لحاء الجذومور والساق	منفلياً يفيد المرارة ويتر الصفراء والبول
الأزهار والثمار وساق	منفلياً الأزهار وصيبتها مسكنة للقلب ويخفف لضغط الدم
الأزهار والبصلة	منفلياً يفيد المعدة، مطبخت ومنبه نشيط
الأزهار والجذومور	منفلياً مضاد للسمال والتشنج. يفيد الآلام العصبية
الجذومور	مسحوقها ومنفلياً عرقس، منقطع، مقو، حاضم، طارد للغازات
الأوراق والأزهار	منفلياً منمن، يفيد الصدر، يقطع السعال
الثمار والبزور	منفلياً القليل من مسحوقها منقطع ناهض. استعمالها خطر لأنها سامة
الأوراق	تقيحها ومنفلياً ناطق، خافض للحرارة. مضادٌ للتشنج، يدر الطمث
العنبة يرتبها	منفلياً يفيد آلام الظهر والطنل العصبية والصداع ويقضي على الدودة الوحيدة
الأوراق	منفلياً حاضم، ينقي الدم، يلين المعدة، يتر البول

النبات	الصفة
سرو شائع	شجرة منتصبه رشيعة. اوراقها فلسية عابقة الخضار. ثمارها اكواز كروية
سعر البر	عشبة معمرة. اوراقها اهلجسية خملية النصال. ازهارها وردية
سفابل	عشبة دوفسية معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب عصفية. ازهارها ارجوانية
سفرجل	شجرة عارشة الاخضار. اوراقها خملية النصال. ازهارها وردية. ثمارها كروية صفراء
سفندر لامع	جنية معمرة فرعاء. اوراقها رقائق جلدية النصل. ازهارها خضراء. ثمارها عتيبة
سكب الغرب	عشبة جلوسورية معمرة. اوراقها كنفية مفصصة. ازهارها وردية
سكع	عشبة عشقولة حصية معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب قلبية. ازهارها زناذية عطرية
سمفون غربي	بللة معمرة فرعاء. اوراقها ستانية خشنة. ازهارها انبوية ملونة
سيمس	جنية معمرة. اوراقها صفيرة ابيدة. ازهارها ليلكية اللون
ستا سوري	جنية معمرة. اوراقها مركبة شفعية رشيعة. ازهارها صفراء. ثمارها سنط مبطة
ستا مكسي	جنية معمرة. اوراقها مركبة شفعية رشيعة. ازهارها صفراء. ثمارها سنط مبطة
ستانبان مزنة، دور	شجرة كبيرة هرمية الشكل. اوراقها ممتعة مفصصة. غرورها غثب الحراشف الصغيرة
سوربان الخريف	عشبة دوفسية معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب ضيقة مستطيلة. ازهارها ليلكية كبيرة
سوس غربي	جنية جلوسورية معمرة. اوراقها مركبة ورية. ازهارها زرقاء. يزورها مستديرة مغلطحة
سوس ابيض	عشبة ارمولة معمرة. اوراقها مستطيلة منجلية. ازهارها كبيرة غيا الابيض والازرق والاصفر
سولع غربي، اقوة	عشبة ارمولة لحمية معمرة. اوراقها لحمية ليفية منتصبه مسنة الختار
شاهترج غربي	عشبة حولية خيملة فرعاء. اوراقها مركبة مفرصة. ازهارها عقودية وردية
شاوا، كستر	شجرة كبيرة. اوراقها مركبة. ورقانها ستانية. ازهارها صفراء اللون
شبت	عشبة حولية منتصبه. اوراقها مركبة خيطية. ازهارها بيضاء. يزورها صغيرة مخددة
شرعط منقهي	عشبة معمرة. اوراقها مركبة مشرحة النصال. ازهارها بيضاء. يزورها دقيقة خضراء
شقيق النمان الابلول	عشبة صغيرة معمرة. اوراقها مركبة خيطية. ازهارها كبيرة قرمزية. يزورها كروية
شار حلز	عشبة معمرة فرعاء. اوراقها مركبة رشيعة. ازهارها صفراء. يزورها صفيرة
شجرة بحرية	عشبة صغيرة معمرة. اوراقها لحمية مركبة. ازهارها بيضاء ثمارها بيضية مخددة
شمرخاض عارض	عشبة عارشة معمرة. اوراقها محففة اهلجسية. ازهارها ارجوانية اللون
شمنجار غربي	عشبة غشوشية معمرة. اوراقها صغيرة ضيقة مزغبة. ازهارها بيضاء. يزورها كروية صلبة
شركة مباركة	عشبة حولية فرعاء. اوراقها كبيرة مضلمة هليية الزغب. ازهارها صفراء
شكران	عشبة محولة ليفية الساق. اوراقها مركبة. ازهارها بيضاء. ثمارها كروية صغيرة
شولاء	عشبة غشوشية معمرة. اوراقها ثلاثية التخصيص. ازهارها عطرية صفراء
شيلك	عشبة وثلبة معمرة. اوراقها مركبة ثلاثية خشنة. ثمارها شمولية مأكولة
صبار معروف	نبات لحمي معمر. الساق وقروها الواح كبيرة بيضية. ازهارها كبيرة نارية اللون
صنبر شائع	عشبة معمرة فرعاء. اوراقها يفسية خملية النصال. ازهارها وردية
صفصاف ابيض	شجرة منبسطة القروع. اوراقها ستانية النصال. ازهارها شريفة صفراء
صنوبر بري، برز	شجرة كبيرة. اوراقها هدية شفعية. اكرازا مردية. يزورها دقيقة مجنحة
طوقيون غربي	عشبة معمرة ليفية. اوراقها اهلجسية مسنة. ازهارها حمراء
ظهرة بلورية	عشبة لحمية حولية. اوراقها لحمية كبيرة. ازهارها بيضاء. يزورها دقيقة سوداء
عافر قرعا	عشبة حولية فرعاء. اوراقها رشيعة ثنائية التخليق. ازهارها صفراء. يزورها مجنحة
عباد الشمس السنوي	عشبة حولية. اوراقها ممتعة قلبية خشنة. ازهارها كبيرة صفراء. يزورها وثلبة
عراوة ملكة المروج	جنية معمرة فرعاء. اوراقها مركبة ستانية ورية. ازهارها الى الخضار الباهت
عمر شائع	جنية معمرة فرعاء. اوراقها ابيدة مدنية. ثمارها عتيبة حلوة اللذاق عطرية
عمر كادي	شجيرة فرعاء. اوراقها ابيضة هدية. ثمارها نوية حمصية اللذ والشكل
عرق الدعب المخزي	جنية حولية معمرة. جلودها غليظة. اوراقها ممتعة صفيرة. ازهارها فردية
عرق انجار	عشبة مذادة معمرة. اوراقها مركبة خماسية. ازهارها كبريتية اللون
عرقون غربي	عشبة حولية فرعاء. اوراقها صغيرة منشارية الحافة. ازهارها وردية
عروق الصباغين	عشبة معمرة فرعاء. اوراقها مركبة مفرصة. ازهارها صفراء اللون

الأجزاء الصالحة	التأثير والاستعمال
الأكرارز والخشب	صحبته قابضة ، مضادة للتربّث وفيه البراسير
الأوراق والأزهار	مستحلبا يقوي القلب والمعدة . مغليا يفيد السعال الشعبي والتهلة الولادة
البزور	مسحوقها سهل عثيف ، معطس ، يدرّ اللعاب ، استعمالها خطر
ثمار	عصيرها مضادّ للاسهال
البزور والأوراق	مسحوقها وتقيها هاضم ويدرّ البول
الأوراق	مستحلبا يفيد التهاب اللوزتين غرغرة . وشق الجروح
الحصبة	صحبته تقيد طين الأذن . مهروصا يقضي على الأورام والمعامل لصفًا
الأرومة والأوراق	مهلوس الأوراق لبثًا يفيد التهاب الأعصاب وعرق النساء والدوالي . مسحوق الأرومة للتزيف للمهبل
الزهار والأوراق	مستحلبا يدرّ البول ويفيد التهابات الكلى والمجاري البولية
الأوراق	تقيها سهل شائع الاستعمال
الأوراق	تقيها سهل شائع الاستعمال
للدهاء	مغلي المسحوق أو تقيها قابض
للدفوسة والبزور	مستحضراتها تقيد دام النطفة وتقضي على القترس
الجذور	تقيها سهل خفيف . مغليا يفيد التهابات الكلى والثلاثة والحجيرة
الأرومة	مغليا منقث وفيه الملل الصدرية
الأوراق	القليل من عصيرها سهل . الكثير منه ماسط
العشبة يرستها	مغليا مقو ويقي الدم ويفيد البرقان والأمراض الجلدية
الأزهار	مغليا طارد للديد من أي نوع كان
الأوراق والبذور	تقيها يفيد الملدة والأمعاء ويمنع الارق ويدرّ البول
البذور	مغليا يفيد الأمراض الصدرية وينفع الحصى ويدرّ البول ويشتدّ الأعصاب
العشبة يرستها	عصيرها أو مسحوقها الجفاف مضاد للتهلة . مسكّن ومطعم
الجذور والبذور والأوراق	مغلي الجذور والأوراق يدرّ البول . مغلي البزور منه ، يدرّ الحليب والطمث
الأوراق وثمار	عصارة الأوراق وتقيج ثمار طارد للديد
للدهاء	مسحوقها يفيد الملل الحصى وسكّتها يفيد الملدة
البذور	مغليا يفيد علل المسالك البولية وقد يذيب الحصى ويفيد في الزنطاري
الأوراق والأزهار	مغليا مقو ، دافع للحصى ، ورضيعها دامل للحرج
الأوراق وثمار	تقيها مضادّ للتشنج ويفيد الربو والسعال الشعبي . استعمالها خطر لأنها سامة
الأوراق والأزهار والجذور	الأوراق والأزهار مطبوخة ، الجذور مضادة للتشنج والصرع والرغص الزنجبي
الأرومة والجذور	تقيها يدرّ البول وقابض ، مغليا يفيد القترس ويليّب الرمل
الألوانج	عصارته مقوية للقلب . تقطع الزحار والاسهال
الأوراق والأزهار	مغليا يسكّن تشنجات الحصى . مسحوقها ينشط الشهية ويدرّ البول
للدهاء	مغليا مضاد لالتهاب والحصى ، يقرق ، يسكّن الآلام ، يدرّ البول
البثاق	مغليا يدرّ البول ويفيد التزلات الشعبية
الأوراق والأزهار	مغليا مقو ، غرض ، هاضم ، يفيد علل الطحال
الأوراق	مغليا يفيد صر البول والسعال التشنجي . مهلوسها يفيد الحروق والجروح
الجذور	مسحوقها يدخل في عدّة تركيب طبيّة اخصها معجنات الانسان
بثلات الأزهار	مغلي البثلات مضاد للحميات والملازيا . ولعابجة توسّعات القصبة الهوائية
الجذور والأزهار	الجذور قابضة ، تدرّ البول ، تقطع التزيف . تقح الأزهار يفيد الاستسقاء والتهابات
ثمار	تقيها يقي الدم ، يدرّ البول ، يفيد الملل الكبدية والمسالك البولية والتشاف الشرياني
الأوراق	تقيها سهول وطارد للديد
الجذور	مسحوقها مقو ، منقث ، مضاد للاسهال . استعمالها خطر يوجب الحذر الكلي
الجذور	التكيد بمحملة يقضي على الأكرار ، للضمضة تقيد تزييف اللثة
العشبة يرستها	مستحلبا يفيد الرشح والتهلات الشعبية ، ويقرّي المعون ، ويفيد الرمد
العشبة يرستها	عصارته تقضي على التالول . خلاصتها المائنة تقيد المعدة والأمعاء وتهاب المرارة

النبات	الصلبة
صم سندي	جنية معمرة فرعاء. اوراقها بيضيه ازهارها ورديه. يزورها دعيت
عشب القوي الرؤيه	عشب مدادة معمرة. اوراقها مركبه ثنائيه الصف. ازهارها كبريتيه اللون
عُش جبار	شجيرة متباعدة الفروع. اوراقها ابيدة سنائيه بارزه العروق. ازهارها ورديه
عقفة مذبذبه	جنية متسلقه معمرة. اوراقها ابيدة جلديه النصال. ازهارها يضاء. ثمارها نوويه
عُله مذروج السائل	جنية معمرة فرعاء. اوراقها كالخرشاف. ثمارها عنيه
عنب الدب، حيران	جنية معمرة فرعاء. اوراقها ابيدة صغيره. ازهارها جلجله ورديه. ثمارها عنيه
عود الانبياء	شجرة متوسطه الحجم. اوراقها مركبه شفعيه. ازهارها زرقاء. يزورها صفراء اللون
عود الراج	عشب جلدموريه معمرة. اوراقها عصفيه قرصيه الانتشاب. ازهارها صفراء اللون
صريح شائع	جنية شالكة معمرة فرعاء. اوراقها مركبه وريه. ازهارها ورديه. ثمارها شاميل كرويه
عينون عطر	بجله ليفيه معمرة. اوراقها ابيدة ملحقه جامده. ازهارها عطريه زرقاء اللون
خافق خولاني	عشب معمرة شالكة الساق. اوراقها مركبه وريه. ازهارها عطريه صفراء اللون
غالين حقيقي	عشب فرعاء مضلمة الساق. اوراقها ضميمه صغيره خصليه. ازهارها الى الصفرة الزاهيه
غالين صليبي	عشب فرعاء مضلمة الساق والفروع. اوراقها صغيره ضفيعه. ازهارها صفراء اللون
خبراء الحابلين	شجرة فرعاء. اوراقها مركبه وريه. ازهارها يضاء كبريه الرائحة. ثمارها صغيره كرويه
غراسيله غزيره	عشب جلدموريه معمرة. اوراقها ضفيعه سنئيه. ازهارها بيويه ورديه
غرندليه ضلجه	جنية معمرة فرعاء. اوراقها سنائيه جامده. رؤسائها الزهرية صفراء اللون
غرغوق عطر	عشب معمرة فرعاء. اوراقها متفصصة مشتمه. ازهارها الى البياض الالهيكي المواج
غفت ابن سينا	عشب ليفيه معمرة. اوراقها مركبه سنائيه النصال. ازهارها ورديه. يزورها دقيقه
خلقة	جنية معمرة مداعة. اوراقها اهليلجيه شديدة الخضار. ازهارها يضاء. ثمارها ككابر
فاشه يضاء	جنية متسلقه معمرة. اوراقها كلفه مفرصه. ثمارها عنيه. ثمارها زيتيه اللباب
فاغه البخان	بجله معمرة فرعاء. اوراقها ضفيعه النصال. رؤسائها الزهرية يبيض اللسينات
فجل حار	عشب حويله غليظه الجلسر. اوراقها مستطيله مفرصه وسنئيه. يزورها كرويه
فراسيون ابيض	عشب معمرة فرعاء. اوراقها يضيئه عشنه سنئيه ازهارها يضاء
فراسيون ازغب	عشب عموه زباء. اوراقها عشنه مزفيه وسنئيه. ازهارها حمره مرقوشه بالابيض
فراسيون اسود	عشب معمرة فرعاء. اوراقها خصليه النصال للسنئيه. ازهارها جزويه منزعه
فراسواز، صريح ابيده	جنية اوسليه معمرة فرعاء. اوراقها مركبه مزفيه سنئيه. ثمارها شاميل مأكوله
فريون لسيس	عشب ليفيه عموه مداعة. اوراقها متصاليه سنائيه. ازهارها ورديه
فريون مخزي	جنية معمرة فرعاء. اوراقها اهليلجيه جامده النصال. ازهارها يضاء اللون
فشاغ مخزي	جنية ليفيه معمرة. اوراقها قليفه جامده النصال. ازهارها صغيره صيرانيه
فلفل كبابه	شجيرة سريعه الفروع. اوراقها اهليلجيه جامده. ازهارها مرجانيه. ثمارها كرويه
فوة	عشب جلدموريه معمرة. اوراقها ضميمه متبايلة سنائيه مزفيه. ازهارها صفراء
فولس حويصل	نبات بحري قلبي الجلسر والسوق والاوراق. لونه الى الخضار الاخفس
فول	عشب حويله جولاه الساق. اوراقها شفعيه. ازهارها يضاء مرقوشه.
فول ككابر	جنية عارشة معمرة. اوراقها مركبه ثلاثيه. ازهارها ارجوانيته. ثمارها قرون تغلف الحبوب
قات	جنية معمرة فرعاء. اوراقها ابيدة اهليلجيه بارزه الضلع سنئيه. ازهارها حمره اللون
قبليس قيه، عيط ذهبي	عشب حويله صغيره. اوراقها صغيره مفرصه. ازهارها قرويه يضاء اللون
قنوايه	جنية معمرة فرعاء فناء. اوراقها سنائيه جامده. ازهارها ورديه مرقوشه
قناء بري	عشب حويله مدادة. اوراقها مصفقه كبيره. ازهارها صفراء. ثمارها ريفيه صفراء
قراض يحمق	عشب حويله فرعاء زباء. اوراقها ناشرة العروق سنئيه كلفه الملب. ازهارها خضراء
قزة	عشب مائيه معمرة. اوراقها مركبه ثلاثيه. ازهارها برتقاليه اللون
قرطم الصباغين	عشب حويله سرحه. اوراقها سنائيه بارزه العروق. ازهارها برتقاليه اللون
قرقه سرنديب	شجرة متصبه فرعاء. اوراقها ابيدة جامده. ازهارها عطريه غرياه. ثمارها عنيه
قرنفل	شجرة فرعاء فناء. اوراقها ابيدة جامده. ازهارها عطريه صغيره حمره. ثمارها نوويه
قسوزة راحيه	جنية عارشة. اوسويه معمرة. سافها حويله. اوراقها كلفه خاسيه التخصيص. ازهارها تينيه
قطر الحرق، خشيشه الحرق	عشب معمرة فرعاء. اوراقها سنائيه سنئيه. ازهارها عطريه يضاء

الاجزاء الصالحة	النافع والاستعمال
اللحاء	مسحوقها يذيب الحصى الصفراوية
العصية يرتبها	تقيها او مغليا يفيد جميع انواع التشنجات ويوقف التزيف
الجذور واللحاء	اللحاء نفيد الاسهال والقرنطاري. الجذور لمعالجة الامراض الجلدية. قليها مقو، كثيرا مقيء
الاوراق والثمار واللحاء	الثمار مسهلة عذبة، الاوراق واللحاء نفيد السفلس والقنواء
الافئاد الزهرة	مغليا يفيد داء الفواصل
الاوراق	مغليا قابض، يدر البول، يطهر الكلي ويفيد مجاري البول ويسهل الطاق
الخشب	صيته نفيد اضطرابات الحصى والنقرس. مسحوقة يفيد السفلس
الجذور	صيته او مغليه تقوي الجهاز العصبي وتساعد المضم ويغيد التزلات الصدرية
الثمار والاوراق والجذور	عصير الثمار منض ومضاد للحصيات. مغلي الاوراق يفيد للمدة. مغلي الجذور لرمي الكل
الاوراق والازهار	مغليا يفيد الحيات المتقطعة والقيش للمستعصي. استعمالها حذر
الاوراق	مهلوسها او تقيها يفيد الامراض الجلدية وغشاة العين والتهاب الحنجرة
العصية يرتبها	مغليا قابض غثيف، مضاد للتشنجات والاسهال، مرقق
العصية يرتبها	مغليا مقو ويفيد للمدة
الثمار	عصيرها او مستحليا مقو، منض، مضاد للمضر والقرحار، يدر البول.
الجذور	مسحوقها سهل صيف، مقيء، يدر البول. استعمالها خطر يوجب شدة الحذر
الاوراق والازهار	مغليا منض، يفيد الريو وللعلل الرئوية والسعال الديكي
العصية وازهارها	يستعمل مستحب الاوراق والازهار ضد العقم. الرواق للهروسة تنفي القروح
الاوراق	مغليا يفيد الكبد والتهابات المرارة وقد يجلل الرمل
الجذور	تقيها مقيء، مرقق، موهج ويذر البول
الجذور	عصارتها سهل صيف. استعمالها شديد الخطر. يقال انها تحرق الشعر
الاوراق والازهار	مغليا مضاد للتشنج، طارد للغازات، يدر الطمث والبول
الجذر	مستحبه يدر الصفراء ويفيد احتقان الكبد والريو والسعال
الاوراق	مغليا منض، يفيد السعال، خافض للحرارة ويذر الطمث
الاوراق	مغليا يفيد الامراض العصبية والاستسقاء ويدر البول ويلبب الحامض البولي
الاوراق والازهار	مغليا يفيد للنص والسعال الديكي، مضاد للتشنج
الثمار	عصيرها يدر البول، مرطب، ملين
الاوراق والجذور	عصير الاوراق يحرط الشعر. الجذور منفة وقيئة، استعمالها خطر
عصارة الساق	استعمالها خارجي ولا يجوز الا بمعرفة الطبيب
الجذور	مغليا يفيد الرشحات والامراض الجلدية
الثمار	زيتها يفيد المالكات البرية والسيان والتهاب الحنجرة والتزلات الشمية
الجذور	مغليه يفيد الكساح، مقو، حاضم، يدر الحصى والصفراء. يفتت الحصى الفوسفاتية
النبات كما هو	مغليه يزيل السمعة وتضخم الغدة الدرقية ويفيد تصلب الشرايين
الازهار	مغليا يدر البول. يفيد الرشح والمساك البرية، يذيب الرمل
الحجوب	ستحضراتها عديدة توصف بأمر الطبيب
الاوراق	القليل من مغليا يقوي الدماغ. استعمالها خطر
الجذور	مغليا مقو
الاوراق واللحاء	خلاصتها السائلة تاخوذ مشهور. مضادة للسفلس وعفشة الفخض
الثمار	عصارتها او مغليا سهل صيف يستعمل في الاستسقاء والشلل واحتقان اللع
العصية الزهرة يرتبها	مستحليا يقي الدم ويغيد الثياب. بلجورها مثيرة للرغبة الجنسية
القروح والاوراق والازهار	عصيرها مضاد للحرق، يفيد الطل العصبي وداء الخنازير. سفت ويدر اللعاب
البزور	مغليا سهل ويفيد اللال العصبي
اللحاء	مسحوقها يبي الاغصان وينشطها، يقوي القلب، مضاد للتشنج
الازهار	صيتها ومغليا منضعة، محرقة، مضطلة، طاردة للغازات
الجذور	تقيها مقو نشيط ويفيد للمدة
الازهار	تقيها يفيد المدة، طارد للريح، مطمت

البيات	الصلبة
قام آسي	جنية معمرة فرعاء فناء. اورالها آسمة جامدة. ازهارها وردية. ثمارها عنبية مأكولة
قنب	عشبة حولية. اورالها كلبية مركبة وثرية. ازهارها ثنائية المسكن. يزورها مكورة
قنة مهجونة	عشبة معمرة. اورالها مركبة لقلبية الوريقات. ازهارها ثنائية
قتلي مبدول	شجرة كبيرة لارضة. اورالها مركبة وثرية. ازهارها عنقودية. ثمارها كستنية الشكل والقلق
قصور شائع	جنية معمرة. اورالها مركبة وثرية. ازهارها برتقالية اللون. ثمارها سنبلية
قطريون صغير	عشبة معمرة فرعاء. اورالها رحيية صغيرة. ازهارها وردية اللون
قوسه غزبية	عشبة معمرة زياء فرعاء. اورالها صغيرة خملية التصال كالفورية العرف. ازهارها عطرية بنفسجية
قيصوم، رمان الارض	جنية لينة فرعاء. اورالها بسيطة خيطية. ازهارها ذهبية اللون. ثمارها لينة كحب الآس
كانور	شجرة كبيرة دالحة. اورالها اهليلجية جامدة. ثمارها زيتونية نوية
كائن شائع	عشبة حولية صناعية. اورالها سنبلية. ازهارها زرقاء اللون. ثمارها جراء. يزورها زنبية
كرابا	عشبة حولية. اورالها ريشية مفلوقة. ازهارها صغيرة بيضاء. يزورها زنبية
كرفس	عشبة حولية ضخمة الجفت. اورالها قرصية الانتشاب مركبة. ازهارها بيضاء مغمضة بالاخضر
كرفس الماء	عشبة معمرة خليقة الجذر. اورالها مركبة وثرية. ازهارها بيضاء. ثمارها كمامير. يزورها دقيقة
كركم صباغي	عشبة صفولية معمرة. اورالها سنبلية مستطيلة. ازهارها سنبلية صفراء اللون
كوفن الزيت	جنية فرعاء. اورالها رحيية جامدة. ازهارها جميلة. ثمارها حبوب شبيهة بالبروج
كربرة الير	عشبة جلمورية معمرة. زناد اورالها ثنائي الانتشاب راعي القروع المروحية صغير الوريقات
كربرة مزروعة	عشبة حولية فرعاء. اورالها مركبة مغرمة مشرقة. ازهارها وردية. ثمارها يزور دقيقة
كستة	شجرة ضخمة دالحة. اورالها ناشرة العروق منشارية الحافة. ثمارها مأكولة اللباب
كشش أحمر	جنية فرعاء فناء. اورالها خلية مفلقة ومسننة. ازهارها موشحة بالاحمر. ثمارها مأكولة
كشش اسود	جنية فرعاء فناء. اورالها خلية مفصصة ومسننة. ازهارها حمراء. ثمارها مأكولة
كشوث السعز	نبات طفلي عظيمي مشتب. اورالها حرشية فليقة. ازهارها وردية
كاثة المروج	عشبة معمرة فرعاء. اورالها خلية مغرمة ناشرة العروق. ازهارها صفراء اللون
كشون	عشبة حولية فرعاء. اورالها مهلكة. ازهارها بيضاء. ثمارها كمامير. يزورها صغيرة
كشكليه، عسم ربيع	شجرة صلبة فرعاء. اورالها مائسة التصال عاقبة الخضار. ازهارها وردية. ثمارها يزور
كشكينا	شجرة فرعاء حمراء اللحاء. اورالها كبيرة التصال. ازهارها خشوية. ثمارها جراء يزورها دقيقة
كهنسة	شجرة مشلقة فرعاء. اورالها جامدة التصال. ازهارها وردية. ثمارها لحسية عافسة
كوشاد اصفر	جنية سرحة مستطلقة الجذور. اورالها كبيرة. ازهارها صفراء اللون
كوكا	جنية معمرة فرعاء. اورالها اهليلجية ناشرة العروق. ازهارها صفراء. ثمارها نوية حمراء
كولا، كوله	شجرة قارضة. اورالها ابيدة جامدة. ثمارها قرون مبطلة تلتف من لوزين الى عشر لوزات
كيس فرامي	عشبة حولية. اورالها لانياسية. ازهارها زرقاء اللون. ثمارها عرينيات. يزورها خردلية
لايرون ايض	عشبة معمرة فرعاء. اورالها سنبلية منشارية الحافة. ازهارها عطرية بيضاء اللون
لئين شائك	جنية معمرة شائكة. اورالها سنبلية مسننة. ازهارها وردية
لسان الحمل الساني	عشبة معمرة مقرة. اورالها قرصية جامدة التصال. ازهارها ثنائية
لسان الحمل الكبير	عشبة معمرة مقرة. اورالها قرصية ملطية جامدة التصال. ازهارها صفراء اللون
لسان الكلب المخزي	بلعة معمرة فرعاء. اورالها سنبلية خملية التصال. ازهارها حمراء اللون
لوشيا نافة، حشيشة الجرح	عشبة مستطيلة الساق. اورالها مركبة وثرية. ازهارها صفراء. يزورها صغيرة
مازريون، دفقة سامة	جنية صغيرة معمرة فرعاء. اورالها جلدية التصال. ازهارها انبوية عطرية. ثمارها عنبية
مشان، دفقة لاحقة	جنية معمرة فرعاء. اورالها حرة مستطيلة. ازهارها عطرية بيضاء. ثمارها عنبية
مران شامخ	شجرة باسقة فرعاء. اورالها وثرية. ازهارها بيضاء خضراء المواج. ثمارها جناحية
مشركة فيرجينية	جنية معمرة فرعاء. اورالها يصفية مسننة الحافة. ازهارها صفراء اللون
مضاض أسود	شجيرة فرعاء، اورالها اهليلجية مسننة الحافة. ازهارها مجنونة. يزورها صغيرة
مئل	جنية فرعاء شائكة. اورالها مركبة ثلاثية. ازهارها فردية. ثمارها جراء
مكناة غزبية، سذاب الماعز	بلعة معمرة فرعاء. اورالها مركبة وثرية. ازهارها الى الزرقعة
منتنة، فساد الكلب	عشبة حولية فرعاء. اورالها اهليلجية مغرمة. ازهارها بيضاء كريمة الرائحة

الأجزاء الصالحة	التأثير والاستعمال
الثمار	عصيرها يشفي الأمراض الجلدية الرطبة . مغليا يقطع الإسهال
البذور	مغليا يسكن تشنجات الأطفال ويفيد الربو والسعال
عصارة الساق	عَرَضَة ، مطبوخة ، منبهة ، مضادة للتشنج ، منقعة وتدرئ الطمث
قشور الثمار	مغليا مضاد لتجليب الدم ، يفيد في معالجة الدولي والبراسير واحتقان الكبد
البذور	مغليا ملين أو مسهل
العشب باستثناء الجذور	تقيها أو مسحوقها يفيد ضعف المعدة وينشط الشهية ويفيد فقر الدم
الأوراق	مسحوقها يفرى الأعصاب ويكافح الحمى عند النساء . يفيد السعال الناشف والتزيف الرحمي
الأزهار والثمار	مغليا مقو ، منبه ، مضاد للحميات ، يزيل الطلخ الحمر من الجلد
زيت الكافور	جافر ومضاد للتشنج
البذور	الليقة الساخنة تسكن آلام المعدة وتفيد التهاب الغدد النكفية وللصفوارة
البذور	مسحوقها مقو ، هاضم ، يفتح الشهية ، يدرئ الغالب ، ينشط العصارى المعدنية
الجذبت والأوراق	تثت الصدر وتحلل الورم وتذلل الحصى وتفتح الشهية
الجذر والأوراق والبذور	الجذر والأوراق مضادة للحرق وتدرئ البول . البذور مهيجة للقوة الجنسية
المساقل	تقيها ومغليا منمنش ويدرئ البول
المهروب	مسحوقها ينقطع ، مسهل شديد الرفع . تستعمل بمعرفة الطبيب
العشب برئتها	مغليا مضاد للسعال
البذور	مسحوقها ومغليا عَرَض ، هاضم ، يفيد القلب والاضطع المعوي
الأوراق	مغليا مضاد للسعال الديكي
الثمار	عصيرها يدرئ البول ويفيد من الملل المعصية والتقرس والشرور
الثمار والأوراق	عصيرها مرطب ، هاضم ، يفتح الشهية . مغلي الأوراق يفيد في التهاب المفاصل
النبات برئته	مغلي يقضي على القبض للصحى ويدرئ الصفراء
الأوراق	مغليا شارب ويوزع اغشية الكبد . يفيد الافرانزات المولية وينظم الحيض
البذور	مسحوقها ناعظ اذا مزج مع الفلفل والمسل . منبه للأمعاء ، طارد للغازات
الأوراق	تقيها بنجيب الحصى الصفراوية ويفيد في بعض الحشيات
القشور	مسحوقها مقو ، دافع للحشيات
الأوراق والثمار	عصارثها مقوية ..
الجذور	عصيرها ملين للشهية ، منمنش ، مقو ، يحفض للحشيات
الأوراق	تقيها ومغليا مقو ، مضاد للأوجاع المعصية
الثلوة	مأكولة منبهة مقوية ، منشطة ، تدرئ البول
العشب برئتها	مستحلب الأوراق والأزهار يفيد الاساك المزمن ، مفرق ، مضاد للسعال ويدرئ البول
الأزهار	مسحوقها ينظم الحيض ويمنع اضطرابه ويمنع السيلان الأبيض
النبات برئتها	تقيها يفيد الأمراض الكلوية والملل المعصية ويدرئ البول
الأوراق والأزهار	عصيرها دافع للحصى ومضاد لتجليب الدم والإسهال
العشب قبل التذير	عصيرها دافع للحصى ومضاد لتجليب الدم والإسهال
الجذور	مغليا بخدر ، مسكن ، مضاد ليصق الدم والإسهال
الأوراق والأزهار	مهروسها يطهر الجرح ويكسه ويقضي على الالتهاب
اللحاء	تقيها او مغليا ينقطع ، مفرق ، مهيج ، يدرئ البول . الاستعمال خطر بوجوب الحذر
اللحاء	منقعة كاوية
الأوراق واللحاء	للحساء دافعة للحشيات . الأوراق ملينة ، مفرقة ، مقوية ، تدرئ البول
الأوراق واللحاء	مسحوقها ومغليا قابض ، مضاد للتزيف . يفيد الملل الشرايبي والاحتقانات
اللحاء	مسحوقها مسهل ، يفرز الصفراء . يقيد الكبد والمرارة
عصارة الساق	منقعة ، مقوية ، مضادة للتشنج
الأزهار	تقيها يدرئ الحليب ويفيد السفلس . تخلاصتها او مغليا علاج للسكرى
الأوراق والأزهار	تقيها ومغليا مضاد للتشنج ويدرئ الطمث

النبات	التسمية
منثور اصفر، خيري اصفر	عشبة معمرة صغيرة. اوراقها سنائية خملية. ازهارها عطرية صفراء. يزورها مستندرة مبطة
منكة	شجيرة معمرة فرعاء. اوراقها خيلية خملية. ازهارها ليلكية. ثمارها عنبية
نادرين غنزي	عشبة معمرة. اوراقها مركبة وثريّة. وريقاتها سنائية مسننة. ازهارها وردية
نبق اسود	شجيرة فرعاء. اوراقها يضيّة ناشرة العروق، ازهارها خضراء اللون
نبق سهل	شجيرة شالكة فرعاء. اوراقها يضيّة حامدة. ثمارها خويشة بنفسجية
نجير زاحف	عشبة جلمورية معمرة. اوراقها عصفية صغيرة. ازهارها سنائية التجمع
نسرين	جنية معمرة فرعاء شالكة. اوراقها مركبة وثريّة. ازهارها غبراء. ثمارها نوية
نمّنع زراعي	عشبة معمرة ملّادة. اوراقها سنائية ناشرة العروق مسننة الخثار
نومان امرد	عشبة معمرة فرعاء. اوراقها يضيّة. ازهارها بيضاء. ثمارها يزور نشوة الملّادة
نمدان مستطير الورق	عشبة معمرة مقوّرة. اوراقها قرصية الانتشاب مسنّقة. ثمارها جراء
هال صغير، لافلة صغيرة	نبات جلموري معمر. اوراقه سنائية كبيرة. ازهاره سنائية. ثماره جراء
هذال	نبات طفيل معمر. ساقه ملّادة. اوراقه صغيرة جامدة. ثماره نوية دافقة
هطراة كتابية	عشبة جلمورية معمرة. اوراقها كفية مضغصة. زهرتها وحيدة يضاء
هلع، بلع الصحراء	جنية معمرة فرعاء شالكة. اوراقها يضيّة جامدة. ثمارها نوية زيتونة
هلتاس اصفر	عشبة جلمورية معمرة. اوراقها قرصية. ازهارها صفراء. ثمارها جراء
هندب، طرخشقون	عشبة معمرة مقوّرة. اوراقها قرصية مستطيلة مفرّشة. ازهارها صفراء اللون
هندباء برّية	عشبة حولية حترائية الجذر. اوراقها مفرّشة. ازهارها زرقاء اللون
هيشان، فجل الخيل	عشبة معمرة وتلبية الجذر. اوراقها سنائية. ازهارها صغيرة يضاء. يزورها زينة
وثير ملّاد	نبات معمر ملّاد. اوراقه عروية يضيّة جلدية النصال. ازهاره جلجلية يضاء
وژال	جنية معمرة فرعاء. اوراقها سنائية صغيرة. ازهارها عطرية صفراء
يوهنبه	شجرة كبيرة دالحة. اوراقها ابيدة يضيّة حامدة ازهارها يضاء اللون صفراء المواج

٢٨٤١٩ - نباتات مُتَحَبِّر

Phytolithe

٢٨٤٢٠ - نباتات مُعَمَّدة ، اُصْع

Plante épiphyte (F). Epiphyte plant (E).

كل نبات يعيش على نبات آخر دون أن يستمد منه غذاءه .

٢٨٤٢١ - نباتات بِعُورِيَّة

Plantes marines (F).

Sea weeds (E).

هي النباتات المائية التي تعيش في البحار .

٢٨٤٢٢ - نباتات بِمَنَاطِيَّة

Plantes d'appartement (F). Apartment plants (E).

هي النباتات الزينة التي تزرع في المراكن وتعيش في المساكن .

٢٨٤٢٣ - نباتات جُمُحَالِيَّة

Plantes vénéneuses (F). Poisonous plants (E).

هي النباتات التي تحتوي بعض العناصر الجسمية المؤذية أو المميتة وهي عديدة ، اشهرها ما جاء في الجدول التالي :

نوع النبات	الاعضاء الجعالية
ارطاة	الجلود
اروم، ترياق ابيض	الاورية والاوراق
انديشت	الجلود والثمار
انجيص، شوك الملك	الجلود
اشقيل بحري، عصعيل بحري	جميع الاعضاء
اطرب، ست الحسن	جميع الاعضاء
افلوس	الاوراق بعد اكتمال نموها
اقي	جميع الاعضاء
اكنيت، ييش	جميع الاعضاء
اكيلاجيا عقابية	جميع الاعضاء اخصها البزور
امارلس، شيك	جميع الاعضاء
ايلنطس	الاوراق
يشس، ششاد	جميع الاعضاء اخصها الورق
بنج	جميع الاعضاء
بنقج	الرواكب والبزور
بومير، مسكر الحوت	البزور
قرس	جميع الاعضاء اخصها الثمار
قتم	جميع الاعضاء
ثلثان	الثمار
ثليب	الجلود
جبقيل، حامول، سح	جميع الاعضاء
نوع النبات	الاعضاء الجعالية
أبنوس كاذب	جميع الاعضاء
أجل، عرعر سيته	الاوراق
اندوتيس، زنطيل	الجلود
أذريون الماء، قرفوس	جميع الاعضاء وتفقدها بعد التجفيف

الاجزاء الصالحة	المنافع والاستعمال
الاوراق والازهار الثمار والجذور	مغليا يسكن الآلام العصبية والصداع ، ويقوي القلب ، يدر البول . مضاد للتشنج مسحوقها طاس ، يجهض ، يقضي على الروماتيزم مسحوقها او نقيها او مغليا مضاد للتشنج والصرع العصبي ودافع للحصى ويسكن وطارد للديدان
اللحاء	مسحوقها ومغليا ملين وسهل عصيرها سهل
الثمار	مغليه مرطب ، يدر البول ، يفيد في الروماتيزم العضلي وداء النقرس والتهاب المثانة منهش نشيط يقوي مناعة الجسم . مسحوق التلات الجففة يفيد التسخحات مغليا منهش عام . يفيد للعدا . يسكن التشنجات ، يدر الصفراء
الجذور	مغليا يفيد التهاب الكلى ويدر البول
العشب برمتها	مغليا يسكن لسعال الديكي ، مفيد للأمراض الصدرية اخضها الحن
العشب برمتها	يزوره مقوية ، هاضمة . ادهان الزور والجذور منهشة للقلب والقوة الجنسية
الجذور والزور	مغليه تحفض للضغط الشرياني ، مضاد للتشنج ، يفيد الصرع واضطرابات الحصى
الثبات برمتها	مسحوقه ومغليه يفيد المسالك الشريانية والبراسير والتريف
الجذور	الناضجة ملينة . فليحة مسهلة ، طاردة للديدان
الثمار	مغليه مقو ، يفيد انحطاط الاعضاء التناسلية ، يدر البول . يفيد سيلان الرحمي والجيش والاحتلام
الاوراق والجذور	مستحلبا مقو ، ينقي الجسم ، يفيد الكبد ، يدر البول
الاوراق والجذور	عصيرها يفيد استحقاق الكبد ويقضي على البراسير وينقي الجلد من الدمل
الجذر	عصيرها منهش فعال يفيد للعدا ويدر البول . مضاد لداء الخفر
الاوراق والازهار	مغليا قابض مضاد للاسهال
الازهار	نقع ازهارها القفصة يدر البول ، يلبس الحصى الكلوية ، يفيد الزلال والوهن
اللحاء	مسحوقها منقح . ويدر الحصى . ويكافح العد

نوع النبات	الاعضاء الجحالية
جلسان	الاوراق والازهار
سربل	الاوراق والازهار
حشيشة القنطرة	جميع الاعضاء
حشيشة القمل	جميع الاعضاء
خلوب	الاوراق والازهار
محض النعم	الاوراق تؤذي الدواب
حفظل	جميع الاعضاء اخضها الثمار
سودان	جميع الاعضاء وتقدمها بعد التخليل
حمى العالم ، حيون	جميع الاعضاء
خرشق	جميع الاعضاء
خرشق	جميع الاعضاء
غردل حقل ، لسان	الاوراق بعد الازهار
غرم الحظلة	الزور
غروب	الزور والكسب
غشقاتل منوم	جميع الاعضاء اخضها الكعاب
غشاذرية	جميع الاعضاء
غششان ، قرقد	جميع الاعضاء
داترون	جميع الاعضاء
دادي ، هيطاريقون	جميع الاعضاء
دقل ، حبن	جميع الاعضاء
نوع النبات	الاعضاء الجحالية
دفة سامة ، مازرين	جميع الاعضاء
دليوث	الساق والاوراق والازهار
دند	الزور والكسب
دقة ، زوان مسكر	الحب
دمجيتال ، زهر الكشكاشين	جميع الاعضاء
ذرة صفراء	الازهار الاكرية
زاريااته	الجذور والاوراق
زخاخ	الزور
زس المنافع	الجذامير
زراونه غليالي	الاوراق والثمار
زئبق الوادي ، ذقة	جميع الاعضاء
سذاب	الاوراق والازهار
سريره ، صمام	عصارة السوق
سقمونيا	عصارة السوق
سك ، بنجود مرم ، عرقشيا	المساق
سماق جسامي	الاوراق
ستليل ، سم السمك	لباب عجانته
سوتيجان	جميع الاعضاء
سون اصفر	جميع الاعضاء
سون المنافع ، برييت	جميع الاعضاء
شاي المروج ، قسوس	الاوراق والازهار

٢٨٤٢٧ - نباتات دهنية ، نباتات زيتية
Plantes oléagineuses (F). Oleaginous plants (E).
هي النباتات الممكن استهلاك ثمارها او بولورها لاستخراج
الدهن او الزيت .

٢٨٤٢٨ - نباتات سكرية
Plantes saccharifères (F). Sacchariferous plants (E)
هي النباتات التي يستخرج منها السكر ، اشتهر ما قصب
السكر والشوندر .

٢٨٤٢٩ - نباتات صبغية
Plantes tinctoriales (F). Tinctorial plants (E).
هي النباتات التي يستخرج منها مواد صبغية .

٢٨٤٣٠ - نباتات صناعية
Plantes industrielles (F). Industrial plants (E).
هي النباتات التي زرع لاستعمالها الصناعي كالتبغ والقنب
والكتان الخ ...

٢٨٤٣١ - نباتات ضارة
Plantes nuisibles (F). Hurtful plants (E).
هي النباتات الطوعية او الدخيلة التي تكثر بين الزروع
وفي الميائل والحدائق فتستنزف غصب التربة وتسيء الى
النباتات المزروعة || النباتات الضارة كثيرة العدد تقتصر ،
في الجدول التالي ، على ذكر اهمها واشهرها :


اسم النباتات	اسم النباتات
سراخس	اغصيا ام الف ورقة
سمادي	اروم ، لوف ميقع
سعد مستدير ، صلب الفهر	اريفارون ، شيخ الربيع
سورجانا الخريف ، قاتل الكلب	اسل
شقار	اكوتيت هربي ، بيش
شقيق ، هي الدجاج	اسوخ
شر الكلب	انجبار ، انارف
شوك	تفان
شوكران	ثوم بري
طحالب	ثيل
هراوة	جنتقل ، حامول ، سح
عشبة القوي	حومل
عوسج ، عقيق	حشيشة القمل
غيطل	جليوب
فربيون ، عنجد ، يتوع	حميص
قرطب	حميص المنافع
قصوان	حيوان
قطريون	خرطاك فتوا
كرسة	خرم
كرنس نبطي	لجان
كشوث	دققة
لسان ، خردل بري	دوسة الحمار ، فرفارة
لباب	دوسر
لبن	ديجيتال ، زهر الكشاثين
لسان الحمل	ذيل الثعلب
نجيل	رازيانة ، مشيل
هدال	ريخاخ
هيسان ، فجل الخيل	زوان مسكر

نوع النبات	الاعضاء الجعالية
شقار	جميع الاعضاء وتقتدها بعد التجفيف
شقيق ، هي الدجاج	جميع الاعضاء
شوكران	جميع الاعضاء
صريمة الجدي	الازهار والثمار
مقلاب سوري	عصارة السوق
مقلوس ، ذوب	الاوراق
منقنية	عصارة السوق ولباب البزور
مائق	جميع الاعضاء اعصها البزور
مير	جميع الاعضاء
مرمر قيرجيني	الاوراق
مروق الصباغين	جميع الاعضاء
مشقة	الثمار
مصل	الاوراق والازهار
عنب الثعلب ، فتاة	جميع الاعضاء
نفق	جميع الاعضاء
فاشرا	الجذور والنبات والثمار
فاششين	الثمار
فربيون ، عنجد ، يتوع	الاوراق والازهار والثمار
قناه بري	جميع الاعضاء اعصها لباب الثمر
قرطب الزرع	البزور
قنة بلولة ، كلخ	الاوراق حتى الازهار
كرز غاري	الاوراق
كريدان ، مشان	جميع الاعضاء
كلاجة	اللحاء والتجيب
لبين المروج ، زفيلة	جميع الاعضاء
لفاح ، يروج	جميع الاعضاء
لكية عشارية الاسبدة	الاوراق تؤذي النواص
لويليه	عصارة السوق
ليتاريه ، حياص	جميع الاعضاء
مايتا صفراء	الاوراق والازهار
مدي	عصارة السوق
مضاغ	اللحاء والاوراق والثمار
ممزون	جميع الاعضاء
ملعى سامة	الاوراق بعد اكتمال نموها
لبق	الاوراق والثمار
هدال	الثمار
هورة	عصارة الساق والبزور
هيسان	الاوراق بعد ازهار النبات
هينوت تن	جميع الاعضاء


٢٨٤٢٤ - نباتات حويلية
Plantes annuelles (F). Annual plants (E).
هي النباتات العشبية التي تعيش سنة او دون السنة .

٢٨٤٢٥ - نباتات علفية
Thaliophytes
صنف نباتات نظرية الجرم خالية من الجذور والسوق
والاوراق والازهار . اطلب مشريبات .

٢٨٤٢٦ - نباتات دنيا
Végétaux inférieurs (F). Inferior plants (E).
هي النباتات السيدة الخلية .



مخطط تسلسل أنساب المملكة النابتية



٢٨٤٣٢ - نباتات طوعية

Plantes vasculaires (F). Vascular-plants (E).
Spontaneous plants (E).

هي النباتات التي تعيش وتتكاثر من تلقاء ذاتها .

٢٨٤٣٣ - نباتات عطرية ، رايحين

Plantes aromatiques (F). Aromatic plants (E).
هي التي يستخرج منها الطر .

٢٨٤٣٤ - نباتات علفية ، نباتات الكلاء

Plantes fourragères (F). Fodder plants (E).
هي التي تستعمل كعلف للحيوان .

٢٨٤٣٥ - نباتات علبة ،

Végétaux supérieurs (F). Upper plants (E).
هي النباتات العديدة الخلايا الكاملة التركيب ، فيها الجذور والسوق والاوراق والازهار .

٢٨٤٣٦ - نباتات لحمية

Plantes grasses (F). Thick-leaved plants, Succulent plants (E).
هي نباتات لحمية الاوراق المكثفة بالماء

٢٨٤٣٧ - نباتات معنولة

Plantes bisannuelles (F). Biennial plants (E).
هي التي تعيش نحو عامين .

٢٨٤٣٨ - نباتات مصلحة

Plantes améliorantes (F). Ameliorating-plants (E).
هي النباتات التي تفيد التربة وتصلحها ، اشهرها الباقية والترمس .

٢٨٤٣٩ - نباتات معزولة

Plantes scissées (F). Weeding-plants (E).
هي النباتات التي تستوجب الزق .

٢٨٤٤٠ - نباتات معمرة

Plantes vivaces, P. pérennes (F). Perennial-plants (E).
هي النباتات التي تعيش أكثر من سنتين .

٢٨٤٤١ - نباتات مفتوحة

Plantes carnivores (F). Carnivorous plants (E).
نباتات مختلفة الفصائل والاجناس يصممها قاص مشترك واحد افتراس الحشرات || الافتراس يتم بواسطة الاوراق التي تشمر كل حشرة تقترب منها ، اغصانها للذباب والبعوض والحمام || اشهر هذه النباتات المذكورة في موطنها ، هي :

Cépalote (F).

Sarracénie (F).

Grassetto (F).

Dionée (F).

Népente (F).

Drosophyllie (F).

Drosère (F).

الاجنية

البوقية

حشيشة اللبن

خائف الذباب

السوس

النقاص

التيمان

٢٨٤٤٢ - نباتات منبهة

Plantes épuisantes (F). Tiring-plants (E).
هي النباتات التي تستنزف خواص التربة .

٢٨٤٤٣ - نباتات نسيجية

Plantes textiles (F). Textile-plants (E).
هي النباتات الصناعية للنسيجية ، اشهرها القطن والكتان .

٢٨٤٤٤ - نباتات وعائية

Plantes vasculaires (F). Vascular-plants (E).
هي النباتات التي يشمل نسيجها اوعية مجري فيها التسع .

٢٨٤٤٥ - نباتة

Plante (F). Plant (E).
هي اللينة واحدة النبات .

٢٨٤٤٦ - نباتي

Végétal (F). Vegetable (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة مباشرة بالنباتات .

٢٨٤٤٧ - نباتاج

Abolément (F). Barking (E).
هو صوت الكلب . وانبح الكلب واستنبح حله على النبات .

قال الشاعر :

قوم اذا استنبح الاضياف كلهم

قالوا لاهم بولي على الناس

تفسك البولي بخلًا أو بجهل به

ويا تبول لم إلا بمقدار

٢٨٤٤٨ - نباتاج

Gulb
هو البرج ، نوع من الجبل ، اطلبه .

٢٨٤٤٩ - نباتاج *

Scaire (F). Wanticrap (E).
جنس حيوانات بحرية مفعوفة من الرضويات المذليات الابريل . انزاعه المفعوفة نحو ١٥٠ صفها بيض صفار ، هياكلها مخروطية الشكل ، حلزونية ، ناشرة التضخيد المستطيل . يكثر وجودها في بحار البلاد الحارة .

٢٨٤٥٠ - نباتاج *

Albugo, Cystopus (S). Cystope (F).
جنس فطور مجهرية من عارة النباتات وفصيلة الصانليات .

انزاعه المخطئة قليلة اشهرها النباتاج الابيض الذي يؤدي البقع والصليبات .

٢٨٤٥١ - نباتاج الدبج الأبيض *

Albugo tragopogonis, Cystopus tragopogonis (S). Rouille blanche des scoronères, Cystope blanc des scoronères (F). White rust of salify (E). Weiber rost der schwarzwurzel (D).
وصم يصيب الدبج وفيرة من نباتات فصيلة المركبات .

سببه فطر مجهرى من النباتات يركب نسيج الاوراق في طورهما التثوي فيزول عملها اللدائي والحياتي ما يسي الى نمو النبات واثاقه || ظهوره الحادري بطور بيض

لا يباسية التريبوب والحجم تملو نصل الاوراق تقشرها وتمتعا عن القيام بعملها الجسودي على الوجه الاكل .

يكتلف باستعمال احد مركبات النحاس .

٢٨٤٥٢ - نباتاج الصليبيات الأبيض *

Albugo candida, Cystopus candidus (S). Rouille blanche des crucifères, Cystope blanc des crucifères (F). White blister of crucifers (E). Weiber Rost der Kreuzblütler (D).
وصم يصيب بعض نباتات الفصيلة الصليبية اغصانها

الكرتب واللفت والملفوف والتفجل والرشاد || سببه فطر مجهرى من النباتات يركب السوق والازهار في طورهما

التثوي . ظهوره الحادري بطور بيض تملو نسيج السوق والاوراق والازهار والتفجل تقشرها وتمتعا || يكتلف كسائر الصانليات باستعمال مركبات النحاس .

٢٨٤٥٣ - نباتية *

Epimedium (S). Epimède (F).
جنس نباتات عشبية جلمورية من فصيلة البرباروسيات .



نباتاج



نباتاج الدبج الابيض



نباتاج الصليبيات الابيض



نباتية

Remugle (F). ٢٨٤٦٣ - نبتة
Mustiness, Musty smell (E).
النبتة : الرائحة الكريهة التي تكتسبها الاشياء المخزونة في
اماكن لا تصلح .

Plante (F). Plant (E). ٢٨٤٦٤ - نبتة
واحدة النباتات تطلق على المشبة والفرسة .

Nemopteridae (S). ٢٨٤٦٥ - نبتوريات
Nemopteridae (F). Nemopteridae (E).
فصيلة حشرات من رتبة شاربقات الاجنحة . اجناسها
وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض اقطار البلاد
الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة
مسطيلة الاعتناق . رؤوسها مخروسة . صينها صغيرة ،
ناشرة . قرونها الاستشعارية غليظة ، قصيرة . ملابسها
الفكية مستطيلة ، منجلية الشكل . بطونها مستعرضة
معتلة التبطيط . اجنحتها لاشاوية ، الزوج الامامي
صغير اللد ، الزوج الخلفي مستطيل ، مجلدي الشكل ،
يسطه تراوح من ٢٢ الى ٥٢ سم . تألف البراري والادغال .
يرقاتها مفترسة ، سريعة الحركة والانتهاز في التربة ||
اشهر اجناسها النبتور .

٢٨٤٦٦ - نبتوس الزنبق
حشرة تدعى هبون المساحف . اطلها .

Neptune (F). Neptune (E). ٢٨٤٦٧ - نبتون
كوكب سيار يتبع النظام الشمسي . اكتشف عام ١٨٤٦ .
قطر دائرته بمعدل ضعف قطر الارض وصحبه يبلغ ١٦
مرة حجمها اما وزنه النسبي فثلاث مرات اكثر من وزن
الارض . دورته حول الشمس تستمر نحو ١٦٤ سنة
٢٨٥٠ يوماً . سرعة انطلاقه في الفضاء نحو ١٩٥٤٨
كيلومتر بالساعة . يدور في فلكه قران : تريتون ونيريد .

Curage, Curament (F). ٢٨٤٦٨ - نبت
Cleansing, Water-pepper (E).
هو تنظيف البحارير والاقنية والانايب ...

Platyodon (S). Platycondone (F). ٢٨٤٦٩ - نبتج
جنس نباتات عشبية حولية برية ووربية من فصيلة
الجنجيات . انواعها المعروفة خمسة ، بعضها جامدة منتصبة
تعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها متعاقبة او غمية ،
نصلها يضيي الشكل ، جامدة الصلصة ، مسنن الحافة .
ازهارها فردية التجميع ، ابطية وطرفية الارتكاز ، عديدة
الالوان يكثر فيها الازرق والابيض || ازهارها يستمر
من تموز الى تشرين .

Haut perchis (F). ٢٨٤٧٠ - نبتج
هي الاجة المستطيلة النبت العالمي ج نتاج .

Clavelés, Variole ovine (F). ٢٨٤٧١ - نبتج
Sheep-pox (E).
النبتج او جدري الضأن مرض معد يصيب الغنم .

Advection (F). Advection (E). ٢٨٤٧٢ - نبتد
النبتد سمركة الريح الاقنية الانتشار .

انواعها وضروبها البرية والوربية عديدة . جذاميرها
مدادة ممدرة . سطها منتصبة حولية . اوراقها مركبة .
وريقاتها مسننة الحافة || اشهر انواعها ما يتبع .

Epimedium sinense (S). ٢٨٤٥٤ - نبتة الصين
Epimède de China (F).
نوع من النبتات التريبي . ساقها مورقة تعلو من ٣٠ الى
٤٠ سم . ازهارها عنقودي لبد التجميع . ازهارها صغيرة
القد يضاهي اللون . تنورها يستمر من نيسان الى ايار .

Epimedium alpinum (S). ٢٨٤٥٥ - نبتة جبليّة
Epimède alpin, Chapeau d'évêque (F).
نوع من النبتات التريبي . ساقها مورقة تعلو من ١٥ الى
٣٠ سم . وريقاتها يضيية الشكل تطويل من ٤ الى ٦ سم .
وتعرض من ٢ الى ٤ سم . ازهارها عنقودي التجميع ،
حامي الارتكاز . ازهارها صغيرة اللد ، صفر البتلات ،
حر الفصل . تنورها يستمر من اذار الى ايار .

٢٨٤٥٦ - نبتة ريشية الورق
Epimedium pinnatum (S). Epimède à feuilles pen-
nées (F).
نوع من النبتات التريبي . ساقها عريضة تعلو من ٢٠
الى ٦٠ سم . اوراقها جذعية الانتشاب ، ريشية الشكل ،
مستطيلة الاسنان الشاذكة . ازهارها عنقودي ، رطل التجميع .
ازهارها صغيرة اللد صفراء اللون . تنورها يستمر من
نيسان الى ايار .

٢٨٤٥٧ - نبتة كبيرة الزهر
Epimedium macranthum (S). Epimède à grandes
fleurs (F).
نوع من النبتات التريبي . ساقها مورقة تعلو من ٢٥ الى
٥٠ سم . وريقاتها دقيقة الشكل مستطيلة الزناد . نصلها
جلوي الصلصة ، ذلق الزام الاخير . ازهارها كبيرة
اللد ، عديدة الالوان التي تختلف باختلاف الضرب ، منها
الابيض والاصفر والاحمر والبنفسجي . تنورها يستمر
من نيسان الى حزيران .

٢٨٤٥٨ - نبتة ككة
Enation
عارض يصيب اوراق النبات فيحجبها ويشوه نصلها
بتريدات وثنية تعلو الاضلاع والمروق .

٢٨٤٥٩ - نبتة
Toxotes (S). Toxote, Archer (F). Archer, Dart (E).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة السمكيات .
انواعها المعروفة ثلاثة موطنها المحيط الهندي والبحر الاحمر
والخليج || يدعونها نبتة لانها تقذف الحشرات والحوام
الحائمة فوق سطح الماء بنقطة ماء من فيها يجهل الطريقة
تقذف توازنها وتسط في الماء تنبتلهم النبتة .

٢٨٤٦٠ - نبت
Végétal (F).
هو النبات ، اطلها .

٢٨٤٦١ - نبت الحراج
Sous-bois (F). Underwood (E).
كل نبات عشبي او جبلي او جبني يعيش في ظل الاشجار
الحرجية .

٢٨٤٦٢ - نبت
يقال نبت الشجر اذا غرسه ورياه . ونبت الحبوب اذا
بندها للاستنبات .

Centrifugation

٢٨٤٧٣ - نَبَد

هو الإنياز، أظلم.

Cestus (S).

٢٨٤٧٤ - نِير، شَعْرَانِكَة

Cestus (F). Botfly, Gadfly (S).
جنس حشرات من فصيلة البيريات. أنزاعه قليلة العدد جميعها غليظة الشكل، هليئة الجسم، صغيرة العظم، دقيقة الذيل القصير، مزركشة الثوب، شفاة الجناح، أناتها تلتئ المكان دون أن تحسه لأنها عادمة المرزات النخزة || افترارها تحصل من ريقاتها التي تدعى نفثا والتي تعيش في مدة الحيوان وتحت جلده. ج نبار وأفبار.

٢٨٤٧٥ - نِير الأبل، شَعْرَانِكَة البعير

Cephalomyia maculata (S). Céphalomyie du chameau (F). Botfly of the camel (E).

نوع من البير يركب الأبل والأجوايس. ذبابته تطول من ١٠ إلى ١٢ سم. ثوبها إلى الخلفي يعلو تجنح أصفر. تهرق مكبها بين الثوب من ظهورها ويأطل الأبل فينتف عن ريقات غليظة هليئة تغلقها الأبل بالنسبا من جلودها إلى حلوقها فيطونها حيث تلتس وتزقي حتى التلع الجلدية تنفث الجلده مع انتهاء طورها البري وتشتغل على الأرض وتصل إلى كزود ثم إلى حشرة قيد سيرتها الأولى.

٢٨٤٧٦ - نِير البقر

Hypoderma bovis (S).
هو لقاعة البقر، أظلم.

٢٨٤٧٧ - نِير الضأن، شَعْرَانِكَة الضأن

Cestus ovis (S). Cestus du mouton (F). Botfly of the sheep (E).

نوع من البير يؤذي الغنم ويهزها. ذبابته تطول من ١٠ إلى ١٢ سم. ثوبها إلى الكهبة الصفراء المواج. صدرها أسود النضيق، بطنها أسود التقيج. رواشها شفاة يعلوها عند قواعدها ثلاث نقط سود. تظهر من أيار إلى أيلول. أناتها تصر المكان بين الحب الذي يصف بالأنت فينتف منه وضعه أو يده بعض ساعات عن رقات دقيقة تسمى إلى داخل الأنت فتصل في مجاريه وتجاوبه وتبقى حتى اكتمال طورها البري الذي يدوم من ١٠ إلى ١١ شهرا. والبرقة عند نهاية تطورها تطول من ٢ إلى ٣ سم. وتعرض نحو ١٠ سم. ثوبها إلى البياض الأصفر يعلو حيد البسر. يتكاثم بطني جهاب الضأن بريت السلك الذي يمنع اقتراب النسر.

٢٨٤٧٨ - نِير الفرس، شَعْرَانِكَة الفرس

Cestus equi, Gastrophilus equi (S). Cestus du cheval (F). Botfly of the horse (E).

نوع من البير، ذبابته تطول من ١٣ إلى ١٤ سم. الأنت أكبر قدما من الذكر. ثوبها إلى الصفراء الاغبر تملو زركشة سمراء. رواشها شفاة. يتوسطها تبيض أحمل. تظهر في المراحل الصغرى ثم تلي مكبها على أجسام الخيل والبقا والمخير. مكبها أسطواني الشكل أبيض اللون دابق الطوف يلسق بالسر إلى أن ينثف عن رقات وشية الشكل هليئة الخيل غراء اللون، هليئة ينثف في الجلده فيجبه ما يدعو الداية إلى لحسه فتعلق البرقة بالسان الذي يتغلقها إلى الحلق ومنه تهر إلى المعدة حيث تستقر بين طياتها المخاطية إلى أن تم انسلخاتها التي تدوم نحو عشرة أشهر فتخرج مع الروث وتصل إلى كزود صلبة الغلاف يحيا من ٣٠ إلى ٤٠ يوما ثم تنشق الصلبة عن الحشرة الكاملة فظهر وتعيد سيرة حياتها المذكورة.

٢٨٤٧٩ - نِير يَاسُورِي *

Gastrophilus haemorrhoidalis (S). Cestre hémorroidal (F).

نوع من البير، ذبابته تطول نحو ١٠ سم. ثوبها إلى السمرة السوداء. صدرها إلى الكهبة يعلوها غط مشعر أسود. بطنها أبيض المقدم، أسود النضيق، بطنها المزعج. رواشها شفاة عادمة التقيج. ريقاتها حراء اللون طولها يراوح من ١٣ إلى ١٦ سم. تمر بالعدة وتقيم فيها بعض الوقت وتبقى بها المطاف إلى السر من تعلق بعض الوقت فتسبب الحكة ونزف الدم || تركيب الغواب على اختلافا وانعسا الخيل.

٢٨٤٨٠ - نِيرِيَّات، شَعْرَانِيَّات

Cestridae (S). Cestridae, Bot-flies (E).

فصيلة حشرات من ذوات الحاشيتين. اجناسها وانواعها كثيرة المدد جميعها متوسطة الجسم، هليئة الجسم، أثوابها إلى الخلفي للزركش بالاسمر والأسود. عظمها قريب الشبه من عظم النمل. اثرتها فاجية لكنها خالية من جهاز الرز والرز. ريقاتها طفيلية. بعضها يتطفل على الدواجن وانعسا الخيل.

٢٨٤٨١ - نِيرِيَّة *

Nebria (S).
Nébrie (F). Nebria (E).

جنس حشرات نافذة مقترنة من فصيلة البيرديات. أنواعها عديدة جميعها صغيرة القد، طولها يراوح من ١٠ إلى ٢٠ سم. ألوانها زاهية، انحدارها متطيلة المربع. تعيش على المحيط البحرية تحت الحجارة والانقاض والاختباب. اشهر أنواعها:

٢٨٤٨٢ - نِيرِيَّة قصيرة العنق *

Nebria brevicollis (S). Nébrie à cou court (F).

Nebria brevicollis (S).
Nébrie à cou court (F).

Nebria brevicollis (S).
Nébrie à cou court (F).

Nebria brevicollis (S).
Nébrie à cou court (F).

Nebria brevicollis (S).
Nébrie à cou court (F).

Nebria brevicollis (S).
Nébrie à cou court (F).

Nebria brevicollis (S).
Nébrie à cou court (F).

Nebria brevicollis (S).
Nébrie à cou court (F).

Nebria brevicollis (S).
Nébrie à cou court (F).

Nebria brevicollis (S).
Nébrie à cou court (F).

Nebria brevicollis (S).
Nébrie à cou court (F).

Nebria brevicollis (S).
Nébrie à cou court (F).

Nebria brevicollis (S).
Nébrie à cou court (F).

Nebria brevicollis (S).
Nébrie à cou court (F).

Nebria brevicollis (S).
Nébrie à cou court (F).

Nebria brevicollis (S).
Nébrie à cou court (F).

Nebria brevicollis (S).
Nébrie à cou court (F).

Nebria brevicollis (S).
Nébrie à cou court (F).

Nebria brevicollis (S).
Nébrie à cou court (F).

Nebria brevicollis (S).
Nébrie à cou court (F).

Nebria brevicollis (S).
Nébrie à cou court (F).

Nebria brevicollis (S).
Nébrie à cou court (F).

Nebria brevicollis (S).
Nébrie à cou court (F).



نير الأبل



نير الغنم



نير الفرس



نير ياسوري



نيرة قصيرة عنق

Faulbaum, Pulverfaulbaum, Schwarzholtz (D). Frangola, Ontano nero, Alno nero, Frangolo (I).

نوع من التين، شجرته صغيرة القند تملو من ٣ الى ٧ امتار . فروعه سرسة لونها الى الاسود الازرق المواج تملو ريشة ريداء . براعمه خرافية . اوراقه متعاقبة عابطة ، فصلها سباعي او تساعي المروق البارزة . ازهارها خاسية الاجزاء ، ابطية الاذنكاز ، لا قياسية التجميع . ثماره طيبة . خشبو خفيف الوزن يستخرج منه بعد التصفيم نوع من البارود شائع الاستعمال . ازهاره يستمر من نيسان الى تموز .

٢٨٤٩٤ - تينق الصبّاغين * ، شَرَكَة الصبّاغين Rhamnus tinctoria, R. utilis (S). Nerprun tinctorial, N. des teinturiers (F). Dyer's buckthorn (E). Immergrün (D). Ramno del tintori (I).

نوع من التينق وهو جنبة شالكة تملو نحو ثلاثة امتار . فروعهها زيتية اللون ، اثنائها جزؤية . اوراقها تطول من ١٢ الى ١٤ سم . وتعرض من ٤ الى ٥ ، فصلها الى الخصار الاصفر المواج . عرقها بارزة ملتفة قليلة العدد . ازهارها خشوية خاسية الاجزاء . ثمارها صابية اللون يستخرج منها صباغ اصفر || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

٢٨٤٩٥ - تينق المسيح Nabks (F). هو السدر ، اطلبه .

٢٨٤٩٦ - تينق جردِي Rhamnus alpina (S). Nerprun alpin (F).

نوع من التينق وهو جنبة كبيرة تملو من ١٥٠ الى ٣٥٠ سم . ساقه عريضة ، فروعه سرسة منتصبة . براعمه حرشفية الخمار . اوراقه عابطة ، فصلها مسن الحافة عروية بارزة عددها يراوح من ٩ الى ١٢ زوجاً . ازهارها خاسية الاجزاء . ثماره صغيرة القند يقال انها طيبة || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٨٤٩٧ - تينق كليفلورية Rhamnus californica (S). Nerprun de California (F). نوع من التينق ، شجرته صغيرة القند تملو من مترين الى خمسة امتار . ساقه كهباء . فروعه خلية للحاء شالكة . اوراقه ابيدة ، فصلها جابدة الصلصة ، مسن الحافة ، قسني اللون ، يارز المروق . ازهارها خلية الاجزاء الخارجية . ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

٢٨٤٩٨ - تينق لُبْنَانِي Nerprun du Liban (F). هو الزفرين اللبناني ، اطلبه .

٢٨٤٩٩ - تينق متَرَدَف Alaterno (F). هو الزفرين الجردى ، اطلبه .

٢٨٥٠٠ - تينق مَقْدُون Rhamnus pumila (S). Nerprun nain (F). نوع من التينق وهو جملة صغيرة مثقوبة تعيش بين الصخور تملو نحو ٣٠ سم . ساقها وفروعهها مثقوبة سرسة . اوراقها . تطول من ٣ الى ٦ سم . فصلها مسن الحافة يارز المروق التي يراوح عددها من ٥ الى ٧ ازواج . ازهارها خشوية خاسية الاجزاء . ازهارها يستمر من ايار الى آب .

٢٨٥٠١ - تينق مُسْهِل * ، شَرَكَة الدُوسَن Rhamnus cathartica (S). Nerprun purgatif, Bourguépine, Noirprun, Epine de cerf (F). Common buckthorn, Purging buckthorn (E). Echter Kreuzdorn, Purgidorn (D). Ramno purgativo, Prognolino, Spina servina (I). نوع من التينق وهو شجرة شالكة ، ترطب في الارتر الباصية ،

اجناسها وازواعها عديدة ، جميعها صغيرة القند او متوسطة . قرونها الاستعمارية ثمانية الفواصل . اثنائها مختلفة وكثيرة . تعيش على السواحل قرب الشطوط البحرية . لشجر اجناسها الثيرة .

٢٨٤٩٤ - نيريس * Nebris microps (S). Nebris (F).

سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من شالكتات الزعانف وفصيلة البهاريات . اعطائها بحار بعض المناطق الحارة . يكثر وجودها قرب شواطئ القويان || جسمها احليجي الشكل مستدل الحجم والتخطيط يطول نحو ٣٥ سم . ثوبها الى الشبهة الفضية يمتد في الرأس والظهر . تتميز برحابة شدتها وبصغر عينها || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٨٤٩٥ - نيريس « شجر ورقه كقروص الصنوبر اوزن من الانبوس خشبه احر تمل من غصاصر الجنباب . وهو اصفر من شجر الصنوبر واشد اجتماعاً » (اللسان) .

٢٨٤٩٦ - نيريس Pouis (F). Pulse (E). هو الصوت الذي يحدته اندفاع الدم من القلب الى الشرايين .

٢٨٤٩٧ - نيريس Extrapoler (F). استخلص من سلسلة معلومات او وقائع مفروضة معلومات او وقائع جديدة تسمح باطالة السلسلة .

٢٨٤٩٨ - نيريس نيرس : استخرج مامها .

٢٨٤٩٩ - نيرس النير : شجر تفضل منه القسي وين اغصانه السهام ينبت في قلة الجبل والنايات منه في السفح الشريان وفي الخضيف الوسط . قال مرة : النير شجر اصفر المود رزيته ثقله الى اليد واذا تقادم اجر . الواحدة نيرة . وفي الحديث ذكر النير ، قيل : « كان شجراً يطول ويصلو فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اطالع الله من عند فلم يطل به » (اللسان) .

٢٨٤٩٠ - نيرس ، قَطْع Polliniser (F). To polliniste (E). نير وطلع وأير : نقل غبار الطلع من متك زهرة الى مياسمها او مياسم غيرها من الازهار .

٢٨٤٩١ - نيريات Albúgés, Cystopées (F). عمارة تطور مجهرية من فصيلة الصانائيات ، تتميز بمشج خليوي يبي جهاز براشف حوصلية . تكاثرها خيطي ، خارجي ، مستقيم الانشعاب ، سبجي الرصف البيضي . اثنائها قليلة العدد يجمعها جنس واحد يدعى النيراب .

٢٨٤٩٢ - تينق Rhamnus (S). Nerprun (F). جنس اشجار وجنبات سرجة من فصيلة النيريات . اثنائها نحو ٦٠ مظها شالكة الاغصان والاقنان . اوراقها متعاقبة ، منتقة ، بسيطة . ازهارها خشوية او ثنائية المسكن . ثمارها كروية خشوية صغيرة القند || اشهر انواعها ما يتبع .

٢٨٤٩٣ - تينق اَسود * ، جَلْهَم ، عَوَسَج اَسود Rhamnus frangula (S). Bourdaine, Bourguène, Aune noir, Bois à poudre, Bois de zhen (F). Alder buckthorn, Black alder, Glossy buckthorn (E). Gemeiner



نيريس



تينق اسود



تينق الصبّاغين



تينق مسهل

٢٨٥١١ - تيسيب

صوت التيس في زمن السغد . يقال بـ " التيس .

٢٨٥١٢ - ثيبنة

Plantula (F). Small plant (E).

هي القنب الصغيرة لا تزال في طور النشوء البدائي .

٢٨٥١٣ - تيسنة

Curure (F).

Dirt, Muck, Sewage (E).

هي الاشباش والاسوال والجل والاصواع التي تستخرج من البئر والحوض واقتاة عند تنظيفها .

٢٨٥١٤ - تيسنة

Monodonta (S).

Monodonta, Labio (F). Monodonta (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الارجل وفصيلة المدييات . انزعاما المرفوعة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اصداها شبه قنبية الشكل ، صغيرة القد ، بجلة الالوان الزاهية المرقوشة او المنقطة بالاسود والابيض . فوطها نصف دائرية الانفراج ، حمزة الحمار الداخلي ، مجزة بنتو صغير شبه بالنس او بالنتب || اجسامها محزنة . رؤوسها صغيرة ثنائية القوامس الغرومية المهيمنة . ارجلها مهددة الحمار . اسفلها قرنية المادة .

٢٨٥١٥ - تيسنة

Dothidella (S).

جنس فطور مجهرية من البيايات وفصيلة الشطيات . اصنامها ميمية لا قياسية ، تكاثرت مرتكزة على حافة الرزمة الجلية الجبل ، بوطها بيضي الشكل ثقات || اعرف انواعه الثلاثة التالية .

٢٨٥١٦ - تيسنة الكشش

Dothidella ribesia, Plowrightia ribesia (S).

فطر مجهري يركب سوك الكشش قسطها ويسبب بيلها . مظهره الخارجي فضي مستطيلة حنطة اللون تطلو حلاء الفروع قسب تنقيدها وتشقيدها ثم بيلها . || يكافح بقسط وحرق الفروع المبرودة وينفخ الانجار بسائل بوردو المحلول ١٪ .

٢٨٥١٧ - تيسنة المطاط

Dothidella ulei, Scolectotrichum hevese, Fusicidium macrosporum, Passalora hevese (S).

فطر مجهري يصيب المطاط ليفي اناجه بد ان يؤذي جميع اصنافه المطاطية || مظهره الخارجي يقع زينة يتندو صغيرة ثم تكبر وتسبب بياس التسنج المطرب فيود النصل كالنربال . وقد يركب الانزاع والثار فيؤذيها ويكتنف الاضغان فيلطنها يقع قرنية سود || اخرها تعود الى نسبة عطب الاوراق والاضغان لانها تثر في اناج المطاط . يكثر في الاراضي الرطبة الواقعة في الاقاليم الحارة . يكافح بتعفيض الآفة وباستعمال احد الفطريات العفالة .

٢٨٥١٨ - تيسنة النفل

Dothidella trifolii, Sphaeria trifolii, Polytetrinidium trifolii (S).

فطر مجهري يصيب اوراق النفل ، حل اختلات انواعه ، قسطها ويسبب بيلها || مظهره الخارجي نكت سود مستديرة الشكل قطرها نحو ١ م . تركب النفل على مسحة السفلى . تظهر وتكاثرت في الربيع قبل حلول الصيف . اضراؤه تمتد الى نسبة عطب الاوراق .

تتلو من تروين الى سجة اثار . فروصها وانفاتها شاذكة الاطراف . اوراقها وانفاتها متقابلة . نصال اوراقها يضيضة الشكل مقنطية تطلو من ٥ الى ٩ سم . وتعرض من ٢ الى ٦ ، مرقها بارزة ملتفة . انزعاما خشوية ، خاصة الاجزاء ثامها طيبة تستعمل في عدة علاجات بطرية وفي سوداء اللث ، بتفسجيه اللباب الحوضي || انزعارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٨٥١٩ - تيسنة

Rhamnaceae (S).

Rhamnaceae (F). Rhamnaceae (E).

فصيلة نباتية من فوات الفلتين كثيرة . اتصالات اجناسها وانواعها زهاء ٤٥٠ اعطائها جبال وهضاب البلاد المعتدلة الحرارة والحارة . اشهر اجناسها اللنب والناب . نباتاتها مجبرات وسنيات . اوراقها لا قياسية التشكيل ، منسبة البسطة والمركبة . انزعاما ابطية خشوية او ثنائية السكن . ثامها لحية منها المأكولة وبعضها طبي وصناعي .

٢٨٥٢٠ - تيسنة

Souche (F). Stump (E).

التسكة هي الجرثومة كقوك لبكة الشجرة اي جرثومتها . ج نباك ريلوك .

٢٨٥٢١ - تيسنة

Nebalia (S).

Nébalie (F). Nebalia (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات العليا ريقبات الصدف . انواعها قليلة العدد تعيش في المواقع التي تكثر فيها الرسول البحرية والاسمال || اجسامها صغيرة قريبة الشبه بالقرديس . ميونها منزلة . قوامها الصدرية متساوية القد ، ثنائية الحادف .

٢٨٥٢٢ - تيسنة

Sagitta (S).

Flèche (F). Sagitta (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الارجل وفصيلة الرخويات . انواعها المرفوعة قليلة العدد . جميعها مية . اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . اسرارها متوسطة العدد . تظهر على سطح الماء بعد غروب الشمس || اجسامها عريانة مستطيلة شبه وشمية الشكل ، حلابة المادة ، شفافة . افواها غططية مهددة الحافة . زعانفها مستطيلة الشكل ، الذيلية منها ملطوقة .

٢٨٥٢٣ - تيسنة

Népanthe (F).

نبات يعرف بالوس ، اطلبه .

٢٨٥٢٤ - ثيبوت

Flora (F). Flora (E).

جاء النباتات في فطر او بلاد . يقال ثيبوت لبنان وثيبوت الشرق الادنى ، التبع . . .

٢٨٥٢٥ - ثيبوت مائية

Flora aquatique (F).

Aquatic flora (E).

النباتات التي تعيش في الماء او في الخلف .

٢٨٥٢٦ - ثيبوت

Végétatif (F). Vegetative (E).

نعت تربوي يدل على المقدور الانباتي .

٢٨٥٢٧ - ثيبوت

Forjet, Forjetura (F).

Projection (E).

النور تنو غير عمودي يحصل في البناء . او تنو غير مستقيم يحصل في التشطيط .



نيلة



نيسخة



نيسخة الكشش



نيسخة النفل

Portée (F). Bearing (E).

٢٨٥٢٩ - نَبَاج

التاج مجموع ما تقسمه اثني الحيوان البون من جراء في ولادة واحدة . راجع مجل .

Produit (F). Produce (E).

٢٨٥٣٠ - نَبَاج

اسم يشمل وضع جميع البهائم .

Exsudat (F).

٢٨٥٣١ - نَبَاج ، نَبَاج ، نَبَاج

Exudat (E).

Vis-à-vis (F). Opposite (E).

٢٨٥٣٢ - نَبَاق ، حَيْكَل

بني داره تتأق داري أي قبالها .

Apogamie (F).

٢٨٥٣٣ - نَبَاكَة ، نَبَل

Apogamy (E).

مجموعة الوسائل التي يمكن بعض النباتات الدنيا من الكاثر في حالة نقدها الشقية .

Transpiration (F).

٢٨٥٣٤ - نَبَح

Transpiring (E).

رشح الإفرازات المائية الزائدة عن حاجة النسيج الحيواني والنباتية في بعض الظروف الخاصة .

Nitrification

٢٨٥٣٥ - نَبَرَجَة

تفاعل جرثومي كيميائي يحول الآزوت العضوي إلى أمونيا في فنيترية لينتراني ولا يتم إلا عن طريق الجراثيم التي تثير الحالة . لذلك فجراثيم النتجة على ثلاثة أنواع لثلاث حالات .

Nettastoma (S).

٢٨٥٣٦ - نَبَسْتُمْ

Nettastome (F). Nettastoma (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الشبقيات متوسحات المنامة . انواعها المعروفة قليلة العدد . اعطائها بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة اجسام الانقليس . رؤوسها واعناها اسطوانية . محيطها مستطيلة ، مقطوعة الاطراف الفصليكية الشكل . اشداها كبيرة . زعانفها الظهرية والشرجية تتقابل وتتصل عند طرف الذنب || اعرف انواعها واشهرها تتقسم المتوسط .

٢٨٥٣٧ - نَبَسْتُمْ أُرْبَد رَصَاصِي * ، نَبَسْتُمْ

Nettastoma melanura (S).

Nettastoma gris plomb, N. de la Méditerranée (F).

Nettastoma melanura (E).

سمكة بحرية بيضاء من النبتون . اعطائها البحر الأبيض المتوسط . تعتبر من اسماك المهاجر والنفاد . سرعتها المادي في الطبقة التي يراوح عمقها من ١٠ الى ٣٠ متر || جسمها شبه انقليسي الشكل ، اسطوانية العنق والراس والحلم ، يطول نحو ٨٠ سم . سمها حاد الحراشف تتشابه مادة مخاطية لزجة || قوتها في الرعدة الرضائية الفضية المراج || زعنفتها الظهرية تلتقي بالشرجية عند طرف الذنب || لحمها متوسط الصنف ، اجود من لحم الانقليس .

Radicle (F). Radicle (E).

٢٨٥٣٨ - نَبَش ، نَبَشِي

جذر البزرة الجنيني .

Perspiration (F). Perspiration (E).

٢٨٥٣٩ - نَبَح

التصع صفور النتح من المسام الجلدية على شكل بخار لا يشاهد بالعين المجردة ولا ينفذ منه الجله كما في العرق .

٢٨٥١٩ - نَبِيدِيَّات ، نَبِيدِيَّات

Nabidae (S). Nabidae (F). Nabidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في جميع اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، معتدلة البنية ، ملونة . رؤوسها صغيرة مدققة . اعناها رباعية الاجزاء . عينها جانبية الارتكاز . قرونها الاستشرابية مستطيلة ، رباعية الفصل . كواسلها يرمية الشوزن ، ترتكز على قواعد شبه مستديرة . حناها صغيرة محروسة . حناجيبها متباينة الحجم ، يكثر فيها الصغر والقصير . رواشتها لاحفة . قوائمها نشيطة || جمع انواعها خاضعة لدميش على اوراق النباتات البرية .

Vin (F). Wine (E).

٢٨٥٢٠ - نَبِيد ، خَمْر

شراب كحولي يحصل من اختار عصير الثمار اغصها العنب .

٢٨٥٢١ - نَبِيد الإجماص ، نَبِيد الكُمُثَرِي

Poiré (F). Perry (E).

شراب يستخلص من عصير الاجاص .

٢٨٥٢٢ - نَبِيد العسل

شراب يستحصل عليه من تخمير العسل مع عصير العنب .

Fromage (F). Cheese (E).

٢٨٥٢٣ - نَبِير

هو اللبن ، تقبل اكلت التنير .

٢٨٥٢٤ - نَبِير الخننج

Nabis ericetorum (S). Nabis des bruyères (F).

حشرة خاضعة من فصيلة النبدييات . جسمها صغير القد ، يطول نحو ٨ م . رأسها صغير الحجم ، بني اللون ، أحمر المراج . خطها مستطيل الطول ، طليق . عيناها صغيرتان ، بارزتان . زباناها مدققتان مستطيلتان . كوسلها بني مزرکش بالاسود . حنجفتها صغيرة سوداء . ظهرانها لاحف ، وردي اللون . بطنها اسمر المذهب . قوائمها مستطيلة || تألف المراج . قوتها اوراق الخننج والقلمب ...

٢٨٥٢٥ - نَبِير لَقَرِي

Nabis ferus (S).

Nabis sauvage (F).

حشرة خاضعة من فصيلة النبدييات . جسمها صغير القد ، يطول نحو ٩ م . رأسها صغير ، حنطي اللون ، اسمر المراج . خطها طليق ، معتدل الطول . عيناها صغيرتان . زباناها مستطيلتان . كوسلها الى الحنطي الاسمر . حنجفتها صغيرة سوداء . ظهرانها لاحف ، حنطي اللون ، وردي المراج ، اسود المرقق والاعاصيب . بطنها اسمر . كثيف الخمل والرشق . قوائمها مستطيلة ، حنطية || تألف البراري والمراج . قوتها اوراق الاعشاب على اختلاف فصائلها .

٢٨٥٢٦ - نَبِيدَة

النبيقة زيمة الكرم اذا هطلت . ج نبات .

٢٨٥٢٧ - نَبِيدَة ، نَبِيدَة

هي الورقة التي احترتها النباكة .

Ombo, Protuberance (F). نُتُو

Umbo, Protuberance (E).



نبتون المتوسط

٢٨٥٥٣ - نَشْرَة

النشرة منزل من منازل القمر الشامية ، يقال لها أيضاً أنف الأسد . وهما كوكبان بينهما رقعة قدر شبر يملؤها تلطيخ أبيض كأنه قطع صحاب || يقبب النشرة يدعى سعد النابيع .



نوم شب

٢٨٥٥٤ - نَقَطُ Levée (F). Gathering (E).
هو أول ظهور النباتات بعدما يصدح القربى ويقل أن يجلبها .

٢٨٥٥٥ - نَكُور Prolifique, Multipare (F).
Multiparous (E).
صفة الحيوان الكثير التاج || أنثى الحيوان تلد عدة أولاد معاً .

٢٨٥٥٦ - نَكِير Ebrouement (F). Snorting (E).
النكير هو عطاس الدواب . تقول ثكرت الدابة : عطست .

٢٨٥٥٧ - نَيْسِط Embryon (F). Embryo (E).
هو الملقحة النباتية .

٢٨٥٥٨ - نَجَا Naja (F).
في السهل ، جنس حيات خبيثة من اميات الاغنادي .



نجار

٢٨٥٥٩ - نَجَاب Corticole (F). Bark miner (E).
النجابه هي الحشرة التي تقضي الدودة البرقية من حياتها داخل لحاء الاجمار .

٢٨٥٦٠ - نَجَار Lactarius lactarius (S).
Lactaire, Lactaire pêche-lait (F).
سكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الاسقمريات . موطنها البحر الاحمر والمحيط الهندي . جسمها يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم . رأسها مقنوم ، زعنفتها الشرجية فارقة . ثوبها ال اخضر القضي المايح . لحنها لليد الطعم جيد الصفت .

٢٨٥٦١ - نَجَالَة * Pelamis (S).
Pelamis (F). Pelamis (E).

جنس حيات خبيثة سامة من اميات الاغنادي وفصيلة الهيدروبيات . انواعها الممرقة قليلة العدد اعطتها بحار مناطق المحيط الهادي || اجسامها مستطيلة شبه مزاوية الشكل . رؤوسها صلبة مخروطية الشوز . اذنانها مبطله مجدافية . اثنائها ثنائية اللون ، النصف العلوي عاكج الخضر الالاس او الازرق الاسود والنصف السفلي ال الريدة . اذنانها مرقوشة .



نَجَالَة

٢٨٥٦٢ - نَجَال Dactyloctenium (S).
Dactyloctenion (F).

جنس نباتات عشبية ، برية ، ممددة ، معمرة من فصيلة النجيليات . انواعها الممرقة سامة . متنبها بعض اقاليه البلاد الحارة من الشرق الادل واfrريقية الشرقية || جميع انواعها شظية . عصفا شيق مستطيل ، يكثر فيه التسنين الغنيق الحاد . انزعرا طري من مكمل ، ليد الزغب .

٢٨٥٦٣ - نَجَالَة * Agrostologie (F).
Agrostology (E).
درس يبحث في نباتات الفصيلة النجيلية .

٢٨٥٤٠ - نَتَل

النَتَل والنَتَلُ بيض النمام الفارغ .

٢٨٥٤١ - نَقْلَة Bourse (F). Purse (E).
هي الابنة العذرية استكملت جرمها المعيز .

٢٨٥٤٢ - نَتُوج Pleine (F). Full part (E).
التروج : الحامل من الدواب وجميع الحافر .

٢٨٥٤٣ - نَتُوم Neotoma (S).
Néotome (F). Neotoma (E).

جنس حيوانات لينة قاضية من فصيلة الفأريات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطاهنا بعض المناطق الامريكية . تألت الموامق القريبة من الماء . قوتها المواد النباتية والصفادح وبعض الثفريات اعصها السرمان || اجسامها رمية مستطيلة القد تطول من ٣٠ الى ٣٥ سم . بما فيها الذنب . وهي شبيهة بالجرذون وبالقناد في آن واحد . اثنائها تختلف مع الانواع || تحلل اجسامها في الحوم وفي مؤلفه من اثنافق مستطيلة وحجر وسطي فسيحة وتتمرس الانفاق من البيض واليسار عدة دهاليز تحوز فيها مؤلفه الشتاء || الاثاف تضع من ٤ الى ٨ ادراس ترصعها نحو اربعة اسابيع || اعرف انواعه واشهرها :

٢٨٥٤٤ - نَتُوم أَشْهَب * Neotoma cinerea (S).
Néotome gris (F).

طوله نحو ٣٠ سم . ثوبه الى الشبهة يسمر بعض النش . في الرأس والظهر ويلبر في البطن . وبره معتدل الطول . ذنبه جيشيل يشبه ذنب السنجاب الا انه أقصر منه .

٢٨٥٤٥ - نَتُوم لُورِيدَا * Neotoma floridana (S).
Néotome de la Floride (F).

طوله نحو ٣٥ سم . ثوبه الى الريدة السمره . بطنه الى الريدة البراء ، وبره نام قصير . ذنبه حشفي انتشار عامد الوبر .

٢٨٥٤٦ - نَتِيجَة Conclusion

٢٨٥٤٧ - نِجَاث Onguent (F). Unguent (E).
المزم ينث به الجرح .

٢٨٥٤٨ - نِقَار ، نَشْر Fécondité (F). Fécondity (E).
كثرة التاج في البائم .

٢٨٥٤٩ - نَقَالَة Déblai (F). Clearing, Cutting (E).
تراب الركبة يستخرج منها وكل تراب يستخرج من حفرة او ردم .

٢٨٥٥٠ - نَقْد Pointer (F). To point (E).
نقد : نبت ، يقال نقد الفطر ونقدت الكماء : خرجت من الارض .

٢٨٥٥١ - نَشْر Epandre (F).
نثر الشيء : ذره بالشاري . To scatter, To strew (E).

٢٨٥٥٢ - نَشْر الأسمِدَة Epandage des engrais (F).
Scattering of fertilizer (E).
هو ذر الاسمدة على التربة وقد تم ايا باليد او بواسطة آلات خاصة تقوم بهذا العمل .

Etoile poire (F). **نَجْمَةُ الْقُطْب** ٢٨٥٨٠
Pole-Star (E).
نجمة القطب أو القطب نجم نير بين الجدي والفردين
تنب عليه القبلة .

Ostracnidae (S). **نَجْمِيَّات** ٢٨٥٨١
Ostracnidae (F). Ostracnidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من رتبة ملحومات الفكوك اجناسها
وانواعها عديدة ، اشهرها ابو صندوق .

Aster (F). **نَجْمِيَّة** ٢٨٥٨٢
هي الأسطر ، اطليه .

Nutrition (F). **نَجْوَع** ٢٨٥٨٣
راجع مادة اشتداء .

Stelleridae (S). **نَجْوِيَّات** ٢٨٥٨٤
Stelleridae (F). Stelleridae (E).
شعبة حيوانات من صف الفوكيات يشمل نجوم البحر .

Agropyrum junceum (S). Agropyrum, Froment des
Jones (F). Sea wheat grass (E). Binsenquecke, Binsen-
weizen (D). Agropiro (I).
نبات عشبي بري مرعوي من الفتيات وفصيلة النجيليات.
يكثر بين الزروع وفي الاراضي المداة وصل جوانات
الطرافات الريفية .

Agropyrum repens, Triticum repens (S). Agram,
Chlendent rampant (F). Couch grass, Quitch grass,
Twitch grass (E). Echte quecke, Grasquecken (D).
Gramigna, Caprinella (I).
لبات عشبي بري معمر من فصيلة النجيليات . ساقه عقدية
مدادة نسيطة كثيرة الانقسام والأذى لانها تنهب التربة
وتعيق الاعمال الزراعية وتسيء الى النباتات المزروعة ان لم
يقض عليها .

Agrostis (S). Agrostide (F). **نَجْمِيَّة** ٢٨٥٨٧
سقية من خشب ليس فيها قصب ولا غيره .

Agrostis (S). Agrostide (F). **نَجْمِيَّة** ٢٨٥٨٨
جنس نباتات عشبية مرجية معمرة من فصيلة النجيليات .
بعضها يزرع في المروج ، اكثراها ينبت عفواً ويسوء
الى الزروع وسائر النباتات || اشهر انواعه ما يلي .

Agrostis alba (S). Agrostide blanche, Florin, Tralno,
Pavine (F). White bent grass, Florin grass (E).
Weisses Straussgras, Floringras (D). Agrostide
blanca, Pennacchini (I).
نوع من النجيل وهو نبات مرعوي بري معمر يعلو من
٢٠ الى ٥٠ سم. حصفه نسيق النصل جيل الخضار .
سنيلاه صغرة اللد ، متبادعة النسيج ، بيضاء اللون .

Agrostis rubra (S). Agrostide d'Amérique, Foin
rouge (F). Herd grass, Red top grass (E). Herden-
gras (D). Fieno rosso (I).
نوع من النجيل المرعي المرعوي المعمر يعلو من ١٠ الى
٦٠ سم. حصفه مستطيل النصل الجامد . انماذ غليظة
جوية اللون . سنباله مستطيلة ، سنيلاه متفرقة .

Agrostis (S). Agrostide (F). **نَجْمِيَّة** ٢٨٥٨٩
نوع من النجيل المرعي المرعوي المعمر يعلو من ١٠ الى
٦٠ سم. حصفه مستطيل النصل الجامد . انماذ غليظة
جوية اللون . سنباله مستطيلة ، سنيلاه متفرقة .

Liber ٢٨٥٦٤ - **نَجَب**
الطبقة السفلى من اللحاء تكون بين القشرة والخشب في
سوق وجذور النباتات الوعائية .

Péricarde (F). **نَجَب** ٢٨٥٦٥
هو قرصة النمل اي صحن قريحه المد لحسن للمازن .

Péricarde (F). **نَجَب** ٢٨٥٦٦
هو الشف ، غلاف القلب .

Coteau, Plateau (F). Slope (E). **نَجَب** ٢٨٥٦٧
النجد ما اشرف من الارض وارتفع . ج. أنجد وأنجاد ونجاد
ونجد . والنجد المكان لا يجر فيه .

Coleus (S). Coleus (F). French nattle (E). Buntlippe,
Buntblättrigenessal (D). Coleus (I).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الشفويات . انواعه
المعروفة نحو ١٢ معظمها بري طبي وبعضها زينة .
سوقها لرماد ، تلو من ٢٠ الى ١٠٠ سم. اورانها متعاقبة
معققة كاملة ، تضامها قلبية الشكل ، خلية البشرة ،
مسلة الحافة . ازهارها صغرة اللد ، غمية التجميع ، عديدة
الالوان ، يكثر فيها الازرق .

Dolsage (F). Planing (E). **نَجَر** ٢٨٥٦٩
نحت الخشب وضعه وتركبه .

Simula (F). Simulium (E). **نَجْرَس** ٢٨٥٧٠
النجرس والنجرس والقنرس : بومض صغير اجزم الأنف
يشبه السكيت ، لسه ملزم .

Transhumance (F). **نَجْمَة** ٢٨٥٧١
طلب الكلأ في موضعه ، راجع انتجاع .

Pastoral ٢٨٥٧٢ - **نَجْمِيَّة**
٢٨٥٧٣ - **نَجَب**

Déboisement (F). **نَجَب** ٢٨٥٧٣
Deforestation (E).
النجب هو قطع الاشجار من اصوفا وابادتها .

Simula (F). Simulium (E). **نَجْرَس** ٢٨٥٧٤
النجرس والنجرس والقنرس : بومض صغير اجزم الأنف
يشبه السكيت ، لسه ملزم .

Bloquer (F). **نَجَل** ٢٨٥٧٥
نجل التربة : شقها لزرامة .

Etoile (F). Star (E). **نَجْم** ٢٨٥٧٦
بوسه عام كل كوكب سماوي ثابت او سيار يدعى نجماً ،
ما عدا الشمس والقمر . وبوسه خاص كل كوكب
نير يتلأ في السماء ويبدو ثابتاً في مركزه الفضائي .

Acaule (F). **نَجْم** ٢٨٥٧٧
Acaulous, Stemless (E).
اسم تعريبي وصفي يطلق على كل نبات لا ساق له .

Ostracion cornu (F). **نَجْم** ٢٨٥٧٨
سكة بحرية مشهورة باسم ابوصندوق اعظم ، اطليها .

Alécris (F). **نَجْم** ٢٨٥٧٩
هو حشيشة الآخ ، اطليها



نَجَب



نَجْم



نَجْم



نَجْم زاحف



نَجْم ابيض



نَجْم احمر

- Apis fasciata* (S). نحلة مصرية
Abellie égyptienne (F).
Apis Indica, A. dorsata (S). نحلة هندية
Abellie indienne (F).
Apis cocopria (S). / نحلة يونانية
Abellie grecque (F).

٢٨٦١٠ - نحلة
 النحلة كوكبية نجوم مشوها الجنوب مركزها تحت قديم
 قنطوس بين كوكبة الحرياء وكوكبة الصليب . عدد
 نجومها ١٣ منها نجم واحد من المراتبة الرابعة .

- ٢٨٦١١ - تحلييات**
Apidae (S).
Apidés (F). *Apidae* (E).
 فصيلة النحل من رتبة غشائيات الاجنحة .

٢٨٦١٢ - نُحُور
 هو الانتعاد اللاتقاسي من الشكل الجسموي المعروف .
 اسبابه كثيرة تعود الى عوامل شتى اخصها الاورام وعلالية
 الادوية ومدى تأثيرها في النسيج المنسي .

- ٢٨٦١٣ - نُحُوص**
Anesse pleine (F).
 النحوص هي الاثان الوشعية الحامل . ج تحص ونحاص .

- ٢٨٦١٤ - نُحُي ، شَكُوء ، سَقَاء**
Baratte (F).
Churn (E).
 وعاء تخمض فيه الكتانة لاستخراج الزبدة .

٢٨٦١٥ - نُحِيشَة *
Cedre (aple) (F). *Section* (E).
 لوح من الشمع المصنوع يحمته اطار من خشب يوضع
 في القفير فيشيد النحل عليه نُحِيشَة ويمر اقراصه .
 ج تحت .

- ٢٨٦١٦ - نُحِيشَة**
Substratum
 ركيزة الصفات المميزة في الشيء .

- ٢٨٦١٧ - نُحِيش**
Amorphe (F).
Amorphous (E).
 غير محدد الشكل .

- ٢٨٦١٨ - نُحِيشَة**
Abre petit (F).
 هي الابرص الطر ، اطليه .

- ٢٨٦١٩ - نُحِيشَة**
Sélectivité (F). *Selectivity* (E).
 انتقائية .

- ٢٨٦٢٠ - نُحِش ، جُنْشَل**
Maquignon (F).
Horse-dealer, Horse-coper (E).
 هو تاجر الخيل . وتجارة الخيل تدعى نُحِشَة وجُنْشَة .

٢٨٦٢١ - نُحِشِيش
Oufes (des poissons) (F). *Gills (of fish)* (E).
 هي في الاسماك الخروق الفرجية التركيب القائمة عند مؤخر
 جانبي الرأس . وظيفتها صرف الماء الذي ترشفه الاسماك
 بمقاطعها عند التنفس . الواحد نُحِشِيش .

٢٨٦٢٢ - نُحِشَاع ، نُحِشَاع
Moelle (F). *Marrow* (E).
 يقسم النشاع الى ثلاثة اقسام : النشاع النطفي او ريم
 النظم والنشاع الشوكي او الحبل الشوكي والنشاع المستطيل .
 فالنشاع النطفي نسج دهي يحمته السحاح الباطن ،
 ويريد في تجاريف العظام وفي ثياها الاسفنجية وهو حل
 نوسين ، ابيض اغبر مركزه في تجاريف العظام الطويلة واسمر
 احمر اللواج مركزه في فجوات الثياها الاسفنجية || اما

الى ١٥ م . ظهروها شفاف يطول عند الذكر من ١٠
 الى ١٥ م . وعند الانثى من ٩ الى ١١ م . زباناها خيطية
 الشكل مجنحة الطرف . سيقانها الخلفية تطول من ٨ الى
 ٩ م . مرز الانثى جالس الانتشاب يطول من ٦ الى ٨ م .
 يظهر التحنوس الشفاف عند اوائل الصيف . يالسالانغال
 والاشعاب الرقيقة . اناته ترز السرد في سوق ووروع
 النباتات الخلقة اخصها الاقسن والحشرف والشنداب
 والبرراق والخيمات من اختلاف انواعها والتبع وسوروع
 الكريمة || دباهه ونيفانه وحشراته الكاملة تعيش حل
 اوراق النبات والمواد العضوية || مسرعه دجوي يستمر
 من الغروب الى الفجر .

- ٢٨٦٢٦ - نُحْص**
Piedmont (F).
 اصل الجبل وصفحه .

٢٨٦٢٧ - نُحْص
Asepsie (F).
Aseptic methods, A. treatment (E).
 مجموعة الطرائق العلاجية التي تستعمل الميكروبات دون
 الاستانة بالمؤاميل المضادة لها .

- ٢٨٦٢٨ - نُحْطَة**
 هي الهجة ، اطلها .

٢٨٦٢٩ - نُحَل
Apis (S). *Abellies* (F). *Bees* (E).
 جنس حشرات مفيدة من فصيلة التحليات ورتبة غشائيات
 الاجنحة . انواعها المعروفة قليلة ، اعطائها العالم . قوتها
 الكبار ورسوق الاضرار . اجسامها اسطوانية الشكل .
 صيوتها مركبة ، اعطائها قارضة لاصقة . صندورها نشيطة
 تحمل ثلاثة ازواج من الاجنحة الشفافة . بطونها مركبة
 من عدة طبقات وبرجات تدعى بشداد لاسع عند الامعات .
 والنحل يعيش عيشة اشتركية تعاونية في مستعمرات مستقلة
 مؤلفة من ثول قوامه ملكة او اثني كاملة تعيش نحو ٥
 سنوات وظيفتها صنع السرد . جسمها مستطيل الشكل مدام
 الخلم اللدق ما يمنحها من تناول الغذاء لتلقاها وما يدور
 وصيفاتها الى تزويجها للسمر . ثم البخور وهو الذكر
 الذي يكوم الملكة مرة واحدة في حياتها يموت حل أثرها .
 والياخير لا يقل عددها في الثول الواحد من بضع مئات ،
 وفي اكبر حشوا واغلظ جسماً من الامعات وفي عادمة
 الشداد اللاسع . حياتها تطول من ٨ الى ١٠ اسابيع وتعيش
 ما تجنيه الامعات . ثم العاملة وهي اثني ناصة التركيب ،
 عادمة الشداد الجنسي ، وظيفتها جني الرقيق والطلم وصنع
 الدنج والشع واللعل وسرارة الخلية وتغيير شاتها وشان
 الحفنة والسعي . وهي مجهزة بشداد لاسع تستعمله للدفاع
 عن النفس . والامعات التي يبلغ عددها عدة آلاف تشكل
 اكثر من ٩٩ ٪ من مجموع افراد الخلية او الثول . وفي
 تعيش من ٣ الى ٥ اسابيع باستثناء فصل الشتاء حيث
 تعيش نحو حشرة اسابيع . || اما اشهر انواع النحل فهي
 ما يلي :

- نحلة ايطالية**
Apis ligustica (S).
Abellie italienne, A. ligurienne (F).
نحلة سوداء ، نحلة مدغشكر
Apis unicolor (S).
Abellie noire, A. de Madagascar (F).
نحلة صيفانية ، نحلة عربية
Apis arabica (S).
Abellie arabe (F).
نحلة شائعة
Apis mellifica (S).
Abellie commune (F).
نحلة صينية
Apis socialis (S).
Abellie de Chine (F).



تحنوس شفاف



مخور

ملكة

عامة

نحل



نحية

وإوراقه حامزة مطهرة وبواسطة عند الاكثار منها || تنويره
يستمر طوال شهر تموز .

٢٨٦٣٣ - نَحْرُطُ الصَّبَاغِينَ ، عَظْلِيمٌ ، عَظْلَمٌ

Baptisia tinctoria (S. **Baptisia tinctoriale** (F.))
 نوع من النشتر الطراحي الاصصامي. **جلطية**
 مسطيلة. **جلطية** متصبغة تملو نحو ١٠٠ سم. **اوراته**
 ممتعة ، مركبة ، ثلاثية الوريقات. **ورقاته** بيضاء
 متصبغة مسطحة **سليطه** و فصلها مالى البشره ، **عابق الحفار**.
ازهاره فريده **الجمع** ، **جورية** الازنكار ، **متصلة** اللد ،
صفراء اللون **جلطه** صباغية ، **خضايها** ازرق اللون
كاثليه **تورمه** يستمر من تموز الى آب.



نُخْرَطُ

Baptisia perfoliata (S). نَخْرَطُ مَثْقُوب - ٧٨٦٣٤

Baptisia perfoliata (F). نوع من النخراط الأزرق الممر . ساقه منتصبه تعلو نحو ١٠٠ سم . أوراقه بسيطة ، متقوية ، مستديرة الشكل ، ماملة البشرة . ازهاره فردية التجميع ، محورية الارتكاز ، صغيرة القد ، صفراء اللون . || تنوره يستمر طويلا ، شهر



تخرية الارز

٢٨٦٣ - نُخْرُوب

Alveolus, Cell (E).
هو عين الشهاد المسلحة الاضلاع التي يصنعها النمل
و يتم فيها سره او يضع فيها عسله. ج تخاريب.

٢٨٦٣٦ - نَحْرِيَّاتٌ ٥ ، وَهَيْوَلِيَّاتٌ ٥

Tiliatiscus (S), Tiliatiscus (F), Tiliatiscus (E).
 فصيلة فطور مجهرية من رتبة الدعاميات تتميز بطياتها
 اللاتقاسية التركيب والانتظام. دعاماتها بسيطة لا وثيرية ،
 بويانياتها عديدة فردية التجميع أو مدخومة || أشهر
 أجناسها : الأنتوريزه ، الأنتيلوبه ، الدقيلة ، الطاهول ،
 الميلانوتونيوم ، النضرية ، النيوفوسه .

Tillocia (S). ٢٨٦٣٧ - نَحْرِيَّة ٠ ، وَهْبُون ٠

جنس فطور مجهرية من فصيلة التفريجات يركب على نباتات اغصانها نباتات للفصيلة النجيلية . || جريه ونبته يتميزان بذوات قصيرة غليظة مدخومة البوافات . بوه اسمر اللون كرهه الزراخية يبدو ماسكا لزجا ثم ينحل فيصبح كالصاب || اشهر انواعه ما يلي .

٢٨٦٣٨ - لَحْرِيَّةُ الْأَرْضِ * ، وَفَيْتُ الْأَرْضَ .

Tilletia horrida (S.). Carte du riz (F).
فطر مجهرى يصيب الارز فيجذبه . اعطاه فسيحة الابيض
تقتل البلاد الاسيوية والامريكية . || مركب بين
انذار المتكامل فيسود الى بؤرة فوسية تنفجر عن غبار
لزوج كثيف لونه الى السمرة الفوسية يتدل كالطوط
المستقر من الزهرة الى الماء قبل ان يجف ويطار .
اضاره زهيد لا تستوجب المكافحة النهائية انما يحسن
مداؤه الكبريات باسح العلاجات الوقائية كتتطيس الثلب
في بعض مركبات الزئبق او الفرمول .



تخميرة الحنطة

٢٨٦٣٩ - لَبَّحْ بِكَ الْخَنَاطَةَ*، رُفِيقُ الْخَنَاطَةِ*

Tilletia tritici, T. caries, Uredo caries, Lycoperdon tritici (S). Carie du blé, C. du froment (F). Stinking smut (E). Stinkbrand des weizens, Steinbrand (D).
فطر مجهرى يصيب الحنطة على اختلاف أنواعها. يركب الحب فيسول في البلاد المعتدلة المناخ والباردة.

النخاع الشوكي فهو جزء من الجهاز العصبي يعد في القناة الفقرية من النخاع المستطيل إلى فقرات القطن الأولى. وهو خضرة من الألوان العصية ويغطته أربعة أغشية الإحساس من أطراف الجسم والمراكز العليا منها بها ١١ شعيراً النخاع المستطيل الذي يقع بين مؤخر الخ و النخاع الشوكي فهو أحد أجزاء الدماغ الذي يمتد في الجهاز العصبي ويسيطر على تنسيق حركات التنفس والقلب والعضلات الخ. وهو يشبه الحبل الشوكي من حيث تركيز المادة السوداء في القسم الخلفي وللمادة البيضاء في المحيط الخارج.

٢٨٦٢٣ - نُحَالَة

هي الفضلات المتأينة عن نخل الحبوب بعد طحنها لا سيما الحنطة.

٢٨٩٢٤ - ٢٨٩٢٤

مادة عضوية طليعية التركيب لزجة تقشي بشرة سوق
وأوراق بعض النباتات .

٢٨٦٢٥ - نُحْبَة

Picoter (F). Peck at (E). نَحْتُ = ٢٨٦٢١

تحت الطائر الشجرة :

কম (E). **৬৮** - ২৮৭২৭

النخلة هي البقر الموا

٢٨٦٢٨ - لَحْر، دَفْب (F). Nécrose (F). Canker (E).
داء ف. يسبب النبات سبه فظو، طفيلية غلظة.

157-28729

مرض فطري يعترى الحبوب لا سيما الخنطة. سببه بعض الفطريات النادرة الممرضة. أغلب نخرة.

* ٢٨٦٣ - لفظ

False Indigo (E). Farberhölzle (D). Baptisia (I).
 جنس نباتات عشبية من البذرليات وفصيلة البقوليات
 الفراشية. أنواعها عديدة معظمها بري وبعضها صناعي
 أو طبي. أروابها ممددة. سيقانها مغطاة. أزهارها
 لا تفتتح بشكل منها الحركة الملتصقة والخامسة. أزهارها
 لا نظامية التجميع. ثمارها حبات أحليجية قصيرة القند.
 أعرف أنواعها وأشهرها ما يتيم.

٢٨٦٣١ - فخرط أبیہی

Saptisla blanche (F).
نوع من النخروط الأبيض، ساقه منتصبه تعلو من ١٢٠ سم. أوراقه مركبة ثلاثية. وريقاته أحليجية الشكل مقطوعة الطرف. أزهاره فردية التجميع، محورية الانتكاز رأبعية، كبيرة الحجم، لونها الأبيض المالح. تنوره يستمر طوال شهر حزيران.

٦٨٦٣٢ - لغزط البر، نيلة برية

Baptisia australis (S). *Baptisia australis* (F).
نوع من النخروط الطبي والزيطي. جلوه غليظة. ساقه
منقصة تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه مركبة ثلاثية
الورقات. وريقاته اعليجية مقطوعة، نصلها مائل البصرة،
جبل الحصار الزاهي. ازهاره عذوق النجمية
الارتيكاز. ازهاره صلبة القدر غزوة اللون || جلوه

سولية أيضاً وثلاثية التنسيت كما في الذكرية ، لكن توبيعها ثلاثي البتلات المرصومة وأسديتها شقية حروفية ومفاتها ثلاث وهي بضيعة الشكل نجمة منفصلة وسماها ثلاثة لسانها وثلاثها وسيدة البزرة . || أشهر أنواعه على الإطلاق هو النخل المعروف أي النخيل .

٢٨٦٤٦ - نَخْلُ الدَّقِيقِ *

Phoenix farinifera, Ph. pusilla (S). Dattier à farine (F). نوع من النخل غليظ الجذع القصير . ساقه تعلو نحو ٢٠٠ سم . بيتاً لا يقل قطرها عن ١٠٠ سم . سفعه كثيف النخيل وأشد أخضراً . جريده يتحسّن عند زامه الأخير . مهده منخفضة سهل الحد الشرقية . رطب في الأثرية الدهبالية المروية . ثماره صغيرة اللد صفراء اللون لا تتوكل يستخرج من جارة ساقه الصمغ لبوب نشوي المادة مأكلة يقال أنه كثير الفوائد الصحية . || يزرع خارج مهد القرن فقط .

٢٨٦٤٧ - نَخْلُ الدُّهْنِ * ، نَخْلَةُ الزَّيْتِ ، إلْوَيْس
Elaeis guineensis (S). Eléide, Eléin, Avolma, Palmier à huile (F). Oil palm (E). Olpalme, Guineische Palme (D). Palma d'oleira, P. da olio, Aouara di Guinea (I).

نوع من النخل ، مهده بلاد إفريقيا الاستوائية انحصها غليظاً ، ساقه حلقة اللحاء مرطاً ، سفعه ريشي التركيب ، ثماره نوبية الشكل ، جوزية اللحم ، صفراء اللون ، تحسّن ثلاث عجمات يستخرج من لها دهن أصفر طار يستعمل في صناعة الصابون ، ويستخرج من صلام عجماتها سمن نباتي أبيض اللون يستعمل للأكل .

٢٨٦٤٨ - نَخْلُ الشَّعْبِ * ، سِيرُوكِيلِ

Ceroxylon (S). Céroxylin, Palmier à cire, Arbre à cire (F). Wax palm (E). Andenwachspalme (D). Palma della cera (I).

جلس نخل امرئكي . أنواعه المروفة قليلة . سوقها ريفية تعلو ٤٠ إلى ٥٠ م . سفعها يشبه سفع النخيل لكنه يطول نحو ٣ أمتار . يتكثّر ويوجد في بلاد البربر عند جبال الإندل مقربة من التلج الدائم . ثمارها نوبية ، كبيرة ، بتسجية اللون ، سكرية الطم . عصارتها شمية تستعمل في عدة صناعات .

٢٨٦٤٩ - نَخْلُ القَطَبِ * ، نَخْلُ نَاتَالِ

Phoenix natalensis (S). Dattier du Natal, D. du Cap (F).

نوع من النخل الصغير اللد . جلده جالس مستقيم يطول نحو ٣ أمتار . ساقه غروية الشكل غليظة القاعدة دقيقة القوس السفلي . جريده سفع يطول نحو ٣ أمتار . غوصه بحري اللون تعلو شجرة غبراء || مهده بلاد رأس الرجاء الصالح وكناتال . يزرع الزين . يوجد في جميع الأثرية ويميل على معظم شواطئ البحر المتوسط || ثماره حامزة صلبة صفراء اللون .

٢٨٦٥٠ - نَخْلُ النَّصَا

Sagoutier (F). هو السافوتية ، أطبها .

٢٨٦٥١ - نَخْلُ بَرِّي

Phoenix sylvestris (S). Dattier sauvage (F). Wild palm (E). Wilder Dattelpalm, Tannenpalme (D). Palma salvatica (I). نوع من النخل الكبير اللد . جلده يرتفع عن ١٠ م . سفعه كثيف النخيل ، بزم غوصه مستدق الطرف طويل الهدبة ، لونه إلى الخضار الأزاعي . || مهده بلاد

كامل البر أو بعضه إلى كتلة من البورج || وهو لا يطبل السوق لكنه يسبب قصر السلاطات والشرانف ثم عقر القسم الأعلى من السنايل . || أضراره قد تكون فادحة إذا لامته البومل الجوية وأغصها اعتدال الحرارة أو تدنّها || يكافح باستعمال أبج الفولابر القتالة منها زرينغات النحاس أو املاح الزئبق أو مركبات الفرميل .

٢٨٦٥١ - نَخْرِيَّةُ الشَّعِيرِ * ، رُهَيْونُ الشَّعِيرِ
Tilletia panicli (S). Cario de l'orge (F).

فطر مجهرى يركب جميع أنواع الشعير . يتكثّر ويوجد في أروبة الوسطى . || طالسه مستدرة الشكل أو يضيعة لونها إلى السرة تعلوها شعبة بتسجية عابقة . أضراره محدودة لا تتجاوز ، في أشد الإصابات ، ثلاث حبات في السلة الواحدة . || يكافح مكافحة سائر النخرينات .

٢٨٦٤١ - نَخْرِيَّةُ الشَّيْثَمِ * ، رُهَيْونُ الشَّيْثَمِ

Tilletia secalis, Uredo secalis (S). Cario du seigle (F).

فطر مجهرى يصيب الشيلم لفيذه . يتكثّر ويوجد في المناطق الباردة انحصها بلاد الاتحاد السوفياتي . وهو على السنايل الملوقة مشعة من إزقة البيرة بيتاً يتكثّر البر أصفر قوفاً من الحاد وأغلظ قطراً . || طالسه كروية الشكل أو يضيعة . يوه له الصبيب ، كرية الزائفة ، أسود اللون ، أزرق المراج ، حقيق البنيار . || أضراره فادحة تراوح بالنسبة إلى المواقع والميول الجوية من ٢٠ إلى ٧٠ ٪ . || يكافح مكافحة نخرية الخططة ومن الواجب اجتناب زراعة الشيلم في الأماكن الرطبة .

٢٨٦٤٢ - نَخْرِيَّةُ مُنْتَبِثَةٍ * ، رُهَيْونُ مُنْتَبِثِ

Tilletia foetida, T. levis, Ustilago foetida (S). Cario fécida (F).

فطر مجهرى يركب بر الخططة في جميع المناطق الحارة والمعتدلة المناخ . || طالسه كروية الشكل أو يضيعة ، بشرتها مائلة السطح موشحة بالأسود . يوهها كرية الزائفة . || أضراره شعبة باضرار نخرية الخططة زراد مع ازدياد وقته الحار . || يكافح مكافحة نخرية الخططة .

٢٨٦٤٣ - نَخْرَ - Térébrer (F). To terebrato (E).

٢٨٦٤٤ - نَخْشُوشُ

Ouies des poissons (F). Gills of fish (E).

نخشوش ج غناشوش . هي أداة الصنع عند الأسماك وهي تقرب فلبية متصلة بالغناشوش من من بين الرأس ويساره .

٢٨٦٤٥ - نَخْلُ

Phoenix (S). Dattier (F). Palm tree (E).

جلس أشجار ليفة من فصيلة النخلات حديد الأنواع والفروبر جميعها من نباتات المناطق الحارة . || جلدها متصببة ريفية أو نجية والجلع عند وجوده يتكثّر استوائي الشكل وسيد الساق المستقيمة الكعرة الكروانية وغير المتفرعة . أو راقها سفينة طويلة الجريد غليظة الكرب وريشة الشكل . غوصها ينزل التركيب ، فتالي البزم اللبني التصل المستطيل المذهب الهدبة . || والنخل من النباتات الثنائية المسكن التي يتبين ازدهارها بطلة فناء وكافور بسيط . أما ازدهارها فلامنة وقد يختلف تركيبها بالنسبة إلى كونها ذكرية أو أنثوية . فالازدهار الذكرية تتميز بتكاس سولية الشكل ثلاثية التنسيت مع توبيع ثلاثي البتلات وأسدية شقية وبآبر خيطية متصببة . || أما الازدهار الأنثوية فكلها



نخرية الشعير نخرية الشيلم



نخل الدقيق




نخل الدهن



نخل الشمع



نخل القصب



1 من - 2 لسان، خنجر مرفوع - 3 خنجر مرفوع - 4 من مرفوع - 5 لسان - 6 خنجر - 7 من مرفوع، من مرفوع - 8 لسان، من مرفوع - 9 لسان - 10 من مرفوع - 11 من مرفوع - 12 كبد مرفوع - 13 زوائد - 14 من مرفوع - 15 من مرفوع - 16 من مرفوع - 17 من مرفوع - 18 من مرفوع - 19 من مرفوع - 20 من مرفوع - 21 من مرفوع - 22 من مرفوع - 23 من مرفوع - 24 من مرفوع - 25 من مرفوع - 26 من مرفوع - 27 من مرفوع - 28 من مرفوع - 29 من مرفوع - 30 من مرفوع - 31 من مرفوع - 32 من مرفوع - 33 من مرفوع - 34 من مرفوع - 35 من مرفوع - 36 من مرفوع - 37 من مرفوع - 38 من مرفوع - 39 من مرفوع - 40 من مرفوع



- نباتات حورية وصيلة : 1 قلبية حبيبة - 2 قلبية حروف الهيك - 3 بيا ، مصبوبة - 4 كرميس - 5 حافة قلبية - 6 عتكار - 7 بحلية تنصبة - 8 عصابة جليك - 9 قشبان - 10 زنبية - 11 لب " قنار - 12 ليلاب لغتي - 13 ستور شوي - 14 ستور اصغر ، ميرقي - 15 خرو مره ، القلبية مره - 16 حليل ايلاني - 17 غلر المسك - 18 غيرة وريكة - 19 عشقاش كاليلوية - 20 عشقاش - 21 فريسين - 22 زهر الكتكئين - 23 لسان الازهار - 24 دافره مصرية - 25 بنبية - 26 سليوت - 27 بنبج كاتوت - نباتات دواسيك وبلدوروك : 28 اماريش ، فريسين - 29 ترنس القمار ، غلو - 30 ترنس فريد - 31 ترنس حطر - 32 ترنس بري ، سراس - 33 يافيا زملية - 34 لنا - 35 اصابا ، دعلو - 36 اصابا كروية - 37 و 38 اصابا ارسوانية - 39 اصابا زنبية - 40 اصابا ابراطورية - 41 دليوت ملطج - 42 دليوت الحصاد - 43 دليوت لسي - 44 سون بيردالي - 45 سون ايلاني - 46 ميون شوشان - 47 دفران - 48 بين القاريس - 49 هراو - 50 بيرين ، انجيل - 51 زنبل ابيض - 52 زنبل رايق - 53 زنبل زطرائي - 54 زنبل ، زنب - 55 قلوب الزمكرين - 56 قلوب مكسي - 57 قلوب فريج - 58 قلوب يتي - 59 قشكر كوكبي - 60 قشكر اقيق - 61 حيلان الزمكرين




- لبات مسمرة: 1 اودوم، ثرياق، 2 هليروب، 3 جريسة جريسة، 4 جريسة كيرة، 5 شمس، 6 فرمعل الشاهر، 7 زغل الزشكين، 8 ترغل صيني، 9 اسطر صيني، 10 اسطر مغربي، 11 كرويت سيات، 12 كرويت لولي، 13 كرويت تحفلي، 14 كرويت رنوب، 15 كرويت لطف، 16 كرويت مسلح الور، 17 كرويت صيني، 18 كرويت كان، 19 دبر كنديري، 20 ناهور، 21 فزان، 22 خروپ ودي، 23 دوكار الشمس، 24 رسة، 25 حاروة، 26 صون كير الفير، 27 صون خضاد، 28 صون زنج، 29 صون مشيق، 30 قريسة جريسة، 31 جيلان جريسة الورق، 32 فالت صابينة، 33 نرندريا، 34 يوكا، 35 خيلي، 36 لوس اسفر، 37 نيلوفر، 38 غشطن شاي، 39 شرکاف، 40 شرکاف دروي، 41 زنده مجيسته، 42 زنده اذان الدب، 43 زنده بابايه، 44 زنده قلعة، 45 رصايه، 46 اكلاديا سيلو، 47 اكلاديا ذهبي، 48 شكار ليليان، 49 روح صير الور، 50 روح صيني، 51 دهل، 52 سيم، 53 سم، 54 دلقور مشجرة، 55 دلقور مشجرة، 56 بش، 57 حنطة، 58 كرا، 59 دلي الحام




النباتات والحيوانات : 1 كنبية - 2 لكجه - 3 افص ليلي - 4 صرية اعلي - 5 دورقة - 6 جلتان هيران اقمر - 7 كريل - 8 صعل - 9 ازانك - 10 بلية - 11 دويجه وردية - 12 مندريه
 كبره اقمر - 13 مندريه جيهه - 14 خلسي ملكي - 15 خلسي افريتي - 16 ليلك ، ليلج - 17 ليلك حنين - 18 صريجه - 19 ملي - 20 دوح جيري - 21 كرز الزمباري - 22 كرز -
 23 شنبلي ليليان - 24 ورد ليلي - 25 ورد علي - 26 ورد جا كير - 27 ورد المارشان ليل - 28 ورد فيجرون - 29 ورد فرسي - 30 ورد نابليون - 31 ورد غسي - 32 ورد كبير اقمر - 33 ورد
 سلوتي - 34 ليل - 35 قمل - 36 صلبية - 37 جلتان حدي - 38 ريسان - 39 مهور - 40 افريتي - 41 حيدكوس - 42 كالشوم - 43 صلب جيهه - 44 لوشيا حنين - 45 لوشيا طليقة -
 46 الاكبه - 47 ارطسيا بندرله - 48 ارطسيا حنكرليكه - 49 كاميليا پافانيله - 50 كاميليا كبره اقمر - 51 خسه - 52 طرخين ، عود الحيله - 53 للكوس - 54 صره المرحبان




- نباتات کنفی اورد : 1 لعلر (الماند) 2 ذراک جیگو 3 انوریوم شرود 4 انوریوم لوریس 5 پیلریه برولیا 6 پیلریه کتیر 7 تیلانسیا سطل 8 تیلانسیا لریس
9 فریو بیو 10 اخیو، شریلو 11 خلیج 12 لید 13 اسکیتو 14 فلوکیدیه 15 سلطان 16 ونسی 17 لپیری 18 ابر تبار، خیزه ازان
19 پورانیلی، پویشی 20 سکی، خیزه حرم 21 زنده العین 22 لریو سکی 23 مورو 24 سخلی 25 براساوا 26 نکل لریو 27 نکل لریو 28 کوریش حریل
29 باربیو بکال 30 باربیو بریزد 31 باربیو لریو 32 باربیو سدر 33 باربیو ریشلیک 34 دندوب لریو 35 دندوب لریو 36 دیز کیر لریو 37 جلی اصغر
38 لریو نشیما 39 لریو لریو 40 لریو 41 فیکلا ساد 42 مکلیه سدر 43 مکلیه ساد 44 مکلیه ساد 45 مکلیه ساد 46 مکلیه ساد 47 مکلیه ساد
48 مکلیه کیر لریو 49 سلیو ساد 50 سلیو ساد 51 سلیو ساد 52 سلیو ساد 53 سلیو ساد 54 سلیو ساد



1 كبريت طبيعي - 2 بيريت (كبريتور الحديد) غشس الزرادي - 3 بيريت (مكتنات راتنة) - 4 بيريت (مكتن طليق) - 5 أجد - 6 حور حار بنس القصب - 7 تر ذهب طبيعي - 8 تر يلاتين طبيعي - 9 نقتة طوبية - 10 زلنج البيريت (ميسكال) - 11 حديد اربلجيتي - 12 ساروز او حديد نغشم - 13 زناك ميكريت - 14 زناك نغشم - 15 رساس ميكريت - 16 قصدير مأكسد - 17 بيريت القنص (كلكتوبيريت) - 18 منليت - 19 نحاس طبيعي - 20 دهنج - 21 زنجفر - 22 لازورد قتي - 23 حبر او كوبران اصفر - 24 اسرب ، غزالوت



- 1 - مرور فلشلف - 2 - توريدالين رودي - 3 - توريدالين أسود - 4 - من الحجر الأسترالي - 5 - ماس أسود - 6 - ماس أبيض - 7 - ماس أزرق - 8 - سفير - 9 - زبرجد - 10 - كيروز - 11 - باقوت أحمر، نعل - 12 - من الحجر - 13 - زبرجد - 14 - جيت أر - 15 - ريشة قرني - 16 - مرو جيتي - 17 - يمان - 18 - يناب، طيق، انط - 19 - شيشوليت 1 - 20 - شيشوليت 2 - 21 - سيلان 1 - 22 - سيلان 2 - 23 - حبة من الباغيتيت - 24 - ميلان قرني - 25 - لاجيت - 26 - كاسيت قتي - 27 - كاسيت سيري - 28 - جيس - 29 - لاصف باناسجي - 30 - ملح لقل



1 بوق البحر - 2 عشاء البحر - 3 مرنج بحري - 4 مجرة - 5 أم حوشة - 6 غلام - 7 براني - 8 عرطوة - 9 مفرقة - 10 صفاة - 11 صبرة - 12 خيرة البحر - 13 ترس البحر - 14 ابر حريون - 15 رسكس - 16 بنات - 17 نقة - 18 طمسرة - 19 قربة - 20 نيشان - 21 نيشان (ق ابل موه) - 22 علية - 23 زب البحر السحلي - 24 زب البحر اللطاني - 25 زب البحر النجيل - 26 دويلة - 27 دقة الخ - 28 بلة البحر الحمراء - 29 بلة البحر المشبكة - 30 كوكبة - 31 نجمة القناع - 32 بكتريون - 33 كرمات مسيل - 34 حنكوب - 35 رصيلة - 36 لصة - 37 تقاء البحر - 38 عريان الرل - 39 كركانة - 40 ام كاليب - 41 اشطره - 42 فلفوس - 43 ابر مير - 44 بطريل



نخل بونان



نخل شائك



نخل كرتني



نخل كناريه



نخل معروف

جارة قلبه للأكل. ويزرع للترين في المراكب وفي المواق التي لا تخفى الصقيع. ساقه قصيرة. كريمة عادم الشوك. سقمه مستطيل الخوص جميل الخضار.

٢٨٦٥٨ - نخل كناريه * ، نخل الجوز النخلة

Phoenix canariensis, P. tinnis (S). Dattier des Canaries (F).

نوع من النخل المتوسط القد، جلعه يملو من ٨ إلى ٨ أمتار. ساقه اسطوانية غليظة يبلغ قطرها نحو ١٠٠ سم. سقمه مستطيل القد، كثيف الخوص، متدل الصنحين الذي يتوسط الزام الثالث || مهده جبر كرتني ونسبا انتقل الى معظم مناطق حوض البحر المتوسط. ضرره عديدة مظهرها ترابي سريع النمو يعيش في جميع الأترية وبعضها زراعي يزرع بجي ثماره مأكله الحمراء اللون.

٢٨٦٥٩ - نخل معروف * ، نخل

Phoenix dactylifera, P. excelsior (S). Dattier fruitier (F). Date palm (E). Dattelpalma, Palmbaume (D). Palma, Dattaro, Palmizio (I).

نوع من النخل، كبير القد، كثير التفرع، جلعه متصب، السوق المستقيمة تملو من ١٢ إلى ٢٥ متر. جريد سقمه يطول من ٣ إلى ٤ أمتار وهو شائك الكرب غليظ الكرناف. غوصه مستطيل اليزم اللهب المدية، لونه الى الخضار الازيد || ازهاره شكولي التجميع عند الذكر والانثى، عكوكو يذو افرضا، يذو عند ظهوره محاطا بقاية كبيرة تدعى القنن. اما الشكل الانثوي الذي يعمل الشر فيذو حرجيا. || ثمرة النخل مستطيلة الشكل، لينة السلق، سكرية الطعم، مأكله. لونها زرة خضية قاسية يقطبا شق طولي عميق يذو الثغور. وطفه الثمرة اتمر يرفية عديدة تختلف مع تطورات مراحلها الحياتية من الارام الى الانواع. فهي بعد الارام صياغة ثم غلالة فيلسة فجذلة فبرسة فبرطة وانيرا || ثمرة || اصطناعه فحوض البحر الاخر لصر فليبا فحوض فالجزائر فراكش. يعيش ايتا زرع غير انه يفضل الأترية الربلية البدالية بالمعاد المضوية والناصر الغذائية كما ازاد حل النخيل الحولي وانقطع عن لسانته. || اقليمه الافضل هو الاقليم الذي تشتت فيه الحرارة من اربال ايار الى ابخر تشرين الاول حيث يبلغ مجموع السرات الحرارية، خلال هذه المدة، نحو ٤٠٠٠ ساعة وعل ان يكون متوسط الربلية الجوية النسبية نحو ٤٠ ٪. || اشهر ضرره وواجبها ما يتبع.

— إريجي — ثمرة تطول نحو ٥ سم. حراء اللون تسلك جافة.

— أمهات — ثمرة تطول نحو ٣ سم. شديدة الحلاوة تؤكل رطبة وبيافة.

— يرتامو — ثمرة تطول نحو ٤ سم. تسلك رطبة وبيافة.

— بنت عيشه — ثمرة تطول نحو ٤ سم. تؤكل رطبة وبيافة.

— فوي — ثمرة تطول نحو ٦ سم. قليلة الايفل تؤكل جافة.

— جندلا — ثمرة تطول نحو ٤ سم. تسلك جافة.

— حلاو — ثمرة تطول نحو ٤ سم. حشلية اللون تصدركثرة.

— حياني — ثمرة تطول نحو ٥ سم. تسلك رطبة وبيافة.

الهند الشرقية ونسبا التشر في معظم بلدان حوض البحر المتوسط. يزرع للترين. ثماره صنية حاضرة.

٢٨٦٥٩ - نخل بونان * ، نخل سيكيم، نخل

Phoenix rupicola (S).

Dattier des rochers (F).

نوع من النخل المتوسط القد، يتشيز بجلو جريده من الكرناف الثام بين الساق والكرب، جلعه يرتفع منه الى ٧ أمتار. سقمه رشيق الشكل يطول نحو ٤ أمتار. غوصه مريض البزم المذهب الطوف || مهده مناطق بونان وسكيم من اعمال الهند. وهو من اجل انواع النخل شكلا وارقا لذلك يزرع للترين ويوجد منه حل بعض شراطي البحر المتوسط || ثماره حشلية اللون مأكله يجمعها قنو كبير القد لا يقل طوله من ١٢٠ سم.

٢٨٦٥٩ - نخل زكوتيبار، نخل مقنوس

Phoenix reclinata (S). Dattier de Zanzibar (F).

نوع من النخل المتوسط القد. جلعه رشيق القوام يرتفع من ٤ الى ٦ أمتار وكثيرا ما يتقوس عند زانه الثالث. سقمه مستطيل القد عجين الجريه. كربه حاد الشوك. غوصه جميل الخضار اللامع || مهده يزرع زراعا وما قابليا من القارة الافريقية. وهو من الانواع السريعة القنو يفضل الأترية الجصية ولا يتأذى من فيها. يزرع للترين. ثماره صنية القد. صفراء اللون لا تؤكل.

٢٨٦٥٩ - نخل سركديب، نخل سيلان

Phoenix ceylanica (S). Dattier de Ceylan (F).

نوع من النخل المتوسط القد. جلعه يرتفع نحو ٥ أمتار. سقمه يطول نحو ٤ أمتار. كربه شائك. غوصه مستطيل اليزم المذهب، لوله الى الخضار اللامع || مهده جزيرة سرديب يعيش في حصص ويطوح هضابها النخلة. يزرع للترين.

٢٨٦٥٥ - نخل سيام

Phoenix siamensis (S).

Dattier de Siam (F).

نوع من النخل المقر العادم الساق. جريده سقمه يطول نحو ٣ أمتار. غوصه كثيف التجميع جميل الخضار الزاهي. يزعمه مذهب العفصة، طويل المدية || مهده سهل سيام الربلية. متطلباته الزراعية قليلة لانه من النباتات المدية وقد رغب في الأترية الربلية التي لا تخلو من الدبال. ثماره ارجوانية اللون مأكله.

٢٨٦٥٦ - نخل شائك

Phoenix spinosa, P. leonensis, P. senegalensis (S). Dattier épineux (F).

نوع من النخل المتوسط القد. جلعه متصب الساق يملو من ٤ الى ٦ أمتار. جريد سقمه يطول نحو ٣ أمتار. غوصه جميل الخضار الباق، يزعمه مذهب شائك. مهده افريقية الاسطوانية. رغب في الأترية الطينية الكلسية ولا يخشى الريحاح البحرية. يعيش حل شراطي البحر المتوسط || ثماره متوسطة القد، نخلة الجرم. سمرها مرجاني اللون. رطبها اجر حجري. ثمارها حشني اللون. سكرى الطعم مأكله.

٢٨٦٥٧ - نخل كرتني

Oreodoxa oleracea (S). Oreodoxa oléracé, Palmiste franc, Chou-palmiste (F). Cabbage palm (E). Kohl-palme, Kohlrangende, Arelpalme (D). Palmisto, Palma cavolo (I).

نوع من نخل البلاد الحارة الاسيوية والافريقية. يزرع لجي

royal, Palmier royal (F). Royal wine palm (E). Königspalme (D). Palma regia (I).

نوع من النخل الزراعي التزييني . جذعه رفيع الساق المنتصب . بهرته تاجية الشكل جميلة القالب . سطحه متوسط الطول قليل التحجيم . غوصه جميل الخضار الزاهي . طلمته كبيرة القد فارشة . ثماره صغيرة الحجم . ارجوانية اللون ، ناشفة السطح ، لا تؤكل . حجارة قلبه مأكولة مستحبة الطعم .

Phoenix paludosa (5). نخيل منقعي - ٢٨٦٦٢

Dattier des marécages (F).
 نوع من النخل المتوسط القد. جلعه مستحب الساق المستقيمة
 يصلو من ٨ الى ١٠ أمتار . جريد سفعه يطول نحو ٣ أمتار
 وهو شائك الكرب يحجن الزايم الأخير . خصوصه جميل
 الخضار الفضي . يزده مذهب الطرف || هذه مناطق اخند
 الشرقية وقد يعيش في جميع الأوصاف الدالية الرطبة . تجار لا
 يتخلو من الحلاوة لونها الى البصرة القائم

Phoenix acaulis (S). ٢٨٦٦٣ - نخل تجمل *

تدريجاً (F).
Dattier acule (F).
 نوع من النخل العادم الساق . صفه كبير القد ريشي الغوص . يزيمه صلب النصل ، مذهب الطرف ، جميل الخضاض الزاهي || مهدد مرتفعات سهول الهند شرقي بحر الكنج || ثمار خيرية اللون حامضة الطعم لا تؤكل . يزرع القزوين وقد يمشي على الشواطيء الباردة ويبرد في الأثرية الرملية القليلة الرطوبة .

Palmicole (F). ٢٨٦٦٤ - نَخْلَانِيّ ٥

نمت تمريني يطلق كل ما يعيش على النخيل او ينمو عليه .

٢٨٦٦ - تَحْلَةُ الْحَمَرِ هو الكرمية ، اطاليا

— — — — —

٢٨٦٦٦ - تحفة السكر * ، أرتفا

Arenga saccharifera, *Borassus gomutus* (S). Areng
Palmier areng, P. à sucre (F). Gomuti palm (E)
Gomutepalme, Zuckerpalme (D). Palma arenga
P. dello zucchero (I).

أنواع من النخل الهندي المثبت ، تكثر زراعته في الهند

والكركشيين وجبارا وملقه حيث يستخرجون السكر من قناره .
ساقه منتصبه رفيعة تعلو من ١٥ الى ٢٠ م . سقمه
كبير القند متباعد الخوص . بزجه مقطوم الطرف ، فصله
عابق الخضر || ثماره لبدة التجميع حلوة المذاق يستخرج
منها عصارة سكرية شائعة الاستعمال .

Palmaeae (S). نَخْلِيَّات - ٢٨٦٦٧

المسكن. ثمارها لاقية الشكل والحجم لبنة السوق.

Palmitine (F), Palmítico (E), **فَخْلِين** - ٢٨٦٦٨

مادة بلورية توجد في الدهن ويكثر وجودها في حامض
النخل وقد تستحضر بتآلف الحامض النخل مع الفليسرين .



٢٨٦٦٩ - نَحْوُ ٢٨٦٦٩ - نَحْوُ ٢٨٦٦٩

٢٨٦٧ - نخب
Sélectif (F), Selective (E).

٢٨٦٧١ - نَحِيرَة *

Branchiostome (F).

النَحِيرَة فوهة صلبة يمكن انغلاقها من الاتصال بالخارج .

٢٨٦٧٢ - نَحِيرَة * ، غُصْرِيَّة الشَّيْب ، لَزْبُود رَمَه *

Lasioderma serricorne (S). Lasioderma (F). Cigarette Beetle (D). Tabakkäfer (D).

حشرة من غدييات الاجنحة وصغيرة الغفريات . جسمها اسطواني الشكل ، صغير القد ، يطول نحو ٣ سم . قوامها الى الهي الكستاني المالح يطول حل المحل . رجليها مقوسة الجسم ، غبراء اللون ، عنانية الرأس ، مهدبة الظفر والجوانب والاطراف ، تطول نحو ٤ سم || ابيها الحولية حديثة تراوح من ٣ الى ٦ ، جيلها يمر من ٤ الى ٧٢ يوما . الحشرة الكاملة تعيش من ٣ الى ٦ اسابيع تنجح مكثها افرادها على التثنت فيقتف خلال مدة ادناها ٦ ايام واقصاها ١٠ . اما البرقة تنبيض من ٣٠ الى ٥٠ يوما || تتحول بعد انسلاخها الثاني الى عذارى ثم الى حشرة كاملة . وهي من حشرات البلاد الحارة والمختلة تسرح في الليل وتلتف الاماكن الاكلة . رقاتها تركب التثنت ولغلاف التيقتفص بها الاضرار الجسيمة لانها تنخرها وتنطها . تكاثرها بواسطة مصائد النور او المصائد الكهربائية .

٢٨٦٧٣ - نَحِيرَة *

Beurre (F). Butter (E).

من اسماء الزبدة ولعلها الزبدة الرقيقة كالزبد .

٢٨٦٧٤ - نَحِيرَة *

هو النخل المعروف ، اطلبه .

٢٨٦٧٥ - نَد * ، غُصْرِيَّة *

Epilobium (S). Epilobe (F). Willow-herb (E). Weidenröschen (D). Epilobio (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الاخدريات . انواعها المعروفة نحو ٦٠ معظمها بري ومنها الطبي وببعضها تزيين . منبتها الاسواق المعتدلة في جميع البلاد . سوقها قروا . اوراقها كاملة مستطيلة متعاقبة . ازهارها رباعية النصل والبتلات ، ثمانية الاسدية ، سلبية التجميع ، عسوية الاكثاظ او هامة || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٨٦٧٦ - نَد * رُبَيْمِيَّة الزَّوَايَا ، اذُنَاب القطة

Epilobium tetragonum (S). Epilobe angulaire (F).

نوع من الند البري الميزول . ساقه صلبة عسوية كثيرة الغروع مغلقة رباعية الزوايا . اوراقه متعاقبة ، رديئة النصل ، منشارية الحافة ، ناضرة الروق . ازهارها سنبل التجميع . ازهارها انبوبية اللون وريدة المالح . يوجد في الاماكن الرطبة من الساحل الى الجرد حتى ارتفاع ٢٠٠٠ م . || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٨٦٧٧ - نَد * سُبَيْمِيَّة

Epilobium angustifolium, E. spatulatum (S). Epilobe en épi, Laurier de St. Antoine (F). Rose-bag willow-herb, Blood vine (E). Waldweidenröschen, Weidenröschen, Antonskraut (D). Epilobio a spighe, Lauro roseo, L. di St. Antonio (I).

نوع من الند الزراعي التزييني الميزول . ابروته مادة . ساقه قروا تملو من ٨٠ الى ١٢٥ سم . اوراقه متعاقبة متضادة ، نصلها سناني الشكل ناضر السروق على صفحاتها السفلى . ازهارها سنبل التجميع هامي الاكثاظ . ازهارها قززية اللون قطرها نحو ٣ م . ومنه غروب يبيض الازهار وموتها || تنوره يستمر من محو الى آب .

٢٨٦٧٨ - نَد * صَغِير الزُّهْر

Epilobium parviflorum (S). Epilobe à petites fleurs (F).

نوع من الند البري الطبي الميزول . ساقه قروا تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقه زقية متعاقبة نصلها رديي الصفعة سنن الحافة . ازهارها سنبل التجميع . ازهارها صغيرة القد وريدة اللون || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٨٦٧٩ - نَد * عَفَالِي ، نَد * قَشْدِي ، عَقِص ، فَرْلُور

Epilobium hirsutum (S). Epilobe hérissée, Nériette (F). Great willow-herb, Apple-ple (E). Zottiges Weidenröschen (D). Epilobio amplexicaulo, Peleso (I).

نوع من الند البري الطبي الميزول . ساقه قروا تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه حاشية متعاقبة نصلها كبير القد منشاري الحافة خلي البشرة على صفحته . ازهارها سنبل التجميع . ازهارها قززية اللون قطرها نحو ٢ م . || تنوره يستمر من محو الى آب .

٢٨٦٨٠ - نَد * قَسْوِي

Epilobium rosmarinifolium (S). Epilobe à feuilles de rosmarin (F).

نوع من الند الجلي الميزول . ساقه قروا تملو من ٤٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه متعاقبة تشبه اوراق القسور . نصلها نقيق الصفعة الجامدة المارقة الروق الناضرة . ازهارها عسودية التجميع ، تاجي الاكثاظ . ازهارها صغيرة القد هراء اللون || تنوره يستمر من حزيران الى آب .

٢٨٦٨١ - نَد * مَشَقِي

Epilobium palustre (S). Epilobe des marais (F). Marsh epilobium, M. willow-herb (E). Sumpfweidenröschen (D). Epilobio palustre, Garofanin di padule (I).

نوع من الند البري الطبي الميزول يكثر في المنقع والبراري وببعضها ساقه عسوية قروا تملو نحو ١٥٠ سم . اوراقه متعاقبة سنانية مستطيلة . نصلها جامد الصفعة سنن الحافة . ازهارها سنبل التجميع . ازهارها وريدة اللون صغيرة القد تنوره يستمر من حزيران الى آب .

٢٨٦٨٢ - نَد * لَعْنَمِي

Epilobium menthoides (S). Epilobe menthoide (F).

نوع من الند البري الطبي الميزول يكثر في بعض الجرد البنيانية . ساقه قروا تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه لمنعية لامعة لا قياسية الترتيب وبشكل مسنن الحافة ناضرة الروق . ازهارها سنبل التجميع . ازهارها عسودية القد وريدة اللون يضاء المالح || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٨٦٨٣ - نَدَاة

Couronne solaire (F). Solar corona (E).

النداء هي دائرة الشمس .

٢٨٦٨٤ - نَدَاخَة *

Taxonomie, Taxinomie (F). Taxonomy (E).

هي علم سنن وقواعد فن التصنيف او التبيين .

٢٨٦٨٥ - نَدَاخَة * ، عَدَاخَة القاب

Luscinola melanopogon (S). Lusciniole à moustaches (F). Moustaches Warbler (E).

عصفور من الموازج وفضيلة التعليلات . موطنه يشال معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . اعطاه البنيانية محنت من السواحل الى الجرد والبراري || جسمه رقيق النواوم يطول نحو ١٣ م . وبسطه نحو ١٥ م .



نَحِيرَة (البرقة والماكنة)



نَحِيرَة (الحشرة)



نَد



نَدَاخَة

والكوليت والنزك ... لان وجودها إلزامي ان من الوجهة
الإنشائية او من الوجهة الغذائية .

٢٨٦٩٢ - نَدَبَكَة Bourrellet, Bourliet (F).
Pad, Cushion (E).

أثر الجرح بعد التأمه في النسيج الحيواني والنباتية .

٢٨٦٩٣ - نَدَحَكَة ٥ ، نُدَحَكَة ٥ Barème, Barrème (F). Printed table, Schedule (E).

٢٨٦٩٤ - نَدَحَكَة الْأَسْعَار Barème des prix (F).
Price table (E).

٢٨٦٩٥ - نَدَحَكَة الْجَمَاعَات Barème des salaires (F). Wage table (E).

٢٨٦٩٦ - نَدَحَج Apponter (F). To land (E).
شد المركب بالصقالة المخصصة لربطه .

٢٨٦٩٧ - نَدَحَج Aborder un rivage (F).

٢٨٦٩٨ - نَدَدَة Phototropisme (F).
Phototropism (E).

النَدَد وتُدعى جاذبية النور ، خاصة تتميز بها بعض
اعضاء النبات في توجيه أطرافها نحو النور .

٢٨٦٩٩ - نَدَغ Satureia (S). Sarriette (F).
جنس نباتات برية خشبية قابلة من فصيلة الشفويات .
أنواعه عديدة متفاوتة الأشكال والأحجام منها المشبة
والبليلة والجنبة . أوراقها مطرة لا قياساً القد متعاقبة او
شعبة . أزهارها أبوية الإرتكاز او تاجية يكثر فيها اللون
الابيض والنرجسي والاحمر . بعضها مفترية يمرحها النسل .
أعروف أنواعه وأشهرها ما يتبع .

٢٨٧٠٠ - نَدَغ اِكْرِيتِي * ، نَدَغ صَعْتَرِي Satureia thymbra (S). Sarriette de Crète (F). Savory
of Crete (E). Kretisches Bohnenkraut (D). Santo-
reggia verticillata, Tragoriano (I).

نوع من النَدَغ الطبي الممر . عشته نجمة صغيرة الحجم .
أوراقه ضمية التجميع صغيرة القد ، نصلها سناني الشكل
خلل البصرة الرمداء اللون . أزهاره ثلاثية التجميع بنفسجية
اللون وريدة اللونج || أزهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٨٧٠١ - نَدَغ الْجَبَل * ، زُوْبَاع الَبَر ، صَعْتَر الجبل Satureia montana (S).
Sarriette montagnarde (F).

نوع من النَدَغ الطبي الممر . مجلته تملو من ٤ الى ٨٠
سم . ساقه خشبية فراءه . أوراقه سنانية مستطيلة مدببة
المنقصة . نصلها جامد الصفحة الالامه مهدب المختار .
أزهاره وريدة اللون او بنفسجية || تنوره يستمر من
تموز الى ايلول .

٢٨٧٠٢ - نَدَغ بُسْتَانِي * ، زُوْبَاع ، صَعْتَر الَبَر Satureia hortensis (S). Sarriette des jardins (F).
Summer savory (E). Gartenbohnenkraut (D). San-
toreggia, Timbra, Cunilia (I).

نوع من النَدَغ اهلل يكثر من النباتات الطبية
الجزيلة النفع العديدة الفوائد الصحية وهو من التوابل
المستحبة الطعم والورف . أوراقه سنانية النصل ، رطلة

ثوبه الى النبي الاصل . رأسه كسني اللون اسود المحالج .
محسره الى الكسني يمتدح خط ابيض يملو العين . رذائله
وظهره وجناحاه صبيزه ونبه الى النبي الاصل يملو شمع
عائق . زوره اخبر ابيض . صدره الى الفبرة البنية . خلفه
عنه بنية . ساقه واخر الحلب وهو ما دعى الى تلقيبه « باني
شوارب » || الاثني اصفر قدماً من الذكر وابنت ثوباً منه ||
يألف المقاصب والمآسل والأجام وضفاف مجاري الماء .
تفريده صداح لطيف متباين الانغام القصيرة || يذئن
عشه في الآجام والمقاصب على ارتفاع من عن سطح المتع
او التربة || الاثني تحضن ثلاث مرات في السنة . حشيتاً
من ٣ الى ٥ بيضات ترعها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً ||
قوته الحشرات الجنبعة اغصنها الفرائش والذباب والحلوم ثم
اليدان والبراق || يعتبر من الصافير النافعة .

٢٨٦٩٦ - نَدَدَة Photophile (F).
Photophilous (E).
نمت تفريري يطلق على كل حيوان او نبات لا يعيش الا
في النور .

٢٨٦٩٧ - نَدَاكَة البُسْر * ٥ ، نَارِيكَة البُسْر
Ephestia calidella (S). Pyrale des dattes (F).
فراشة من النارات صغيرة القد غراء اللون مجلطة بالاسود .
يرقها دقيقة تحيلة بجوية الثوب تفرض البسر وتطبه .

٢٨٦٩٨ - نَدَاكَة الشَّيْب * ٥ ، نَارِيكَة الشَّيْب
Ephestia elutella (S).
Pyrale des tabacs, Pyrale des fruits secs, Teigne
du cacao (F). Tobacco moth, Cacao moth, Currant
moth (E). Dörrobstzünsler, Kakaomotte, Hen-
motte (D).

فراشة صغيرة القد من فصيلة التاربات ، بسطها نحو ١٧ م .
ورشناها الاماميان الى الكعبة الزرقاء المواج ، ورشناها
الخلفيان الى الريدة . رقبها صغيرة دقيقة رمداء اللون تعيش
على غطت الثمار المجففة والتبغ والبسكوت وأوراق التبغ
الخالقة الخزونة || اسيالها الحولية وهي مرقطة بموايل المناع
تأويح من ٣ الى ٥ .

٢٨٦٩٩ - نَدَاكَة الدَّقِيق * ٥ ، نَارِيكَة الدَّقِيق
الغَبَرَاء Ephestia kuehnelia (S).
Pyrale de la farine (F). Mediterranean flour moth
(E). Mehimotte (D).

فراشة صغيرة القد من فصيلة التاربات . بسطها نحو ١ م .
ورشناها الاماميان الى السرة الخنطية يمتدحها تجديس
وتنجيح . ورشناها الخلفيان مهدبا المختار ثوبها الى البياض
الاخضر يملو شعاع اشقر . اسيالها الحولية متدنية ، تكثر في
الاماكن الحارة وتقتل في البادية . رقبها دقيقة الجسم ،
حنطية اللون سوداء الرأس ، تعيش على مختلف أنواع الدقيق .

٢٨٦٩٠ - نَدَاكَة ٥ ، نَدَغ ٥ ، كَيْسِيكَا حَيَّة Blochimie (F). Blochemistry (E).

قسم من علم الكيمياء يبحث في تفاعلات المادة الحية .

٢٨٦٩١ - نَدَاكِل Oligo-éléments (F).
Trace elements (E).

تدريج دائر . اسم يطلق على العناصر التي تدخل في
المركبات العضوية والنباتية بكميات متناهية الصغر كما
هي الحال في اليود واليوتان والزنك والنيكل والحديد



نَدَاكَة البسر



نَدَاكَة الشَّيْب



نَدَاكَة الدَّقِيق



نَدَاكَة الدَّقِيق



نَدَغ اِكْرِيتِي



نَدَغ الجبل



نَدَغ بَسْتَانِي



ندوة



ندابة مبدولة



نرجس



نرجس أخضر



نرجس اسلي



نرجس الشعراء

تطول من ٤ الى ٧ م. ازهارها صفيرة ولقد خضرها اللون تنور خلال شهر حزيران . ثمارها عتية قدراها قدر الحصة الصغيرة لوها الى الحرة البرتقالية المالح .

٢٨٧١٤ - نرجسين *
Neritina (S).
Nérítine (F). Neritina (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات معليات الارجل وفضاية القرصيات . انواعها المعروفة نحو ١٥٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة . منظرها نيري ومتين وبضها عمري . جميعها مفرسة || اصداؤها مثبانية الاشكال ، يكثر ثوبا الشكل البرمي المنصرف القليل الحلازة المحصورة في الاغقاب . جميعها ملونة ، قل فيها اللون السوي وكثر التصليح والتجديد والرنجة والزينة .

٢٨٧١٥ - نرجيني *
Nérictique (F).
نمت ثمريني يطلق على كل منطقة رسوبية تدمرها المياه ولا يتجاوز غورها ٢٠٠ م .

٢٨٧١٦ - نرجيس ، قند *
Narcissus (S).
Narcisse (F).

جنس نباتات بصلية حولية سبروتية من فصيلة النرجسيات . انواعها وضروبه واصرامه كثيرة البلد . ازهارها فواصة العرف لاقياسة التجميع منها الفردية والثنائية والثلاثية والارباعية حتى العشارية . وفي تركيز على شراخ اجويل يطول ذرات قصير بسيط تحسن توزيع لاقياس الشكل منه القسيمي والبروتي والجبري والولولي . اوراقه قرصية الانتساب ، قندية التصل ، مستطيلة || يعيش ويوجد في جميع الاروبة الزراعية ولا يخفى سوى فوط الاندماج وكثرة الرطوبة .

٢٨٧١٧ - نرجيس أخضر *
Narcissus viridiflorus (S). Narcisse vert (F).

نوع من النرجس المالح . اوراقه قرصية الانتساب ، ضروبه خضراصة الزهري دقيق ونحيل . ازهاره عطرية الرائحة ، روية البتلات الذهبية الخضراء اللون . وفي لاقياسة التجميع يراوح مدحها من ١ الى ٤ . توجعها دلالية الشكل || ينور في تشرين الثاني .

٢٨٧١٨ - نرجيس اسكي * ، جنكوبل *
Narcissus jonquilla (S). Jonquille (F). Jonquil (E).
Jonquillen (D). Giunchiglia, Narciso d'Oriente (I).

نوع من النرجس السبروتي . ضروبه واصرامه كثيرة البلد . اوراقه قرصية الانتساب نصلها اسطوانتي الشكل ، محد الصفحة ، يطول من ١٥ الى ٣٠ سم . شراخه الزهري دقيق القصبي يطول نحو ٣٠ سم . ينتهي بقصة من الازهار يراوح مدحها من ٢ الى ٦ ، توجعها كروي الشكل ، رائحتها فواصة العرف البرتقالي ، لوها الى الصغار الحاقق . ينور في نيسان .

٢٨٧١٩ - نرجيس الامازون *
نوع نضري الامازون ، اطليه .

٢٨٧٢٠ - نرجيس الشعراء * ، عكوف *
Narcissus poeticus (S). Narcisse des poètes, Herbe à la vierge, Claudinette, Moulin à vent (F). Poet's daffodil (E). Dichter Narcisse (D). Narciso dei poeti, Fior maggi (I).

نوع من النرجس السبروتي . ضروبه كثيرة البلد . اوراقه

الصفحة ، قائمة الخضار . ازهارها صفيرة القند يضاء اللون او ودية || تنوره يستمر من تموز الى تشرين الاول .

٢٨٧١٣ - ندية *
في البرونيم ، اطليه .

٢٨٧١٤ - ندوة *
Cressa (S). Cresse (F).
Rosin weed (E). Harzkraut (D). Cressa (I).

جنس نباتات عشبية برية ممرسة من فصيلة البقوليات . انواعها المعروفة ثمانية منها سواحل البلاد الحارة من الملين القديم والجديد . ازهارها عديدة الالوان عادية العرف .

٢٨٧١٥ - ندوة زراعية *
Comica agricole (F).
Agricultural committee or show (E).

كل جمعية زراعية تعمل على انتشار الزراعة العملية الصحيحة .

٢٨٧١٦ - ندوة عسكية *
في الارق ، اطليه .

٢٨٧١٧ - ندود *
Phototropique (F).
Phototropic (E).

ما هو منوط بالند .

٢٨٧١٨ - ندى *
Rosée (F). Dew (E).

رذاذ يتكاثف بسبب الرضاء على النباتات والاشياء الموجودة في الغلا || وفي التخصيص يطلق الذي على ما سقط من بلل آخر الليل وما اذني يسقط اوله فهو الندى .

٢٨٧١٩ - ندى البحر *
Romarin (F).
هو حصا البان ، اطليه .

٢٨٧٢٠ - ندودة مبدولة * ، دودة السند *
Nadass oboleta (S).
الصبرية

فراشة من فصيلة البطيئات ، صفيرة القند طولها نحو ٢٢ م . نوجها الى الخطي الربي . اجنتها موشة بثلاثة خطوط مفرصة متعرجة لوها الى السمرة الداكنة . زياناها مشطية الشكل . الانثى اكبر حجماً من الذكر وافتح لوناً . تمتع مكثها الأخضر اللون على فروع واغصان السند ينقث برفات تلهم الاوراق وتعمل الاشجار ثم تلجج شراخ ، اسطوانية الشكل ، مستديرة القطرين ، دقيقة الوسط ، خيطي سريري اسمر ، تبيت فيها وتتحول الى حذوة || اما افرقة فسراء اللون ، حلبية القشار يغطيها غطان ملونان لوها الى البرتقالي وتحمل في كل من حلفاتها الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والحادية عشرة غدة جرابية عشوة بالحلب الاسود اللثقي تستعمله للدفاع عن النفس ليحلب جلد الجسم الذي يلسق به .

٢٨٧٢١ - نديان *
هو التينمان ، اطليه .

٢٨٧٢٢ - ندية *
Cicatricule (F).
Cicatrice, Tread (E).

الندبة علامة يضاء تشاهد على عرقيل البية ، اي صفارها ، يتكون منها الجزء البروتوبلاسمي حيث تلتا الجرثومة الحية مزكوة كانت او غير مزكوة .

٢٨٧٢٣ - نوريلا *
Nertora (S). Nercère (F).

جنس نباتات عشبية ممرسة وسولية من فصيلة الفويات . انواعها المعروفة قليلة . مهمها بلاد زيلندا الجديدة . سوقها مشوفة تملو من ٥ الى ١٠ سم . اوراقها يضيئة التصل

الصفار البرتقالي. غروب وأصامره الزراعية حديثة
أوراقها استطالة الشراخ ولون الأزهر.

٢٨٧٢٧ - نرجس نسيجي * هو الزئير ، اطلبه .

٢٨٧٢٨ - نرجس بقطوب *

Sprekelia formosissima (S). *Sprékélie magnifica*,
Lis St. Jacques, *Amaryllis à fleur en croix* (F). *Jacobaan lily*, *St. Jame's-cross lily* (E). *Echte Jakobillie* (D). *Giglio di St. Giacomo*, *Croce di St. Giacomo* (I).
نبات يصل من فصيلة النرجسيات يزرع للزينة. أوراقه
مزودة الصنف ، قرصية الالتشاب ، عصفية الشكل
تظهر بعد الإزهار . أزهاره مركب من زهرة كبيرة واحدة
ترتكز على شراخ يعلو نحو ٦٠ سم. بتلاتها متدلية تطول
نحو ١٠ سم. لونها أبيض المخمر القزينة العاقبة. زراعتها
لا تتطلب حناية خاصة إنما يرغب في الأرضة القليلة
الانجماع .

٢٨٧٢٩ - نرجسيات

Amaryllidaceae (S). *Amaryllidaceae* (E).
فصيلة نباتية من وحيات الفلقة . أجناسها وأنواعها كثيرة
العدد منتشرة في جميع اصقاع العالم ، أشهر أجناسها
النرجس والنرجوس والأماريلس والباهرة .

٢٨٧٣٠ - نرجس *

Hippeastrum (S). *Hippeastrum* (F).
جلس نباتات بصلية عشبية من فصيلة النرجسيات . أنواعه
وضروبه عديدة . أوراقها قرصية الالتشاب ، قديمة الشكل.
شدايتها الزهرية مجوفة . أزهارها حامية وبحورية متدلية ،
قبة القالب ، سداسية البتلات ، عديدة الألوان المختلفة
التي تراوح من الأبيض إلى الأحمر القرمزي || أعرف
أنواعه وأشهرها ما يتبع .

٢٨٧٣١ - نرجس أرجواني

Hippeastrum rutilum (S). *Hippeastrum écarlate* (F).
نوع من النرجس البروتي . يصلته ولدية الجلود . أوراقه
مستعرضة حيلة الخضار الزاهي تطول نحو ٣٠ سم. شراخه
الزهرى يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أزهاره ثنائية التجميع ،
مستطرفة الارتكاز ، حاملة العرف ، ارجوانية اللون .
تنوره يستمر طوالم فصل الربيع .

٢٨٧٣٢ - نرجس أميري

Hippeastrum sulcum (S). *Hippeastrum princier* (F).
نوع من النرجس البروتي . هذه البرازيل . أوراقه
عديدة حيلة الخضار تطول نحو ٤٠ سم. شراخه الزهرى
يعلو نحو ٥٠ سم. ينتهي بزهتين كبيرتين لونهما إلى الآخر
المضلع بالجوي أما التويج فاحضر اللون ، مذهب التهديد .
تنوره يستمر طوالم شهر كانون .

٢٨٧٣٣ - نرجس الملكة كارولين

Hippeastrum réginae (S). *Hippeastrum de la reine Caroline* (F).
نوع من النرجس الجانح . أوراقه عديدة مستطيلة النصل
التيق . شراخه الزهرى يعلو من ٥٠ إلى ٦٠ سم. أزهاره
وردية التجميع كبيرة اللد ارجوانية اللون يتوسط تويجها
بحجر خضر || تنوره يستمر من أيار إلى تموز .

٢٨٧٣٤ - نرجس ببحاني

Hippeastrum psittacium (S). *Hippeastrum perroquet* (F).
نوع من النرجس البروتي الشائع الزراعة . أوراقه خضراء

قديمة مستطيلة . شراخه الزهرى يعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم.
ينتهي بزهرة وسيدة ، كبيرة اللد ، عطرية الرائحة ،
بيضاء اللون ، ترتكز على تويج أسفر القالب ، آخر الإطراف .
ينور في الربيع .

٢٨٧٣١ - نرجس برّي * ، نرجس جبلي ،

سيراس

Narcissus pseudonarcissus, *N. sylvestris* (S). *Narcisse sauvage*, *N. trompette*, *N. des prés*, *Porlon*, *Ciochette des bois*, *Coucou*, *Jeannette* (F). *Wild narcissus*, *Daffodil*, *Lent lily* (E). *Gemeine Narzisse* (D). *Narciso del boschi*, *N. falso*, *Tromboncino* (I).
نوع من النرجس البروتي المليل . أوراقه قرصية
الالتشاب ، خاسية أو سداسية المدد . نصلها منتصب
الصفيحة المنسجة . شراخه الزهرى يعلو نحو ٣٠ سم.
ينتهي بزهتين كبيرتين بوقية التويج لونهما إلى الصفار
الكبري || ينور في آذار . يعيش في جميع المواع
والأرضة .

٢٨٧٣٢ - نرجس شرقي * ، مضطرب

Narcissus orientalis, *N. tazetta* (S). *Narcisse caszette*, *N. à bouquet*, *N. de Constantinople* (F). *French daffodil*, *Polyanthus narcissus* (E). *Tazetten-Narzisse* (D). *Narciso a mazzetto*, *Tazetta* (I).
نوع من النرجس البروتي المليل . غروب وأصامره
لا تقل من ١٢٠ سم. جميعها من نباتات حوض البحر المتوسط .
أوراقه قرصية الالتشاب قديمة النصل البحري الخضر
الغليل التخديد . شراخه الزهرى قوي القصبة يعلو من
٣٠ إلى ٥٠ سم. ينتهي بضمة من الأزهر . أزهاره مستطيلة
الان من متدلية ، متوسطة الحجم ، لونها إلى الأبيض الأصفر
المواج ، عليها ذكي الرائحة الفواحة || ينور في الربيع .

٢٨٧٣٣ - نرجس عطري * ، جبراء

Narcissus odoratus (S). *Narcisse odorant*, *Campanella*, *jonquille campanella* (F). *Campanella jonquille* (E). *Wohriechende Narzisse* (D). *Girscapo*, *Gracoli* (I).
نوع من النرجس البروتي الشائع الاستعمال الزاهي .
أوراقه ميزانية الشكل ، حيلة الخضار الزاهي . أزهاره
ثنائية أو رباعية التجميع ، ذكية العرف ، صفراء اللون ، ترتكز
على تويج قسي الشكل بكامل حامة الشراخ الذي يعلو
نحو ٣٥ سم. || ينور من آذار إلى نيسان .

٢٨٧٣٤ - نرجس عتكيبي

Pancratier (F).
هي الحلفاء ، من النرجسيات ، أطلبها .

٢٨٧٣٥ - نرجس مضطرب

Narcissus serotinus (S). *Narcisse tardif* (F).
نوع من النرجس الجانح المشاعر . أوراقه خيلية الشكل
رأوح عددان من ١ إلى ٣ ، شراخه الزهرى دقيق ونحيل
يعلو من ١٠ إلى ٢٥ سم. ينتهي بزهرة وسيدة كبيرة
اللقد ، عطرية الرائحة ، بيضاء اللون ، صفراء التويج . ينور
في تشرين .

٢٨٧٣٦ - نرجس مدسي

Narcissus bulbocodium, *Corbularia bulbocodium* (F). *Narcisse bulbocode*, *Trompette de méduse* (F).
نوع من النرجس البروتي . أوراقه قرصية الالتشاب
قديمة النصل الضيق المستطيل . شراخه يعلو نحو ٣٠ سم.
ينتهي بزهتين كبيرتين . تويجها بوقي الشكل لونها إلى



نرجس برّي نرجس شرقي



نرجس عطري



نرجس مدسي



نرجس مضطرب



نرجس

٢٨٧٤٦ - نُزَّاقَة

النزاق : داء يأخذ الفم فتزود منه حتى تموت .

٢٨٧٤٧ - نُزَّاقَة ، نَسَّاقَة (F). Conflit (F). Conflit (E).

هو التماس بين مؤيدين . وهو في القانون الإداري خلاف بين محكمتين على اختصاصهما في النظر بدمى واحدة .



نَزَّاقَة مَبْلُور

٢٨٧٤٨ - نُزَّاقَة (F). Litige (F). Litigation (E).

خصومة تقضي إلى رفع دعوى .

٢٨٧٤٩ - نُزَّاقَة

Vampyrus (S).

Vampire (F). Vampire (E).

جنس خفافيش من فصيلة الرقيات . أزعاج عديدة ، موطنها البلاد المعتدلة المشرفة نحو الحارة ، تكثر في أمريكا الجنوبية || أجسامها مغطاة القدر ، رؤوسها شخنة ، مستطيلة . فرائسها بارزة . زواجلها المنقرضة ستانية الشكل ، كبيرة ، ضيقة ، أظفارها لا أثر لها || تأث الأراج الكثيفة والأجبار القنصة . تعيش منفردة . ذكورها تقرب أناثها عند الكرم فقط . مسرحها من الفسق إلى الفجر . قوتها الحشرات والآبار والدم تستتره من مختلف الحيوانات انصمها الحيل والبقير || أرواف أنولاه وأشهرها الزراف المبلور .

٢٨٧٥٠ - نُزَّاقَة مَبْلُور * ، نُزَّاقَة شَجَرِيَّة

Vampyrus spectrum (S). Vampire spectrum, V. commun (F). Great vampire, False vampire (E).

نوع من الزراف ، طول نحو ١٤ سم . وبسته ٣٥ سم . ثوبه خفي للملص كسني الرأس والظهر ، أشبه البعن والحواشي . موطنه فسح الأرياء يم أمريكا الجنوبية ، يكثر في الفويسان . يأث الأراج الكثيفة . قوته الحشرات والآبار والدم .



نَزَّاقَة

٢٨٧٥١ - نُزَّاقَة * ، أُر صَكَن

Antideros anchora (S).

Gazelle à bourse, Sprinbok (F). Sprinbok (E).

نوع من الغزلان . حيوان لبن مجتر أجوف القرن ثنائي الاختلاف . موطنه افريقية الجنوبية . يأث السباب . ملجته الحالي جامعي . إجله بعد بعض الحيات || جسمه ربع لقامة وثيق القوام كسائر الغزلان . ثوبه إلى السرة المخططة . عنقه وصدره وبطنه وقفاء إلى الأبيض التبيي الملوحي . قرنه متتابع الخيد ، ذرب الطرف المنطش || يتنير باللفة وبسرعة المدم ويتنايم القنقر البعيد الجبال .



نَزَّاقَة

٢٨٧٥٢ - نُزَّاقَة *

Pilea (S).

Pilée, Herbe au feu d'artifice (F).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الانجريات . أزعاجها الممرضة عديدة جميعها من نباتات المناطق الاستوائية والحارة . مغطاه معمر وبشها حولي || سوقها قزراء . أرواؤها متعاقبة ، سننقة ، سنانية الشكل ، مستطيلة التنبيب . فصلاها كثيرة المروق والاصحاب ، خلية البشرة ، سننقة الحواشي . أزعاجها وصيدة للسكن ، متفردة التجميع ، ابطية الارتكاز . مأبر أزعاجها الذكورية تنضج عند ادراك الطلع وتقلد به بديا || منها أنوع تزيينية لزروع في المصاري اعصمها الزنقة النخامية (Pilea mucosa) .

الزرن طول نحو ٤٥ سم . شراخه الزهري يعلو من ١٠ إلى ١٠٠ سم . أزعاجه عذرية الارتكاز وغامية ، ثنائية التجميع ، لزها إلى الخضار المصغر والمجنذع بالآخر القرمزي . تنوره يستمر من الربيع إلى الخريف .

٢٨٧٥٣ - نُزَّاقَة جَرَل

Hippestrum bifidum (S). Hippéstrum bifide (F).

نوع من الزرجوس السبروي . أروافه عذرية القرن طول نحو ٣٠ سم . شراخه الزهري يتقدم الأوراق ويعلو من ٢٥ إلى ٣٥ سم . خسته الزنقة تجمع من ٤ إلى ٦ أزعاج . نوزجها مهدب أخضر ، أزعاجه جزلة طول نحو ٥ سم . بتلاتها قزمية القرن يتوسطها خط أخضر || تنوره يستمر من حزيران إلى ايلول .

٢٨٧٥٤ - نُزَّاقَة قَهْدِيَّة

Hippestrum pardinum (S). Hippéstrum Léopard (F).

نوع من الزرجوس الجالنج . أروافه شديدة الخضار طول نحو ٦٠ سم . شراخه الزهري يعلو نحو ٥٠ سم . أزعاجه كبيرة القدر ، حامية القرن ، مرقطة بالأحمر الجوزي || تنوره يستمر طوال شهر شباط .

٢٨٧٥٥ - نُزَّاقَة مَوْشَح

Hippestrum vittatum (S). Hippéstrum à bandes, Amaryllis à bandes, A. de Rouen (F). Banded amaryllis (E). Bandirte Amaryllis (D). Amarill striata (L).

نوع من الزرجوس السبروي الشائع الزراعة . أروافه حامية الخضار طول من ٦٠ إلى ٧٠ سم . وتعرض نحو ٥ سم . شراخه الزهري غليظ القصة الثلثية يعلو من ٩٠ إلى ١٠٠ سم . أزعاجه إلى لياقية التجميع تراوح ضحا من ٤ إلى ٩ أزعاج ، تكثر في الأوساط الفساح ويقل مع اقترابها من الغامة . والزهرة كبيرة القدر مذبذبة البتلات المصنعة وفي مغلقة الزنقة حامية يعلوها توضيح وودي كامل المخطوط . تنوره يستمر من حزيران إلى تموز .

٢٨٧٥٦ - قَرْصِين *

Narcissus (S).

Narcine (F). Narcinus (E).

جنس املاك مجرية من السفقيات وفصيلة الرمادات . أنوعها المعروفة خمسة ، اعطائها بحار المناطق الاستوائية والحارة || أجسامها مستطيلة الطول ، يرمية الشكل ، مبطلة المقدم ، مستطيلة الاذناب || من ميزاتها الخاصة إطلاق ساهها الخيشومية من أربع فجوات مستطيلة مركزها في مقدم الرأس ، فيموتان تحت كل عين || لحومها مأكولة ، معتدلة الصنف .

٢٨٧٥٧ - قَرْصِيَّة

Polythyras sinensis (S).

Polythyras de Chine (F).

شجيرة برية وتزيينية من فصيلة النصفيات . مهداه الصين . ساقها متعينة فرها تملو من ٣ إلى ٥ أمتار . فرودها حجر البهاء . أروافها عابلة منقطة متعاقبة . فصلها قلمي الشكل مالم الصفحة العليا خفي السفلي . أزعاجها وصيدة للسكن ، عادمة التزويج ، صبرية القدر ، يشاه القرن . أزعاجها شوكولي التجميع ، طرفي الارتكاز . شاموها حقبة الشكل ، رباعية المصاريح || تنورها يستمر طوال شهر تموز .

٢٨٧٥٨ - قَرْصَاء ، قَرْو

Salite, Monte, Coite (F).

Covering, Serving, Cotion (E).

النزاء والزر هو جاع الحيوان الجاهل كالحيل والبقير .

٢٨٧٦٣ - نَزْوِيَّة *
Nasonia brevicornis (S).

Nasonia brévicorne (F).
حشرة نافعة من الصفریات النشائية الاجنحة . تصطف
على سطح حشرات ذوات الجناحين اخصها الذباب المنزلي .
طولها يراوح من ٢ الى ٣ سم . توضع الى اخصار الانس
الاسفح للملاج . زباناها قصيرة القذ صولجانية الشكل .

٢٨٧٦٤ - نَزْوِيَّة
Bramée, Bramement (F).
صوت الايالي والظباء .
Belling (E).٢٨٧٦٥ - نَزْوِيَّة
هو النَزْو ، اطلبه .٢٨٧٦٦ - نَزْوِيَّة *
Amphipore (F).
جنس ديدان خمروية مبطولة في معظم بحار العالم .٢٨٧٦٧ - نَزْيَك * ، كَاكُو
Nervalla (S).
Nasique Kakau (F). Noe-ape (E).

قرد وسيد الجنس والنوع من فصيلة الهباريات ، موطنه جزر
الزنج ، يأنف الذبابات القائقة على صفات المنافع ويجاري
الماء الى طول نحو ٧٦ سم ، وذنبه ٧٠ سم . يتميز بانفه
المستطيل الارضية . ثوبه كثيف الشعر الناعم للمس ،
لونه الى الكهبة الصفراء يبق عند الظهر ويمر عند الصدر
والبطن .

٢٨٧٦٨ - نَزْيُونُ الشَّرْوِيَّات *
Nysius senecionis (S). Nysius des senecions (F).

حشرة خاضعة من فصيلة الطقريات ورتبة غنطفات الاجنحة .
حجمها صغير القذ ، بطول نحو ٤ سم . رأسها شبه مربعي
الشوزن ، مذهب اللون . خطمها صغير . صيهاا صغيرتان ،
ناشرتان . زباناها مستطيلتان . كسولها والصلصة العليا
من بطنها الى اصغار المذهب . الصلصة السفلى الى الصرة
السوداء . حشفتها صغيرة محرمة . قشرها شفاف ||
مرسها البراري . تركيب نباتات فصيلة المركبات واخصها
الشرويات .

٢٨٧٦٩ - نَزْيُون *
Nisionades (S).

حشرة من الحسيرييات . فراشها صغيرة القذ ، مردنية
الجسم . حشفتها الثوب ، بطول نحو ٢٦ سم . في الذكور
والاناث . رواشها كسنتية اللون سقم الملاج ، حشفتها الصلصع
والزركشة في الاناث ، يبيض التنقيط في الذكور .
يكثر وجودها من نيسان الى حزيران . رقاتها تركيب معظم
النباتات التريينية دون ان تقتربها شديد الانس .

٢٨٧٧٠ - نَزْيُون تَاج *
Nisionades tages (S).

Nisionades tages, Thanaos tages (F).
Nisionades tages (E).

حشرة من فصيلة الحسيرييات ورتبة حرشقيات الاجنحة .
موطنها معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحارة من الشرق الاذن
واروية . فراشها واثمة قوتها رقيق الاضرار . سرقتها تمش
على اوراق الشندان والايروس واكثر نباتات القرنيات
القراضية || جسمها متوسط القذ بطول نحو ١٣ سم . بسطها
نحو ٢٧ سم . رأسها كسنتية اللون . صيهاا كبيرتان . الزباناها
صولجانان . جوشها وبطنها الى الكسنتية الاسمر الازفح
الملاج || رواشها الذكر الى الكهبة السوداء تملوها في الزوج
الاسامي اربع جدات متقطعة كسنتية اللون ويملونها في
الزوج الخلفي تحضيب كسنتي متفاوت السرة || رواش

٢٨٧٤٨ - نَزْو

النزردوم في فصرق البقرة . يقال بقره نَزْوَرَة اي واردة
الضرع .

٢٨٧٤٩ - نَزْوِ الرَّامِ

Ebourgeonnage, Ebourgeonnement (F). Nipping of
buds, Dis budding (E).
هو التثديع اي انتزاع البرام الزائفة او القاصرة لتحويل
ما تستهلكه من نسج الى سائر ما تبقى من اعضاء النبات
الهوائية .

٢٨٧٥٠ - نَزْوِ المُنَكِيَّة ، اِسْتِمْلَاك

Expropriation
هو سلب المالك ملكه قانونيا لضعف العام على ان يطلع منه
المقدم اليه .

٢٨٧٥١ - نَزْوَة ، نَزْوُوع

Ataviame (F).
Atavism (E).
هي البنج والبنوج اي زعة الاحياء في الرجوع الى الاصل
الذي اصبحت عنه انسائها السابقة او السالفة .

٢٨٧٥٢ - نَزْوَة

بقلة كالخضرة تكون بالاروس وليس لها زهر ولا ثمر ،
تأكلها الابل اذا لم تجد غيرها * (ابو حنيفة) .

٢٨٧٥٣ - نَزْو ، نَزْوِيَّة
Hémorragie (F).
Hæmorrhage (E).

خروج الدم من مجاريه الطبيعية .

٢٨٧٥٤ - نَزْوِ الرَّحْمِ
Métorrhagie (F).
Metrorrhagia (E).

نزف رمي يحصل اثناء الحمل يؤدي الى الاجهاض .

٢٨٧٥٥ - نَزْوَلَة
Hemipenis (F). Hemipenis (E).
الترك قصب الذكر عند التزاوجات كالحيات والسلاحف
والعظاء . وهو يتميز بانوداجيته وباشكاله المختلفة وبتماليه
للدية الاطراف او المسنة التي تمكنه عند انتشارها من
الالتصام وعدم الاطلاق .
٢٨٧٥٦ - نَزْوَل
Produit (F). Produce (E).
النزل والذلة من محاصيل الارض الزراعية .
٢٨٧٥٧ - نَزْوَلَة
Catarrhe (F). Catarrh (E).
التهاب الغشاء المخاطي وسيلانه .
٢٨٧٥٨ - نَزْوَلَة وَالْقِلْدَة
Grippe (F). Influenza (E).
هي الزؤفة والانفلونزا والزؤلة الصدوية الفيروسية ، مرض مد
يصيب الانسان والحيوان .
٢٨٧٥٩ - نَزْوَلَة وَنَزْوِيَّة ، نَزْوَلَة صُدْوِيَّة
Broncho-pneumonie (F). Broncho-pneumonia (E).
مرض التهاب الشعب الرئوية يصيب الانسان والحيوان .
٢٨٧٦٠ - نَزْوَلَة شَعْبِيَّة ، بَرُوَشِيَّة
Bronchite (F). Bronchitis (E).

مرض التهاب الشعب يصيب معظم الحيوانات الداجنة لا سيما
الحمل والضأن .

٢٨٧٦١ - نَزْوُوع
هو النَزَا ، اطلبه
٢٨٧٦٢ - نَزْوُوع
Atavisme (F). Atavism (E).

هي زعة الاحياء في الرجوع الى الاصل الذي اصبحت عنه
انسائها السالفة . اطلب زعة .



نَزْوِيَّة



نَزْيَك



نَزْيُون



نَزْيُون تَاج

٢٨٧٨١ - نِسْبِيَّة
Proportionnalité (F).
Proportionality (E).
حالة الأعداد أو الأشياء المتناسبة فيما بينها .

٢٨٧٨٢ - نِسْه * و نِسْه
Nyssa (S).
Nyssa, Tupélo (F). Tupélo tree (E). Tupelobaum (D). Nissa (I).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة النسيات . أنواعها المعروفة قليلة ، جميعها أشجار و شجيرات عابلة . جذورها حشة لتعمل امتداد للقليل . سوقها رقيقة منتصبة للأصصان . انشاشها لينة للمادة البيضاء اللون . أوراقها متعاقبة جامدة للتصل للاعم . أزهارها لا نظامية التركيب منها الحشوية الخماسية الاسدية ومنها الذكرية المشاورة الاسدية المتفردية التجميع ومنها الانثوية الثلاثية التورية . ثمارها حصى النواة ، لينة السويك || اعرف أنواعها وأشهرها ما يلي .



نِسْه

٢٨٧٨٣ - نِسْه بَيْضَاء
Nyssa candicans, N. ogeche (S). Tupélo blanchâtre (F).
نوع من النسة ، شجرتها متوسطة القد سريعة النمو تملو من ٦ إلى ١٦ م . أوراقها قصيرة الاعتدال تملو نحو ١٥ سم . نصلها اسفلي الشكل مائل الضمعة العليا على السفلى التي تملو كأنها مغطاة بالرماد الأبيض || عنائده أزهارها الذكرية صغيرة الحجم . أزهارها الانثوية فردية التجميع مزينة الاضواء . ثمارها بيضيه الشكل حواء اللون تملو من ٢ إلى ٤ سم . سوقها حازم العلم . صلبها حصىة التخديد الطولي .

٢٨٧٨٤ - نِسْه جَبَّارَة
Nyssa aquatica, N. uniflora (S). Grand tupélo (F).
نوع من النسة ، شجرتها كبيرة الحجم سريعة النمو ترضب في المناطق والمواقع الرطبة . تملو نحو ٣٠ م . أوراقها كبيرة القد ، أهليلجية الشكل ، مدببة القصبة ، محجورة بثلاثة اسنان كبيرة القد مستقيمة الأطراف ، نصلها مائل الضمعة العليا ، على السفلى . خلقه ثقل التجميع اخبر اللون . أزهارها الانثوية فردية التجميع . ثمارها بيضيه الشكل تملو نحو ٣ سم . لونها الى الزرقه الماعقة .

٢٨٧٨٥ - نِسْه جَبَّارَة
Nyssa sylvatica (S).
Tupélo de montagne (F).
نوع من النسة ، شجرتها كبيرة الحجم سريعة النمو تملو من ١٢ الى ٣٦ متراً . أوراقها مسطيلة الاعتدال تملو نحو ١٢ سم . نصلها أهليلجي الشكل لامع البشرة على سفنحيه . عنائده أزهارها الذكرية مسطيلة . أزهارها الانثوية شفعية التجميع براوح مدعما من ٢ الى ٨ . ثمارها حصىة القد والشكل لونها الى الزرقه الماعقة .



نَسْر

٢٨٧٨٦ - نَسْر *
Amorpha (S). Amorpha (F).
جنس نباتات برية وريينية من فصيلة القرنيات . انواعه المعروفة قليلة جميعها جنبا وشجيرات لاقياسه القالب والبرية . أوراقها ريشية ، وريه التركيب ، عابلة . أزهارها مستحبة الرائحة ، مغلفة التجميع ، بنسجية اللون || اعرف أنواعها وأشهرها ما يلي .

٢٨٧٨٧ - نَسْر أَيْص
Amorpha canescens (S).
Amorpha blanchâtre (F).
نوع من النسر البوروني الأبيض . جنسه صغيرة القد تملو نحو ٩٠ سم . أوراقها تملو نحو ١٠ سم . ورقها

الاثني قريبة الشبه برواشن الذكر إلا أنها اجت مابة || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجبل الأول في نيسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في تموز . تسرح في النهار . تظل بند ظهرها بنحو اربعة اسابيع ويحتج المكان مباحياً على الضفادع السفلى من نصال الأوراق || السرة عند بلوغها الكمال تملو نحو ٢٢ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مستطيف الوسط ، مائل انتشار ، اسمر اللون ، تملو مابة غصراء زرقاء . رأسها اسود . مدنها ورواجبها الى السرة القائمة || طول الكمال الذي يستمر في الجبل الاول نحو ١٥ يوما ، يستمر في الجبل الثاني نحو ١٨ اسبوعاً ويتفشي ضمن صلجة تحجبها السرة بين الاوراق الابدية .

٢٨٧٧١ - نَسْج * و نَسْج *
Lézarde (F).
Crack (E).
انصداع في جدار البناء سببه مرور الزين أو هيب في البليان أو خلل في الهيكل نتج عن ظرف قاصر .

٢٨٧٧٢ - نَسْج *
Délisquent (F).
Delisquent (E).
نمت تعريتي يطلق على الأجسام التي تتأخر من تشرها بطوة الهواء .

٢٨٧٧٣ - نَسْج *
Délisquance (F).
Delisquance (E).
صفة الأجسام التي تتأخر من الرطوبة التي تمتصها أو تكثرها من الهواء .

٢٨٧٧٤ - نَسْج *
طائر له منظر كبير (ابن سيدة) ج . نسايف .

٢٨٧٧٥ - نَسْج * و نَسْج *
Tare, Vanneuse (F). Winnowing-machine (E).
آلة تنظف الحبوب بواسطة تيار هواء يتسلط على غرابيلها المزانة .

٢٨٧٧٦ - نَسْج *
Taxologie (F). Taxology (E).
النساقه علم يبحث في تنسيق جميع معارف البشر .

٢٨٧٧٧ - نَسْج * و نَسْج *
Lignage (F). Lineage (E).
هو القرابة في الآباء خاصة . وهو نومان نسب مستقيم وهو ما كان بين الآباء والأبناء . ونسب عرضي وهو . ما كان بين الاخوة وبنين الاخوة وبنين الاخام . ج . انساب

٢٨٧٧٨ - نَسْج *
Généalogie (F). Genealogy (E).
هو سلسلة نتائج الانسال في الاسرة الواحدة أو العرق الواحد .

٢٨٧٧٩ - نَسْج * هَذَالِيَّة * نِسْجَة غَذَالِيَّة *
Relation nutritive (F). Nutritive relation (E).
هي نسبة للمواد الأرواقية الى غيرها من المواد الغذائية القابلة للمضم في كل علف أو مخنة .

٢٨٧٨٠ - نَسْج * نَسْج * نَسْج *
Proportional (F). Proportional (E).
نمت تعريتي توصف به مناسبات الأشياء المختلفة .

وهو من القواطع يحوب أجواء اسيا الوسطى وأفريقية الشرقية والشيالية وأودية الجنوبية . سره يتألف من ثلاثة إلى ستة أزواج || قوته الجفيف على اختلاف أنواعها وإذا جاع تملأ على اللحم واللحار والطعام || الذكر لا يفارق أنثاه على الحياة . يلدن وكنه بين فروع شجرة دامية على ارتفاع بضعة أقدام من الأرض || أثناء تبيض ريشين كثيرتين لونهما إلى الرماد الطاحل تملو ريشة حمراء . الأخضر يستمر نحو ستة أسابيع تقارب عليه الاثنى والذكر .

٢٨٧٩٤ - نَسْرٌ أَمْرِيكِيٌّ Condor (F). هو الكنتور ، أطليه .

٢٨٧٩٥ - نَسْرٌ طَائِرِ Altaïr (F). Altaïr (F). النسر الطائر ويدعى الطير ، نجم نيز من كوكبة العقاب ، راجع طير .

٢٨٧٩٦ - نَسْرٌ قَطَّاعٌ Condor (F). هو الكنتور ويدعى النسر الأمريكى ، أطليه .

٢٨٧٩٧ - نَسْرٌ قُبْرَانِيٌّ * ، لُسْتُوسٌ Vultur occidentalis (S). Vautour huppé (F). White headed vulture (E). نوع من النسر ، كبير الهامة قدرة قدر نسر الجواء ، ثوبه إلى البياض الإفر الزاوي المايح . قمرص متفرع بقشرة صغيرة زغبية الريش ناصعة البياض . عنقه أخضر الريش الأخضر ، ريشه أصفر باهت || موطنه أفريقية الوسطى . يألف الإخراج ويجاري الماء ، إحقاقه وطباعه لا تختلف من إحقاق وطباع نسر الجواء .

٢٨٧٩٨ - نَسْرٌ وَاقِعٌ Vêga (F). Vega, Wega (E). النسر الواقع نجم نيز لامع من كوكبة القيثارة . يعتبر من ألم نجوم السماء . يجد من الأرض نحو ٢٦ سنة ضوئية . يبدو أن النظام الشمسي بكامله يسير باتجاهه أي أنه يجذبه نحوه .

٢٨٧٩٩ - نَسْرِيَّاتٌ Vulturidae (S). Vulturidés (F). Vulturidae (E). فصيلة من لمة النسود وفئة كواسر النهار وربة الجوارح ، تشمل النسر والرخة والأنوق والقشام والبيئات والسفل . جميعها كبيرة الجثة والسقط . رأسها أصغر أو أخضر . ريشها كبيرة . عنقها أخضر الريش الناعم . أرسافها حادية غلاف أرساف العقبان الكاسات السمرلة . غالبها فريقة لذلك فهي لا تقوى على حمل فريستها كما تشمل العقاب وهذا مما يجعلها تقع على الجيف وتلقا تصيد .

٢٨٨٠٠ - نَسْرِين * ، جُلْنَسْرِين ، وَرْدَبَرِيٌّ ، وَرْدُ السَّيَّاحِ Rosa canina (S). Eglantier, Eglantine, Rose sauvage, Ros des chiens (F). Canker flower, Dog-rose, Dog-briar, Hesperose (E). Hundrose, Hundrose (D). Rosa canina, R. delle siepi, Cinorrodo (I).

نوع من الورد البري . ساقه تملو من مقر إلى ثلاثة أمتار . شوكه متناهي الدرز ، حاد الطرف المحين . وريقاته ورية الشجيع ، مستطيلة الاعتان ، ناشرة العروق والأعصاب . مسنة الحافة . أزهاره خضراء اللون ، ووردة المراج ، مستحبة العرف الذي الرائحة ، بتلاتها رسيدة الصف . نماه نووية

كثيرة البلد البرزي الذي يراوح من ٢١ إلى ٤٩ ، نصلها خلي البثرة على صفحتي السفلى . سنابلها الزهرية مستطيلة . أزهاره يستمر طوال شهر تموز .

٢٨٧٩٨ - نَسْرٌ مُشَجَّرٌ Amorpha fruticosa (S). Amorpha arbuscul, Indigo batar, Faux indigo (F). Bastard indigo (E). Bastard-Indigo, Strauchige Uniform (D). Amorfa, Indaco bastardo, Falso Indaco, Amorosa (I).

نوع من النسر البروتي الشائع الأزراعة . شجيرة كبيرة لقد تملو من ٣ إلى ٤ أمتار . أوراقه مستطيلة الاعتان طولاً نحو ٢٥ سم . وريقاته تد من ١١ إلى ٢١ نصلها يضي الشكل بطول من ٢ إلى ٣ سم . سنابلها الزهرية فية لبة تملو نحو ٢٠ سم . || أزهاره يستمر طوال شهر سزيران .

٢٨٧٩٩ - نَسْرِيَّاتٌ * Agnostoma (S). Nestis (F). جنس اسماك نهيرة من شالكاك الزمانات وفصيلة البوريات . أنواعه المعروفة نحو ١٠ أعطانها أنهر أفريقية الاستوائية || أجسامها أهلية الشكل ، معتدلة التهييط ، طولها من ١٥ إلى ٢٢ سم . رؤوسها صغيرة مغلطحة كرقوس البري . زعانفها الظهرية ثنائية ، الخلفية منها تقابل الشرجية . زعانفها الذيلية كبيرة مغلطحة الأطراف أو قليلة التقدير . أثوابها تراوح من الرمكة المتفاوتة السمرة إلى الشبهة . خضاب رؤوسها وظهورها أبيض من عخاب بطونها الذي يفر عند بعض الأنواع || لحمها متوسطة الصف ، مأكولة .

٢٨٧٩٠ - نَسْرٌ عَظَمَ Epandrea (F). To scatter (E). نصح السباد والقراب والقتل ... أخذاها .

٢٨٧٩١ - نَسْرٌ Fourcheste (F). Frog (E). من أجزاء حافر الخيل وهو القسم البارز من باطن الحافر .

٢٨٧٩٢ - نَسْرٌ Vultur (S). Vautour (F). Vulture (E).

جنس طير من الكواسر ينتمي إلى فصيلة النسريرات . أنواعه قليلة البلد كبيرة الجثة الضخمة . رؤوسها صلح خفر . مناسرها مستطيلة جالسة تنتهي بهرة منسقة حادة . اعتانها زغبية الريش الأغر . قواعد اعتانها مطوقة برائل مهذلة الزغب . سواطعها مستطيلة منفرجة . أذنانها قصيرة مستقيمة . أرسافها قوية حارية || والنسر شره نهم زغب ، إذا وقع على جيفة وأمتلأ منها لم يستطع الطيران حتى يشب ، ولبات متالية يرتفع على أرمها شيئاً فشيئاً || ويقال للنسر عريف الطير . كنيته أبو الإرد وأبو الأصم وأبو مأك وأبو المبال وأبو يحيى . والاثى يقال لها أم قشم . وهي لسراً لانه يسر التي . ويصلته . جمه في القلة النسر وفي الكثرة نسود || أعرف أنواعه وأشهرها نسر الجواء والنسر القنبراني .

٢٨٧٩٣ - نَسْرٌ الْجِرَاءُ * Vultur monachus (S). Vautour moine, V. cendré, V. arrian, Grand vautour (F). Hooded vulture (E).

نوع من النسر ، طولها نحو ١٢٥ سم . وفتحة سبطيه نحو ٢٥٠ سم . ثوبه إلى السمرة الخفيفة البهراء . رأسه أصغر . عنقه أخضر الريش الطاحل . ريشه مستطيل اللون . منسره كبير القد ، حاد البهرة الزرقاء الشديدة الانعقاد .



نيس



نسر الجواء



نسر قنبراني



نسرين

٢٨٨١١ - نِسْفَكَة ، نِسْفَكَة ، نِسْفَكَة ، نِسْفَكَة ،
نِسْفَكَة ، نِسْفَكَة ، نِسْفَكَة ، نِسْفَكَة ،
Basalte (F). Basalt (E).
وقد ترد بالثين بدلا من البين ، هي ججارة الحرة السوداء
ذات النخاريب .

٢٨٨١٢ - نِسْفَكَة ، نِسْفَكَة ، نِسْفَكَة ،
Meulière (F). Millstone grit (E).
صخور صوانية نخرة تستعمل كإحذية .

٢٨٨١٣ - نِسْق شَامِي
النسق الشامي مجموعة كواكب مصطفة على رأس الحية
في كوكبة حور وسية .

٢٨٨١٤ - نِسْق يَمَانِي
النسق اليماني مجموعة كواكب مصطفة تحت هق الحية في
كوكبة حور وسية .

٢٨٨١٥ - نِسْك
Cinnyrus albiventris (F).
هو القنبر الأبيض البطن ، اطلبه .

٢٨٨١٦ - نِسْلَة
Nesla (S). Nesle (F).
جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة الصليبيات .

انواعها المعروفة قليلة الممد منها يمتد من الشرق الأوسط
الى اوروبا || سيقها منتصبه فرعاء . اولائها كاملة .
ازهارها متفردي او متكرولي التجميع . ازهارها صغيرة
يكثر فيها اللون الاصفر || اعرف انواعها واشهرها النسلة
المتكرولة .

٢٨٨١٧ - نِسْلَة عُنْكَرِيَّة
Nesla paniculata (S). Nesle paniculée (F).
نوع من النسلة . عشية برية ، حولية . منها بعض
الاصناف البنيانية ، احصها الجبلية || ساقها فرعاء .
اوراقها متناحية ، منقطة ، رقيقة النصال المستطيلة .
ازهارها متكرولي التجميع . ازهارها صغيرة ، صفراء اللون ||
تتوهرها ربيعي .

٢٨٨١٨ - نِسْتَس
Nisnas (F).
هو حبروس الناب ، اطلبه .

٢٨٨١٩ - نِسْتَسَة
في الطبوط الاخير ، اطلبه .

٢٨٨٢٠ - نِسْتَس
هو القنبر القنبراني ، اطلبه .

٢٨٨٢١ - نِسْرَكَة
Pollate (F).
هي ازهارو الصغير ، اطلبه .

٢٨٨٢٢ - نِسْجَات
Nysacées (F). Nysaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها والوانها قليلة
العدد اشهرها النسة .

٢٨٨٢٣ - نِسْج
Tissu (F). Tissue, Web (E).
الانسجة هي الخامات التي تتكون منها اعضاء الاجسام الحية .
وهي عديدة الانواع المختلفة التركيب والخصائص وتألف
من خلايا ماثلة شكلا وجمعا . || اشهر انواع النسيج
ما يتبع .

٢٨٨٢٤ - نِسْج دُعَامِي
Tissu palissadique (F).
Palissadic tissue (E).
اسم يطلق على النسيج المنطبي الغائم الخلايا المتكسبة
المشودة كما هي الحال في نصال الاوراق .

جوزية القد ، ارجوانية اللون ، لائفة الب ، غنية بالخاص
الاسترطوبي الذي يستعمل عند الحفر .

٢٨٨٠١ - نِسْطَرَان
سمكة توف بلوت المتوسط ، اطلها .

٢٨٨٠٢ - نِسْطُور
Nestors (S).
Nestor (F). Nestor (E).
جنس طير من المتسلقات وفضيلة الببلاوات . انواعه
المعروفة اربعة موطنها زيلنده الجديدة والجزر المحيطية .
ملجتها الحياتي جامي . افواجاها قليلة العدد . تألف
الفايات والمواقع التي تكثر فيها الصقور المتراكبة لانها
تدثر احتشاشا في مخايفها قوتها المواد النباتية واهصبا
الثار النتية والمساقل والنواهي وبعض الحشرات واساريمها ||
اجسامها معتدلة القد تطول من ٤٥ الى ٥٠ سم . اذناها
متوسطة الحجم ، مستديرة الاطراف . الواجها قائمة الالوان
تكثر فيها الشبه السمراء والحمرية الجاوية || الاثني قطع
اربع يهضات تحضها نحو ١٩ يوما بينا الذكر يطول
لها الغذاء .

٢٨٨٠٣ - نِسْطُوك
Nastoc (F).
ألف مأكلي يكثر وجوده في بعض مناطق الصين . يهي
رقة القنبر .

٢٨٨٠٤ - نِسْطُوم
Neostoma (S).
Néostome (F). Neostoma (E).
جنس اسماك بحرية من مقترحات الخافاة ، عديمات السهف ،
كثيرات الشفق . انواعه المعروفة قليلة الممد تعيش في
المناطق الجبلية البعيدة النور ولا تشاهد الا نادرا قرب
البحار والشواطئ || اجسامها مستعرضة القدم ، مستطيلة
المؤخر ، تطول من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اشدائها كثيرة
عظيمة . جلودها عادية السهف . لحوسها مأكولة متوسطة
الصنف .

٢٨٨٠٥ - نِسْغ
Vent du Nord (F). North wind (E).
النسغ اسم ريح الشمال . ويقال ريح نسعية اي شمالية .

٢٨٨٠٦ - نِسْغ
Poignet (F). Wrist (E).
النسغ : المفصل بين الكف والساعد .

٢٨٨٠٧ - نِسْغ
Sève (F). Sap (E).
سائل غذائي يؤمن حياجة غطفت اعضاء ونسج النبات . وهو
على نوعين : نسغ باهل او صاعد او ناقص او وارد ونسغ
كامل او هابط وهو الصادر المنطبي .

٢٨٨٠٨ - نِسْغ بَاهِل ، نِسْغ نَاقِص ، نِسْغ
صاعد
Sève bruta (F). Inorganic sap (E).
هو ما يمتصه النبات من مواد قابلة التمثيل فيوردها الى
الاوراق لتضخيمها وتحريكها الى غذاء .

٢٨٨٠٩ - نِسْغ كَامِل ، نِسْغ هَاطِط
Sève élaborée (F). Elaborate sap (E).
هو ما حضره الاوراق من النسغ الباهل فاصبح كاملا
صالحا لتضخيمه الى الجلود التي توزعه على مختلف اجزاء
النبات .

٢٨٨١٠ - نِسْف
Vannage (F). Winnowing (E).
نفس الحب وغربله بالنسف .



نسطور

Crédit (F). **٢٨٨٤٠ - تَسْيِفَة ، إِشْتِمَاك**
Credit (E).
الزَّام يقطع مصرف أو شخص لمن يطلب منه أن يبيع له استعمال مال معين نظراً للغة التي يشر بها نحو . وقد تطلق اللفظة أيضاً على المال نفسه .

Amidon (F). Starch (E). **٢٨٨٤١ - نَشَاء ، نَشَاء**
النشأ مادة صغوية لا متبلورة ، يضاف اللون ، مادة الطعم والرائحة ، ناعمة للمس ، تلويب في الماء الدافئ . وهو ينتمي ككبريتاً إلى فئة مركبات هيدرات الكربون ويتكون مجهرياً من حبيبات ذرية يختلف شكلها وحجمها باختلاف مصدرها || يوجد النشا في معظم أجزاء النبات وأخصها الأوراق الخضر وكثير في بعض الحبوب والبقول كالحنطة والارز والشعير والقرطم والحمص والفاصوليا والبطاطا والانيام الخ ...

فصية الحنطة تحوي نحو ٧٠ ٪ من النشا
وحبة الارز تحوي نحو ٨٠ ٪ من النشا
ولبوب البطاطا يحوي نحو ٢٥ ٪ من النشا

Météorite (F). Meteorite (E). **٢٨٨٤٢ - لَسَاب**
شذرة معدنية التركيب مصدرها الاجرام السارية . يقال انها من سحَاب النيازك التي تحترق الاجزاء الارضية . راجع نيزك .

Serpent volant (F). **٢٨٨٤٣ - نَسَاب**
نوع من الثمابين يدعى السف ، اطلبه .

٢٨٨٤٤ - نَشَاوَر ، نَشَاوَر
هو الامونياك ، اطلبه .

Vermoulure (F). Worm-hole (E). **٢٨٨٤٥ - نَشَارَة**
حميق الخشب الذي يخرج من الثقوب والانفاق التي تخلدها الحشرات في الاخشاب والاعشاب || وهي أيضاً حميق الخشب الناتج عن النشر .

Osyris blanc (F). **٢٨٨٤٦ - نَشَاس**
لبات زيبية يعرف بأبي ليله ، اطلبه .

Cirro-cumulus **٢٨٨٤٧ - نَشَاص ، نَمْرَكَة**
نوع من الغيوم البهية العالية ، مظهرها كتل صغيرة تشبه القطن المنثوق || يقال صحاب نشاس ويوم نمر .

Dynamique (F). **٢٨٨٤٨ - نَشَاطَة ، دِيْنَمِيْكَ**
Dynamics (E).
هي علم القوى .

٢٨٨٤٩ - نَشَان هو كركدن سويتراً ، اطلبه .

Chromosome **٢٨٨٥٠ - نَشْبَة ، نَشْبَة**
مواد جبرية شكلية نووية معدودة تكون في الخلية اثناء انقسامها . اما عدد النشَب فهو نوعي لا يتغير .

٢٨٨٥١ - نَشَج النشج هو يجري الماء الطبيعي .

Phototactisme (F). **٢٨٨٥٢ - نَشَج**
Phototactism (E).

النشج مدى تأثير النور باعضاء النبات .

Plasmon **٢٨٨٥٣ - نَشْجَة**
الآثرات الوراثي الخارج عن نطق النشج .

Tissu adipeux (F). **٢٨٨٥٥ - نَسِيج شَحْمِي**
Adipose tissue (E).
كل نسيج في الحيوان تحولت خلاياه وسويت فجاً من جراء التسمين .

Tissu conjonctif (F). **٢٨٨٥٦ - نَسِيج نَسَام**
Conjunctive tissue (E).
هو في النبات نسيج الزئ الذي يتكون من خلايا ماعدة التمييز تصف بمقدورها الانسيابي الذي يؤهلها الى الدخول في تركيب مختلف النسيج .

Tissu nerveux (F). **٢٨٨٥٧ - نَسِيج عَصَبِي**
Nervous tissue (E).

Tissu de soutien (F). **٢٨٨٥٨ - نَسِيج عَقْدِي**
Support tissue (E).
هو النسيج النعامي الذي يمد النبات بالصلابة النوية اللازمة .

Tissu musculaire (F). **٢٨٨٥٩ - نَسِيج عَضَلِي**
Muscular tissue (E).

Tissu osseux (F). **٢٨٨٦٠ - نَسِيج عَظَامِي**
Osseous tissue (E).

Tissu cartilagineux (F). **٢٨٨٦١ - نَسِيج غُضْرُوثِي**
Cartilaginous tissue (E).

Tissu de revêtement (F). **٢٨٨٦٢ - نَسِيج كِسَاكِي**
Revetment tissue (E).
هو النسيج الذي يلفغ الاعضاء النباتية الهوائية فيحميها من الجلل والنشاف ويختلف المواضع الخارجية .

Tissu méristématique (F). **٢٨٨٦٣ - نَسِيج مَتَسِي**
Meristematic tissue (E).
كل لبات وهالي يحوي مجموعة من الخلايا غير الممتعة تتكاثر في مناطق معينة ، توجه تخصيصها النسيجي ، تسمى المناطق المنسية . وهي تقسم الى قسمين قسم النسيج المنسية الاولى او الحامية وقسم النسيج المنسية الثانوية او القلبية .

Tissu conducteur (F). **٢٨٨٦٤ - نَسِيج مُوَصِّل**
Conducting tissue (E).
هو النسيج الرئائي والانبوبي الذي يؤمن النقل السريع بين مختلف اعضاء الجسم النباتي .

Textile **٢٨٨٦٥ - نَسِيجِي**
نمت تعريبي توصف به كل مادة يمكن جعلها الى خيوط صالحة للحياكة .

Humidité normale (F). **٢٨٨٦٦ - نَسِيم**
Normal humidity (E).
الرطاب الطبيعي المثالي الذي يكون في سائر المواد الاستهلاكية وهو ما يبرهن عنه بالارطوبية النوية .

Nucelle (F). **٢٨٨٦٧ - نَسِيْلَة**
هي قسرية اطلها .

٢٨٨٦٨ - نَسِيْلَة هي الزوان للممر ، اطلبه .

٢٨٨٦٩ - نَسِيم ، رِيْدَكَة
Breeze, Weak wind (F).
رياح ضعيفة لا تحرك مجراً ولا تعني أمراً . ج. نسام .

٢٨٨٧٢ - نضج الزرع *

Helminthosporium gramineum, Pleospora graminea, Pyrenophora graminea (S). Helminthosporiose des graminées, Maladie des stries de l'orge (F). Stripe disease of barley (E). Streifenkrankheit der gerste (D).

نظر مجهري يصيب النجيليات اغصانها الشعر والحلقة والشليم والدخن والذرة || مظهره الخارجي يقع مسطيلة قديمة الشكل تملو العصف قبيدو عابطة اللون ثم شاحبة وتفتحي بالسمره || يركب الزرع بعد ابداه باربعة او خمسة اسابيع وينتقل من صفة الى اخرى اعل منها حتى السلة فيمتلئ من الطعيف او يسبب اغلاص عقدا . يكافح اما بانتعال بلار جديد خال من فطر المرض او بتطهير البذار الموجود بواسطة الاملاح النحاسية او مركبات الزئبق .

٢٨٨٧٣ - نضج الشعير *

Helminthosporium teres, Pleospora teres, Pyrenophora teres (S). Helminthosporiose de l'orge (F). Net blotch of barley (E). Blattfleckkrankheit der gerste (D).

نظر مجهري يركب القلت وجع انواع الشعير الزراعية والبرية . مظهره الخارجي ، في اول عهده ، يقع مائلة لا تقياسية الشكل والحجم تملو نصل العصف وتستقر بين الاصصاب ، لوينا الى الحطلي الزيتوني اللامع ، ثم تتنسم وتتأخذ شكل المستطيلات || اضراره في الغالب محدودة وقد تبلغ في بعض المراتع الربطة والظروف الخاصة نحو ٥٠ ٪ . يكافح بتطهير البذار بالاملاح الزئبقية او غيرها .

٢٨٨٧٤ - نضج الشوفان *

Helminthosporium avenae, Pyrenophora avenae (S). Helminthosporiose de l'avoine (F).

نظر مجهري يصيب الشوفان ليطيه . مظهره الخارجي يقع صفيحة مستديرة شاحبة اللون ثم مسطحة زاهية عابطة تركب اواسط نصل العصف ثم تمه قلبب ذبوله ويابهس . اضراره في غالب الاحيان زعجية || يكافح بتطهير البذار كغيره من فطر النضج .

٢٨٨٧٥ - نضج

Plantation (F). Planting (E). النصب هو زرع الفراس في التربة . وقد يتم حل عدة اشكال اعماها الرزدة والتخسيس .

٢٨٨٧٦ - نضجة

Plant (F). Young plant, Slip (E). النضجة والذرة والفروسة في كل نبات صغير في تمكه جلوه من استمرار الحياة متفردا .

٢٨٨٧٧ - نضج

Chloroleucite, Chloroplaste, Chloroplastide جسم مشرب الخضيب يوجد في وقت الخلية الفتائية . ج . صابغ .

٢٨٨٧٨ - نضج

Oiseau femelle (F). She-bird (E). النضجة هي المصفورة ، انثى المصفور .

٢٨٨٧٩ - نضجيات الجناح

Hemiptera, Hemipteroides (S). Hémiptères (F). Hémiptera (E). طبقة حشرات من شعبة المليات ، فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد مجتمع الى زئتين : متجانسة الانجسة ومختلفة الانجسة .

Slage (F). Sawing (E).

٢٨٨٥٤ - نضج

هو قطع الخشب بالمشار .

Bulletin (F).

٢٨٨٥٥ - نضجة

٢٨٨٥٦ - نضجة جوية

Bulletin météorologique (F). Weather forecast (E). موزن الاواك الجوية وعولمها التي حصلت في فترة معينة . وقد تيمت ايضا في الاحوال الجوية المرتقبة .

Doer (F). To proportion (E).

٢٨٨٥٧ - نضج

نضج وركز وصاير : حدد مقادير المواد المختلفة بالنسبة الى بعضها . او عين مقدار المادة الفعالة بالنسبة الى كمية محدودة من الماء او غيره .

Dose

٢٨٨٥٨ - نضجة

هي المقدار الكافي من المادة الفعالة .

Dose léthale (F).

٢٨٨٥٩ - نضجة ذاهلة

Lethal dose (E). هي الكمية اللازمة من كل مادة جمالية او سامة لقتل كل كائن بين موصوف .

Déterrage (F).

٢٨٨٦٠ - نضج

هو استخراج المحراث من التراب في آخر اتم .

Micocoulier (F).

٢٨٨٦١ - نضج

هو الميس ، اطلبه .

Fabreoulier (F).

٢٨٨٦٢ - نضج ابيض

هو ميس الجبل ، اطلبه .

Micocoulier oriental (F).

٢٨٨٦٣ - نضج شرقي

هو ميس الشرق ، اطلبه .

Micocoulier de Chine (F).

٢٨٨٦٤ - نضج ميني

هو ميس الصين ، اطلبه .

Anabase (F).

٢٨٨٦٥ - نضجة

هي الاناباز ، اطلبه .

Affleurement (F).

٢٨٨٦٦ - نضج

٢٨٨٦٧ - نضج ضرب من السمك (السان) .

٢٨٨٦٨ - نضج

نبات الرشد من اودته اول ما يبدو حين يصعد الارض .

٢٨٨٦٩ - نضج

التشول : قلة الحرارة .

Odeur naturelle (F).

٢٨٨٧٠ - نضجة

Natural odour (E). هي الرائحة الطبيعية تفوح من الشيء دون واسطة . ج . نشايب .

Pyrenophora (S).

٢٨٨٧١ - نضج

جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة المشويات . تتميز باصنافها السوداء الحليمة المسام . تكاثرها دويوية الشكل مرموقة . ينفثها شعبي التجميع ، نمالي الانكناز ، ونثري الخلية || انواعها الاقتصادية قليلة اشهرها :



نضج الزرع



نضج الشوفان

٢٨٨٩١ - نُضَار ، كَامَلِينَة

Camelina (S).

Caméline (F).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الكامليديات . أنواعه عديدة معظمها بري ، يكثر بين الزروع فيلذها || أشهر أنواعه النصار المزروع .

٢٨٨٩٢ - نُضَار مَزْرُوع * ، كَامَلِينَة مَزْرُوعَة

Camelina sativa, Myagrurn sativum (S). Caméline cultivée, Sésame d'Allemagne (F). Cameline, Gold of pleasure (E). Echter Dotter, Leindotter (D). Camelina, Sessmo di Germania, Dardella (I).

نوع من النصار الاستثاري زرع لبزوره الزيتية الشائعة الاستعمال الصناعي || يشتهر فراءه . أوراقه صغيرة القد ، سنانية النصل الأخضر . أزهاره عقودي التجميع . أزهاره صغيرة ، صفراء اللون ، تنور في أوائل الصيف . ثماره غردلية ، بزورها دقيقة يغيث الشكل رتقالية اللون تحوي نحو ٣٥ ٪ من الزيت الصناعي الذهبي اللون .

٢٨٨٩٣ - نُضَار

Requin-marteau (F).

هو مطراق البحر ، سمكة من القرشيات ، أطولها .

٢٨٨٩٤ - نُضَارِيَّات

Chrysomalidae (S).

Chrysomélidés (F). Chrysomelidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غدديات الأجنحة . اجتماعها وأنواعها بضعة آلاف . معظمها حشرات صغيرة القد . أجسامها ملساء البشرة ، زاهية الألوان . قرونها الاستنشادية عديدة الأشكال فيها الخيطي والحلبي والصورياني والمشاري . أراغها خاصة التكوين ، رباعية المظهر الخارجي . قوتها أوراق والثياب وأزهار النبات . مكثها ثني اللون ، تختلف الأشكال تكثر فيه الاستطالة ، تمتد الأني حل النبات المائل أو تلقيه في التربة قرب العرائل || ريقها خاضعة ، سداسية الأبريل ، عديدة الألوان ، تركب النبات فتقسم الأوراق وتغتر السوق عند جماع التربة وبعضها يركب الجلود || حورياتها صغيرة القد تلصق بشرقتها تصنعها من الطين والمواد العضوية .

٢٨٨٩٥ - نُضَارِيَّةُ الْحَمَاضِ *

Gastrophysa raphani (S). Chrysomée de l'oseille (F).

حشرة من النضاريات . طولها نحو ٥ م . ثوبها إلى الخضار الزردي زاهي الملمح . تظهر في أواخر الربيع وتنتج لطخ مكثها حل الصفحات السفلى من أوراق الحمض لينتفخ خلال شهر أيار عن رقات سمراء اللون نمت تقسم الأوراق وتؤذيها .

٢٨٨٩٦ - نُضَارِيَّةُ الْحَوَرِ * ، لِينَا الْحَوَرِ

Lina populi, Melasoma populi, Chrysomela populi (S). Lina du peuplier (F).

حشرة من النضاريات طولها نحو ١١ م . رأسها ودورها إلى الخضار الأزرق الملمح . خمداهما إلى الحشرة يملؤها عند طريقتها بتيقج أسود . أجسامها الحولية ثلاثة . تركب صغيرة القد ، وردية الجسم ، سوداء الرأس ، تركب أوراق الحور فتقتطع الخشب ولا تترك سوى الإصصاب والشرائين . وقد تصدى على التواهي وعلى الأبرام الغنية تقتضي عليها .

٢٨٨٩٧ - نُضَارِيَّةُ الزُّوَنا

تعرف بأرما مرجناتا ، أطولها .

٢٨٨٩٠ - نُضَارِيَّةُ الْأَجْنَحَةِ

Hémiptère (F). نمت تعريف يعلق على جميع الحشرات التي تنتمي إلى طبقة نصفيات الجناح .

٢٨٨٩١ - نُضَل ، حَاشِيَة ، شَكْرَة ، صَبِيحَة

Limb (F). Limb (E).

هو الجزء المنبسط المستطيل العريض من ورقة النبات .

٢٨٨٩٢ - نُضَلِي

Limbaire (F). Limbaire (E). نمت تعريف يوصف به الأعضاء التي تولد النصل كقروك خلايا نصلية .

٢٨٨٩٣ - نُضَلُ الْحَافِرِ

Avalure (F). Sloughing of the horny part of the (E). عارض يصيب الحافر فيسبب هبوطه في الخيل .

٢٨٨٩٤ - نُضِي *

Sasa (S).

Bambou (F). Bambou (E). جنس نباتات قصيرة برية وزراعية من عائلة الخيزرانيات ونصيلة النجيليات . أنواعه عديدة ترطب في المواقع الرطبة والأتربة قليلة الاندماج الغنية بالمواد العضوية || أشهر أنواعه ما يتبع .

٢٨٨٩٥ - نُضِي أَبْلَق

Sasa variegata (S).

Bambou bandé (F). نوع من النضي يعلو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم . أوراقه مزدوجة النصف ، نصلها مائل الصفحة العليا الخضراء اللون ، خلي النصل المبلقة بالأبيض || يرطب في الأتربة الرطبة المتوسطة الاندماج .

٢٨٨٩٦ - نُضِي مَذْهَب

Sasa auricoma (S).

Bambou à chevelure dorée (F). نوع من النضي يعلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم . سلاحياته بنفسجية اللون . أوراقه تطول من ١٢ إلى ١٧ سم . نصلها خلي البشرة حل صفحته ، يعلو توسيع ذهبي || يرطب في الأتربة الرملية الدالية الرطبة .

٢٨٨٩٧ - نُضِي مَزْدُوجُ التَّصْفِيفِ

Sasa disticha, Bambusa nana (S). Bambou distique (F).

نوع من النضي يعلو من ٣٠ إلى ٩٠ سم . أوراقه خفيفة مستطيلة مزدوجة التصفيف تطول من ٤٥ إلى ٦٠ سم . وترطب من ٦ إلى ١٠ سم . نصلها أخضر الصفحة السفلى مخضب العليا ، خضبا أنجواني يمتد عند الأزراب . يرطب في الأتربة العميقة الرطبة المتوسطة الاندماج .

٢٨٨٩٨ - نُضِي يَابَانِي

Sasa japonica (S).

Bambou japonais (F). نوع من النضي يعلو من المترين إلى الخمسة أمتار . سلاحياته إلى الخضار الأصفر . أوراقه تطول من ١٠ إلى ٢٥ سم . وترطب من ٣ إلى ٥ سم . نصلها مسن الحافة ، مائل الصفحة العليا المائلة الخضار . خلي السفلى الرقاع اللون . يرطب في الأتربة الخفيفة الغنية الرطبة .

٢٨٨٩٩ - نُضِيب

Part, Quote-part (F).

Share, Part, Portion (E). هو جزء من ذمة مالية يختص بها أحد المختارين . وهو حصة المرء في شيء أو مال مشاع .

٢٨٨٩٠ - نُضِي * ، وَشَكَل

Suint (F).

Grease of wool, Yolk (E). هو نضيف الصوف أخضر صوف الكرم .



ثلاثة خطوط يمر تلوها كشاش من الحلب الدقيق ||
طور الاكمال يستمر نحو اربعة اسابيع ويتقني ضمن
جرباب في التربة .

٢٨٩٠٥ - نُضَارِيَّةٌ مُتَبَرِّجَةٌ

Chrysomela fastuosa (S). *Chrysomèle guindée* (F).
Chrysomela fastuosa (E).

حشرة خاضعة من فصيلة النضاريات ورتبة مفدمات
الاجنسة . تألف البراري التي تكثر فيها نباتات الفصيلة
الخشوية وأخصها الصمغ . خاضعها تعيش على الاوراق
والتواقي . يرقاتها تركب الاوراق || جسمها صغير القد
يطول من ٦ الى ٧ م . ثوبها الى الخفسار الاسفع المواج
يعمل في الظهوران فتحش طول ارجواني وازرق . رأسها
كبير الجرم . عينها صغيرتان بارتقان . زباناها غبيطان ،
دقيقان . ظهرانها مستدير الزوايا والظفران اللاحف .
مخدها متنايتا التفتيط الخفيف . ارسافها رباعية المقل
الظاهرة || الاثنى اميز قدام من الذكر وابنت ثوبها منه
واقصر زبانا || لها جيل واحد في الحقل . تظهر الحشرة
الجملانة في اوائل حزيران وتبقى حتى اواسط ايلول . تخرج
في النهار وتبيت في الليل || البرقة عند تمام نموا تطول
نحو ١٢ م . جسمها وشي الشكل ، قليل التقويس . ثوبها
مستطيل المقدم ، مستدق المؤخر ، سداسي الروايح . ثوبها
الى السطحة الخشبة المواج . رأسها وشريها ودراجها الى
السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع
يتقني في التربة تحت الجملانة ومنتج الحماوة .



نضارية الصفات الخضراء



نضارية الصفات الزرقاء



نضارية القردة



نضارية القريصات



نضارية انيقة

٢٨٨٩٨ - نُضَارِيَّةُ الصَّفَصَاتِ الْخَضِرَاءِ *

Phylloctecta vitellina (S). *Chrysomèle verte de l'osier* (F).

حشرة من النضاريات . طولها يراوح من ٤ الى ٥ م . ثوبها
الى الخفسار الزبرجدي . تركب مع يرقاتها اوراق وبرايم
الصفصاف فتؤذيها اشد الاذى .

٢٨٨٩٩ - نُضَارِيَّةُ الصَّفَصَاتِ الزَّرْقَاءِ *

Phylloctecta vulgarissima (S). *Chrysomèle bleue de l'osier* (F).

حشرة من النضاريات ، طولها نحو ٥ م . ثوبها الى الزرق
الغامق . تركب مع يرقاتها اوراق الصفصاف فتضرمها
وتقتسم النامي وبرايمها فتؤذيها اشد الاذى .

٢٨٩٠٠ - نُضَارِيَّةُ الصَّلِيصِيَّاتِ

هي الخدوش ، اطليه .

٢٨٩٠١ - نُضَارِيَّةُ الْقِرَّةِ *

Phaedon cochleariae (S). *Chrysomèle du cresson* (F).

حشرة من النضاريات بيضبة الشكل عمودية ، طولها نحو
٤ م . ثوبها الى الزبرجدي يعطو مواج ازرق . زباناها
الى السوداء الفسحي . تركب مع يرقاتها اوراق القرفة تنجملها
كالمسد وتتسدى على اوراق العجل واللفت والمفوف فتضل
فيها فعلها بالقرعة .

٢٨٩٠٢ - نُضَارِيَّةُ الْقَرَصِيَّاتِ * ، رَفِيدٌ ،

Raphidopalpa foveicollis (S). *Raphide*, *Galéruque du melon* (F).

حشرة من النضاريات ، طولها نحو ٧ م . ثوبها الى الحمرة
البرقانية . تعيش على اشباب الرماحي الطبيعية والقصة
والبرسيم . انثاها تلقي بيضها على التربة قرب موائلها ، اخصها
القريصات ، فينتفج المكان من رقات صغيرة تلبية اللون
تركب وتفسر سوق الشمام والطبخ والخيار والكوسى وسائر
نباتات الفصيلة القرصية .

٢٨٩٠٣ - نُضَارِيَّةُ الْكُرْمَةِ

هي رموس الجفنة ، اطليه .

٢٨٩٠٤ - نُضَارِيَّةُ اُنَيْقَةٍ * *Chrysomela polita* (S).

Chrysomèle élégante (F). *Chrysomela polita* (E).

حشرة خاضعة من فصيلة النضاريات ورتبة مفدمات
الاجنسة . تألف المواق الرطبة وفضاف مجاري الماء .
خاضعها ويرقاتها تعيش على جميع انواع الصنع البري
والزراعي فتضخم الاوراق وتؤذيها || جسمها صغير القد
يطول من ٦ الى ٨ م . ثوبها متراكب الالوان كوسلها
الى الشحنة النحاسية الخفساء المواج . ظهرانها الى الشحنة
الصنابية اللامعة المواج . رأسها معتدل الجرم . عينها
صغيرتان . زباناها غبيطان دقيقان . ظهرانها معتدل
الاحاديذاب مستدير المؤخر اللاحف . خدها معتدل
الصلاة ، نظاميتها التفتيط الخفيف . ارسافها رباعية
المقل الظاهرة || الاثنى اميز قدام من الذكر واكد قوفا
منه واقصر زبانا || لها جيل واحد في الحقل . تظهر الحشرة
الجملانة في اواخر الربيع وتبقى حتى اواخر
الصيف . تخرج في النهار || والبرقة عند ادراكها للكمال
المجموعي تطول نحو ١٥ م . جسمها وشي الشكل ،
قليل التقويس ، احمل اللون . رأسها غليظ الجرم اسمر
اللون . رواحيها الى السرة . تحمل في ظهرها ويانبيها

٢٨٩٠٦ - نُضَبٌ

Tarir (F).
To drain, To exhaust (E).

نضب التبع : انقطع مائه . ونضب الماء : غار في الارض .

٢٨٩٠٧ - نُضُجٌ

Plaine mûrissée (F).
Full maturity (E).

هو بلوغ الثمرة كالها الجسوري . يصيرها آخر دور
من ادوار حياتها . والنضج يأتي بعد الادراك والابتاع .

٢٨٩٠٨ - نُضُجٌ

Bassinage (F). *Sprinkling* (E).

هو الاسقاء بالرداذ اي الاسقاء الخفيف .

٢٨٩٠٩ - نُضُجٌ

Pulvérisation (F).
Pulverization (E).

هو رش الماء او اي سائل آخر بواسطة جهاز ضاغط خاص
يقذفه بمنف .

٢٨٩١٠ - نُضَبْدٌ

Stratifier (F). *To stratify* (E).

نضد البذور ، جعل بعضها فوق بعض صفوا متراصفة
متنايئة .

٢٨٩١١ - نُضَفٌ

هو الصمغ البري ، اطليه .

٢٨٩١٢ - نُضَفَكَةٌ

Nauclerus (S).
Nauclère, Milan-hirondelle, Epervier à serpent (F).
جنس طير من صارة الحذاء وفضيلة الصقريات . انواعه
المعروفة قليلة العدد ، تتميز باجسامها الجاه . رؤوسها
صغيرة . اصنافها صغيرة . سواقلها مستطيلة ذلقة الاطراف .
اذنابها شديدة الطول ثاقرة . مناسرها قوية ، منقعة البرة
الحادة . ارسافها قصيرة ، مخالبها قوية ذرية . تألف
الحياة الجاهية سرجا يراوح من ١٥ الى ١٠٠ زوج .
قوتها الحشرات والورغ والسماء والحيات ، تفت اركانها
في فن الاشجار اخصها السنديان والصنوبر . انثاها تضع

وهو سريع النمو ولادراك يحد في الاثرية الكلسية التي لا تصلح للزراعات الاخرى .

٢٨٩١٨ - نَهْشَاشٌ * ، قُنْطَدُ التَّمَلِّ

Echidna (S), Echidné (F), Echidna (E).

جنس حيوانات لبونة حاشرة جامة من وحيدات المسك . انواره المعروفة قليلة ، اعطائها جبال استراليا وغينيا الجديدة . اجسامها مكورة تطول من ٣٠ الى ٣٥ سم . يغلها شوك دقيق كثيف ذوب الاطراف كشوك القنفذ . رؤوسها صغيرة مخروطية الشكل تنتهي بخلم مستطيل كالمنقار . جرائزها مسلمة باظفار قوية حادة تمكئها من الحفر . السنتها مستطيلة دقيقة احادة اندفاعية تمكئها من ارتشاف الحشرات والتمل . تألف الموائل القليلة الادفال . تروح في الليل . هاجرها حاليز مستطيلة عديدة التتابع وسيدة الخلد .

٢٨٩١٩ - نَهْشَوَكَة Fer à cheval (F), Horseshoe (E).
حديقة تمتل بها حوافر الدواب .

٢٨٩٢٠ - نَهْشِي Vierge des équidés (F).
Penis of the equidae (E).
النهي قضيب ذكور الخيل وحر الوحش .

٢٨٩٢١ - نَهْشِي Couche (F), Layer, Stratum (E).
كل ساف مرصوف من التي المنصود .

٢٨٩٢٢ - نَهْشِير Eucharis
جنس نباتات بصلية من فصيلة النرجسيات منها المقد بلاد امريكا الجنوبية . اوارقه المرفوعة قليلة ، مغطاة بري وبضها زبيني . اوراقه قدية الشكل تحدة التصل . شامريه بجققة تنتهي بفسمة من الازهار عطرية العرف الفلج ، جميلة الشكل ، مختلفة الالوان . || اشهر انواره الزينية نصير الامازون .

٢٨٩٢٣ - نَهْشِيرُ الْأَمَازُون * ، نَهْشِيرُ الْأَمَازُون Eucharis amazonica (S), Eucharis de l'Amazone (F), Amazon lily (E), Amazonische Lilie (D), Eucaris (I).
نوع من النصير الزبيني السبروتي . اوراقه قرصية الانتشاب مستطيلة التصل القدي الشكل المتحد الصفة . شراخه الزهري يحمل غصن من الازهار الماجية العطرية العرف يحد في جميع الموائل والاربية ولا يخفى سوى الرطوبة المستحكة .

٢٨٩٢٤ - نَهْشَاة Cupule
هي قم الزهرة والنترة . ج . أنطاه .

٢٨٩٢٥ - نَهْشَاة * ، أُو حَرْمَة Monacanthus (S).
Monacanthé (F), Monacanthus (E).

جنس اسماك بحرية من ملحوبات الفك ، قاسيات الجلد ، تنتمي الى مجموعة التنفري اي عن الماء . انواره المرفوعة حمة اعطائها بحار البلاد الحارة || اجسامها ربعة تطول نحو ٤٠ سم . رؤوسها كبيرة القدي ، مخروطية الشكل ، متوجة بقرن كالخرية ينشأ في القمة . زفافها الصديرة والبطينة والظهرية شائكة . انوثها الى الطحلة السوداء المبقعة والموشحة بالابيض والاصفر والاعصر . زفافها صفراء اللون || لحوها متوسطة الصنف ، مأكلة .

٢٨٩٢٦ - نَهْشَار Epouvantail (F), Scarecrow (E).
هو الجدار ، ينصب في الزرع والمجالز مزيرة لطير والوحش .

من يفتن الى اربع رفات تحضنها بمنوبة الذكور . اصف انواره واشهرها ما يتبع .

٢٨٩١٣ - نَهْشَاة غَرْبِيَّةٌ *

Nauclerus nauclore (S), Nauclore d'Afrique (F).
نوع من النَهْشَاة ، موطنها يشمل معظم اقطار افريقية الجنوبية الشرقية والوسطى . جسمها يطول نحو ٥٥ سم . رأسها رعتها وصلها وبطنها الى البياض الماجي . سقاطها وطورها دنيا الى السود اللامع تملو ماجة غصراء . كسرها اسود اللون . حقة فيها كالكايوت . ارساها كاسية . || تألف الاحراج ويحاري الماء . تحبب البلاد في طلب الرزق . سرها يحد من ١٠ الى ٥٠ زوجا .

٢٨٩١٤ - نَهْشَاة امْرِيكِيَّةٌ *

Nauclerus furcatus (S), Nauclore-martinet, Nauclore d'Amérique (F).
نوع من النَهْشَاة ، موطنها فسيح الاربابا يشمل امريكا الجنوبية والشمالية . جسمها يطول نحو ٥٧ سم . رأسها رعتها وجشها وبطنها الى البياض الثلبي وما تبقى اسود اللون ازرق المراج تملو غصرة صفراء . كسرها عابق السرة . حقة فيها جزوية . ارساها الى الصفراء الاصغر المراج . تألف الاحراج . تحبب البلاد الامريكية في طلب الرزق والمصيف والمضى . سرها يحد من ٢٠ الى ١٠٠ زوج .

٢٨٩١٥ - نَهْمٌ ، سَرَّازَان Fagopyrum (S), Sarrasin
جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة البطيانيات ، سوطها متصببة قليلة الصلابة . اوراقها متعاقبة متفكة ، ناصها قليلة الشكل اهرسية ، خماسية اللوح ، عابقة الضمار . ازهارها عتودي التجميع . ازهارها خشوية ، صغيرة القدي ، خماسية البتلات ، عادمة التويج . ثمارها حقائق لا قياسية الشكل والحجم يكثر فيها الخروطي . بلورها حبة المادة ، دقيقها غذائي شائع الاستعمال في صناعة الماين من طفت الدواجن . || اصف انواره واشهرها مايتبع .


٢٨٩١٦ - نَهْمٌ شَالَعٌ * ، سَرَّازَان شَالَعٌ ، حَنْطَلَةُ سَوْدَاك ، قَمْعُ الْبَقَرِ

Fagopyrum esculentum, Polygonum fagopyrum (S).
Sarrasin commun, S. manger, Blé noir, Bucal, Carabin (F), Buck wheat, Sarrasin corn (E), Buckenweide, Echter Buchweizen (D), Saraceno, Fagopiro, Grano nero, Fraina (I).

نوع من النهم الزراعي ، ساقه متصببة فراء . اوراقه سهية التصل ، مستطيلة الملق ، لاحقة القدي . ازهاره يهنا اللون . حقائقه مخروطية الشكل حادة الزوايا . بلوره سود . وهو سريع النمو لادراك دوره الحياتية تستلزم من ١٨٠٠ الى ١٩٠٠ مرة توتها ينحو ١٠٠ يوم . وهو يحد في جميع الاثرية باستثناء القوية الاندماج الرطبة .

٢٨٩١٧ - نَهْمٌ هِنْدِيٌّ * ، سَرَّازَان تَحْرِيٌّ ، حَنْطَلَةُ تَحْرِيٌّ ، قَمْعُ الْبَقَرِ الْهِنْدِيَّ

Fagopyrum tataricum (S), Sarrasin de Tartarie, S. de Sibérie, S. galeux, Blé de Tartarie (F), Indian wheat, Tatarian buckwheat (E), Grüner Buchweizen (D), Saraceno di Siberia (I).
نوع من النهم الزراعي الملق . ساقه متصببة فراء . اوراقه قليلة التصل ، امحاده حجمة لا حاضرة . ازهار الى الخضار الاصفر . حقائقه رباعية الحروف مستطيلة الشكل . بلوره صغيرة حرة مراء اللون ملغية غزيرة المادة الغذائية .



نصفه افريقية نصفه امريكية



نهم شالغ



نهم هندي



نفساوس



نصير الامازون



نطاح

٢٨٩٣٧ - نَطَاشُ مِصْرِي

Crotalaria segyptica (S). *Crotalaire d'Egypte* (F). *Rattle-box* (E). *Klapperhölse* (D). *Nacchera* (I).
نوع من النطاش المسمى. جنته عشوة القند، فرع الساق، صغيرة الأوراق السنانية اللزدية. اعطاه فسيحة الإرباب تحت من صمرا سينا الى الصمراي المصرية.

٢٨٩٣٨ - نَطَاشَة
Chromosome
هي اللثة والكرموزوم.

٢٨٩٣٩ - نَطَاشُ، طَعْمُ المَزْدَرَعِ

Goût de terroir (F). *Native tang, Raciness* (E).
طعم خاص يملأ طعم بعض المحاصيل الزراعية كالنخيل والتينغ فوشيا بعض الشيء وهو يمدد الى بعض عناصر التربة للامتجاسة الدائمة.

٢٨٩٤٠ - نَطَاشُ
Vin de presse (F).
ما يسيل من عصير العنب وقد تكون غره اذا حسن صنعها فاعصره الصف.

٢٨٩٤١ - نَطُورَة *
Nochura (S).
Nothure (F).

جنس طير من الدجاجيات بفضيلة الزنوفيات. انواحه المروفة سمة منتشرة في جميع بلاد امريكا الجنوبية. شكلها قريب الشبه من النضر. اجسامها متوسطة القند. اذناها جذعة. الاطراف الى الصبهة المشقة والحجمة بالاسود. اصنافها وصنوعها وطبعتها الى الصبهة العناية الزاهرة || قوتها الحشرات والبلور البرية. تألف سواشي النابات. صيدها مرغوب فيه لانها من الطرائق السنية المستعينة الطعم.

٢٨٩٤٢ - نَطِيشَة *
Natica (S).
Natic (F). *Natica* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرضويات مملكات الاربل وفضيلة النطيشات. انواحه الماصرة المروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم. جميعها مفرقة قوتها الرضويات واليدان || اصنافها مائة، شبه كروية الشكل، صلبة القند المحزن اللدب. اجسامها بفضية الشكل، مستعرة الابدية، عريضة القروص المبطعة، ثنائية الاواس المبيضة، كبيرة الاربل || تعيش في الاسمال ويحل رمال الشطوط المضمرة بالمال.

٢٨٩٤٣ - نَطِيشَات *
Naticidae (S).
Naticidae (F). *Naticidae* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرضويات مملكات الاربل وحيوانات الاجهزة. اجناسها وانواعها المروفة عديدة بعضها من متحجرات الاراضي الطباشيرية والبحورية، وبعضها مدامس منتشرة في معظم بحار العالم || اصنافها شبه كروية الشكل، صغيرة القند، قصيرة القروص، قسيحة القروص. اسفلها كبيرة، قرنية للمادة او كلسية، توصد الفتحة عند الحاجة || جميع انواعها مفرقة تقضي على الديدان والرضويات الصغيرة. اعراف اجناسها واشهرها النطيشة.

٢٨٩٤٤ - نِظَام
Alintam
النظام نجم ثير من كوكبة قيطس مركزة على اصل النخيل.

٢٨٩٤٥ - نِظَام، قَائِن
Statut (F). *Status* (E).
هو اتفاق او قانون يضمن حسن انتظام العمل.

٢٨٩٢٧ - نَطَاشُ الكُرْوِيل *

Lestoteuthis Kamohachica (S).
Lestoteuthis de Kameschat (F).

حيوان بحري مفرس يسجد الجنس والنوع من الرضويات واسيات الاربل، مزدوجات الاخياش، عشاريات الجرامز وفصيلة الطردوسيات. اعطاه جيزر الكورويل || جسمه مخروطي الشكل، كبير القند، يطيل نحو حصة اطار. زنتاه طرقتان، كبيرتان، مزوانيتان. جرامزه مجسمة، حلقة، لامساوية الطول ونها زوج لتقيف شديد الطول ينتهي برسي سنانية الشكل تملؤها حناجم وكلايب.

٢٨٩٢٨ - نِظَاطُ اخضر

هو القيوط الاخضر، اطلبه.

٢٨٩٢٩ - نِظَاطَات

فصيلة حشرات من مملكات الانجثة تعرف بالساوليات، راجعها.

٢٨٩٣٠ - نِظَاق، نِظَاقُ الجَزْوَءِ

Baudrier d'Orion (F). *Alniak* (E).

النظاق او نطاق الجوزاء ثلاثة نجم مستعرة وباصة في وسط الجوزاء تسبها العرب النظم وهي مثل في الانتظام والانتظام.

٢٨٩٣١ - نِظَاح

التلح نجم ثير من كوكبة برج الحمل.

٢٨٩٣٢ - نِظَرْنُوس *

Notornis (S).
Notornis (F). *Notornis* (E).

جنس طير من طوالب الساق وفضيلة النطليات. انواحه المروفة ستة افترض حصة منها وبقي نوع واحد يسير في طريق رفاة. موطنه غابات نيوزيلندا واوراجيا || جسمه يضاهي اجسام المحشيات لكنه صغير الجناح، عديم الذنب، ضلع المغاد القصير المخروطي الشكل || قوته الاعتباب والبلور والحبوب البرية. مسرعه عند الصباح وتبل الغروب. يمدو بسرعة تالقة ولا يستطيع الطيران || لحمه جيد الصنف مرغوب فيه.

٢٨٩٣٣ - نِظَرُون

هو ملح البارود، اطلبه.

٢٨٩٣٤ - نِظَرُونِي

Nitreux (F). *Nitrous* (E).
نعت تمريني يدل على جود النطرون، ككوك حامض نطروني وتربا نطروني.

٢٨٩٣٥ - نِطَاش *

Crotalaria (S). *Crotalaire* (F).
جنس نباتات حولية وصمرة من فصيلة القرنيات الفراسية. انواعه زهاء ٣٠٠. جميعها جنات واعشاب برية. منها البلاد الحارة من المابين القدم والجديدة. اوراقها وانفاتها مرصوة متلفعا للماشية. ازهارها مفرقة تجرستها النحل.

٢٨٩٣٦ - نِطَاشُ البَنَغَالِ

Crotalaria juncea (S). *Crotalaire du Bengale, Chanvrier du Bengale* (F). *Bengal hemp plant, Sunn hemp plant* (E). *Bengalischer Hanf* (D). *Nacchera del Bengala* (I).
نوع من النطاش يكثر في بعض مناطق الهند اعطاه النبال. ساقه اسلية الشكل يستعملون لابلها استعمال القتب.



نطرس



نطش



نطرون



نطيشة

Paranucléines (F). **٢٨٩٦٢ - تَطْيِرَةُ النَّوَالِين**

Zygomycètes (F). **٢٨٩٦٣ - تَطْيِيرِيَّات**
مركبة من رتبة الفطور البيضاء، أجناسها وأناقها كثيرة
العدد تنقسم إلى فصليتين: المبيضات والبغليات.

Corbillat, Corbillot (F). **٢٨٩٦٤ - تَعَابِب**
فرخ الغرب.

Serinus syriacus (S). Serin de Syrie (F). Syrian
canary (E). **٢٨٩٦٥ - تَعَار *** ، نَعَرِ سُوْرِي

نوع من النمر حسن الصوت يكثر وجوده في البلاد القبلية
السورية. طوله نحو ١٢ سم. ثوبه برنجمي اللون يطغى
ظهوره وجناحه مشعشع أسمر. زودو وبهوشته وبلته إلى
الصغار البرتقالي المواجه لعلو ريشة مستطيلة سمراء. متعار
وصدقة عينه وريشاه سمير. || يألف الحداثق والجناش
والنبايات القريبة من الممران. يأن عشه في الأشجار الغناء.
اقتاد تضع من ٤ إلى ٥ بيضات تحضنها وسدا نحو ١٣
يوماً.

Embryologie (F). **٢٨٩٦٦ - نُعَارَكَة ***
Embryologie (E).

Embryologie végétale (F). **٢٨٩٦٧ - نُعَارَكَة نَبَاتِيَّة ***
Vegetable embryologie (E).

النعار النباتية علم يبحث في التكوين النباتي وفي المراحل
المتتابعة التي يمر بها كل نبات.

٢٨٩٦٨ - نُعَاعَسَةُ النَّيْع *
Dicyphus minimus (S). Dicyphe minime, Punaise du
tabac (F). Suck-fly (E).

حشرة ثاقبة ماصة كرجية الرأحة صغيرة القد مستطيلة الشكل
من فصيلة خاسيات الفواصل. طولها يراوح من ٨ إلى
١٠ سم. رأسها أسود اللون. زباناها خيطية مستطيلة
منتقطة إلى الدواء. ظهرها ملون وموشع بالخطي والوردي
والأسمر والأخضر والأسود. يطها إلى السمرة المابقة.
انثاها تختبئ المكن أفرادياً في وئ التصل يفتقد بدم منحه
بنحو ٧ أيام من يرقات دقيقة مرقالة تركيب النصل ومخص
خلايا نسيجه || الحشرة الكاملة مختص عصاة قة الساق
وضلع الأرواق الحامية قشيب لها الذبول والالتواء نحو
الأرض فتبدو كأنها عادمة الجبل لا تقوى على متابعة
شماخها ودرورها الحياتية || أضرارها قد تكون جسيمة إذا
اعترت الشول في زمن الشايع. تكافح عند الحاجة باستعمال
أحد الحواشير النافذة الذي يؤثر في أعصاب الحفم.

٢٨٩٦٩ - نُعَاعَكَة بقلة ناعمة كالناعمة. ج نعام.

٢٨٩٧٠ - نَعَام ، نَعَالِم
النعام أو النعام منزل من منازل القمر البائية. وهي ثمان
كواكب على اثر الشمس، أربعة منها في الهجرة وهي النعام
الواردة لأنها شرعت في الهجرة كأنها تشرب. وأربعة خارجة
عن الهجرة وهي النعام الصادرة كأنها شربت ثم صدرت ||
رقيب النعام يدعى الحمنة.

٢٨٩٧١ - نَعَامَات
النعامات خمسة نجوم من كوكبية قيطس مركزها في أوسط
البدن.

Régime (F). **٢٨٩٤٦ - نِظَام ، أَسْئُوب**
Rules, Regulation (E). مجموعة القواعد المفروضة أو للتحمة.

Système (F). System (E). **٢٨٩٤٧ - نِظَام**
مجموعة مقائد أو مبادئ مرتبطة بشكل مذهب أو اعتقاد
خاص.

٢٨٩٤٨ - نِظَامِ الاسْتِعْثَال ، طَرِيقَةُ الاسْتِعْثَال
Système de culture (F). Cultivation system (E).
الطريقة التي يتبعها المزارع في استغلال أرضه.

٢٨٩٤٩ - نِظَامِ الاسْتِعْثَالِ
Exploitation patronale (F). Sweating system (E).
هي الخفارية التي ترمي إلى خفض أجور العمال حتى الحد
الادنى.

٢٨٩٥٠ - نِظَامِ الْأَمْلاكِ الْعَامَّةِ
Domainialité publique (F). Public property (E).
نظام قضائي خاص من "للاملاك العامة".

٢٨٩٥١ - نِظَامِ الْحَصْرِ
Régie (F). Stewardship (E).
إدارة الإعمال وحصرها وتوجيهها توجيهاً اقتصادياً محصياً.

٢٨٩٥٢ - نِظَامِ الْخَطَرِ ، مَنَاجِنُ الْأَمْطَارِ
Régime des pluies (F). Rain regulations (E).
كيفية الاطوار المحلية وكيفية توزيعها على مختلف شهور
السنة.

٢٨٩٥٣ - نِظَامِ التَّعَابِثَاتِ
Syndicallisme (F). Syndicalism (E).

٢٨٩٥٤ - نِظَامُ دَوْرِيّ
Système circulaire (F). Circulation systemic (E).

نظام دورة الدم في المهيمنة الومالية الجسدية.
٢٨٩٥٥ - نِظَامِ عَيْشِيّ
Statut réel (F). Real status (E).
صفة تقليدية تدل على القانون الذي يعالج موضوع الاموال
المنقولة منفردة.

٢٨٩٥٦ - نِظَامِ وَرَقِيّ
Foliation
النظام الورقي هو الشكل الترتيبي الذي يتخله الورق
على الفصن. ويدعى الارياق.

٢٨٩٥٧ - نَظَرِيَّة
Théorie (F). Theory (E).
مذهب علمي أو علم نظري لا علمي.

٢٨٩٥٨ - نَظَرِيَّة
Théorème (F). Theorem (E).
قضية يطلب برهانها.

٢٨٩٥٩ - نَظَرِيَّةُ الطَّوَرِئِ
Théorie de l'imprévision (F).

٢٨٩٦٠ - نَظْم
النظم ثلاثة انجم من الجوزاء قديمي النطاق ، راجع نطاق.
٢٨٩٦١ - تَطْيِير ، تَطْيِيرِ السَّمْتِ ، سَمْتِ السَّمْتِ
Nadir
نقطة السماء التي تحت قديمي الراصد وهي تقابل سمت الرأس.



نمار



نعامة النبع



نعام



نمرل باشا



نمر البقر



نمر المائي



نمر المزن



نمر سوداء



نمر مزعجة

٢٨٩٧٩ - نعام * هودعة

Brebis (F). Ewe (E).

أنثى القن من اجتيازها الشعر الحامس عشر من عمرها أي من وقت صلاحها للسفاد .

Tabanus (S).

Taons (F). Gadflies (E).

جنس حشرات من النمرات. أنواعها عديدة ، ذكورها تعيش على ريق الأزهار ، أنثاها تعيش على ما تمصه من دم وهي تلص الحيوان ولا تف من الإنسان . ويضعها ينقل مرض الدباب من الأيل إلى الخيل فيميتها . الواحدة منها تنمي نمر . أعرفها وأضرها ما يلي .

Embryon d'animal (F).

Animal embryo (E).

Tabanus bovinus (S).

Taon des bœufs (F). Ox-fly (E).

ذباب من النمرات ، طولها يراوح من ١٨ إلى ٢٥ سم . ثوبها إلى السمرة . صدرها وسيقانها صفراء . أرسافها سود . يكثر وجودها في فصل الصيف والخريف . أنثاها تنمي على البقر والخيل والحمار .

٢٨٩٨٣ - نمر المائي *

Chrysops caecutians (S). Taon aveuglant (F). Horse-fly, Breeze fly (E).

ذباب صغيرة من النمرات ، طولها يراوح من ٩ إلى ١٥ سم . غطتها قصير القد . حورياتها خضر يطولها موج ذهبي لامع . أنثاها تنمي على الخيل والحمار والبقر ولا ترتد عن مائها .

٢٨٩٨٤ - نمر المزن *

Chrysosona pluvialis (S). Taon pluvial (F). Cleg (E).

ذباب صغيرة من النمرات ، طولها يراوح من ٨ إلى ١٢ سم . حورياتها خضر النصف الاعل ، زرد النصف الاسفل . يكثر وجودها من حزيران إلى أواخر ايلول . أنثاها تنمي على جميع الدواب وتقتصم الإنسان .

٢٨٩٨٥ - نمر سوداء *

Tabanus morio, Pangonius micanis (S). Taon noir (F).

ذباب من النمرات ، طولها يراوح من ١٥ إلى ٢٥ سم . ثوبها اسود اللون ، زباناتها إلى الصلبة ، غطتها مستطيل المنك . يكثر وجودها من حزيران إلى تموز .

٢٨٩٨٦ - نمر مزعجة * ، نمر الربيع

Tabanus bromius (S). Taon bruyant (F). Gadfly (E).

ذباب من النمرات ، طولها يراوح من ١١ إلى ١٥ سم . ثوبها اسمر اللون يمتد بالاسود . مقدمها اغبر . حورياتها إلى الخضار المشع بالاحمر . يكثر وجودها من ايار إلى حزيران . ذكورها لا تشارك اناثها في التمتع . أنثاها تنمي جميع الحيوانات ولا تمتع من الإنسان .

Tabanidae (S).

Tabanidae (F). Tabanidae, Gadflies (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وأزواجها كثيرة المدد معظمها من الدباب الكبير . أغطائها مستطيلة ، انساها ثالثة ماصة ولاعة . قرورها الاستعمارية ثلاثية الفواصل . حورياتها كبيرة القد ، مصلة في الذكور ، مفترقة متباعدة في الاناث . اجنسها غشائية التركيب شقافة . ذكورها تعيش على مشر الأزهار ودماء الانجاز

Struthio camelus (S). Austrucho (F). Ostrich (E).

طائر من النوادي وصيد الجنس والنوع من فصيلة النعاميات . اسم الجنس نعام والذكر ظلم والاثنى ريداء وقلوص والصغير رال والجامة بنات الحيق ويودع . وكنتها ام البيض . صياح الظلم يدعي عرادا وصياح القلوص زبارا . || تعتبر النعام اكبر واضخم الطيور المعاصرة . تملو نحو ٢٦٥ سم . والذكر ارفع من الانثى . ريشها ناعم مبدل مائل ، لونه يراوح من الاسود القاتم إلى الزبادي فالايض من البني . غطها منتصب مستطيل ، مادم الريش ، كثيف الزغب الاغفر ، ينمي برأس صغير القد وشقار مفلطح . ساقاها قويتان رفيحتان متساويتان على العدو السريع . يبيض كبير القد ، حاجي اللون ، اصفر المزاج ، زن الواحدة سنة ١٤٥٠ غ . قوتها الاشباب والبقول والحبوب والبذور والحبوب والبار والحشرات والمطاط الخ ... || تدن في الفصوص من ابرل قله ١٥٥ سم . ومقه ٣٥ تضع فيه من ١٢ إلى ١٨ بيضة متضخمة بمنزلة الذكر من ٤٢ إلى ٤٨ يوما .

Nandou (F).

٢٨٩٧٣ - نعام امريكية

هي الرواء ، اطها .

Vent du sud (F).

South wind (E).

النعام ديع الجنوب لانها ابل الرياح والبطها .

Struthionidae (S).

Struthionidae (F). Struthionidae (E).

فصيلة طير من رتبة النوادي ، اجناسها المعروفة ثلاثة النعام والرواء والاسود . جميعها سريعة العدو ، كبيرة القد ، مستطيلة المنك الدقيق الاثني الريش . أرسافها رفيعة قوية تتقي باصمين او بفيلة اصابع . اجنسها صغيرة ضيقة لا تمكنها من الطيران . أرباها رطلة متبدلة لا مياكة . تميش من ٢٥ إلى ٣٥ سنة . موطنها المناطق الحارة من افريقية وامريكا واستراليا .

Spilornis (S). Buse huppée (F).

جنس طير من السقاوت وفصيلة الصقريات . أنواعها عديدة جميعها من اوباد المناطق الحارة . اجسامها ريمة ، أرواها مختلفة الألوان التركية . تتميز برووها لثخنة بكشفة تقنية الاكثر من . تميش في الجبال الجرداء وفي القياي الناحلة . قوتها القرواصم والزحافات والافاعي والحشرات . أشهر أنواعها نمرل باشا .

Spilornis bacha (S).

Buse huppée bacha, Bacha (F).

طائر من النمرل ، طولها نحو ٩٥ سم . وبيسته ١٥٥ سم . ثوبه اطمل اللون ، حاجي الظهر والسقط ، اغبر البطن ، يطول توشم ابيض مستدير . كشته يبيض الانتشاب سوداء الطرف . صدقة عينه جزوية اللون . خاله صفر ، منمره ازرق اللون اغبر المزاج || موطنه فصح الارباء يمتد من افريقية الجنوبية إلى الشرقى فالحند والصين . يدن وكته في شخايف الصغور الناتئة . انشاء تنعم من رفنة إلى ثلاث رفنات متضخمة وسدا نحو خمسة اسابيع .

٢٨٩٧٨ - نمرل

النمرل هو الذئب : الاكر من الضبايع .

٢٨٩٩٥ - نَمْلُول (Otiorynchus).

Otiorynchus (F). Weevil, Broad-nosed weevil (E). Schwarzer Rüsselkäfer, Dickmaulrüssel (D).

جنس حشرات رأبل من فصيلة النملولات. أنواع عديدة أعطتها العالم أجسامها صغيرة القد. رؤسها وأنتاكها مستطيلة. قرونها الاستشارية مكورة منفرجة الزوايا تنقلب في مقدمة المتك. اعتمادها صلبة. سيقانها مسنة. أرسافها رباعية. أطواها تراوح من الخفلي إلى الاسود. قشارها دقيق السهف والحلب تملو اعداديد وتراويز مختلفة. جميعها تسرح في الليل وترقد في النهار. يرقاتها تعيش في التربة على المواد العضوية ومنها تقضم الجذور كما هو الحال في نملول السكك. اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٨٩٩٦ - نَمْلُول أَحْمَر السَّاقِ (Otiorynchus lugdunensis).

Otiorynchus lugdunensis (S). Otiorynchus à pattes rouges (F).

نوع من النملول، مرثته الانجمار المشرة ومشاها. يكثر في المناطق الجبلية. طوله يراوح من ١٥ إلى ١٤ سم. ثوبه إلى السواد اللامع. سيقانه حمراء اللون. قشار ظهرانه عادم السهف، عشاري الاخاذيد. || يسرح في الليل. قوته الاوراق الفتية والبرام.

٢٨٩٩٧ - نَمْلُول الزَيْتُون (Otiorynchus cribricollis).

Otiorynchus cribricollis (S). Otiorynchus de l'olivier (F).

نوع من النملول، مرثته الاول نجمة الزيتون ثم الدراق والوز. طوله يراوح من ٧ إلى ٨ سم. جسمه يغطي الشكل. ثوبه إلى السرة السوداء. متكته مخروطي قصير. زبانه مستطيلان منفرجا الزاوية. سكبته رافعة الطرف. مقدم جوشه بالغ التحصين. قشار ظهرانه عشاري التخديد. اعداديده مهددة الحروف، منتظمة التغطيط. || يسرح في الليل. قوته الاوراق الفتية يلتهمها بشراهة.

٢٨٩٩٨ - نَمْلُول السَّكَّك (Otiorynchus rugosostriatus).

Otiorynchus rugosostriatus (S). Otiorynchus des cyclamens (F).

نوع من النملول. مرثته الوردة وبعض نباتات الزينة. طوله يراوح من ٦ إلى ٧ سم. ثوبه إلى السرة السوداء. زبانه إلى الجؤوة. متكته يبدو كاله استطالة الرأس. ظهرانه كثير التخديد الطولي، كثيف الركيات السهفية، مبهر الهلب || يسرح في الليل. قوته الاوراق الفتية. اذاه الاكبر يأتي من يرقاته التي تعيش في التربة وتلتهم جلود السكك تقضي عليه.

٢٨٩٩٩ - نَمْلُول الكاشِش (Otiorynchus ligustici).

Otiorynchus ligustici (S). Otiorynchus de la livèche (F). Lovage weevil (E). Liebstöckelrübler (D).

نوع من النملول، مرثته الكاشش والنفل وبمظم القرنيات وبعض الانجمار المشرة. طوله يراوح من ١٥ إلى ١٢ سم. ثوبه إلى السرة الريداء. متكته أسطواني الشكل. مقدم جوشه متظم التحصين. ظهرانه سهي القشار، متبق الخطوط || يسرح في الليل. قوته الاوراق الفتية.

٢٩٠٠٠ - نَمْلُول الكَرْمَة (Otiorynchus sulcatus).

Otiorynchus sulcatus (S). Otiorynchus de la vigne (F). Vine weevil (E). Gefurchter Lappenrübler (D).

نوع من النملول، مرثته الكرمة ولا ينف عن الانجمار المشرة والحرجية. طوله يراوح من ٨ إلى ١٠ سم. جسمه

الخفشية والثار الناجية المطلوبة. اما انثاها فقوتها قوت الذكور يضاف اليه الدم الذي تنصه من الحيوان لانها لا تستغي عنه في تكوين المكن. مكنتها وشي الشكل تنصه الاثان صفوا متناوبة متراصة فينقف بهد متصه بمدة وجيزة تراوح من ٢٤ إلى ١٢٠ ساعة || يرقاتها دودية الشكل، غبراء اللون او صفراء يطوها تجذيع اسود وهي تعيش في الماء والثريل والوسل والرمال الرطبة والاصبال الكثيفة المنصه.

٢٨٩٩٨ - نَمُصَّة (Fagne).

Fagne (F). Upland moss-hug (E). نملول احر الساق

في الاراض الرطبة كثرت اعشاشها الطوية التي ترقادها الجهم.

٢٨٩٩٩ - نَمُصَّة (Flacourtia).

Flacourtia (S). Flacourtie (F). الواسدة نمصة . جنس انجمار ونجيرات برية وزراعية من فصيلة النصفيات . انواعها المعروفة ١٢ مهددا الهند وسائر بلاد الشرق . جلوصها معتدلة السوق . اغصانها فارشة .

اوراقها متعاقبة . انزعارها ثنائية المسكن . انزعارها سليلي التجميع ، ناجي الانكناز . ثمارها مأكولة ، كرزية الشكل صغيرة القد ، كثيرة العدد ، تتولد نحو ثلاثة اشهر . اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٨٩٩٠ - نَمُصَّة سَرَحَة (Flacourtia inermis).

Flacourtia inermis (S). Flacourtie inerme (F). Lovli (E).

نوع من النصف ، نجمره تملو من ٤ إلى ٥ اثمار. ساقها اغصانها سرحة . ثمارها كرزية الشكل ولقد تتولد من ٨ إلى ٩ اشهر ، لونها إلى الحمرة الزاهية ، سوقها قليل الحامضة ، غزير المصارة ، يؤكل ويربب .

٢٨٩٩١ - نَمُصَّة مَدَغَسْكَر (Flacourtia ramontsi).

Flacourtia ramontsi (S). Prunier de Madagascar, Ramontsi, Marroane (F). Governor's plum, Madagascar plum (E). Achte Flacourtia (D). Pruno del Madagascar (I).

نوع من النصف ، جنبته تملو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم. ساقها سرحة . اغصانها فناء قليلة الشوك . ثمارها كرزوية الشكل قطرها نحو ٣ سم. لونها إلى الجؤوة اللامعة ، سوقها مستحب الحامضة يكثر استعمالها في المربيات . لحاء ساقها حولي القلانة . قلعه دباغي المادة شائع الاستعمال .

٢٨٩٩٢ - نَمُصَّة هِنْدِيَّة (Flacourtia cataphracta).

Flacourtia cataphracta (S). Flacourtie de l'inde, Prunier malgache, P. de l'inde (F). Indian plum, Runesla plum (E). Flacourtie (D). Pruno d'India (I).

نوع من النصف نجمره تملو من ٦ إلى ٨ اثمار. ساقها اغصانها شاككة . انزعارها صغيرة القد فتتقى اللون . ثمارها غرضية الشكل ، كشمشية القد ، كرزية اللون ، جامدة السيوق ، ظاهرة الحامضة ، تستعمل اقريب . قلافة لحاء سوقها اغصانها دباغية المادة .

٢٨٩٩٣ - نَمُصَّات (Flacourtiaceae).

Flacourtiaceae (S). Flacourtiaceae (E).

فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة مستقلة القعالات . اجناسها وانواعها عديدة ، منها الانجمار والنجيرات ، معظمها بري وبعضها زراعي مأكول اللب . || اشهر اجناسها النصف والايريير والظفر والمربانية والريسة .

٢٨٩٩٤ - نَمُصَّة

هي المنقة القاسدة في الم .



نملول احر الساق



نملول الزيتون



نملول السكك



نملول الكاشش



نملول الكرمة

منها يقسية والوسطى قلبية والعليا رحيمة مدببة أو مقطوعة الطرف . تصلها نائض الاصاب ، قليل الخمل ، ازهاره سنبل التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهاره متراكبة ، ليدة ، حراء اللون || اوراقه وازهاره ليوموية العرف . تقريبا يطهر المعدة ويلهب بالمغص || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٠١٩ - نَعْتَع مُسْتَدِير الْوَرَق

Mentha rotundifolia (S). *Menthe à feuilles rondes* (F).

نوع من النعنع البري المبلول . ساقه متصببة زباد متقاربة الفروع تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه شبه مستديرة . تصلها نائض الاصاب ، رافع التسبيح المتجمع ، خمل الصفعة السفلى || ازهاره سنبل التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهاره كثيرة العدد حياء اللون صفراء المواج || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

٢٩٠٢٠ - نَعْتَع Jabot (F).

النعنة هي الحوصلة ، اطلها .

٢٩٠٢١ - نَعْمُور

النور هي الريح التي تقاظك ببرد ورائت في حر او بحر ورائت في برد .

٢٩٠٢٢ - نَعِيب ، نَعِيش Croassement (F).
Croaking, Cawing (E).

هو صوت الغرباب ويدهى ايضا زبيب .

٢٩٠٢٣ - نَعِيم

نعم وصليب الجنوب اسمان لكوكبة نجوم واحدة مركزها الجنوب . اطلب صليب الجنوب .

٢٩٠٢٤ - نَعِيم هو الاخيرانتوس ، اطلبه .

٢٩٠٢٥ - نَعِيمَة هي السج ، اطلبه .

٢٩٠٢٦ - نَعَاش Pedionomus (S). Pédionome (F).

طائر وسيد الجلس والنور من فصيلة التديويقات . واحده نغاشة . وهي صغيرة الجثة طولا نحو ١٧ سم . ثوبها الى الصهبة يعطوها تأذير وتوشيم اصفر واجر واسود . رأسها مخطط بالاجر || قوتها الحبوب والحشرات . تألف الاساكن القليلة الاشجار ، الكثرة الشب العالي || تنثر في الخوص قدرة بين الاعشاب . تعيش من ٨ الى ١٠ في بيضات يحضنها وسدها نحو ثلاثة اسابيع .

٢٩٠٢٧ - نَعَاش *

Meconopsis (S). Méconopside, Méconopsis (F).
Flaming poppy, Wind poppy (E). Mohling, Mohn-
gescht (D). Papavero cimbrico, Meconopsis (I).

جنس نباتات عشبية من فصيلة النعاشيات . انواعه مدببة ، اصطناعا العالم ، معظما بري وبعضها تربي . سوقها متصببة . اوراقها كاملة او مفرقة . ازهارها مستحبة . منها الاصفر والازرق والبشجي . عصارها لينة دقة صفراء اللون جعالية المادة || اعرف انواعه وازهارها ما يتبع .

٢٩٠٢٨ - نَعَاش رَفِيع Meconopsis grandis (S).
Méconopside élevée (F).

نوع من النعاش المعمر . ساقه مزينة متصببة تملو نحو ١٠٠ سم . اوراقه ضمية التجميع طرفية الارتكاز

٢٩٠١٣ - نَعْتَع بَرِّي * ، نَعْمِرَة ، نَعْمَرَة

Mentha sylvestris (S). *Menthe sauvage*, *M. sylvestre* (F). *Wild mint* (E). *Wilde Minze* (D). *Mentastro*, *Menta salvatica* (I).

نوع من النعنع البري الشائع الاستعمال الطبي . ساقه فراء تملو من ٢٥ الى ٥٠ سم . اوراقه احليجية ذرية تصلها نائض الاصاب عابق الخصار يطول من ٢ الى ٣ سم . ازهاره ضمية التجميع ابطية الارتكاز فواحة العرف الاخاذ .

٢٩٠١٤ - نَعْتَع جَعْدِيّ *Mentha crispata* (S).
Mentha crispata (F). *Curled mint* (E). *Krause Minze* (D). *Menta crispata*, *Mentone* (I).

نوع من النعنع البري المبلول . ساقه متصببة متباعدة الفروع الزيادة تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم . اوراقه احليجية الشكل ، تصلها نائض الاصاب متسج الصفعة للمشارية الحافة || ازهاره سنبل التجميع طرفي الارتكاز . ازهاره صغيرة ، دقيقة ، غبراء اللون يعطوها مواج ليكي || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

٢٩٠١٥ - نَعْتَع زُرْعِيّ * ، نَعْتَع بَسْتَانِيّ

Mentha piperita (S). *Mentha poivrée* (F). *Peppermint*, *White mint* (E). *Pfefferminze*, *Pfeffer-Wasser-münze* (D). *Menta prima*, *M. peperina*, *M. pepe*, *M. piperita* (I).

نوع من النعنع الزراعي لبقيل الشائع الاستعمال . ضروبه المشهورة ثلاثة : الحزني والابيض والاسود . سوقها متصببة الانتصاب فراء تملو من ٣٠ الى ٩٠ سم . اوراقها معتقة . اذلية ، لافطة الاذنيات . تصلها سنائية الشكل ، مدببة المقصبة ، نائضة الاصاب ، ميخرة الزغب ، حايقة الخصار ، غشنة للملس . ازهارها سنبل التجميع طرفي الارتكاز . ازهارها وردية اللون او بيضاء || مداته الفعالة تهب المدة وتقدر الاصاب وتفتح الانتطاح وتقيد الصدر وتقضي عل البلغم .

٢٩٠١٦ - نَعْتَع صَعْقَرِيّ ، نَعْتَع يَابَانِيّ

Mentha arvensis (S). *Mentha des champs*, *M. du Japon*, *Pouliot thym* (F). *Corn mint*, *Field mint* (E). *Feldminze* (D). *Menta campestris*, *M. cultivata* (I).

نوع من النعنع الزراعي المشهور هذه اليابان . ساقه متصببة فراء تملو من ٩٠ الى ٩٠ سم . فروعها متراكبة جلفة . اوراقه احليجية الشكل تطول من ٩ الى ٩ سم . تصلها خلي الصفعة ، نائض الاصاب ، سنن الحافة . ازهارها وردية اللون ، ابطية الارتكاز ، ضمية التركيب ، صويانية الشكل || يزود لاستعطار المتلول .

٢٩٠١٧ - نَعْتَع كَنَدِيّ *Mentha canadensis* (S).
Mentha du Canada (F).

نوع من النعنع السعاني يزود لاستعطار طهر . مهده كندا وهو يزود في جميع الاقاليم المعتدلة المنخفضة نحو البراية . ساقه فراء تملو من ٢٥ الى ٧٥ سم . اوراقه معتقة سنائية الشكل . تصلها زغب البشرة ، نائض الاصاب ، سنن الحافة ، يطول من ٥ الى ٨ سم . ويعرض من ١٢ الى ٢٥ سم . || ازهاره وردية اللون ، ضمية التجميع ، ابطية الارتكاز || يزود ويحيد في جميع الاربة الفنية الرطبة المتصلة الانتطاح . يستعطر طهره من الازراق والازهار .

٢٩٠١٨ - نَعْتَع لَيْسَرِيّ *Mentha citrata* (S).
Mentha citronnée (F).

نوع من النعنع الزريبي . ساقه فراء مستطيلة تطول من ٣٠ الى ٩٠ سم . اوراقه معتقة لا نظامية الشكل ، السفل



نعنع بري



نعنع زراعي



نَعَاش

٢٩٠٣٥ - نفاض واليش (S). Meconopsis wallichii
Méconopsidé de Wallich (F).
 نوع من النفاض الحولي . ساقه فروعاً منتصبة تملو من ٨٠ إلى ١٨٠ سم . أوراقه ملتصقة وريشة غزيرة . أزهاره زرقاء اللون متدلية ، قطرها يراوح من ٣ إلى ٥ سم . ثماره جراء مستطيلة رباعية الحروف النافرة المحدة الجانب || ساقه وفروعها مزينة بالسجاد ، زفيها حلبي الشكل اسمر اللون ، عادم الصلابة || تنوره يستمر من حزيران الى تموز .



نفاض

٢٩٠٣٦ - نفاضات (F). Amiboides (E).
 رتبة كائنات حيوانية دينا من الجدريات .

٢٩٠٣٧ - نفاض (F). Amibe
 هي الايبه ، اطليه .

٢٩٠٣٨ - نفاض (F). Hypodermose
 مرض يحدث نفث النبر في الخيل والبقرة والضان .

٢٩٠٣٩ - نفاض ، أم شينوكه (F). Buphaga (S). Buphage, Pique-bœuf (F). Beefeater, Ox-pecker (E).
 جنس طير من فصيلة الزروريات ، انواحه قليلة . طوله يراوح من ٢٤ الى ٢٧ سم . راسه وعنقه وصفده وبشته يظهر الى الجؤرة . سقاط وذنبه الى السرة المايقة . نذكاه الى الصهبة . مقارعه طليظ الشكل والققد ، اصفر القناعة والجسم ، احر الملقط . ضياء الى احمرية الجؤرية ، رساه وغالبيه سمر || يعيش برفقة الحمر والخميرات من ابقار وابل ويغريها يلتقط ما عليها من قراد وذباب ويستأصل من جلودها النمر والثفن وما اشبه .

٢٩٠٤٠ - نخب (F). Turnix (S).
 نخب الطائر : حسا من الماء ما يكفيه .

٢٩٠٤١ - نخبوق (F). Turnix (S).
 جنس طير من فصيلة النخبوقيات . انواعه قليلة العدد ، جميعها صغيرة القند طويلا يراوح من ١٦ الى ١٨ سم . اوتها الى الصهبة المايقة الموشحة والمؤدرة بالاصفر والاسود . دورسها موشحة بثلاثة خطوط صفر || اناته تكد بين الاشباح والادغال ترصع افنيسيمها بالحلوش . فيض من ٦ الى ١٠ بيضات تحضنها وحدها نحو ثلاثة اسابيع || قوته الحبوب والحشرات حل اختلاف انواعها وانحسها انسل . يألت اللياني والاراضي المخصصة || اعرف انواعه واشهرها النخبوق الاقريقي والنخبوق القتال .

٢٩٠٤٢ - نخبوقيات (F). Turnicidae (S).
 فصيلة طير من رتبة الدجاجيات . اجناسها خمسة . شكلها بين الحليل والحبارى . تتميز بقندة المقتار والسان . بامتطاة قوادم السقط وبقصر الانفيك || اجناسها خمسة : النخبوق والتكنوق والحقم والشونى والنفاض .

٢٩٠٤٣ - نخبوق (F). Trachycarpus (S).
 جنس نباتات برية وريزينة من فصيلة النخبوقيات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، جلودها اسطوانية مستقيمة تملو من ٥٠ سم . الى عشرة امتار . اوراقها مستطيلة الزناد ذرفية الشكل أو موشية قطرها يراوح من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . لونها الى الخضار الالامس الازرق المولج يملو تمشيح فضي .

يملوها ازهار مركب من ثلاثة ازهار جؤرية اللون سباعية او تساعية البتلات قطرها يراوح من ٨ الى ١٠ سم . تنوره يستمر من تموز الى آب .

٢٩٠٤٢ - نفاض شايك (S). Meconopsis aculeata
Méconopsidé épineuse (F).
 نوع من النفاض المسمر . ساقه شائكة منتصبة تملو نحو ٦٠ سم . شوكها هربي الشكل ذريب الحمة . اوراقه قليلة الشكل ، كبيرة القند ، خاسية التفصيص . ازهاره ارجوانية اللون ، صفر الاسدية ، متوسطة القند ، قطرها نحو ٥ سم . || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٠٤٣ - نفاض عشقودي (F). Meconopsis racemosa (S). Méconopsidé à grappes (F).
 نوع من النفاض المسمر . ساقه شائكة منتصبة تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراقه كاملة عادمة التشرج . نصلها الى الخضار الاصفر المولج . ازهاره عشقودية التجميع . ازهاره بنفسجية اللون قطرها يراوح من ٣ الى ٤ سم . بتلاها لا نظامية التركيب والند الذي يراوح من ٥ الى ٨ || تنوره يستمر من تموز الى آب .

٢٩٠٤٤ - نفاض كامل الورق (F). Meconopsis integrifolia (S). Méconopsidé à feuilles entières (F).
 نوع من النفاض الحولي . ساقه منتصبة تملو من ٥٠ الى ٩٠ سم . فروعها متبادعة لا منشبة . زفيها حلبي الشكل ، اسمر اللون ، متوسط الصلابة . اوراقه سنانية النصل مستطيلة . ازهاره صفراء اللون ، مزدوجة البتلات ، كبيرة القند ، قطرها يراوح من ٧ الى ١٥ سم || تنوره يستمر من تموز الى آب .

٢٩٠٤٥ - نفاض كمبري (F). Meconopsis cambrica (S). Méconopsidé de Cambrie (F).
 نوع من النفاض المسمر . ساقه فروعاً منتصبة تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . أوراقه ملتصقة وريشة غزيرة ، ازهاره متوسطة القند تعرض من ٣ الى ٤ سم . تيلو كبريتية الصفار ثم تنعروف نحو البرتقالي . ثماره سقية الشكل . حقاها صقية ، مستطيلة ، رباعية الحروف الحادة وينها سداسية . تنوره يستمر من حزيران الى آب .

٢٩٠٤٦ - نفاض مشترم (F). Meconopsis sinuata (S). Méconopsidé sinuée (F).
 نوع من النفاض الحولي . ساقه شائكة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . فروعها متبادعة لا منشبة . اوراقه لا قياسية التفصيص والتشرج ، نصلها كبير القند عايق الخضار . ازهاره عشقودية التجميع ، زرقاء اللون ، رباعية البتلات ، قطرها يراوح من ٥ الى ٧ سم || تنوره يستمر من تموز الى آب .

٢٩٠٤٧ - نفاض هاليك (F). Meconopsis heterophylla (S). Méconopsidé à feuilles variables (F).
 نوع من النفاض الحولي . ساقه فروعاً منتصبة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه لا قياسية التفرغ والتشرج . ازهاره جرد اللون ، قطرها يراوح من ٤ الى ٥ سم . ثماره جراء مستطيلة سداسية الحروف النافرة || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .



نخبوق

قليلة المدد . جميعها وسيدة الجبل الحولي . تظهر في أوائل الربيع ثم تمتص مكثها القوي على فصال ومنايق بعض النباتات المرصومة يفتنف عن رقات تقضي على الأوراق . أشهرها لغريل الفصية .

٢٩٠٥٣ - نُجُولُ الفَصِيَّة

هو سويد الفَصِيَّة ، الحَلِيَّة . (F). *Négril de la luxerne*

٢٩٠٥٤ - نُجُولِيَّات

Gymnoscaecae (S).
Gymnoscaecae (F). Gymnoscaecae (E).
مرتبطة فطور مجهرية من رتبة الزئيات تتميز بانزاعها المرابطة . اجناسها وانواعها كثيرة المدد تجمعها ثلاث فصائل : الخثرات والحجيدات والوققيات .

٢٩٠٥٥ - نَجِيْطَةُ

رقة الثبر اي دهموصه . ج. لث . تنقب على ظهور الخيل والابل والثير التي تلحسها وتلتها بالسلها الى افواهها فحلقها فاساتها حيث تستقر بعض الوقت ثم ترقى مع التسج الى الجلد او تمكث بين طبقات الجلد الى ان تخرج مع الروث .

٢٩٠٥٦ - نَجَل

هو في الحيوان من كان ابوه من غير جنس امه كابل الذي يتولد من الحمار والفرس .

٢٩٠٥٧ - نَجْع

سن حرف الديك .

٢٩٠٥٨ - نَجِيْطَةُ ، سَبِيْطُورِيَّة

Septoria (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة السبليات . بكتيداتا كروية او بيضية تشكأ عضوية في الطبقة الادمية . معها شارب الاينكاز . جولا مثل التسج دقيقه . بريدتها مستطيلة او عويطة . مستقيمة او منقطة ، شفافة ، شفعية الانقسام العرضي ، تحمله الزئيرة || انواعه عديدة . قدرها نحو ٩٠٠ منها حبيبة لا ضرر فيها ومنها مؤذية وبعضها شديدة الاذى . أشهرها ما يلي .

٢٩٠٥٩ - نَجِيْطَةُ الْأَزَالِيَّة ، نَجِيْطَةُ الْجَبَسَان

Septoria azalae (S). Septoriose de l'azalée (F). Leaf scorch (E).

فطر مجهرى يركب الأوراق الفتية عند قاعدة عروقها الاول فيسبب احمرار التسج واسمراره ثم ييبس ، فتلثس الأوراق ويخشو النبات . وقد يكون اذاه شديداً فيؤثر على النمو ويمنع الانزراع || يكلف عند ظهوره بمركبات النحاس او الزنك ويحرق الأوراق الساقطة لانها تحافظ على بؤخ الفطر .

٢٩٠٦٠ - نَجِيْطَةُ الْأَنْجُون

Septoria callistephi (S).

فطر مجهرى يصيب أوراق سطر انواع الاصول الزراعي فيسبب التناث ويؤثر في نمو وانزراعها || مظهره الخارجى يقع لاقابية الشكل والحلم تركيب نصل الأوراق بين الاصاب والبروق . تبدو مستطية ، غيراه اللون ثم تحل نحو البسة التي يمتها الياس والاصحات . يكلف بقتلاح النباتات المرصومة وبطعمه التربة بالكلس او بسلقات النحاس .

٢٩٠٦١ - نَجِيْطَةُ الْبُرْتَقَال

فطر مجهرى حاد الاذى يركب البرتقال والحامض والبرسي

كرها شالك الحافة ، شوكه صلب التسج ، حاد الحمة . ثماره مثلية التجسيم ، عتية الشكل والقد ، لينة الجباب الناشف اللاماكل || والتنبول يعيش ابناً ذروح وفي اي ربة كانت شرط ان لا تنخفض الحرارة الدنيا عن ثلاث درجات مئوية . || اعرف انواعه وأشهرها ما يتبع .

٢٩٠٤٤ - نُجُولُ أَزْعَب

Trachycarpus nana (S).
Palmier à tige rudimentaire (F).
نوع من التنبول الزينبي السبروتي الشائع الزراعة . ساقه اسطوانية رفيعة تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . أوراقه دقيقة الشكل لامة النصل الاخضر اللامس . ثماره جزوية اللون ، عتية الشكل والقد || وهو يعلى النمو ، يحل الشكل ، يزوح في المراكب والحداق .

٢٩٠٤٥ - نُجُولُ النَّبِّ

Trachycarpus excelsa (S). Palmier à fibre, Palmier-chavre (F). Fibre palm (E). Faserpalm (D). Palma de fibra (I).
نوع من التنبول السبروتي الصنابي الشائع الزراعة . ساقه اسطوانية رفيعة تملو نحو ١٠ أمتار طولها شباك من اليف متراكبة الحياك مستطيلة اللون . أوراقه مروحية الشكل قطرها يراوح من ٤٠ الى ٦٠ سم . وزنادها يطول نحو ٥٠ سم . || ثماره عتية الشكل والقد لونها الى الزرقوة المابقة || البالة مغروب فيها تتصلل في صناعة الاكياس والحبال .

٢٩٠٤٦ - نُجُولُ مَرْزِيَّاتَا

Trachycarpus khasiana, T. martiana (S). Palmier de Marcins (F).
نوع من التنبول السبروتي الزينبي . ساقه لاشرة الخيد ، ميمرة الالياف الرطلة ، تملو من ٣ الى ٥ أمتار . أوراقه مروحية الشكل قطرها يراوح من ٦٠ الى ١٠٠ سم . وزنادها يطول من ٦٠ الى ٧٠ سم . نصلها حاد الخشار اللامس يملو شمشج فضي . ثماره عتية الشكل والقد لونها الى الصفار البرتقالي .

٢٩٠٤٧ - نَجَش

هو المثلث ، الحلبه .

٢٩٠٤٨ - نَجَر

هو البليل ، الحلبه .

٢٩٠٤٩ - نَجَر

Serinus (S). Serin (F). Canary (E).
نرج . نجران . جنس عصافير غريسة من فصيلة الشرشوريات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد . انبواها الى الصفرة والصفرة الزرقية والورشة . جميعها تألف القفص وتقتبس ادب التنريد || أشهر انواعه النجر الكناري المعروف بالكناز .

٢٩٠٥٠ - نَجَر سُوْرِي

Serin de Syrie (F).
هو النجار ونوع من النجر تنجي اللون حسن التنريد يألف البلاد الجبانية السودية .

٢٩٠٥١ - نَجَرَة

Serine (F). She canary (E).
أنثى النجر . جسمها اصغر قدأ من جسم الذكر ورأسها اقل استدارة وثوبها اقل لمة وخضيباً .

٢٩٠٥٢ - نُجُولُ

Colaspidae (S).
Colaspidae, Négril (F).
جنس خنافس صغيرة القد من فصيلة النضاريات . انواعه



نجريل



نَجِيْطَةُ الْبُرْتَقَال



نَيْظَةُ الْبُقْدُونِس



نَيْظَةُ الْبُنْبُوْرَة



نَيْظَةُ الْخَس



نَيْظَةُ الزَّرْع (١) نَيْظَةُ الزَّرْع (٢)



نَيْظَةُ الزَّرْعُون



نَيْظَةُ الْقَرْعِيَّات

يُباسها || مظهره الخارجي يقع حر لا قياسية الشكل والحجم تملو نصل المرحلة الأولى أو الثانية ثم تنتشر نغم معظم المرحلة وقد تنقل إلى غيرها أحياناً منها || يكالغ بقطع وسرق المرحلة المصابة وينضج المراج السليمة بأحد مركبات الزنك .

٢٩٠٦٩ - نَيْظَةُ الزَّرْع ٥٥

Septoria nodorum, *S. glumarum* (S). *Septorioses du blé* (F).

نظر مجهرى يصيب قنايع وصيفات الحنطة . مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة قطرها ٣ إلى ٤ م. تبدو حنطية أو برتقالية اللون ثم تتسع قليلاً فيغير لونها ويقتطع أطرافها بعد أن ينحرف إلى الجؤوة العالقة . || أضراره قد تكون باهظة إذا لامته العواجل الجوية لأنه يعطب الحب بعد أن يجده ويقتل إنتاجه ووزنه ومطبوته النشوية . يكالغ بتطهير البذار وباختاب الزراعة في المواقع الرطبة .

٢٩٠٧٠ - نَيْظَةُ الزَّرْعُون ٥٥

Septoria crataegi (S). نظر مجهرى يركب الزعرور فيصيب مسقط أفراته قبل زين الاضبال || مظهره الخارجي يقع مستديرة ممتدة جؤوية اللون صفراء اختار قطرها يراوح ١ إلى ٣ م. تركب الاوراق والبذر تقبب يباسها مسقطها . يوفداته غطيلة كثيفة تتجمع تعزل من ٥٦ إلى ٧٠ ميكرون وتعرض من ١ إلى ٢ .

٢٩٠٧١ - نَيْظَةُ الزَّرْعُون ٥٥

Septoria oleae, *S. olivae* (S). نظر مجهرى يترى اوراق الزيتون فينبو أن يلاذها شديد الأذى || مظهره الخارجي يقع بيضية الشكل صغيرة القدر يراوح مدنها من ٢ إلى ٥ م. تركب النصل في زامة الاول والثاني بين الاصابع والعلف . تبدو شهية اللون ثم تسمر || أضراره لا تستسب العناية لأنها لا تتعدى المئة ورة في الشجرة الواحدة .

٢٩٠٧٢ - نَيْظَةُ الْبُتْم ٥٥

Septoria socalis (S). نظر مجهرى يصيب صنف البلم فيوقع به يفسد الاذن . مظهره الخارجي لطح لا قياسية الشكل والحجم تبدو صغيرة حنطية اللون ، ثم تتسع وقد تم كامل نصل المصفة . أضراره زديدة لأنها لا تتعدى اثنى النصف .

٢٩٠٧٣ - نَيْظَةُ السُّنُون ٥٥

Septoria pistaciae (S). نظر مجهرى يترى اوراق السنق والمغرو فينبو . مظهره الخارجي تقطع صغيرة مستديرة قطرها نحو ١ م. تركب النصل ضمن حطار أطرافها ، تبدو حنطية اللون ثم تسمر وتنتهي بالاحمرار . يوفداته غطيلة تقطع نحو ٢٠ ميكرون || أضراره زديدة لا تستوجب العناية .

٢٩٠٧٤ - نَيْظَةُ الْقَرْعِيَّات ٥٥

Septoria cucurbitacearum (S). نظر مجهرى يصيب اوراق وسوق القرعيات اغصانها الطليخ والشام والكوس والحياح || مظهره الخارجي يقع مستديرة قطرها من ٦ إلى ١٠ م. لونها اخضر زيتوني ، محورها حنطي ، أطرافها اصفر باهت . تركب نصل الاوراق تنفضي على الثلج المنحارة وتسبب يباسها واختابها . يستسا مركب السوق يبلل الاوراق برمتها || يكالغ باستسا سائل بورود أو الكبروسيد أو غيرها من الفواطير القلابة .

والملحي || مظهره الخارجي نقط سمر تملو اعناق البذر وقشورها . وهو على الاوراق يقع بيضية الشكل لونها الى الكلبة || ينشط في المراتق الظليلة البعيدة عن الشطوط البسرية . لا يستوجب المكافاة .

٢٩٠٦٢ - نَيْظَةُ الْبُقْدُونِس ٥٥

Septoria petroselinii (S). نظر مجهرى يركب اوراق البقدونس تقصفر وتيس . مظهره الخارجي نقط سود تملو عروق النصل تقبب مذوب . يوفداته غطيلة مستديرة ثنائية أو ثلاثية التحويل تقطع من ٣٠ إلى ٤٠ ميكرون وتعرض من ١ إلى ٢ . يكالغ عند ظهوره باستسا مركبات النحاس أو سائل بورود .

٢٩٠٦٣ - نَيْظَةُ الْبُنْبُوْرَة ٥٥

Septoria lycopersici (S). نظر مجهرى يصيب اوراق البننورة وسطحها فيصطبها . مظهره الخارجي يقع صغيرة مقترنة اثرؤايا لونها الى الجؤوة تركب الاوراق تنفضي على الثلج المنحارة وتركب السوق تقترح الائمة والبشرة || يتكاثر وينشط في المراتق الرطبة الظليلة وفي الارربة الغنية بالنصر الازوتي || يكالغ عند ظهوره باستسا سائل بورود وغيره من الفواطير القلابة .

٢٩٠٦٤ - نَيْظَةُ الثُّوم ٥٥

Septoria alliicola (S). نظر مجهرى يركب الثوم في اوراقه فينبو . مظهره الخارجي لطح مستديرة غير اختار تركب النصل في زامة الاخير || لا يستوجب المكافاة لأنه عادم الاذى .

٢٩٠٦٥ - نَيْظَةُ الْجُنْجُل ٥٥

Septoria humili (S). نظر مجهرى يركب اوراق الجنبل فينبو . مظهره الخارجي يقع كثيرة متتامة لا قياسية الشكل والحجم تركب النصل تبدو زيتية اللون ثم تسمر وتيس وقد تنفضي على النصل بكامله . يوفداته غطيلة الشكل تقطع من ٢٥ إلى ٣٥ ميكرون وتعرض من ١ إلى ٢ || يكالغ بتطهير البذار وباختاب الاراضي الرطبة وبالنصل عن الزراعة على موسم أو موسمين متتالين في المواقع التي حصل فيها الوم .

٢٩٠٦٦ - نَيْظَةُ الْخَس ٥٥

Septoria lactucae (S). نظر مجهرى يركب اوراق الخس فينبو . مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة زبداء اللون مظلوة بالأصفر تملو النصل تقبب وتقرح || يوفداته يكتيداته غطيلة الشكل محببة شفاقة ، تقطع نحو ٢٧ ميكرون وتعرض نحو ٥ م. أضراره لا تتعدى بعض الاوراق الخارجية . يحسن اجتناب اخذ البذار من نباتات موصولة .

٢٩٠٦٧ - نَيْظَةُ الدُّلْبُوْت ٥٥

Septoria gladioli (S). نظر مجهرى يصيب الدلبوت في اوراقه واسطاف يصبه . مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة كثيفة التجميع تبدو حرار اللون ثم حنطية عالقة تقضي على الثلج المنحارة تقبب ذبوا . يباسها || يكالغ بتطهير البصل والربة وذلك قبل الزرع .

٢٩٠٦٨ - نَيْظَةُ الدُّبْشَار ٥٥

Septoria aquilina (S). نظر مجهرى يركب الدبشار فينبو . مظهره الخارجي يقع مجرحة وقد يصب

تركب الثآليل قرب اكتمال نموها عند انحراف لوئها من الأخضر الى الاصفر || يكافح فور ظهورها باستعمال سائل بورود المحلول ١,٢ ٪.

٢٩٠٨٢ - نُصَيْفَةُ ثَمَرِ الزَيْتُونِ *

Septoria oleagina (S).
نظر مجهرى يعترى ثمار الزيتون فيها . مظهرها الخارجي يقع مستديرة قطرها نحو ١ م. تركب بشرة الثمرة قرب نصفيها . تبدو حطية اللون ثم تسمر فتقرح البشرة وتشو الثمرة وتسبب تأكد القباب || اضرارها محدودة لا تستوجب المكافئة المكلفة .

Ensemencer (F). **نَعْمَ** - ٢٩٠٨٣
To sow with seed (E). نف الارض : بلدها .

Vaporisateur (F). **نَفَاكَة** ، **بَعْدَارَكَة** - ٢٩٠٨٤
Vaporizer, Sprayer (E). جهاز قوي الضغط ينضخ السوائل كالبخار .

Intumescence **نَفَاكَة** * - ٢٩٠٨٥
عارض شوزي يسبب بفطس النباتات في تصال اوراقها وفي لحاء فروعها الفتيه فيسبب انخماط وانتفاخ خلايا النسيج الرئويّة دون ان يترس خلايا الحياك الاذي || فيها الخارجي بقور صغيرة القد لاقياية الشكل تكثر فيها الاسطالة الاحليلجية . سببها العوامل الجوية ، تنشطها كثرة الازوت وقلة الحامض النيتروجيني || يكافح بعدم تقنين السوريفضات .

Geyzer **نَفَاكَة** ، **شَبَابِكَة** - ٢٩٠٨٦

نَفَاش - ٢٩٠٨٧ هو التاراج ، اطلبه .

نَفَاكَص - ٢٩٠٨٨
داء في الشتاء يجعلها تنفص بايولها حتى تموت .

نَفَاكَلَة * - ٢٩٠٨٩
Evers arglades (S).

فراشة من فصيلة القنيات . جسمها يطول نحو ٢٩ م. نوحها الى الخطي الاسمر . صدرها ازرق المجلج . رواشن ذكورها بنفسجية اللون مخططة بخضار اسمر . رواشن انثاهي خطلاء اللون زرق الانتساب يملونها تنقيل اسود ويطويها حطار اسمر || تألفت المروج والمراعي الاصطناعية . ترسم من نيسان الى ايار وين تموز الى آب . ريقها تركب اوراق النفل . يكثر وجودها في تموز وفي تشرين .

نَفَاكَاوَة ، **نَفَاكَاكَة** - ٢٩٠٩٠
Déchet (F).
Loss, Waste, Offal (E).

هو ما لا يصلح للاستعمال من المادة المطلوبة او هو ما يفسد هدرا من المادة عند استعمالها او تفتيتها وتخريرها .

نَفْتَالِين - ٢٩٠٩١
Naphtalène, Naphthaline (F).
Naphthalene, Naphthalin (E).

كربود يستخرج من تقارن الفحم الحجري يتصل برائحته احادة خاصة تنفر منها الحشرات . وهو جامد ، ابيض اللون ، وزنه النسبي ١,٢٦ يمتزج في المحل ويدرول في ٨٠ سع . يستعمل في صناعات عديدة احصاه التفصيل . ويستعمل في وقاية الثياب والجلود من ميث الحشرات .

٢٩٠٧٥ - نُصَيْفَةُ الْقُرْثُوسِ *

Septoria cornicola (S).
نظر مجهرى يعترى اوراق القرثوس فيشوها . مظهرها الخارجي يقع شبه مستديرة يراوح قطرها من ٣ الى ٤ م. تركب النصل قرب ضلعه . تبدو حطية اللون قرمزية الخمار ثم يتفلسق اللون مع الياس ويتآكل النسيج فيسبب نخر الاوراق وتشوهاها || يكافح باستعمال مركبات النحاس عند ظهور المرض .

نُصَيْفَةُ الْقَنْبِ * - ٢٩٠٧٦
Septoria cannabiz (S).
نظر مجهرى يعترى اوراق القنب فيطها ويلوها . مظهرها الخارجي يقع لا لياسية الشكل والحجم منها المستديرة الصغيرة القد ومنها المستطيلة المسننة الاطراف التي تركب النصل بين اصابه . تبدو شبيهة اللون ثم تسمر وتيس . بويافها كثيرة لبدة غصيلة الشكل تطول من ٤٠ الى ٦٠ ميكرون وتعرض من ٢ الى ٣ || ينتشر في الموانع الرطبة . اذا استحكم القنبه يقضى على بعض اوراقها يراوح من ١ الى ٣ ٪ .

٢٩٠٧٧ - نُصَيْفَةُ الْكَرْسِ *

Septoria spili (S). *Septoriose du céleri, Rouille du céleri* (F).
نظر مجهرى يسبب اوراق الكرسي فيلونها . مظهرها الخارجي يقع لا لياسية الشكل والحجم قطرها يراوح من ٣ الى ٦ م. وفي حطية او صفراء اللون تركب نصل الاوراق قليب اسفراها وذويها || يكافح باستعمال الكبريتيد تعديرا على النبات منذ ظهور عوارض المرض .

٢٩٠٧٨ - نُصَيْفَةُ الْكَرْمَةِ *

Septoria ampelina (S). *Mélanose de la vigne* (F).
نظر مجهرى يسبب الكرمية في اوراقها فيؤذيها . مظهرها الخارجي يقع صغيرة مقرنة الزوايا قطرها نحو ١ م. تبدو حطية اللون ثم سبها وتنتهي بالاسمر || يكتنفها بيضية فيها نحو ٧٠ ميكرون . بويافها مستطيلة قياسها نحو ٥٠ ميكرون || يكافح كسائر انواع الكنيفة .

٢٩٠٧٩ - نُصَيْفَةُ الْكَرْزَانْتَمِ *

Septoria chrysanthemella, S. chrysanthemi (S).
نظر مجهرى يسبب اوراق الكرزانتم فيلونها ويقضي عليها || مظهرها الخارجي يقع شبه مستديرة لاقياية الحجم تبدو خربة اللون ثم تتعرض الى السرة . تظهر في اوائل الربيع وتدمر حتى الخريف حيث تلبد الاوراق به ان سمجها || يكثر وجوده في الموانع الرطبة الظليلة . يكافح باستعمال اسد الفوطاير النحاسية المحلول ٥,٠ او ٧,٥ ٪ رشا على التربة وذلك بعد انتزاع وحرق الاوراق الموصية .

٢٩٠٨٠ - نُصَيْفَةُ الْزُرْكَانِ *

Septoria cyclas (S).
نظر مجهرى تركب اوراق الزران فيطها . مظهرها الخارجي يقع مزاوية الشكل متناحية الصغر كثيفة التجميع تركب النصل في زامة الاخير او قبل الاخير ، تبدو صناعية ثم حطية وتنتهي باليايس || يكافح باستعمال مركبات النحاس ويمرغ الاوراق المصابة .

نُصَيْفَةُ اللَّيْمُونِ * - ٢٩٠٨١
Septoria citri (S).
نظر مجهرى يسبب ثمار الليمون الحامض والبرتقال فيشو للفسور دون ان يؤذيها شديد الاذى || مظهرها الخارجي يقع لا لياسية الشكل والحجم لوئها الى الصهبة الخطية تملوها بقشة غفيفة من النقط اسود قطرها من ١ الى ٢ م.



نُصَيْفَةُ الْكَرْمَةِ



نُصَيْفَةُ الْكَرْزَانْتَمِ



نُصَيْفَةُ الْكَرْزَانْتَمِ



نُصَيْفَةُ الْزُرْكَانِ



نُصَيْفَةُ اللَّيْمُونِ



نفل ابيض

ويعتبر النفل في الوقت الحاضر من أهم وسائل التويد التي تستخدم في تحريك الآليات المختلفة من الطائرات والسفن إلى السيارات وأجهزة المصانع. || أهم البلاد المنتجة للنفل هي الولايات المتحدة وروسيا وأمريكا الجنوبية والبلاد العربية وإيران.

٢٩١٠٣ - نَفْطُور

Micro-organisms (F).
Microorganism (E).

اسم يطلق على كل عضو مجهرى نباتي أو حيواني. ج. فطائير. ومنهم من قال فمضكري. ج. فمضكريات.

٢٩١٠٤ - نَفْثِيَّة

Utilitarisme (F).
Utilitarianism (E).

التفعية مذهب فلسفي يقول بأن المنفعة إن خاصة أو عامة هي سمة العمل البشري.

٢٩١٠٥ - نَفَثَات

Impenses (F). Expenses (E).

هو ما ينفقه المرء على عين ثابتة قابلة للاسترداد والتفقات قد تكون:

نفقات ترفيه
Impenses voluptuaires (F).
Voluntary expenses (E).

نفقات ضرورية
Impenses nécessaires (F).
Necessary expenses (E).

نفقات مفيدة
Impenses utiles (F).
Useful expenses (E).

٢٩١٠٧ - نَفَل ، نَفَلْ ، شَبْدَر

Trifolium (S).
Trèfle (F). Clover (E).

جس نباتات عشبية من القرنيات الفراقشية. أنواعه المعروفة زباد ١٥٠ معظمها بري مرعوي وبعضها زراعي على ريشها الحولي وأهلل والممر. جلورها جنية تنور في الربيع. سورها فراء. أوراقها مركبة ثلاثية الوريقات مستطيلة الزناد. أزهارها رومبي التجميع أو سنبل. أزهارها متفرقة مختلفة الألوان. ثمارها سنية. زهورها كلوية الشكل، صغيرة، لثدي، حمراء اللون. || أعرف أنواعه وأشهرها ما يقع.

٢٩١٠٨ - نَفَلْ أبيض

Trifolium repens (S).
Trèfle blanc, T. rampant, T. d'agneau (F).

نوع من النفل المرعوي. تكثر زراعته في الأريّة الرملية. ساقه مدادة فراء. وريقاته جنية مستطيلة. أزهارها رومبي التجميع. أزهارها بيضاء. بلورها كلوية الشكل حنطية. || يوجد في جميع الأريّة انحصا المنتجة ولا ينحى للكسبية. حلفه جيد الصنف مرعوب فيه أكثر استعماله لبقير الحلوب.

٢٩١١٠ - نَفَلْ البَرِّ ، رجُل الأربنب

Trifolium arvense (S). Trèfle des champs, Pied de lièvre (F). Field clover, Hare's foot clover, Stone clover (E). Feldklee, Hasenpötschenklee (D). Mosconi maggiore, Erba lepre, Pie di lepra (I).

نوع من النفل البري المرعوي الممر. ساقه وفروعه زباد



نفل البرِّ

٢٩١٩٢ - نَفَث الدَّم

Hemoptysis (F).
هو يسقط الدم، عطلة.

٢٩١٩٣ - نَفْج

Edosion (F). Hatching (E).
هو التفنن والتفقيص. تقول نفج القلوب أو الصمصص أو الكتكتوت أي خرج من البيضة.

٢٩١٩٤ - نَفْجِيَّة

Pneumatologie (F).
Pneumatology (E).

التفجعية مذهب فلسفي لاهوتي يثبت في كل ما هو خاص أو منوط بالكانات البسيطة بين البشر والآله أو الآلة.

٢٩١٩٥ - نَفْروِب

Néphrops (F).
دورية من التفريجات تدعى برفوت البحر، عطلة.

٢٩١٩٦ - نَفْروِد

Nephrodium (S).
Néphrodie (F). Nephrodium (E).

جنس نباتات جذمورية معمرة من السراخس ونصيلة البسيجات. أنواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم أصقاع العالم || أوراقها مستطيلة، مركبة، وقرية التجميع، جميلة أنفاس الالاس. مزاجها ريشية أو مفرقة. سدائها كلوية الشكل. زكاتها شبه ملصوقة || بعض أنواع التفريده يزرع في المراكب لتزيين.

٢٩١٩٧ - نَفْريد

Néphridies (F).
تفريده نفايد أعضاء الإفراز عند بعض الحيوانات الدنيا كاللوزات وعضديات الارجل والديدان. وفي حيازة أنابيب مسكة، مهدية الجدران الداخلية تمتد في الجسم وتنتهي إلى الخارج.

٢٩١٩٨ - نَفْص

النفس: ما تساقط من الورق وأكثر.

٢٩١٩٩ - نَفْص

Gaulage (F). Beating (E).
هو النوط أو الخبط أي جني الثمار بواسطة الضرب بالمصا.

٢٩١٠٠ - نَفْص

Egronage (F). Picking (E).
فصل الحبوب أو البلور من السنابل والمطر وما أشبه.

٢٩١٠١ - نَفْصَة

المطرعة تصيب بقعة من الأرض وتغطي بقعة.

٢٩١٠٢ - نَفْط ، نَفْطِل

Pétrole, Naphte (F).
Petroleum, Naphtha (E).

زيت معدني يوجد في جوف الأرض مركب من عصري الكربون والهيدروجين الاصليين. أنواعه عديدة ومختلفة الأعراف من لين ورائحة وصفاء ولزوجة. ومنه ما يكون مصفراً قليل المتناثر الثانوية وهو أبيض ومنه ما يكون مغسراً كذا ومنه ما يفرغ إلى الحمرة أو السوداء ويكون بمهه شفافاً وبمهه الآخر كذا كغياً. قلته النوني يراوح من ٧٨٠° إلى ٨٣٠° || يستخلص منه بالتقطير المواد التالية:

سقي ٧٠°
إثر البترول
من ٧٠° إلى ١٢٠°
من ١٢٠° إلى ١٥٠°
البترين
من ١٥٠° إلى ٢٨٠°
زيت الآلانة المعروف بالبترول
من ٢٨٠° إلى ٤٠٠°
الزيوت الثقيلة والشحم المذني
من ٤٠٠° وما فوق
البترين والفازلين
وأخيراً المازوت الذي يعتبر رأسب التقطير

٢٩١١٦ - نفل بلغاتي ، نفل دكاسي

Trifolium pannonicum (S). Tréfle pannonien, T. de Dalmatie (F).

نوع من النفل المرصوي الممر . ساقه زهاء منتصبه فراءه تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم . ازهاره رويمى التجميع غروطي الشكل . ازهاره كبيرة القذ عاجية اللون يملعها مواج اصفر . وريقاته اعليجية تملو من ٤ الى ٥ سم . نصلها ازغب البشرة باثت الحفصار || وهو من النباتات السبروتية التي تعيش حتى ارتفاع ١٨٠٠ م . ويجود في جميع الاربة العميقة الغور .

٢٩١١٧ - نفل ثرؤسي *Trifolium lupinaster* (S). Tréfle à feuilles de lupin, T. faux-lupin (F).

نوع من النفل الزبني الممر . ساقه منتصبه قليلة الفروع تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقه خماسية او سباعية الورديات ، نصلها ستانية ذرية تملو نحو ٤ سم . ازهاره مستطيل الشكل . ازهاره ارجوانية اللون تملو نحو ٢ سم . تنوره يستمر من حزيران الى آب .

٢٩١١٨ - نفل قرمزي *Trifolium incarnatum* (S). Tréfle incarnat, T. anglais, T. du Roussillon (F). Scarlet clover (E). Incarnat-Klee (D). Trifoglio incarnato (I).

نوع من النفل المرصوي الزراني القمي الممر : ساقه فراءه زهاء تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم . وريقاته ملوكة الشكل . ازهاره سنبل التجميع . ازهاره قرزية اللون . يزور الى الصفار الملعب المواج || يجود في جميع الاربة الصافة . يكثر استعماله كنبات حولي لانه سريع النمو وجيد الانتاج في اول عهده . ضروده المشهورة لحسة فوارقها التعلوت بسرعة الادراك وصلاحيها الى اربة معينة .

٢٩١١٩ - نفلح صفة الفصر الذي لا يجس لبنه . فتقول فصر لفعو . والبقرة النفلح تلك التي يخرج لبنها من غير حلب .

٢٩١٢٠ - نكيد ٥ *Usable* (F). *Liable to wear out* (E). صفة ما يمكن استنفاده او ما يمكن ان يفنى .

٢٩١٢١ - نكيد ٥ *Terebratula* (S). *Térébratule* (F). *Terebratula* (E).

جنس حيوانات من الرغويات عضديات الارجل وعضية الفيلديات . انواعه المعروفة عديدة ، بعضها من متحجرات الطبقة الديفوتية والبيض الآخر ، اي الماصر ، منتشر في جميع بحار العالم || اصداها صغيرة القذ ، شبه غروطية الشرنق ، لامتناهية المصاريع المائلة || تعيش لاصقة بالصخور المنصورة .

٢٩١٢٢ - نكيد يات ٥ *Terebratulidae* (S). *Térébratulidés* (F). *Terebratulidae* (E).

فصيلة من الرغويات المنفصلة عضديات الارجل . اجناسها وانواعها عديدة ، معظمها من اساقير الابراج القديم والحديثة الديفوتية . اما اجناسها المعاصرة فنتشرة في معظم بحار العالم || اصداها صغيرة القذ ، شبيهة الاشكال والاراء || اعرف اجناسها واشهرها النغيدة والتقيشة والملاس والفسيث والدليية .

٢٩١٢٣ - نغير *Stramoine* (F). هو الداتوره الشاذكة ، اطليا .

تملو من ١٠ الى ٢٥ سم . وريقاته ثلاثية التركيب قليلة الشكل . ازهاره سنبل التجميع . ازهاره ودية اللون .

٢٩١١١ - نفل الماء *

Menyanthes trifoliata (S). Ménélanthe, Ménéyanthe, Tréfle d'eau, T. des marais (F). Bog-bean, Buck-bean, Marsh trefoil (D). Bockbohne Fleckerklee, Sumpfbleckerklee (D). Scarfano, Trifoglio d'acqua, T. caprino (I).

نبات عشبي جلمودي متعني معمر من فصيلة الجنطيانات . اوراقه مركبة ثلاثية تشبه اوراق النفل وهي متعاقبة ، منقطة ، حاشنة . ازهاره عنقودي التجميع . ازهاره صغيرة القذ يضاء اللون موشحة بالوردي || اوراقه طيبة عديدة المنافع الصحية وقد تستعمل استعمال الجنجل . راجس المطرغل .

٢٩١١٢ - نفل للروج * ، نفل بتفسجي ، برسيم احمر ، رطبة

Trifolium pratense (S). Tréfle commun, T. des prés, T. violet, T. rouge, Tramène, Triolet, Lucotte (F). Red clover, Purple clover, Meadow clover (E). Klee, Roserklée, Wiesenklee (D). Trifoglio rosso, T. dei prati, Moedno (I).

نوع من النفل المرصوي السنبل السبروتي الممر الشائع الزراعة . ساقه منتصبه فراءه جواء تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم . اوراقه ثلاثية الورديات البيضية الشكل . نصلها مائل المنفصه يملو عند قاعدته تجديع ابيض حل شكل ٨ . ازهاره رويمى التجميع . ازهاره بتفسجية اللون تعلوها ماجة ارجوانية . يزور بتفسجية القطب الخليل ، صفر القطب القيق || يجود في جميع الاربة الوافرة الموضوية اخضها المتدنية ، العميقة اللور ، الرقاب || متطلباته الخاصة الكلس والبوتاس .

٢٩١١٣ - نفل ابيض *Trifolium elegans* (S). *Tréfle élégant* (F).

نوع من النفل المرصوي الممر . ساقه كثيرة الفروع ، متوسطة الطو ، زهاء . وريقاته ملوكة النصل ، عاقبة الحفصار . رؤوساته الزهرية متوسطة القذ ، كثيرة العدد . ازهاره الى الحفرة الوردية السوية || يجود في جميع الاربة ولا يحسن الفقيرة والخفيفة والرطبة .

٢٩١١٤ - نفل اجنح *

Trifolium hybridum (S). Tréfle hybride, T. de Suède, T. d'Alsace, T. bétard (F).

نوع من النفل المرصوي الشائع الزراعة في المناطق الباردة الرطبة . ساقه دقيقة فراءه تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم . وريقاته بيضية مستطيلة رؤوساته الزهرية كبيرة القذ . ازهاره ودية اللون مخلفة المواج الذي يروح من الالبيش الشاحب الى الاحمر الزاهي || علفه جيد الصنبت مرغوب فيه .

٢٩١١٥ - نفل برتقالي

Trifolium aurantiacum (S). Tréfle orangé (F).

نوع من النفل الزبني الحولي . ساقه فراءه مشبة تملو من ١٥ الى ٢٥ سم . وريقاته ستانية النصل المسن . ازهاره رويمى التجميع ، يبغي الشكل ، يملو من ٥ الى ٧ سم . ازهاره صغيرة القذ يرتقالية اللون || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .



نفل الماء



نفل الروج



نفل اجنح



نفل قرزية



نميدة

٢٩١٢٩ - نقيطة الأرز *

Mycosphaerella oryzae (S).

نطريه مجهرى ركب عصف الارز في نهري تموز وآب
نقوذه وبشي الى اسبكه || مظهره الخارجى يقع مبشرة
لاقياسية الشكل والترتيب تملو نصال الصف تسبب
ذوبها وبياضها الباكر ما يؤدي الى سوء الاسبال وتذقي
الانتاج || احسانه نودلية الشكل . بوياته ثنائية الخلية
تطول من ١٤ الى ١٥ م. وترفض نحو ٤ م. || اضراره
الحققة حتى الآن لا تسبب للكثافة لانها لم تتجاوز
٢ ٪ .



نقطة الاجاص



نقطة الاراشيد



نقطة الارز



نقطة البزيلة



نقطة البطيخ



نقطة التفاح

٢٩١٢٤ - نقيض Labile, Caduc (F). Deciduous (E).

قابل الاحبال أي السقوط .

٢٩١٢٥ - نقيطة *

Mycosphaerella (S).

جنس فطور مجهرية من السخاميات ونصيلة المشويات .
احسانها بسيطة ، ككثاها مديمة النكاة . بوضها خفاف
او زيتوني اللون يجعل يجعل ممتزعة تقصصه الى خطين
متقابلتين القدر . منها هامي الارنكاز في التفاح شبه
ثعلولي || انواعه الفارة عديدة امرها ما يتبع .

٢٩١٢٦ - نقيطة الاجاص *

Mycosphaerella sentina, *Sphaerella sentina*, *Sphaerella pyri*, *Septoria pyri*, *Septoria piricola*, *Septoria nigririma* (S). *Septoriosa du poirier* (F). *Leaf spot of pears* (E). *Weißfleckenkrankheit der birne* (D).

فطر مجهرى يمتري اوراق الاجاص وقد يصيب اثار .
مظهره الخارجى يقع صغرية مبشرة ، قطرها من ١ الى
٤ م. لونها الى الخطين يحيطها اطوار احمر اللون يتسجي
المواج ، تركب نصل الاوراق فتؤذيها وتمتحنها عن القيام
بوظيفتها الى الوجه الاكل || بكتيدات نائلة نودلية تطول
من ١٥ الى ١٨ م. . بوياته اسطوانية مقوسة شفاقة
مستتة الاطراف ثنائية الانقسام لثلاثية الخلايا تطول من
٣٣ الى ٤٣ م. وترفض نحو ٣ م. || تكاثره مشروط
بالعمل الجوى المرافقة || يكافح كسائر فطور جلحه.

٢٩١٢٧ - نقيطة الاراشيد *

السوداكي *

Mycosphaerella arachidicola, *Cercospora arachidicola*, *C. arachidis* (S).

فطر مجهرى ركب اوراق النبات وسوقها . مظهره الخارجى
يقع زبتيه م حنطية بجووية فطرها براوح من ١ الى ١٠ م
تملو نصال الاوراق الى صفحاتها السفلى ثم تنتشر على
السوق والمخاليق فتؤذيها وتمتحنها عن القيام بوظيفتها الى الوجه
الاكل || كوانبه ربادية اللون ملتوية الاطراف . كئاده
صغرية الشكل مستقيمة الجسم او مقوسة ، طولها براوح
من ٣٧ الى ١٠٨ م. وعرضها من ٣ الى ٥ م. . انقسامها
شدية التباين براوح من صغف الى ٣ اصغاف || يكافح
باستعمال الادوية الفطورية التي لا ينجح من تركا
عناصرها الفعالة . وين المستحسن تطهير البذار قبل
استناله بمحلول سلفات النحاس المركز ٥ ٪ مدة ساعة
من الزمن .

٢٩١٢٨ - نقيطة الاراشيد المستديرة *

نقيطة بركسكي *

Mycosphaerella berkeleyi, *Cercospora personata*, *Cladosporium personatum*, *Septogloeum arachidis* (S).

فطر مجهرى ركب سوق الاراشيد واوراته فيقوذيها وقد
يسبب ذوبها وبياضها || مظهره الخارجى يقع مستديرة
تبدو حنطية اللون ثم تسم وتنتهي باليباس والانفجرات .
كوانبه نودلية الشكل جووية اللون . كئاده اسطوانية
الجسم ، مستتة الاطراف ، حنطية ، تطول من ١٨ الى
١٠ م. وترفض من ٥ الى ١١ م. . انقسامها يشطرها
بنكس ضمين الى ٩ اصغاف . احسانها وارتاقها برمية
ثعلولي . بوياته ثنائية الخلايا لا متساوية الشكل والجسم .
يكافح مكانة نقيطة الاراشيد .

٢٩١٣٠ - نقيطة البزيلة *

Mycosphaerella pinodes, *Ascochyta pisii* (S). *Anthraxose des pois* (F). *Blight of peas*, *Leaf spot of peas* (E). *Brannfleckenkrankheit der bohnen und erbsen* (D).

فطر مجهرى يمتري اوراق وصفت البزيلة والجلبان
والخمر والترس || مظهره الخارجى يقع لاقياسية الشكل
والترتيب لونها الى الطمعة يحيطها حنط اسمر ، تركب الوراق
والسنت والسوق فتشوهها وقد تسبب ذبول القرون وبياضها
قبل اكال الحب || وهو من الفطور القوية التي لا تتكاثر
الا في ظروف بيئية محدودة تساندتها عوامل مناعية خاصة
قوامها تدلى الحرارة وقلة الفصح وكثرة الرطوبة الجوية
النسيية .

٢٩١٣١ - نقيطة البطيخ *

Mycosphaerella citrullina, *Dipodina citrullina*, *Ascochyta cucumis* (S).

فطر مجهرى ركب البطيخ والنبات والنبات والكوس وغيرها
من القرعيات فيقوذيها اشد الاذى || مظهره الخارجى يقع
سمر لاقياسية الحجم والتجميع تسبب نصل الوراق تسبب
يباس النسيج ثم تسبب السوق لتسقطها بيثور قرصية
تحول دون وصول كامل النسيج الى الفروع والاوراق
تسبب اسودادها وبياضها || بكتيدات نودلية الشكل ،
حنطية اللون ، حجمة الخن ، تطول نحو ١٦ م. . بوياته
شفاقة ، ثنائية الخلية ، شبه اسطوانية الشكل تطول من
١٠ الى ١٨ م. . وترفض من ٣ الى ٥ م. . يكافح عند
ظهوره باستعمال احد الادوية الفطورية الفعالة تعفيرا على
النبات والربة .

٢٩١٣٢ - نقيطة التفاح *

Mycosphaerella pini, *Cylindrosporium pini*, *Phoma pini* (S). *Fruit spot*, *Brooks' fruit spot* (E).

فطر مجهرى ركب ثمار التفاح . مظهره الخارجى يقع
دقيقة فطرها نحو ٥ م. . تسبب بشرة الثمرة تبتو حنطية
اللون او خضراء حابطة او سمر . ركب التفاح في آب
ويستمر في نشاط حتى الخزن بالبراد حيث يتوقف ويركن
الى ثبات البياض || احسانه في تمويش على الوراق المساقطة
والتي براوح قطرها من ٧٠ الى ١٠٠ م. . تحسن بعض
الاتفاق التي لا يقل عددا من ٣ . بوياته شبه اسطوانية
طولا ١٩ م. . وعرضها ٣ م. || اما بكتيدات التي
تركب الثمار فهي تلتفت للعديد من الكائنات الخيطية
المستقيمة ابر المويعة التي تطول من ٥ الى ٨ م. وترفض
البشرة لانها تقا تملب السوق اذ لا تغدق فيه اكثر من
ملليتين || يكافح مكانة التفاح .

٢٩١٣٢ - نَيْطَلَةُ الثُّوتِ *

Mycosphaerella morifolia, *Cylindrosporium mori*, *Septoria mori*, *Septoglossum mori*, *Chelaria mori*, *Phaeospora mori* (S). Fausse-rouille du mûrier (F).
فطر مجهرى يركب أوراق الثوت. مظهر الخارجي يقع مزوانية صفاء اللون، سمراء الاطراف، تستري نصل الازراق وتصب جفاف التسجج || اضراره محصورة بمدى العطب الذي يمل بالنسج وفيه يعمل في بعض المراتق انتطيلة والظروف المتغيرة للملاعة الى نحو ٥ ٪ من مساحة النصل. هذا مع العلم ان دون القتر يفسد اكل النسج الشائبة. يكافح بنضج الاشجار قبل اوراقها باسد المركبات النحاسية.



نَيْطَلَةُ الثُّوتِ

٢٩١٣٤ - نَيْطَلَةُ الثُّوتِ *

Mycosphaerella bollana (S).
فطر مجهرى يركب الثتين في اوراقه فيلذبا. مظهره الخارجي يقع مزوانية تملو النصل على صفحت السفل ضمن حديد العروق والاعصاب، تبدو حافية اللون الى ان يكتملها الحامل الاطمل فتتألفها اذ ذلك على الصفحة العليا نحو سمر واحدة مقروسة || كئائله وشية الشكل زيتونية اللون تطول من ٣٥ الى ٤٥ م. وتعرض من ٧ الى ٨ م. انفاسها يراوح من ضعفين الى ٦ اشعاع. اضراره تافهة لا تستوجب المكافحة.



نَيْطَلَةُ الثُّوتِ

٢٩١٣٥ - نَيْطَلَةُ الثُّوتِ *

Mycosphaerella allicina (D).
فطر مجهرى يركب أوراق الثوم والكرات فيوشها وقد فيلذبا ويصيب يباسا || مظهره الخارجي يور صغيرا كبيرة مبهمة تبدو يفساه اللون ثم يوداء وتنتهي بالمسرة واليباس || اسناته تتكاثر على صفحتي النصل. انقلقه تطول من ٥٥ الى ٦٥ م. وتعرض نحو ١٤ م. ويريفاته ثنائية الخلية تطول من ١٦ الى ٢٥ م. وتعرض نحو ٥ م. اضراره لا تمتد الى الازراق.



نَيْطَلَةُ الثُّوتِ

٢٩١٣٦ - نَيْطَلَةُ الخَمْصِ *

Mycosphaerella rabiei, *Ascochyta rabiei*, *Phyllosticta rabiei* (S). Anthracnose du pois chiche (F).
فطر مجهرى يصيب الحمص في جميع اعضاءه الهوائية. مظهره الخارجي يقع بفضية الشكل او مستديرة تركب السوق والاوراق والسلف. تبدو حطية اللون ثم تتصرف الى البنية البيضاء يحرقها اطراف اخر. وعند اشتداد اذاها تفرح السوق وتذبل الاوراق وتصبج اطراف السلف. ويريفاته اسطوانية الشكل تطول من ١٢ الى ١٤ م. وتعرض نحو ٤ م. || يكافح اما بتطهير الحمص قبل بدو ذلك بقتله نحو خمس دقائق في محلول سلفات النحاس المركز ٥ ٪ او بنضج زراعته قوًا بعد ازهارها بمحلول يورود المركز ١ ٪.



نَيْطَلَةُ الثُّوتِ

٢٩١٣٧ - نَيْطَلَةُ الخَمَزِ *

Mycosphaerella populicola, *M. populi* (S).
فطر مجهرى يركب الخمر في اوراقه فيوشها. مظهره الخارجي يقع مزوانية صغيرة اللتد حطية اللون تملو النصل فتفرحه || تشوهه لا يستوجب المكافحة.



نَيْطَلَةُ الشَّيْثَانِ

٢٩١٣٨ - نَيْطَلَةُ الثُّوتِ *

Mycosphaerella tulasnei, *Cladosporium herbarum*, *Hormodendron cladosporioides* (S). Noir des céréales, Mouchetage, Moucheture (F). Black point, Dark, Brow-tip (E). Schwärze des Getreides (D).
فطر مجهرى يمتري عصف الزرع وعصيفات السنايل في الخطة والشير والشرفان والتليل || مظهره الخارجي

يقع حطية تركب العصف قسب ذبولة ثم تصيب عصيفات الحب فتوشها بنقط سود. وفيه يركب البرة في نطيلها فيفسد كنقطة سوداء داكنة || كوانبه بسيطة التركيب لاقياسية الجسم والاستطالة لونها الى السمرة. كئائله طرية التكاثر. ويريفاته بفضية الشكل، حطية اللون، فردية او ثنائية الخلية تطول من ١٨ الى ٢٤ م. وتعرض من ٧ الى ١٥ م. || اضراره قليلة لا تستوجب المكافحة المكثفة.

٢٩١٣٩ - نَيْطَلَةُ الزَّرْقَانِ *

Mycosphaerella miliagrana, *M. microscopa* (S).
فطر مجهرى يصيب الزرنون في اوراقه فيلذبا وفي قصباته الفتية فيفرحها ويصلها. || مظهره الخارجي يقع كثيرة سمراء اللون، مستديرة الشكل، قطرها يراوح من ٣ الى ٤ م. تركب فصل الازراق قسب يباس التسجج وانثقابه. وهو حل القصبان يقع مستطيلة لا يقاسية الشكل والحجم تركب بشرة السام قرب ابط الورقة فتفرحها وتقرحها يطار رافع جويي ابيض. || كوانبه ضمية التجميع متصبة. كئائله سوية صفراء اللون تطول من ٣٥ الى ٤٦ م. وتعرض من ٥ الى ٥ م. اسناته كروية الشكل قطرها يراوح من ٢٥ الى ١٥٥ م. انثقابه وشية تحفن اربعة اذواج من اليريفات الشفافة التي يراوح طولها من ١٦ الى ٢٥ م. وعرضها من ٣ الى ٤ م.

٢٩١٤٠ - نَيْطَلَةُ السُّوسَنِ *

Mycosphaerella macrospora, *Didymella macrospora*, *Heterosporium gracile*, *Scolecotrichum cladosporioides* (S).
فطر مجهرى يصيب اوراق السوسن واللوبث وفيلذبا ويصيب الى نوحها وازهارها. || مظهره الخارجي يقع مستطيلة حطية اللون جوية الخار خيزراء الاطراف الخارجي تطول من ٤ الى ١٥ م. وتعرض من ٢ الى ٥ م. تركب النصل على صفحتها العليا فتفرحها وتقرحها وتصبج اصفرارها وذبولها. || كوانبه اسطوانية الشكل ملتوية الاطراف تطول نحو ٢٥٠ م. وتعرض نحو ١٢ م. كئائله طرية الانتساب حلوظ يراوح من ٤٥ الى ٨٥ م. وعرضها من ١٥ الى ٢٥ م. وهي لا نظامية الاقسام الذي لا يقل من ضعفين ولا يفوق الخمسة. || يكافح قبل الانزعاج باستعمال سائل يورود المركز ١ ٪.

٢٩١٤١ - نَيْطَلَةُ الشَّوْثَرِ *

Mycosphaerella tabifica, *Sphaerella tabifica* (S). Pourriture du cœur de la betterave, Pied noir de la betterave (F). Dry heart rot of beets (E). Herzfäule der Runkelrübe (D).
فطر مجهرى يصيب اوراق الشوثر ويجلوه فيصلها. مظهره الخارجي يقع مستديرة تبدو حطية اللون ثم سمراء تركب الازراق في اواسط الصيف، على صفحات نصالها العليا قسب اصفرارها وذبولها ثم تنتقل بواسطة الاوعية الشبكية الى داخل الجذور فتصلها وتوقع بها اشد الاذى || يكافح باستعمال محلول يورود من مرتين او ثلاث مرات ابتداء من اول تموز.

٢٩١٤٢ - نَيْطَلَةُ الشَّيْثَانِ *

Mycosphaerella fragariae, *Sphaerella fragariae*, *Stigmatae fragariae*, *Septoria fragariae*, *Ascochyta fragariae*, *Cylindrosporium grevilleianum*, *Ramularia tulasnei* (S). Maladie des taches rouges du fraisier, Taches brunes des feuilles du fraisier (F). Leaf spot of strawberry (E). Weißfleckenkrankheit der Erdbeerblätter (D).
فطر مجهرى يصيب الشيك بارواقه فيلذبا. مظهره



نقطة الفرتل



نقطة العنق



نقطة الكرز



نقطة الكسنة



نقطة الملوغ

مستطيلة لا قياسية الانقسام الذي يراوح من ٣ الى ١٢ .
بويغاته ثنائية الخلية . || اغراض زهيدة لا تستوجب
المكافحة .

٢٩١٤٧ - نَقِيطَةُ الْكُسْنَةِ *

Mycosphaerella maculiformis, *Phyllosticta maculiformis*, *Cylindrosporium castaneicolum* (S).

فطر مجهري يركب اوراق الكسنة والبنلق وبعض الانجبار
الحرجية كالاسفندان والثث والبيلا والشرم والسنديان .
مظهره الخارجي يقع صغيرة مزوانية تصيب نصل اوراق
من طلعها السفل فتبدو يضاء اللون ثم سره .
بكتيدات ميمرة التجميع لا قياسية الترتيب لونها الى السرة .
بوضه اسطواني الشكل رباعي الانقسام او خماسي . بويغاته
تطول نحو ٥ مي . وتعرض نحو ١ مي . || اغراض تنحصر
بما يلحقه من اذى بالاوراق وما يسببه من نقص في الغذاء
يؤدى الى الاصبال الباكى .

٢٩١٤٨ - نَقِيطَةُ الْكُشْمَش *

Mycosphaerella ribis, *M. grossularis*, *Septoria ribis*, *Phyllosticta grossularis* (S), *Septoria du grossellier* (F), *Septoria leaf spot* (E).

فطر مجهري يركب اوراق الكشمش . مظهره الخارجي
يقع فسيحة مزوانية الشكل تظهر في نموز وآب لونها الى
الصهبة الحمراء المالح ثم تميل الى البثرة وتستقر حل اللون
الاحمر او يعلو توتيب اسود . || بويغاته شريطية مستطيلة
شاذة لا قياسية الانقسام الذي يراوح من ٢ الى ٥ .
اغراضه زهيدة . يكالغ كسائر فطوره جسه .

٢٩١٤٩ - نَقِيطَةُ الْمُرْأَةِ *

Mycosphaerella fraxini (S).

فطر مجهري يركب المران في اوراقه فيسبب يياها .
مظهره يتكاثر بمسرى الخليا بين النسيج الحايكية واللحمية
مظهره الخارجي يقع مستديرة حطية اللون اردوانية الخمار .
كناثه حطية الشكل ، مستقيمة او مقوسة الاطراف
تطول من ٣٠ الى ٤٠ مي . وتعرض من ١ الى ٢ مي .
اغراضه لا تستوجب المكافحة .

٢٩١٥٠ - نَقِيطَةُ الْمَلْثُوف *

Mycosphaerella brassicicola, *Sphaeria brassicicola*,
Dothidea brassicae, *Phyllosticta brassicae*, *Asteroma brassicae*, *Phoma oleracea* (S), *Ring-spot* (E).

فطر مجهري يصيب الملفوف في اوراقه الخارجية فيعطها
ويؤدى الى النمو فيضعه وقد يؤدى || مظهره الخارجي
يقع مستديرة رداء اللون سود الخمر طرعا يراوح من ٥
الى ١٠ سم . تركب النصل تقديب اصفرار وذوبه .
اصانه وبكتيدات تراكب وتتشابك في البقعة الواحدة
تضطوا الى بؤرة سوداء تتكاثر من مقلها لوف البويغات
الذبيقة الشاذة التي تطول نحو ٥ مي . وتعرض نحو ١ مي .
اغراضه التي حين طليا حويل الورطة يراوح من ١ الى
٢٥ % يكالغ بطيهر البذار ويطيهر تربة الماشال او
باصمال مائل جديدة .

٢٩١٥١ - نَقِيطَةُ الْمَيْتَةِ *

Mycosphaerella manihoti, *Cercospora cassavae*, *C. manihoti*, *C. henningii*, *Septoglossum manihoti* (S).

فطر مجهري يصيب المنيوت في اوراقه فيضها ويؤدى .
مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل ، رداء اللون
تركب اوراق النصل تقديب يباس النسيج وانفثاته .
كناثه تطول من ٢٠ الى ٧٥ مي . وتعرض من ٥

الخارجي يقع صغيرة لا قياسية الترتيب والشكل والحلم
تركب نصل الاوراق لون صفحتها العليا ولا تمتع من
المعالين . تبدو جقوية اللون بتسجية المالح ثم تتحرف
الى السرة وتستقر على البثرة يحويها طار آخر داكن .
كوايه فارشة ، كناثه مستقيمة او مقوسة وهي شاذة
اسطوانية مستقيمة الاطراف . بويغاته لا قياسية الانقسام
تطول من ٢٥ الى ٥٥ مي . وتعرض من ٢ الى ٣ مي .
اغراضه محصورة بمطبع النسيج وحرمانه من القيام بعمله
الجسموري على الوجه الاكل . || يكالغ قبل الانقراض
وبعد الطلع . وقد تبسبب تملطس جلود الشيك ثيل زهيدا
يحلول الحامض الكبريتي المركز ٢ % الذي يقضي على
هذا الفطر ويغيره من الفطوره الضارة .

٢٩١٤٣ - نَقِيطَةُ الْعَلِيق *

Mycosphaerella rubi, *Septoria rubi* (S).

فطر مجهري يركب اوراق العليق والموج البري والجلوي .
مظهره الخارجي يقع مزوانية صغيرة اللد ضلعها يطول من
٢ الى ٣ سم . لونها الى الحطلة تملوها مشحة سمره تركب
نصل الاوراق منذ انتشاب الفروق تسبب يباس النسيج
ثم انفثاته وسقوطه . || كناثه يحصل عادة بعد جني الثار
وهو اذا لامت العوامل الجوية يحش الاوراق الثنية
فيحسبها ويؤدها . || يكالغ كسائر فطوره جسه .

٢٩١٤٤ - نَقِيطَةُ الْفَرْثَل *

Mycosphaerella dianthi, *Didymella dianthi*, *Helminthosporium echinulatum*, *Helminthosporium echinulatum* (S).

فطر مجهري يصيب الفرتل بجميع اعضاءه الهوائية .
مظهره الخارجي يقع مستديرة الشكل او يضيعة ، حطية
اللون ، مهدبة باطار احمر او بتسجية تركب الاوراق ثم
السوق وتعد الى ترويح الزهرة وبتلاتها . || كوايه فسيحة
التجميع ، ممرسة الغرام ملقوة . كناثه اسطوانية الشكل
لا قياسية الانقسام الذي يراوح من ضعف الى اربعة
اصفان . بويغاته تطول من ٣٥ الى ٤٥ مي . وتعرض
من ١٢ الى ١٦ مي . || يكالغ باستعمال سائل بوبود
المركز ١ % قبل الانقراض .

٢٩١٤٥ - نَقِيطَةُ الْفُتْن *

Mycosphaerella gossypina, *Cercospora gossypina* (S), *Cercosporiosis du cotonnier* (F).

فطر مجهري يركب اوراق الفتن فيؤذيها دون ان يسي
الى النمو والانتاج . || مظهره الخارجي يقع صغيرة سمره
اللون مهدبة بالاحمر تلو اوراق الفتن القريبة من التربة
التي لا تملها اشعة الشمس . || كوايه هريبة الشكل
تطول من ١٢٠ الى ١٥٠ مي . كناثه شاذة تطول من
٧٠ الى ١٠٠ مي . وتعرض نحو ٣ مي . وهي سداسية او
سباعية الاجزاء . اصانه حطية الشكل طرعا يراوح من
٦٠ الى ٩٠ مي . انثاقها اسطوانية تطول من ٤٠ الى
٥٠ مي . وتعرض من ٨ الى ١٠ مي . بويغاتها وشية ،
ثنائية الخلية تطول من ١٥ الى ١٨ مي . وتعرض من ٣
الى ٤ مي . || اذاه لا يستوجب المكافحة .

٢٩١٤٦ - نَقِيطَةُ الْكَرْزَةِ *

Mycosphaerella cerasella, *Cercospora cerasella* (S).

فطر مجهري يركب اوراق الكرز والحلب . مظهره الخارجي
يقع صغيرة مستديرة حطية اللون مهدبة بالاحمر تنصل
نصل الاوراق ثم تيبس . وقد ينفضها الريح فيبدو السفل
كالغربال الجبر الملوغ . || كناثه حطية الشكل

والاثنى تمتع المكن محباً في بطون الاثاري || البرقة عنه بلوؤها الادراك الثام تطلو نحو ٦ م. ثوبها في اول عهدا الى الجفوة ثم ينصرف الى البنفسجي الفاتح تملو خطوط قاطبة من النقط السود .

Humerus

٢٩١٥٦ - نَقَّاذ

النقا هو عظم الصدر .

Purété (F). Purité (E).

٢٩١٥٧ - نَقَّاذ و طَهْر

هو غلر الشئ من العناصر الغريبة عنه .

Picolde tridactylus (S).

٢٩١٥٨ - نَقَّاذ

Picolde tridactyle (F).

طائر من فصيلة النقايات ورتبة المتشكلات . موطنه يشمل المناطق الجبلية من الشرق الادلى واروية || جسمه معتدل القدر يطول نحو ٢٠ سم . بسطه نحو ٣٠ سم . ثوبه الى السواد الفضي الملبق بالأبيض في الصق والاياهر . صدره وبطنه الى البياض المشيز بالبنفسجي . جبهة ورقته ويصره الى السواد اللامع . قنة رأسه ذهبية اللون يطولها تشيز نضج . حذقة عينه زرقاء اللون . منقاده وساقه الى السمرة السوداء . ثوب الاثنى لا يختلف من ثوب الذكر الا بحضاب الفتنة اللغوي المشيز بالاصفر || ويتميز النَقَّاذ بكونه ثلاثي الاصابع مغلداً لئلا تلتصق اجناس النقايات الرباعية الاصابع || قوته الحشرات واساريمها . وبعض البلور البرية || يدقن عنه في تجاويف الاشجار . الاثنى تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وسدها دون الذكر الذي يؤن لها الغذاء .

Syndicat (F). Syndicate (E).

٢٩١٥٩ - نَقَّاذ

هي جمية اشخاص يقتنون الى مهنة واحدة او من متشابهة للنفاع للشروع من مصالحهم المهنية .

٢٩١٦٠ - نَقَّاذ

Charrue défonçaise, Défonçaise (F). Trenching plough (E).

سكة خضفة مقنطرة تستعمل للفلج التربة او سحرها واتراخ حيايتها على اعماق تراوح من ٦٠ الى ١٢٠ سم .

Coccothraustes (S).

٢٩١٦١ - نَقَّاذ و نَقَّاذ

Gros-bec (F). Hawfinch (E).

جنس طير من فصيلة الشرشوريات . انواعه المعروفة ١٢ جميعها من عصافير المناطق الحارة والمعتدلة . مسرهما العالم القديم والجديد . تتميز بمنقدها الضخمة التي يمكنها من كسر حبة الوز واللوح والكرز . قوتها النار والحرب والحشرات . قدن في الاجبار الفناء انماها تنقع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها متناوبة الذكر نحو ١٥ يوماً . اعرف انواعه واشهرها النَقَّاذ المبلول .

٢٩١٦٢ - نَقَّاذ مَبْلُول

Coccothraustes vulgaris (S). Gros-bec vulgaire, Gros-bec commun (F). Common hawfinch (E).

طائر من النقاذ وهو اشيع انواع جنسه واكبرها واخصها قدماً وبنشاً . طوله نحو ١٩ سم . رأسه كشي اللون . قفته الى الصبغة الورداء . زفاده وظوره سود . ظهره وسدره الى الصبغة الحمرة . بطنه ابيض . جناحه سود القاعدة ومظف الاطراف . يبيض الريس والعض الاطراف . ذنبه اسود اللون ينتهي ببقعة بيضاء . منقاره الى الزرقاء العابقة . حذقة عينه وردية . ساقه الى الحمرة الطللاء . || يألف

الى ٦ م . انقسامها لا تقاسي الترتيب براوح من ٢ الى ٩ . اصنافها سطحية الاكثر . كروية الشكل تطرها براوح من ٩٠ الى ١١٠ م . اقلها ريمية تحضن اربعة ازواج من البويضات الشفافة الثنائية الخلية .

٢٩١٥٢ - نَيْفَةُ الْمَوْزِ *

Mycosphaerella musicola, Cercospora musae (S). Cercosporiose du bananier (F). Sigatoka disease (E). فطر مجهري يركب الموز في اوراقه فيضها ويسبب ذبولاً وبس في الكيماست ان لم يندمها . || مظهره الخارجي نقاط دقيقة زيتية اللون تظهر في اوائل الصيف على الاوراق الجديدة ثم تقسم وتنشفر نهائياً على شكل مستطيلات براوح طولا من ٣ الى ١٠ م . وقد تتصل بعضها فتصبح بقعاً فسحة مستطيلة لا تقاسية الحجم . اما لونها فيستب على الصبغة الخضمية يحقها اطراف اسمر اللون . اطول البتديب . كراتيه خسية التجميع . كنانته موطية الشكل تطول من ٢٠ الى ٨٠ م . وتعرض من ٢ الى ٦ م . انقسامها براوح من ٣ الى ٧ اصناف . بويضاتها شفافة ثنائية الخلية تطول من ١٤ الى ١٨ م . وتعرض من ٣ الى ٤ م . اضرارها منقطة جدى انتشاره لانه يسبب بياس الاوراق وتثخن الكيماست او اخذها وعدم تكوينها . يكافح باستعمال سائل يورود المركز ٢ ٪ يضاف اليه ١ ٪ من الدبس و ٥ ٪ من الفشا .

٢٩١٦٣ - نَقَّاذ

Canalicule (F). Canaliculus (E).

Nephila (S).

٢٩١٤٤ - نَقَّاذ

Néphile (F). Nephila (E).

جنس زبيلات من المناكب الكبيرة القند . انواعها المعروفة نحو ٦٠ منتشرة في معظم المناطق الحارة من المابين القديم والجديد || ذكورها اصفر قدماً من انثائها . انواعها متراكبة الالوان يطلب فيها الاصفر والاحمر والاسود . جرائرها سم الاطراف || يربو بها في بعض البلاد الاسيرية والامريكية لاستخراج نواصها الحريري الاصفر اللون || اشهر انواعها الصالحة للربية :

N. chrysogaster (S).

لغلة ذهبية اللون

N. clavipes (S).

لغلة لوزيائه

N. madagascariensis (S).

لغلة مدغشكر

٢٩١٥٥ - نَقَّاذ كَرْدِيَّيَلِي * و فَيْدَالِيَّة

نَقَّاذِيَّة كَرْدِيَّيَلِيَّة *

Novius (Macronovius)

cardinalis, Vedalia cardinalis (S).

Novius cardinal (F). Vedalia cardinalis (E).

حشرة عاتلة من فصيلة الدعسوقيات ورتبة معدنات الاجنحة تألف بساتين الحمضيات والمياقل والحدائق . خنافسها ويرقاتها تعيش على الاثاري الذي يفتك بالحمضيات والورد والميموزا ... || جسمها صغير القدر يطول من ٣ الى ٤ م . ثوبها احمر يطول تيجع اسود . رأسها صغير الحجم . اسود . عيناها صغيرتان . زباناها صقيان . صغيران . لكهاها نيشطان . ظهراتها شديدة الاحدياب . مستدير الموتر اللاحت . غداها كهيئة الحمل . ارسافها رباعية العقل || ايجالها الحولية ستة . تخرج الحشرة الجملانة من بيئاتها الشتوي في اوائل الربيع . تسرح في النهار . جيلها يستمر من ٣٥ الى ٤٠ يوماً باستثناء الجيل السادس . في الشتوي ، الذي يستمر نحو ٦٠ يوماً || تسافه بمد ظهورها بابسوح



نَيْفَةُ الْمَوْزِ (١) نَيْفَةُ الْمَوْزِ (٢)



نَيْفَةُ



نَقَّاذ كَرْدِيَّيَلِي



نَقَّاذ



نَقَّاذ مَبْلُول



نقار احمر الرأس



نقار اسود



نقار صير



نقار كبير



نقار



نقاص

٢٩١٦٩ - نقار كبير * ، نقابوية السنوي

Picus major (S). *Pic épéche* (F). Great spotted woodpecker (E).

نوع من النقار موطنه فسيح الاجزاء يمتد من اواسط الشرق الى اطراف اربوية الغربية. جسمه يطول نحو ٢٤ سم. ثوبه متباين الالوان الزاوية. ظهره واعلى جسمه الى السواد اللامع. عنقه وصغره وسنانه مبقعة بالابيض. رأسه اسود. قفقه ويؤخر بطنه الى الحمرة. صدره وبطنه الى البياض الاخير. حذقة عينه جزوية اللون. منقده وربطه الى الكهية الرصاصية. انشاء صواء التقف. يألف اشرج الصنوبريات ولا يقرب من الحادق والجائز الا عند سبب الحاجة الى الطعام.

٢٩١٧٠ - نقاريات

Picidae (S). *Picidae* (F). *Picidae* (E).

فصيلة طير من رتبة المتفصلات اجناسها وانواعها عديدة تبجها ثلاث عمارات. اشهر طيورها النقار والواء.

٢٩١٧١ - نقار *

Penelope (S). *Pénélope* (F). جنس طير من فصيلة الترناسيات. انواعه قليلة، جميعها مستطيلة الشكل الرقيق. قوية المنقار الاجمن. رؤسها رقيقة الريش المستطيل انثام. عشاره ملط. اجنحتها مستدرة، اذيالها طويلة. اوتواها الى السمة الداكنة يطورها وتضم وتوضع الى ثالث الاجراج. تعيش اسراب كبيرة قوتها النار والجرب والخرط. تتش اعشاشها في الاجراج. انثاها تبيض نحو ٤ بيضات تحضنها رسدها اربعة اسابيع.

٢٩١٧٢ - نقار *

Drosophyllum (S). *Drosophylla* (F).

نبات معمر مقرب وسيد الجلس والروع من فصيلة البندانيات. ساقه مقرية. اوراقه صفوية مستطيلة منتصبية تحية النصل المدور بازيب الباق السبي الشكل الذي يشمر كل حشرة تقرب من يقضي فيها ويحميها. ازهاره صفراء اللون. حلقية التجميع. هلبة الازفكار، تقوم حل شراخ مودق قومي الانتساب.

٢٩١٧٣ - نقاطة ، سحاحة (Burette) (F). Curet (E).

٢٩١٧٤ - نقاق

Bombina, *Bombinator* (S). *Bombinaeaur*, *Sonneur* (F). *Bombinator* (E).

جنس مفادح من فصيلة الصفاقيات. انواعه المعروفة قليلة العدد، مهدا البلاد المعتدة الحراة من العالم القديم جسمها صغيرة القد. اطولها تواج من ه الى ٧ سم. جلدها مثاقلة تفرز من الس رفة يضاه سرجة قائمة. اوتواها الصفوية تراوح من الصفرة الباحة الى الحمرة تملوها رقة طحلاء زرقاء الموالج في المتاع ويجاري الماء تركها في الليل وتعد لها عند الفجر الى اجرية مدلهما وشية الشكل عوي من ٢٠ الى ٤٠ مدلة مبطلة تنقف بد التشرة بنحو ثلاثة اسابيع في اشهر انواعه التفاق الاسفر لبطن والتفاق لثاني البطن.

٢٩١٧٥ - نقاق أصغر البطن

Bombina salza (S). *Bombinateur à ventre jaune* (F). *Bombinator à ventre*

نوع من المفادح الثقالة ينتمي الى فصيلة الصفاقيات. موطنه يمتد من الشرق الادلى الى اطراف اوروبية. يألف

الاجراج والنباتات اغصها اشرج الصنوبر والتنوب ولا يقرب من الحادق والجائز الا في فصل الشتاء وعند الحاجة القاهرة الى القوت.

٢٩١٦٣ - نقار ، قواع ، نقابوية

Picus (S). *Pic* (F). *Woodpecker* (E). جنس طير من فصيلة النقاريات. انواعه عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء امريكا. جميعها مستطيلة تركب جذوع الاشجار فتقشرها وتقر قشورها وتقبب شكيرها لاستخراج ما فيها من اساريج وديدان. اجسامها متوسطة القد، اوتواها ملونة. منقارها قوية، مستطيلة، مخرقة. اجنحتها منفرجة الاطراف. اذيالها متوسطة الطول. ارباغها قصيرة. جزئية التسرب. قوتها الحشرات ورققاتها واساريجها وديدانها من النمل الى المناكب والجنادب ولا تمتع من النار والجلوز والصنوبر عند الحاجة. تتش في تجاويف الاجراج انما تقع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وسدها من ١٤ الى ١٧ يوما. تعتبر من الطيور الثالثة التي تستحق الحماية. اشهر انواعها واهرها ما يتبع.

٢٩١٦٤ - نقار أحمر الرأس *

Picus medius (S). *Pic mar*, *Pic à tête rouge* (F). *Mittlerer Buntspecht* (D).

نوع من النقار. موطنه الشرق الاوسط واروبية. جسمه يطول نحو ١٨ سم. ثوبه ثوب النقار الكبير الا انه احمر الرأس. يألف اشرج السنديان دون سواها. انشاء تحضن بمناوبة الذكر من ٥ الى ٧ بيضات.

٢٩١٦٥ - نقار أحمرسر

Pivert (F).

هو الشسة الخضراء، اطليا.

٢٩١٦٦ - نقار أسود * ، ناقوية سوداء، دركوب

Dryocopus martius (S). *Dryocope noir*, *Dryocope noir*, *Pic noir* (F). *Black woodpecker* (E). *Schwarzspecht* (D).

طائر من النقاريات. موطنه جبال الشرق واروبية. جسمه يطول نحو ١٧ سم. وبطنه ٧٧ سم. ثوبه الى السواد السوي القاتم الداكن يستفي منه قة الرأس القرمزية. جناحه متوسط القد، ذلق الطرف. حذقة عينه صفراء اللون. يألف الغابات والاشراج. قوته الحشرات والذناير والنار العنية ويبغس الجرب والصنوبر. الى الاثني تحضن بمناوبة الذكر من ٣ الى ٤ بيضات نحو ١٥ يوما.

٢٩١٦٧ - نقار الفركه هو الحسون ، اطليه

٢٩١٦٨ - نقار صغير * ، نقابوية السنديان

Picus minor (S). *Pic épéchetta* (F). *Lesser spotted woodpecker* (E).

نوع من النقار. موطنه يشمل الشرق الاوسط واروبية باستثناء المناطق النائية. جسمه يطول نحو ١٥ سم. ثوبه الى السواد الغايب اللامع يطلو جميع ابيض معوض. ومستطيل. جبهة وصغره الى البياض الاخير. قة رأسه قرمزية اللون. يتوسط صدره سيالة سوداء تمتد من قاعدة المنقار الى اواسط الجوش. حذقة عينه حمراء اللون. منقاره وربطه الى السمة الرصاصية. انشاء لا حرة في رأسها. يألف الاجراج حل اختلاف انواع اعجابها انما يغفل اشرج السنديان والزائن. قوته الحشرات واساريجها ورققاتها ويكها. انشاء تحضن من ٥ الى ٧ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر ١٤ يوما.

ه يضيأت لونها إلى البياض الناصع تملوه ورقة جلوية .
أعرف أنواعه وأشهرها ما يلي :

نقشاة الحدائق Phyl. trochilus (S). Pouillot fts (F).
نقشاة الشمال Phyl. borealis (S). Pouillot boréal (F).
نقشاة زرقالة Phyl. sibilatrix (S). Pouillot siffleur (F).
نقشاة صناعية Phyl. rufa, Phyl. collybita (S).
Pouillot vélocé (F).

٢٩١٨٥ - نقص
Déficiency (F).
Deficiency (E).
نقص بعض العناصر. الغذائية أو صجز في عيها الأدنى يؤدي إلى خلل ملموس .

٢٩١٨٦ - نقص القيمة
Moins-value (F).
Decrease in value (E).
نقص القيمة أو النقص هو انخفاض قيمة الشيء بين زمني .

٢٩١٨٧ - نقطة
Point

٢٩١٨٨ - نقطة الإرتكاز
Point d'appui (F).
Support-Point (E).

٢٩١٨٩ - نقطة الإستعصاء ، نقطة الجليد
Point de congélation (F). Congélation-Point (E).

٢٩١٩٠ - نقطة الإنصهار
Point de fusion (F).
Fusion-Point (E).

٢٩١٩١ - نقطة الإنطلاق
Point de départ (F).
Starting-Point (E).

٢٩١٩٢ - نقطة الإنقلاب
Point d'inflexion (F).
Inflexion-Point (E).

٢٩١٩٣ - نقطة البُعْثَار
Point d'ébullition (F).
Boiling-Point (E).

٢٩١٩٤ - نقطة البروز
Point d'émergence (F).
Emergence-Point (E).

٢٩١٩٥ - نقطة الجُذْم ، نقطة التقاطع
Point de section (F). Section-Point (E).

٢٩١٩٦ - نُقْطُور
Necturus (S). Necture (F).

جنس حيوانات قازية من السرفقيات وفصيلة القطرسيات .
أنواعه المعروفة قليلة العدد موطنها أمريكا الشمالية . تألف
المتاع وضفان بجاري الماء || أجسامها شبه أسطوانية
الشكل ، تطلو من ٣٠ إلى ٤٠ سم . رؤوسها شبه
خروطية الشكل . عيونها شديدة الصغر . قوائمها قصيرة ،
رباعية الأصابع || أطوارها إلى السرة المرقشة بالأسود ||
قوتها الديدان والدويبات الصغيرة .

٢٩١٩٧ - نُقْطُول
Noctule (F).
نوع من الخفافيش المفيدة يهوى عُشَّاف السَّق ، أطليه .

٢٩١٩٨ - نُقْب ، نُقْبُص
Eclosion (F).
Hatching (E).

هو في الطير زمن انفلاق البيض عند اكتمال الخلقة وهو
في السمك زمن أنبجاص السرة أما في الحشرات فهو زمن
نقب المكن .

٢٩١٩٩ - نُقْلُ الْحَقِّ
Transfert (F).
Transfer, Conveyance (E).
هو أن ينقل المرء سقاً له إلى غيره . وفي القانون التجاري

الماتم ويجاري الماء . مسرعه دجوي . يعيش نحو عشر
سنوات . قوته الحشرات الصغيرة والديدان والذباب || جسمه
صغير القد يطول نحو ٥ سم . عند الذكر ونحو ٦ سم .
عند الأنثى . رأسه صغير الحجم . عيانه جاحظتان . حنكه
مستعرضة الشدق ، سنن الفك العلوي . قائمتا الأمانيتان
قصيرتان ، رباعيتا الأصابع الطويلة ، أما الخلفيتان
فمطيلتان ، خاصيتا الأصابع المفيدة بحظاب كامل .
جلده مشتمل القشار يفتر عنه لحمه رقيقة بياض نافطة
تثير العطاس والدموع . ثوبه العلوي إلى السرة الخنطية
الضفاد المولج تعلوها نمشة قائمة ورسجية خضراء . بطنه
وسائر صمغته السفلى إلى السرة الناعمة تملوها مشمة
صفراء ورقشة زرقاء خفيفة || بيئاتها الشتوي يستمر نحو
أربعة أشهر . يتميز ببلته الصويصة الرائحة الجوزية
الشكل والقد . ليقته قصير النعمة ، متتابع الإيقاع .
شديد الإزعاج .

٢٩١٧٦ - نُقَّالَة
Brouette (F). Wheelbarrow (E).
عجلة يدوية مجهزة بدولاب واحد يستعملها الإنسان لنقل
الاياع الخفيفة .

٢٩١٧٧ - نُكْب
Défonçage, Défoncement (F).
Subsoil ploughing (E).
كري التربة الزراعية لقلبها وتفتيت مدرها وتنظيفها
وأعدادها لزراعة القابلة .

٢٩١٧٨ - نُكْح
Silice pure (F). Pure flint (E).
الخالص من الريل .

٢٩١٧٩ - نُكْدَم ، عَدَا
Comptant (F).
Spot cash, Ready (E).
طريقة دفع ثمن مبيع عند تسلمه أو أجرة عمل عند نهايته .

٢٩١٨٠ - نُكْدَك
هي النعشة ، أطليها .

٢٩١٨١ - نُكْدَك
هي الكروية (الانزري) والكزبرة (ابن الانزاري) .

٢٩١٨٢ - نُكْرَة مَرَّة
Taches amères (F).
Bitter pit or stippen (E).

عارض يصيب ثمار التفاح الخضرية في الرباد ، أسبابه المعروفة
حتى الآن تمتد إلى الشلوة في التغذية والرري وإلى مناخ بعض
المواقع || مظهره الخارجي بقع مستديرة منخفضة السطح
قطرها من ٣ إلى ٦ سم . وضعها الداخلي يفور من ٢ إلى
١٠ م . فيسبب تغير لون اللباب المطلوب ويكسبه مראה
المذاق .

٢٩١٨٣ - نُقْرُوس
Simulle (F).
هو النجوس والقنوس ، أطليها .

٢٩١٨٤ - نُقْشَارَة
Phyllopeuste, Phylloscopus (S). Pouillot (F). Wil-
low warbler (E).

جنس طير من فصيلة الدغليات . أنواعه المعروفة عديدة ،
أعطاها العالم القديم ، منها الأراباد والقواطع التي تجوب الترق
والقرب . جميعها صغيرة القد ، متراكبة الألوان بكثير
فيها الأصفر والأخضر . قوتها الحشرات والحوام . تألف
الحادق والجئاتن القريبة من المصراع . تدفن في الشجيرات
والأشجار المغنونة . أعشاشها مخروطية الشكل جانبية المداخل
تحمس من مرتين إلى ثلاث مرات في العام . مسطنتها نحو



نقشاة



نقوس

يراجح من ٨ الى ١٢ سم. ثوبها رصاصي اللون لامع اللوامح. يكثر وجوها في الصيف. تمتص مكبها حل دود القطن فينتفخ عن رقات ذرية دقيقة تدمل وتنتقل في جسم المائل ونحته.

٢٩٢١٠ - **تغيير فضي** *
Gonia capitata (S).
ذبابه نافعة من التغيرات طويلة راجح من ١١ الى ١٣ سم. رأسها فضي اللون. جسمها رصاصي اللون تملوه خلة فضية وشطوط صمر. تمتص مكبها حل البودة القنطرة فينتفخ عن رقات نهمة تنتقل في جسم المائل ونحته.



نقر أصفر الجناح



نقير اهل

٢٩٢١١ - **تغيير صيدولة** *
Phryxe vulgaris (S).
Phryxe vulgaire (F).
حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة التغيرات. جسمها يطول من ٦ الى ٩ سم. قشورها متكاثف الحمل والملمب. ثوبها الى الطحلة الموشحة بالاسود. رأسها كبير، احمل اللون. عظمها متدل الطول. زباناها صغيران، نحيلتان. عينهاا ناضراتان، ارجوانيتان. ورشهاا كيرتان، اصفر القاعده. قوائمها الى السرة السوداء. تظهر الحشرة الجملانة من نيسان الى تشرين الثاني. وهي مبدولة في كل مكان تكثر فيه الازهار. يرقاتها تتطفل على اساريع الحشرات من مختلف الفصائل.



نقير رصاصي



نقير نقي

٢٩٢١٢ - **تغيير مدملك** *
Gymnosoma rotundatum (S). *Gymnosoma arroundi* (F).
حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة التغيرات. جسمها صغير القد، متكاثف الحمل، يطول من ٥ الى ٧ سم. رأسها كبير الجرم، اصفر اللون، ملصق اللجم. عظمها متدل الطول. زباناها دقيقتان، صغيران. عينهاا كيرتان، ارجوانيتان، صدها الى الصفار المذهب. بطنها شبه مكور الشكل، اصفر اللون، صناعي اللوامح تملوه، في قمه، ثلاث نقط سود. ورشهاا موشجان بالاصفر. قوائمها الى السرة السوداء. تظهر الحشرة الجملانة من ايار الى آب. سرسوها البراري حيث تكثر النباتات الصيوانية الازهار. يرقاتها تتطفل على نصفيات الاجنحة.



نقير مدملك

٢٩٢١٣ - **تغييريات** *
Tachinidae (S). *Tachinidae* (F).
فصيلة حشرات ذبابية نافعة من ربة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها كثيرة التمدد مختلفة الالوان الاحجام. تعمل على طويها بمستوى حلقهاا الطريقة بعض الهلج الشاك القاسي. قوتهاا مدثر الازهار والارزاقهاا. يرقاتها طفيلية تركب اكثر الحشرات انحصاا مستنبات الجناح ونصفيات الاجنحة والنشائيات والحشويات والمفسلات. وهي لا تفرق بين الحشرة والاسروع والمخادعة.



نقير مدملك

٢٩٢١٤ - **تغييريات** *
Bothriocephalidae (F).
فصيلة دود من المنطقيات الرغصات تتميز بحلقهاا المسترقة العادة الحبيرات التناسلية.

٢٩٢١٥ - **تغييرية** * ، **تغييرية رصاصة** *
Bothriocephalus (S). *Bothriocéphale* (F). *Bothriocephalus* (E).
جنس ديدان قدية مستحيلة من فصيلة التغيرات. انواعهاا عديدة جميعها مؤذية تتطفل على الحيوانات الفقارية.

هو نقل ملكية السند الاسمي من اسم البائع الى اسم المشتري.

١٩٢٠٠ - **نقل الملكية** *
Mutation (F). *Transfer* (E).
هو كل عمل قانوني ينقل من شخص الى آخر ديناً او حقاً عينياً.

١٩٢٠١ - **نقطة** *
Point de pivot
النقطة هو وسط الشيء او النقطة المحورية التي ترتكز عليها قياسات المدار.

١٩٢٠٢ - **نقوس** *
Copernicia (S). *Copernicia* (F). *Wax palm* (E). *Caroubapalmes* (D). *Copernicia* (I).
شجرة من فصيلة النخلات، اعطائها الاقاليم الحارة الرطبة. جذعها مائل العماد يطول نحو ٨ امتار. اوراقها حامية الازنكار مرمسية الشكل مستطيلة الزنار المدم الشوك. نصلاها جامد الصلصة، مائل البشرة، جميل الخشار الزاوي. نسيجه مضروب فيه يستعمل في صناعة القبعات. ثماره زيتية المادة يستخرج منها دهن النقوس الشائع الاستعمال.

١٩٢٠٣ - **نقوي، عصبدي** *
Huméral (F). *Humeral* (E).
نعت تعري ي يطلق على كل ما له صلة بالنقا.

١٩٢٠٤ - **نقبة** *
Lacunelle (F). *Lacunula* (E).
١٩٢٠٥ - **نقير** *
Hile (F).
هو الانقود، اخلبه.

١٩٢٠٦ - **نقير** *
Auge (F). *Trough* (E).
جرن مستطيل يستعمل لاحكام الماشية او لاسقاطها.

١٩٢٠٧ - **نقير أصفر الجناح** *
Phaia crassipennis (S). *Phasie crassipenne* (F).
حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة التغيرات. جسمها متوسط القد، متكاثف الحمل والملمب القصير، يطول من ٨ الى ١١ سم. رأسها كبير، انفس، اصفر اللون. عظمها متدل الطول. زباناها نحيلتان، صغيران. عينهاا كيرتان، ارجوانيتان. صدهاا قديمي الشكل، اصفر اللون، يتفسي الحمار والقاعدة والتطبيع. بطنهاا صغري الشكل. اصفر اللون، تملوه بقعة بنفسية. ورشهاا كيرتان، مناسكان، ابيضان، اصفر الحمار الامامي. قوائمها الى الخنطي الصناعي. ارساهاا سود. تظهر الحشرة الجملانة من حزيران الى ايلول. سرسوها البراري وكل مكان تكثر فيه الازهار. يرقاتها تتطفل على مستنقات الجناح ولا تمف عنه الحاجة عن نصفيات الاجنحة.

١٩٢٠٨ - **نقير اهلب** *
Mimtho lila (S).
ذبابه نافعة من التغيرات. طولها نحو ١٠ سم. رأسها وصدها الى الزرقعة الالامسة. بطنهاا احمر اللون يملوه ملج كفيف اسمر. يرقاتها تعيش على مكن غدييات الاجنحة. ج. انقرة.

١٩٢٠٩ - **نقير رصاصي** *
Eutachinus larvarum (S).
ويلى تاكينا كبيرة. ذبابه نافعة من التغيرات. طولها

انها تبض من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر من ١٧ الى ١٨ يوماً || اعرف انواعها واشهرها النكات الاسود الذيل .

٢٩٢٢٥ - نَكَاتٌ اَسْوَدُ الذَّيْلُ *

Recurvirostra avocetta (S). *Récurvirostre avocette*, *Avocette* (F). *Avocette* (E).

طائر من النكات طوله براوح من ٤٧ الى ٥٠ سم. ثوبه الى البياض الناصع باستثناء منقاره ورأسه وظهوره وذنبه وكل جناحيه وابهرها السود || يحرب العالم القديم في طلب المصيف والمشي. يرتاد الشواطئ والاعوار والمناقع وبحاري الماء. يعيش اسراباً كبيرة براوح عددها من ٥٠ الى ٥٠٠ .

٢٩٢٢٦ - نَكَاتِيَّاتٌ

Récurvirostridae (F). *Recurvirostridae* (E).

عمارة طير من فصيلة دجاجيات الارض وسيدة الجنس قليلة الانواع تتميز باستطالة ذقن منقائدها المدية الملائق المنقشعة الى اللامع. اجنحتها مستطالة ذلقة تلتف الذنب ارساغها رفيعة ، مستطعة ، سرديّة البشرة. اصابعها كلبية ، حطائها كامل موصل .

٢٩٢٢٧ - نَكَاسٌ

النكاس والآنكس نوع من السلك عظم جداً (التاج) .

٢٩٢٢٨ - نَكَاتٌ

Parotidite (F). *Parotitis* (E). النكاف ويدهى التهاب الكففة هو التهاب الغدة النكفية .

٢٩٢٢٩ - نَكْبَاةٌ

هي الريح التي تلوذ دون ان يتبين لها مهب .

٢٩٢٣٠ - نَكَيْتِيبٌ جَبَّارٌ *

Nyctibius grandis (S). *Ibajau géant* (F).

طائر راس من فصيلة السيديات. موطنه بعض مناطق امريكا الجنوبية. يألف الاجراع الكثيفة الجيدة من كل هيران. يسرح في الليل ويبعث طول النهار جاثماً على فصن حجر لا يتحرك البتة || جسمه كبير القند يطول نحو ٥٥ سم. بسطته نحو ١٣٠ سم. ريشه شديد النعومة متوسط اللون. ثوبه الى الطحلة الصفراء المراج يملؤها تجلج اسمر وتشيز اشجع ورقشة ربداء. رأسه مستعرض الجرم. عيناه كبيرتان كسنتينان. رموش عينية طويلة. سباله كثيف مستطيل. منقاده قليل الاستعداد الخارجي. عجبين البهرة ، عريض القاعدة ، عظم الشدق. عتقه بالغ القصر. جناحه رجب مستطيل. ذنبه مستدير الطرف. رسناه قصيران. اصابعه مستطيلة قوية || طيرانه خفيف الحركة ، سريعها. سميح على الارض اخرق. قوته الحشرات من جميع الفصائل والثرثب ومن جميع الاحجام || يدشن عتبه في تجاريف الاشجار. الاثن تسع من بيضتين الى ثلاث بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ثلاثة اسابيع .

٢٩٢٣١ - نَكَيْتِيلُ *

Noctilio (S). *Noctillon* (F). جنس غفائش من عمارة الرماصات يتميز باستطالة رأسه وفوطيته ، بانشرام شفته العليا المتعصبة يطول جناحه. له نوزاع موطنها جزر الانتيل || يعيش جماعات قليلة العدد. يسرح من الفسق الى الفجر. قوته الحشرات على اختلافها والاسماك الصغيرة. يألف المداور وراقب الصخور البحرية .

تميش حياتها البدائية في الماء حيث تتطفل على بعض الاسماك وتنتقل منها الى معدة الانسان || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٢٩٢١٦ - نَقِيرِيَّةٌ عَرِيضَةُ

Bothriocephalus latus (S).

اكبر انواع الديدان النقرية القديمة التي تتطفل على الانسان طوطا نحو ١٠ امتار. رأسها ثنائي الوافض ، عادم الكلايب ، مغزولي الشكل ، مقطوم للمقدم. جسمها عديد السكم المستمرة الضيقة. يعتقد ان ملقوحاتها المهيدة التي تميش في الماء وتتطفل على بعض الاسماك منها السلمون والثرثرة ، تتطفل بذات الاسلوب على بعض الناس الذي يتسبحون في بعض المياه المذبة .

٢٩٢١٧ - نَقِيرَشَةُ * ، قُبْعَةُ الامْبَاطُور

Spirifer (S). *Spirifère*, *Chapeau de l'Empereur* (F). *Spirifer* (E).

جنس حيوانات من الرغويات عصفيات الاربل وفضيلة التنديمات. انواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الطبقة الدفونية. انواعها الماصرة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحارة || اصداؤها صغيرة القد ، شوزنها قريب الشبه بالقيمة التي كان يرتديها الامباطور نابوليين. جميعها نظامية التركيب ، متساوية المصارع الا ان اليسارية منها اقل احديداً من اليمينية || تعيش لاصقة بالصخور المغمورة .

٢٩٢١٨ - نَقِيرِيسٌ

Imperfecti تمت قمرني توصف به الفطور الناقصة التركيب او الشاذة الحرة من بعض مراحل التطور .

٢٩٢١٩ - نَقِيرِيَّاتٌ ، نَقِيرِيَّاتٌ

Infusoirs (F). *Infusoria* (E). صف حيوانات دنيا من الاوالي تشمل السوطيات والمدينيات وعدة زنب وفضائل .

٢٩٢٢٠ - نَقِيرَةُ *

Néonate (F). *Neonate* (E). تمت ترميني يطلق على الحشرة المستجدة النقف .

٢٩٢٢١ - نَقِيرِيقٌ

Coassement (F). صوت الضفدع. نق الضفدع : صات .

٢٩٢٢٢ - نَقِيرِمٌ

Ligne médiane de la route (F). خط وسط الطريق .

٢٩٢٢٣ - نَكَاتَةٌ

Paraphyse (F). اخلية المستطيلة في نكة الفطور الزقية والدعامية .

٢٩٢٢٤ - نَكَاتٌ

Recurvirostra (S). *Récurvirostre* (F). جنس طير من النكاتيات. انواعها اربعة جميعها كبيرة القند طوطا براوح من ٤٠ الى ٥٠ سم. منقائدها مستطيلة ، منقطة الى اللامع ، ثوبه السيف. أطوارها لبقاء اللون يكثر فيها الياض || يحرب السبلاد الاسيوية والاروية والافريقية. ترتاد غصاف الانهار وشواطئ البحار والمناقع والاعوار. قوتها الفشريات والرغويات والديدان والدعاميس والحشرات. تنكت الحسا والخضر والربايد في طلبها || تدش اعشاشها في التراب ، افاحيصها مستطيلة الشكل قليلة السمق.



نقيرة



نقيرة



نكات اسود الذيل



نكيب جبار



نكروية

أوراقه كبيرة فائقة قطر نصلها يراوح من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أزهارها صفراء اللون قطرها يراوح من ١٠ إلى ٢٥ سم. مالحيتها تظل من ١٠٠ إلى ٢٥٠ سم. || جذائره نشوية للمادة، سكرية الطعم، مأكولة. تنوره يشتر من تموز إلى آب.

٢٩٢٤٦ - نَلْسِيومُ الشَّرْقِيّ * ، نَلْبُوْفَرُ قُبْطِيّ
بَقْلِيّ قُبْطِيّ ، جَامِسَة

Nelumbo nucifera, Nelumbium speciosum (S). Né-lombo d'Orient, Fève d'Egypte, Lis rose des Egyptiens, Rose du Nil (F). Nelumbo, Egyptian bean (E). Nelumbo, Nussmummel (D). Nelumbo (I).

نوع من النلبور البروتي المابلل. مهدء مياه الهند وأفريقية الشرقية. يكثر في مياه النيل. أوراقه كبيرة اللد مستديرة النصل قطرها يراوح من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. امتلاكها شائكة. أزهاره وردية اللون أو عاجية، مستحبة العرف القليل، كبيرة اللد، قطرها يراوح من ٢٠ إلى ٣٥ سم. مالحيتها تظل من ١٥٠ إلى ٢٠٠ سم. || ثماره نشوية للمادة، مأكولة. تنوره يشتر طوال فصل الصيف.

٢٩٢٤٧ - نَلْسِيومُ
Philoptera (F).
هو القردح جنس حشرات جلدية ذرية اللد من التمنيات. أنواعه عديدة منها ثم البط والجوام والمهام والزنج والتسور.

٢٩٢٤٨ - نَلْسِيومُ
Trichodectes (F).
هي النمة، من الحشرات الجلدية التي تتركب الحيوانات المفادجة.



نلبو اصفر

٢٩٢٤٩ - نَلْسِيومُ
Platystoma (S).
Platystome (F). Platystoma (E).

جنس حشرات من فصيلة النجاسيات ورثة ذوات الجناحين. أنواعها المعروفة متوسطة البدن منتشرة في بعض أقطار العالم. أعصابها البلاد المعتدلة الحرارة || أجسامها صغيرة تظل من ٥ إلى ٨ مم. رؤوسها مستديرة. عيونها كبيرة، فائقة عند الشقين. قرنها الاستشعارية قصيرة، ثلاثية النصل، تنتهي بنسيلة دقيقة. أعصابها معتدلة الطول. ملابسها صغيرة. كواسلها شبه بيضيه الشكل. بطونها يرمية تنتهي بمزات ذرية. رؤوسها مبيجة. قوائمها نشطية بطولها في اخفاذها حلب دقيق || جميعها واثقة. تألف الحراج والقنابات وكل مكان تكثر فيه الاثمار. يرقاتها عاتلة أو دلمة.

٢٩٢٥٠ - نَلْسِيومُ
Platystomidae (S).
Platystomidés (F). Platystomidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. أجسامها وأزهارها المعروفة متوسطة البدن منتشرة في معظم أصفاح العالم || أجسامها متفارقة اللد، تظل من ٤ إلى ١٢ مم. رؤوسها مستديرة. عيونها كبيرة، فائقة عند الشقين. قرنها الاستشعارية قصيرة، ثلاثية النصل. كواسلها شبه بيضيه الشكل. بطونها يرمية. رؤوسها مبيجة. قوائمها قياسية || الحشرة الجملانة واثقة أما البرقة فعاثلة وبعضها دامن ومنها التي تمش على البصل وفي دوفس الزنايق || أشهر أجناسها الثلاثة.



نلبو الشرق

٢٩٢٥١ - نَلْسِيومُ
Odontoglossum (S).
Odontoglossé (F). Odontoglossum (E).

جنس نباتات أمية برة وتربيتية من فصيلة السحليات. أنواعها المعروفة تقارب السنين جميعها من نيوت جبال

٢٩٢٣٢ - نَكْدَة
قلة عشب المرعى أو البرية.

٢٩٢٣٣ - نَكْرُوبَة *
Nicrobia (S).
Nécrobie (F). Nicrobia (E).

جنس حشرات خنفسية من فصيلة النرجسيات. ورثة غديات الاجنحة. أنواعها المعروفة قليلة البدن || أجسامها صغيرة اللد. أطوالها تراوح من ٤ إلى ٧ مم. أنوفها وبيدة اللون أو ثنائيتة. البيضة اللون زرقاء. أما الثنائية فزرقاء وحمراء || مسرجها دجوي. تعيش على المواد العضوية والجلود الجافة والفراء.

٢٩٢٣٤ - نَكْرُورُ الشَّعْطِ

حشرة تدعى ذقة الشالط، أو أطلبا.

٢٩٢٣٥ - نَكَشْ ، نِكاش
Plochage (F).
Digging (E).
اصلاح التربة بفرارة وانتلاخ النخل منها أو اصلاح التربة المخرومة وتفتيت مدمرها وتنظيفها من الاشباب.

٢٩٢٣٦ - نَكْمَة
Hyménium, Chapeau (F).
Hymenium, Pileus (E).
هي غلفة الفطر أي قيمته التي تحوي جهاز الإخصاب والتكثير.

٢٩٢٣٧ - نَكْمِيّ
Hyménial (F).
نمت تدريجي يطلق على كل ما له صلة خاصة بالنكمة.

٢٩٢٣٨ - نَكْمَلَة
Parotide (F). Parotid gland (E).
هي اللدة النكفية أي بنت الأذن.

٢٩٢٣٩ - نَكْمُونُ
Nucéon (F). Nucleon (E).
التكليون هامة ثلاث نواة اللدوية (يوجد نكليات إيجابية لدعي بروتون ونكليات حيدة لدعي نوترون).

٢٩٢٤٠ - نَكْمُونِيّ
Nucéonique (F).
Nucleonic (E).
نمت تعريفي يطلق على ما هو خاص بالتكليون.

٢٩٢٤١ - نَكْمِيّ
Nécomien (F).
ساف حصيلبي يعتبر قاعدة سافات الطبقة الطباقية السفلى.

٢٩٢٤٢ - نَكْبِي
الكبيك : دائرة الحافر وأخف.

٢٩٢٤٣ - نَلْكَ
Aubépine azérolier (F).
هو الزعرور البادي، أطلبا. الواحدة نلكة.

٢٩٢٤٤ - نَلْسِيومُ
Nelumbo (S).
Nélobio (F). Nelumbo (E).
جنس نباتات عشبية جذمورية مائية من فصيلة النيلوفرديات. الأنواع المعروفة قليلة البدن. أعصابها مياه البلاد الحارة. جذائرها مفادة. أوراقها مستطيلة الاعتناق مستديرة النصل. أزهارها كبيرة اللد. ثمارها كروية الشكل مفصية في طست مستعرض الاطار. بزورها نشوية للمادة للمأكولة || أشهر أنواعها ما يتبع.

٢٩٢٤٥ - نَلْسِيومُ أَصْفَر * ، نَلْسِيومُ أَصْفَر
Nelumbo lutea (S). Nélobio jaune (F). Yellow nelumbo (E).
نوع من النلبو البروتي. مهدء البلاد الأمريكية.



نماشة كبيرة الزهر



نمت الغنم



نمة البقر



نمة الخيل



نمة الضأن



نمة النمر



نمة الكلب

أمركة الاستوائية . ينسجها جمل الازهار كبيرها شائع
الزراعة التريينية المركبة في المصاري والمنازل || اوراقها
قرصية الانتساب ، مستطيلة ، قليلة المدد . ازهارها
عقدية الجميع ، تتركز على شرايخ ليلية مصتة ||
اعرف انواعها واشهرها ما يلي :

٢٩٢٥٢ - نَمَاشَةُ كَثِيرَةِ الزَّهَر *

Odontoglossum grande (S).
Odontoglossa à grandes fleurs (F).

نوع من النفاشة . اوراقها سنائية النصل ، مستطيلة ،
قليلة المدد ، تطول من ١٥ الى ٢٠ سم . شراعيها يحمل
من ٤ الى ١٢ ازهار . قطر الزهرة يراوح من ١٠ الى
١٨ سم . لونها الى الصفرة البرتقالية يعلوها تمشيد جزوي .
شيفات الازهار تبتية اللون صفر الحواج || تنويرها
يستمر طوال فصلي الخريف والشتاء .

٢٩٢٥٣ - نَمَاشَةُ مُشْتَجَّة

Odontoglossum crispum (S).
Odontoglossa crispé (F).

نوع من النفاشة . اوراقها صفنية الشكل تطول نحو ٤٠ سم .
شراعيها يحمل من ١٥ الى ٢٠ زهرة . قطر الزهرة يراوح
من ٨ الى ١٢ سم . بتلاتها وفصلها متواجبة النصال لونها
الى البياض العاجي تعلوها نقطة كستنية سفاء لظلمية
الترتيب . شيفات الازهار صفراء اللون ، اعليجية
الشكل ، مدبة الاطراف || تنويرها يستمر من اوائل
شباط الى اواخر نيسان .

٢٩٢٥٤ - نَمَاص
Fil fin (F). *Fine thread* (E).

نميط الابر من اي مادة كان .

٢٩٢٥٥ - نَمَاشَةُ
النفاشة : اهل الرأس وتعرف بالنافوخ .

٢٩٢٥٦ - نَمَال *
Myrmecophile (F).

نمت ترميى يطلق على النبات الذي يأوي النمل ويعوله .
٢٩٢٥٧ - نَمَام ، نَمَام المَلَك (F). *Thym ghebre* (F).

هو البستر الارط ، اعطيه .

٢٩٢٥٨ - نَمَامَةُ
Pigamon (F).

هي التليب ، اعطيه .

٢٩٢٥٩ - نَمَايَكَة *
Anabolisme (F). *Anabolism* (E).

علم يبحث في دور شيوخ الكائنات الحية .

٢٩٢٦٠ - نَمَت *
Hippocrepis (S). *Hippocrépide* (F).

جنس نباتات برية من فصيلة القرنيات القرشاية . انواعه
المعروفة ١٢ منها الجنيات والجنابات والاشباب . اوراقها
مركبة شطية مستطيلة الاضلاع . ازهارها صفراء اللون ،
صيرانية التجميع طويلة المالحق . ثمارها قرون ملفطة
وريقة غمره الاطراف || اشهر انواعه واكثرها انتشاراً
نمت الغنم .

٢٩٢٦١ - نَمَت الغنم *

Hippocrepis cornosa (S). *Hippocrépide à toupet*,
Hippocrépe à toupet, *Fer à cheval* (F). *Tufted horse-*
shoe vetch (E). *Schopfhufeisenklee* (D). *Ferro di*
cavallo, *Mandorlo dei boschi* (I).

نوع من النمت الطبي البري المرصود . تتغلف الغنم بشهوة

٢٩٢٦٢ - نَمَةِ البَقَر *
Trichodesca du bœuf, *Petit pou du bœuf* (F).

حشرة من النيمات . تركيب الانقباض وتميش على فوف
واوساخ جلدها . طولها يراوح من ١ الى ٢ م . لونها الى
الصفرة رأسها وصدرها متساويا الغرض . تميل في وسط
كل سكة من سكم بطنها نقطة سمراء بيضاء . تكثر على الظفر
والايامل والفضة . تسبب تميشاً يقود الى الحكاك .

٢٩٢٦٣ - نَمَةِ الخَيْل *
Trichodesca veritatus (S). *Trichodesca du cheval*,
Petit pou du cheval (F).

حشرة من النيمات تركيب الخيل وسائر الدواب . طولها
نحو ٢ م . لونها الى الصفرة رأسها قصير مستعرج . تميل
في اواسط السج سكم الاول من بطنها تجلجج متعرض اسمر .
تميش على فوف الاكئاب والمعاور فضائيق الدواب وتميلها
على الحكاك .

٢٩٢٦٤ - نَمَةِ الضَّأْن * ، نَمَةِ الغنَم
Trichodesca spharocapulus (S). *Trichodesca du*
mouton, *Pou du mouton* (F).

حشرة من النيمات تركيب الاغنام فلفلها . طولها نحو
١ م . وخمسة خطوط . لونها الى البياض الاغبر يعلوه موج
اسمغ . تميش على فوف الجلد وتقرض الصوف وتقلق راحة
الغنم وترصبها .

٢٩٢٦٥ - نَمَةِ العَنَز * ، نَمَةِ المَاحِز
Trichodesca climax (S). *Trichodesca de la chèvre*,
Pou de la chèvre (F).

حشرة من النيمات تركيب الماحز . طولها نحو ١ م واربعة
خطوط . لونها الى الصفار . الخنطي يعلوه تجلجج اسود .
تميش على فوف الجلد وتقرض الشعر فتؤذيه وتسبب حكاكاً
مزعجاً يبيح الجلد وقد يدميه .

٢٩٢٦٦ - نَمَةِ الكَلْب * ، نَمَةِ الكَلْب
Trichodesca latius, *T. canis* (S). *Trichodesca du*
chien, *Gros pou du chien* (F).

حشرة من النيمات تركيب الكلاب الفتية والهرمة . طولها
يراوح من ١ الى ٢ م . لونها الى الصفار الفاتح الباهت
يعلوه توشيح اسمر . تميش على الفوف وتقرض الوبر وتسبب
الحكاك الدامي .

٢٩٢٦٧ - نَمِر ، نَمِر *
Felis pardus (S). *Panthère*, *Léopard* (F). *Panther*, *Leopard* (E).

حيوان مفترس من فصيلة السنوريات ورتبة اليراس .
يقال انه وحيد النوع عديد الضروب فوارق ضروبه
تقوم على قدر الجسم ولون يراوح طوله من ٩٥ الى ٩٠ سم .
الانطباع ، اهيف اللد ، مستدير الرأس ، جميل الشكل ،
مرقط الحرب ، مائج اللعة . يطول من ١٥٠ الى ٢٤٥ سم .
يما في ذلك اللب الذي يراوح طوله من ٩٥ الى ٩٠ سم .
مزاجه كراجل الأسد الا انه اقهر واخيب واعنف ، لا ترويه
سلطو احد . دغم ضمت مزه وشديد حمره || كنيته
ايو الابردي وايو الاسود وايو جمدة وايو جهل وايو خطاف



نمر أسود



نمر الأطلس



نمر الحيشة



نمر الشرق



نمر الهند



نمر ملطخ



نمرود صومرا

Cirro-cumulus

٢٩٢٧٨ - نَمْرُودَة

هي النخاس ، نوع من النجوم العالية .

Nemorhaedus (S).

٢٩٢٧٩ - نَمْرُودَة

Némorrhède (F). Nemorrhædus (E).

جنس حيوانات لبونة عاشية بمجرة من فصيلة الإيليات . أنواعه المروفة ستة موطنها يمتد من الهند إلى الصين وصومرا واليابان . تألفت غابات الحشاش والجبال ، ملجأها الجباني جامعي . جماعها إلى إجمال قليلة العدد || أجسامها متوسطة القد . قرونها قصيرة ، مخروطية الشكل ، متنامية الجذ ، منقطعة إلى الزوايا . ضرور أنثا ثنائية الإخصاف . يحمل الأنثى يولم نحو ستة أشهر تضع في تمامه ينفورا واحداً || أشهر أنواعه التالية :

٢٩٢٨٠ - نَمْرُودَة حَبَلَانِيَّة

Nemorhaedus bubalinus (S).

Némorrhède bubalin, Chamois de l'Himalaya (F). نوع من النمرود . موطنه يمتد من كشمير إلى حلايا وشان ، يسرح من ارتفاع ١٨٠٠ إلى ٣٩٠٠ م . عن سطح البحر || جسمه ربة يطول نحو ١٦٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٠ سم . ارتفاعه ٩٣ سم . وزنه نحو ١٠٠ كيلو . قرنه يطول نحو ٢٣ سم . عند الذكر نحو ١٧ سم . عند الأنثى . رأسه مستد الجرم . عيناه واذناه كبيرتان . قرواه شديدة القنط ، ثوبه إلى الكمية السوداء رأسه وذيغ ظهره إلى السمرة الداكنة . عنقه وصدره إلى الشقشة . ذنقه ويطه إلى الأبيض الأفر || أجله يندسبة انفار ، ذكر مانع وثلاث وثلاث شواذن .

٢٩٢٨١ - نَمْرُودَة صُومَرَا

Nemorhaedus sumatrensis (S).

Némorrhède de Sumatra (F).

نوع من النمرود . موطنه يمتد من شرق حلايا إلى بيرمانيه والنيام وصومرا . يسرح من ارتفاع ١٣٠٠ إلى ٣٠٠٠ م . عن سطح البحر || جسمه ربة يطول نحو ١٥٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٨ سم . ارتفاعه ٨٥ سم . عند الذكر نحو ٨٥ كيلو . قرنه يطول نحو ٢٠ سم . عند الذكر ونحو ١٥ سم . عند الأنثى . رأسه مستد الجرم . عيناه كبيرتان مكملتان . اذناه مستطيلتان . ثوبه إلى الشقشة السوداء يبق في الرأس والظهر ويغير في البطن || أجله يندسبة انفار .

Rancissement (F). Rancidity (E).

٢٩٢٨٢ - نَمْس

نماد في المواد الدنية يسي إلى ملائها ورائحتها .

Herpestes (S).

٢٩٢٨٣ - نَمْس

Mongoose (F). Mongoose (E).

جنس حيوانات لبونة لامة من فصيلة الزباديات . أنواعه المروفة ٢٠ جميعا مستطيلة الجسم والذنب ، قصيرة القوائم ، حادة الأطراف . رؤوسها صغيرة مخروطية الشكل . اذناها صغيرة مستديرة . عيناها حمر . اقاربها إلى الكدرة . موطنها يشل العالم القديم . تألفت المناطق الحارة . تعيش قرب مجاري الماء في القنص والمسل والقياس . قروها الإقامي والجردان والمظا وكل ما استطاعت إليه سبيلا من الحيوان والغير . تدجن بسهولة تربى للقضاء على الفأر والجردان والحيات || أنثاها تضع من جرورين إلى أربعة جراء . مجارها انفاف منخفضة ، ضيقة ، مستطيلة ، نودية النحالين || اعرف أنواعه وأشهرها ما يلي .

وأبو الصب وأبو رقاس وأبو سهل وأبو عمرو وأبو المرامل والأثني نمره والجمع آثار ونمور ونمار || موطنه قنص الإرجاء يشمل معظم البلاد الآسيوية والأفريقية || يعيش منفردا إلا في زين النجوم وقد يستمر على القة الأنثى ما بعد وضعها بثلاثة أسابيع . يقال أن يحمل الأنثى لا يفوق ٩٠ يوما تضع عند تمامه ثلاثة جراء أو أربعة تبصر بعد وضعها بسبوعين وتعيش برقة أمها نحو ٦ أشهر . اعرف ضروره وأشهرها ما يتبع .

Irbis (F).

٢٩٢٦٨ - نَمْر أبيض

هو البريس ، أطله .

٢٩٢٦٩ - نَمْر أسود *

Felis pardus melas (S). Black leopard (E).

ضرب من النمر ، متوسط الجثة أسود اللون كسني القرقة الكاملة . يكثر في جنوب الهند وفي جزر الأراج .

Tigre du poirier (F).

٢٩٢٧٠ - نَمْر الإحشاش

حشرة مؤذية تدعى ببر الإحشاش ، أطله .

٢٩٢٧١ - نَمْر الأطلس *

Felis panthera (S). Grande panthère (F).

ضرب من النمر ، يقال أنه أكبر النمر جثة ، صغير القرقة ، كامل الحلفة التي تنسج مع اجتماعها من ثيج النهر واقترابها من البطن . موطنه يشمل كامل أفريقيا الشمالية إحصيا جبال الأطلس .

Felis pardus nimr (S).

٢٩٢٧٢ - نَمْر الحيشة *

Panthère de l'Afrique (F).

ضرب من النمر ، كبير الجثة أسود القرقة أضر الحلفة الناقصة . موطنه الحيفة والصومال .

٢٩٢٧٣ - نَمْر الشرق *

Felis pardus orientalis (S). Panthère de l'Amour (F).

ضرب من النمر ، كبير الجثة جزوي القرقة الصنائية المختار . موطنه حوض نهر الأمور وجباله .

٢٩٢٧٤ - نَمْر الصين *

Felis pardus chinensis (S). Panthère de la Chine (F).

ضرب من النمر . متوسط الجثة أسود القرقة الكبيرة والمتقلقة . موطنه الصين والمندل .

٢٩٢٧٥ - نَمْر الهند *

Felis pardus antiquorum (S). Panthère de l'Inde (F). Leopard (E).

ضرب من النمر ، كبير الجثة أضر القرقة الصغيرة اللقائية الشكل . موطنه الهند .

٢٩٢٧٦ - نَمْر سورِّي ، نَمْر القوس ، بَمَلَك

Felis pardus talliens (S).

٢٩٢٧٧ - نَمْر مَلَطَخ *

Panthère de Syrie, P. de la Perse (F). Leopard (E).

ضرب من النمر متوسط الجثة ، أسود القرقة ، أصعب الحار ، مثلث الحلفاء المفتحة . موطنه يشمل القوس وصوريا .

Felis nebulosa (S).

٢٩٢٧٧ - نَمْر مَلَطَخ *

ضرب من النمر ، يتميز باستطالة رقبته وسلطاته اللقائية الجسم . موطنه جبال الهند ورمانيا وقلعه وجزر الأراج .

٢٩٢٩١ - نمّشة الزيتون * *Aonidiella maeleti* (S). *Cochenille vermillion de l'olivier* (F).

حشرة دمبوسية من القرميزات تعمرّي الزيتون في أوراقه قسّية إلى حله. موطنها بلاد المغرب. يكثر وجودها في مراكنس والجزائر || جلبهاها الرّسبي عند الاثنى مستدير الشكل، قمرزي اللون، نودلي السرة المركزية النغم، قطره براوح من ٢ مم. ال ٢ مم. وثلاثة خطوط. وهو عند الذكر بيضي الشكل، قطبي السرة، قمرزي اللون، يطول نحو ١ مم. وأربعة خطوط || لها جيلان في الحول. أناتها تقص من ٤٠ إلى ٦٠ مكنة بطرف ثلاثة أسابيس. اضطرابها للاقياسية لأنها منطقة بكثرة وجودها على الأوراق. وهي تركب التصل على صفحتيه تمتص عصارة الخلايا وتسبب بالنتيجة نيباس الأوراق || تكافح باستعمال أحد الحواشير الفعالة مزوجاً بالزيت المعدني الأبيض أو بالزيت النباتي.

٢٩٢٩٢ - نمّشة الليمون المخمر * *Chrysomphalus dictyospermi* (S). *Pou rouge des oranges* (F).

حشرة ناعمة من القرميزات، تركب الكثير من النباتات الشجرة والزيتونية أغصانها الحشيشات || يقال أن موطنها الاصل كان الشرق الأقصى وقد انتشرت في معظم أقطار العالم وأصبحت من آفات حوض البحر المتوسط وبلاد القرم بعد الصين واليابان وزيلندا الجديدة وأستراليا والانتيل وجامبا والبرازيل والمكسيك والولايات المتحدة ... جلبهاها الرّسبي بيضي الشكل ثلاثي التخذيد نودلي الطرف القطبي الاوسط لونه إلى الحمرة المفرّاة القاعية يحيطها اطراف اطحل. الاثنى تطول نحو ٢ مم. والذكر ١ مم. وثلاثة خطوط. والحفره عند تجرّيدها عن رتمها ذكرًا كانت ار اثني تيلور ريمية الشكل صفراء اللون خضراء الملوام الا لاجمها الحولية براوح من ٢ إلى ٤ مم. وهي تتمصل الحرارة القصوى الماطقة حتى ٤٥ °م. وحرارة الدنيا الماطقة حتى ١٠ درجات تحت الصفر || اضطرابها في الحشيشات شديدة الاثنى تركب الأوراق والانتان القفصية تمتص العصارة وتسبب الذبول وتركب الثأر لقمع نموها وقد توفقه وتسبب بخصاف الالباب وتضع الحصوص || تكافح باستعمال التبخير السيانيدريكي ومنهم من استعمل الزيوت البيضاء مع أحد الحواشير الفعالة غير أن نتائج التبضخ لا تؤازر التبخير || وهناك عدة حشرات غائلة تقضي على هذه النمّشة أغصانها من الصفريات أي بنات النقا ومن الدصقيات أي بنات اليد.

٢٩٢٩٣ - نمّشة فلوريدا *Chrysomphalus aonidum*, *C. ficus*, *Aspidiotus ficus* (S). *Pou de Floride* (F). *Black scale* (E).

حشرة ناعمة من القرميزات تركب الكثير من النباتات أغصانها الحشيشات والتخل والأهوكاتيف والنفونا والخروج والندخل واللباب والمضاض || يقال أن موطنها الاصل كان فلوريدا وقد انتشرت في معظم مناطق القرم من اليابان إلى الصين وفروموزا والهند وسريلدب والانتيل وكوبا والمكسيك والبرازيل وبلاد أفريقيه. وهي شديدة الاثنى تراوس || جلبهاها رسي وهو عند الانتان مستدير الشكل قطره براوح من ٢ إلى ٤ مم. لونه إلى السرة الصفبجية الملوام تتوصه سرة مركزية جزوية اللون ثلاثية الخطوط الدائرية. وهو عند الذكور بيضي الشكل يطول من ١ مم. وسطين إلى ١ مم. وأربعة خطوط. والحفره عند

٢٩٢٩٤ - نمّشة أشعل * *Herpestes albicaudus* (S). *Mangouste à queue blanche* (F).

نوع من النمّس كبير القد طوله نحو ٥٠ سم. وذنبه ٤٥ سم وهو أرفع قائمة من المصري وأعل منه. ثوبه إلى القبرة يعلوها نأذير حطلي. ذنبه أبيض اللون الاثمل، جتل الور. موطنه الحبشة والتانال وغينيا والسنگال.

٢٩٢٩٥ - نمّشة بني * *Herpestes fuscus* (S). *Mongoose brune* (F). *Brown mongoose* (E).

نوع من النمّس متوسط القد والارتفاع طوله نحو ٤٢ سم. وذنبه ٤٥ سم. ثوبه إلى البني يعلو تجلج معترض أسمر. رأسه حالك السرة. قوامه سيد.

٢٩٢٩٦ - نمّشة فارسي * *Herpestes auripunctatus*, *H. persicus* (S). *Mongoose à points dorés*, *M. de Perse* (F). *Persian mongoose* (E).

نوع من النمّس صغير القد جميل الثوب المرقط بالابيض والاصفر اللبني. موطنه العراق وبلاد فارس وجورجيا يكثر وجوده في أسوار النخل وقرب ضفاف الأنهر.

٢٩٢٩٧ - نمّشة مصري * *Herpestes ichneumon* (S). *Mongoose ichneumon*, *ichneumon*, *Rat des Pharaons* (F). *Egyptian mongoose*, *ichneumon* (E).

نوع من النمّس موطنه حوض البحر المتوسط. يكثر في البلاد المصرية حيث كانوا يملونه من زين الفراطة. جسمه مستطيل الشكل، قصير القوام، طوله نحو ٥٠ سم. وذنبه ٤٠ سم. ثوبه إلى الصفار الاثهب يعلو توشم اطحل. رأسه وظهوره اميت لوناً من سائر جسمه. قوامه سيد.

٢٩٢٩٨ - نمّشة هندي * *Herpestes griseus*, *H. mongo* (S). *Mongoose mungo* (F). *Indian mongoose* (E).

نوع من النمّس متوسط القد والعلو طوله نحو ٤٠ سم. وذنبه ٣٥ سم. ثوبه إلى الصفار الخطي الملوام يعلو توشم اطحل ونمّشة بيضاء. رأسه مابق اللون. قوامه إلى السرة. موطنه الهند والافغان.

٢٩٢٩٩ - نمّشات *Ichneumonidae* (S). *Ichneumonidae* (E).

فصيلة حشرات من حشائيات الاجنحة المضمورة. اجناسها وانواعها زهاء ٣٠٠٠٠ جميعها مستنقة الاجسام. اطولها تراوح من ٥ إلى ٢٠ مم. ألوانها عابكة يكثر فيها الاسود وبعضها عوز البين بالاسود والاصفر || رقاتها طفيلية تتوشم بأكثريتها على عوائلها من حشرشيات الاجنحة والنمّشات.

٢٩٢٩٠ - نمّشة * *Ichneumon* (S). *Mouche vibrante* (F).

جنس حشرات صغيرة من النمّشيات انواعها المعروفة زهاء ٥٠٠ جميعها مستنقة الاجسام المستطيلة. أطولها تراوح من ١٥ إلى ١٦ مم. ألوانها مختلفة الانوان يكثر فيها التحزير بالاصفر والاسود. وأعضائها ثنائية الزوج شفاة على الكثير من الحشرات أغصانها الناعمة إلى حشرشيات الاجنحة ومنها الملوام والكزنيه والانتونوم والصلمل الخ ...



نمّشة أشعل



نمّشة فارسي



نمّشة مصري



نمّشة هندي



نمّشة



نمّشة الزيتون

٢٩٢٩٩ - **نَمَص** ، **نَمَص** (F). *Jonc des nattiers*
هو الأسل العربي لين البود تصنع من الحلياق والثلث .

٢٩٣٠٠ - **نَمَصَة** (F). *Apex, Sommet*

(E). *Apex, Sommit*

النشفة هي ذروة كل عضو من الأعضاء في الحيوان أو في النبات . وللذروة من كل شيء أصله .

٢٩٣٠١ - **نِمْفُولَةُ البَشِينِ** *

Nymphula nymphaesta (S).

Nymphule du nénuphar, Teigne du nénuphar (F).

Nymphula nymphaesta (E).



نَمْفَة الحَفِيفَات

حشرة من فصيلة الناريات حشرشيات الاجنحة . موطنها معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . فراشها واشمة قريباً رحيق الانزاع وظلها . سرقها خاضعة تمشي على اوراق البشينة وعرس لاء وكلايات لاء . جسمها بطول نحو ١٢ م . بسطها قزاح من ٢٦ الى ٣٠ م . رأسها مستدل الجرم ، قصير الخطم . عينها صغرتان . زباناها خيطيان . ملاسها قصيرة . مرشفاها مستدل الطويل . جشها وبلها في الزوج الامامي زراكل بنية وصنابو ويعلمها في الزوج الخلفي تجهلج معترش ويتجيج في صنبلي . اعداها قفصية . لها جيل واحد في الجيل . تقتر الفراشة طويلا في أيار ويثقي حتى آب . تفرح في التبار . تعاطل بعد ظهورها بنحو عشرة أيام وترفع المكن سجادها على الصفحات السفلى من نصال الاوراق . للطور البرقي يستمر نحو ٢٨ اسبوعاً والسرقة منه بلها الكمال الجسدي تطول نحو ١٥ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، واسع القسم السفلي ، مستدق المقدم والمؤخر ، اسمر اللون ، تبي الموج ، تملوه خطوط قاعية من الملب القصير . رأسها اسود اللون . مدنها ورواجها الى الطلحة . طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينتفضي فشن صلبة تسجها الرقة تحت الجلالة او بين شقوق لاه الانجار .



نَمْفُولَةُ البَشِينِ

٢٩٣٠٢ - **نَمَل** (F). *Fourmis*

جس حشرات من فصيلة النمليات . انواعه عديدة منتشرة في اكثر اسواق العالم . معظمها صغير القند . تألف الحياة الجماعية ، مجموعتها تسمى جالية ريفية تقم في قرية او قرية مؤلفة من عدة سراويل وانفاق ودعايز وسجر ورياء . والنمل كالنمل يقسم الى ثلاثة اقسام ، الذكور والاناث والحناث . الذكور لاهل حاسوي كرم الاناث وهي تأكل ما تجنيه الحماثل . والاناث بعد كويها ورجوعها الى القرية تستقبلها الحماثل بالترحاب فتصلها من اجنحتها ثم تلتقيها وتقودها الى الحامض منج الملائن . اما الحماثل اي الحناث فهي التي تقوم بجميع الاعمال ، تشيد القرية وتحي الطعام وربي اللها والذو والذو يقصر على سدقة القرية تقودها خزيمة ابقاء والحياة الجماعية المنتظمة في سبل مصلحة عامة لا تصرف الى غيرها . ذكرها واناثها مجنحة بامرة . علامتها عامة الجناح والمبرص تصرف على نظراتها وصل الاشياء بواسطة قزونها الاستشعارية المرفوعة الاساس . رؤسها مسلحة بفكين حادين قاضمين . قوائمها دقيقة رشيقة مستطيلة تمكها من السير السريع . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .



نَمَلٌ أَحْمَر

٢٩٣٠٣ - **نَمَلٌ أَحْمَر** ، **نَمَصَة** ، **جَمِينِي** (F). *Myrmica rubra* (S). *Fourmi rouge* (F). *Red ant* (E).

يجريدها من ترسها ذكر كز كالت او انثى تلو صفراء اللون زاهية المالح . اما ذكرها المجنحة فترتقاة اللون ، ثنائية الجناح الابيض . اجيالها الحولية تراوح من ٤ الى ٥ اناثها ينض نحو ٥٠ مكنة متنها يستمر نحو اسبوع . اضارها في الحفشيات شديدة الوقع والاذى لانها تركب الارراق فتتصص صساره خلاياها وتسبب اصفرارها وذيوبا وتركب الثار فتصنها من النمو وقد تسبب جفاف اللحاء وتسمم محصولها . تكافح بشق الحواشير الفعالة للمزوجة بالزيت البضاء وقد يحسن استعمال التبخير الغايانديكي لانه اقل من التصفح اذ يدخل في جميع غياها الانجار .

٢٩٢٩٩ - **نَمَصَة نَارِيَّة** ، **نَمَصَة نَمَصِيَّة** (F). *Chrysomphalus aurantii, Aspidiotus aurantii, Aonidiella aurantii, A. taxus* (S). *Pou fer à cheval* (F). *Citrus yellow scale* (E).

حشرة نائمة عارفة من القرميزات تركب الكثير من النباتات اخضها الحفشيات وقد تغفل اليمين الحامض على البرتقال وتركب السط والخروب والياسمين والتوت والموز والبرتقال والنخل والورد والصفصاف والال والخرع . موطنها فصح الاجزاء يشمل جميع اقاليم اليمن الاسيوية والافريقية والامريكية والاروبية . جلبهاها التربي عن الانثى مستدير الشكل قليل الاحديداب مركزي السرة لونه الى السمرة النارية الباهة يحوطها اطراف سبق اختار اكبه اللون قطره براوح من ٢ م . نحو ٢ م . وعطيل . وهو عند الذكر يضي الشكل بطول نحو ١ م . وثلاثة خطوط . والحشرة عند تجريدها من ترسها ذكر كز كالت او انثى تلو نضوية الشكل حنطية اللون . اجيالها الحولية تراوح من ٢ الى ٥ م . اناثها ينض نحو ٥٠ مكنة متنها يستمر تراوح من شهر الى شهرين . اضارها شديدة الاذى لانها تركب كامل اعضاء النبات الحولية اخضها الاناث التي تجمها الارواق التي تذلها والثار التي تعطها وتصلب لبها . تكافح بكافة النشمة الحمره .

٢٩٢٩٥ - **نَمَصِيَّة** (S). *Sporozichum*

جنس فطور مجهرية من الطليسات رفضيلة الوطشيات . انواعه قليلة العدد والاذى . حقه مداد رنض على سطح العائل . جرابه الكندي بسيط التركيب قصير القند . كنافه يضي الشكل تركز على اطراف الشغيرات وهي شفاقة او ملونة بنها الفريدة للجميع والقصية . اعرف انواعه الثلاثة التالية :

٢٩٢٩٦ - **نَمَصِيَّة الشَّحَاح** (S). *Sporozichum malorum*

فطر مجهرى يركب الثار الحفوظة الملوثة او المبروسة ، فيغن البشرة دون ان يتعدى حدود اللب .

٢٩٢٩٧ - **نَمَصِيَّة الحَمَفِيَّات** *

Sporozichum citri (S). فطر مجهرى عادم الاذى يركب اوراق الحفشيات على اختلاف اجنسها وانواعها فيزها يقع خلية صنية لا قياسية الشكل لونها كالرصاص .

٢٩٢٩٨ - **نَمَصِيَّة الصُّوْقَان** (S). *Sporozichum mycophilum*

فطر مجهرى يركب الصوْقَان فيسلطه بوشاح من الخمل اللد البرتقالي اللب يقضي على نمو .

ومصباتها || كلالها قوية ، سيقها وأوراقها شبه مستديرة
حلاطية المادة حمراء اللون .

٢٩٣١٨ - نَمَلٌ الْبَطْ *

Dacophorus lictrodes (S). *Dacophore bilieux* (F).
حشرة جلدية من النمليات . طولها نحو ١ م. ثوبها الى
الحمرة الجلوية . رأسها مثلث الزوايا . بطنها يضيئ الشكل
مبهر الحلب اللينق القصير || تركيب البط . تكاثر
بمستحضرات الفرديب .

٢٩٣١٩ - نَمَلٌ التَدْرُج *

Goniodes dissimilis (S). *Gonide dissemblable* (F).
حشرة جلدية من النمليات طولها يراوح من ٢
م. الى ٢ م. وخمسة خطوط . جسمها رمعي الشكل .
عرض رأسها يفوق طولها . عليها غشي التجميع . ثوبها الى
الباغض الاخير يملو بتيجع اصفر . || تركيب التدرج
والجمل والدجاج . تكاثر بالفرديب .

٢٩٣٢٠ - نَمَلٌ الْحَمَام *

Gonlocotes compar (S). *Gonlocote compaignon* (F).
حشرة جلدية من النمليات طولها يراوح من مليمت واحد
الى مليمت وخمسة خطوط . ثوبها مستطلي اللون اصفر المواجه .
بطنها يضيئ الشكل مبهر الحلب اللينق المستطيل .
تركيب الحمام فتضيمه . تكاثر بمستحضرات الفرديب .

٢٩٣٢١ - نَمَلٌ الدَّجَاج *

Gonlocotes gigas (S). *Gonlocote géant* (F).
حشرة جلدية من النمليات طولها يراوح من ٣ الى ٤ م.
ثوبها الى الصفار الخشن المواجه . بطنها يضيئ الشكل
قصير الحلب القصي التجميع || تركيب الدجاج تقذيه .
تكاثر بالفرديب .

٢٩٣٢٢ - نَمَلٌ الْفِرْعَوْن *

Goniodes stylifer (S). *Gonide stylifère* (F).
حشرة جلدية من النمليات طولها يراوح من ٣ الى ٤ م.
جسمها اجاصي الشكل . رأسها كالقبة الثانية القرون .
عليها كثيف التجميع . ثوبها الى السمرة السعفاء || تركيب
الفرغ والحلش . تكاثر بالفرديب .

٢٩٣٢٣ - نَمَلِيَّاتِ *

Phloopteridae (S). *Phloopteridés* (F). *Phloopteridae* (E).
فصيلة حشرات جلدية من رتبة القمليات . اجناسها وانواعها
عديدة جميعها صغيرة القد ، مفلطحة الجسم ، كثرة
الحلب ، واخضة القرون الاستعمارية الحماشية العقل . ارساها
غاشدة ثنائية المقاطع . تعيش على اوساخ جلود الطير
وريشه . اشهر اجناسها النمام والفردود والفردودع .

٢٩٣٢٤ - نَمَلٌ ، نَمَلٌ ، نَمَلٌ *

Ride (F). *Ripple* (E).
هو الاثر الذي تتركه الريح على التراب والماء .

٢٩٣٢٥ - نَمَلٌ ، نَمَلٌ ، نَمَلٌ *

هو العلوك ، اطلبه .

٢٩٣٢٦ - نَمَلٌ ، نَمَلٌ ، نَمَلٌ *

Accroissement, Végétation (F). *Increase, Vegetation* (E).
هو استمرار دور النشوء والنضارة واذا يزداد الجسم في النبات .

٢٩٣٢٧ - نَمَلٌ ، نَمَلٌ ، نَمَلٌ *

Nemura (S). *Némura* (F). *Nemura* (E).
جنس طير من الجوامئ سنيا المنابر وفصيلة الدغليات .

٢٩٣٠٤ - نَمَلٌ أَسْمَر *

Lasius niger (S). *Fourmi brune* (F). *Dun ant* (E).

٢٩٣٠٥ - نَمَلٌ أَكْفَف *

Formica rufa (S). *Fourmi fauve* (F). *Drab ant* (E).

٢٩٣٠٦ - نَمَلٌ أَصْفَر ، سَمَام *

Lasius flavus (S). *Fourmi rousse, F. jaune* (F). *Yellow ant* (E).

٢٩٣٠٧ - نَمَلٌ جَسُور ، قَمَص *

Formica animosa (S). *Fourmi féroce* (F). *Bold ant* (E).

٢٩٣٠٨ - نَمَلٌ حَبَشِي ، جَمَلٌ ، دُعَاةٌ ، دُعُوب *

Formica nigra (S). *Fourmi noire* (F). *Black ant* (E).

٢٩٣٠٩ - نَمَلٌ حَمَاد ، جَمَلَةٌ *

Atta structor (S). *Fourmi molssonneuse* (F).

٢٩٣١٠ - نَمَلٌ سُلَيْمَان *

Fourmis de Salomon (F). *هو الحق ، نمل احمر صغير ، اطلبه .*

٢٩٣١١ - نَمَلٌ فَارُوسِي *

Formica flava (S). *Fourmi blonde* (F). *Golden ant* (E).

٢٩٣١٢ - نَمَلٌ مُدَسِّي ، جَمَلَةٌ *

Formica sanguinea (S). *Fourmi sanguine* (F). *Robber ant* (E).

٢٩٣١٣ - نَمَلَةٌ ، نَمَلَةٌ *

Formica (S). *Fourmi* (F). *Ant* (E).

النملة واحدة النمل الذكر والانثى ج . نمل ونمل ونمل .
وارض نملة ذات نمل بطعام منبسط اذا اصابها النمل . ويضئ
النمل يضي ماژا ويضئ وصغيره يضي ذرا وكنته ايشونل
وكنته النملة ام ماژا ونمل قوية . وميت النملة نملتها
وهو كثره سركبها وقلة قواجمها || ومن شر الامام تاج الدين
البيهي في منزل فيه نمل قوله :

حالي ادرى منزل المول الاديب به
نمل تجميع في اربابك زمر
فقال لا تجميع من نمل منزلنا
فالنمل من شأنه ان تلعب الشر

٢٩٣١٤ - نَمَلَةُ الْأَرَجِسْتِين *

Fourmi de l'Argentine (F).

هي النملة ، نملة مهددا بلاد الارجنتين وقد انتشرت في
جميع اقطار العالم .

٢٩٣١٥ - نَمَلَةٌ فِرْعَوْن *

Fourmi de Pharon (F). *نوع من النمل يضي سحائل ، اطلبه .*

٢٩٣١٦ - نَمَلِيَّاتِ *

Formicidae (S). *Formicidés* (F). *Formicidae* (E).

فصيلة حشرات . من رتبة شافيات الاجنحة . انواعها
المعروفة زهاء ١٢٠٠ منتشرة في جميع اقطار العالم .
اعتادوا وكبرها قدا الانواع التي تعيش في المناطق الاستوائية .

٢٩٣١٧ - نَمَلِيَّوْن *

Nemalion (S). *Némale, Némalion* (F). *Nemalion* (E).

جنس نباتات مائية من الخفيات الحمر . انواعها المعروفة
عديدة . يكثر وجودها عند شلالات الانهر ونداسق الاسداد



نمل جسر



نمل حصاد



نمل مدسي



نملون



نمام البط



نمام الحمام



نمام الدجاج

منها في أواسط العصر البلياسي، وقد تطور القسم الآخر الذي اختلف، على ما يبدو، الإجناس المعاصرة.

٢٩٣٣٤ - **نَمُوزِيَّات** * Nummulitidae (S).
Nummulitidae (F). Nummulitidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من المنفريات الجذريات. أجسامها وأنواعها المعروفة قليلة العدد، معظمها الساسق من متحجرات الحقبة الجيولوجية. أما المعاصر منها تعيش في بحار البلاد الحارة أعرف أجسامها النموزة.



نموزة

٢٩٣٣٥ - **نَمِيزِيَّات** * Trichodectidae (S).
Trichodectidae (F). Trichodectidae (E).

فصيلة حشرات جملدة من رتبة القمليات. أجسامها وأنواعها عديدة جميعها صغيرة القد، بيضية الشكل، مفلطحة البطن، كثيرة الهلب. قربها الاستشارية لثلاثة العقول. أرباعها عايدة، فلوب المقاطع تركب الحركات البزعة كالحيل والبقر والعنق والقمل والكلاّب والسرابع والصابغ والأيايل...



نَمِيزَة

٢٩٣٣٦ - **نَمِيزِيَّة** * Oogone.
نمليّة نباتية تحفّن وترّي الاجرام الانثوية، ج غاليا.

٢٩٣٣٧ - **نَمِيزَة مَطْمَحَة** * Venilia macularia.
Pseudopanthera macularia (S). Vénille maculé, Pseudopanthera maculé, Panthera (F). Venilia macularia, Pseudopanthera macularia (E).

حشرة من الأربيات حشرغيات الاجنحة. موطنها الاسفاح المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط الى ارضية. فراشها واحة قوتها مغر الازهار. سرقها تميش على اوراق الشفويات وزاعرها جسمها ضيف ابيض بطول نحو ٩ م. بسطها نحو ٣٠ م. رأسها اسمر. عينها صغيرتان. زانها مشطيان عند الذكر، عيطان عند الانثى. مشرفها معتدل الجرم والطول. جوشها وريثها الى السمرة. يملوها ملج الكلف رشاشا الاماميان الى الصفار الباهت تملوها رقة كستنية. رشاشا الخلفيان الى الصفار الاكثف المالح طوله نمرة كستنية تمتد حتى الحمار. اهداها الى الشقة لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في ايار ويقي حتى تموز. تسرح في الليل. تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتنتج المكن لطعا على ماء البوق ونصال الارواق السريعة بعد بلوغها اكثال بطول نحو ٢١ م. جسمها اسطواني الشكل، مالى التقاش، يملوها ثلاثة ازواج من النمل الصغيرة المتعاقبة. قوتها يمان البية التي تمش فيها لذلك فهو غالبا بلون الارواق. رأسها ونمولا وشرجها الى الكستني. شرجها ينتهي بزاؤتين صغيرتين في طور الاكثال الذي يستمر نحو ١٥ يوما يقتضي ضمن صلجة تحميها السرعة بين الارواق التي تلاحس التربة.



نموش الصمغ

٢٩٣٣٧ - **نَمُوزِيَّة** * Nummulites (S).
Nummulites (F). Nummulites (E).

جنس حيوانات بحرية من المنفريات الجذريات وفصيلة النملويات. أنواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الاحساب الجيولوجية والطباشيرية. أما المعاصر منها تعيش في بحار البلاد الحارة أعرف اصداها كبيرة، مستديرة، قرصية الشكل، عديدة الحجيرات الثلاثية او الثلاثية التجوّل الاثني.

٢٩٣٣٨ - **نَمِيزَة** * Nemesis (S).
Némésie (F). Nemesis (E).

جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة الخنازيريات. مهدها بعض المناطق الافريقية الحارة والمتدلة الحرارة. سبطها هزيلة. اوراقها متعاقبة. ازهارها لعمية. مزدوجة. مجهزة بهمايز قصيرة في تزود القرنين في الماكن والحدائق. أنواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية.



نميرة مملعة

انواعها المعروفة سبعة، ستة منها اسيوية وواحد افريقي. جميعها مصافير صغيرة القد، رشيقة الحركة، ثنائية الفين. يكثر فيها الرداء والاطلل والبلن الابيض التي المواج قوتها الحشرات الصغيرة والذباب والحوام وقد تنقذ في الادغال البنية. حشفتها من ٤ الى ٥ بيضات يتناوب عليها الذكر والانثى نحو ١٣ يوما.

٢٩٣٣٨ - **نَمُوزَة** * Nemosis (S). Némosis (F).

جنس طير من الجوارم غرويات المنالير وفصيلة التنتريات. انواعها المعروفة نحو ١٠ موطنها المناطق الاستوائية الامريكية. تألف العايات وضفاف مجاري الماء. ملجها الحيائي حاجي. جاعاها متوسطة العدد الذي يراوح من ٢٠ الى ٧٠ زوجا. قوتها الحشرات والبقور والثار المعنية البرية في اجسامها صغيرة بطول من ١٢ الى ١٥ سم. منقارها غروية الشكل. الوابها متباينة الازواج جميعها زاهية الخضاب عند الذكور باعثة عند الاناث في تدن اعشاشها في الادغال. اناتها تحفّن بنموبة الذكور من ٣ الى ٥ بيضات. الترخيم يستمر نحو ١٣ يوما.

٢٩٣٣٩ - **نَمُوس** * Nomeus (S).
Nomeus (F). Nomeus (E).

جنس اسماك بحرية من شالكسات الزعانف وفصيلة الاسقمريات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة اجسامها احليلية الشكل تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. زعانفها الظهرية غارقة. زعانفها الصدرية تنتشر وتنتفي، عند التقضاء، في تجايف خاصة. الوابها الى الرتبة القضيبة يملوها تنجب اسمر لاقياسي التوزيع انما يكثر ويقيم عند الرأس والظهر في حلوبها متوسطة الصنف، مأكولة.

٢٩٣٤٠ - **نَمُوش الصمغ** * Turanana beton (S).

حشرة فراشية من فصيلة القليات. جسمها يطول نحو ٢٢ م. رواشن ذكورها الى الزقة الرمادية المواج يملوها حمار اسود اطار ابيض الهذب تقطع الاصاب السود. رواشن اناتها حنطية اللون سمر المواج يملوها تمشيش بنفسجي ويملوها اطار ابيض الهذب تترصه الاصاب السود. رقاتها تركب اوراق الصمغ لتفخها.

٢٩٣٤١ - **نَمُوش** * نبات يدعى لغة الحمل، اعطيا.

٢٩٣٣٧ - **نَمُوزِيَّة** * Nummulites (S).
Nummulites (F). Nummulites (E).

جنس حيوانات بحرية من المنفريات الجذريات وفصيلة النملويات. أنواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الاحساب الجيولوجية والطباشيرية. أما المعاصر منها تعيش في بحار البلاد الحارة أعرف اصداها كبيرة، مستديرة، قرصية الشكل، عديدة الحجيرات الثلاثية او الثلاثية التجوّل الاثني.

٢٩٣٣٧ - **نَمُوزِيَّة** * Nummulites (S).
Nummulites (F). Nummulites (E).

نمت ترميفي يطلق على الحقبة الاولى من الاباج الثاني المعروف ايضا بالاباج الحديث. وهو يشعل العصر الباليوسيني والعصر الايساني والصمر الاوليوساني في تميز هذه الحقبة ببيود الكثير من اساقير النملولة في جراطها الرئيسية. ويظهر بعض الثدييات التي انقرضت قسم

٢٩٣٤٦ - تَمِيْزَةُ عَصْفِيَّة الْوَرَق

Moltkia graminifolia (S).

Moltkie à feuilles de graminées (F).

نوع من النَمِيْزَةِ . ساقها زبّاه فروعاً تملو من ٢٥ الى ٤٠ سم. اوراقها متعاقبة عصفية اتصال المسنة الحافة . ازهارها عنقودي مبّهل . ازهارها الى الزرقاة البنفسجية || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

Nandou (F).

٢٩٣٤٧ - تَشْدُو

في الروعاء ، اطبا .

Nandus (S).

٢٩٣٤٨ - تَشْدُوْس

Nandus (F). Nandus (E).

جنس اسماك نهريّة من شائكات الزمانف . انواعه المعروفة قليلة العدد ، بعضها من اسماك المناطق الاسيرية الحارة والاستوائية || اجسامها متوسطة القد . شكلها قريب الشبه بالفرخ . ظهورها محدودة . زعانفها الظهرية مستطيلة شائكة . زعانفها الشرجية مقبولة || اذنيها الى السرة السفعا المواجه يملوها بتقريب اسود متباين الرخابة || حولها متوسطة الصنف ، مأكولة .

Nandina (S). Nandine (F).

٢٩٣٤٩ - تَشْدُوْسَا

جنية مشرة معمرة ابدة الاوراق من فصيلة البرابرسيات . مهدها الشرق الاقصى . تعيش وتكثر في الاقاليم المعتدلة المشرفة نحو الحارة . جنيها قليلة الفروع تملو من متر الى مترين . اوراقها متعاقبة مركبة . وريقاتها اهلالية النصل وريّة التجميع . ازهارها عنقودي التجميع طرفي الارتفاع . ازهارها حالية اللون فواحة العرف المطري . ثمارها غنية حراء اللون مأكولة .

Paraffine (F). Paraffin (E).

٢٩٣٥٠ - نَهَاكَة

هو البرافين، نوع من الشمع الابيض الجاهد المكسرىستخرج من النفط . راجع نفط .

٢٩٣٥١ - نَهَاكَة

نوع من الدود

Méthodologie (F).

٢٩٣٥٢ - نَهَاكَة

Methodology (E).

النهائية قسم من علم المنطق يبحث في مقدمات ونتائج المناهج المختلفة .

Outardeau (F). Young bustard (E).

٢٩٣٥٣ - نَهَاكَة

فرخ الحبارى . قالت العرب احق من نَهَار . وقد اختلف اللغويون في النهار فقال قوم هو فرخ القطاة وقال قوم انه ذكر البوم والاثنى صيف . وقيل انه ذكر الحبارى والاثنى ليل . ج . اهرة ونهر .

٢٩٣٥٤ - نَهَاكِي ، نَهَاكِي ، نَهَاكِي

Diurne (F). Diurnal (E).

نعت تعريفي يستعمل لقلالة على الشيء الخاص بالنهار او الذي لا يحصل الا في النهار اي النهار .

Rapaces diurnes, نَهَاكِيَّة ، نَهَاكِيَّة

Diurnes (F). Diurnal birds of prey (E).

اسد قسي . جوارح الطير المعروفة بجوارح او كوارس النهار يقابلها جوارح او كوارس الليل .

٢٩٣٥٥ - نَمِيْزَةُ حَدِيَّة

Nemesia strumosa (S).

Némésie gibbeuse (F).

نوع من النَمِيْزَةِ . عشية تزيينية حولية . ساقها خلية البهاء تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها اهلالية سرطاوية ، الجذعية منها لاطئة ، متشاربة الخار . ازهارها حراء اللون ، منها غروب بيضاء اللون وزرقاء ووردية || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٩٣٥٦ - نَمِيْزَةُ كَثِيْرَةُ الزَّهْر

Nemesia floribunda (S). Némésie floribonde (F).

نوع من النَمِيْزَةِ . عشية تزيينية حولية . ساقها تملو من ٢٠ الى ٣٥ سم. اوراقها الدالية لاطئة ، سنانية . اوراقها السفل معتقة ، بيضية . ازهارها عاجية اللون يملوها موج بنفسجي . عرفها عطر فواح || تنويرها يستمر من ايار الى آب

٢٩٣٥٧ - نَمِيْزَةُ قَائِمَةٌ

Nemesia suffisa (S). Némésie

fumigée (F). Némésie (E).

دوية من النماكب القائضة الساعية رباعية الورايا والملائن تنتمي الى فصيلة الخفاشيات || جسمها متوسط القد يملو نحو ١٤ م. عند النماكب ونحو ١٨ م. عند النماكية . سداها اسماك الكعب اللون يملوها تسنج وتزويق سود . عيناها زنجياني . شيفها ضليمان . فكها منخفان . جراسها شطية ، مستطيلة الزوج الخلفي . بطنها اهلالي الشكل ينتهي بزاويتين مغمليتين ، ثوبه الى الكهبة المخططة يملوها خط قاطب اسود وسبعة خطوط متعرجة || تألف البراري والمزارع . مسرحها دجوي . قوتها الحشرات واسارها ويرقاتها || حديدتها يوش في التربة النوي الشكل ، عمودي الفروع ، متوسطة المدق ، ورفقي القمر ، تحفر تحت حجر كبير || ملجئها الحياتي كليلن سائر النماكب . تعيش نحو ثلاث سنوات . لسنتها مؤنثة وقد تكون بيته في بعض الظروف الخاصة || تعتبر من الدويبات المؤنثة الصارة .

٢٩٣٥٨ - نَمِيْزِي

اول ما يبعو من النبات .

٢٩٣٥٩ - نَمِيْزِيَّة

Moltkia (S). Moltkie (F).

جنس نباتات جنيية معمرة من فصيلة الحسنيات . انواعها المعروفة قليلة العدد مهدها الشرق الاوسط || سوقها زبّاه فروعاً ابيرة الشكل تملو نحو ٦٠ سم. اوراقها متعاقبة عصفية الشكل او ابيرة . ازهارها عنقودي التجميع ابطي الارتفاع || احرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

٢٩٣٦٠ - نَمِيْزِيَّة الصُّخُور

Moltkia petraea (S). Moltkie des rochers (F).

نوع من النَمِيْزَةِ . ساقها زبّاه تملو من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقها ابيرة الشكل تملو نحو ٤٠ سم. وتعرض نحو ٤ م. ازهارها عنقودي منتصب . ازهارها ابجوانية اللون في اول عهدها ثم تنصرف الى الزرقاة البنفسجية فالزرقاة الباهتة || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٩٣٦١ - نَمِيْزِيَّة زَرْقَاء

Moltkia caerulea (S).

Moltkie bleue (F).

نوع من النَمِيْزَةِ . ساقها زبّاه قليلة الفروع تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها متعاقبة سنانية اتصال الفتحة التسنين . ازهارها عنقودي . ازهارها زرقاء اللون || تنويرها يستمر من نيسان الى حزيران .



نَمِيْزَةُ ثَائِمَة



نَمِيْزَةُ الصُّخُور

٢٩٣٥٦ - نَهْاس

هو الاسد ، الطيه .

Lion (F).

٢٩٣٥٧ - نَهَام

Nyctala funerea (S).

Nyctale, Chouette pattue (F).

طائر من البويات ورمارة الغداديات . جسمه صغير القد يطول نحو ٢٩ سم . رأسه مستدلل الحجم . صدره نازح القرس . منقشه شديدة الانحناف اسود اللون تعلوه شحة صفراء . ذنبه مستطيل الريش تتعرضه خسة خطوط بيض . ارساغه كاسية لبداء || موطنه فسيح الارياض يشمل البلاد الاسيوية والاروبية والامريكية . يألف اسراج الصنوبر والتنبوب والمزولا ويقتر به اهدا من الاماكن الالهة . يلتصق قوته في الليل ، يصيده الجرد والقفسار والزباب والحشرات . يمشى عشه في صدمع الاشجار وبين فروعه . انقضاء نفعه من ٤ الى ٥ يضيأت تحفنها بمناوبة الذكر من ١٧ الى ٢٠ يوما .

٢٩٣٥٨ - نُهْبُوغ ، زَقْرَاقِ مُسْتَح

Hoplopterus (S), Hoploptère (F).

Hoplopterus (E).

جلس طير من طوال اساق وفصيلة الزرقانيات . انزاعه المعروفة ١٠ واحد . نها امريكي موطنه يمتد من الاربعين الى البرازيل وتسعة اسيرية وافريقية || جميعها قريبة الشبه من الزقراق المظلي . اجسامها صغيرة . اذنانها قصيرة . اجنتها مسلسلة بمناحس قرنية المادة ، مدية ، ناعسة . ارساغها دقيقة مستطيلة . اصابعها ثلاثية || قوتها الحشرات والديدان والحمار || انثاها تدث في افاحيص تحفرها في رمال صفات الانهر والبحيرات . وفي تحفن رسدها من ٣ الى ٤ يضيأت || احرف انزاعه واشهرها التبرج الناعس .

٢٩٣٥٩ - نُهْبُوغ ناعيس ، زَقْرَاقِ ناعيس

Hoplopterus spinosus (S).

Hoploptère épineux, Vaneux à éperon (F).

Hoplopterus spinosus (E).

طائر من التبرج الغراب القواطع . اعطانه تمتد من الحيشة الى السودان وصغر والجزيرة العربية والقرق وسانر اقطار الشرق الاوسط حتى تركيا والبرازيل يحوي بعض اصنافها كل عام في طلب الرزق والمصيف والمشق || جسمه متوسط القد . طوله نحو ٣٠ سم . ظهره وجناحه الى الصبغة السمر . رأسه وجيشته الى السواد الفصحي . عجماره ومنقحه وكفاه ويطنه والنيكه وراسه جناحه الى البياض الناعس . اطراف قوادمه سود || يألف الاغوار وصفات الانهر والبحيرات ، سره متوسط اللدد . قوته الحشرات والديدان والحمار .

٢٩٣٦٠ - نَهْدَكَة ، نَهْدَكَة ، نَهْدَكَة

Beurre (F), Butter (E).

من اسماء الزبدة . وقد تستعمل للدلالة على مقدار في الالبان بالزبد فتقول هذه هذه الالبان ... نهديده هذا اللبن .

Fleuve (F), River (E).

٢٩٣٦١ - نَهْر
يجري من المياه العذبة ينساب على الارض ويسب مياهه في بحر او بحيرة . يمتد النهر على التتابع والامطار والثلوج الذائبة وهو يتألف عادة من مجرى رئيسي تغذيه السواهد والفرود . وان صغر وكثرت مياهه فهو النهر (Rivière) ج اطباع وساعده يدمي جملنا ج . جداول . وان كبر فهو النهر وساعده يدعى رافداً ج . روافد .

٢٩٣٦٢ - نَهْر ، اُرِيدَانُوس

Eridan (F).

Eridani, Eridanus (E).

النهر او اريدانوس كوكبة نجوم جنوبية المقع . مجيها اربعة وثلاثين . شكلها كالنهر ، يتبعث منه ثلث المجزاء قمر في المغرب على تربع الى قرب صدر قيطس ثم تمر في الجنوب على ثلاثة انجم ثم تنطف الى الجنوب فالجوب ثلاثة انجم ايضا ثم تنطف الى الجنوب فالجوب قمر على كوكبا عديدة ونهته بنجم نير يدعى آخر النهر || أشهر نجوم هذه الكوكبة : الثلاثة التي في المنطف الثاني وتدعى « منطف النهر » ، ثلثة التي في المنطف الرابع وتدعى « لدسي النعام » . والكواكب التي حولها تدعى « البيض » . ثم « نير الزروق » . ثم « القربة » ثم « العلم » . وهو اشهرها ، ويدعى ايضا « آخر النهر » . وبين هذا النظم والنظم الذي لم الحوت كوكب كثيرة تدعى « الرمال » .

٢٩٣٦٣ - نَهْرَة السَّعَادَة

Conjoncture économique (F).

Economic situation, Trend (E).

النهرة اتفاق النظري في وقت ما .

٢٩٣٦٤ - نَهْس

Pie-grègle écorcheuse (F).

Red-backed shrike (E).

هو الصرد الأحمر . ج نهسان .

نَهْسَر

Enneoctonus (S).

Ennéoctone (F).

طائر من القرب يمتد الى فصيلة الصرديات . يألف الغابات والمروج والمراعي . قوته الحشرات والبرويات والنمطه والبقارب والتماكب ... || جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٢ سم . رأسه مستعظم الجرم . منقاده غليظ وضيح . ثوبه الملوي الى الشبقة السمر . بطنها مشيح اسود . جبهة وعصره الى البقرة . حياءه مسكتان بالاسود الذي يمتد حتى القفن . زوره وصدره ويطنه الى الصبغة النبراه . جناحه متدلا الطويل . ذنبه مستطيل الشكل مقطوع الطرف || يذث عشه في الاشجار الرقمية . الاث تحفن وسدها من ٤ الى ٥ يضيأت بينا الذكر يذث لها اللداء .

٢٩٣٦٦ - نَهْن

Cathetus (S).

Cathetus, Taligalla, Dindon des buissons (F).

جلس طير من فصيلة الشقيانيات . انزاعه ليلية المدد جميعها كبيرة القد طولها يراوح من ٧٥ الى ٩٠ سم . تتميز برووسها الصلواء القليلة الزغب . متناقدها قوية حادة . اعاقبها سرحة . حادة الريش . حراء الجلود الجيدة المسترسية . اجنتها مستديرة ضيقة . اذناها متوسطة القد . ارساغها قوية . خالها كبيرة . انزاعها الى السرة يطولها مراح حشوي وتأذي نفسي . || تألف الاسراج . تعيش ذكرا وانثى كالحمام . سرها يد من ١٥ الى ٢٥ زوبا . قوتها الحبوب والحشرات . انثاها لا تحفن البيض بل تقسه في حاشن خاصة تشيدها بالتراب والقصبان والافنان والقش والورق تجعلها هرية الشكل مستديرة القاعدة ظهرا يراوح من ٢٨٠ الى ٤٢٠ سم . وانقلعها من ١٢ الى ٢٠٠ سم . || والاثنى تضع في مومها الحولي من ١٢ الى ١٥ بيضة بين الواحدة والاخرى ١٢ يوما . اما البيضة فتتفق بد وضعها باسويين من قرخ نضبط انقب الريش يدبر امر نفسه ويلد منه .



نهام



بيغ ناعس



نهر



نهن

٢٩٣١٧ - نَهْمَةٌ

Roquette sauvage (F).

نحو ١ م. ثوباً الى الخنثى الاسمر . رأسها اسود . نمداه
الى الصلبة الزاهية . || تميش تحت الحجارة والاشعاب
في البراري وقرب البيوت وبينسها . قوتها المواد العضوية
وبرقات الحشرات وبتلات الازهار .



نِهيك أُنْب

٢٩٣١٨ - نَهْمَةٌ

النَهْمَةُ وطائر طويل المنقار والرجلين والرقبة ، اُفِر
الْقَيْنُ « (السان) .

٢٩٣١٩ - نَهْمَةٌ

Troque (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مشهورة باسم عتيل ،
اطليه .



نِهيك الايجار

٢٩٣٢٠ - نَهْمِيَّاتٌ

Trochidae (S).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات تدعى ايضاً
عتليات ، اطليه .

٢٩٣٢١ - نَهْمِيَّيْنِ

Blarment (F). Bray of an ass (E). صوت الحمار . والنهيق كذلك .

٢٩٣٢٢ - نَهْمِيَّيْنِ ، قَالِبِ الْأَذُنِّ ، أُبُو مَقْصَمٍ

Forficula (S). Forficula, Parca-oreille. Pince-oreille (F). Ear wig (E). Ohrwurm (D).

جنس حشرات مباشرة صغيرة من فصيلة النَهْمِيَّيَّاتِ . انواعها
عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . اجسامها مغلطنة
مستطيلة سداسية القوام . قوتها الاستعمارية غنطية
الشكل لا قياسية الطول والتركيب براوح عدد قليل من
١٠ الى ٣٤ . كواسها مثلفة الزاوية مهيبة الشكل والاحجام .
اعمالها قصيرة مقنونة . رواشها متباينة الاشكال والاحجام .
جالسة الاوتكاز . تحمل في مؤخر بطونها ملاط لا نظامية
الشكل ، مقنونة كلابية في الذكور ، مستقيمة في الاناث .
يزم اهل القرب انها تلتفب الاذن وزعم غريم انها تمض
اطر الزريق وقوف الجوارى . || اعرف انواعها واشهرها
ما يقع .



نِهيك الحقل الصغير

٢٩٣٢٣ - نَهْمِيَّيْنِ أَزْهَبٌ

Forficula pubescens (S). Forficula pubescens (F).

نوع من النَهْمِيَّيَّاتِ ، حشرته دقيقة الجسم الازناب طول من ٦
الى ١٢ م . قوتها الاستعمارية مركبة من ١٢ عقلة .
ثوبها الى الخنثى الاسف المواج . ملاط ذكورها كلابية
الشكل دائرية التفوق . ملاط اناثها مستقيمة .
تميش على الاشعاب والجنات الصغيرة . قوتها مكن الحشرات
ويرقاتها وريش الازهار وبتلاتها .



نِهيك الحقل الكبير

٢٩٣٢٤ - نَهْمِيَّيْنِ الْأَشْجَارِ

Forficula decipiens (S). Forficula des arbres (F).

نوع من النَهْمِيَّيَّاتِ ، حشرته طول من ٧ الى ١٣ م . قوتها
الاستعمارية مركبة من ١٣ عقلة . كوسها ونمداه الى
الصغار الخنثى . ثوبها الى السرة الخنطية المواج . رأسها
اصهب . ملاط ذكورها كلابية الشكل طول نحو ٥ م .
ملاط اناثها مستقيمة طول نحو ٣ م . تميش على الاشجار .
قوتها مكن الحشرات وبرقاتها والافرازات النباتية السكرية .



نِهيك مَبْدُول

٢٩٣٢٥ - نَهْمِيَّيْنِ الْحَقْلِ الصَّغِيرِ

Labia minor (S). Labia (F).

نوع من النَهْمِيَّيَّاتِ ، حشرته طول من ٥ الى ٦ م . قوتها
الاستعمارية دقيقة مركبة من ١٠ الى ١٢ عقلة . نمداه
ورواشها مستطيلة . ملاط ذكورها كلابية الشكل قليلة
التفوق ، طول نحو ٢ م . ملاط اناثها مستقيمة طول



نُورٌ

ترضعه نحو ٦ أشهر || موطنها فسح الارياح يشمل كامل إفريقيا الشرقية والجنوبية وبعض البلاد الاسيوية .

٢٩٣٨١ - نَوَاشِئُ الدَّبَب

٢٩٣٨١ - نَوَيرُ عَيْنِيَّ، كَرِيْمَه Carriera (S). Gnou à queue blanche, Carrière (F).

نوع من النَوَير الجثة طوله نحو ٢٥٠ سم. وارتفاعه ١٣٥ ثوبه الى السرة الكتستية. ذنبه ابيض اللون. الاثنى اصفر قدماً وقرناً من الذكر. اجله يد من ١٠ الى ٥٠ نفراً || موطنه يشمل ضفاف الوردج وسهوله .

٢٩٣٨٢ - نَوَاشِئُ الْحَبِثَةِ

٢٩٣٨٢ - نَوَيرُ اَشْجَلُ البَحْبَحَةِ Connochaetes albojunctus (S). Gnou à barbe blanche (F).

اكبر انواع النَوَير جثة واقفا خلافة واعطيا حفرة وخفة. جسمه بطول نحو ٢٨٠ سم. ويرتفع نحو ١٤٠. قرنه اثني الالتشاب مدبب الطرف الاحمير. ثوبه الى السرة الخيطية الصهباء المواج. عفرته شديدة السرة يتخللها سيبب ابيض. لحيته يضاء اللون ومنه ضرب امود الحبة. اجله يد من ٨ الى ٤٠ نفراً. موطنه افرقية الشرقية حتى بحيرة فيكتوريا لينايا.

٢٩٣٨٣ - نَوَيرُ مَسْلَح

٢٩٣٨٣ - نَوَيرُ مَسْلَح Connochaetes taurinus, C. gorgon (S). Gnou taurin, G. rayé (F).

نوع من النَوَير كبير الجثة خيلطيا، طوله نحو ٢٢٠ سم. وارتفاعه ١٢٠. ثوبه الى السرة الخيطية يعطيا تسليج اشهب. اجله يد من ١٥ الى ٢٠ نفراً. يبيض برفقة النعام ويجير الزرد || موطنه يشمل معظم اقطار افرقية الجنوبية.

٢٩٣٨٤ - نَوَيرُ

Noyau (F). Nucleus (E). هي عضو الاستمرار في الخلية تركب من شبكة مكونة من النشب الساعية في السائل النووي .

٢٩٣٨٥ - نَوَيرُ

Noyau (F). Stone (E). هي الحبة ، اظنها .

٢٩٣٨٦ - نَوَيرُ الْفَيْلِ

Barysphère (F). Barysphere (E). نواة النخل اسم يطلق على كتلة الارض المركزية ذك لان جميع مركباتها من الحادن الثقيلة الماثمة .

٢٩٣٨٧ - نَوَيرُ الْوَلَدِ

Nucléine (F). Nuclain (E). هي عناصر نواة اخلية وقد تكون ازوتية ودهنية وفسفورية وكبريتية ومنهم من مدحاها تكلوين .

٢٩٣٨٨ - نَوَيرُ

اقصى الاضرار وهي ارمية في اقصى الانسان بعد الاراء . وتسمى فرس الحلم لانه ينبت بعد البلوغ وكال العقل . وقيل النواجد التي تلي الاثياب . وقيل هي الاضرار كلها . نواجد . قال الجوهري : وقد تكون النواجد الفرس . وهي الاثياب من الخلف والسوالغ من الظلف .

٢٩٣٨٩ - نَوَيرُ الْخَيْسِ

Eperon (F). Spurs (E). جلب مؤنثة تملو سَوَاقِ بعض الحشرات .

٢٩٣٩٠ - نَوَيرُ

Anthophore (F). نمت وصفي يطلق على كل عضو نباتي يعمل زهرة او حدة زهور .

٢٩٣٩١ - نَوَيرُ اَبَيْصَ

هو الياسم ، اظنها .

٢٩٣٩٢ - نَوَيرُ الْفَيْلِ

هو شب الليل ، اظنها .

٢٩٣٩٣ - نَوَيرُ عَيْنِيَّ، كَرِيْمَه Carriera (S). Carrière (F).

شجرة برية وزينية من فصيلة النضيات . مهدا الصين . ساقها منتصبه زرقاء تملو من ٥ الى ١٥ م. اثمارها واثانها حر اللحاء . اوراقها عابلة متعقبة متعاقبة . نصلها احليجي الشكل لامع البشرة على مسطحه . اثمارها صلبة القد ، عادمة القعالات ، حلابة الفصم البيش ، كثيرة الاسدية . ثمارها جرداء وشمية الشكل ، ثلثية المصاريع || تنورها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٩٣٩٤ - نَوَيرُ

Eutoca (S). Eutoque (F). Eutoca (E).

جنس نباتات عشبية حولية وبعمرة من فصيلة النضيات . انواعها المعروفة ١٢ . بعضها امريكية الهيد ، بعضها شائع الاستعمال الزيني || ساقها عفاثة . اوراقها صلبة ، متعاقبة زياء الاتصال . اثمارها جيلة ، عفاثة العرف ، ملونة ، منها الازرق والاريجاني والايض || اشهر انواعها الزراعية الزينية نَوَيرُ يورنيليانا (Eutoca Wrangeliana)

٢٩٣٩٥ - نَوَيرُ

Anthophore (S). Anthophore (F). Anthophora (E).

جنس شجرات جارية لاقحة من عشائيات الاجنحة المحمويات وفصيلة التواريات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع مناطق البلاد المحتلة الحاررة والحارة . قوتها رحيق الازهار وطلما . ملجها الحياتي انتمالي || جسمها متوسط القد قريب الشبه بحجم ذكر النحل . تتميز بكثافة الزغب الذي يكتنفها من قة الرأس الى طرف البطن || عتلتها عشاا تبنيها العالين في المواقع المهجورة اغصها الحيطان الحربة .

٢٩٣٩٦ - نَوَيرُ

هو اسطرغالوس ثوريس ، اظنها .

٢٩٣٩٧ - نَوَيرُ

Anthophoridae (S). Anthophoridæ (F). Anthophoridae (E).

فصيلة شجرات جارية لاقحة من عشائيات الاجنحة المحمويات . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء المناطق الباردة || ملجها الحياتي تختلف مع اختلاف الاجناس ، بعضها جامي والبعض الآخر انتمالي . والجامي منها قتل المدينة . الذكور والاثان تمل في سبل الحيا والبقاء اذ لا يبيد عائلات كا في النحل || اشهر اجناسها النَوَيرُ والفتارة .

٢٩٣٩٨ - نَوَيرُ

عيط المنكبوت ونسجه . وفي المثل ارمي من نواس المنكبوت .

٢٩٣٩٩ - نَوَيرُ جَوِيَّة

Perturbations atmosphériques (F).

هي التقلبات الجوية المارضة غير المألوفة . وتلويطه هي الزوبعة من الرياح . ج نوج .

٢٩٤٠٠ - نَوَيرُ مَسْلَح

Neoborus ornatus (S). Néobore armé (F).

سكة نهريه يبيض من مفتوحات المانة . موطنها بحيرات ومنطقات نهر الكنفو . تعيش بين الاشباب المائنة



نَوَيرُ



نَوَيرُ مَسْلَح

٢٩٤٠٦ - نُورَسِيرَات * *Noteridae* (S).*Noteridés* (F). *Noteridae* (E).

فصيلة حشرات مائية من غديبات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ، اهلبيجية الشكل ، محببة ، تطول من ٦ الى ١٢ سم. رؤوسها قصيرة ، مستعرضة ، عيونها صغيرة ، تأثريها وفكرها قياسية. قرونها الاستشعارية شبه وشعية الشكل ، مركبة لاسفة ، ١١ فصلة. كواسلها محببة ، مستعرضة ، اغدادها لاحقة ، عادمة التعقيد. قواهمها نشيطة ، الخلفية منها مجهزة للوم || جميعها مفترسة. تعيش في المياه الراكدة او الجارية البطيئة الانسياب || اشهر اجناسها النوتيرة .

٢٩٤٠٧ - نُورْد *Calodon* (S). *Calodon* (F).

جنس فطور من فصيلة الابريرات . انواعها قليلة العدد اصطنابا ينض اطال من مناطق البلاد المعتدلة الحارة . جميع انواعها كاعنة الصف لاماكلة . تتميز ببوطها الشفوي المتجميع المثلث ، وبسوطها القصيرة الضفصنة ، وببنكها المجلدية المجددة شبه ليفة المادة || اعرف انواعها واشهرها الاربية التالية .

٢٩٤٠٨ - نُورْد بُرْتَقَالِيّ الْوَن * *Calodon auranticum* (F).

نوع من النوتة . يعيش في ظلال الصنوبريات . ساقه غليظة ، قصيرة ، صفراء اللون ، برتقالية الموانج . نكته غروطية الشكل ، كثيرة الحداب الاستشعارية ، قطرها نحو ٨ سم . سطحها خلي برتقالا اللون . لحسنته كالحلنن ، صفراء اللون ، كاعنة الصف ، غير مرغوب فيها .

٢٩٤٠٩ - نُورْد حَديديّ الْوَن * *Calodon ferrugineum* (S). *Calodon ferrugineux* (F).

نوع من النوتة . يعيش في ظلال الصنوبريات . ساقه قصيرة شبه غروطية الشكل ، لامستايوية السطح الخشن ، لونها الالكسني الاسمر . نكته يرمية الشكل قطرها نحو ٨ سم . سطحها خلي البشرة ، متتابع الحداب ، لونه الى الشقمة السمره يعلوها تنقيط احمر يطقه الابيض || لحسنته قاسية كالجلد ، كاعنة الصف ، لا تؤكل .

٢٩٤١٠ - نُورْد عَرَسِيّ * *Calodon geogenium* (S). *Calodon terrestre* (F).

نوع من النوتة . يسكن في الغابات . يعيش في المواقع الرطبة المشبعة بالطعالب . ساقه شديدة القصر تؤلف مع النكتة شكلا شبيها بالقنص الثلاثي الاعاخذ . قطر النكتة نحو ٢ سم. لونها كالكسكس الى الصفار الكبريتي || لحسنته كاعنة الصف ، لا تؤكل .

٢٩٤١١ - نُورْد عَدَب * *Calodon suaveolens* (S). *Calodon suave* (F).

نوع من النوتة . يعيش في ظلال الصنوبريات . ساقه قصيرة ، غروطية الشكل ، ربامية الحداب المستطيلة ، لونها الى الزرقوة السمره . نكته قمية الشكل ، كثيرة الحداب الجانبية والبطيحية ، قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الصبغة يعلوها تمخج ازرق وموانج اسف || لحسنته جلدية المادة ، كاعنة الصف ، غزامية الرائحة العذبة ، لا تؤكل .

قوتها الاماك واللوبيات والداميس والديدان || جسمها مغطى الجرم ، مستطيل الشكل ، يطول نحو ٣٥ سم. رأسها غروطي . عظمها مستطيل كالجلد . فكها مسلحان بسانن قوية ذرية . عيناها ماسحتان . زعنفتها الظهريّة الاولى كبيرة لقد شرعية الشكل . الثانية جفنة . زعانفها الصدرية والحرفية والشرجية معتدلة القد . الذيلية كبيرة ، فاقرة . ثوبا الى الشبهة البنفسجية الموانج . جانبها الى الخضار الزيتي الموانج بالفضي . عظمها الى الذرة المانجة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٩٤٠١ - نُورَسِيرَة * *Notoceras* (S). *Notocère* (F).

جنس نباتات عشبية برية ، حولية ومحولة وبعمرة من فصيلة الصليبيات . انواعها المعروفة عديدة اصطنابا فسحة الاربعة تمتد من البلاد الحارة الى الباردة || سرطها زهاب متصبية او مستطيلة ، فراء او قليلة الفروع . اوراقها كاملة ، متعاقبة ، سنانية الاتصال . ازهارها صغيرة يضاء اللون او تنية او صفراء .

٢٩٤٠٢ - نُورَسِيرَات * *Nautilidae* (S).*Nautilidés* (F). *Nautilidae* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات وأسيات الاربيل ربايعات الخياشيم . اجناسها وانواعها المنقرضة القادرة كثيرة العدد ، أما الحاضر منها فجنس واحد موط المحيط الهندي والبحار المجاورة . يعي نوتية .

٢٩٤٠٣ - نُورَسِيرَة * *Nautilus* (S).*Nautilé* (F). *Nautilus* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات وأسيات الاربيل ، ربايعات الخياشيم وفصيلة النوتيات || انواعها المعاصرة المعروفة ثلاثة اصطنابا المحيط الهندي والبحر الاحمر || اصداها كبيرة ، شبه قروية الشكل ، معتدلة التطيط . اجسامها غروطية ، صغيرة الرءاء . رؤوسها صغيرة . عيونها كبيرة جاسقة ، لراسها عديدة ، فسحة ، ونها اثنتان مجهزتان بما يشبه المهاجم . اصطنابها نشيطة وقوية || اشهر انواعها وأكثرها انتشارا النوتية الجاعة .

٢٩٤٠٤ - نُورَسِيرَة لَمَاعَة * *Nautilus pompilius* (S). *Nautilé flamé* (F).

نوع من النوتية يكثر وجودها في بحار الهند . اصداها لامة ، للوزنية الصفحات الداخلية ، لونها الى البياض المهدج بالصنابي || لحمها مأكول . اصداها مرغوب فيها شائعة الاستعمال الصناعي .

٢٩٤٠٥ - نُورَسِيرَة * *Noterus* (S).*Notère* (F). *Noterus* (E).

جنس حشرات مائية مفترسة من فصيلة النوتيرات ورتبة غديبات الاجنحة . انواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة من اليابان الى اروب . تألف المناق واللياء الراكدة || اجسامها صغيرة ، اهلبيجية الشكل ، محببة ، تطول من ٧ الى ١٠ سم. رؤوسها مستعرضة ، قليلة النتوش . عيونها صغيرة بارزة . فكثريها وفكرها ولامسها قياسية . قرونها الاستشعارية وشعية الشكل . كواسلها مستعرضة . اغدادها لاحقة ، عديمة التعقيد . قواهمها نشيطة ، الخلفية منها مجهزة للوم . ألوانها سوية الخضاب الكسني او الجروي || الجملانة قانصة والبرقة ايضا .



نوتية لَمَاعَة



نوتية



نورْد بُرْتَقَالِيّ الْوَن



نورْد حديديّ الْوَن



نورْد رَمَلِيّ



نورْد عَدَب



نوري



نوسة الاجاص



نوسة الاجاص



نوسة الحفصيات



نوسة

مظهره الخارجي يقع رداية اللون أو يضاف لا قياسية الشكل والحجم تركيب نصل الإوراق وصفات السواء الادمية تحطليا بعد ان تقضي على السنج والحلايا . وقد يركب كالأر الناضجة فدهو البشرة يبقعه أسمر دون أن يؤذي لياك السوخذ . يكالغ كثير من الفطور التي تصطب الكبريت والنحاس .

٢٩٤٢٣ - نَوْسَة الحُمْصِيَّات * Oospora citri-aureanti (S).

فطر مجهرى مهم الانتشار يركب ثمار الحفصيات المدركة والمخفوقة على اختلاف الوانها || يصيب القشور فيفسدها بعد ان يطب السنج والحلايا التي تنسل وتنفق خاصة الباك || يكتاغب بتطوير البآر المدة لحفظ او التصدير وياجتنب الاماكن الحارة المشبعة الرطوبة .

٢٩٤٢٤ - نَوْسَة * Nasiterna (S). Nasiterna (F).

جنس طير من النسلقات وفسيلة البببانات . اناوعها المروفة ١٢ موطئا غيبية الجديدة يبرز سلايان . تألف الثباتات الكثيفة الانجار والمواقع القريبة من الماء . ملجئها الحياتى جماعى . قوتها الثآر واسارع الحشرات . تنسل الاشجار كالنقار وتطير بشفة للورى || اجسامها صغيرة ، ربة ، تطول من ٨ الى ١٢ سم . اجنتها لاحة . اذناها قصيرة مستترة الاطراف . الثوابها تختلف مع الانواع ، جميعها زامرة الالوان || اشهرها النوسة القزينة .

٢٩٤٢٥ - نَوْسَة قزينة * Nasiterna pygmaea (S).

طائر من النوسة . جسمها صغير لقة يطول نحو ٨ سم . ثوبا الى الخضار المختلطة المجات . رأسها ومقنها صفر . رقال ذئبا الجانبية الى السواد اللابع باستثناء الزام الاعير فانه اصفر ، اما الرقال الوسطى فزرقاء اللون .

٢٩٤٢٦ - نَوْسَة * Métamère (F). Metamere (E).

٢٩٤٢٧ - نَوْسَة * Métamérie (F). Metamerism (E).

٢٩٤٢٨ - نَوْسِيَّات *
Oosporées (F). Oosporas (E).
عارة فطور مجهرية من فصيلة النوسليات . اجناسها ستة : الاربعداد والنسج والسداع والسيلندريوم والموزيليه . واثنية .

٢٩٤٢٩ - نَوْسَادِير * Rhinocéros de Sumatra (F).

هو كركدن سومترا ، اعطيه .

٢٩٤٣١ - نَوْس * Imbibber (F).

٢٩٤٣٢ - نَوْس ، بَنَل *
To imbibre (E).
ربط الشيء بالماء أو باي سائل آخر .

٢٩٤٣٣ - نَوْصَرَة * Diopsis (S).

٢٩٤٣٣ - نَوْصَرَة *
Diopsis (F). Diopsis (E).
جنس حشرات من فصيلة النوضريبات ورتبة ذوات الجناحين اناوعها المروفة ستة اصطنائها البلاد الحارة || اجسامها خضرة ، هيفاء ، تطول من ٨ الى ٨ سم . رؤوسها مكورة تملوها زائلك مغترية الانشباب تحمّل في اطرافها الزباني والوسن . عيونها بارزة صغيرة . قوتها الاستثنائية صغيرة ، تحيلة ، تتيق الميون . اعطائها ولاسها صغيرة . كولسها

٢٩٤٣٤ - نَوْجَل * Heteropogon (S).

٢٩٤٣٤ - نَوْجَل *
Hétéropogon (F). Heteropogon (E).
جنس نباتات عشبية حولية زركوبية من فصيلة النجيليات اناوعها المروفة نحو ٢٥ اصطنائها البلاد الحارة والمتندلة الحارة . سوقها جامدة تحيلة عادمة الفروع . اوراقها عصفية . انزعارها سنيل التجميع سنابلها فردية . يعضها ينبت طويلا في بعض مواقع الساحل البنياني والوسط .

٢٩٤٣٥ - نَوْجَة * Ecade

نتيجة البيئة الموسمية في التكيف أو التبدل . كترك نوجة الظل والشمس والجفاف والرطوبة ...

٢٩٤٣٦ - نَوْز * Corymb (F). Corymb (E).

٢٩٤٣٦ - نَوْز *
Corymb (F). Corymb (E).
النورة والمذق شكل من اشكال الانزعار صويلا التركيب هدي الانزعار المتساوية الابد من الخور الرئسي . يكر في الفصيلة النورية || والنورة هي الزهرة .

٢٩٤٣٧ - نَوْز * Mouette (F).

٢٩٤٣٧ - نَوْز *
Mouette (F).
هو نزع الماء ، اعطيه .

٢٩٤٣٨ - نَوْسِيَّات * Laridae (S).

٢٩٤٣٨ - نَوْسِيَّات *
Laridae (F). Laridae (E).
فصيلة طير من كليات القدم ، طويولات الريش . اجناسها واناوعها المروفة عديدة || اجسامها متباينة الحجم . اجنتها مستطيلة ذلفة الاطراف . متناهدا عادمة الزحف . اصابعها ناضجة الخطاب . قصاصها مجزة بزويين من الفرائض لافية . زوج اين وزوج ايسر || اشهر اجناسها النورس ونزع الماء والمجهوم .

٢٩٤٣٩ - نَوْري * Nuris (S).

٢٩٤٣٩ - نَوْري *
Nurie (F). Nuris (E).
سمكة نورية صيدة الجنس والنوع من فصيلة الشبوطيات . موطئها انهر الهند || جسمها وشي الشكل يطول من ٤٥ الى ٥٥ سم . رأسها معتدل الجرم ، مقطوم اعظم . شفتها معتدل الانفراج ، وباهي الذبابت المستطيلة . عيناها ماصتان . زعنفتها الظهرية خلفية الانزكاز تقابل الشرة الذيلية مقمرة الطرف . ثوبا الى الخضار البصري ينبر وتعملو ساحة وريدية في البطن ويسمر ويبقى في الظهر || لحمها عويط الصنف ، مأكول .

٢٩٤٤٠ - نَوْريَة * Péale (F). Pétal (E).

٢٩٤٤٠ - نَوْريَة *
Péale (F). Pétal (E).
هي بتلة الزهرة عامة وكه تستعمل تقصيصا دلالة على البتلة المستقلة .

٢٩٤٤١ - نَوْسَة * Oospora (S).

٢٩٤٤١ - نَوْسَة *
Oospora (S).
جنس فطور مجهرية من النوسيات وفصيلة النوسيات تميز بعيشها التحيل النراس المتشابك للراكب الذي يفسن النسخ المشارة ويكتاثر خارجيا . جرباها الكندي مذلاني الشكل . كلاله سببية ويكتاثر خارجيا || اناوعها عديدة ، مظهرها رمي يعيش على المواد الذائبة المخفوقة وعلى الاعتشاب اليابسة وفي اثرية || اعرف اناوعها المؤذية ما يلي .

٢٩٤٤٢ - نَوْسَة الاجاص * Oospora piricola (S).

٢٩٤٤٢ - نَوْسَة الاجاص *
Oospora piricola (S).
فطر مجهرى يتطفل على اوراق الاجاص واثاده ومثاره .

٢٩٤٤٢ - نُؤْفَر أَرْعَب *Nuphar pumilum* (S).
Nufar nain (F).
 نوع من النوفر المبلول . أعطاه مياه البلاد المحتلة الحرارة .
 أوراقه تطول من ٥ إلى ١٥ سم . وتعرض من ٤ إلى ١١ سم .
 أزهاره صفراء اللون صغيرة القد ، قطرها براوح
 من ٢ إلى ٣ سم . || تنوره يستمر من حزيران الى آب .

٢٩٤٤٣ - نُؤْفَر أَصْفَر *Nuphar luteum* (S). *Nufar jaune, Lis jaune des étangs, Plateau* (F). *Yellow water-lily, Brandy-bottle* (E). *Gelbe mummel, G. wasserrose* (D). *Ninfes gialla, Ercules gialla* (I).
 نوع من النوفر المبلول في مياه البلاد الحارة . أوراقه كبيرة
 تتصل الاغصان الباهت ، تطول من ١٥ إلى ٣٠ سم .
 وتعرض من ١٠ إلى ٢٠ سم . أزهاره صفراء اللون متراكبة
 الثلاث المدينة الصفوف قطرها براوح من ٥ إلى ٧ سم .
 ثماره اجاصية الشكل . بلوره ويهدأ به أوكولة || ينور
 من حزيران الى ايلول .

٢٩٤٤٤ - نُؤْفَر سَهْمِي *Nuphar sagittaeifolium* (S). *Nufar sagittal* (F).
 نوع من النوفر الامريكي ، أوراقه سهمية الشكل تطول
 من ٢٠ إلى ٤٠ سم . وتعرض من ٥ إلى ٨ . أزهاره صفراء
 اللون متوسطة القد قطرها براوح من ٤ إلى ٦ سم . || تنوره
 يستمر من حزيران الى آب .

٢٩٤٤٥ - نُؤْفَر يَابَانِي *Nuphar japonicum* (S). *Nufar japonais* (F).
 نوع من النوفر البروتي الوافر اللشط والندو . مهد
 اليابان ، أوراقه اهلالية الشكل . تنصلها اخضر الصفحة
 العليا ، اخر السفلى يطول نحو ٣٠ سم . أزهاره كبيرة
 القد صفراء اللون تطلوها بقشة حمراء . اسديها ويأربها
 ارجوانية || تنوره يستمر طوول فصل الصيف .

٢٩٤٤٦ - نُؤُفَس *Bronza*
 سبيكة ، متوافقة اللب ، من النحاس والتصدير والزئبق .

٢٩٤٤٧ - نُؤُفَصِيَّات *Dibamidae* (S). *Dibamidés* (F). *Dibamidae* (E).
 فصيلة حيوانات زحافة من العظائيات قصيرات الالسة .
 انواعها المعروفة ثلاثة يصممها جنس واحد . أعطاهنا بعض
 اقالم افريقية الاستوائية || جميعها جاساة تسرح في الليل
 وببيت في النهار || اجسامها دودية الشكل تطول من ٢٠
 الى ٢٨ سم . وهي عادمة القوائم الامامية ، صامخة الخلفية .
 عيونها طامسة تلمحها اغشية مبطنة .

٢٩٤٤٨ - نُؤُكَّة *Nucula* (S). *Nucule* (F). *Nucula* (E).
 جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحات الخياشيم
 وفصيلة التوكليات . انواعها المتعاصرة المعروفة قليلة العدد
 منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصداؤها
 شبه مخروطية الشكل ، متساوية المصارع || لاساوية
 الاصلع . الوانها عديدة ينفذ فيها الاغبر ثم انبي الفاتح .
 اصفاها للؤلؤة الماددة من الداخل || تعيش منعزلة في
 الرمال المتوسطة الغور .

٢٩٤٤٩ - نُؤُكِيَّات *Nuculidae* (S). *Nuculidés* (F). *Nuculidae* (E).
 فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفيحات الخياشيم .

شبه اهلالية ، مجهزة باربعة منخاس ذرية . بطونها شبه
 مدقية الشكل . رواشتها شافطة يطوها بعض البقع السمر .
 قوامها مستطيلة || الجملانة واثمة اما اليرقة فخاصلة
 ترعب في عصف النجيليات .

٢٩٤٤٤ - نُؤُصِرِيَّات *Diopsidae* (S). *Diopsidés* (F). *Diopsidae* (E).
 فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها
 المعروفة نحو ٦٠ منتشرة في جميع مناطق البلاد الحارة ||
 اجسامها صغيرة تطول من ٥ إلى ٨ سم . رؤوسها معتدلة
 الجرم مجهزة بزوائد سننية الارتكاز ، متفرجة ، مستطيلة ،
 تحمل الميون في اطرافها . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية
 صغيرة تنشب في الزوائد قرب محيط العين . كواسلها شبه
 يضيعة . بطونها متعصرة المؤخر . اجنحتها شافطة يطوها
 بعض البقع السمر . قوامها مستطيلة || يرقاتها خاصلة
 تركب عصف النجيليات || اشهر اجناسها النوصرة .

٢٩٤٤٥ - نُؤُطَّة *Ventricula succenturié* (F).
 اسد اجزاء جهاز الهضم عند الطير . اولها الحوصلة ثم
 النطقة ثم القاصدة ثم الاءاء || فالخوصلة هي الجراب الاول
 الذي يلي المريء . يجتمع فيه الطعام بعض الوقت ثم ينتقل
 الى النطقة (البليطن الصمراوي) وهي جراب مستطيل يفرز
 العصارة الخاصة حل الاغصنة من حب وفيه اني صار
 تليينها بالخوصلة ثم ينتقل الطعام من النطقة الى القاصدة
 حيث يمتص مع الحميم والزلزل ويدخل في الاءاء حيث
 يتم الهضم والفلذاء .

٢٩٤٤٦ - نُؤُطُور *Nothure* (F).
 طائر يدعى نطوره ، اطلبه .

٢٩٤٤٧ - نُؤُطُوع *Espèce* (F). *Species* (E).
 النوع هو جاع القروب اي جملة الافراد المتشابهة التي
 تنحدرت من اصل واحد او جديدي مشتركة .

٢٩٤٤٨ - نُؤُطُوم *Cystoseira* (S). *Cystoseire* (F). *Cystoseira* (E).
 جنس نباتات بحرية من الخياشيم السمر . انواعها المعروفة
 نحو ٣٠ اصنافها معظم بحار العالم || كلالها قصيرة .
 سيقانها رفراء . أوراقها خيطية ، صغيرة . كثيرة العدد ،
 متراكبة . تنبت بمجموعلاتها الشبه يضيعة الشكل ،
 السبعية التجميع .

٢٩٤٤٩ - نُؤُطُوي *Spécifique* (F). *Spécific* (E).

٢٩٤٥٠ - نُؤُكَّة *Cardiosperme* (F).
 هي الكف ، اطلبه .

٢٩٤٥١ - نُؤُفَر *Nuphar* (S). *Nufar, Nuphar* (F). *Nuphar* (E).
 جنس نباتات عشبية جمهورية مائية من فصيلة النوفريات .
 انواعها المعروفة ١٥ اصنافها مياه انهار واحوار وبعض
 بحيرات البلاد الحارة والمعتدلة . جملامره مدادة . أوراقه
 مستطيلة الاعناق طافية . أزهاره عديدة الثلاث المتتامة
 الصفوف . ثماره جراه ريمية الشكل ، يزورها نشوبة
 الماددة || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .



نوعم



نوفر



نوكة

اجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد. أنوعها النادرة من متحجرات اقدم التكاوين الجيولوجية. أما الممارسة المنتشرة في معطر بحار المال || اصنافها شبه غروية الشكل ، متساوية المصارع ، لامتناهية الاصلح. اصنافها خشنة ملونة من الفاج ، مائلة للزؤنة من الداخل. حيواناتها مائعة اللصع ، كبيرة الاصيل الاحليلجية المستطيلة || اصراف اجناسها الممارسة واشهرها النوكلة .

٢٩٤٥٦ - نوليستا ٥

Nolina (S), Noline (F).
جلس نباتات من فصيلة الزنبقيات مفردة التعريف على اسم البورتالي الفرنسي ونولان. أنوعها المعروفة قليلة، منها بلاد الكسكس. سيقانها ليفية التركيب، لغشية الجذث والقاعدة ، دقيقة الجذع. اوراقها خضراء النصل، مستطيلة متعقبة، انزهارها جرسية الشكل ، عنقودية التجميع، ساطعة الازهار || ترطب في الاثرية الفنية المتوسطة الاندماج والمادة الكلسية. تحشى المواقع الباردة والرطوبة المستحكة. اشهر انواعها الزنبقية ما يتبع .

٢٩٤٥٧ - نوليستا مجعنة ٥

Nolina recurvata (S), Nolina arquata (F).
نوع من النولينا الزنبقية، ساقها تعلو من ٤ الى ٦ أمتار. اوراقها بجلة الخضار تعلو نحو ١٠٠ سم. وتعرض ٢ سم. ازهارها حاملي بكل الساق بمقوده المنقش الكبير الحجم. ازهارها يضاء اللون. تنورها يستمر طول الصيف .

٢٩٤٥٨ - نوليستا مستطيلة الورق ٥

Nolina longifolia (S), Noline à longues feuilles (F).
نوع من النولينا الزنبقية، ساقها تعلو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها شديدة الخضار المايق لتعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. وتعرض نحو ٢ سم. ازهارها حاملي الازهار يخرج الساق بمقوده المنقش الكبير القد. ازهارها يضاء اللون ، فبراء الملاج. تنورها يستمر طول الصيف .

٢٩٤٥٩ - نولمان ، حشيشة الحقن

Herniaria (S), Herniaire (F).
جلس نباتات حشوية برية من فصيلة النوليات. أنوعها المعروفة ثمانية تكثر في الاماكن الرملية الجافة . سيقانها فراء اوراقها متعاقبة لائفة صغيرة القد . ازهارها ابطية الازهار || اشهر انواعها النولمان الامرد .

٢٩٤٦٠ - نولمان امرد* ، حشيشة الحقن

Herniaria glabra (S), Herniaire glabre, Herniola, Herbe au cancer, Turquette (F), Rupture-wort, Turk's herb (E), Glatte bruchkraut (D), Ernaria, Erba turchetta, Erniols (I).
نوع من النولمان الحشوي البري الطهي المعمر. ساقه فراء مراء ، اوراقه صغيرة القد ، متعاقبة ، لائفة ، يضيئة النصل ، مائلة البشرة . ازهار ابطية وتاجية الازهار ، نورية التجميع ، صغيرة الحجم || كان شائع الاستعمال في علاج الحقن .

٢٩٤٦١ - نوميديات

Nilecebras (S), Nolecebras (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمة القنالات . اجناسها وأنواعها كثيرة العدد. نباتاتها اشباب حولية ومعمرة تعيش في الماراض الحارة وفي الاثرية القليلة الرطوبة . اوراقها كاملة. ازهارها غمية التجميع لا قياسية الازهار . ثمارها بغور نشوية المادة . || اشهر اجناسها النولان والحربط والشعير وشعشة القنابيل .



نولان



نولان امرد

٢٩٤٥٠ - نولان *

Nolans (S), Nolane (F).
Nolans, Chilian bell-flower (E), Glockenwinde (D), Nolans (I).
جلس نباتات برية وزراعية زنبقية من فصيلة النوليات. أنوعها عديدة منها المشوي والجنيبي والحولي والمحلر والمعر. سيقانها لا نظامية الجلوس منها المنصبة والمستقيمة والمندادة. اوراقها كاملة متعقبة متعاقبة او ثولمية. ازهارها فردية التجميع ، محورية الازهار ، جرسية الشكل ، فارشة الاطراف كالبلوق . ثمارها نورية لا قياسية الشكل والحجم. بلورها خشبية المادة . شديدة الصلابة || اصراف أنوعها الزنبقية واشهرها ما يتبع .

٢٩٤٥١ - نولان ميرميتي الورق

Nolana striplifolia (S), Nolane à feuilles d'arroeche (F).
نوع من النولان الزنبقي الحولي . موطنه الاصل بلاد كولومبيا. ساقه مستقيمة مدادة زباء اللحاء. اوراقه الجلمية كبيرة القد سميكة الشكل . ازهاره زرق الابواب ، صفر الانابيب والفجاج || تنوره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٩٤٥٢ - نولان سنائي الورق

Nolana lanceolata (S), Nolana lancéolée (F).
نوع من النولان الزنبقي الحولي . موطنه بلاد الشيلي . جلده جني الجذر . ساقه مستقيمة مدادة زباء لائفة ، ساعدة ، سنائية النصل ، خلية البشرة ؛ الجلمية منها ضمية التجميع والاخرى ثولمية . ازهاره كبيرة القد صانجوية الابواب ، صفر الفجاج والانابيب المسنجة بالنفسيج . تنوره يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٩٤٥٣ - نولان متناقض

Nolana paradoxa (S), Nolane paradoxaie (F).
نوع من النولان الزنبقي الحولي السبروتي . موطنه الاصل بلاد البرازيل . ساقه متعقبة مدادة . زباء اللحاء ، تعلو نحو ٣٥ سم. اوراقه ثولمية ساعدة ، نصلها مسوالة الشكل ، خلي البشرة . ازهاره بنفسجية الابواب ، صفر الانابيب ، حر الفجاج || تنوره صيني يستمر نحو ٤٥ يوماً .

٢٩٤٥٤ - نولان مستطع

Nolana prostrata (S), Nolane couchée (F).
نوع من النولان الزنبقي الحولي السبروتي . موطنه الاصل بلاد البرو . ساقه مستقيمة مدادة . اوراقه متعقبة متعاقبة ، نصلها اهليلجي الشكل ، مائل الصفحة ، جبل الخضار الزاهي . ازهاره زقاء اللون ، مسنجة بالنفسيج كورسها هرمية الشكل ، خاسية الفصوص المتساوية الزخمية الاطراف. تنوره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٩٤٥٥ - نوليديات

Nolanaceae (S), Nolanacées (F), Nolanaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها قلية العدد .

٢٩٤٧٤ - نِيْتَاكَة ° Orogenèse, Orogénie (F).

النفاقة فرع من الجيولوجية والجغرافية الحكمية يبحث في تكوين الجبال انطلاقاً من السداسة والكتاحة .

٢٩٤٧٥ - نِيْزَاكَة ° Zoogenie (F), Zoogeny (E).

النفاقة فرع من الزولوجية يبحث في نشوء الانواع الحيوانية وفي مدارج نموها .

٢٩٤٧٦ - نِيْجَة Animus (F).

هي الدافع الباطني الحقيقي للعمل .

٢٩٤٧٧ - نِيْجَة التَدَلِيْس ، نِيْجَة الدَفْس °

Constilium fraudis (F).

هي قوة اجرامية يستدل عليها من معرفة المدين مدى الضرر الذي يلحق بهدائيه عند قيامه بعمل يحمله مفسراً او يزهد في افعاله .

٢٩٤٧٨ - نِيْجَة التَمَتُّك Animus domini (F).

هي ان يتصرف المرء في المال كتصرف المالك له سواء كانت ملكيته صحيحة ام غير صحيحة .

٢٩٤٧٩ - نِيْتَرَات Nitrate (F).

النيترات ، كبريتات ، ملح يحصل من تآكسد الحامض النيتريكي مع احد الاجسام . وهو من الامسدة الازوتية المشهورة القابلة للاستعمال نظراً لسرعة انفجاليها في التربة وقرى متناظها من النبات الذي يغطها دون جهد او عناء . النيتراتات او الامسدة النيترياتيية عديدة مختلفة التراكيب والمصادر اعرفها واشبهها استعمالاً ما يتبع .

٢٩٤٨٠ - نِيْتَرَات الامُونِيَاك ، نِيْتَرَات التَشَاكُور Nitrate d'ammoniaque (F).

احد الامسدة الازوتية التركيبية يستحضر من تفاعل الحامض النيتريكي مع الامونياك . يحوي نحو ٣٥٪ من الازوت الصافي منها ١٧.٥٪ ازوت نيتريكي و ١٧.٥٪ ازوت امونياكي . لذلك فهو يجمع بين سرعة انفجاليه وتحميل النيترات ودين بطل انفجاليه وتحميل الامونياك الذي يوافق اكتمل الاكبر من دورة النبات الشولية او الحولية .

٢٩٤٨١ - نِيْتَرَات البُوتَاكْس Nitrate de potasse (F).

سماد ازوتي بوتاسي يستحضر من تكرير ملح البارود وتصنيعه مع البوتاس . يتميز بفعالته لسبة رزفه التي لا تفوق ٤٪ وهو يحوي من ١٢ الى ١٤٪ من الازوت النيتريكي ومن ٤١ الى ٤٦٪ من البوتاس . || مظهره الخارجي ملح متبلور ابيض اللون . ارتفاع نمته يجعل استعماله محصوراً بزرعات الزهار .

٢٩٤٨٢ - نِيْتَرَات البَرِي ، نِيْتَرَات الكِلْس Nitrate de chaux (F).

سماد كياوي مركب من تآلف الحامض النيتريكي مع الكلس . وهذا الحامض النيتريكي يستحضر اما مباشرة بتسليط القوس الكهربائي على الازوت الجوي او باكسدة الغاز الامونياكي بحسد استحصاله من ازوت الجو . وهو يحوي ١٥.٥٪ من الازوت النيتريكي ونحو ٢٨٪ من الكلس . تألفه مع الكلس يجعله اسرع الامسدة انفجاليها وتتشبك واكثرها ملائمة لجميع الارز . || اما محاذيره فهي سرعة تحمله وتقلصه من التربة ، ارتفاع نسبة رزفه التي تبلغ ٥٥٪ . عدم قابليته المزج مع الامسدة الاخرى

٢٩٤٧٢ - نُونُ الكُنْز هو الحوت . ج نينان وأونان .

٢٩٤٧٣ - نُونُ بَحْرِي Anguille de mer (F).

سمكة بحرية تدعى زرقية مبنولة ، اطلبها .

٢٩٤٧٤ - نُونُكَة ° ، أَفِيَا ° Aphyn pellicuda (S).

Athérine naine, Nounat (F), Atherine (E).

سمكة وصيدة الجنس والنوع من فصيلة القويبيوات . جسمها عادم السهف ، صغبر القد ، دقيق الشكل ، يطول نحو ٥ سم . || يكثر وجودها في بعض الازوتية قرب الشطوط اللبنانية . وهي من الاسماك المأكولة المتوسطة الصنف .

٢٩٤٦٥ - نُونُكَة ° Phytogénésie (F).

Phytogenesy (E).

النوع نمو النبات ونشأته .

٢٩٤٦٦ - نُونُورِيَات Pileosporaceae (F).

Pileosporaceae (E).

فصيلة الفطور المتطورة من رتبة الزقيات .

٢٩٤٦٧ - نُونِيْ Nucléaire, Nucléol (F).

٢٩٤٦٨ - نُونِيْ Drupe (F), Any stone-fruit (E).

كل ثمرة خضية ذات نواة اي حبة كالشمسة والفرزة يكون فيها السقك اي الجزء المتوسط الكائن بين القشرة والحبة لحمي التركيب ، ويكون الجزء الداخلي الذي يحيط بالبررة قابلاً صلباً كما في حبة الزيتون والخوخة ...

٢٩٤٦٩ - نُونِيْكَة Oospore (F), Oospore (E).

النوية بوفرة غقيات الوليع .

٢٩٤٧٠ - نُونُ

هو النضج اي صوت اليوم . قال الاعشى يصف للاً :
ولا يسع المرء فيها ما يؤمنه
بالليل الا لثيم اليوم والضحا »

٢٩٤٧١ - نُونِيَادَات Unionidae (S).

Unionides (F), Unioniidae (E).

فصيلة حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم بحيرات وانهار العالم || اصداؤها نظامية ، متساوية المصارع ، لامتساوية الاصلع ، ملونة ، يشها ادمة خضراء . اجسامها مائحة المنحاص ، مستطيلة الارجل الصفيحية الشكل || اعرف اجناسها واشهرها النيسادة والدردية والمريفة والمريفة والونينة والمريفة .

٢٩٤٧٢ - نُونِيَادُكَة ° Unio (S).

Mulette (F), Unio (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة النبادات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠٠ منتشرة في جميع انهر العالم ونيجرياته || اصداؤها كبيرة القد او متوسطة ، بيضية الشكل ، متساوية المصارع ، يشها ادمة من الخارج ادمة يكثر فيها اللون الاخضر وبشها من الداخل طبقة صميكة لؤلؤية المادة شائعة الاستعمال الصناعي || تعيش منتمة في الاسمال والارمال .

٢٩٤٧٣ - نُونِيَاط

النباط نجمان نيران من كوكبة برج العقرب موضعها قدام القلب وعقله .



نُونُكَة

٢٩٤٩١ - نيترون شير مائن .

٢٩٤٩٢ - نيتكة
Curure (F), Dirt, Muck (E).
وسل مستخرج من فتاة او عثاق .٢٩٤٩٣ - نيتديبات
Phrynomeridae (S). Phrynomeridae (E).

فصيلة حيوانات دوداء قارضة شائعة من لمة الحشرات
ورمية السوفيات وربة الجراتات اي عدديات اللب ||
اجناسها وانواعها قليلة العدد مهدها بلاد افريقية الشرقية
والجنوبية . جميعها من الصفاد الصغيرة القه . تتميز
بساوات سطح ضلعي قوسها الصدري في مركز تلاقيها
وتتبدد التنوات المطية الجانبية في فقرة العجز . وروسها
ضخمة . فكوكها العليا مسننة . اصابع قوائمها الامامية
والخلفية طويلة من كل سظاب تحمل في اطرافها طباط
حمضية تمكثها من تسلق سطح الماء . جلودها مائسة ،
عامة التمثل ولكنها تفرز من عند القنص عليها ، مادة
كاوية تعمل في اليد ما يفعله نبات القراس الحرق ||
الوانها مختلفة الالوان يكثر فيها الاسمر الداكن والارشفة
الصفراء وبض الصفوط القاطبة || سطح انوعها يميل
هل النباتات والاخيار القريبة من الماء .

٢٩٤٩٤ - نيتور
Propeague (F).

النتر جهاز التناسل عند العطال . وهو مركب من
عدة حبيرات زينية ، وشية الشكل ار عسبة . يسقط
عند الادراك اتمام فينش في التربة ويعد الدورة الحياتية .

٢٩٤٩٥ - نيتديكة
Melnargia galatae (S).
Melnargia galatae, Demi-douli (F).
Melnargia galatae (E).

حشرة من فصيلة الحياتيات وربة حشريات الاجنحة .
موثها يمتد من الشرق الاوسط الى معظم الاقطار الاروية .
فرائنها واسعة قوتها مشر الاضرار . سرقتها تعيش على
صفت الذكيتل والفرطيل والعصوية والنت في جسمها
تتوسط القند يطول نحو ١٨ م . مسقطها نحو ٤٨ م . راسها
الى الربعة . حينها كبيرتان . زياتاها صولطانيان اسودتان .
جوشها الى الربعة السوداء . يعطها الى الربعة || رواشها ،
عند الشقين ، الى البياض الاخير يطولو تبيج وتزويق
وتتميق اسود || لها جبل واحد في الحلق . تظهر القراشة
في حزيران . تسرح من النفض الى فصحة الجبل . تعاطل
بعد ظهورها بنحو تسعة اسابيع وتضع المكن لطفاً على
الصغصعات السفلى من نصال العصف || السورة عند بلوغها
الكامل تقطو نحو ٣٢ م . جسمها اسطواني الشكل . قشورها
نام الحمل القصير . ثوبا الى الربعة الخضراء يعطوها
غطان جانبيين اصفران ويضع لجبي اسود . راسها اسود .
شرعها ينتهي بزايدة مفلقة . منها ورواجها الى السورة ||
طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتقضي في
التربة ضمن غلاف عضوي المادة .

٢٩٤٩٦ - نيتديكة
Neda (S), Neda (F), Neda (E).
جنس حووانات بحرية من الرخويات مديات الابريل
خلفيات الحياش وفصيلة الكتيتيات . انواعها المعروفة
قليلة العدد اعطائها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط .
تمتلك لاصقة بالصخور القريبة من الشواطئ || اصداها
داخلية ، مستديرة ، رقيقة ، شديدة الصغر . اجسادها
نحيلة ، مستطيلة ، مدببة المقدم والمؤخر . اعطائها


نيدل



نيدة

انصهيا السوروفوسفات ونترات الصودا وسلفات الامونيك
والاسمدة العضوية .

٢٩٤٩٣ - نيترات الشيلي ، نيترات الصودا
Nitrato de soude de Chili,
Nitrato de soude naturel (F).
الطبيعي

سماد ازوتي يستخرج من كلش مناج الشيلي بعد تقويبه
وتسيبه ويخبر مائه . مظهره الخارجى ملح ابيض اللون
يحوي من ١٥ الى ١٦ ٪ من الازوت النيتريكي وبض
التي ازيد من عناصر اليود والبروم واليورق والمينا
يضاف اليها بعض لوله الاكثار الثانوية . || وهو
سريع الانفعال في التربة قريب التمثل من النبات غير
انه يسلط تماسك ذرات التربة الذي يجد من رفايتها .
لذلك ينصح باستعماله في الارثة الخفيفة القليلة الانساج
وبعد استعماله في الارثة المنتجة او الحامضية الدالت
لانه يحدد تفاعيلها نتيجة تماسك ذراتها .

٢٩٤٩٤ - نيترات الصودا التركيبية
Nitrato de soude synthétique (F).

سماد كياوي ازوتي سريع الانفعال والتثل ، يستخرج من
ازوت الجير ، يحوي من ١٥ الى ١٦ ٪ من الازوت النيتريكي .
يقال فيه ما قيل بنترات الشيل من حيث نتائجها الحكيمة
والكياوية على ذرات التربة والاملاجات .

٢٩٤٩٥ - نيتروجين
Nitragine (F).
مستخرج ازوتي سائل المادة ينتج من تكثير جرثائم النترجة
صناعياً || يستعمل حثاً بالتربة لمدها بجرثائم النيتروجن .٢٩٤٩٦ - نيتروبوئاس
Nitropotasse (F).
سماد كياوي يستخرج من تفاعل الحامض النيتريكي مع
البوتاس . تركيبة ٢٥ ٪ بوتاس و ١٦ ٪ ازوت نصه
تماماً نيتريكي والنصف الآخر امونياكي . يصدر من الاسمدة
الجبلية الطبع والالفة غير انه يشكو من ارتفاع نسبة وزنه
التي تبلغ ٣٤ ٪ .٢٩٤٩٧ - نيتروجن
Nitrogène (F). Nitrogen (E).
هو الازوت ، اطلق .٢٩٤٩٨ - نيتروفسفات
Nitrophosphate
سماد كياوي يستخرج من تفاعل الحامض النيتريكي مع
الفوسفات المعدني . تركيبة ١٤ ٪ من الحامض الفسفوري
الذي يلوي في الماء و ٧ ٪ من الازوت النيتريكي السريع
الانفعال . يصدر من الاسمدة النشطة التي تحسن النبات
على الازهار .٢٩٤٩٩ - نيتروهيل
Nitrophile (F).
نعت تربوي يطلق على كل نبات رطب في الارثة النينة
بالنترات وقد يطلق على التربة ايضاً قوتها تربة نيتروهيل .٢٩٤٩٠ - نيتيل
Nitala (S), Nitala (F).
جنس حشرات نافعة من الصفريات العثائية الاجنحة
المقصورة . انواعها عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم
جميعها صغيرة القند طولا براوح من ٢ الى ٥ م . انوعها
مختلفة الالوان يكثر فيها الاسود والاسمر والاصفر الصنابي .
قوتها الاستعمارية عجيبة متفرقة الاطراف . مرآتها
شذائية الحمة الحادة . || قوتها التزويبات من اي نوع
كانت تعلمها بشذائها فتصدر اعصابها وتقلها الى حيث
تلتهمها .

غروبية متوسطة الطول. لوانسا ثنائية، انبوية مفلوجة السطوح الخارجية.

٢٩٤٩٧ - نِيدَس قَمَصِيَّة

Noides tipularius (S). *Néide tipulaire* (F).

حشرة خالصة من فصيلة البروسيات ورتبة مخلفات الاجنحة. جسمها صغير القد ي طول نحو ١٠ سم. شكلها وسرعاتها في انتقالها شبيهة بشكل القمص وسرعاتها || ثوبها الى الخطي الاسمر. رأسها مكور، مستطيل الخط. عيناها جانبيتان، صغيرتان. زباناها دقيقتان، مستطيلتان كوسلهما شبه غروبي الشكل. حجبها ضيقة، صغيرة. ظهورها ضيق لاحت. قوائمها مستطيلة. الصفحة السفلى من بطنها وصدرها الى السرة السوداء || تألف الجبراري والمواقع التي تكثر فيها الاحشاب اغصانها الجراب. قوتها الارواق.

٢٩٤٩٨ - نِيدَمَان * ، نِيدَيَان ، وَرْد القَمَص *Drosara* (S). *Drosara*, *Rosée du soleil*, *Rosolli* (F). *Sundew*, *Lustwort* (E). *Runder Sonnentau*, *Rosékrut* (D). *Drosara*, *Rosolida*, *Erba da gotzari* (I).

جس نباتات شبيهة مقترنة ممدرة من فصيلة النيدمانيات. انواعها المعروفة زهاء ١٠٠ جميعها نباتات تعيش في المناطق والمطارب والمواقع الرطبة. سطوها مقرة. اوراقها قرصية الانتساب مستطيلة الاضلاع. ازهارها خالصة الاجزاء تقوم على شرايع دقيقة متصبة تتوسط الارواق. || اقتراشا الحشرات يتم بواسطة اوراقها المستترة، المقترنة التصل للحدود بالوانس الدافئة التي تشع كل حشرة تقرب منها ثم تقضي عليها وتغصصها بعد ان تفرز لوانسا الصادرة الخالصة الخاصة اللازلة. وعند نهاية عملية الانتصاب يعود التصل الى ما كان عليه وتعود الوانس الى الانتصاب وتفرز المواد الدافئة بانتظار فريسة جديدة.



نيدمان

٢٩٤٩٩ - نِيدَمَانِيَّات

Drosaraceae (S).

Drosaracées (F). *Drosaraceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة الفصائل مرتفعات البيض. انواعها المعروفة عديدة تنقسم الى ستة اجناس اشهرها النيدمان والنفاس والديونه. جميعها اشباب مقرة ممدرة ترطب في المناطق وفي الارابة الطرية الرطبة. اوراقها قرصية الانتساب. ازهارها خالصة الاجزاء. ثمارها جراد بيضية الشكل. يزورها آسية السلام. معظم انواعها من النباتات المقترنة التي تحول اجسام الحشرات الى مواد منهضة تتصصا بلباسها.

٢٩٥٠٠ - نِير

Joug (F). *Yoke* (E).

خشبة مختلفة الاشكال والاحجام توضع في حق الثور او على راسه يستعمل بواسطة من جر الاثقال والحرث وما اشبه.

٢٩٥٠١ - قِير

Lucicole (F).

نمت تقريباً يلقن على الحشرات التي تسمى في الفلاد.

٢٩٥٠٢ - نِير التَوَاهِين

Castor (F). *Castor* (E).

نجم نير من برج القوسين. مركزة قبالة رأس التولم المأخوذ. يبعد عن الارض نحو ٢٨ سنة ضوئية.

٢٩٥٠٣ - نِير الحَمَامَة

نجم نير مزدوج من كوكبة الحمامة، يدهى الفاعنة، اطلها.

٢٩٥٠٤ - نِير الرَاس

نير الراس نجم نير من كوكبة المرأة المسلسلة.

٢٩٥٠٥ - نِير الزُرْق

نير الزرقة نجم نير من كوكبة النهر.

٢٩٥٠٦ - نِير السُرَة

نير السرة نجم نير من كوكبة المرأة المسلسلة.

٢٩٥٠٧ - نِير السِرَطَان

نير السرطان نجم نير من كوكبة السرطان.

٢٩٥٠٨ - نِير الفِكَة

نير الفكة نجم من كوكبة الاكليل الشمالي، ويوجد خلف السالك الرابع ويدعوته قصعة المساكين.

٢٩٥٠٩ - نِير القَدَم

نير القدم نجم نير من كوكبة المرأة المسلسلة.

٢٩٥١٠ - نِير قَنْطُورُوس

نير قنطورس نجم من كوكبة قنطورس يدهى حضار، اطله.

٢٩٥١١ - نِير نُعِيم

Alpha de la Croix du Sud (F). *Cruix* (E).

نير نعيم نجم نير من كوكبة صليب الجنوب المعروفة ايضاً بنعيم. يبعد عن الارض نحو ١٠٠ سنة ضوئية.

٢٩٥١٢ - نِيرَة

Nerea (S). *Nérée* (F). *Nerea* (E).

جس حيوانات بحرية من الرخويات ممدات الارجل غلفياتها اشباح وصلبة السليبات. انواعها المعروفة قليلة العدد اساطنها تمتد من المحيط الهندي الى البحر الاحمر || اجسامها غرياطة حلالية مستطيلة محدبة الظهور الثنائية الاضلاع، رباعية الزوائد الجناحية الشكل. رؤوسها صغيرة مكورة، ثنائية الوانس الدورية. غياضها انبوية الشكل تعلق الزوائد.

٢٩٥١٣ - نِيرَج

Sui generis

لكل زهرة او ثمرة او مادة ضوئية او جسم حيواني رافعة خاصة فارقة مميزة. فالنيرج هو تلك الزائفة الخاصة المميزة

٢٩٥١٤ - نِيرَمِرجِيَّة

Nierembergia (S).

Nierembergia (F).

جس نباتات شبيهة مدادة ممدرة من فصيلة الباذنجانيات. صفوة التبريد على اسم العلامة «نيرميرج». سطوها تطلو من ٢٠ الى ٩٠ سم. اوراقها مختلفة الاشكال والاحجام. ازهارها بيضاء اللون او ليلية. انايبها مستطيلة. بتلاتها فارقة. منها بعض مناطق امريكة الجنوبية || انواعها المعروفة، متوسطة المدد اشهرها التالية.

٢٩٥١٥ - نِيرَمِرجِيَّة كَدَنَة

Nierembergia frutescens (S).

Nierembergia frutescente (E).

منها الشيل. ساقها كدنة خلية اللحاء تطلو من ٣٠ الى ٩٠ سم. اوراقها صغيرة مستطيلة العرض. نصلها خلية

Avril (F) April (E).

٢٩٥٢٤ - نيسان

يعرف أيضاً بأبريل. الشهر الرابع من السنة الشمسية وهو من شهور الربيع التي تنتفخ فيها بنشاط طاقة النشو الطبيعية. مدته ثلاثون يوماً.

لقوعه الزراعي : الاعمال الزراعية الواجب تنفيذها في هذا الشهر أو الممكن إنجازها فيه منوعة ومندبة لخصها.

في الزراعات العامة الموسمية

— بلر القطن بعد تحضير التربة وتوزيع الاسمدة الكيماوية اللازمة لانه من النباتات المبكرة التي تستدق خواص التربة والتي تتطلب الكثير من المواد الغذائية.

— متابعة تحضير التربة ونثر الاسمدة الكيماوية المعدة لزراعة التبغ قبل انقضاء الفترة الأولى من هذا الشهر.

— متابعة الاعتناء بمشاكل التبغ وقلعها من الحشرات والأمراض الفطرية.

— توزيع آخر وجبة من الاسمدة الأزوتية النيرانية على ذروع القمح المتناغرة.

— الأسراع في زرع البصل المتأخر قبل حلول الفترة الثانية من الشهر.

— مباشرة زرع الشوندر السكري بعد تحضير التربة ومدها بالاسمدة اللازمة مع العلم ان الشوندر يرغب في الأتربة الغنية بالمواد العضوية.

في الأشجار المثمرة

— متابعة الصلصم في المناطق المتناغرة.

— السهر على حياة الأشجار المثمرة من صقع بعض الليالي الصافية الايام وقد يتم ذلك باستهلاك غيوم اصطناعية من الدخان الكثيف.

— متابعة جمع امحال مكافئة الحشرات والاصنام النباتية.

— مباشرة مكافحة ديدان الشر في الطماخ والاياصم والخوخ .. على اثر سقوط الفروع الزهرية.

— الاجتهاد بحرق التربة او ركاشها مع طمر الاشعاب التي كانت فيها شرط ان يكون العقد قد جاوز حجم حبة الخوص.

في المحاصيل

— حرق تربة البساتين واتلاخ جميع الاشعاب وطمرها.

— تشذيب الاشجار وقصاط الفروع الزائدة او الاجناسنة.

— متابعة توزيع الاسمدة الكيماوية اللازمة.

— حضان المطاطيم الجديدة عرياً عليها من لسة الشمس.

— عدم تأخير قضاط الاشجار التي بشرت بالانزوار.

— مباشرة مكافحة ذبابة البحر للمنطوط.

في الموز

— اتلاخ جميع الشتول الفتية الضعيفة او الزائدة عن الحاجة.

— توزيع النصب القريبة من الاكباس بقليل من الاسمدة السريعة التشيل.

في الزيتون والكرية

— متابعة حراثة الزيتون واجازها قبل ابتداء الثل.

— حرق الكرية حفاظاً على رطوبة تربتها ولقصها على الاغصان المتناغرة.

— تغيير اوراق الكرية بالكبريت الميكروني، على سبيل الحيلة، في اللواتع المعرضة للارصاد.

في الخضار

— بلر وذرع جميع الخضار الصيفية التي تملأ زرعها في الشهر الماضي نظراً لمخاطر التربة وفوضيتها.

البشرة لزنها الى الخضار الباهت. ازهارها ليلكية اللون قطرها نحو ٢.٥ م. || تنويرها يستمر من الصيف الى الخريف.

٢٩٥١٦ - نيرمبرجيه نهريّة

Nierembergia rivularis (S).

Nierembergia des ruissaux (F).

منبتها غفاف نهر البلاتا. ساقها مسطحة تطول نحو ٤٠ سم. اوراقها مسطحة الشكل. تصالها عادة أنخل، حيلة أخضار المايق، || تطول نحو ٣ سم. ازهارها عاجية اللون، فواصة البرق. قطرها نحو ٤ سم. طولها ٣ الى ٥ سم. || تنويرها يستمر طول شهر تموز.

٢٩٥١٧ - نيرمبرجيه نهريّة

Nierembergia gracilis (S).

Nierembergia grêle (F).

منبتها الاربعينين. ساقها هزيلة مسطحة تطول نحو ٥٠ سم. اوراقها ضيقة، شبه حطية الشكل. ساقها واوراقها كثيفة الحبل والزغب. ازهارها ليلكية اللون يملوها مواج بنفسجي. توزيعها الى البياض الارزق الموج || تنويرها يستمر من حزيران الى آب.

٢٩٥١٨ - نيرولي

Néróli (F). Neroli (E).

هو عطر القنداح او دهن القنداح المستقطر من زهر النارج المعروف بالقنداح.

٢٩٥١٩ - نيرولن الزيتون * Philoetribus olea (S).

Néiroun, Rongeur de l'olivier, Scolyte de l'olivier (F). Philoetribus olea (E). Ölbaumborkenkäfer (D).

حشرة من الكرشيات المدميات الاجنعة. طولها نحو ٢ م. توجهها الى السواد اللامع يعلوه تجلجج خفي ابيض. زيانها دليقة صفية الاطراف، || تركب الزيتون واليالك والمراش. انها تفتح المكان في العاء وقد تخلج الانثان عند انتساب السابل الزهرية. ينقب المكان عن برقات غاشية تحمل الفكيير تصطب. || يكائن بالقتطاع وحرق الاجزاء الصافية في غضون شهر نيسان.

٢٩٥٢٠ - نيرينة *

Nerinea (S).

Nérinée (F). Nerinea (E).

جنس حيوانات من الرضويات مدميات الارجل وفصيلة النيرينيات. انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من متحجرات الاحقاب التانوية || اصداها مرندية مستطيلة قريبة الشبه بالسريتات.

٢٩٥٢١ - نيرينيات *

Neriniidae (S).

Neriniidae (F). Neriniidae (E).

فصيلة من الرضويات مدميات الارجل. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من متحجرات الاحقاب التانوية || اعرف اجناسها النيرينة.

٢٩٥٢٢ - نيزوب

النيزب هو قصب ذكور الاغنام والظباء.

٢٩٥٢٣ - نيزوك

جسم صلب اللد شارب في الفضاء يعبر الاجواء الارضية وقد يستقر على الارض.



نيزون الزيتون



نيرينة

Désinsection (F). ٢٩٥٣٣ - نَيْبَة

Arête d'une montagne ٢٩٥٣٤ - نَيْبَة
Ridge, Crest (E).
أعلى نقطة أو موقع في قمة جبل . ج. نَيْبَة وَنَيْبَة وَنَيْبَة .

Petricola (S). ٢٩٥٣٥ - نَيْبَة
Pétricole (F). Petricola (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم
وفصيلة النيكيات . أنواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في
مظم بحار البلاد المعتدلة الحارة || أجسامها صغيرة القد .
مشاعها بارزة طليقة . أصدافها شبه مظلمة الشكل . تعيش
في انفاق تنقبها في الصخور المغمورة بالماء . لها غزير
المادة .

Petricolidae (S). ٢٩٥٣٦ - نَيْبِيَّات
Pétricolidae (F). Petricolidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم
تنتمي إلى مرتبة النيكيات . أجسامها وأنواعها الغالبة عديدة
أما الممارسة فقليلة جميعها مصفدة رباعية الأضلاع
كالخياشيم والمثاقب والأذنين . أعطانها معظم بحار العالم .
تمشي في انفاق تنقبها في الصخور المغمورة بالماء ||
أعرف أجسامها وأشهرها النيب والنباير .

Nika (S). Nika (F). ٢٩٥٣٧ - نَيْكَة
جلس دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الأرجل
وفصيلة النيكيات . أنواعها المعروفة عديدة منتشرة في
مظم بحار العالم || ملجئها الحيائي جاف . تسرح قرب
الجانب والشطوط جميعها جيدة الصنف مأكولة كاللحبار .

Nickel ٢٩٥٣٨ - نَيْكَل
معدن كيميائي أثري الفاتح اللامع ، شديد الصلابة ولثانة ،
وزنه (Ni) وزنه الذري ٥٨,٦٩ ، ثقله الذري ٩
ينصهر في ١٤٥٠ °س . || وهو قليل التأثير بالهواء
الجوي ، قابل للتلفظ والطرز والسحب . يدخل في تركيب
أكثر السبائك لانه يكسبها من صلابته وبنائه ويؤديها
من قابليته للسحب . وهو يستخدم أيضاً بكثرة في عملية
طلاء المادن .

Nicotine (F). ٢٩٥٣٩ - نَيْكُوتِين
ويسم من قائل تبين . مادة قلوية جسمية شديدة اللطخ
والفعالية تستخرج من التبغ . || وهي تستعمل تحت شكل
سلفات النيكوتين في القضاء على بعض الحشرات الزراعية

Nicotianées (F). ٢٩٥٤٠ - نَيْكُوتِيَّات
هي التنبليات ، راجعها .

Nikidae (S). ٢٩٥٤١ - نَيْكِيَّات
Nikidae (F). Nikidae (E).
فصيلة دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الأرجل ،
طويلا الذليل . أجسامها وأنواعها عديدة منتشرة في جميع
بحار العالم || أجسامها صغيرة قريبة الشبه باللحبار .
مناكمها قصيرة . الزوج الامامي من قوائمها مجهز بملاصق
صغيرة . الزوج الثاني مجهز بملاصق ذرية || أوتابها حيلة
الألوان القسطنطينية الزاهية || أشهر أجسامها النيكَة .

في الزهور
- بلر الأنواع المشخرة ونقل الثقل الصالحة إلى مستقراتها
- الحافظة على التناقصات والورود من عتب الحشرات
المتطفلة والاصوام الفطرية .
- الاعتناء بالتسميد والتقليم .

في الدجاج والنحل
- متابعة حفن وترعيم البيض والعناية بالصيوان .
- تحوير القفران أو الخلصا اللازمة لتكاثر الالوان
الجديدة .
- البند بنقل النسل إلى الاماكن الموصوفة بمجدة مرتعها
المفري .

٢٩٥٢٥ - نَيْب ، نَيْبَان
طريق النمل إلى زيبه .

٢٩٥٢٦ - نَيْبَم
Event (F). Blow-hole (E).
مخرج بخار الماء من تحت الحيتان وبعض الاسماك . ج. نايام .

Nyson (S). ٢٩٥٢٧ - نَيْسُون
Nyson (F). Nysson (E).
جلس حشرات قانصة مفترسة من خشايات الانجسة
الحويوات . وفصيلة النيسونيات . أنواعها المعروفة نحو ٩٠
منتشرة في جميع اقطار العالم القديم || أجسامها صغيرة
مخضرة . رؤوسها مستديرة . تكتسحها نشطة ، حادة .
مهيئتها كبيرة ، نافذة . قرونها الاستشعارية عجيطة ،
مستطيلة . اجنتها شبه شفافة . بطونها اهليلجية . أثوابها
إلى السرة المشافة السوداء عليها في بطونها تجليج طوي
يراح من التني إلى الأصفر الذهبي .

Nyssonidae (S). ٢٩٥٢٨ - نَيْسُونِيَّات
Nyssonidae (F). Nyssonidae (E).
فصيلة حشرات قانصة مفترسة من خشايات الانجسة
الحويوات . أجسامها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في
جميع اقطار العالم || جميعها جارية تقم عشاواتها في التربة .
أجسامها صغيرة ، مخضرة ، ملونة . اجنتها وقوائمها
نشطة . قرونها الاستشعارية عجيطة ، مستطيلة ، منقطة
الأطراف . تلص طرائدها فضغدها وتنقلها إلى عشاواتها ||
أشهر أجسامها النيسون والفوريت .

Epi (F). Tuff (E). ٢٩٥٢٩ - نَيْشَان
هو الدائرة من الشعر .

Porc-épic commun (F). ٢٩٥٣٠ - نَيْسْ
هو الشجيم الملبول ، اطلبه .

Chiloptomases, ٢٩٥٣١ - نَيْسْمِيَّات
Chiloatomés (F).
رئيسية من الحيوانات الطليعية الفسيكليات . فصائلها
وأجسامها عديدة ، بعضها من متحجرات الاحقاب الثالثة
والبعض الآخر معاصر . جميعها منزلة ضمن حبيرات
قرنية المادة أو كلسية تعلوها اسفاط نافذة كالكشاه تنقسم
وتنفصل حسب الحاجة .

Relation nutritive (F). ٢٩٥٣٢ - نَيْطَة عَيْدِيَّة
Nutritive relation (E).
هي النسبة الغذائية أي نسبة المواد الازوتية إلى غيرها من
المواد الغذائية القابلة الانقسام في كل حلف .



نَيْب



نَيْكَة

٢٩٥٤٢ - نِيلَس * ، نِيلَتَج ، حِلَّة

Indigofera (S). *Indigotier*, Anil (F). *Indigo plant* (E). *Indigopflanze*, Anilpflanze (D). *Indaco*, *Enduco* (I).
جنس نباتات عشبية وجينية من فصيلة البقوليات الفراشية. أنواعه زهاء ٢٠٠ منها الحلوي والفلو والوس. سوقها فرعا غلظية. أوراقها/ محتلفة مركبة وريّة الترتيب. أزهارها خيماية التجميع/الألوان. أزهارها صفراء اللد تكثر فيها الألوان الزردية والحمراء. جميعها من نباتات المناطق الحارة. معظمها بري وبعضها صناعي يستخرج من أوراقه وسوقه صباغ نيل اللون. أشهر أنواعه الزراعية والنزيرية ما يلي.

٢٩٥٤٣ - نِيل الصَّاهِين *Indigofera tinctoria* (S). *Indigotier des teinturiers* (F).

نوع من النيل الزراعي المشهور. جنته تملو من ١٢٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقه فرعا. أوراقها سباحية أو تساعية الورقيات الريشة. أزهارها صفوي التجميع محوري الانكاز. أزهاره وريّة اللون يملوسا مروج لسم. انتاجه الخضابي واقر المادة جيد الصنف.

٢٩٥٤٤ - نِيل أَيْثِي *Indigofera decora* (S). *Indigotier élegant* (F).

نوع من النيل التزييني. مجلته تملو نحو ١٠٠ سم. أوراقه لا خيماية التركيب منها الخيماية الورقيات والسباحية والتساعية. وريقاته اهليجية النصل الامرد المالس. طولها يراوح من ٧ إلى ٩ سم. وعرضها نحو ٣. أزهارها صفوي التجميع، محوري الانكاز. أزهاره وريّة اللون المايق. || تنوره يستمر من ايار الى آب.

٢٩٥٤٥ - نِيل بَحْرِي *Indigofera glauca* (S). *Indigotier glauque* (F).

نوع من النيل الزراعي. جنته متوسطة اللد تملو نحو ١٥٠ سم. ساقه فرعا. أوراقه مستطيلة، عديدة الورقيات البحرية اللون، الخيماية الريشة. أزهارها صفوي التجميع محوري الانكاز. أزهاره الى الحرة الفاتحة. || انتاجه الخضابي واقر المادة متوسط الصنف.

٢٩٥٤٦ - نِيل حَرِّي *Indigofera arabica*, l. anil (S). *Indigotier anil* (F).

نوع من النيل الزراعي. مجلته تملو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. ساقه فناء. أوراقه عديدة الورقيات البيضية النصل الصندرية اللد. أزهارها صفوي التجميع. أزهاره الى الحرة الزاهية. || انتاجه الخضابي متوسط اللاد والصنف.

٢٩٥٤٧ - نِيل فَيْحِي *Indigofera argentea* (S). *Indigotier argenté* (F).

نوع من النيل الصناعي والنزيري. مجلته صفيرة اللد تملو من ٩٠ الى ٩٠ سم. أوراقه ثلاثية أو خاسية الورقيات. وريقاته خلية النصل الفضي، بيضية الشكل، مغنوية الطرف. أزهارها صفوي التجميع. أزهاره وريّة اللون بتفسيرية المروج. انتاجه الخضابي قليل المادة فاقر الصنف. تنوره يستمر من تموز الى آب.

٢٩٥٤٨ - نِيل قِرْمَزِي *Indigofera atropurpurea* (S). *Indigotier cramoisi* (F).

نوع من النيل التزييني. مجلته تملو نحو ١٢٠ سم. أوراقه مركبة من ١١ وريقاته اهليجية الشكل، خلية النصل المتجمع حرة. أزهارها صفوي التجميع. أزهاره قمرزية اللون المايق. || تنوره يستمر من تموز الى آب.

٢٩٥٤٩ - نِيل هِنْدِي *Indigofera indica* (S).

Indigotier hirsuta (F).
نوع من النيل الزراعي. مجلته تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها فناء. أوراقها كبيرة عديدة الورقيات الانطاطية الترتيب التي يراوح عددها من ١١ الى ٣٣ نصلها ساني الشكل، خلي البشرة، اصعب المروج. أزهارها صفوي التجميع كبير اللد محوري الانكاز. أزهارها الى الحرة الزاهية البنفسجية المروج. || انتاجه الخضابي واقر المادة متوسط الصنف.

٢٩٥٥٠ - نِيلَة *Indigo*

خضاب ازرق يستخرج من ورق النيل وسوقه.

٢٩٥٥١ - نِيلَة عَيْنِيَة *Indigofera tinctoria* (S). *Indigotier des teinturiers* (F).

هي البطاط النيل، اطبله.

٢٩٥٥٢ - نِيلَتَج *Indigofera tinctoria* (S). *Indigotier des teinturiers* (F).

هو اليك، اطبله.

٢٩٥٥٣ - نِيلَك * *Dryobalanops aromatica* (S). *Dryobalanops aromatica* (F).

شجرة حرجية وصناعية وسيد الجنس والنوع من فصيلة الترتيليات. اعطائها تمتد من الهند الى الهند الصينية وجزر الزايج || هيكلها جميل القالب. ساقها سلس. أوراقها متعاقبة مستطيلة. نصلها جامدة، سنائية الشكل، شديدة الخضار الزاهي. أزهارها صفوي التجميع. ثمارها قنطرة ولينة بطولها تفوق خامس الفصم المستطيلة، المينة || وصندا يبلغ عمر الشجرة نحو ١٥ سنة تتلفق ساقها طولا ويرشح منها دهن كالنوري فاقر الصنف يدهى كافور بونديو أو بونديو.

٢٩٥٥٤ - نِيلَن *Nylon*

سد نسجي تركيب شائع الاستعمال.

٢٩٥٥٥ - نِيلَتَج *Indigofera tinctoria* (S). *Indigotier des teinturiers* (F).

هو النيل، اطبله.

٢٩٥٥٦ - نِيلَوْر ، نِيلَوْر ، بَشْنِين *Nymphaea* (S). *Nénufar*, *Nénuphar* (F). *Water-lily* (E). *Seeros* (D). *Ninfea* (I).

جنس نباتات عشبية جيمورية مائية من فصيلة النيلوريات. انواعه المعروفة ٢٥ اعطائها مياه البلاد الحارة والمستتلة. جلدسها مباددة. أوراقها وزاهاها مستطيلة الماعين طافية. ثمارها جراه كروية الشكل. بزورسا نشوية المادة. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

٢٩٥٥٧ - نِيلَوْر أَيْثِي * ، بَشْنِين أَيْثِي * ، عَرَالِس النِيل ، حَفِيَّة التَسَك *Nymphaea alba* (S). *Nénufar blanc*, *Lis des étangs*, *Blanc d'eau*, *Lune d'eau*, *Voilet* (F). *Flatter dock*, *White water-lily* (E). *Welsae Seeros* (D). *Ninfea blanca*, *Nénufar*, *Luna d'acqua*, *Regina dei laghi* (I).

أشهر أنواع النيلور واشيها. جلدسها غليظة متباددة اللد. أوراقه كبيرة اللد تعرض من ١٠ الى ٣٠ سم. نصلها اخضر البشرة عل مسطحه. أزهاره يضاء اللون، عادمة العرف، تقطرها يراوح من ١٠ الى ١٢ سم. ثماره وجليدها مأكولة. || تنوره يستمر من حزيران الى ايلول.

٢٩٥٥٨ - نِيلَوْر أَرْزَق * ، بَشْنِين أَرْزَق ، كَرْب الماء *Nymphaea coerulea* (S).

Nénufar bleu, *Lotus bleu* (F). *Blue water-lily* (E). *Blaue Seeros* (D). *Ninfea caelesta d'Egitto* (I).
نوع من النيلور البهري الشائع في مياه بحيرات وأبار



نيل



نيلك



نيلور ابيض



نيلور ازرق



نيلوفر أصفر



نيلوفر العروس



نيلوفر عطر

أفريقية الشرقية . أوراقها متوسطة القد تعرض من ١٠ إلى ٢٥ سم . نصلها أخضر الصفحة العليا أحر السفلى . أزهارها إلى الزرقاء يعلوها مزاج وردي . ثماره ويجذبه مأكولة . || تنوره يستمر من حزيران إلى أواخر آب .

٢٩٥٩٦ - نِيلُوفَرُ أَصْفَرٌ * *Nymphaea flava* (S). *Néoufar jaune* (F). نوع من النيلوفر الأزرق . هذه أهورا فلوريدا ويجرباتها . جذائره نخيلة مستدقة . أوراقها متوسطة القد تطلو من ١٠ إلى ١٥ سم . وتعرض من ٩ إلى ١٢ سم . نصلها عجز الحمار . أخضر الصفحة العليا ، أسفع السفلى . أزهارها القد لونها إلى الصفار الكبريتي . || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٥٩٧ - نِيلُوفَرُ الْعُرُوسِ * *Nymphaea lotus* (S). *Lotus*, *Nénufar blanc* d'Égypte, *Lotier d'Egypte* (F). *Egyptian lotus*, *White lotus*, *Sacred lotus* (E). *Aggyptische Lotusblume*, *Weisser Lotus* (D). *Lotus*, *L. sacro*, *L. agiziano* (I). نوع من النيلوفر البربري المألوف في مياه البلاد الحارة . هذه حوض النيل . أوراقها متوسطة القد تعرض نحو ٢٠ سم نصلها أخضر الصفحة العليا بحري السفلى . أزهارها كبيرة الحجم ، بيضاء اللون . ثماره ويجذبه وأحاط أوراقها مأكولة . تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٥٩٨ - نِيلُوفَرُ عَطَر * *Nymphaea odorata* (S). *Nénufar odorata* (F). نوع من النيلوفر الأزرق . هذه مستدقة كبيرة القد تطرها براوح من ١٢ إلى ٣٠ سم . نصلها أخضر الصفحة العليا ، أحر السفلى . أزهارها عطرية العرف ، كبيرة القد ، تطرها براوح من ١٢ إلى ١٥ سم . لونها إلى البياض المالح . تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٥٩٩ - نِيلُوفَرُ مَحْدُود * *Nymphaea tuberosa* (S). *Nénufar tubéreux* (F). نوع من النيلوفر الأزرق . هذه البلاد الأمريكية . ضروبه عديدة . جذائره متقاربة القد القدية الدرية الشكل . أوراقها كبيرة مستدقة تطرها براوح من ١٥ إلى ٣٠ سم . نصلها يبدو أحر ألثم ثم يتصرف شيئاً شيئاً إلى أن يستقر على الأخضر المالح . أزهارها كبيرة القد ، عادمة العرف ، متباينة الألوان ، منها الأبيض والوردي والاحمر والقرنبي . تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٥٩٣ - نِيلُوفَرُ هِنْدِيّ * *Nymphaea indica* (S). *Nénufar des Indes* (F). *Water-lily*, *Water nymph* (E). *Nymphenblume*, *Seroose* (D). *Ninfex indica* (I). نوع من النيلوفر البربري المألوف في معظم مياه أنهار الهند . أوراقها كبيرة القد ثلابة الشكل ، نصلها أخضر الصفحة العليا حتملي السفلى . أزهارها كبيرة الحجم ، خافتة العرف ، تبتية اللون . ثماره ويجذبه مأكولة . || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٥٩٤ - نِيلُوفَرَاتُ ، بِشَنِيَّاتُ *Nymphaeaceae* (S). *Nymphaeaceae* (F). *Nymphaeaceae* (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القامات . اجناسها خمسة ، أنواعها عديدة . جميع نباتاتها جمهورية

مائية . أوراقها مستطيلة الاضلاع ، كبيرة النصل النفاش . أزهارها كثيرة البتلات مستطيلة المالحات تطلو على سطح الماء || اما اجناسها خمسة فهي النيلوفر والنوفر والنلمبر والندامة والكبيبه .

٢٩٥٦٥ - نِيلُوفَرُ ، نِيلُوفَرُ *Indigotine* (F). *indigotin* (E). هي المادة الملونة في النيل وهي رباعية التركيب بيضاء اللون تتأكسد في الهواء وتزرق . الصناعة الحديثة تستخرجها من الفتغلين .

٢٩٥٦٦ - نِيمُوسْتِيلُ *Nematostylis* (S). *Nématostyle* (F). *Nematostylis* (E). جنس نباتات عشبية دوفسية سرولية من فصيلة السوسيات . منبتها بعض مناطق أمريكا الشمالية . شاربها منتصب ، معتدلة الارتفاع . أوراقها صغيرة ، ضيقة النصل . أزهارها مستطيلة الاضلاع تتركز في اباط الشرايف || تزود للزيت في الخدائق . تربط في الاقربة المتوسطة الاندماج المنسوبة التركيب العنصري الزاوية المواد الغذائية || انواعها المعروفة متوسطة العدد ، أشهرها التالية .

٢٩٥٦٧ - نِيمُوسْتِيلُ أَرْجَوَانِيَّة *Nematostylis purpurea* (S). *Nématostyle pourpre* (F). عشية تزيينية دوفسية جادحة . منبتها التماسكس ولوزيانا . شراخها يرتفع نحو ٢٥ سم . أوراقها صغيرة القد ، ضيقة النصل ، زرقية الخضار . أزهارها متدلية الحجم ، أرجوانية اللون . اسديتها ملتصحة القواعد . متاكها منتصبه الخيوط الجالسة || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٩٥٦٨ - نِيمُوسْتِيلُ سَمَاقِيَّة *Nematostylis coelestina* (S). *Nématostyle céleste* (F). عشية تزيينية دوفسية جادحة . شراخها يرتفع من ٥٠ إلى ٩٠ سم . أوراقها صغيرة ، ضيقة النصل ، زاهية الخضار . أزهارها كبيرة زرقاء اللون . اسديتها ملتصحة القواعد . متاكها حلزونية الخيوط || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٩٥٦٩ - نِيمُوسْتِيلُ سَمَاقِيَّة *Nematostylis brunnea* (S). *Nématostyle brun* (F). عشية تزيينية دوفسية سرولية . منبتها المكسيك . شراخها يرتفع نحو ٣٠ سم . أوراقها صغيرة الحجم ، ضيقة النصل . حيلة الخضار الزاهي . أزهارها سماء اللون بنفسجية الموج . بتلاتها الداخلية موهجة بالأصفر . متاكها جالسة الخيوط || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٩٥٧٠ - نِيمُوسُورُ *Nemospora* (S). جنس تطور مجهرية من فصيلة الرغيفيات . انواعها قليلة العدد والاذى تتميز بسرطانها القرية الملوثة الشج . كائناتها اسطوانية ، منقطة ، هليية الاطراف .

٢٩٥٧١ - نِيمُوزُوتَا مُسْتَقِيلَةٌ *Nemosome elongé* (F). حشرة تدعى اسطوانية اللحم ، اطلها .



ثِيُوت مَبْدُول

Néogène (F).

٢٩٥٧٣ - نِيُوجِين

نمت تعريفى يطلق على الحقبة الثانية من الاباج الثالثى المعروف أيضاً بالاباج الحديث . وهو يشمل العصر الميساني والعصر اليوساني || تتميز هذه الحقبة بتطور الثيوب وبارتقاء العظم ، بوجه عام ، الى الحالة الحاضرة . كما وانها تشهد ، في الزمن الاخير منها ، ظهور اول انسان على الارض او اول شبه بالانسان .

Neovostra (S).

٢٩٥٧٤ - نِيُوجِيه

جنس فطور مجهرية من فصيلة النشريات . يوفه يحمل في اطرافه خيوط مشجية شفافة . انتاش يوفه يتميز بدعيات غروبية الشكل تحمل العديد من البويضات المحلية الضمية التجميع || انواعه المؤذية قليلة الضرر لا تستوجب العناية

Néolithique (F). Néolithique (E).

٢٩٥٧٥ - نِيُولِيثِي

نِيُولِيثِي او العصر النِيُولِيثِي هو زمن الحجر المصقول .

٢٩٥٧٢ - ثِيُوت مَبْدُول * ، مَبْدُول الماء المَبْدُول ، مَبْدُول مَبْدُول ، مَبْدُول مَبْدُول

Molge vulgaris, Triturus vulgaris (S). Triton vulgaire, Triton punctué (F). Smoot Newt (E).

حيوان زحاف قاذب بيوض من فصيلة السمندليات ورتبة السرفوقيات . موطنه يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا || جسمه مستطيل الشكل بطول من ١٤ الى ١٦ سم . الذكر اصفر من الانثى . رأسه غروبي الشكل . عيناه صغيرتان . حركته كامل التسيين في الفكين . تاقمتاه الاماميتان رباعيتا الاصابع اما الخلفيتان فخاسيتها . جلده مائل القشار . ثوبه العلوي مدبج وزركش وصنيج بالاسمر والاصفر والاصفر والاسيد . مدبه الى الكلبة الطحلاء متوسطها جدة حراء تمتد من الزور الى الخزرق || يتميز بفنل الهمة . يألف النابيح والمناقع . قوته الحشرات والقشريات والرضويات || يجتر من القواضب الخفيفة النافعة .



٢٩٥٨٣ - هاذة قلبية الورق

Ampelopsis cordata (S). Vigne vierge à feuilles en cœur (F).

نوع من الهاذ التريبي. جنته مدادة عارضة تطول من ١٥ الى ١٠ م. اوراقها قلبية الشكل، قليلة التفصيص تطول وتعرض من ٥ الى ١٢ سم. تصلها ريق الصفعة، انصر اللون، عادم الخمل || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

٢٩٥٨٤ - هاذة كبيرة الورق *

Ampelopsis megalophylla (S). Vigne vierge à grandes feuilles (F).

نوع من الهاذ التريبي. جنته دغلية تملو من ٣ الى ٤ امتار. اوراقها ريشية التركيب. وريقاتها كبيرة اللد بيضيه الشكل تطول من ٦ الى ١٠ سم. تصلها مالن الصفعة اللبسا، خلي السفل، احمر المروق والاخصاب. ازهارها صيدانية التجميع. يزورها سود. ازهارها يستمر طول شهر تموز.

Ampelopsis arborea (S). هاذة شجيرة. *Vigne vierge arborescente* (F).

نوع من الهاذ التريبي. شجيرة متعصبة تملو نحو ٥ امتار. اوراقها ريشية التفصيص، تصلها مالن الصفعة العليا خلي السفل. ازهارها خماسية الاجزاء || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٩٥٨٦ - هاذة هانكة

Ampelopsis heterophylla (S). Vigne vierge à feuilles variables (F).

نوع من الهاذ التريبي. جنته عارضة تطول من ٥ الى ٦ امتار. ساقها وفروها جزوية السماء. اوراقها هانكة لاقياسية التفصيص الذي يراوح من ٣ الى ٥، تصلها مالن الصفعة العليا، خلي السفل. بلورها الى التزقة التزاخية. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٩٥٧٦ - هابط، وكايط

Descendant (F). *Descending* (E).

هو نقيض الصاعه.

Hétérophylle (F).

٢٩٥٧٧ - هاتيك

Heterophyllous (E).

لمت تعريفي يوصف به كلى ليات لانظامي الاوراق تركيباً وشكلاً وارتكازاً.

Grenouille femelle (F).

٢٩٥٧٨ - هاجكة

She-frog (E).

الصفعة الاثى. ج هاجات. تصيرها هوية وبيبة.

Méridien (F). *Meridian* (E).

٢٩٥٧٩ - هاجركة

الخط الرئيسي الذي يرتكز عليه قياس درجات الطول.

٢٩٥٨٠ - هاجنكة

الهاجنة هي النطفة تحمل صليرة.

Ampelopsis (S).

٢٩٥٨١ - هاذ

متر من الجفة المذراء. انواحه المهرقة ١٢ تصير بحرقها البسيطة الخالية من الاطياب المحببة ويمحانق تبيض ازهارها القدسية الشكل. واسدته هاذة. || اشهر انواحه التريزينة ما يتبع.

٢٩٥٨٢ - هاذة شرقية

Ampelopsis orientalis (S). *Vigne vierge du Proche-Orient* (F).

نوع من الهاذ التريبي. هذه الشرق الاوسط. جنته دغلية الشكل تملو من مترين الى ثلاثة امتار. اوراقها ريشية. وريقاتها تطول نحو ٧ سم. وتعرض نحو ٤. تصلها مالن البشرة على صفحجه. ازهارها رباعية الاجزاء. ازهارها يستمر طول شهر آب.



هاذة كبيرة الورق

٢٩٥٨٧ - هَادَّةٌ هَلَالِيَّةٌ الْوَرْق

Ampelopsis sconiifolia (S). *Vigne vierge à feuilles d'aconit* (F).

نوع من الهاذ الزيمبي . جنته حارشة تطول نحو ٥ الى ١٠ امتار. فروصها دقيقة ، جذوية السحاء في اول صيفها . اوراقها اسبعية الشكل لاقبسية التفريغ الذي يراوح من ٣ الى ٥ ولا متساوية التسمك الذي يطول من ٥ الى ٨ سم . نصالحا مائلة المصنعة ، عابقة المضمار ، مسنة الحافة . جذورها بترقالية اللون || ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٩٥٨٨ - هَادَّةٌ يَابَانِيَّةٌ

'Ampelopsis japonica (S). *Vigne vierge du Japon* (F)

نوع من الهاذ الزيمبي . جنته حارشة تطول نحو ٧ امتار . جلدها رافع السنع والاردم . اوراقها كبيرة القند ، لاقبسية التفريغ السكسي ، الذي يراوح من ٣ الى ٥ ، نصالحا حايق المضمار اللامع || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٩٥٨٩ - هَارِب

Déversoir (F). *Overflow* (E).

الثروة للمدة لتصريف الفائض من المياه .

٢٩٥٩٠ - هَارَبَا ، هَارَبِي

Achéria (F).

هو الخحاس ، سمكة صغيرة القند مأكولة ، اطبخ .

٢٩٥٩١ - هَارِجَة

Acrocephalus, Calamoherpe (S). *Rousserolle* (F). *Sedge warbler* (E).

طير من فصيلة الدخليات . انواعه المعروفة كثيرة اندس جميعها صغيرة القند تتميز بانحنائها المستطيلة الزرية . الاطراف . اذنانها رتاجية الريش غروبية الشكل . متاورها مستعرضة القاعدة ، مدهية للالاقط || تألف النائق والصفاف والمقاصب والرياض . قوتها الحشرات والهورام اصحابها الياسيب والتمر والبوص || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٩٥٩٢ - هَارِجَة الْبَطْلَاح

Acrocephalus palustris, Calamoherpe palustris (S). *Rousserolle verderolle, Verderolle* (F). *Marsh warbler* (E).

نوع من الموارزج ، صغيرة القند تطول نحو ١٤ سم . ظهورها الى السطح الزرنيضية المزاج . بطنها الى الصفرة . زورها الى البياض الاكدر . تألف الاماكن الرطبة والمناة وضيقات الماء . تدنن في الشغل وفي الشجيرات المتوفرة . صحتها تراوح من ٤ الى ٥ ويضات ترعها بمناوة الذكر من ١٤ الى ١٥ يوما .

٢٩٥٩٣ - هَارِجَة السُّعْد

طائر من الموارزج يدعى ام نوح ، اطبخا .

٢٩٥٩٤ - هَارِجَة الْقَصْب * ، عَشْفَج

Acrocephalus arundinaceus, Calamoherpe turdol (S). *Rousserolle turdoide, Grive de rivière* (F). *Great reed warbler* (E).

طائر من الموارزج . طولها يراوح من ١٩ الى ٢٠ سم . ظهرها الى الصبغة اصفرار المزاج . بطنها الى البياض الاشعث . زورها ابيض الغمر . جريشها الى الكهبة المنجية بالاسمر . تجوب البلاد في طلب المصيف والمشي . تألف المقاصب والالاجام . تدنن عنها حل القصب . تبيض من ٤ الى ٥ يضايات بعضها بمناوة الذكر نحو ١٥ يوما .

٢٩٥٩٥ - هَارِجَة الْمَاء *

Acrocephalus paludicola (S). *Phragmites aquatique* (F). *Aquatic warbler* (E).

طائر من الموارزج ، صغير القند طوله نحو ١٣ سم . ظهوره اغبر اللون مجذع بالاسمر . بطنه الى البياض الغليبي وملو تسليج اكعب || يألف ضفاف الانهر والبحيرات ويحوم البلاد في طلب المصيف والمشي .

٢٩٥٩٦ - هَامَصَة

Gail de l'éléphant (E).

هي عين الغيل .

٢٩٥٩٧ - هَامُوم ، هَضَام

Digestif (F). *Digestive* (E).

هو ما له قوة الهضم التي تحوّل الاطعمة وتجعلها قابلة للتشثيل كالصناعات الهضامة ...

٢٩٥٩٨ - هَاتَف

هاتف ورق الشجر : سقط .

٢٩٥٩٩ - هَائِل * ٥

Alactaga (S). *Alactaga* (F).

جنس حيوانات كبيرة قانسة من فصيلة البيربويات . ازواجها عديدة موطنها الشرق العربي ويصير وأيران والتركستان والبيت || شكله شكل الجرذ . طوله نحو ٢٠ سم . وذنبه ٢٧ . رأسه صغير القند . عيناه كبيرتان . اذناه مستطيلتان . طول جوارحه الخلفية يبلغ أربعة اصعاف الامامية || ثوبه الى الصفرة الزلية يطولها مزاج اصعب . بطنه الى البياض . ذنبه صناعي اللون اما الحصلة لبقا || يألف الاراضي الطينية . جبروه فسمرة ربيحة يجرها من حق ١٠ او ٧٠ سم . يضي فيها بيانه الشفوي ؛ فخلها فخل طويل مترج اما خرجها فثقل مستقيم مثل الانحدار || قوته المردم التياتية حل اختلاط أشكلا والوجها || لثاه تحمل ثمانية اطيله وقصع من ٤ الى ٦ ادراس حل ثلاث مرآت في السنة .

٢٩٦٠٠ - هَال ، هَيْل ، هَيْلَو ، هَالَتَة ، شَوْشَمَة ، شَوْشَمِير

Anomom (S). *شَوْشَمِير* (F). *شَوْشَمَة* (E).

جنس نباتات جلدودية طيبة طرية برية وزراعية من سبط الهاليات وفصيلة النرجسيات . انواعه عديدة جيمما من نباتات المناطق الحارة || جذاميرها لبرية التركيب . سوقها منتصبة عادمة القروع . اوراقها لمدية الالتشاب متناقلة . ازهارها سلبية الجميع او مذكولة . ثمارها جرد ثلاثية الاخية . بذورها تلمعي حب الحال يستخرج منها اذعان طرية طيارة كانت فيا نفس من اشهر الطوبير المستعملة في التحنيط || لبوب جذاميرها ولبورها وادعائها هاضمة ومنبهة القلب وبقرة الجنسية ، مضادة للقشج ، طاردة الرياح ، سكتة الفص ويندرة للعث .

٢٩٦٠١ - هَال جَاوَا ، قَالَتَة مُجَحَّمَة

Anomom maximum (S). *Cardamome allé de java* (F). *Java Cardamom* (D). *Cardamomo di Gleva* (I).

نوع من الهال التابل الشائع الاستعمال ؛ تكثر زراعتة في بلاد جاوا . ساقه رفيعة ، اوراقه كبيرة القند ، بلوره جيلة الصنف وافرّة الالمان الطرية الطيارة .



هازجة البطاح



هازجة القصب



هازجة الماء



هاتل

الفصيلة الباذنجانية، ساقه غليظة جلوية اللون، ازهاره كبيرة القند متراكبة الاولون فيها الياضف والأصفر والبرتقالي والاحمر والأزرق. يزهر ذبذبة القند مستديرة الشكل حشلية اللون تحفظ بقوى انباتها نحو عشر سنوات.

٢٩٩١١ - هالِيَات، قَالِيَات (E). Amomés
سبط من فصيلة الزنجبيلات، أشهر اجناسه الهال .

٢٩٩١٢ - هَالِيْزَة * ، هَالِيْزِيَّة ، تَعْل
Haleisia (S). Haldéia, Haldésier (F). Silver bell-tree, Snowdrop tree (E). Schneeglöckchenbaum (D). Aleisia (I).

جلس نباتات برية وتربيتين من فصيلة الاصطريكات. انواعها ستة جميعها اشجار وشجيرات متوسطة القند. سيقانها منتصبة متفاربة الفروع. اوراقها هائلة، معتقة، متعاقبة. تصلها يفيش الشكل سنن الحافة. ازهارها محورية الاكواز، قمية التجميع، عديدة الاسدية، مستطيلة الزناد. ثمارها جراح مجتمعة || احرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٩٩١٣ - هَالِيْزَة ثَلَاثِيَّة الْجَنَاح
Haleisia dipeters (S). Haldéia à 2 ailes (F).

نوع من الهاليزة التريبية. ثمرتها تملو نحو ١٥ سم. اوراقها بيضيه الشكل تملو نحو ١٥ سم. وتعرض نحو ١٠ سم. نصلها جامد اللون، اخضر الصلعة العليا، خلى السفلى، ازهارها يضاء اللون تملو من ٢ الى ٣ سم. وتعرض من ٢ الى ٥ سم. ثمارها جراح ثنائية الجناح وشبه الشكل تملو من ٤ الى ٥ سم. || ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران.

٢٩٩١٤ - هَالِيْزَة رُبَاعِيَّة الْجَنَاح
Haleisia tetraptera (S). Haldéia à 4 ailes (F).

نوع من الهاليزة التريبية، ثمرتها تملو من ٥ الى ٩ امتار. اوراقها احليبية الشكل ستانية الزايم الاخير. نصلها جامد اللون، الخضر اللقيق، اخضر الصلعة العليا خلى السفلى. ازهارها متدلية، ثلاثية التجميع، يضاء اللون، صفيحة القند. ثمارها جراح رباعية الجناح مخروطية الشكل تملو من ٤ الى ٥ سم. || ازهارها يستمر من آذار الى ايار.

٢٩٩١٥ - هَامَكَة
Efrasia commune (F).

هي البقعة، اطليها ج. هام وهامات. قال ذو الرمة :
قد احضت النازح المجهول مصفه
في ظل اخضر يدور حامة اليوم

٢٩٩١٦ - هَامَكَة ، مِهَشَكَة
Trayouse mécanique
عدة مجهزة باريح شفافات تستخرج الحليب من صبرع البقرة وتقله الى رماء الحفظ الحكم السد.

٢٩٩١٧ - هَامِن
Marcascent (F).
Marcascent, Wiehering (E).

نمت تعريفي يطلق عل كل نبات او جزء من النبات يكون في حالة الحمن .

٢٩٩١٨ - هَامِي
Apical
نمت تعريفي يوسف به كل عضو مركزة الذروة .

٢٩٩١٩ - هَامِيْكِيَا *
Hamelia (S). Hamélie (F).
جلس نباتات برية وتربيتين من فصيلة الفويات. انواعها المعروفة ١٥، اصطناعا للمناطق الاستوائية الامريكية. سيقانها فراءة. اوراقها متعاقبة، كاملة، ستانية النصل. ازهارها

٢٩٩٢٠ - هَال حَبَشِي * ، قَالِيَّة حَبَشِيَّة
Amomum angustifolium (S). Amome de Madagascar (F). Madagascar cardamoms (E). Madagascars Cardamomen (D). Cardamomo maggiore, C. massimo (I).
نوع من الهال لكر زاعي الشائع الاستعمال في جزيرة مدغشقر. اوراقه حشلية النصل اللقيق . ليوب جلا. يره تابل مشهور. بلودره وافر المولد الدهنية العطرية المتوسطة الصنف .

٢٩٩٢٣ - هَال حَبَشَا * ، حَبَشَا ، قَالِيَّة عَنُقُوْدِيَّة ، اُمُونِ
Amomum cardamomum (S). Amome cardamome (F). Cardamon (E). Cardamomen (D). Cardamons, Cardamomo, Amomo (I).

ويروف ايضا بالمال المدقودي . نوع من الهال الجيد الصنف . تكثر زراعه في الهند الصينية . ازهاره عتقودي التجميع. بلودره جيدة الصنف شائعة الاستعمال وافر المولد الدهنية العطرية .

٢٩٩٢٤ - هَال ذَكْر * ، قَالِيَّة ذَكْرِيَّة ، حَبَرِيَا
Amomum melegueta (S). Méleguette, Méliguette, Graines de paradis (F). Melegueta-pepper, Grain of paradise (E). Malaguettapeffer (D). Grana paradisi, Sami di paradiso (I).

نوع من الهال، تكثر زراعه في بعض مناطق افريقية الشرقية والوسطى . اوراقه مستطيلة النصل اللقيق . بلودره متوسطة الصنف والمولد العطرية .

٢٩٩٢٥ - هَال صَغِير ، قَالِيَّة صَغِيرَة ، حَبَهَان
Electaria cardamomum (S). Cardamomo petit (F). Bastard cardamon, Lesser cardamon (E). Kleine Kardamomen (D). Cardamomo minore (I).

نوع من الهال الجيد الصنف ، تكثر زراعه في سريلنك وبيلار. ساقه واوراقه صغيرة القند. ازهاره سنبل التجميع . بلودره وافر المولد الدهنية العطرية الفاعرة الصنف .

٢٩٩٢٦ - هَالَة
Halo
دائرة مضبة تحيط بالقرص سبها انكسار النور الذي ينفق بلورات الجليد المتلفة في اليوم التالية للبيدة . اما الدائرة التي تحيط بالقرص فتدعى طفاوة .

٢٩٩٢٧ - هَالُوْجَة ، قُرَيْسَة
Halogeton (S).
Halogèta, Halogeton (F). Saltwort (E). Salzkraut (D). Alogeton (I).

جلس نباتات برية وزراعية من السمرايات ونضلة السمرايات. انواعها ستة منها الاشباح والجنبايات. سيقانها وفريها زباه الصماء. اوراقها خيشة متعاقبة. ازهارها فردية التجميع ، محورية الاكواز جميلة الشكل || اشهر انواعها الخارجية الزراعية المأكولة .

٢٩٩٢٨ - هَالُوْكَة وَيْشِي
Philipée d'Egypte (F).
هو الطرثوث المصري ، الحلبه .

٢٩٩٢٩ - هَالُوْكَة قَرْشِي
Clandestine du Levant
هو الطرثوث الاحمر ، الحلبه .

٢٩٩٣٠ - هَالُوْكَة لُصْبِي
Orobancha caryophyllacea (S). Orobancha du guil-let (F). Clove scentom broom-rape (E). Nelken-sommerwurz (D). Erba scalogna, Succiamete garofanato (I).

نوع من الجفيل يتطفل على الفالين ويمل معظم نباتات



هال حَبَشِي



هال حَامَا



هال ذَكْر



هَالِيَّة



هَامِيَا

- هبار الهم
S. obscurus (S).
S. obscur (F).
هبار بودن *
S. Budeng (S). S. maure, Budeng (F).
هبار جرماني
S. German (S). S. de Germain (F).
هبار جونني
S. Johni (S). S. das Nilagiris (F).
هبار ديني
S. ursinus (S). S. ourson (F).
هبار شابلي
S. sanex (S). S. blanchêtre (F).
هبار متعرج
S. mitratus (S). S. mitre (F).
هبار ملايلوف
S. melalophus (S). S. métalophe (F).



هبار انتلوس

- ٢٩٦٢٥ - هباركة *
Scolocotrichum (S).
جنس بطور مجهرية من عمارة الزناخيات رضية الطيريات.
جربه الكتيبة اسطوانية قصيرة تعلوها كتلة صرغانية
ضخيمة التراكيب ثنائية الخلية || اذناه قليلة السدد
والاذني اعرفها هبارة التيجليات .

- ٢٩٦٢٦ - هباركة التيجليات *
Scolocotrichum graminis (S).
فطر مجهرية يركب بعض التيجليات البرية والكلالية
فيشوا الاوراق دون ان يذخها || ظهوره الخارجي يقع
صغيرة تركب نصل النصف ثم تلتصق وتنتهي بيلغ طويلا
نحو ٣٠ سم. تبدو شقراء اللون او حمراء ثم تبيض فيما تبيض
ستارها .



هبار بودن

- ٢٩٦٢٧ - هباريات و رعييات
Semnophthecidae (S). Semnophthecidae (F).
Semnophthecidae (E).
فصيلة قريد من سلفيات المنخرين تشمل اربعة اجناس :
الهبار والحوبر والزيك والقنطرب .

- ٢٩٦٢٨ - هباش *
Homola (S).
Homola (F). Homola (E).
جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل
قصيرات الذيل وفصيلة الهباشات . انواعها المعروفة عديدة
منتشرة في جميع بحار العالم || اجسامها شبه مجنبة الشكل ،
تطول من ٤ الى ٨ سم. قوائمها مستطيلة ، قليلة التلاطع
باستثناء الزوج الاول للمفلي الاطراف ، الكبير التسنين
اشائك والزوج الاخير الذي يتمركز في كفتي الظهر
والذي يتميز بالصغر واللقطة والشرابة الاطراف . القوائم دائما
حراء اللون يعلوها مراح يراوح من الصغالي الى الجوي ||
لحموها مأكولة .



هباش

- ٢٩٦٢٩ - هباشيات
Homolidae (S).
Homolidae (F). Homolidae (E).
فصيلة حيرانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل
قصيرات الذيل ، حاملات القوائم . اجسامها وانواعها
عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || جميعها مستطيلة القند
الذي يراوح من ٤ الى ٨ سم. تتميز بصر ولصر الزوج
الاخير من القوائم الذي يتمركز في كفتي الظهر || اشهر
اجناسها واعما انتشارا الهباش .

- ٢٩٦٣٠ - هبال * و شتيقي و صرموزة *
Hapale (S). Oulestis, Marmoset (F). Marmoset, Oulestis (E).
جنس قريد امريكية من فصيلة القريد البدية . انواعها ٧
موطنها حوض الامازون والياباد الهابرة || اجسامها
صغيرة القند ، مجنبة الشكل ، مسطيلة الشعر الناعم



هبال

كبيرة القند ، مجنبة الشكل ، سفلية التجميع ، تاجية
الارتكاز . ثمارها نووية غير مأكولة || اشهر انواعها
المغالبيا الزيادة الورق ويسمونها قاتلة الجردان ايزواريا
حراء اللون ، ثمارها جميلة المادة تقضي على الجردان .

- ٢٩٦٣٠ - هبار و رصين و قريد مقدس
Semnophthecus (S). Semnophthèque (F). Solemn
apes, Simpal (E).
جنس قريد من فصيلة الهباريات تدعى القريد المقدسة
لان الهنود لا يسمونها وقد يخلطوا || انواعها كثيرة العدد .
اجسامها رضية ، نحلة ، متوسطة القند . اذناها مستطيلة .
انوارها ناعمة الشعر . جباهها مكلفة بخمار من الهلب الاسود .
موطنها الهند وبنجارا . اقلها يمتد من الشط الى ارتفاع
٤٠٠٠ م. || تعيش على الاشجار . قريبا المواد النباتية
من الثمار والبرود والجلود الى البرام والنواصي || اناها
تضع من جرور الى جرورين || اشهر انواعها ما يتبع .

- ٢٩٦٣١ - هبار انتلوس * و قريد الهند المقدس
Semnophthecus antelius (S). Semnophthèque antelie,
Entelle, Singe saint des Hindoux, Houleman,
Houleman, Mandi, Mabus (F). Hanuman, Hoonu-
man, Entelius (E).
نوع من الهبار ، جسمه بطول نحو ٦٠ سم. وذنبه ٩٦ سم.
لونه ابيض اللون ، مسطيل الشعر . وجهه اسود البشرة .
خمار جهته اسود الهلب المنتصب || موطنه شمال الهند
حتى حدود الهند والبنجاب . يعيش جماعات متوسطة العدد .
يفضل القناصات والاحراج الظليلة على مجاري الماء .
يقرب من الدساكر والبيوت الالهة || قوته الثمار والحبوب
ياخذها اينما كانت .

- ٢٩٦٣٢ - هبار حصكيا
Semnophthecus schistaceus (S). Semnophthèque de
l'Himalaya, S. ardois (F).
نوع من الهبار . جسمه بطول نحو ٩٥ سم. لونه الى الرتبة .
شعره كثيف وطويل . ظهره عايق اللون يعلو مراح جوي .
وجهه اسود البشرة . خمار جهته اسود الهلب المنتصب .
اذناه صغيرتان . ذنبه بطول نحو ١٠٠ سم. وينتهي بتصلة
مجللة . موطنه حلايا وبلاد الكشمير . اقلها يمتد من
ارتفاع ٢٠٠٠ الى ٣٩٠٠ م.

- ٢٩٦٣٣ - هبار دوك ، هبار لينيس ، دوك
Semnophthecus nemeaus (S). Semnophthèque douc,
Douc (F).
نوع من الهبار ، جسمه بطول نحو ٥٠ سم ، لونه متباين
اللون . رأسه واظراف يديه ورجليه سود . وجهه اصفر .
عنه وساعده وفخذه الى الجوف . ذقنه وصدره وذنبه يبيض .
منه اخضر . ظهره الى الرتبة || موطنه غابات الكوشلين
جماعات كبيرة العدد ، مؤذية ، تلتف كل زراعة
تصل اليها .

- ٢٩٦٣٤ - هبار قيرى
Semnophthecus phayrei (S). Semnophthèque de
Phayre (F).
نوع من الهبار ، جسمه بطول نحو ٨٠ سم . لونه رمادي
اللون . عايق الظهر . رأسه حربي الشعر الاصفر . يعلو
ويطامن يديه ورجليه الى البياض الاخير . كفاه الى
الفضة . ذنبه ابيض اللون ، اسمر الطرف . بطول نحو ٧٦
سم || يألف الثنايات الكثيفة الاحجار واجام الخيزران .
قوته الثمار والحبوب والبرود والجلود .
من انواع الهبار المعروفة تخص بالذكر :

يلوه يتجيج ثني وزركشة كستنية ورقشة حلولة. روشنها الخلفيان الى الخلفي الاطول. حناها اكلت. اعداها الى الشقة ا لما جيل واحد في الحول. تظهر الفرافة في ايار وثني حتى تموز. تسرح في الجبل. تحامل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتجمع المكن لطحا لانتالة الحبر على الصفحات السفلى من نصال الارواق الى السرة عند بلوغها الكمال تغزل نحو ٢٧ م. جسمها شبه اسطواني الشكل مستطيل المقدم، مستدق المؤخر. ثوبها الى الطحلة السوداء يعلوها تجلجج مفرس اخضر اللون عند حل الجانين من السكة البطنية الثالثة الى التاسعة. رأسها شديد السمرة وبدنها ورجلها الى طور الاكمال الذي يستمر من ٣٠ الى ٣٢ ارجوا ينقضي ضمن غلاف رقيق شفاف في الجنالة او تحت الارواق الساقطة.

Hoplopteronus (S). **هبريس** ٢٩٦٤١

Hoplopteron (F). Hoplopteronus (E).
جلس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفضيلة الالوسيات. انواعها المعروفة قليلة المدد اعطائها بحار الصين الى اصداها صغيرة لناعمة، مريضة الشكل، غلزنة، مجنعة الغالب، زاهية الالوان الفاتحة.

Matthiola graeca (S). **محبس** ٢٩٦٤٢
Matthiola maritima (F).

نوع من المنشور البري، نبات عشبي بري ممر من فصيلة الصليبيات. منته تهام حوض البحر الابيض المتوسط، من اليونان الى لبنان الى سواحه متصبية فراه تملو من ٣٠ الى ٧٥ سم. اوراقه متناقية، سنائية النصال الضيقة الزيادة. ازهاره عشوية التجميع، طرفي الازهار. ازهاره ذكية اللون عديدة الالوان منها الاحمر والبنفسجي والوردي والابيض والاصفر الى تنويرة يستمر من آذار الى تموز

Hypsipetes (S). **هيسبيت** ٢٩٦٤٣
Hypsipète (F). Hypsipetes (E).

جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الكتيبات. انواعها المعروفة نحو ٢٠ موطنها يمتد من الهند الى الصين وبعضها يعيش في الحيشة وندفسكر. ملجئها الحيائي جماعي. جماعاتها قليلة العدد. تألف الغابات وفضلات مجاري الماء. قوتها الحشرات المختلفة والحوام الى اجسامها صغيرة قلبية الشكل بالجليل، اطوالها تتراوح من ١٧ الى ٢١ سم. ورونها معتدلة الحجم. مناقيرها مخزنية ذرية. اجنحتها ذلقة. اذناها مستطيلة، فارقة الاطراف. اذواها تختلف مع الانواع يكثر فيها الاسود الاسم اللامع والكستني الاشعث والرمادي الازرق المواج... الى تدن اعاشها في الاجمار الرضية القريبة من مجاري الماء. اناثها تحسن من ٤ الى ٦ بيضات على مرتين في الحول. الذكر متناب مع الاناث في الحفن.

Ane noir (F). Black ass (E). **هيج** ٢٩٦٤٤
هو الجمار الاسود.

Strelitzia (S). Strelitzia (F). **هيجل** ٢٩٦٤٥

جلس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الموزيات. انواعها المعروفة ٦ جميعها من نباتات البلاد الحارة. سوقها ليفية متراكبة الانابيب. اوراقها معتقة، كبيرة اللد، ثنائية التصنيف، متعابلة النصال. جرشها خشوية. ازهارها خشوية. زرد للزئين الى اشهر انواعه ما يلي.

الثير. ورونها مستديرة. اذناها مرودية الور. اذناها مستطيلة جتلة. جميعها شاجرة تألف الغابات والاحراج البعيدة والقريبة من الممران. قوتها الثمار والحشرات. اكلها هنية، رضية. تألف حياة الدجج وتعلق باصحابها.

٢٩٦٣١ - **هيجال**
شجر تملل من السهام. الواحدة هبال.

٢٩٦٣٢ - **هيجاية** (E). Dry peels (F). Ecorces sèches (F).
حياة الشجر: قشرها الناضف.

٢٩٦٣٣ - **هيجية** (E). Legacy, Bequest (F). Legs (F).
هوكل مغروب في وصية مكتوبة.

٢٩٦٣٤ - **هيجج** (F). Broussin (F).
ردم يمتري لحاء سوق واغصان واغاد الشجر، سببه الصمغ او بعض الجراثيم.

٢٩٦٣٥ - **هيجد**، **هيجيد** (F). Graines de colocynth (F). Seeds of the colocynth (E).
هو حب الحنظل الواحدة هيجد.

٢٩٦٣٦ - **هيجبر** (F). Filasse (F).
هو للشاقة، اطباها.

٢٩٦٣٧ - **هيجبر** (F). Diacope rivulata (S).
سمكة من الشطف وفصيلة القرشيات. جسمها كبير القد مسط الشكل. طيلها يراوح من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. وعرضها من ٤٠ الى ٤٨ سم. ثوبها الى الزرقة البنفسجية المواج. لحمها مستحب العلم مغروب فيه. اطباها فسيحة الاجزاء تمتد من البحر الاخر الى بحار استراليه.

٢٩٦٣٨ - **هيجبرلية** (S). Haberie (S).
Habérie (F). Haberies (E).

عشبة صغيرة معمرة من فصيلة الجسبريات. منتهيا يمتد من الشرق الاذلى الى اللقان. ترطب في المواعع الصخرية. ساقها جذمة. غمرهاها الزهري يملو من ١٠ الى ١٥ سم. اوراقها اعليجية مقنطرة. نصالها جلدية مسننة الختار. ازهارها ليلكية تغزل نحو ٥ سم. قشرها ٤ سم. بتلاتها خلية الى تنويرها يستمر طول شهر حزيران.

٢٩٦٣٩ - **هيجبروية** (F). Habroste (S). Habrosta (S).
جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة النونيات. انواعها المعروفة قليلة المدد منتهيا بعض اصفاق حوض البحر الابيض المتوسط الى سوقها نخلة فراه. اوراقها صغيرة، متعابلة، شبه مخروطية الشكل. ازهارها صغيرة وردية اللون. تنويرها رديهي.

٢٩٦٤٠ - **هيجبروئين** **أسيبد** (S). Habrosyne derasa (S). Habrosyne rasé (F).
حشرة من فصيلة الشروبيقات ورتبة شروبيقات الاجنسة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اربوة. فراشها جارية قوتها رقيق الازهار. سرتها تميش على اوراق المويج الى جميعها وشي الشكل يطل نحو ١٢ سم. مسطها نحو ٣٨ سم. رأسها اسمر اللون. عينها كبرتان. زياتها عيطان. رشها مسطيل ملتف. جرشها وعلها الى الحنطي الاسمر الى روشنها الامانيان الى الحنطي الاسمر



هبال



هيموزين اسبد



هيب



هبل



هبلر



هبلر



هبلر

وانواعها المرفقة عديدة منتشرة في معظم بحيرات ومناطق وأهوار البلاد المتعددة الحرارة || اجسامها صغيرة ، شبه بيضية الشكل ، مدببة الخنصر ، طولها من ٢ الى ٥ سم . رؤوسها صغيرة ، مستعرضة . حيويتها ناشرة . قربها الاستثنائية غطية مركبة من حشر فصل . كواشها عذبة ، مستعرضة . احادها لافحة ، نجيلة التفتيد . قواشها نشطة || جميعها مفرقة وعشائية . تعيش بين النباتات المائية قرب الشواطئ وعلى الصفات في فصل الصيف || اشهر اجناسها الهبلر .

٢٩٦٥٣ - هَيْلِيَّاتِيَّة (S). *Habenaria* (F). *Habenaria* جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السحليات . ازهارها نحو ٤٠٠ معظما أمريكية المنبت . اقاليمها المناطق الحارة والمعتدلة . بعضها زراعي زينة . اشهرها الهبلرية الثنائية النصل .

٢٩٦٥٤ - هَيْلِيَّاتِيَّة ثنائية النصل ، وَكُونْدِي (S). *Habenaria bifolia* (S). *Habenaria bifolia*, *Orchis blanc* (F). *Butterfly orchis*, *Fringed orchis* (E). *Kleine Ständelwurz* (D). *Orchids bianca* (I). نبات عشبي زينة معمر . جلوهه ديدية شذائية الشكل . اوراقه قرصية مطعنة ثنائية النصل . ازهارها جميلة الشكل ، يبيض اللون ، سلبية التجميع ، ترتكز على سراج قوسي الانتساب .

٢٩٦٥٥ - هَيْلِيَّاتِيَّة (S). *Hypn* (F). *Feather moss* (E). *Astmos* (D). *Ipne* (I). جنس نباتات طحلبية من المرشيات . انواعها المرفقة نحو ٢٠٠ ، سويها نجيلة مدادة متفرقة . اوراقها دقيقة متراصة متعاقبة تلحف السوق بكاملها || وهي تعيش وتتنو في القباب وعلى الصخور وطولج الانحجار . تستعمل للزينة وتصلص خاصة في صر الآلية الخزفية والبلورية لاقابها من الكر .

٢٩٦٥٦ - هَيْلِيَّاتِيَّة (S). *Hipponyx* (F). *Hipponyx* (E). جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدنيات الاويل امايات الخياشيم وحيدات الاجهزة وفضيلة الهليسيات . انواعها المرفقة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق المحيط الهادي . بعضها يعيش على الاصايف المهيجرة والبعض الآخر على الصخور || اصداها غروطية وحيدة المصادر قرية تشبه بالقرن القصير المدب الطرف . اجسامها بيضية الشكل . رؤوسها مكورة . نواصها غروطية . حيويتها كبرية ترتكز على قواص الاقواس . خياشيمها نظامية . ارجلها وحيدة كبيرة محمية .

٢٩٦٥٧ - هَيْلِيَّاتِيَّة (S). *Hipponyxidae* (F). *Hipponyxidae* (E). فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مدنيات الاويل امايات الخياشيم وحيدات الاجهزة . اجناسها وانواعها الماصرة المرفقة قليلة العدد . اعطائها بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تعيش قرب الشواطئ || اصداها قرية تشبه بالخافر وبالقرن القصير . سلطان الصدة يتطور مع العمر فيصبح كالنفسه || اعرف اجناسها واشهرها الهيليس والمرفلة .

٢٩٦٦٦ - هَيْلِيَّاتِيَّة (S). *Scleritzia reginae* (S). *Scleritzia de la reine* (F). نوع من الهبل الزينة ، يطو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه مستطيلة الاثنان . نصلها جامد الصلصة المتصبة الاطراف ، لونه الى الخضار البحري . ازهارها كبيرة القد ، ذببة النصل ، سلبية النباتات .

٢٩٦٦٧ - هَيْلِيَّاتِيَّة (S). *Scleritzia parvifolia* (S). *Scleritzia à petites feuilles* (F). نوع من الهبل الزينة ، يطو نحو ١٢٠ سم . اوراقه اسلية الشكل ، عادمة النقص ، عابقة الخضار . ازهارها متصلة للذات . ارجوانية النصل ، بنفسجية البتلات .

٢٩٦٦٨ - هَيْلِيَّاتِيَّة (S). *Scleritzia augusta* (S). *Scleritzia augusta* (F). نوع من الهبل الزينة ، يطو من ٣ الى ٦ امتار اوراقه كبيرة القد معتقة . اعطائها تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ونصلها من ٦٠ الى ١٠٠ سم . وهي اهلجية الشكل ، قلبية القاعدة ، شديدة الخضار المايق . ازهارها كبيرة القد ، يبيض اللون .

٢٩٦٦٩ - هَيْلِيَّاتِيَّة (F). *Greyhound* (E). هو الكلاب السلوقي او السلاقي ، مستطيل الجسم الفتيق الاطراف . يتميز بخلقه وبسرعة عدوه . يستعمل في صبه التزال .

٢٩٦٧٠ - هَيْلِيَّاتِيَّة (S). *Hapaloderma* (S). *Hapaloderma* (F). طائر وحيد الجنس والنوع من المستطقات وفضيلة الطيرفنيات موطنه بعض مناطق افريقية الحارة . يأنف الغابات الرطبة . ملجته الهلالي زويج . قوته الحشرات على اختلاف انواعها وبعض آثار الغنية || جسمه متوسط القد ، يطو نحو ٣٢ سم . قوبه الى الخضار الذهبي المويج . زوره ودي اللون . بطه الى الشهية . يتميز بكثافة سياه وبكبر ذبه الذي يشبه المروسة . جناحاه معتدل الطول ، ذلقا الاطراف || يدئن حشه في صدور الانجار الحرة . الاثنى تحضن نحو اربع بيضات على ثلاث مرات في الحوط . الذكور يؤن لها الغذاء .

٢٩٦٧١ - هَيْلِيَّاتِيَّة (S). *Haliplus* (F). *Haliplus* (E). جنس حشرات مائية مفرقة من فصيلة الهليديات وذرية غمديات الاجنحة . انواعها المرفقة نحو ٥٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة والباردة || اجسامها صغيرة ، شبه اهلجية الشكل ، مدببة الخنصر ، تطول من ٣ الى ٥ سم . رؤوسها صغيرة ، مستعرضة . حيويتها ناشرة . قربها الاستثنائية غطية . تأخيرها وفكوكها لافحة ، شبه مجنية الشكل ، نجيلة التفتيد . قواشها نشطة . اثوابها مبقجة || تألف الناتج والبيحيرات التي تكثر فيها الاصاب المائية . قربها كل ما تستطع قصه من دويبات .

٢٩٦٧٢ - هَيْلِيَّاتِيَّة (S). *Haliplidae* (F). *Haliplidae* (E). فصيلة حشرات مائية من غمديات الاجنحة . اجناسها

الى الحنطي تملوه زغبة صفراء اللون ذهبية المواج . تعيش في البيوت والمكاتب بين المصاحف والكتب القديمة .

٢٩٦٦٨ - هَيْبَةُ مُخَفِّكْسٍ *
Ptnus fur (S).
Ptine voleur (F). Spider beetle (E). Gemeiner Diebskifer, Krauterdieb (D).

حشرة من الهبويات . طولها نحو ٣ سم . ثوبها الى الحنطي . يملوها في اواسط غنيتها يجمع اصغر قائم || تعيش على انناد وافنان الاضمار اليابسة .

٢٩٦٦٩ - هَيْبَةُ مُلَطِّخٍ *
Ptnus rufipes (S).
Ptine maculé (F). Ptnus rufipes (E).

حشرة قاذفة ناعمة من فصيلة الهبويات ورتبة مفصلات الاجنحة . تألف الحراج والأذغال والحافائق . غناتها تعيش على ما تقضمه من لحاء افنان النبات السائل نحو الياس . ريقاتها تسردب الحاء والشكير || جسمها صغير اللد يطلو من ٣ الى ٥ سم . ثوبها الى الحنطي الاشعث الاسمر المواج يملوه في الظهوران بقنجان صغيران معترستان . رأسها صغير الجرم يفر مجملته تحت الكوسل . صينها صغيران بارزتان . زبالها خيطيان مستطيلان . ظهورها مستدير الطرف اللائح . غناها كثيفتا الحمل ، متباستا التحيز القابل . ارساها خاسية المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط ايار وتبقى حتى اواسط آب . تسرح في النهار . تساقد بعد ظهورها بشهر واحد . تمتع المكن على لحاء الانداد والافنان || ابرقة عند بلوغها الكمال الجسوري تطلو نحو ٧ سم . جسمها مقوس الشكل متتابع الحيد والتجعيد ، سداسي الجوارب ، يحتمي اللون ، اسود الرأس . مستدير المؤخر كثيف الملب والزغب || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي في آخر سرداب احتفرتة البرقة .

٢٩٦٧٠ - هَيْبُورِيَّات *
Ptnidae (S).
Ptnidae (F). Ptnidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غدييات الاجنحة . اجناسها والواها عديدة جميعها صغيرة اللد زهاب الجسم . اطواها تراوح من ٢ الى ٥ سم . قوتها الاستثمارية خيطية الشكل ، عشادية المقل . ارساها خاسية || ريقاتها تحيلة دقيقة تركيب الخضر واليابس وتعيش تحت الحاء وبين الاوراق وعلى المواد العضوية وفي المساكن .

٢٩٦٧١ - هَيْبُورِيَّات *
Aspergillaceae (S).
Aspergillaceae (F). Aspergillaceae (E).

عارة فطور مجهرية من فصيلة الرقيسات . جرابها الزني مستدير التركيب ، انغلاقي النظام . انغاقها كروية او اجاسية الشكل تحوي من التكتين الى اللان تكات منها فردية الحلية ومنها ثنائيتها || اجناسها وانواها عديدة بعضها حاد ضار وبعضها صناعي كهوية الارز (Aspergillus oryzae) وبعضها حي وطي يمد الى جنس البنيسيلوم .

٢٩٦٧٢ - هَيْبَةُ الْجَنْجُلِ *
Hepialis humuli (S). Hépiale du houblon (F).
Ghost moth, Oter moth (E). Hopfenspinner (D).

وتدعى ليلية الجنبيل . حشرة من الهيبانيات ، كبيرة اللد ، يسبقها تراوح من ٥٠ الى ٦٠ سم . رواشن ذكورها الى البياض القضي يحويها اطار من الهدب جوي اللون . رواشن اناتها الى الصفرة يملوها مواج اجر وزرشفة سمراء . تسرح

٢٩٦٥٨ - هَيْبَةُ ذَبَابَةٍ *
Aspergillus flavus, A. sulfurus (S).

فطر مجهرى من عارة الهبويات مركب حب اللد وبزور القلب عند انتاشها في الاراضي الرطبة فيطها وقد يسي الى نموها وانتاجها .

٢٩٦٥٩ - هَيْبَةُ سَوْدَاء *
Steirigmatocystis nigra (S). Smut (E).

فطر مجهرى من عارة الهبويات يسبب المدن الاسود الرخر في بعض البوار ومنها التبن والبرقال والقيون . يسمنه في الولايات المتحدة (كليفورني) مرض السموت (Smut).

٢٩٦٦٠ - هَيْبَةُ طَحْلَاء *
Aspergillus glaucus, A. ochraceus (S).

فطر من الهبويات يصيب ثمار البرقال والقراسكين والقيون .

٢٩٦٦١ - هَيْبُور *
الهبور هو اصغر اللد . وهو صافاة الزرع الذي يؤكل .

٢٩٦٦٢ - هَيْبُور *
Zodariidae (S).
Zodariidae (F). Zodariidae (E).

نوع من المتناكب القانصة الساعية وراعات الروايا والفتان ينتمي الى فصيلة الهبوريات || جسمه صغير اللد يطلو نحو ٧ سم . عند المتناكب ويحو ١٢ مم . عند المتناكة . سداسه صغير الجرم ، ضمي اللون . عيناه زهيتان . شيفاه صغيران ذريان . فكاه مستطيلان مستقنان . جرازه مستدة الاطراف ، كثيرة الملب . بطنها كبير الجرم اسود اللون تملوه اربع لطيخ بيض واربع نقط سود || مسره دجوي . يبيت في النهار تحت صنة قنفسورية الشكل ينسجها بين الحجارة || يسمى وراه قصه ركفا . قوته الحشرات الصغيرة والذباب والحوام || يعتبر من الدوريات النافعة اللاؤدية .

٢٩٦٦٣ - هَيْبُورِيَّات *
Zodariidae (S).
Zodariidae (F). Zodariidae (E).

فصيلة حناكب من رتبة الزيلولات . اجناسها وانواها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد الحارة والمتحدة الحارة من العالم القديم || جميعها مفترسة قانصة صغيرة اللد او متوسطة ، مستدة الجراز المستعدة الاطراف . ثوابها قائمة تراوح من السمة الى السواد الفضي . شمها متينة الحلبك تنسجها في كل مكان تألفه || أشهر انواعها الهبور .

٢٩٦٦٤ - هَيْبُور *
Dévaluation (F). Devaluation (E). هَيْبُور

الهبور اسقاط قيمة اللدق .

٢٩٦٦٥ - هَيْبُور *
Décrue (F). Fall of water (E). هَيْبُور

انخفاض مستوى المياه الجارية يقدر هذا الانخفاض .

٢٩٦٦٦ - هَيْبُون أَحَدَب *
Gibbum pyllodes (S).

حشرة من الهبويات . طولها نحو ٣ سم . جسمها محطوب الشكل . ثوبها امير اللون ، حلي المواج . قوتها يقرنها الاستثمارية مسطيلة . تعيش في البيوت والهازان . قوتها المواد العضوية الجافة من اي نوع كانت .

٢٩٦٦٧ - هَيْبُون المصاحيف *
Niptus hololeucus (S).

حشرة من الهبويات . طولها يراوح من ٣ الى ٤ سم . ثوبها



هبور



هبون احذب



هبون المصاحف



هبون مخلص



هبون ملطخ



هبيل الجنبيل

Hétérophyllie (F).

٢٩٦٨٠ - هَتَاكَه

حالة النبات المائل.



هَيْبَالُ الْحَذَائِقِ

Particule (F). Particle (E).

٢٩٦٨١ - هُتَامَة

الجزء الأصغر من الشيء ويسمى جزئياً. وهي في علم الفيزياء كل جزء من الأجزاء الثلاثة (الكثرون، بروتون، نوترون) التي يتتركب منها الذرات.



هَيْبَالُ الْغَابِ

Hetrodes (S).

٢٩٦٨٢ - هِتْرُودَة

Hétrode (F). Hetrodes (E).

جنس حشرات قفازة غاضلة من فصيلة الجراديات. أنواعها الممرقة عديدة أصلاتها معظم مناطق أفريقية الحارة والاسوائية. جميعها عامة الاجنحة عند الشقين || أجسامها مستوية القد تطول من ٣ الى ٥ سم. رؤوسها مخروطية الشكل. هيئتها مركبة ناشرة. قرونها الاستشرابية دقيقة مستطيلة. كواسلها مطوقة بتقوأتها فخرولية ويعملوا هلب شالك يلحف كامل القصبة العليا. بطونها شبه بيضية الشكل مقطوعة القاعدة يعملوا من ٥ الى ٧ خطوط متفرعة من الملب الفالك. أنثواها تراوح من الأخضر الى الاسمر والاصفر وبفسها منقط بالجلودي أو بالأحمر قوائها الخلفية مستطيلة، مجزأة تقطر || أجبالها الحولية ثلاثة. انتشارها محصور لأن النسل يقضي على مكها وديها.



هَيْبَالُ التَّجِيلِيَّاتِ

Heterius (S).

٢٩٦٨٣ - هِتْرُوس

جنس حشرات مفترسة من فصيلة الحشريات. أنواعها الممرقة قليلة العدد جميعها صغيرة القد بيضية الشكل طويلاً نحو ٣ م. ألوانها الى الصبغة البسما المزاج. تعيش تحت الحجارة وتحت لحاء الأشجار القاصية || ربقاتها قانصة. تلتهم النمل وسائر الحشرات الصغيرة.



هَيْبَة

Heteroceridae (S).

٢٩٦٨٤ - هِتْرُوسِيَّات

Hétéroceridae (F). Heteroceridae (E).

فصيلة حشرات من عُمْدِيَّات الاجنحة. أجناسها وأنواعها الممرقة عديدة منتشرة في جميع أصقاع العالم || أجسامها صغيرة تطول من ٤ الى ٧ سم. رؤوسها كبيرة. هيئتها بارزة. ملابها الفككية ضليمة. قرونها الاستشرابية لائيسية الشكل وبعد الفصل القلي يراوح من ٨ الى ١١. كواسلها مستعرضة، محببة. أعقادها لائحة. قوائها جاساة، شاذكة القنابيية. أصباها رباعية اللون. أنثواها ملونة || ملبنها الحيائي جامي. تعيش في أفلاق تتخلها حلة صفات مجاري الماء. قوائها المواد المصنوعة المتحللة ويعيش البديان || أشهر أجناسها الهِتْرُوسِير.



هِتْرُوس

Hétéroclée (F).

٢٩٦٨٥ - هِتْرُوسِيد

واحد من قسمي النملوكوزيد والثاني ينسب حلوسية.

Heterocerus (S).

٢٩٦٨٦ - هِتْرُوسِير

Hétérocer (F). Heterocerus (E).

جنس حشرات من فصيلة الهِتْرُوسِيَّات ورتبة عُمْدِيَّات الاجنحة. أنواعها الممرقة نحو ٣٥ منتشرة في جميع مناطق واصقاع العالم || أجسامها صغيرة، معتدلة الاحديداب، تطول من ٤ الى ٧ سم. رؤوسها كبيرة، مستعرضة القفن. هيئتها صغيرة، بارزة. ملابها الفككية ضليمة. قرونها الاستشرابية لائيسية الشكل وبعد الفصل القلي، كواسلها شبه مكورة. أعقادها لائحة. قوائها نشطة، شاذكة القنابيية. ألوانها ملونة ومزعزعة || جميعها جاساة تعيش في أفلاق



هِتْرُوسِير

من حزيران الى أواخر تموز || ربقها غبراء اللون منقطة بالاصفر. تركيب جلود الجنبيل وتعيش عليها وتركب المصنف فتؤذي.

٢٩٦٨٣ - هَيْبَالُ الْحَذَائِقِ *

Hepialus hecta (S).

حشرة من الهيباليات، صغيرة القد، لونها الى الصفرة المخضرة. رواشها الامامية مزركشة ومنقطة بالابيض والاصفر. زباناها عادمة التسنين. ظنوب ذكورها شبه الشكل يحمل حل صفحته الداخلية غدة عطرية للمادة. تسرح من ايار الى تموز || ربقها ناعمة تركيب جلود مختلف النباتات الحذائقية من اجنبات الى الانجار.

٢٩٦٨٤ - هَيْبَالُ الْغَابِ *

Hepialus sylvinus (S).

حشرة من الهيباليات، صغيرة القد، لونها الى الصفرة المخضرة بالكهية. زباناها ظاهرة التسنين. تسرح من آب الى ايلول. ربقها ناعمة تركيب جلود مختلف النباتات الحرجية.

٢٩٦٨٥ - هَيْبَالُ التَّجِيلِيَّاتِ *

Hepialus lupulinus (S). Hépiale des graminées (F).

حشرة من الهيباليات، صغيرة القد، لونها الى المخضرة الاصفر المزاج. رواشها الاماميان مزركشان بالابيض. قرونها الاستشرابية مستطيلة، بسطة التركيب، عادية التسنين. مسرحها يستمر من ايار الى حزيران || ربقاتها ناعمة تركيب اسناع التبغ وتلود التجيليات الزراعية والبرية فتقتسمها وتؤذيها.

Hepialidae (S).

٢٩٦٨٦ - هَيْبَالِيَّات *

Hépialidae (F). Swifts, Swit moths (E). Wurzelbohner (D).

فصيلة حشرات من حشرهايات الاجنحة. أنواعها الممرقة زبانه ٣٠٠ تجتمع الى عدة اجناس. أجسامها لائيسية القد، كثيفة الخرافش التي يتخللها بعض الهلب. رواشها كبيرة. تكشيرا وقرونها الاستشرابية قصيرة. مسرحها دجوي. ذكورها واناثها مختلفة الاطوار || ربقاتها ناعمة تملد الجلود وتعيش في داخلها. اجبالها ثنائية الحول. أصلها العالم اعصها المناطق الحارة.

٢٩٦٨٧ - هَيْبِيد

حب المختل يستخرج من حشبه.

Micropogon (S).

٢٩٦٨٨ - هَيْبَصَة *

Micropogon (F).

سمكة بحرية وحيدة الجنس والذرع من فصيلة البهاريات. مسرحها البحر الابيض المتوسط. لا تقترب من المالح والسطوط الا في زين الترسة || جسمها اميليجي الشكل، كبير القد، ربيع القند. رأسها شبه مخروطي، منفرج الشفق. صينها صغيرتان جاسختان. زعانفها الظهرية اثنتان، الاولى شبه هرمية الشكل والثانية مشطية. الذيلية مقطوعة الطرف. حراشها مبراشية. لونها الى الاربدة القصبية يمتد في الظهر ويملو تجلبيج معترض اسمر || لحمها جيد المصنف مرغوب فيه.

٢٩٦٨٩ - هَبَّ و زَرْقِي

Feuillée, Ebroutage (F).

Bower (E).

قلط وزرق الشجر وهو ايضاً المشق أي فصل الورق عن السالج ولذا يكون في ورق الثوت قبل تقدمه الى دود النثر.

Hétéroplode (F).
Heteroploid (E).

نمت تعريفي يطلق على الاجهزة المضوية الانقياسية المنطش.

Anchérozoides (F).
Ancherzoides (E).

هي عنصر الانخصاب الذكري عند معظم النباتات . وهي التي بالتحامها مع العنصر الانثوي تكون البويضة المخصبة والاستمرار .

Rainette (F).

٢٩٦٩٤ - هَجَاة

هي الشفدع ، اطليه .

Cercopithecus (S).

٢٩٦٩٥ - هَجَرَس

Cercopithecus (F). Tailed apes, Lasiopyga (E).

جلس فرود ذيلية من فصيلة الهجريات . انزاعه المروعة ٤٤ ، موطنها اسراج وغابات القارة الافريقية . جميعها صغيرة القد ، رشيقة القوام ، مستطيلة الاذناب ، قصيرة الاربعة ، وسيمية الازنهاء . اثنايا زاهية الالوان يكثر فيها التوشيح . تعيش على الاشجار ، قوتها الثمار والحبوب والجلود . جماعاتها متوسطة العدد . اثنايا تضع جروا واحداً رفصه نحو ٦ شهور || اعرف انزاعه واشهرها :

٢٩٦٩٦ - هَجَرَسُ احْمَر

Cercopithecus patas, C. ruber (S). Cercopithecus patas, Singe rouge (F). Patas (E).

موطنه بعض اسراج وغابات افريقية الشمالية . ظهره وايظاء فضفاضة وباعداة وذيله الى الصهبة الجلوية . بطنه وبوامن قوائمه الى البياض الاطمل . وبجهه واذاؤه سود .

٢٩٦٩٧ - هَجَرَسُ اخْضَر

Cercopithecus callitrichus (S). Cercopithecus callitrichus, Singe vert (F). Green monkey (E).

موطنه ضفاف النيجر . جماعاته كثيرة العدد . ثوبه الى اخضر الزيتوني . بطنه الى البياض الافرقي . وبجهه اسود اللون . حنار جبته ابيض . ذنبه اصفر المذهب .

٢٩٦٩٨ - هَجَرَسُ اخْضَر

Cercopithecus pygerythrus (S). Cercopithecus ver-vet, Vervet (F). Vervet (E).

موطنه افريقية الجنوبية . جماعاته متوسطة العدد . ثوبه الى اخضر الاصفر يميلو موج اسمر . بطنه وسنار وبجهه الى البياض الافرقي .

٢٩٦٩٩ - هَجَرَسُ اسْمَل

Cercopithecus cephus (S). Moustac

موطنه الغابات القائمة بين الغابون والكنغو . ثوبه الى الصهبة ، رأسه زيتوني اللون ، وبجهه الى الزرقعة السوداء . حناره ابيض . كفه اسود . ذنبه اربد اللون ، اسمر المذهب والطرف || اخلاقه رشيقة هنية . وهو سريع الالتباس والسيان .

٢٩٧٠٠ - هَجَرَسُ الْبَحْرِيات

Cercopithecus brazzae (S). Cercopithecus de Brazza (F). Brazza monkey (E).

موطنه مناطق بحيرات الكونغو . جسمه رشيق القوام يميل نحو ٧٠ سم . وذنبه ٧٥ سم . ثوبه الى الصهبة . حنار وجهه تاجي الشكل صتاني المقدم ، اسنحه المنخر . يذاه ورجلاه سود . طرف فخذها الخارجي ابيض اللون . يياضه عند من حدود الساق الى الجامرة . ذنبه اسود لامع .

تخلعا على غفاف مجاري الماء . قوتها المواد المضوية المنحلة والديدان وكل ما تسطيع قصه .

٢٩٦٨٧ - هَتَلَى

جلس نباتات جذمورية برية وزراعية تزيينية . انزاعه المعروفة قليلة ، منها مناطق البلاد الحارة . اوراقها اسلية الشكل ، جلعية الانتشباب . انزاعها غشائي ينتهي بزهرة عشوية ، ثلاثية التويجات وابتلات . ميسها ثلاثي المسكن . عديد البويضات . بتلات ازهارها بياض اللون او ودية .

٢٩٦٨٨ - هُتُونِيَا

جلس نباتات مائية من فصيلة الربييات . انزاعها قليلة . اوراقها مركبة ريشية مستطيلة الاعتناق تملح على صهبة الماء . انزاعها عقديدي التجميع طرفي الزنكار . انزاعها خماسية التركيب || اشهر انزاعها واعما زراعة المختزنية المنغمية .

٢٩٦٨٩ - هُتُونِيَا مَتَقِيَا

Hottonia palustris (S). Hottonia des marais, Mil-lefeuilles aquatique, Plumeau, Girofée d'eau (F). Featherfoil, Water gillflower, Water violet (E). Wasserfeder, Feder-Garbe (D). Garofano d'acqua, Erba militare, Penne d'acqua (I).

نوع من المختزنية ، يكثر ويبيدها في المنابع والماء الراكدة . تزرح في اسوان الماء التزين . ازهارها حيلة الشكل . بتلاتها حر الصلصة صفر القامدة .

٢٩٦٩٠ - هُتُونِيَا

Houttuynia (S). Houttuynia (F). هُتُونِيَا
جلس نباتات طيبة جذمورية زخافة من فصيلة الصرويات . معقدة التعريف على اسم العلامة الدانمركي هوتون . انزاعها المعروفة قليلة ، منها بعض اسنحاق آسيا الشرقية ، تعيش على غفاف مجاري الماء . سوتها تحيلة حولية تملح من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقها متتقة متعاقبة ، تصلا قلبية الشكل ، مذهب المغصنة ، بارز المروق ، حشوي الصلصة السفلى . ازهارها سنبلية التجميع . ازهارها صغيرة القد غبراء اللون ، عصارة جلودها حريفة الطم . اوراقها معطشة .

٢٩٦٩١ - هُتُونِيَا

Sphænodon punctatus (S).

Sphænodon, Hatteria (F).

حيوان يربوس وحيد النور والجلد والفصيلة من رتبة مغطيات الرووس . موطنه جزر زيلندا الجديدة || شكله شبيه بالظاء ، اثنا البازيز الفوزي واليسموري ويكسان في التركيب وفي القد . جسمه يطول نحو ٧٠ سم . جلده مبشور التمثل ويميل في القد رأسه وفي كبح ظهره وذنبه عرف فضروري التركيب مسن كالنشار . رأسه مكل . المنطقة الصلصية من الرأس مظنية التركيب . بطنه مخفوف بالاضلع . مديه ملمعوت بزحف جلدي . ذنبه مستطيل ، قابل التجديد عند الانفصام . قوائمه نشطة ، خاصة الاصابع المنيقة بمخاطب قاصدي . غنابه سادة الاطراف المصنة . اسنانه مرزقة ، وحافة الخارجية من الفك الاصل || الاثني امين قدأ من الذكر واعشي بطنأ منه . تلقى من ١٠ الى ١٢ شلقة في سفرة بين الصخور التي ترتادها برقة بطور البحر . يتنقث الشلق بعد وضعه بنحو ٤ اسبوعا || يسرح في الليل . انتقاله سريع الحركة في البر وفي الماء || قوته السطاء والقضاد والديدان والقراض الصغيرة .



هتل



هتونية



هتيرة



هجرس اسمر



هجرس اخضر

٢٩٧٠١ - هَجْرِيَسُ الْغَابِ * ، نَسْتَسُ

Cercopithecus pyrrhonotus (S). Cercopithèque nisnas, Nisnas (F).

موطنه افريقية الشرقية انحصار الصومال وكردفان ودورفور. ثوبه سوي اللون الاصهب الصباني. حمار وجهه الى الياض الاخير || وهو من القردة الشبيهة الحذر المكيدة، التي تقتبس العلم ببطء ولا تفسى .

٢٩٧٠٢ - هَجْرِيَسُ دِيَانَا *

Cercopithecus diana (S). Cercopithèque Diane (F). Diana monkey (E).

موطنه ليبريه والكنغو . ثوبه جميل الالوان . ظهوره ارجواني. يطفه الى الياض الاخير . ساعده وضفاده سود الطاهر ، صفر الباطن . اما الذكر فيتميز بختار جبهته الاسود وبلمرته وسباله البيض .

٢٩٧٠٣ - هَجْرِيَسُ سَبَا * ، شَادِي ، هَيْتَجْ ، طُوتْ

Cercopithecus sabaeus (S). Cercopithèque de Sabs, Grivet, Tota (F). Grivet (E).

موطنه افريقية الشرقية يكثر في الحيشة وسنار وكردفان . جسمه صغير القدرع التقاطيع . ثوبه الى الخضار الباقين. قوائمها وذيله موشمة بالابيض . وجهه واذناه سود .

٢٩٧٠٤ - هَجْرِيَسُ سَكْسَار ، سَكْسَار

Cercopithecus talapoin (S). Talapoin, Mitopithèque (F).

موطنه الدارين . ثوبه كثيف الشعر الناعم . ظهره الى الخضار الاصفر . يطفه الى الياض الاخير . حمار جبهته ثنري الشكل ، ابيض اللون || اخلاقه هنية رضية . يقتبس العلم بدهن نفور واخراج .

٢٩٧٠٥ - هَجْرِيَسِيَّاتٌ ، قُرُوْدٌ ذِيَالَةٌ ، قُرُوْدٌ مَدْبَكِيَّةٌ

Cercopithecidae, Lasioptygidae (S). Cercopithicidae (F). Cercopithecidae, Lasioptygidae (E).

الهجريسات والهجريسات فصيلة قردة من صفات المنخرين تشمل ستة اجناس الهجريس والحولود والمالك والشدم والقشة والقردوح .

٢٩٧٠٦ - هَجْرِيَسِيَّاتٌ ، مَيْتِسْ

Métis (F). Cross-bred (E).

هو في الحيوان تاج التجبين اي الاسفاد بين حيولتين من نوع واحد ولكن من سلالتين مختلفتين .

٢٩٧٠٧ - هَجْرِيَسِيَّاتٌ ، هَيْبْرِيْدٌ

Hybride (F). Hybrid (E).

هو في النبات نتيجة تلقيح زهرة بطلع زهرة اخرى من نوعها اما من غير سرها او سرها . وهو يدعى هجلاجا .

٢٩٧٠٨ - هُدَابُ *

Parnassius (S).

جنس حشرات فراشية من حمارة اللذانبيات . اكلوهه عديدة جميعها متوسطة القدر ، بسطها تراوح من ٥٥ الى ٦٥ سم . اجسادها اسطوانية مهدبة . روافدها مستعرضة مستديرة . لونها الى الياض الاخير يلموها تمسح ليكي وكنتيت اطبل وتبقيج اسود وافر || تظهر في اوائل الصيف تمتع سكتها على نباتات فصيلة الهلدات فينتف من رقات مغلفة خضرة جوزية اللون خلية الجسم مهدبة بلهلب القصير ومنطقة بالاحمر .

٢٩٧٠٩ - هُدَابُ الْجُرُوْدِ *

Parnassius montivagus (S). Parnassien des montagnes (F). Mountain Butterfly (E).

حشرة من فصيلة الفراشيات ورتبة حرشيات الاجنحة . موطنها بدس جبال الشرق الاذن . لرفلتها واسمة قوتها رقيق الازهار . سرقتها تمسح في اوراق اشطريون والخلدات || جسمها متوسط القدر يطول نحو ١٧ سم . بسطها نحو ٥٤ سم . واسها اكبه اللون . عينهاا ناشزتان . زياناها صولغانيان . جوشنها الى الشبهة السراء المراج . بطنها الى الشبهة الرصاصية المرافجة || روافدها عند الشقين الى الياض الاخير يطلو تمسح اريد وليكي وتتمسح اسمر وتبقيج اسود || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اواخر الربيع وتسرح في التبار . تماثل بحد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمسح للكن محادبا على الصفحات السفلى من نصال الازراق || السرة عند ذيلها الكال تطول نحو ٣٢ سم . جسمها مغلف الشكل . ثوبها الى السرة الجوزية تملوها ثلاثة غطوط سود قاتبة وتنقيد جانبي احمر واصفر . قشارها كيف الخمل والمهلب القصير . واسها اسود . فكهاا نشيطان . روافدها وبدنها الى الربعة السراء || طور الاكمال الذي يستمر من ٢٢ الى ٢٤ اسبوعا ينقضي عمن صلبة متنة التسج .

٢٩٧١٠ - هُدَابُ ، فِيلَارِيْدَةُ

Filaridae (F). Filaridae (E).

رعد من الديدان السلكية الوليدة . تتميز باجسادها الدقيقة النسيجية الخيطية الشكل . انواعها عديدة تعيش في الاجسام الحية نفوذها وقد تمسحها . اطلب هدابة .

٢٩٧١١ - هُدَابِيَّةٌ * ، فِيلَارِيَّةٌ ، هَوَكَّةٌ

Filaria (S). Filare (F).

جنس ديدان سلكية من الهداب . انواعها كثيرة الفدية تصيب الانسان والحولون . جميعها دقيقة الجسم التتميل ، عيطة الشكل، مستطيلة، تعيش في الجهاز الدوري وفي التسج الضام تقسب اضطرابات حيلة واختلالات داخلية قد تكون سببة المواقب || اعرف انواعها ما يتبع .

٢٩٧١٢ - هُدَابِيَّةٌ الْخَيْلِ

Filaria equina (S). Filare du cheval (F).

نوع من الهداب تطول من ٤ الى ١٢ سم . تصيب الخيل واليئال والحخير . تتمركز في احشية المعدة . تسب بعض الاضطرابات الفداخلية فلما تكون وضعية العاقبة .

٢٩٧١٣ - هُدَابِيَّةٌ الدَّمْعِ

Filaria lacrymalis (S). Filare lacrymale (F).

نوع من الهداب تطول من ١٠ الى ٢٥ سم . تركيب البقر وتعيش في مجاري غدد الدم تسبب التهاب الملتحمة . يقضي عليها باستئصالها .

٢٩٧١٤ - هُدَابِيَّةٌ الطَّبَاةِ

Filaria cervina (S). Filare des cervidés (F).

نوع من الهداب تركيب الظهار والايالي في نسجها الضامة . طولها يراوح من ٣ الى ٥ سم .

٢٩٧١٥ - هُدَابِيَّةٌ الْكَلْبِ

Filaria immitis (S). Filare cruelle (F).

نوع من الهداب تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . تركيب الكلب تقسب في الجهاز الدوري وتنتشر في بطن القلب الايمن . يكثر وجودها في الصين واليابان وفي ايطاليا وكوتونا .



هجريس الغاب



هجريس ديانا



هجريس سبا



هداب



هداب الجروود



هدابة

Cloporte commun (F). - **هَدْبِيَّة** ٢٩٧٢٥
 راجع حمار تيان .

Fulcre - **هَدْبِيَّة** ٢٩٧٢٦
 هي غويوط جهاز التناسل في فطور الارماديات .

٢٩٧٢٧ - **هَدْبِيَّة** طائر (السان) .

Tigre mâle (F). He-tiger (E). - **هَدْبَس** ٢٩٧٢٨
 الهدبَس البر الذكور عند بلوغه كامل النشاط .

Ciliés (F). Cilia (E). - **هَدْبِيَّات** ٢٩٧٢٩
 شعبة من التقييعات من الحيوانات الدنيا الاوالي .

Thysanoptéroïdes - **هَدْبِيَّات الجناح** ٢٩٧٣٠
 طبقة حشرات من شعبة الطليّات تشمل رتبة واحدة تسمى
 هدية الاجنحة ، اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠٠ جسمها
 حدة فصائل .

Thysanoptères (F). - **هَدْبِيَّة الاجنحة** ٢٩٧٣١
 Thysanoptères (E).

رتبة حشرات من طبقة هديات الجناح . فضائلها واجناسها
 وانواعها كثيرة العدد . اجسامها صغيرة دقيقة يصعب
 تمييزها بالعين المجردة . انشطارها غروية الشكل . امتلاكها
 ثلاثة ماسة . قرونها الاستشعارية عديدة المقل التي تراوح
 ٦ الى ٩ . اجنسها عند وجودها هدية التركيب
 مستطيلة . اظفارها موية الالوان منها الاصفر والاسمر
 والكتني والاصفر || حشرات الكاملة ويرقاتها تركيب
 العديد من التبات . قوسها الخفيف والسبع وعصاة
 الخلايا || اشهر حشراتنا الرئيس .

Thysanoures (F). - **هَدْبِيَّة الأذنان** ٢٩٧٣٢
 Thysanura, Bristle-tails (E). Borstschwänze (D).
 طائفة من الحشرات المدبة المدعة الجناح . فصائلها
 واجناسها وانواعها كثيرة العدد تتجمع الى ريتين رتبة
 لاطات المتك ورتبة ظاهرات المتك .

Hydraires (F). - **هَدْرَات** ٢٩٧٣٣
 هي المدارات ، رتبة حيوانات مائية من الهيرفوات .

Hydra (F). Hydra (E). - **هَدْرَة** ٢٩٧٣٤
 الهدرية من المدار ، جلس حيوانات مائية من المدارات .

Hydrogénation (F). - **هَدْرَجَة** ٢٩٧٣٥
 المزج بالهيدروجين .

Hydrostatique (F). - **هَدْرَسَة** ٢٩٧٣٦
 Hydrostatics (E). علم توازن السوائل وضغطها .

Hydrobia (S). - **هَدْرُوب** ٢٩٧٣٧
 Hydrobie (F). Hydrobia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مدديات الارجل
 وفصيلة الهدروبوات . انواعه المعروفة كثيرة العدد بعضها
 من متحجرات الاساقب الثالثة والبعض الآخر منتشر
 في معظم بحار العالم . يكثر وجودها عند مصبات الانهر ||
 اصنافها صغيرة ، ماسية ، مدهبسة الاساقب ، قروية
 الاسقاط .

Filaria caprae (S). - **هَدْبَايَة الماعز** ٢٩٧١٦
 Filaire des caprins (F).

نوع من المهاب طويلا يراوح من ٢ الى ٥ سم . تركيب
 الماعز في نسجهما الفصاة ففترح جلدها ونفسها .

٢٩٧١٧ - **هَدْبَايَة المدينته** ، عرق مديني
 Filaria medinensis (S). Filaire de Médine, Ver de
 Médine (F). Guinea-worm (E).

نوع من المهاب تكثر في البلاد الحارة . تعيش تحت الجلد
 في نسج الجسم الفصاة عند البشر والخيول واليقر وسائر البهم.
 انشطارها طول من ٥٠ الى ٨٠ سم . وقد يصل طولها في بعض
 الاحيان الى ٤٠٠ سم . تستقر في أي مركز كان اما
 تغفل اسفل الساق فتسبب دملة تنتهي بجراح مقروح .
 يقال ان كيشها يدخل المدة مع الماء . فاجتنابها يكون
 اما بخل الماء او بتغييره .

٢٩٧١٨ - **هَدْبَايَة بأسوريه**
 Filaria haemorrhagica (S). Filaire des boutons hé-
 morragiques (F).

نوع من المهاب طويل من ٢ الى ٧ سم . تركيب الخيل
 والبال والخيول . تستقر في المتق والكنتف والحواريه .
 تسبب دملات تثر القبح والدم .

٢٩٧١٩ - **هَدْبَايَة الأرجل**
 Cirripèdes, Cirropodes (F). Cirropoda (E).

رتبة حيوانات دليا من القشريات . فصائلها واجناسها
 كثيرة العدد جميعها صيرة القند تعيش تقريبا على الاسماك
 والحيات وكل شيء تستطيع الالتصاق به . قرونها
 الاستشعارية مجوده بمحاجم تمكنها من الالتصاق .

٢٩٧٢٠ - **هَدَاكَة** ٢٩٧٢٠
 Frigidité (F). Frigidity (E).

حالة مقاومة سلبية او قنور في وظائف الاعضاء التناسلية
 تجعل المرأة تنفر من التكاثر او لا تتقبل بمارسته لانها
 قلما تتحسن الجهور الجنسي .

٢٩٧٢١ - **هَدَاكَل** *
 Viscum album (S). Gui, Gui blanc, Morvé (F). Common mistletoe (E).
 Gemeine Mistel (D). Visco quercino, Viscio
 comune, Panis (I).

نبات طفيلي معمر من فصيلة المتنبات . يعيش على اخضار
 الاشجار الشجرة والحرجية اغصانها التفاح . فيقام عائله
 النسل ويؤديه . برته تنشق في السطح الذي يلتصقها
 بالنسج . جلورها تشبه في لحاء الدائل . فروعها ثنائية
 التركيب . ازوائها متعاقبة جامدة النصل الاخضر الاس .
 ازهاره وحيدة الشق ، غصية التصبيغ ، ابطية الارتكاز . ثمار
 نووية الشكل ، يضاء اللون ، دايقة لمادة . يزورها
 دقيقيه مغلفه || ثمارها مأكولة من بعض انواع الطير
 اغصانها البان التي تنقل البزور مع السائل الى اي شجرة
 كانت || والحدال يستعمل ضد القربو والشهاق ويستخرج
 منه نوع من الدقيق جيد الصف .

٢٩٧٢٢ - **هَدَاكَهْد** هو المحدث ، اطلبه .

٢٩٧٢٣ - **هَدْبِيَّة**
 Cueilir (F). To gather (E).
 هذب الشجرة : اجتثاثها وهذب واحذب ايضاً .

٢٩٧٢٤ - **هَدْبِيَّة** ، **هَدْبِيَّة** ٢٩٧٢٤
 Aiguille (F). Needle (E).
 الحدية والمدينة . ج هذب وهذب واحذاب . كل ورقة إبرية
 الشكل لا خير لها ولا مرض كورة الصنوبر واللائل ...



هدال

الملمس، سواد اللون، قضيبة المواج، تعتبر من اقصر وأنجن الفراء.

٢٩٧٤٦ - هيدروبيات * Hydrea (S).

Hydrine (F). Hydrea (E). جنس حشرات من فصيلة الهيدروبيات ورتبة غمديات الاجنحة. أنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجناسها صغيرة، اطيالية، هيفاء، تطول نحو ٣ سم. رؤوسها مستعرضة، عيونها بارزة. قرونها الاستشعارية عيطية، تأثيرها قصيرة. ملابسها سطيلية، مننققة، كواسلها شبه مكورة الشكل. انحدارها لاحقة. قوائمها سطيلية، اثوابها سوية اللون تكثر فيها البصرة السوداء والحواء ثم البني والكنسي || تألف مجاري الماء. تعيش تحت الحجارة المصنوعة.

٢٩٧٤٧ - هيدروبيات * Hydranidae (S).

Hydranidae (F). Hydranidae (E). فصيلة حشرات مائية من غمديات الاجنحة. اجناسها وافواها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجناسها صغيرة، اطيالية الشكل، متعلة الاسدياب، تطول من ٣ الى ٥ سم. رؤوسها متعلة الجرم. عيونها بارزة. قرونها الاستشعارية عيطية، سباحية الفصص. تتميز باستطالة ملابسها الفكية المننققة. كواسلها نظامية. انحدارها لاحقة. قوائمها سطيلية || تعيش في المنافع والبحيرات ومجاري الماء تحت الحجارة المصنوعة او بين اوراق النبات. وبها انواع تعيش تحت طبقات الصفات. يرتقاها مفرسة || اشهر اجناسها الحديثة.

٢٩٧٤٨ - هُدَس Myrta (F).

هو الاس، اطيبة.

٢٩٧٤٩ - هُدَك، هُدُك Frigide (F). Frigid (E).

الهدك والمهدك من تميز بالهداك.

٢٩٧٥٠ - هُدَكَّة، لِيَسْرُوءَة Leptostroma (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الهدكيات. انواعه عديدة جسيما روية لا مؤذية. بكتيداتها غارضة، طباية الشكل، سواد اللون، فريية الانفلاق. يودلتها بجوار اللون عطفلة الاشكال، منها الليبية والخرطوية والمننققة.

٢٩٧٥١ - هُدَكِيَّات * Leptostromataceae (S).

Leptostromatacés (F). Leptostromataceae (E). فصيلة فطور مجهرية من رتبة الزويات. اجناسها وانواعها كثيرة الدم، بكتيداتها مجنحة، فعية اللون، شارة الارتكاز او محضرة. يوبقها غطفلة الاشكال، متباينة التركيب. || اشهر اجناسها الثمانية التالية: اتسبورويوم (غشاه)، بيغويه، ديكوريز، غلوس ليتيورويوم، لريولا، ملسيه، هدة.

٢٩٧٥٢ - هُدُلُقي هو النمط للملمس التواطب.

٢٩٧٥٣ - هُدُن Fortilité (F). Fertilité (E).

الهدن هو التحبب في الانتاج.

٢٩٧٥٤ - هُدُود، هُدُود Upupa (S).

Huppe (F). Hoopoe (E). جنس طير من الهدديات. انواعه المعروفة ستة، جسيما

٢٩٧٢٨ - هيدروبيات * Hydrobilidae (S).

Hydrobilidae (F). Hydrobilidae (E). فصيلة حيوانات مجهرية من الرخويات مديات الاربيل امانيات الحياشيم اللطيفة. اجناسها المعروفة ٢٢ وانواعها بعض المئات منتشرة في معظم مجار العالم وخاصة عند مصبات الانهر لانها ترضب في الماء الاجاج || اعرف اجناسها ولشهرها الهدروب.

٢٩٧٢٩ - هيدروبيات * Hydroscaphidae (S).

Hydroscaphidae (F). Hydroscaphidae (E). فصيلة حشرات مائية من غمديات الاجنحة. اجناسها وافواها المعروفة قليلة العدد. اسطائها منقوع وبجيرات البلاد المتعلة الحرارة || اجناسها شبه بيضية اللون، متعلة التبيط، تطول من ٨ الى ١٤ سم. رؤوسها مستعرضة، مخروطية. عيونها بارزة. تأثيرها ولكنكها نظامية. قرونها الاستشعارية سباحية الفصص. كواسلها شبه مربعة الشكل. انحدارها لاحقة || تعيش على النباتات المائية في البحيرات والمنافع || اشهر اجناسها الهدروس.

٢٩٧٤١ - هيدروبيات Hydroids

هي الهداريات من الهيفيات تشمل ثلاث رتب. الهدرات والهدرات المرجانية والجلديليات.

٢٩٧٤١ - هيدروبيات هُدُوسية Hydroméduses (F).

صف حيوانات من الهيفيات يشمل الهداريات والمهدويات والمصصيات.

٢٩٧٤٢ - هيدروبيات مَرَجَالِيَّة Hydrocorallaires

رتبة حيوانات مائية من الهدرات.

٢٩٧٤٣ - هيدروبيات Haidreichia (S). Haidreichia (F).

جنس نباتات عشبية، معمرة، برية، من فصيلة اللصليبيات. انواعه المعروفة قليلة العدد منتبها جبال بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || سقها زحافة فراء. اوراقها متعاقبة، متقاربة لحماية النصال. ازهارها طرفي الارتكاز. ازهارها صغيرة، بيضاء اللون. ثمارها غريقات وحيدة البزرة || اشهر انواعه الهيدروبيات الحلجالي اوراق.

٢٩٧٤٤ - هيدروبيات حَبَلَبَلِيَّي الورك Haidreichia buplevifolia (S).

Haidreichia à feuilles de buplèvre (F). عشبة معمرة برية من فصيلة اللصليبيات. منتبها جرد لبنان. ساقها زحافة فراء. فروعها منتصب. اوراقها طمية مليقة النصال. ازهارها طرفي الارتكاز. ازهارها صغيرة، بيضاء اللون. ثمارها غريقات وحيدة البزرة || اشهر انواعه الهيدروبيات الحلجالي الصغرية. تنويرها في اواخر الصيف.

٢٩٧٤٥ - هيدروبيات * Enhydria marina (S).

Enhydre marine, Grande loutre de mer (F). Kalan, Sea otter (E). Kalan, Grosseer Seeotter (D). حيوان بحري لبون وحيد الجنس والنوع من فصيلة السرمويات. قوته الاسماك والقشريات. اسطانه مجاج مضيق بجرين. طولها نحو ١٦٠ سم. يتميز باستدارة راسه ومغطاب قاعيه الخلفيتين الذي يكتنف كامل البرائن دون الاطراف. فروته قصيرة الورب الناعم الكثيف، خلية



هدريس



هدرية

٢٩٧٦٠ - هُدَيْيَات (F). Flagellés (F). Flagellates (E).
نقطة من الأولى ، غالباً جهرية ، جبهة بأهداب دقيقة
قابلة الانحياز تدعى هدديات تمكّنها من العوم والانتقال
في الماء . بعضها فسفوري اما أكثريتها تستمتع بالخصيب .
بينها أنواع طفيلية تعيش على الحيوانات .

٢٩٧٦١ - هُدَيْف (F). Allergène (F).
نعت تعريفي يطلق على كل مادة قد تسبب الحساسية .

٢٩٧٦٢ - هُدَيْل (F). Pigeon mâle (F). Dove male (E).
الهديل هو ذكر الحمام . قال فيه جرّان العميد .

كان الهديل الطالع الرجل وسطها
من النبي شرّيب يفرّج مسرف
والهديل صوت الحمام من هدل . والهديل كما جاء في التميمي
و فرخ كان له عهد نوح فصاده جارح من الطير غليس
من حامة الأوتيكى عليه الى يوم القيامة . قال نصيب :
قلقت أبتكي ذات طوق تذكركت
هديل وقد اوى ريساً كان تبع »

٢٩٧٦٣ - هُدِيم (F). الهديم : باقي نبات العام السابق .

٢٩٧٦٤ - هَدِيَّةُ الشَيْتَمِ * ، عَشَقِيَّةُ السَّلْتِ

Hadena scalis, Hadena didyma (S).
Hadène du seigle, Noctuelle du seigle (F).
Hadena scalis (E).

حشرة مؤذية من فصيلة اللسقيات مرشفتات الاجنحة .
موطنها يمتد من الشرق الأقصى الى اوروبا والبريق الشمالية .
فراشتها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقتها غاصلة تركب
التجشبات البرية والزراعية || جسمها مستطيل الجرم
يطول نحو ١٣ م . بطنها تراوح من ٣ الى ٣٥ م .
رأسها مستعرض الشكل . صيغتها صيرتانا . زباناها
عيطان . ملابسها صلبة . مرشفتها مستدل الطول . جوفتها
وبطنها الى الخنطي || راشتها الى الخنطي الاسمر تعلو
في الزوج الاسامي زراش متعرجة وزخارف تراوح بين
الكسني والجملوي . وتعلو في الزوج الخلفي ماجة قاعدة
سواء لا تتجاوز حدود الزايم الاول || لها جيل واحد في
الحول . تظهر الفراشة في اواسط تموز وتبقى حتى ايلول .
تسرح في الليل . تماثل يده ظهورها بنحو ستة اسابيع
وتتبع المكان في عطوط مستقيمة على عصف النبات المائل ||
الطور الاسروي الذي يستمر نحو ٤٠ اسبوعاً ينقضي
على النبات والسرقة عند بلوغها الادراك تغول من ٢٥ الى
٣٠ م . جسمها اسطواني الشكل ، باعته الخصار يعلو
خطان شجيان اميران يمتدان من الكويل الى الشرج .
رأسها اسمر اللون ، ميسر الخلف الثقيل . مدنها ورواجها
الى الخنطي || طور الاكمال الذي يستمر من ٢١ الى
٢٨ يوماً ينقضي في التربة حيث تنتمن السرقة وتنمط
بجلباب من الطين .

٢٩٧٦٥ - هَدِيَّةُ مُشَبَّكَة *

Hadena reticulata (S). Hadène reticulée (F).
Hadena reticulata (E).

حشرة من اللسقيات مرشفتات الاجنحة . موطنها بعض
اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارية
قوتها رقيق الازهار . سرقتها تعيش على اوراق العلوك
والقنقل البري والزراعي وتقتب الكماير وتلقم البور

من طور العالم القديم . اجسامها ريشية ، رؤوسها متوتة
بقنازع مروحية الشكل . اثوابها جميلة الالوان المتراكبة
الزاهية يعلوها جمليج وتسلج . || حكي القزويني ان
الهدد قال لسليان اريد ان تكون في سياتي قال انا وسدي
قال بل انت واهل مسرك في جزيرة كذا في يوم كذا
فصبر سليان بمجنوده فطار الهدد فاصطاد جرادة فخنقها
وربى بها في البحر وقال كلوا يا نبي الله من فاته الله
ناله المرق ففسك سليان ورجنوده من ذلك حولا كاملاً
وفي ذلك قول :

جاءت سليان يوم المرض هددة
أعدت له من جراد كان في فيها
وانشدت بلسان الحال قائلته
ان الهدايا على مقدار مهديها
لو كان يعلو الى الانسان قيمته
لكان يعلو لك الدنيا وما فيها
أعرف انواعه واشهرها الهدد الشائع .

٢٩٧٥٥ - هُدُودُ شَائِع * ، دُودُكُ الجِبِلِّ

Upupa epops (S). Huppe commune, H. vul-
gaire (F). Common hoopoe (E).

نوع من الهدد المبلول في لبنان وفي سائر الشرق الاوسط .
كنيته ابو الاصهار وابو ثمامة وابو قلعة وابو الربيع
وابو درج وابو جهاد وابو حباد . ج هداده وهدايد .
الواحدة هددة . || وهو طائر اسرج الثوب متوسط
الجسم طوله تراوح من ٢٧ الى ٢٨ سم . مقار دقيق
مستطيل . قزته كبيرة القد سوداء الاطراف . قوبه الى
الصبيحة الطحلاء . جناحاه وظفوه الى الصبيحة القائمة يعلوها
تسلج اسود وابيض يتخلله الاسفر . ذنبه مقطوع الطرف
اسود اللون ابيض الجانبين والوسط . || يألف الاماكن
المسيرة الازهار . قوته الحشرات والديدان . يئن قوته في
تجاويف الازهار . الاثنى تخمن رسحها من ٤ الى ٧
بيضات نحو ١٦ يوماً . الذكر يؤذن لما الاكل . || يعتبر
من الطيور النافعة الواجب حمايتها .

٢٩٧٥٦ - هُدُودُ يَمَات

Upupidae (S). Hupupidae, Upupidae (F). Upupidae (E).

فصيلة طير من الجوارم الرقيقات المناشير . انواعها عديدة
تجميع الى جنسين الهدد والهدير . اجسامها ريشية . اجنحتها
ذلفة . السنتها قصيرة . ارسافها قوية . اثوابها جميلة الالوان
الزاهية .

٢٩٧٥٧ - هُدُودِيَّة *

Hedobia (S). Hédobie (F).

جنس حشرات خاشبة من فصيلة القفرجات . انواعها المروقة
١٠ ، اعطائها البلاد الحارة والمعتدلة . جميعها صغيرة القد ،
مسطلة الشكل ، اثوابها مزركشة مختلفة الالوان .
يرقاتها تركب الاشجار الميتة فتتغرسها وتعلبها .
اشهرها الهدبوية الامباطورية .

٢٩٧٥٨ - هُدُودِيَّةُ امِبَاطُورِيَّة *

Hedobia imperialis (S). Hédobie impériale (F).

نوع من الهدبوية طولا من ٤ الى ٥ م . قوبها سطحي
اللون اسمر المزاج تعلو زراش مخلفة خلية التركيب
مطلد . زاهية . || يرقاتها تركب احضان الانجار الميتة
من اي نوع كانت .

٢٩٧٥٩ - هُدَيْيَّة *

Flagello (F). Flagellum (E).



هدد شائع



هدوية امباطورية



هدية الليل



هدية مشبكة

إذا ازدحت هوم الصدر قلنا
مسي يوا يكون لها انفرج
ندمي هري وانيس نفسي
فقاتر لي وشوقي السرج

٢٩٧٧٢ - هَرَكِس Acacia blanc (F).
هو السط الابيض . الواحدة هراسه .

٢٩٧٧٣ - هَرَايَسَة Astrologus (F). Astrologus (E).
الحراسه علمه النجوم . النجمين والمتنجنين .

٢٩٧٧٤ - هَرَب هَرَب الحرب . ثوب البطن .

٢٩٧٧٥ - هَرَبُودَة Harpagodus (S).
Harpagode (F). Harpagodus (E).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديلات الاربيل
وفصيله الكتيبات . انواعه المرفقة قليلة العدد اصنامها
بعض مناطق المحيط الاطلسي المراجيه لاربيكة الثالية ||
اصنامها متوسطة القد وشبهه عازلة جزوية اللون . فواها
متدلة الانفرج ثلاثية الفلق التي تبدو كرجل البش شكلا
وحطابا .



هَدَاب

٢٩٧٧٦ - هَرَبُوتِس Harpactes (S). Harpactes.
Couroucou flamboyant (F). Harpactes (E).
جنس طير من فصيلة الطرغويات . انواعه المرفقة نحو
١٠ موطنها يشمل معظم مناطق آسية الشرقية والجنوبية .
جميعها متوسطة القد . متانيداه قوية عذبة الاطراف .
مقمرة الحاطم العليا . اجنتها متوسطة الطول . ذلقة
الاطراف . رتاجية الريش اذناها مسطحة . رتاجية
التركيب . اقواسها جميلة الالوان المتشعبة || فواها اشخات
هل اختلاف انواعها وبعض الفوايات || احرف انواعه
واشهرها المرقع المطوق .

٢٩٧٧٧ - هَرَبُوتِس مُطَوَّق هَرَبُوتِس مُطَوَّق

Harpactes fasciatus (S).
Harpactes à bande, H. konder (F).
نوع من المرقع . اصنامها بلاد الهند وصوترا . يأنف
الغابات الكثيفة || جسمه متوسط القد بطول نحو ٣٠ سم .
ثوبه جميل الالوان الصالية . رأسه ومقله الى السواد اللحمي
اللامع . صدره وبطنه الى الحمرة القرمزية اللطيفة البهتان
وكذلك عصبه تطوق رأسه من البين الى العين . سواد عنقه
واحجار صدره مقسولان بلوق ابيض كالماج . طور
وافتيحه وزلالان ذنب الى الجوفه تغطها حاشية سوداء
ويطوقها حمار مستعرض ابيض . جناحاه الى السواد المسج
بالابيض . متقاده ورشاه الى الزرقه || طرائه العادي
قصير الشوط يكثر فيه التصعب والتجيب . قوته الحشرات
والدوابت اعصها المتناكب || يذئن عنه في صعود
الاشجار الحرة . الاثن تفيض من ا الى ه يبيضات
تفصها بمقاربة الذكر نحو ١٥ يوما .



هَرَبُوتِس مُطَوَّق

٢٩٧٧٨ - هَرَبُوتِس Harpalus (S).
جنس حشرات من فصيلة المربوسيات . انواعه كثيرة
العدد جميعها صغيرة القد . دجوية المسرح . تمشي تحت
الحجارة والاعشاب والاوراق اليابسة . قوتها البزود
والحيوب وبعض الثآير . ريقاتها غاصلة تعيش على اوراق
النبات . اشهر انواعه الثلاثة التالية .

الفقة || جسمها متوسط القد بطول نحو ١٧ سم . بطيها
نحو ٤١ م . رأسها الى الخطي الاسمر المواج . عينها
كبرتان . زباناها عيحيان . جوشها وبطنها الى الخطي
الاسمر || روشنها الاماميان الى الخطي الاشقق المواج
تعلوه شبكة من الخطوط الكستنية . روشنها الخلفيان
الى الخطي التبي المواج يسر عنه الاطراف الخارجية .
اعذابها الى الثلثمة المتناية || لها جيل واحد في الحول .
تظهر الفراشة في اواسط ايار وتبقى حتى تموز . تفرح
في الليل . تماثل بعد ظهورها بشو ستة اسابيع وتضع
المكس لعلما مرببة على الصفحات السفلى من نصال
الاوراق || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٤٠ سم .
جسمها اسطوانى الشكل . مشدود القشار . قوتها الى
البركة تثبت في الظهر وتجت في الجانبين ويعلوها خشان
جانبيا احمران وثمة خطوط متممة صفراء اللون . رأسها
الى الجفوة . مدها الى الطلعة الفراء . رواجها الى السرة ||
طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينتهي في
الربة ضمن جلاب من البين لتلتفه السرفة .

٢٩٧٧٩ - هَدْيُوتِس Hedyotis (S).
Hedyotis, Hedyote, Hédote, Hédoteide (F). Dog-
wood (E). Süsohr (D). Edoteide (I).
جنس نباتات برية وزراعية ممرمة من فصيلة الفويات .
انواعه قليلة منها الاششاب والجنبا . اوراقها متفالة .
ازهارها محورية الاثكاز اراتية . ثمارها جراء لثالية
اللقلة . || احرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٩٧٨٠ - هَدْيُوتِس سَرَكْدِيْب Hedyotis auricularia (F).
نوع من المديوتيس . اصنامها سرديب . جنته ممرمة .
اوراقها حاشنة ذكية البرق الطري . ازهارها تاجية
الاثكاز حاشنة البرق . يستخرج من اوراقها بالتقطير
عطر المديوتيس .

٢٩٧٨١ - هَدْيُوتِس هِنْدِي Hedyotis à ombelle (F).
نوع من المديوتيس . اصنامها الهند . عشته محلة . جلورها
صباغية يسمونها "شي" غصنها احمر اللون شائع الاستعمال

٢٩٧٨٢ - هَدَاكِب Mesites (S). Méсите (F).
واحدته هداكة . جنس طير من فصيلة الهذابيات . انواعه
قليلة العدد . اجسامها متوسطة القد . طولها يراوح من ٢٧
الى ٣٥ سم . جوارحها ورشاهها ونحالبها مسطحة . ازنها
غريانة . جوارحها لامعة ذلقة . اذناها مقصرة مخروطية .
الاقواس الى الصبهة المايقة يعلوها توشج خفيف . جوارحها
ويطوقها الى الصفرة الموشة بالاسود . اصنامها ثقبية اللون .
قوتها البزود والحويوب والحشرات على اختلاف انواعها .
تنش عنها في النور بين الادلان والاششاب الرقيقة .
حفظتها من ١٢ الى ١٥ يمشية .

٢٩٧٨٣ - هَدَاكِب Mesitidae (S). Mesitidae (F). Mesitidae (E).
فصيله طير وسيدة الجلس من رتبة الدجائيات . انواعها
المرفقة قليلة . جميعها من طيور مدخسكر . قوتها البزود
والحيوب والحشرات .

٢٩٧٨٤ - هَر Chat (F).
هو السنور . اطلبه . ج هرة والاثن هرة . قال احد بن
فارس صاحب المجلد في اللغة :

٢٩٧٨٧ - هَرَبُلُوسْ رَقِيع *Scutellaria altissima* (S).
Toque élevée (F).

نوع من الهربولوس الأزرق الممر. ساقه متصبية تملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه متعقة أحليجية الشكل ؛ نصلها جامد الصفحة ؛ سنن الحافة ، أزغب البشرة .
٢ سم. شفراتها العليا ينفسجية اللون ، شفراتها السفلى عاجية . تنوره يستمر من حزيران إلى آب .

٢٩٧٨٨ - هَرَبُلُوسٌ كَبِيرُ الزُّهْرِ *Scutellaria macrantha* (S). Toque à grandes fleurs (F).

نوع من الهربولوس الأزرق الممر. ساقه تملو من ٢٠ إلى ٣٠ سم. أوراقه لاطئة ، بيضية الشكل ، نصلها قليل الحمل ، سنن الحافة . أزهاره سفلية التجميع ، متعاقبة الانكناز تطلو نحو ٣ سم. لوها إلى الزرقه الزاهية || تنوره يستمر من تموز إلى ايلول .

٢٩٧٨٩ - هَرَبِيلَكَة نَهِيكَة * ، قَوْبِيَكَة انْخَسَب *Harpella forficella* (S). *Harpella perca-bols*,
Taïgne du bois mort (F). *Harpella forficella* (E).

حشرة من فصيلة القربيات حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الأوسط إلى اوروبا . قرافتها جارية قوتها رقيق الازهار . سرفتها غاشية تمشي على جلجول الاشجار اليابسة والافصان والافناد || جسمها قصيف يطلو نحو ٧ سم. بطنها تراوح من ٢٢ إلى ٢٤ سم. رأسها مسكور الشكل . عينها صغيرتان . زباناها غيطاني . ملاسها دقيقة . مرشفها معتدل الطول . جوشها وبطنها إلى اثني الصنابي المواج || روشنها الامنيان إلى الصفراء الغاتم يعلون شمع بني . روشنها الخلفيان إلى الصفراء السمره المواج . اهدانها شقراء اللون || لها جمل واحد في الحول . تظهر القراشة في اوائل حزيران تبقى حتى اواخر تموز . تسرح في النهار . تماطل بعد ظهورها بنحو ستة أسابيع ويختج المكان مبيدات في شقوق الخشب ويخت التفتور اليابسة || القرفة عند بلوغها الادراك التام تطلو نحو ١٦ سم. جسمها شبه اسطواني الشكل ، مستدق المقدم والمؤخر ، ميمش الحلب القصير . ثوبها إلى الحنطلي الاسمر . رأسها شديد السمره . مدنها ورواجها الصدرية والبطنية إلى الحنطلي الباهت || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي بخارج الفلق الحشبي ضمن صلجة تنسجها السرفة تحت القشور أو بين الشقوق .

٢٩٧٩٠ - هَرْتَمَكَة

الهرمة : السواد بين منخري الكلب وسائر الحيوانات من ذوات الفصيلة .

٢٩٧٩١ - هَرَجَج *Clitoria de Ternate* (F).

هو المازريون الهندي ، اطلبه .

٢٩٧٩٢ - هَرَجَكَة ، كَجَج *Exotype*

اسلى سلالات جبل القليب الهابط . يمر منها علمياً بحرف ٢ يتيمه رقم السلالة . فاذا اودت التير من السلالة الاولى كتبت ١ ٢ والدلالة على السلالة الثالثة كتبت ٣ ٢ وعلى السلالة السابعة ٦ ٢ الخ ...

٢٩٧٩٣ - هَرُجُجَج *Talin* (F).

هو التالينوم ، اطلبه .

٢٩٧٩٤ - هَرَبُلُوسْ أَصْهَبْ *

Harpalus rufus (S).

نوع من الهربولوس . حشرته تطلو من ١١ إلى ١٣ سم. ثوبه إلى الصبغة الحنطية الناعمة . يألف الاربة الرملية . قوته البزور والحبوب والآثار الجافة الساقطة . رقاته خاضلة قليلة الاذنة .

٢٩٧٩٥ - هَرَبُلُوسْ أَطْعَمَكُ الظَهْرِ *

Harpalus distinguendus (S).

نوع من الهربولوس . حشرته تطلو من ١٤ إلى ١٦ سم. ثوبه إلى السمره الغمام المواج . ظهره اطحل اللون ، اسمر الخطيط المستطيل . يركب شمائل الشبك لاثام بزورها القويقة فيعطب الشمائل ويشربها .

٢٩٧٩٦ - هَرَبُلُوسْ مَلُون *

Harpalus aeneus (S).

نوع من الهربولوس . حشرته تطلو من ٧ إلى ١٠ سم. ثوبه إلى الأخضر الاسمح تملو مشعة جوية . زباناها وبرجارها إلى الحسرة . يعيش تحت الحجارة والاشخاب . قوته البزور والحبوب . رقاته خاضلة قليلة الاذنة .

٢٩٧٩٧ - هَرَبُلُوسِيَّات *

Harpalidae فصيلة حشرات من قشبات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة البند . اصطلحها العالم . معطها وابل وبعضها مفرس . رقاتها خاضلة ناعمة ومنها المقرسة التي تنسج البديان القراشة || اشهر اجناسها الهربولوس والمرس والياح والديتموس .

٢٩٧٩٨ - هَرَبُلُون *

Pseudope جنس عظم من فصيلة الحنطويات المادام القوام . انواعه قليلة ، اصطلحها البلاد الحارة والمعتدلة . اجسامها اسطوانية تطلو من ٤٥ إلى ١٠٠ سم. روشنها مفطسة . اذنانها دقيقة . سراقفها مربعة متتابة . قوتها الحشرات . تعيش من الزسافات المفيدة .

٢٩٧٩٩ - هَرَبُون * ، دَرَكَة *Scutellaria* (S).

Scutellaria, Toque (F).

الدرقة من الامير مصطلح الشهائي المأخوذ إلى مصدر الاسم العلمي . جنس نباتات برية ويزينية من فصيلة الشفويات . انواعه عديدة ؛ نباتها الشرق الاقصى وافريقية الشمالية . سوقها عشوية تحلة . اوراقها صلبة القد لاطئة او معتقة . ازهارها سفلية التجميع ، معتقطة الالوان . بزورها دقيقة حنطية اللون || اعرف انواعها واشهرها ما يليق .

٢٩٧٨٥ - هَرَبُونٌ أَبْيَض *Scutellaria albidia* (S).

Toque blanche (F).

نوع من الهربولون الأزرق الممر . ساقه زياء اللحاء تملو من ٤٠ إلى ٨٠ سم. أوراقه معتقة أحليجية الشكل ؛ نصلها جامد الصفحة ؛ خلل البشرة ، سنن الحافة ، دبق المسام . أزهاره سفلية التجميع تطلو نحو ٢ سم. لوها إلى البياض العاجي || تنوره يستمر من حزيران إلى تموز .

٢٩٧٨٦ - هَرَبُونٌ أَبْيِي *Scutellaria alpin* (S).

Toque des Alpes (F).

نوع من الهربولون الجبلي البري الممر . ساقه تملو من ١٠ إلى ٣٠ سم. أوراقه لاطئة بيضية النصل تطلو من ١ إلى ٢ سم. اذنانها بياض الانابيب ، زرق الاطراف ، سفلية التجميع . تنوره يستمر من حزيران إلى آب .



هربولوس اصهب



هربولوس اطحل الظهر



هربولوس ملون



هربول



هربولون



هريلة نيكة



هرجود



هرجود مَيْج



هرجود مَعْصَب



هرشان

٢٩٨٠٢ - هَرْدِيْب مَيْجَج *

Chlorophorus varis (F). Chlorophore taché (F). Chlorophorus varis (E).

حشرة واسعة غاطسة غاشية من فصيلة التقرنيات ورتبة ممدات الاجنحة. تألف البراري القريبة من السران. خنافسها تعيش على ازهار الصيوانيات ولا تمتع من الاوراق. يرقاتها تركب الجلعول والاصناف والقصبان المقطوعة اليابسة وقد تسردب ساييك الكومة ويزارح الاثمار النضرة وسناسله || جسمها متوسط القد يطول من ١٥ الى ١٤ سم. ثوبها الى الصغار الكبريتي تعلقو يقع وتذلق سود. رأسها مستدل الجسم. عناتها كبرتتان ناشرتان. زبانا خيطيان دقيقان. ظهورها مستطيل الشكل، ضيق المؤخر المستدير الفارق. غدها مستدلت الصلابة، متناظرة التميز النجيل القاطب. اسرارها خاسية للقل || الانثى ابرز قدماً من الذكر وأكد ثوباً منه واكثر زبانا || جيلها ثلاثي الجيل. تظهر الحشرة الجملانة في اواخر ايار وتعيش حتى اواخر ايلول. تسرح في التبار وتبيض في اليل || البرقة عند تمام ادراكها تطول من ١٨ الى ٢٤ سم. جسمها محذوب الظهر، مبط اللب، قصير الراجب. الصفرة الخفيفة الشكل. ثوبها الى الصفرة الزرقية يعلوها تنقيط اسمر. رأسها احمر.

٢٩٨٠٣ - هَرْدِيْب مَعْصَب *

Chlorophorus trifasciatus (S). Chlorophore trifascié (F). Chlorophorus trifasciatus (E).

حشرة واسعة غاطسة من فصيلة التقرنيات ورتبة ممدات الاجنحة. تألف الموائل التي تكثر فيها نباتات الفصيلة الصيوانية. خنافسها تعيش على الازهار. يرقاتها تركب اريومات النباتات الحولية والحولة وتسردب حلاء جلعول الاثمار باستثناء الصنوبريات || جسمها صغير القد يطول من ٨ الى ١٥ سم. ثوبها متعدد الالوان فيه الاسود والاحمر والاسمر الخفي والبيج الاصفر المواج. رأسها صغير الجسم. عناتها صغيرتان، ناشرتان، زبانا خيطيان، دقيقان. ظهورها مستطيل الشكل، مستدير الطرف الفارق، اسود اللون كالعين. غدها متناظرة التميز الخفيف القاطب. اسرارها خاسية للقل || الانثى ابرز قدماً من الذكر واكثر زبانا منه واطول مرراً || لها جيل واحد في الجيل. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل حزيران وتبقى حتى اوائل آب. تسرح في التبار وتبيض في اليل || البرقة، عند الادراك التام، تطول من ١٦ الى ٢٥ سم. جسمها محذوب الظهر، مبط اللب، نولي الراجب. ثوبها الى الصفرة الصنائية المواج يعلوها تنقيط احمر. رأسها جلدي اللون.

٢٩٨٠٤ - هَرْدِيل * Haridelle (F). Seed, Nag (E).

الحريدل الصفائح الضيقة من السبور. الواحدة هريدلة.

٢٩٨٠٥ - هَرْوْزَن * Autruche mâle (F).

هو الظلم، أطله.

٢٩٨٠٦ - هَرْشَان * Caragana (S).

هرشان تعريب الاسم للثري. جس نباتات برية وزراعية من فصيلة التقرنيات القرشاية. مهدا بعض بلاد الشرق الاقصى وبعض مناطق سيريير. انواع عديدة. جميعها معمرة، معظمها جنبي وبعضها بجلي. اوراقها عابدة مركبة،

٢٩٧٩٤ - هَرْجُود * Heterogynis (S).

Hétérogynis (F). Heterogynis (E).

حشرة من فصيلة الهرجوديات ورتبة حرشفيات الاجنحة. اعطتها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة. تألف البراري والجرار المبعثرة الاثمار || جسمها صغير، نحيل، كثيف الخمل التام. مسطها نحو ٢٠ سم. رأسها صغير. عناتها صغيرتان، بارزتان. غطتها ولباسها شديدة القصر. زبانا مشطيان، مسطيلان. اجنتها كبيرة || الانثى مرقلة ومعدة الخناخ. البرقة شبه اهليلجية الشكل، مسطحة، غاطسة، تعيش على اوراق فصيلة التقرنيات القرشاية ومنها الزوال، مرثها الفضل.

٢٩٧٩٥ - هَرْجُودِيَّات * Heterogynidae.

Epiconpterygidae (S). Hétérogynidés, Epiconpterygidae (F). Heterogynidae, Epiconpterygidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة. اجنتها وانواعها المعروفة قليلة العدد، جميعها شلالية الاصلان || اجسامها صغيرة، نحيلة، يلفها خل نام. مسطها تراوح من ١٨ الى ٢٢ سم. رؤوسها صغيرة. عناتها بارزة. اعطتها ولباسها شديدة القصر. قرنوسا الاستعمارية مسطية. اجنتها ضخمة الانتشاب. مستعرضة الطرف. اوراقها الى السمرة الخشبية المتضاربة الماجات | انثا معار مرقلة. اساريها شبه اهليلجية الشكل، مسطحة || أشهر اجنتها الهرجود.

٢٩٧٩٦ - هَرْجُوم Damalique du Sénégal (F).

Korrigum (E).

هو مدلولو السنغال، موطنه يمتد من السنغال الى اريقية الشرقية والجنبة.

٢٩٧٩٧ - هَرْد Curcuma (F).

هو الكركم الصباحي. اطله.

٢٩٧٩٨ - هَرْدَاء * Thamnocalamus (S).

Bambou (F). Bambou (E).

جس نباتات قصبية برية وزراعية من عماره الخيزرانيات وفصيلة النجيليات. انواعه قليلة العدد ترطب في الاربة الخفيفة المبيقة القور الوارفة المواد المضوية.

٢٩٧٩٩ - هَرْدَاء هَنْدَسِيَّة Thamnocalamus hindi (S). Bambou de l'Inde (F).

نوع من الهراء يطول من القرن الى الخمسة اذبار. سلاجه ثوبه شديدة الخضار. اوراقها تطول من ٢٥ الى ٣٠ سم. وتعرض نحو ١٥ م. نصلها جلدي السنج، صفحة العليا غضراء اللون طحلاء المواج، صفحة اسفل بيضاء اللون زباه. يربط في الاربة البالية الرلبة.

٢٩٨٠٠ - هَرْدِيَّات * Phalangides, Opilions.

Faucheurs (F). Phalangides, Opilions (E).

رتبة من صف التنيكيويات. اجنتها وانواعها عديدة تنقسم الى اربع فصائل منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة، ملحونة الصدراس يابلن، غشوية التنس، عادمة المشاقن، مسطية الجرامز الدقيقة. أشهر فصائلها الكهوليات.

٢٩٨٠١ - هَرْدِي Hourdis (F).

الحردى او الحردى، كلمة عربية اسميلة تصصل الآن للدلالة على المجارة الخفيفة من الباتون (اطلب حردى).

٢٩٨١٣ - هَرَشَانْ كَدَن ٥
Caragana frutex (S).
Caragana frutescent (F).
 نوع من المرشان. جنيته تملو نحو ٢٥٠ سم. أوراقها رباعية التركيب. وريقاتها لاقامية الشكل والحجم تملو من ١ إلى ٣ سم. وتقرض من ١ إلى ١٢ سم. نصلها بيضي الشكل، اذنياتها حادة شائكة. ازهارها كبيرة القند، فردية التجميع، لونها الى الصفار الزاهي || تنوره يستمر طول شهر ايار.

٢٩٨١٤ - هَرَصِي
 Clous (F).
 بقور صغيرة جامدة تملو للنج النباتية.

٢٩٨١٥ - هَرَصَكَة
 Ver (F). Worm (E).
 هي البودة ج. هَرَص.

٢٩٨١٦ - هَرَصِي
 Polymnatus (S).
 جنس حشرات فراشية من فصيلة الحمرشيات. انواعه عديدة، اصطلحوا بمطر اصقاع العالم. اجسامها صغيرة القند كثيفة اطرافها المستتقة الخملية الاطراف. اوراقها ملونة. قرونها الاستعمارية مستطيلة دبوسية الشكل || تسرح في النهار. قوتها طلع الازهار وريحها || ريقاتها غاصلة وثامرة تركب اوراق النبات وتغمار || اعرف انواعه واشهرها ما يلي.

٢٩٨١٧ - هَرَصِي الباقية ٥

٢٩٨١٨ - هَرَصِي البَقُول ٥
 Polymnatus amandus (S).
 فراشة من المرض، جسمها احمر اللون رضاعي المراج. طويها نحو ٣٥ سم. رواشن ذكورها الى الزرقعة البناجرجية الزاهية يطويها حنار اسود واخار ابيض الحذب. رواشن انثاها حنطية اللون يملوها رقشة سمره واطار ابيض التهديب. ريقاتها صغيرة القند، غصراء اللون، تركب الباقية في اوراقها وقرونها.

٢٩٨١٩ - هَرَصِي البَقُول ٥
 Polymnatus baeticus (S).
 فراشة من المرض، جسمها حنطي اللون احمر رضاعي المراج. طويها نحو ٣٥ سم. رواشن ذكورها الى الزرقعة الجميلة الزاهية يطويها اطار ابيض التهديب. رواشن انثاها غبراء اللون يملوها تنميش اسود. ريقاتها غصراء اللون تقربها كدرة غبراء || تركب البَقُول وتقرض الحبوب قبل ادراكها اغصها القبول واللوباء والترس.

٢٩٨١٩ - هَرَصِي التَرُوس ٥

٢٩٨٢٠ - هَرَصِي الرُّمَانْ، قَرَمَكَة ٥
 Polyommatus damon (S).
 فراشة من المرض. جسمها حنطي اللون اخضر المراج يطويها ذكورها الى الزرقعة الغصراء المراج يطويها اطار اسود وتهديب ابيض. رواشن انثاها حنطية يملوها تنميش اسود. وضط اوسط ابيض وحنار اسود واطار مهدب ابيض. ريقاتها تركب معظم النباتات القرنية اغصها الترس.

٢٩٨٢٠ - هَرَصِي الرُّمَانْ، قَرَمَكَة ٥
 Virachola livia (S).
 فراشة من المرض. جسمها حنطي اللون اخضر المراج يطويها نحو ٣٠ سم. رواشن ذكورها برتقالية الصفحة العليا، ربادية السفلى، كستنية الطوق المهدب. رواشن انثاها بنفسجية الصفحة العليا سمره السفلى، حنطية الطوق

وريشية وشمعية و متقابلة، تنميش باذنية شائكة مكينة من امتداد الضلع. ازهارها غصية التجميع او فردية يكثر فيها اللون الاسفر. ثمارها قرنية. بزورها بيضية الشكل. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

٢٩٨٠٧ - هَرَشَانْ أَزَّعْب ٥

٢٩٨٠٧ - هَرَشَانْ أَزَّعْب ٥
Caragana pygmaea (S). *Caragana pygmée* (F).
 نوع من المرشان. جنيته تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم. قرونها متدلية. اوراقها رباعية التركيب نصلها ضيق الصفحة السنانية الشكل يطول نحو ٢ سم. ويقرض نحو ٣ سم. ازهارها فردية، لونها الى الصفار الزاهي || تنوره يستمر من نيسان الى ايار.

٢٩٨٠٨ - هَرَشَانْ الصَّيْن ٥

٢٩٨٠٨ - هَرَشَانْ الصَّيْن ٥
Caragana chinensis (S). *Caragana de la Chine* (F).
 نوع من المرشان جنيته تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها رباعية التركيب. وريقاتها بيضية الشكل تطول من ١ الى ٣ سم. وتقرض من ٦ الى ١٥ سم. نصلها مائل البشرة على صفحيه اذنياتها شائكة. ازهارها فردية التجميع، كبيرة القند، متدلية لونها الى الصفرة يملوها تنميش ارجواني ازرق الموالج. تنوره يستمر طول شهر سحران.

٢٩٨٠٩ - هَرَشَانْ صَبِير الرُّوق ٥

٢٩٨٠٩ - هَرَشَانْ صَبِير الرُّوق ٥
Caragana sitagana, *C. microphylla* (S). *Caragana à petites feuilles*, *Acacia de Sibérie* (F).
 نوع من المرشان. جنيته تملو نحو ٢٠٠ سم. وريقاتها تند من ١٢ الى ١٨ وهي بيضية الشكل مستديرة الطرف. نصلها يطول نحو ١٠ سم. وهو خلي البشرة على صفحيه. ازهارها فردية او ثنائية التجميع، لونها الى الصفرة الجمليلة. تنوره يستمر من ايار الى سحران.

٢٩٨١٠ - هَرَشَانْ بُرْتَقَالِي ٥

٢٩٨١٠ - هَرَشَانْ بُرْتَقَالِي ٥
Caragana aurantiaca (S). *Caragana orangé* (F).
 نوع من المرشان. جنيته تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها فراء. قرونها متدلية. اوراقها رباعية التركيب ضيقة النصل الذي يطول نحو ١٥ سم. ويقرض نحو ٣. ازهارها فردية، برتقالية اللون || تنوره يستمر طول شهر سحران.

٢٩٨١١ - هَرَشَانْ شَالِك ٥

٢٩٨١١ - هَرَشَانْ شَالِك ٥
Caragana spinosa (S). *Caragana épineux* (F).
 نوع من المرشان. جنيته تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها فراء، اوراقها لاقامية التركيب منها الرباعية الاصبعية الشكل ومنها السداسية والثانية للوريقات. نصلها يطول نحو ٢٥ سم. ويقرض نحو ٥ سم. صفحته المليسا غصراء اللون، صفحته السفلى خلية البشرة حلاء. واشارت اوراقها شائكة تطول من ٣ الى ٤ سم. ازهارها الى الصفار الكبيرتي. تنوره يستمر من نيسان الى ايار.

٢٩٨١٢ - هَرَشَانْ كَبِير ٥، شَجَرَة الحَصِي

٢٩٨١٢ - هَرَشَانْ كَبِير ٥، شَجَرَة الحَصِي
Caragana arborescens (S). *Caragana arborescent*, *Arbre aux pois* (F).
 نوع من المرشان. جنيته تملو من مترين الى خمسة امتار. وريقاتها لاقامية العدد الذي يراوح من ٦ الى ١٢ نصلها تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. وتقرض من ٢ الى ٥ سم. ازهارها ذهبية اللون، ثنائية التجميع او فردية. بزورها مأكولة وهي كالحصص شكلا وقذا وطعماً || تنوره يستمر من ايار الى سحران.



هرش الباقية



هرش البَقُول



هرش الترس



هرص الشيلك



هرص الصغر



هرص الرن



هرص النصف



هرص القطايات



هرص الكوباي



هرص

من نصال الاوراق || السرة عند بلوغها الكمال تطوي نحو ١٥ م. جسمها عذب الشكل ، مستنق القدم والمخسر . ثوبها الى الخضار الانس تطوى ثلاثة خطوط صفر وخطان اسودان ويحيط سكي غير . رأسها اسود . ملها ورواجها الى السرة الذاكرة || طود الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع تقضيها المخادرة متدلية برجلها متصدده المحصية .

٢٩٨٢٦ - هرّصيات
فصيلة حشرات قرائية تتوف بالفتيات ، اطليها .

٢٩٨٢٧ - هرّط ، هرّطه
علم الحيوان المهزول انحصا علم النعبة الكبيرة المهزولة .

٢٩٨٢٨ - هرّطام ، هرّدينا
Gaudinia (S). Gaudinie (F). Gaudinia (E).

جنس نباتات مقدودة التعريف علم اسم الدلالة وقديين . وهي نباتات عشبية ، بيرة ، حليسة ، من فصيلة التيجليات . انواعها المروقة قليلة البعد منها حوض البحر الابيض المتوسط || جميعها شلبية ، سورها مالة او خلية . عصفها مطبق الضلال الباهة الخضار . انهارها سنبل . ستيلاها متصدية .

٢٩٨٢٩ - هرّطمان هو الخراط البري ، اطليها .

٢٩٨٣٠ - هرّص الكوباي
Gyropus ovalis (S). حشرة جلدية دقيقة من فصيلة الحفريات . طولا نحو ١ م. جسمها مسطح الشكل . زباناها وثأثيرها رباعية التركيب . مقاطعها عذبة الاطراف الحادة || تركب الكوباي وتؤذيه .

٢٩٨٣١ - هرّصيات
Gyropides فصيلة حشرات جلدية من رتبة القملات . اجناسها وانواعها كثيرة اللد جميعها صغيرة القد مفلطحة الجسم مقنطة الاسراع تنطقل على الحيوانات الجبيرة من ذوات الارب الجمل النام .

٢٩٨٣٢ - هرّص ، هرّصس
Improllique (F). الضم من النبات .

٢٩٨٣٣ - هرّص
Nyctes nivea (S). Harfang des neiges (F). طائر من البويات وحارة الفذاديات . موطنه جيم الاصفاق الشمالية الباردة . طوله نحو ٧٥ سم . ويسكنه الى نقل من ١٥٤ سم . لونه الى البياض الناصع في الطائر البالغ وهو متش وموطنه بالسمرة في الطائر الفرخ . رأسه صغير القد . محصر فافر القرس . مله اسود الجسم والبرية . عيناه الى الحمرة الصنائية . ذنبه مستطيل الريش . ارساه ومخالبه قصيرة القد كاسية . || يدن عشه في تخاليف الصخور . انشاء تصع من ه الى ١٥ يضيض تحفها بمخلوبة الذكر . قوته الجرد والقار واللين والرموط والسلك .

٢٩٨٣٤ - هرّصيّة
Heracleum (S). Berce (F). جنس نباتات عشبية كبيرة القد من فصيلة الحفريات . انواعها المروقة قليلة لا تنمى الثانية . مهدا جبال الخينة والهند والشرق الاوسط وارودة الفرية وامريكية الشمالية . منها النباتات المعمرة والمخلوة . ابروتها ورشية مغلقة او كنية النصل . يستخرج من سورها واروقها وانهارها

المهدب || ريقها صغيرة القد سوداء الرأس قبلو في ازل مهدا خضراء الجسم كيفية الملب الاسود ثم ينف ملها ويحصل لونها الى الحمرة ويبلغ طولا نحو ١٢ م . تركب ثمار الزمان والمهولة وقد تدري اليسر .

٢٩٨٣١ - هرّص الشيلك

Polyommatus icarus (S). فراشة من الهرص . جسمها اسطواني الشكل مخضور الوط اطبل الثوب يطول نحو ٣٢ م . رواشن ذكورها الى الزرقه البنفسجية يطوقها حنار اسود واطار من المهدب الابيض . رواشن انثاها حنطية اللون صفراء المواج يطولها تنمش اسود وايض واجر ، اطارها ابيض المهدب || ريقها تركب اوراق مختلف النباتات انحصا الشيلك .

٢٩٨٣٢ - هرّص الصعتر

Polyommatus meleager (S). فراشة من الهرص ، تطول نحو ٣٦ م . رواشن ذكورها الى الزرقه البازية اللامعة يطوقها حنار اسود ويهدب ابيض . رواشن انثاها الى الطحلة الصفراء المواج يطولها تنمش اسود وتنسج اسمر . قواعدها زرق الانتساب اطولها غير المهدب || ريقها ناهة تركب الصعتر وسائر النباتات البرية .

٢٩٨٣٣ - هرّص الرن

Polyommatus dolus (S). فراشة من الهرص . جسمها يطول نحو ٢٥ م . رواشن ذكورها الى الزرقه البزراء المواج يطوقها حنار اسمر واطار من المهدب الابيض . رواشن انثاها الى الحنطية الاصعب المواج يطولها تنمش دقيق اسود ويطوقها حنار مهدب غير . || ريقها تركب اوراق وسنن الرن والفصة .

٢٩٨٣٤ - هرّص القصة
Polyommatus eros (S). فراشة من الهرص . جسمها يطول نحو ٣٥ م . رواشن ذكورها الى الزرقه النضبية المواج يطوقها حنار اسمر يتخلل بعض النقط اسود واطار مهدب ابيض . رواشن انثاها حنطية اللون زرقاء المواج يطولها تنمش وتنسج واطار من المهدب الابيض . || ريقها تركب مطم نباتات المراعي انحصا القصة .

٢٩٨٣٥ - هرّص القطايات

Polyommatus coridon (S). Polyommatus coridon. P. des légumineuses (F). Polyommatus coridon (E). حشرة من فصيلة القنات ورتبة حشرقيات الاجنسة . موطنها يشمل مطم اقطار البلاد المحتلة الحارة من العالم القديم . فراشتها جارية قوتها رقيق الانهار . سورها تمش على اوراق القطايات وجوبها قبل ان تبلغ الادراك تمام || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٣ م . بسطها نحو ٣٤ م . رأسها مستدل الجرم . عيناه كيرتان . زباناها صولجانية . جوشها ازرق اقرون عند الذكر ، كستينه عند الانثى . بطها كسني اللون عند النشيق || رواشن الذكر الى الزرقه يطولها مواج لفي وبق كستية وخطوط سود . رواشن الانثى الى السرة الكستنية يطولها في الزوج الامامي تهديب ابيض تترفع خطوط حنطية ، ويكتنفها الزورج المخلي حزام نصفي اللون من النقط احمر يوصلها الاسود || ارجل راسد او الحول . تظهر الفراشة في حزيران . تشرح في البار : تماثل بد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتنع المكن ميعاديا على الصفحات السفل

ثوبه الى الزرقاء السمره المراج، يطلع اقل سمره واكثر يابسا. يتميز بفكيه المستطيلين وزعانفه الصدرية المستعصمة. قوته الاسماك والقشريات. || موطنه جنوب المحيط الاطلسي بين امريكة وافريقية.

٢٩٨٤١ - هرقلية القطب

Balaenoptera borealis (S). Rorqual boréal (F). نوع من المراكلة. طوله نحو ١٥ م. يتميز بصغر زعانفه الظهرية والصدرية. يعيش اسرابا كبيرة البدن. قوته السمك والقشريات والرغويات والحث. || موطنه القطب الشمالي وقد يقرب، في بعض فصول السنة، من شتلوط ايسلندا والنرويج.

٢٩٨٤٢ - هرقلية حبريوس

Balaenoptera rostrata (S). Rorqual à rostre (F). اصغر انواع المراكلة. طوله يراوح من ٧ الى ١٢ متر. ظهوره الى الكهية السمره المراج. يطلع الى اليابس الاكثر. زعانفه الصدرية سمر القواعد والاطراف يبيض القسم الاوسط. قوته الاسماك دون سواها. || موطنه شمالي المحيط الاطلسي وبحار النروج وقد شوهد في المتوسط.

٢٩٨٤٣ - هرقلية معروف * و متارة

Balaenoptera musculus (S). Rorqual commun (F). Finback, Finner (E). نوع من المراكلة. طوله يراوح من ١٨ الى ٢٠ م. ظهره احمر اللون، وصاحي للمواج. يطلع ابيض اكثر. موطنه المحيط الاطلسي وقد شوهد في المتوسط. يعيش جماعات سره به يد من ١٥ الى ٢٠ نفرا. قوته السمك والقشريات يرافق اسراب الرلكة حيث تصب.

٢٩٨٤٤ - هرقلية

Balaenopteridae (S). *Balaenopteridae* (F). فصيلة حيوانات بحرية لبونة من مرتبة فصليحات الاسماك ورتبة الحويات || انواعها المعروفة عشرة، جميعها كبيرة الجسم فضفة. اشهرها الهركل الازرق والهركل الحبري وهركل القطب والهركل المعروف الذي يدعى منارة وكبة الجنوب وكبة الخليج وكبة القطب المعروفة بجمل البحر.

٢٩٨٤٥ - هرمل

الهرمل: ضرب من الحفش فيه ملحوظه ورو اذله واشده انيساطا على الارض واستطاسا. ا. م.

٢٩٨٤٦ - هرملية

Triton (F). هي التروية، من اسماك المياه العذبة. اطلسا.

٢٩٨٤٧ - هرغوس

Hemipterus (S). *Hemipterus* (F). جنس اسماك بحرية من شاتكات الزعانف وفصيلة القديتات. انواعها المعروفة قليلة البدن اعطائها بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || اجسامها وشعبة الشكل، مستعصمة، تقطن من ٤٠ الى ٦٠ سم. رؤوسها كبيرة، مستعصمة طولها زعانف وطناف متباينة الاشكال عديدة. اشكالها كبيرة. زعانفها الظهرية والصدرية والشرجية كبيرة، كثير المناسخ الحادة. زعانفها الحوضية صغيرة، والذيلية مقبولة. انوابها الى الرتبة الرصاصية المراج يلمحوا في ظهورها تبقيع اسمر. رؤوسها حفرها اللون فضلة والحطني الاسمر || حومها كاعنة الصنف.

نوع من الكحول جيد الصنف. وقد تستعمل اوراقها في صناعة مشروب خاص قريب الشبه من الجعة || اشهر انواعها ما يلي.

٢٩٨٤٥ - هرقلية إيرانية *

Heracleum persicum (S). Berce de Perse (F). نوع من الهرقلية المعمرة القواسم العرف المستحب. مهدا بلاد ايران. يجلبها تملو من مترين الى ٣ متر. اوراقها مركبة. فصوصها ذرية. نصلها عابق الحشاش الالسن. ازهارها كبيرة القذ، يضاء اللون. اوراقها وعمارها صنعية يستعمل منها قطر فاخر الصنف ويستخرج منها مشروب شائع الاستعمال. || تنورها يستمر من حزيران الى آب.

٢٩٨٣٦ - هرقلية زغبية، هرقلية صمغية

Heracleum pubescens, *H. gummiferum*, *H. speciosum* (S). Berce douvete, B. pubescens (F). Downy cow-parsnip (E). Flaumiges Herkuleskraut (D). Panace (I). نوع من الهرقلية المعمرة العامة العرف. مهدا بلاد القفقاز. يجلبها تملو من ١٢٥ الى ٢٥٠ سم. ساقها زغبية السهام. اوراقها مركبة. وريقاتها كبيرة القذ. نصلها شائك الحافة، احضر للصفحة العليا، خلى السفلى. ازهارها الى اليابس الكندر. || سويقها تنضج عند حرما او قلقها مادة سكرية مأكولة يقال انها جزية النفع. ويستخرج منها وبن اوراقها مادة كحولية شائعة الاستعمال. تنورها يستمر من حزيران الى آب.

٢٩٨٣٧ - هرقلية صرطية

Heracleum lanatum (S). Berce laineuse (F). نوع من الهرقلية المعمرة. مهدا امريكة الشمالية. يجلبها تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. ساقها وفروعها زغبية السهام. اوراقها قليلة الفصوص المسننة الحافة. نصلها احضر الصفحة العليا، ازغب السفلى. ثمارها صغيرة القذ. تنورها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٩٨٣٨ - هرقلية نافعة *، سقند ليون، عيطل

Heracleum sphondylium (S). Berce branche-ursine, Patte d'ole (F). Meadow parsnip, Cow-parsnip, Hogweed (E). Heilkraut, Welsenherkuleskraut (D). Spondillio, Panace erculeo, Zampa d'oca (I). اشهر انواع الهرقلية واكثرها انتشارا. تتميز من النباتات الضارة لان مناصرها القبيحة جسيمة تؤذي المواشي التي تأكل اوراقها. ومع ذلك نزارعها شائعة ويستخرج منها كحول جيدة الصنف ويصنع من اوراقها مشروب مستحب الطعم قريب الشبه من الجعة.

٢٩٨٣٩ - هرقلية

Balaenoptera (S). *Balaenoptera*, Rorqual (F). Rorqual, Fin whale (S). جنس حيوانات بحرية لبونة من الحويات. انواعها المعروفة اربعة ومنهم من قال ١٢. جميعها كبيرة القذ، وشعبة الشكل، خضمة الرأس الذي لا يقل طوله عن الزمام الاول من الجسم. اعناقها مستطيلة التضفد. زعانفها الظهرية محببة الى الزوراء. زعانفها الصدرية ذرية الاطراف. موطنها جميع البحار تجوبها في طلب الحصيد والمخش.

٢٩٨٤٠ - هرقلية اذوق

Balaenoptera sibbaldi (S). Baleine bleue, Rorqual de Sibbald (F). اكبر انواع المراكلة وانضما جنه. طوله نحو ٢٦ م.



هرقلية إيرانية



هرقلية نافعة



هركل معروف



هرغوس



هرنة الشروشور



هرندي



هرنوع اسفغ



هرنوع يرتقالي



هرنوع جامد



هرنوع خيشت

٢٩٨٦٠ - هَرْمِيَّتْدِيَّات *
Hernandiaceae (S).
Hernandiaceae (F). Hernandiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين كثيرة التعاللات منخفضة المبيض. اجناسها وانواعها قليلة العدد، اعطائها بعض المناطق الاستوائية من المالحين القديم والجديد || نباتاتها اشجار كبيرة، قمراد. اوراقها منقطة، متعاقبة، جامدة الاتصال القلبية الشكل او البيضية. ازهارها متكررة التجميع، طرفي الارتكاز. ازهارها صغيرة صفراء اللون او نورية. ثمارها مسهلة. اغشائها صناعية.

٢٩٨٦١ - هَرْنُوعْ ، هَرْنُوعْ ، بُولِيَّطُس
Boletus (S). Bolet (F). Boletus (E).

جنس فطور من فصيلة السميات الشفالية. انواعه كبيرة العدد تألف الفاهات والاحراج الغظبية انحصار حراج السنديان. بعضها مأكول مستحب الطعم وبعضها جسامي ضار او كثير الاذى. اشكالها واسماها ولونها مختلفة، جميعها قلنسوية المسائل الجامدة اللادة || اعرف انواعها واخرها ما يتبع.

٢٩٨٦٢ - هَرْنُوعْ اسفغ *
Boletus aerus (S).
Bolet bronzé (F).

نوع من الهرنوع المأكول. يعيش ويكثر في التربة. ساقه غليظة القد، وردية اللون. صفاته كبير القد، فارش القطنوس، كسني اللون، اسفغ الملاج. مكروه ابيض اللون ينصرف الى الوردي عند تأكله من الهواء.

٢٩٨٦٣ - هَرْنُوعْ البكر
Boletus bovinus (S).
Bolet des bœufs, Albareille (F). Boletus bovinus (E).

نوع من الهرنوع ينتمي الى فصيلة السميات الشفالية. ينتمي من الفطور المأكولة. يعيش على اشجار الخور والكتنة || جلعه اسطوانة الساق المتصبة. صفاته كبيرة، فارش، جامد اللصية، حطلي اللون، اصفر الملاج. مكروه الى البياض التي ينصرف الى الوردي عند تأكله من الهواء.

٢٩٨٦٤ - هَرْنُوعْ بَرْتَقَالِي *
Boletus aurantiacus (S). Bolet orange (F).

نوع من الهرنوع المأكول المسحب الطعم. يعيش على جنور السنديان. ساقه غليظة. صفاته كبير القد، يرتقالي اللون، وزن من ٦٠٠ الى ١٠٠٠ غرام. مكروه ابيض اللون ينصرف الى الوردي عند تأكله من الهواء.

٢٩٨٦٥ - هَرْنُوعْ جامد *
Boletus scaber (S).
Bolet rude, Roussille (F).

نوع من الهرنوع المأكول المسحب الطعم. يعيش على جنور السنديان. جلعه يشي الشكل. صفاته كبير القد، جامد اللصية، حطلي اللون، اسفل الملاج. مكروه اخر اللون يبقى على حاله او ينصرف قليلا الى الوردي عند تأكله من الهواء.

٢٩٨٦٦ - هَرْنُوعْ خيشت *
Boletus luridus (S).
Bolet pernicieux, B. bième (F).

نوع من الهرنوع الجسامي اللادة، حريف الطعم، مر المذاق. ساقه غليظة حراء البشرة. صفاته كبير القطنوس القارضة، حطلي اللون، اسفغ الملاج. مكروه ابيض اللون ينصرف الى الزرقه عند تأكله من الهواء.

Pyramidal (F).
نمت وصفي يطلع على ما كان شكله يشبه الهرم.

٢٩٨٤٩ - هَرْمِيَّس
هر الكركدن الابيض، اعطيه.

٢٩٨٥٠ - هَرْمِيَّسَكَة
اثنى الحلققان.

٢٩٨٥١ - هَرْمِيَّسِيَّوم *
Hormiscium (S).
جنس فطور بحيرية من الشعيات وفصيلة الطميسات. جميعها مفطور التركيب. جبرها الكنديية سميحة الانظام، منتعقة الاطران، ملونة اللادة. || انواعه ثليلة العدد تعيش على المواد المغوية والنباتية السائرة الى الاغلال.

٢٩٨٥٢ - هَرْمِيَّكَة *
Hermelia (S).
Hermelia (F). Hermelia (E).
جنس ديدان حلقية قسابة من فصيلة الهرمليات ازواعها المعروفة عديدة تعيش في رمال الشواطئ التي لا تنقطع منها المياه، ضمن انايب عريضة الارتكاز تصم فوطها بملاسها الرأسية الكثيفة المسد.

٢٩٨٥٣ - هَرْمِيَّيَّات *
Hermellidae (S).
Hermellidae (F). Hermellidae (E).
فصيلة من الديدان الحلقيات القسابة. اجناسها المعروفة قليلة العدد موطنها رمال الشواطئ البحرية في الاقاليم الباردة والمعتدلة الحرارة || اشهر اجناسها الهرميلة.

٢٩٨٥٤ - هَرْمِيَّين
Hermine (F).
هر القاقم، حيوان من السراحيب.

٢٩٨٥٥ - هَرْمِيَّكَة
مشي اللودة.

٢٩٨٥٦ - هَرْنُوعْ
Ridnus (S).
الواحدة هرمنة. جنس حشرات جلدية من فصيلة الهرمليات. انواعها عديدة تركيب الطيور الجواثم. جميعها ذرية القد، مستطيلة الجسم والرأس، دقيقة الارياض، متباعدة الحلب النظامي الارتكاز. || اعرف انواعها هرمنة الشروشور.

٢٩٨٥٧ - هَرْمِيَّكَة الشروشور *
Ricin (S).
حشرة جلدية من الهرم. طولها نحو ٣ م. رأسها مبط المقدم. تأكلها قوية، زيانها جدية. بلها بيض الشكل. || تركيب الشراشير والمصابير الفريدة نفلها وقد تقصمها.

٢٩٨٥٨ - هَرْمِيَّعَات *
Ridnidae
فصيلة حشرات جلدية من رتبة القلذبات. انواعها عديدة. اجسامها دقيقة، مستطيلة الشكل، مفلطحة، طولها من ٣ الى ٣ م. تنتمي الطيور الجواثم انحصار الشروشور والمصابير الفريدة || اشهر اجناسها الهرم.

٢٩٨٥٩ - هَرْمِيَّتْدِي *
Hernandia (S).
Hernandie (F).

جنس نباتات بحيرية من فصيلة الهرندييات. النوع المعروفة سبعة جميعها من اشجار المناطق الاستوائية. اوراقها متعاقبة، منقطة، قليلة النصل الجامد المذهب الصفحة. ازهارها متكررة التجميع، طرفية الارتكاز. ثمارها مسهلة اغشائها صناعية. تقع اوراقها منفض شايق يستعمل حقنًا بالسرم.

٢٩٨٧٤ - هَرِيَّات ، قِيدِيَّات Amentacées (F).

Amentaceous plants (E). هي النباتات التي تكون أزهارها الذكورية على شكل حريرة أو قدة لذلك فالجوزيات والبقيصيات والسندانيات إلى آخره جميعها من الهريات .

٢٩٨٧٥ - هَرِيَّاع Feuilles mortes (F).

Dead leaves (E). الورق تنفضه الريح فيتناثر على الأرض .

٢٩٨٧٦ - هَرِيرَّة ، قِيدَة Chaton (F).

Setting of a germ (E). نظام هجرة قوامه سنبلة مركبة من أزهار وسيدة الشق .

٢٩٨٧٧ - هَرِيَّصَة Mare d'eau stagnante (F).

Pool (E). مستنقع الماء الساكن .

٢٩٨٧٨ - هَرِيَّعَة Peltaria (S). Peltaira (F).

جنس نباتات برية حولية أو معمرة من فصيلة البليبيات . أنواعها المعروفة أربعة أصلاتها الشرق الأوسط وأروبة الشرقية . أوراقها متعاقبة ، أزهارها عقنودية التجميع ، طرفية الأذنكاز . ثمارها خريدلية مبطة || أشهر أنواعها هريمة النورم .

٢٩٨٧٩ - هَرِيَّعَة الثُوم Peltaria alliacea (S).

Peltaira alliacea (F). Shieldwort (E). Knoblauchschelbenkraut (D). Peltaria (I). نوع من الهريمة المبدولة المسمرة . أوراقها متعاقبة بيضبة الشكل حاضنة ، نصلها حايق الحصار البحري ، ناشر الاصباح . أزهارها يضاء اللون || أوراقها ثوبية الرائحة عند المس . يقال أنها طيبة تغيد المعدة وتظهر الاسماء .

٢٩٨٨٠ - هَرَكَار Luscinia, Philomela (S).

Rossignol (F). Nightingale (E). جنس طير من فصيلة الشفليات . أنواعه ثلاثة الحزار الأشرق والتندليب والمزقة . أجسامها صغيرة القد مستطيلة الشكل . مناقيرها دقيقة مدنية الملاحظ . أجنتها وأذنانها متوسطة الحجم . أرسافها طويلة . أصابعها نحيلة . أطافرها ضعيفة . ألوانها جميلة الألوان المتخالفة المتراكبة || جميعها هريمة تألف المواقع الرطبة . تجوب البلاد في طلب الحصيد وللشق . تلتق في الإدفال وقد تركز صفها على الحفصيف بين الشب . قوتها الحشرات .

٢٩٨٨١ - هَرَكَار أَشْرَق Philomela major, Luscinia luscinia (S).

Rossignol (F). Nightingale (E). نوع من الحزار . تفرقة قريبة لشبه من نَزَقَة التندليب إلا أنها لا تقاسها بالركة وبجس الإلحان وتعداها || طوله نحو ١٨ سم . ثوبه إلى الخشنى الأصهب الملوخ . صدره وبعده إلى البياض الأكر . أجنته منشة بالاسمر . منقاره حشلي للمقط الأعلى . أصفر الأسفل . ساقه وأصابعه إلى الصفرة الحطية || قوته الحشرات . يدرث في الإدفال . انشاء تقص من ه إلى ه يضاء تحضها بنجوبة الذكر .

٢٩٨٨٢ - هَرَكَار هَرِيد Granier (F).

Granary, Corn-loft (E). هو الإنباء ، مستودع رطب الجوانب تجمع فيه الحويبر . ج . أراءه .

٢٩٨٨٣ - هَرَكَار جَشَان Philomela major, Luscinia luscinia (S).

Rossignol (F). Nightingale (E). هو نبات الفاشرين ، اطليه .

٢٩٨٦٧ - هَرُون لَتِيد * ، بُولِيَّس كَاة Boletus edulis (S).

Bolet. comestibile, Cèpe, Ceps (F). Esculent boletus, Polish mushroom (E). Edelhöhrling (D). Boletus comestibilis (I). أشهر أنواع الهرنوع للأكل . لذية الطعم ، مستحب المذاق يعيش ويتكاثر على التربة في ظل الأشجار الحرجية اغصبا السنديان . صقلاته قلنوسية الشكل ، كبير القد ، جامد الصلبة ، لونه إلى البياض الأكر الأصفر الملوخ . مكروه أبيض اللون ينحرف إلى الوردي عند تأكده من الهواء .



هرنوع لذية

٢٩٨٦٨ - هَرُونُوع نِيلِي * Boletus cyanescens (S).

Bolet. indigotier, B. bleus-sant (F). نوع من الهرنوع الجمال المذوي المر المذاق . ساقه غليظة حراء اللون . صقلاته كبير القد قريب الشبه من صقلان الهرنوع الأسفع . مكروه أبيض اللون ينحرف إلى الزرق النيلية عند تأكده من الهواء .



هرنوع نيلي

٢٩٨٦٩ - هَرُونُوعِي * ، هَرُونُوع Apera spica-venti (S).

Agrostide des champs, Jouet du vent, Epi du vent (F). Corn grass, Silky bent grass, Wind grass (E). Windhalm, Echter Windhalm (D). Spica venti (I). نبات عشبي بري موهي معمر من فصيلة النجيليات . يكثر بين الزروع وفي الأراضي البيرة المسناة .



هرنوع

٢٩٨٧٠ - هَرِيلِي * Heliornis fulica (S).

Héliorne (F). Heliornis (E). طائر وسيد الجنس ولتورج من فصيلة التفلفليات . قريب اليه بالانطاس والبالرة . يألف المستنقعات والبحيرات وصفان الآخر . قوته الحشرات والنباتات المائية || جسمه متوسط القد ، يطول نحو ٣٠ سم . يتميز بطول عنقه ويقصر ذيله المستدير . رأسه مستدل الجرم . منقاده ضليع مدب الطرف . جناحا فارشان . لاشخان . ساقه قصيرتان . أصابعه مستطيلة مخبطة تمكته من السير على الأشعاب المائية . ثوبه العلوي متداخل الاسود والاسمر . ثوبه السفلي إلى البياض الأصفر . رأسه وعنقه بلون الصدر تملوها جذة سوداء أول تمتد من قاعدة المنقاد إلى الرداء . وجة ثانية تمتد من طرف العين إلى الظهر || يدرث عشه على ضفاف الماء . بين القصب والاسل . الانثى تحضن وسدا نحو ١٢ بيضة بينا الذكر يرين لها الغذاء . الترخيم يستمر نحو ثلاثة أسابيع .



هريس

٢٩٨٧١ - هَرِهَرَة Bèlement (F). Bleating (E).

صوت اللسان .

٢٩٨٧٢ - هَرِهِير Pempéhride (F).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف . أنواعه المعروفة قليلة البد ، أعطائها بجوار البلاد الحارة . أجسامها صغيرة القد مضطمة . جريتها مستديرة كبيرة ، أثوابها إلى السرة . ظهرها ينسجية الملوخ . بطونها فضية . لحومها مأكولة تعتبر من الاصناف المادية .



هريمة الثوم

٢٩٨٧٣ - هَرِي Granier (F).

Granary, Corn-loft (E). هو الإنباء ، مستودع رطب الجوانب تجمع فيه الحويبر . ج . أراءه .



هزار أشرق



هزان



هساس جبل



هسيير الحجازيات



هسيير الشيك



هسيير العرج



هسيير القرايين



هسيير القرموطم

٢٩٨٩٠ - هسيير ٥

Hesperia (S).
جنس حشرات من فصيلة الهسيريات. أنواعه المعروفة كثيرة العدد لما الفصاة قليلة. فرائضها صغيرة قليلًا طولها يراوح من ٢٣ إلى ٣٣ م. أجسامها مودنية الشكل. أوتابها إلى السرة. رواشها مزركشة وبقيشة. مكها كروي الشكل تنحصر على صفحات الأوراق السفلى. أشهر أنواعها وأغمرها ما يتبع.

٢٩٨٩١ - هسيير الخياريات ٥

Hesperia mahva (S). Plain-chant (F).
حشرة من الهسيير. فرائضها صغيرة قليلًا طول نحو ٢٣ م. فرائضها إلى السرة السوداء طولها مائة غصية. رواشها ذكروها وأوتابها قريبة للشبه لا يفترها سوى اتساع التبييض الأبيض في الذكور. يكثر وجودها في نيسان وآيار وفي تموز وآب. ريقاتها مؤذية تركب الحجازيات والنداسيات والشيك والبرج.

٢٩٨٩٢ - هسيير الشيك ٥

Hesperia serrata (S).
حشرة من الهسيير. فرائضها طول نحو ٢٦ م. فواها إلى السرة الخطية. رواشها ذكروها إلى الخطية طولها تجتمع وتبييض أعصر. رواشها أوتابها كستنية اللون يتخللها تجتمع وتبييض أبيض. يكثر وجودها من تموز إلى آب. ريقاتها مؤذية تركب أوراق الشيك.

٢٩٨٩٣ - هسيير العرج ٥

Hesperia des ronces (F). *Hesperia sao* (E).
حشرة من فصيلة الهسيريات ودية حشفيات النجمة. موطنها بعض اصقاع البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم. فرائضها واسعة قوتها رقيق الانعراج. سرتها تعيش على أوراق البرج والبلان. جسمها صغير القند يطول نحو ١٠ م. بسلها نحو ٢٣ م. رأسها كسني اللون. صيها كيرتوان. زياتها صولطانيان. جوتها ويطها إلى الكسني. التاقم. رواشها الذكر إلى السرة الكستنية طولها رشفة بيضاء. رواشها الانثى أقل لمة وترويقًا. لها جيلان في الخريف. تظهر فراشة الجبل الأول في نيسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في تموز. تسرح في التبار. تماطل بعد ظهورها بنحو أربعة أسابيع وتفتح المكان مبعاديًا على أمان الأوراق ونصالحا. إلى السرة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٢٠ م. جسمها بسيط الشكل. ماسي القشار. أصلح اللون، أصغر اللون، بجوي الرأس، اسمر اللبد والرواسب. في طور الأكمال الذي يستمر في الجبل الأول نحو ١٥ يومًا، يستمر في الجبل الثاني نحو ١٨ أسبوعًا ويتقضي ضمن صليبة تحميها السرعة بين الأوراق.

٢٩٨٩٤ - هسيير القرايين ٥

Hesperia proto (S).
حشرة من الهسيير. فرائضها طول نحو ٣٠ م. ذكروها وأوتابها متساويان في القند. فواها اسمر كسني الخراج. رواشها مزركشة وبقيشة وهي في الذكر زاهية الألوان للمزركزة على الخراج. يكثر وجودها من سزيان إلى تموز. ريقاتها تركب القرايين وسائر النباتات الحجازية.

٢٩٨٩٥ - هسيير القرموطم ٥

Hesperia carthami (S).
حشرة من الهسيير. فرائضها طول نحو ٣٠ م. فواها إلى

٢٩٨٩٤ - هزان ٥

Opisthocomys (S). Hoazin (F).
جنس طير من فصيلة الترسيات. أنواعه قليلة تتميز بأوتابها المسججة التي تشبه راحة اليدين. جميعها مستطيلة القند الرقيق، قوية المخار، قزمية الرأس، نحلة المنق، مستندرة الاجنحة، مستطيلة الذيل، أوتابها إلى السرة السوداء يطولها نأزر أبيض وتوشج وتوشج. عنقها وجوتها إلى الناصب الثاني. تألف الأجزاء. تعيش أسراب كبيرة. قوتها التار. تشد عشا، في الانغسال ولا تنجار المنقمة، فوق الماء. أوتابها تبيض نحو ٤ بيضات تحضنها وصدها أربعة أسابيع.

٢٩٨٩٥ - هزيير

من اسماء الاسد المشهورة.

٢٩٨٩٦ - هزورج

هو ساق القطر.

٢٩٨٩٧ - هساس

Pelidna (S). *Pelidna* (E).

جنس طير من دجاجيات الارض. أنواعه المعروفة قليلة العدد. جميعها من القواطع. أجسامها صغيرة القند، قريبة الشبه من الجلهول. أوتابها إلى الربعة الخطية، تميز وتترقش بالاسمر في الظهر والجناب، وتبرز وتبيض في المنق والجرش والياطل والبطن. مناقبها مستطيلة، دقيقة. أذنانها قصيرة. اجنحتها لا سفة. قوتها الحشرات والديدان والحزوز والرخويات. أعرف أنواعه وأشهرها الحساس الجبلي.

٢٩٨٩٨ - هساس جبلي ٥

Pelidna alpina, *Tringa subarctica* (S).

Pelidna alpina, *Bécasseau corcoll* (F).

Curlew-Sandpiper (E).

طائر من الحساس. اعطانه لسمية الارباء تحته من اليابان إلى أدوية. يصيفه جبال البلاد المعتدلة الحارة. مشتاء ساحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الآخر ويصير والسودان والخليقة. جسمه صغير القند. طوله نحو ١٦ م. ثوبه إلى الربعة الخطية. ظهره عايق اللون يطول تميز اسمر وأبيض. عنقه وبقيشة ويطول إلى الناصب الأخير يقيق بصل التي في الصدر. متقاده اسمر اللون، رصاصي اللون. جيتان إلى السرة الكستنية. يذفن في افحوص قليل المنق، صاصي الشكل، يبطه بانيم الحاشاش. حشسته من ٣ إلى ٤ بيضات ترخها الانثى دون الذكر نحو ١٧ يومًا.

٢٩٨٩٩ - هسية ٥

Hipse (S). *Hipse* (F). *Hipse* (E).

جنس حشرات خافضة من حشفيات النجمة وفضيلة النشاريات. أنواعها المعروفة نحو ٣٠٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد الاستوائية والحارة والمعتدلة الحارة من العالم القديم. أجسامها صغيرة القند طول من ٧ إلى ١٠ م. رؤوسها صغيرة. جوتها بارزة. قوتها الاستعمارية بحيلة منتصبة. كواشها وأغامدها وسواشها بطرنا مدرزة بالشوك اللين الحاد. اتحادها شبه جنية الشكل مستديرة الخوضر الألف. أوتابها متباينة الألوان والمخاطبات، يكثر فيها الاسود وشفتها ثم الجروي ثم الكسني والبي.

(١٦٩٥-١٧٣٣) أنواعها عديدة تنتمي الى فصيلة الفويات. اصطلحاً البلاد الامريكية. جميعها اشباح سبروتية مسمرة. اوراقها متقابلة. ازهارها قلبية الشكل، مستطيلة المالحق || اشهر انواعها ما يتبع .

٢٩٩٠٣ - هسبرنتية أرجوانية

Houstonia purpurea (S). *Houstonie purpurine* (F).
نوع من المستوية. ساقها خضراء تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها بيضيه النصل، صغيرة القد، ثلاثية أو خماسية الفلوع. ازهارها ارنبانية اللون، هامة الارتكاز. تنورها يستمر من ايار الى ايلول.

٢٩٩٠٤ - هسبرنتية تركشاهية

Houstonia corulea (S). *Houstonie-bleue* (F).
نوع من المستوية. ساقها خضراء تملو نحو ٢٠ سم. اوراقها بيضيه أو احليجية النصل، صغيرة القد، فردية الفلوع. ازهارها الى الزرقاء البنفسجية المواج. ازهارها يستمر من نيسان الى تموز.

٢٩٩٠٥ - هسبرنتية صغرىة الورق

Houstonia serpyllifolia (S). *Houstonie à feuilles de serpolet* (F).
نوع من المستوية. ساقها خضراء تحيلة تملو من ٨ الى ١٥ سم. اوراقها كاورق الصنوبر البري شكلًا وقد ولوًا. ازهارها زرقاء اللون، فردية التجميع. تنورها يستمر من ايار الى آب.

٢٩٩٠٦ - هسبرنتية

Hister (S).
جلس حشرات مفترسة من فصيلة الحسبريات. انواعها عديدة، جميعها صغيرة القد بطول يراوح من ١٥ الى ٢٠ سم. لونها الى السواد اللامع يملو تنقيط وتبييض اخر || رقائقها قاصصة مفترسة لا تمتد من كل حشرة تستطيع انيا سيقا. اشهر انواعها :

هسبرنتية احمر الغمد *Hister purpurascens* (S).
هسبرنتية النقط *Hister uncinatus* (S).
هسبرنتية رباعي النقط *Hister quadrimaculatus* (S).
هسبرنتية لا متساوي النقط *Hister inaequalis* (S).

٢٩٩٠٧ - هسبرنتية أحمَر الغمد

Hister purpurascens (S). *Hister pourpré* (F).
Hister purpurascens (E).
حشرة نائلة جامة من فصيلة الحسبريات وربة غمديات الاجنحة. تألف المراعي وحبوب الطرقات والمواقع القريبة من العمران وكل مكان يكثر فيه القروا والزبل والقمامة || جسمها صغير القد بطول نحو ٥ سم. لونها الى السواد المالحق غمداء الى الحمرة الارنبانية. رأسها صغير الحجم. عينها صغيرتان. زباناها صوفياتان. ظهرها سداسي التخديف السدي، يلحف ثلاثة ارباع البطن. ارساغها خماسية النعل || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجبلانة في اوائل الربيع وتميش حتى اواخر الصيف. تسافد في اواخر آب وتخت الحكن في اكرام الزبل ... || البرقة عند كمال نموها تقطو نحو ١٢ سم. جسمها شبه اسطواني للشكل، اغبر اللون، كسني الرأس والشرج والرواجب، مشطال الجانبين، مهدب النعل.

السمة السوداء المواج. رواشن ذكورها جراء اللون، خضر الزراكش والباليج والتجاذج. رواشن انثاها الى السمة يملوها تبييض ابيض. يكثر ربيدها من ايار الى آب. رقائقها تركيب القرمط وسائر الحيازيات.

٢٩٩٠٦ - هسبرنتية، زهرة الحبيب

Hesperantha (S). *Hespéránthe* (F).
Hesperantha (E).
جنس نباتات عشبية دوفسية من فصيلة السونيات. منتبها بعض مناطق افريقية الجنوبية. اوراقها ثنائية الصف، ضيقة النصل. ازهارها سنبل التجميع. ازهارها صغيرة القد، فواحة العرف المطري تفتتح عند غروب الشمس || انواعها المرفقة قليلة العدد، أشهرها التالية :

٢٩٩٠٧ - هسبرنتية زرقاء

Hesperantha pilosa (S). *Hespéránthe velue* (F).
نوع من الحسبرنته. ساقها شراخية ترتفع من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقها حلالية ومزينة. ازهارها سنبل التجميع. ازهارها صغيرة القد، يضاء اللون من الخارج والداخل || تنورها يستمر من نيسان الى ايار.

٢٩٩٠٨ - هسبرنتية قرفية العرف

Hesperantha cinamomea (S).
Hespéránthe à odeur de cannelle (F).
نوع من الحسبرنته. ساقها شراخية ترتفع من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقها جرداء غمدية السطح. ازهارها سنبل التجميع. ازهارها صغيرة القد، قرفية العرف. بتلاتها الداخلية الى الحمرة الخمرية. بتلاتها الداخلية يضاء اللون || تنورها يستمر من نيسان الى ايار.

٢٩٩٠٩ - هسبرنتية منحنية

Hesperantha recurvata (S).
Hespéránthe recourbée (F).
نوع من الحسبرنته. ساقها شراخية نشيطة ترتفع من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها مقعرة السطح، جرداء النصل. ازهارها سنبل التجميع. ازهارها كبيرة القد مجنحة الانابيب، حر البتلات الخارجية، يبيض الداخلية || تنورها يستمر من ايار الى حزيران.

٢٩٩٠٠ - هسبرنتيات

Hesperilidae (S).
Hespérilés, Hespérilées (F). *Hesperilées, Common Skippers* (E). *Dickcopfalter* (D).
فصيلة حشرات من سرفشات الاجنحة. اجنحتها وانواعها كثيرة العدد. جميعها صغيرة القد. ورووها غليظة. قربها الاستشادية دقيقة منفردة. ارجلها الامامية تامة النمو. بطونها كبيرة. مكثا قلنسوي الشكل. رقائقها عارية او مشيرة الحلب، مستطلة الاطراف، خضراء الوسط. خادراتها تلتصق بطلاف يقب الصلصة متين الحباك شبه الشرفة تسلمه بين الاوراق المتشابكة || اشهر انواعها واضرها بالانصداد الزراعي الحسبر والثرزين والياروز واليانوف والكركرود.

٢٩٩٠١ - هسنته

Funkle (F).
هي الفسكة، نبات من الزنبقيات. اطلمها.

٢٩٩٠٢ - هسبرنتية

Houstonia (S).
Houstonie (F).
جلس نباتات مفردة التعريف على اسم العلامة هسنت



هسنته



هسبرنتية



هسبرنتية احمر الغمد

٢٩٩٠٨ - هَيْسْتِيرُ رُبَاعِيّ النُّقْط *

Hister quadrimaculatus (S). *Hister* à 4 points (F).
Hister quadrimaculatus (S).

حشرة ثالثة جسامه من المستيريات ورتبة مغذيات الاجنحة. تألف الزوارع والمواقع القريبة من العمران لانها تعيش على الخبث والروث وفي المزابل || جسمها صغير اللد يتولى من ٨ الى ١١ سم. قوتها الذ السواد اللامع يطوى في كل غمد يفتحان ابروانيتان. ورأسها صغير الحجم ، ضليح الفكين. زباناها صويغانيان. صحتها صغرتان. ظهرها رباعي التضخيد الصدي ، يلفث ثلاثة ارباع البطن. ارساها خماسية العقول || الاثنى اصغر لداً من الذكر واهت ثوباً منه واقصر زبانا || لها جيل واحد في الحول. تظهر اخشرة الجملالة في اواسط الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف. تتساقط في اواسط شهر آب || البرقة عند كمال نموها تطول من ١٨ الى ٢٤ سم. جسمها مدني الشكل ، اغبر اللون ، اسود الرأس والشرح والرواسب. مثلل الجائنين الايمن والايسر.

٢٩٩٠٩ - هَيْسْتِيرِيَّات *

Histeridae (S).
Escarots, *Histérídes* (F). *Steele beetles*, *Hister beetles* (E). *Stutzkäfer* (D).

فصيلة حشرات مغترسة ناعمة من رتبة غدييات الجناح. اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها صغيرة اللد لامة الثغوب. قرونها الاستشارية مرفقة الشكل ديبوية الطرف. جواميزها الامامية مجهزة الحفر. رفاقها مغترسة تعيش في ائتفاق تحللها في المواد العضوية وتقتطع لاء الاجنار اليابسة. اهرق اجناسها واشهرها المستير والحفوس والذئوس والصبرين.

٢٩٩١٠ - هَيْسَاب
Acacia du Sénégal (F).
هو سبط السقال ، اطليه.

٢٩٩١١ - هَيْسَار *

Echinaria (S). *Echinaire* (F).
جنس نباتات عشبية ، برية ، حولية من فصيلة النجيليات. انواعه المعروفة قليلة العدد متبث بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || سوتها كثيرة الاضواء. مصفها ضيق ، مستطيل ، شثن اللمس. ازهارها سنبل ، متالها مركبة متجاعدة.

٢٩٩١٢ - هَيْسَاش *

Melacophaga (F).
Melacophagous (E).
نمت ترميفي يطلق على كل حيوان او طائر قوته الرضويات والدندان. الحلف طائر هشاخ.

٢٩٩١٣ - هَيْسَتْة

Hechtia (S). *Hechtie* (F).
جنس نباتات عشبية مسرة جادسة من فصيلة الانناسيات. اوزانها قرصية الالتفاف صغيفة الشكل لينة الصفة الجلمدة. نصلها ملون الصفة العليا ، اغبر السفل ، شاكك الحافة. ازهارها غراسية الارتكاز ، لاقياسية التجميع. اشهر انواعها ما يتبع.

٢٩٩١٤ - هَيْسَتْة لَصْبِيَّة

Hechtia argentea (S).
Hechtie argentea (F).
نوع من المشته. مصفها يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم. نصلها فضي اللون له مصفحه. اشواك حشاشها كركسية التجميع عجيبة الاطراف. ضراخها فردية. ازهارها نسيمة. هابة الارتكاز ، يبيض اللون. ازهارها صبي.

٢٩٩١٥ - هَيْسَتْة نُنْقَدِيَّة

Hechtia glomerata (S). *Hechtie à glomérules* (F).
نوع من المشته. مصفها يطول من ٢٠ الى ٥٠ سم. نصلها اغبر الصفة العليا يحمر مع التقادم. اشواكها كركسية التجميع عجيبة. ازهارها نسيمة ، رتاجية ، يبيض اللون. تقوم على غراسين او ثلاثة ضاربخ تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ازهارها يستمر طوال فصل الصيف

٢٩٩١٦ - هَيْسَر ، هَيْسُور

نمت ترميفي يطلق على الاجنار النفيضة التي يلفظ وثقا سرياً.

٢٩٩١٧ - هَيْسَيْشَة
Feuille de plante herbacée (F).
ورقة كل نبات عشبي مهما كان نوعه.

٢٩٩١٨ - هَيْسُور *

Halosaurus (S).
Halosaura (F). *Halossaurus* (E).
جنس اسمك بحرية من مفصوات المثانة وعلية الصابوريات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة ، ضيقة ، معتدلة التخطيط. تطول نحو ٤٠ سم. رويها صغيرة شبه ودية الشكل. فكوكها العليا تتقدم السفلى. زعانفها الظهرية شرابية الشكل ، الحوضية مروحية ، الصدرية صغيرة. الشرجية مستطيلة تمتد حتى طرف الذيل المامد الزعنفة. اثوابها قفصية تمبق بمص الشبه في الظهر || لحمها مأكولة انما مبتلة.

٢٩٩١٩ - هُيْسون *

Hussonia (S). *Hussonie* (F).
جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق البلاد الحارة || سوتها فرعاء قليلة الغذاء. فرووها عاذية الزغب. لوزانها متعاقبة ، احادية التفصيل الريشي او ثنائية. ازهارها صغيرة ، عطية البتلات ، ثنية اللون || تنويرها صبي.

٢٩٩٢٠ - هَيْسَم ، هَيْسُوم
Digestif (F).
Digestive (E).
المضام والمضام هو ما له قوة الهضم التي تحول الاغذية وتجعلها قابلة للتشغيل.

٢٩٩٢١ - هَيْسَامَة ، فَاغُوسِيَّت

Phagocyte (F).
خلية في الجسم الحيواني تتولى على الجسيمات الضوئية وغير الضوئية تقضي عليها.

٢٩٩٢٢ - هَيْسَم
Digestion (F).
جام الاعمال الطبيعية الميكانيكية والكيميائية التي تحول عناصر الغذاء الى مواد تمثيلية يستفيد منها الجسم.

٢٩٩٢٣ - هَيْسُوم

Peptone (F).
هي المواد الاحية المهضومة. راجع بيتن.

٢٩٩٢٤ - هَيْسُمِين

Pepsine (F). *Pepsin* (E).
هي خيرة الهضم في حصاره المعدة وهي التي تحول المواد الاحية الى هضمون. راجع بيتن.

٢٩٩٢٥ - هَيْسِيل *

Anastre (F).
هصيل م. هفيلة. نمت ترميفي يطلق على كل نبات عديم الازهار.



هَيْسَر رُبَاعِيّ النُّقْط



هَيْسُور



مطلة



هفة جزارة



هفة مرقوق



هفة سمراء



هفة حطلماء

٢٩٩٦٦ - مُطَلَّة ٥

Piflocat (F).

Peculation, Embezzlement (E).

المطلة سرقة الاموال الاميرية من قبل المولج بمجانبها .

٢٩٩٦٧ - مُطَلَّع ٥

هو الخلي القروزي ، اطلبه .

٢٩٩٦٨ - مُطَبِّلَة ٥

Eupomatia (S).

Eupomatie (F).

جنس نباتات جنينة برية وتربيتية من فصيلة المطيليات . لها نومان تقط المطيلة الغارية والشرقية . اصطفاها تمتد من الهند الى الجزر فاسترالية || ساقها مرعاء قليلة الفروع . اوراقها متعاقبة ، مستنقة ، اهليجية النصال الجمادة الزاهية الخضار . ازهارها كبيرة ، فردية ، حيلة الشكل ، حمراء اللون او صفراء ، مخزوية الانتساب او طرفية .

٢٩٩٦٩ - مُطَبِّلِيَّات ٥

Eupomatiaceae (S).

Eupomatiacées (F). Eupomatiaceas (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . اجناسها وانواعها قليلة العدد اصطناعت تمتد من الهند الى اليابان واوراقها || جميعها مخزيرات وجنبسات . سوقها مرعاء . اوراقها مستنقة ، متعاقبة ، اهليجية النصال . ازهارها فردية ، كبيرة ، لسينية البتلات العديدة ، حيلة الالوان الزاهية || اشهر اجناسها المطيلة .

٢٩٩٣٠ - هِف ٥

Athérine (F).

هو الحساس ، من الاسماك الصغيرة ، اطلبه .

٢٩٩٣١ - هِفَة الْمُتَوَسِّط ٥

Saucelet

سكة بحرية تدمى قفقوش ، اطلبها .

٢٩٩٣٢ - هِفَة جَزَارَة ٥

Ephydra macellaria (S).

ذبابية صغيرة من الحفيات . طولها نحو ٣ م. ثوبها الى الأخضر النعاسي الازرق . اجنسها وارجلها الى الصفرة . تعيش على سطح الماء ، يكثر ويوجد في مناطق الارض حيث تلتج بمكبها الذي يتقف من يرقات تعيش على المواد الضوية وقد تلتشب بجلود الارض ويذيراته فضتها من كامل تطورها للتشوي فتسبب تلأخير النمو وضعفه .

٢٩٩٣٣ - هِفَة سُرْعَالِيَّة ٥

Ochthera mantis (S).

Mouche mante (F).

حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة الحفيات . جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٦ م. ثوبها الى الوردية السمراد . رأسها مستعرض . عظمها قصير . زباناها صغيران ، دقيقان اسمران . عيناها كبيرتان ، نافذتان قرمزيتان . الزوج الامامي من قوائمها قريب الشبه بطنافي السروقة ، الفتق مستطيل شالك والظنوب مقوس ينتهي بمخض ساد . ووشاها كبيران ، اسمران . قوائمها الى الاسرة || تظهر الحشرة الجملانة من اوائل تموز الى اواخر ايلول . تسرح قرب مجاري الماء .

٢٩٩٣٤ - هِفَة سَمَرَاء ٥

Teichomyza fusca (S).

Teichomyze brun (F).

حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة الحفيات . جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٦ م. يطوى طلب مستطيل مسطح . ثوبها الى السمره الخفيفة المولج . رأسها كبير اسمر اللون . عظمها محتال للقد . زباناها صغيران ،

نحيلان . عيناها نافذتان ، جزويتان . ووشاها كبيران ، اسمران . قوائمها قصيرة الملب ، سمراء اللون || الحشرة الجملانة مويضة على مدار السنة انما يكثر عددها في فصل الصيف والخريف || مسرهما الحادائق المنزلية والمراحيض || يرقاتها تعيش في المراحيض على المواد الضوية .

٢٩٩٣٥ - هِفَة طَحْلَاء ٥

Hydrellia griseola (S).

Hydrellie grise (F).

ذبابية صغيرة من الحفيات . طولها يراوح من ٢ الى ٣ م. ثوبها الى الرمادي الاطلس . زباناها وارجلها سود . يكثر ويوجد من ايار الى ايلول . تمتج مكبها على مختلف النباتات المائية وعلى بعض النباتات البرية ينقف عن يرقات ناعمة ، دقيقة ، مستطيلة تلتج نصال الوراق وتسبب اصفرارها وذبولها .

Ephyridae

٢٩٩٣٦ - هِفَات ٥

فصيلة حشرات ذبابية من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها نداء ٣٠٠ ، يكثر ويوجد قرب الماء ولون سطحه . طيراتها بطيئة الحركة . تجمعهاها خالطة العدد . تعيش على النباتات المائية وعلى الصغور التي تكتنفها المياه . وهي من الحشرات الواجبة الحواكة وقد تكون نائلة في ظروف خاصة || انماها تمتج المكان في لسج البتات وقد تلقه على صفحات الماء او ترز في وسط المنافع || يرقاتها قد تكون ارضية او مائية فالارضية حواكة خاصة تعيش على المواد النباتية المنحلة وقد تلتج سوق اوراقه . اما المائية فتعيش في جميع انواع المياه من العلية الى الاجاج وتحمل في طرفها انوية شربية مقلاعية ثقابة تستخلص بواسطها ، من التسج النباتية ، ما تحتاج اليه من اكسين .

٢٩٩٣٧ - هِفَقَة ٥

الحقمة منزل من منازل القمر الشامية وتدمى رأس الجوزاء وهي ثلاثة نجم نيرة ليل منكب الجوزاء قريبا بعضها من بعض كالاناث . سميت هفقة تشبهاً بمرص زور القوس الذي يقال له الحقمة . وعندما تطلع مع القمر يشتد حر الصيف || رقبها الحقمة يدمى الشولة .

Autruchon (F).

٢٩٩٣٨ - هِفَل ٥

هو الرأل ، اطلبه .

Erogène (F).

٢٩٩٣٩ - هِكَاكِي ٥

Erogenic, Erogenous (E).

ما من شأنه اثارة الشيق .

Hectare (F).

٢٩٩٤٠ - هِكْتَار ٥

قياس مساحي يوازي حشر دلمات او مئة آر او عشرة آلاف متر مربع .

Hectogramme (F).

٢٩٩٤١ - هِكْتُوْغْرَام ٥

قياس وزني يساوي مئة غرام .

Hectolitre (F).

٢٩٩٤٢ - هِكْتُوْلِيْتَر ٥

قياس حجمه يساوي مئة ليتر .

Pelobates (S).

٢٩٩٤٣ - هِكْرَس ٥

Pelobate (F). Pelobates (E).

جنس ضفادع من فصيلة الهكربسات . انواعه المعروفة

لثلاثة. أعطائها الشرق الأوسط ومعظم الإصقاع الآروبية المتعددة الحرارة || يتبين برفاعة الثوم التي تفوح منه عندما يؤخذ وبتقنيته الحاد المتتابع وباستمالة بلاصيط التي يبلغ طولها نحو ١٧ سم. || أشهر أنواعه الهكس أسمر وهكس الشواطئ.

٢٩٩٤٤ - هيكس أسمر *
Palobates fuscus (S).
Palobate brun (F). Brown Palobates (E).

نوع من ضفادع الهكس ، هذه الشرق الأدنى ومعظم الإصقاع الآروبية || جسمه صغير القند مربع الشكل يطول نحو ٧ سم. عند الذكر نحو ٩ سم. عند الأنثى رأسه مستعرض الجرم ، قصير الخلف ، عيناه كبيرتان ، جاحضتان . حذقة عينه عمومية الارتكاز . جلده متعبد انضوئ المسامية تتخللها غدد غازرة || ثوبه إلى السرة الخطيئة يعلوها تبقيع جلوي ورقشة بنية || يعيش قرب الماء . سميه قفر قصير المدى . يسرح في الليل ويبيت في النهار داخل انفاق يحفرها في التربة البنية على عمق يراوح من ٢٠ إلى ٥٠ سم. || قوته الحشرات المختلفة والديدان || أثناء تسرأ الدجبل ضمن حبال دقيقة تلفها على النباتات المائية التي لا يفترها الماء أكثر من ١٠ سم. || بلاصيط كبيرة القند تطول نحو ١٥ سم.

٢٩٩٤٥ - هيكس الشواطئ

Palobates cutripes (S). Palobate cutripède (F).
Cutriped Palobates (E).

نوع من ضفادع الهكس . أصلانه تمتد من الشرق الأدنى إلى أوروبا الجنوبية والغربية || جسمه متوسط القند ، مجموع الشكل يطول عند الذكر نحو ٩ سم. ويطول عند الأنثى نحو ١١ سم. رأسه مستعرض الجرم ، قصير الخلف . عيناه كبيرتان جاحضتان ، تعلوها قناتان مستديرتان . حذقة عينه عمومية الارتكاز . جلده قليل التملل والندد الغازرة . ثوبه إلى الخضار الأسمر يعلو تبقيع عايق ورقشة سوداء لامعة || يعيش قرب الماء . سميه قفر قصير المدى . يسرح في الليل ويبيت في النهار داخل انفاق يحفرها في رمال الشواطئ والكتبان التي يفضلها على غيرها من المواقع || قوته الحشرات والديدان || أثناء تسرأ الدجبل ضمن حبال دقيقة مستطيلة تلفها على بعض النباتات المائية التي لا يفترها الماء أكثر من ٨ إلى ١٠ سم. || بلاصيط كبيرة القند تطول نحو ١٧ سم.

٢٩٩٤٦ - هيكس سيات *
Palobatidae (S).
Palobatidae (F). Palobatidae (E).

فصيلة حيوانات درداء قازية من لمة الوبقيات ورتبة السنويات ورتبة عديمات الذنب || أجناسها وأنواعها عديدة منتشرة في معظم أقطار العالم . تصنيفها الشوزي يأتي بين الفصاجيات والمجموسيات || أعرف أجناسها وأشهرها الهكس والكربوس .

٢٩٩٤٧ - هيكس *

Hocoes
جلس طير من فصيلة الغرناسيات . أنواعه قليلة جميعها مستطيلة الشكل قوية انشطار الخلفيل الأسجين تعلو لحمية تعلو الشكل . رؤوسها قنزعية الريش . أجنحتها مستعرة . أذيالها طويلة ، أولها إلى السرة الناذكة . بطونها يعض . تألف الإحراج والغذيات الظليلة . قوتها البئر والجوهر . تعيش ذكراً وأنثى . تدش عشها في الأشجار . أتناها تبيض نحو ٤ بيضات تحضنها وحدها أربعة أسابيع .

٢٩٩٤٨ - هيكسية *
Hexabranchus (S).
Hexabranchus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مملكات الاربل غلافيات الخياشيم فضيلة للوروسيات . أنواعها المعروفة قليلة البند أعطائها جمار معظم المناطق الحارة من المحيط الهادي والهندي || أجسامها عريضة الهلالية مبطنة . رؤوسها صغيرة لرؤوسها كبيرة . خياشيمها سداسية الأتانيب الدقيقة . أربلها وحيدة مستعرة .

٢٩٩٤٩ - هلال *
Lunula (F). Lunula (E).

شبة شكلها كالمحلل .

٢٩٩٥٠ - هيلالية *
Heterotoma (S).
Hétérotome, Oiseau pendu (F).

جلس نباتات جينية معمرة من فصيلة القرطيات . مهدها المكسك . أنواعها المعروفة قليلة البند ، زرع الزرين . أربلها متعقة متعاقبة يشبه الشكل ، تفصلها جامد الصفحة سنن الحافة . أنزهارها عتقوي التجميع . أنزهارها كبيرة القند صفراء اللون أو حراء ، شكلها كالمحلل الملحق . تنورها يستمر طولاً فصل الصيف .

٢٩٩٥١ - هلام ، جيلاتين
Gélatine (F).
Gelatine (E).

مادة لزوية تستخرج من نسيج الحيوانات .

٢٩٩٥٢ - هلاميات ، مضططيات
Deuteromycetes, Myxomycetes (F). Deuteromycetes, Myxomycetes (E).

رتبة من التطور عديدة الفصائل والأجناس . تطورها كحل حلالية لا شكل لها تعيش على الأخشاب البنية وعلى الاشنة والطحالب ...

٢٩٩٥٣ - هلاهل
هو الاكثبات الملهل ، اظله .

٢٩٩٥٤ - هلب
Crins, Soles, Jarres, Jards (F).
Coarse hair, Silken hair (E).

ما غلظ من الشعر كسبب ذب القرس ووبر اللثة وشعر الخنزير ، اللع .. وأسدته حلبة .

٢٩٩٥٥ - هلبكة *
Pilosité (F). Pilosity (E).

٢٩٩٥٦ - هلبوس *
Holobus (S).
جنس حشرات من فصيلة الذنابات . أنواعه قليلة البند جميعها صغيرة القند طولها يراوح من ١ إلى ٣ م . أولها إلى السرة السوداء ، أربلها وقربها الاستشارية إلى الشفرة . تركيب الأجزاء وتعيش تحت لحاء الأشجار السقيمة السائرة نحو اليباس .

٢٩٩٥٧ - هلبوس أشنع الزئبان *

Holobus flavicornis (S). Holobe à antennes
rousses (F). Holobus flavicornis (E).

حشرة وأشعة هواكة من فصيلة الذنابات ورتبة غذيات الاجنحة . تألف الإحراج والحذاق والجائفل . غناشها تعيش على طلع الأزهار . يرتقاها تعيش على المواد الخشبية المتحللة في سرايب الحشرات الخاشية || جسمها صغير القند يطول نحو ٢ م . ثوبها أسود . زباناتها وبريزما إلى الصفحة الصفراء . رأسها صغير الجرم . عيناه صغيرتان .



هكس اسمر



هكس



هلالية



هلبوس

Tuberculosis (F).

٢٩٩٦٤ - هتس

هو مرض السل عند الحيوان .

Helostoma (S).

٢٩٩٦٥ - هكستوم

Helostoma (F). Helostoma (E).

جنس اسماك نهريه من شائكات الزعانف وفتة البلوميوات النجيه . انواعه المعروفة قليلة العدد ومنها اهر مايزيه . جسمها تفجر من الماء وتفرح في البر بمض الرقت || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة ، تطول من ١٥ الى ٢٥ سم . رؤوسها متوسطة الحجم ، مخروطية الشكل ، صغيرة الاضام والاشداد . عيونها كبيرة جاحضة . زعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة ، كثيرة المناخس اللويه . زعانفها اللويه مقطوعة الاطراف . اثوابها تراوح بين الشقعة النحاسية الموانج والوسمة الخضيه ، جميعها منسجه بنظوظ قاطبة اعين من اللون السائد || لحومها جيدة الصنف ، مرغوب فيها .

٢٩٩٦٦ - هكسونيات

Alcyonaires, Alcyonaires (F).

شعبة حيوانات بحرية من المزهاريات . مدافعها ثمانية القوامس عديدة الشيلات . هياكلها ، إن قترية المادة او كلسية ، حراء اللون او زرقاء .

Helicina (S).

٢٩٩٦٧ - هيلسيكة

Hélicine (F). Helicina (E).

جنس حيوانات برية من الرخويات مبهيات الارجل وفصلية الخلويات . انواعها المعاصرة المعروفة كثيرة العدد ، نحو ٥٥٠ ، منتشرة في جميع الاقطار الاستوائية باستثناء افريقية . تعيش في المواعظ الرطبة وبعضها يتسلق الاشجار || اصداها صغيرة شبه كروية الشكل صغيرة الاضام المحزنة القليلة التلو .

Arracher (F). To grub up (E). ٢٩٩٦٨ - هتس

Arrachage (F). Pulling up (E). ٢٩٩٦٩ - هتس

٢٩٩٧٠ - هتس صوفي

Holcus lanatus (S). Houlgus laineuse, Petite fennase (F). Meadow soft grass, Velvet grass (E). Wolliges Honigrass (D). Olco lanoso, O. vellutato (I).

نبات عشبي بري مرعوي من فصيلة النجيليات . يدخل في اخلاط زور المراعي الاصطناعية . ثمة حلف جيد الصنف || ساقه فارغة ثنائية او ثلاثية الاشطاء . سلفه انضصر التصل المتوسط القد . ازهاره سنبلية التجمع يملو زغب لبد كالصوف . يزوره مستطلة مبطلة .

Holcus mollis (S). ٢٩٩٧١ - هتس مداد

Holcus mollis, Houque molle (F). Couch grass, Rot grass, Soft grass (E). Walches Honigras, Weiches Wollgras (D). Olco molle, O. setaceo (I).

نوع آخر من الخلفس وهو نبات عشبي بري مداد معمر من النجيليات . يكثر في الاراضي المزروعة المرورية وهو كالنجيل من النباتات الضارة الواجب استئصالها من التربة . ساقه فارغة رطبة ، سلفه ضيق التصل . جلوه مدادة كثيرة الانتساب .

٢٩٩٧٢ - هلكوفيل ، هليكوفيل

Helicophyllum (S). Hélicophylle (F).

جنس نباتات عشبية من فصيلة القلقاسيات . انواعه

زياناما غيلاني . ظهورها خلى القشار يلحف نحو نصف البطن . ارساغها خماسية المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في مطلع نيسان وتعيش حتى اواسط تموز . تساقط في سيران وتجمع المكن في مفر التفت الذي تبيض فيه || البرقة عند مجها الكامل تطول نحو ٥ سم . جسمها ديبوي الشكل . ثوبها الى التربة السمراء . رأسها وبرازها سود .

٢٩٩٥٨ - هتتي ، لسان العصفور المر

Holarrhans (S). Holarrhane (F). Holarrhans (E). Ruhrholarrhans (D). Olarrhans (I).

جنس شجيرات طيبة برية من فصيلة الدفليات . انواعها قليلة ، اعطتها الهند . سوقها سرسة فراء . اوراقها متعقة متعاقبة اهليلجية التصل الامر الجامد . ازهارها حشوكية التجميع تاجية الاوتكار زاهية الالوان الخفلة || ازهارها وزورها وجفورها طيبة تستعمل في عدة علاجات معوية .

٢٩٩٥٩ - هتج * ، هتج ، بلح العنصرة ، زكون ، زكون

Balanites aegyptiaca, Ximanla aegyptiaca (S). Balanite, Dattiar du désert, Zacon, Zacon (F). Egyptian balsam, Thorn tree, Zachum oil tree (E). Zachunbaum, Agyptischer Zahnbaum (D). Dattaro deserto (I).

جنية شائكة الاقدان والافان من فصيلة السليات . اوراقها متعقة ، ثنائية الانتساب ، يضية الشكل ، مستطيلة . تصلها جامد الصفة . يهاث انضار . ازهارها محورية الاوتكار . ثمارها نوبية كالتزيت ، حامزة ، مرة ، تسهل المعدة قبل ادراكها ، سكرية الطعم مأكولة عند نفسها . ويستخرج من جسمها دهن مأكول يستعمل استعمال الزيت .

Autoclave (F). Sterilizer (E). ٢٩٩٦٠ - هلتجاب

مرجل يحكم اليد يستعمل التطهير بواسطة البخار المضغوط .

٢٩٩٦١ - هلتزين الزيتون *

Hylesinus oleiperda (S). Hylésine de l'olivier (F).

حشرة من الكرشيات . طولها يراوح من ٣ الى ٤ سم . ثوبها اسود اللون ، غدها منسجة بالاسر || تركب الزيتون فتصلع شكير افاده وافاته السقمة الضعيفة الجهرية . انفاقها وسرايها تشبه انفاق وسراي اليرقان الا انها اقل عددا واستطالة .

٢٩٩٦٢ - هلتزين الصنوبر *

Myelophilus piniperda (S). Hylésine du pin (F).

حشرة من الكرشيات . طولها نحو ٥ سم . ثوبها الى السرة السوداء طولها خلى سنلي || الحشرة الكاملة تنقل حاء الخواصب لتعيش حل صناعتها ثم تخرج مكنها داخل السرداب الرئيسي لينتف من رقات تلج الشكير في جميع الاتجاهات ابتداء من السرداب الام || جيلها صولي . مكانتها صبة .

٢٩٩٦٣ - هلتزين المران *

Hylesinus fraxini (S). Hylésine du frêne (F).

حشرة من الكرشيات . طولها نحو ٣ سم . ثوبها كسني اللون ، غدها متعددة بالاسر يملوها خلى اسفل || تركب المران فتصلع شكير اغصانه . يكثر وجودها في الاغشاب للفقوة .



هلتج



هلتزين الزيتون



هلتزين الصنوبر



هلتزين المران



هلتسوم



هليكة



هلتس مداد

هلتس صوفي



هولد الناتج

المعروفة اريمة منبثبا السواحل البحرية . اوراقها معتقة
خطية . ازدهارها عريضة وسيدة الشق تنمها ضبة نحيلة .
ثمارها عنبية قدتها قدر الحمص .

٢٩٩٨٢ - هِلْكِين * خنزير اَبُو قَرْتِين

Phacocherus (S). Phacochère (F).
جنس حيوان من فصيلة الخنزريات . رأسه قبيح الشكل
مخع تعلوه لمل جلدية . فظفطه مفلطحة مستطيلة .
اذناه صغيرتا القد لثقتان . فطرته طويلة الملب . انياه
كبيرة مقوسة تطول نحو ٢٣ سم . قظرها عند قاعدها يراوح
من ٤ الى ٥ سم . ذنبه طويل دقيق || موته افرقية
الاستوائية . قوته الجلود والجرب والبار . يعيش اجامات
يراوح عددها من ١٠ الى ٢٠ || له نومان اعشيش
والانثري .

٢٩٩٨٤ - هِلْكِين اِثْرِيَنِي

Phacocherus africanus (S). Phacochère africain (F).
African wart-hog (E).

نوع من الملوغ . طوله نحو ١٧٥ سم . وارتفاعه ٧٥ سم .
ثوبه الى الخطي الاصعب . ظهره ابيض من بطنه . فطرته
مستطيلة الملب . لونها الى الخطي الاسفر . رأسه كبير
وظليل . فظفطه مفلطحة || موته المناطق الاستوائية .

٢٩٩٨٥ - هِلْكِين حَيْثِي

Phacocherus aethiopicus (S). Phacochère d'Ethiopie (F). Ethiopian wart-hog (E).
نوع من الملوغ . يتميز بظفطه الطويلة وضبابته القارنتين .
طوله من ١٥٠ الى ١٦٠ سم . طوله من ٦٥ الى ٧٠ سم . ثوبه
الى السرة الخطية . ظهره ابيض لوناً من بطنه . فطرته
مستطيلة الملب الاسود . || موته الحيشة والزبير والكبر .

٢٩٩٨٦ - هِلْكِين * هِلْكِين

Heliases (S). Hélias (F). Heliases (E).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة السلبيات
انواعه المعروفة ١٢ اصنافها المحيط الاطلسي والبحر الابيض
المتوسط || اجسامها شبه بيض الشوزن . مبطلة . تطول
من ٢٥ الى ٣٥ سم . اصنافها صغيرة . عيونها نافذة .
زمانها الظهيرة شاذكة والليلية غائقة || لحمها متوسطة
الصفت . مأكولة .



هليس

٢٩٩٨٧ - هِلْكِين * هو الملعج . اعطيه .

٢٩٩٨٨ - هِلْكِين دَقِيقَة

Triphleps minuta (S). Triphleps menu (F).
حشرة مقترنة من فصيلة القترسيات . جسمها شديد الصغر
يطول نحو ٣ سم . ثوبها الى السرة السوداء تشبه في الرأس
والكويل والحجفة وفي اطراف الحنجرتين . حنجرتها
الى الشقعة الصنابية تلوها نمشة سمراء . ورشاتها الى
النيرة الشهباء || تألف جميع المرقع التي تكثر فيها
الاعشاب . تعيش بين الارواق وفي الجلالة . قوتها ما
تستطيع قصه من نقت الحشرات .

٢٩٩٨٩ - هِلْكِين * هِلْكِين

Heliactin (S). Héliactine (F).
طائر وحيد الجنس والنوع من الجواثم ريفات المناطق
فصيلة القترسيات . موته ارمكة الجنوبية || جسمه
صغير . اجوف يطول نحو ١٥ سم . رأسه مزين الجانبين
بارياش قسطانية اللون . منقاد يقين مستطيل . جناحاه



هليكين

٢٩٩٧٣ - هِلْكِين

الحلل نسج التكبوت وأول المطر .

٢٩٩٧٤ - هِلْكِين * الحلم : ثلج الجبل .

٢٩٩٧٥ - هِلْكِين

هو الحكاك . مرض جلدي .

٢٩٩٧٦ - هِلْمَتِيَنَز

Helminthase (F). Helminthiasis (E).
مرض درد الاعضاء . ومن سببه وجود الديدان ونحوها وتكاثرها
في الاعضاء .

٢٩٩٧٧ - هِلْمُوش

هو الكشش الاسود . اعطيه .

٢٩٩٧٨ - هِلْمُشَل

Aconit féroce (F).
هو الاكويث الملهم . اعطيه .

٢٩٩٧٩ - هِلْمُشَل

Ploce de neige (F). Snowflake (E).
هو الجالحة اي كبة الثلج عند سقوطها على الارض .

٢٩٩٨٠ - مَلْدُ المَنَالِيع * ، مَلْدُ صَير

Malodes minuta (S). Hélode chéatif, Hélode manu (F). Helodes minuta (E).
حشرة خاضعة رابطة من فصيلة الملوديات ورثة مفعفات
الاجنحة . تألف المانع وضفاف مجاري الماء . غناصها
تعيش على صفت الاغشاب واوراقها . يرقاتها رابطة تعيش
في محيط الجلود التي تركبها وتقضي عليها || جسمها صير
القد يطول من ٦ الى ٧ سم . ثوبها الى الصبغة . وأنها
صغير الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها خطيطان .
ظهرها مستدير الطرف الاصح الفار . تحيل للتحيز
الغصفي . كتيوف الخيل . ارساغها خاضعة المقل || لها
جبل واحد في الخيل . تظهر الحشرة الجملة في ايار
وتعيش حتى اواخر تموز . ترحل في التبار . تساقد بعد
ظهورها بنحو ستة اسابيع . تنجح المكن . محاديا تحت
العبل او في ارويات الاعشاب المتفعية || البرقة بطيئة
النمو . تطول عند ادراكها التام من ٨ الى ١٠ سم .
جسمها مردني الشكل . سداسي الرواجب القصيرة . الفير
اللون . اصفر الملوغ . اسمر الرأس || طور الاكمال
الذي يستمر نحو ٣٥ يوما ينقضي في التربة .

٢٩٩٨١ - مَلْدُ يَات * هِلْدُ يَات

Helodidae (S). Helodidae (F). Helodidae (E).
فصيلة حشرات رابطة من ورثة مخمديات الجناح ||
اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من حشرات
البلاد المعتدلة الحارزة . تألف المواق الرطبة . قوتها صفت
الاعشاب واوراقها . يرقاتها رابطة تعيش في محيط الجلود ||
اجسامها صيرة القد . اهليلجية الشكل . خلية اقشار .
مستعرضة الرؤوس الصغيرة . مستطيلة الزباني الخفية .
قوية الجرامز . خاضعة المقل الرسفة || اشهر اجناسها
المَلْدُوس .



هليكويا



هلي



هليوت ركي



هليوت مسلح



هليوت رب



هليوت ريس

ذريا الاطراف . ذيله راجي الرقال . ثوب الذكر الى الخضار الاسفع ، رأسه الى الزرقه ، زوره وعصره سيد . بطنه ونكاته يفس . ثوب الاثى الى الشقة والعلقة وبفس التبيج الاسيد || قوته الكذاب والحرام وريحق الازمار || يدين عشه الى الاشجار الفتاه . الاثى تحسن مرتان في الحول . مسفتها ٥ يعضات ترخلها بمنابرة الذكر .

٢٩٩٩٠ - هليكويا* ، وشيج

Heliconia (S). Héliconie (F). Bastard plantain (E). Héliconie (D). Elconia (I).

جنس نباتات ارموية برية وزينية من فصيلة الموزيات . انواعها المعروفة نحو ٨ تشبه الموز والقنا والملازوان . ساقها نصيرة ، اوراقها مستطيلة الاعتناق ، كبيرة النصل الذي يطول من ٦٠ الى ١٣٠ سم . ويمرض من ٢٠ الى ٤٠ سم . شربانها كبير اللد ، بالغ التضديد ٥ اريواني اللون ، اصفر الطرف . ازهارها عقودي التجميع يطول نحو ٦٠ سم . ويمرض نحو ٣٠ سم . ازهارها الى الصفرة الخضراء المالح . تنورها يستمر من حزيران الى آب .

٢٩٩٩١ - هلي* ، هليي أذري

Cephalophus (S). Céphalophe, Antelope des buissons (F).

الجليج هلي . جنس حيوان من ذوات الكلف المختار . اطراف القرن . انواره نحو ١٠ جميعها صغيرة اللد ، ريشة القوام . رؤوسها متوجة بطرة من الور اليد المسطلي . قربها نصيرة ، متصبية ، ذوبة ، حادة الاطراف . اذنانها قصيرة . اثولها سوية الالوان تلب فيها الريدة زرقاء المالح || انثاها جاه الروس ، رباحية الاعلاف || تألف الادغال والقفاف الشبية .

٢٩٩٩٢ - هليوت* هليوتس

Heliothis جنس مشرات فراشية من فصيلة التفسقيات . انواعه عديدة جميعها نصيرة اللد . اجسامها الى السرة الرمادية . رواشها مزركشة متراكبة الالوان الزاهية والمابقة . ريقاتها الى السرة يطولوا مالح وردي وخضان جانبيان قاطبان . وهي تسمى من البرقات الناحية التي تركب معظم النباتات النجيلية . بعضها يركب القرع فيلهم الحب ابلان تكونه .

٢٩٩٩٣ - هليوت ركي* هليوتس

Heliothis rexia (S). Heliothis roi, Ver des bourgeons (F). Bud worms (E).

فراشة من الهليوت . طولها يراوح من ١٥ الى ١٨ سم . ويسطها من ٣٠ الى ٣٦ سم . ثوبها الى الحطلي . خلفها اطبل اشهب . زباناها عيطية . رواشها الاناسيان الى الكمية الخضراء المجلدة بالاسر . رواشها الخلفيان الى الخضار الفتاح يطولها اثار اسمر ينهي يهدبي فني . ذكورها اصفر قدأ من انثاها . مسرهما دجوي . ايجيماها الحولية ثلاثة . ريقها اسطوانية الشكل تطول من ٢٠ الى ٢٤ سم . ثوبها اسمر اللون اخضر الحلقات ، اشهب الغلب . ريقاتها تركب الزيدات والبرام الحامية في عدة نباتات انحصا القطن وتركب حقاك التبيج تنفترها وتقضي حل معظم زورها || تكالغ باستعمال الحواشير النافذة التي تؤول الى الجهاز الصمبي او الحضي .

٢٩٩٩٤ - هليوت مسلح* ، غسقية الذرة

Heliothis armigera, الصفراء

H. obsoleta (S). Heliothis armé, Noctuelle du maïs, Noctuelle des tomates (F). Corn earworm,

Tomato caterpillar (E). Baumwollkapselwurm (D). فراشة من الهليوت ، طولها يراوح من ١٦ الى ٢٠ سم . ويسطها من ٣٢ الى ٤٠ سم . ثوبها الى الكمية الفدرا . زباناها عيطية . رواشها الاسمية والخطفية مجعدة ومبقجة بالاسر . ايجيماها الحولية من ٣ الى ٤ . ذكورها اصفر قدأ من انثاها || وهي من الحشرات القواطع التي تجوب البلاد في طلب الزرق . ريقها تطول من ٣٦ الى ٤٠ سم . ثوبها الى الخضار الاصفر المالح تغطيه ثلاثة خطوط اسمر . مدنها يراعي اللون . وهي ناعمة تركب برام مختلف النباتات انحصا القطن واللوز والذرة الصفراء والتبيج والبنوترة وله كؤذها ، حدة كؤذها ، شديد الاذى وتقتل حقاك التبيج وتلتهم البذور من حين تكونها الى تمام نضجها . تكالغ باستعمال الحواشير النافذة التي تؤول الى الجهاز الصمبي او الحضي .

٢٩٩٩٥ - هليوتروب* ، ركيب الشمس ، كركر

Heliotropium (S). Héliotrope (F). Heliotrope, Cherry-pia (E). Heliotrop, Sonnenwende (D). Elotropio (I).

ومن اسمها طامرمويا وهي تحريف صار يودا السريانية . ثم حشيشة القروح . وهو جنس نباتات من فصيلة المسميات انواعه المعروفة ١٧٠ اعطائها البلاد الحارة والمتدلة . معظمها عشي وبضها جنبي . اوراقها متعاقبة متعكدة كاملة . ازهارها شكلية التجميع هامة الازكاز تدور مع الشمس || منه انواع زراعية ازهارها عطرية العرف زرقاء اللون او ليلكية يستخرج منها بالتقطير ادهان عتيمة || اوراقه طيبة تسكن الالتهابات وتظهر المبروح .

٢٩٩٩٦ - هليوتروبس* هليوتروبس

Heliothis haemorrhoidalis (S). Thrips des serres, T. de la vigne (F).

حشرة من التريبس صغيرة اللد طولها يراوح من مليتير وتطيل الى مليتير واربية خطوط . ثوبها الى السرة المرفوية . تتمسكها في نسج النبات فتبثف من ريقان ناعمة صفراء اللون تغفل فعل الحشرة الكاملة التي تقطع بشرة النسيج وتقص عصارة الخلايا || ايجيماها الحولية تراوح من ٤ الى ١٠ وفك لانها شديدة التأثير بوسائل الحرارة والبيئة || تركب الكركرة والشام والجار ومختلف نباتات المصاري من اي نوع كانت .

٢٩٩٩٧ - هليوتريت* هليوتريت

Héliophyte (F).

Héliophila (S). Héliophille (F).

جنس نباتات حولية برية وزينية من فصيلة الصليبيات . انواعه المعروفة نحو ٤٠ معظمها من نباتات افريقية الجنوبية . سقها قفراء . اوراقها متعاقبة ، السفلية منها ريشية غرمة ، الوسطى اعطيلية مسنة الحافة . المالح سانية . ازهارها طرفي ، عقودي التجميع . ازهارها صغيرة اللد ، مختلفة الالوان ، منها الالبيش والاصفر والوردي والازرق . تنورها يستمر من حزيران الى آب .

٢٩٩٩٩ - هليوكريد* هليوكريس

Heliocharis (S). Héliocharis, Héliocharide (F).

جنس نباتات عشية برية حولية ودمعة من فصيلة السمديات . انواعه المعروفة نحو ٨٠ منتشرة في معظم اصقاع العالم . سقها دقيقة تنتهي بسيليلات منفردة .



هليوس

الاسفر . ثماره جلوية اللون . اغاليجه مستطيلة ، قليلة
التفاحة ، ذكية الطعم ، قاهرة الصنف .

٣٠٠٠٧ - هليون عكرش

Asparagus scandens (S). *Asperge grimpante* (F).
نوع من الهليون الترنبي السرح . ساقه مقلقة . فروعها
تحلة اقية الانتشاب متدلية . ردياته ثلاثية التجميع ،
تصلها بسط الصنف يطول من ٦ الى ١٣ م . ازهاره
الى الخضار العايق . ثماره حراء اللبن وسيدة البرزة .

٣٠٠٠٨ - هليون معروف * هليوس ، برمع

Asparagus officinalis (S). *Asperge commune* (F).
Common asparagus, *Sparrow-grass* (E). *Echter*
Spargel, *Asparagen* (D). *Asparago comune*, *Sparago*
cultivato, *Asparagio* (I).
هو الهليون البقي المشهور . ضروده واصرامه الزراعية
عديدة جميعها مأكولة الاغاليج . اربوت قصرية . اغاليجها
خليفة . سيقها سرسة فراء تملو من ٦٠ الى ١٥٠ سم .
ردياته حزنية التجميع تمد من ٣ الى ٦ م . تصلها خطي
الشكل يطول من ٦ الى ١٥ م . ازهاره خضراء اللون .
ثماره الى الحمرة الناعقة .

٣٠٠٠٩ - هليونيات ، هليونيات

Asparagum
سبط من فصيلة الزنيقيات ، اشهر اجناسه الهليون .



هليون ريشي

٣٠٠١٠ - هليوتين ، آسفرجين ، آسبراجين

Asparagine (F). *Asparagin* (E).
مادة حيوية قابلة التبلور عادمة اللون ناعقة اللحم لاتتوب
في الكحول ، تلوب في الماء البارد وفي الحامض والقل .
توجد في صارة معظم النباتات ككثر نسبيا في اغاليج
الهليون . تستعمل لدر البول .

٣٠٠١١ - هساشة

Platypiza (S).
Platypiza (E).

جنس حشرات من فصيلة الحاشيات رتبة ذوات الجناحين .
انواعها المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في معظم اقطار البلاد
المتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٣ الى ٥ م .
رؤوسها مستضخنة . عيونها متلاصقة عند الشقين . قرونها
الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل ، تنتهي بسيلة
دقيقة . اعظامها قصيرة . ملاصقا بواسطة العقلة . كولسلها
مربعة ، مبرمة ، مبرشة . بطونها بارزة الحدة ، مبرشة
القلب . رواشها كبيرة ، قسطانية التخفيف ، قوامها
نخيلة || تألف المواقع الدفلة والحراج المبرشة الانحجار .
يرقاتها عاردة تميش على القطور .

٣٠٠١٢ - هساشيات

Platypizidae (S).
Platypizidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجنتها وانواعها
المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد المتدلة
الحرارة . تألف المراعي والروج والنباتات || اجسامها
صغيرة تطول من ٢ الى ٥ م . رؤوسها مستضخنة . عيونها
متلاصقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية
الفصل . ملاصقا وحيدة العقلة . اعظامها قصيرة .
شفاها السفلى لاقعة او ثاقبة ، كولسلها مربعة
الشكل ، مبرشة القلب اللقيق . رواشها كبيرة ، شفاة
بطونها مردنية ، خلية انتشار . قوامها قياسية || يرقاتها
مبطلة تميش على بعض انواع القطور وعلى المواد النباتية
الجزئية الاغوال || اشهر اجناسها الحاشة .



هليون معروف

اوراقها صفية . يكثر وجودها في المناطق وفي التلوع
الرطبة .

٣٠٠٠٠ - هليومتر

Héliomètre (F).
Heliometer (E).

هو المبرام ، جهاز يستخدم في قياس قطر دائرة الاجرام
السموية .

٣٠٠٠١ - هليون ، هليون

Asparagus (S).
Asperge (F). *Asparagus* (E).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الزنيقيات . انواعه
المعروفة نحو ٥٠ جميعها اشباح قصرية ممرمة . معظمها
بري وبعضها زراعي وترنبي . سيقها منتصبه وعارشة
ومتدلية . اوردها رديية . ازهارها تحلة خضراء اللون ،
ثمارها عنية || اعرفت انواعها واشهرها ما يتبع .

٣٠٠٠٢ - هليون اجعد

Asparagus crispus, *A. decumbens* (S). *Asperge cré-*
pue (F).

نوع من الهليون الترنبي . ساقه دقيقة متقلقة متعرجة كثيرة
الفرع المنبسطة المتدلية العادة الشوك . ردياته ثنائية
او ثلاثية التجميع ، تصلها جامد الصنف يطول من ٤ الى
٧ م . ثماره حراء اللبن سداسية التيزور .

٣٠٠٠٣ - هليون برتي ، هليون شالك

Asparagus acutifolius (S). *Asperge plantane*, *A. sauv-*
age (F). *Wild asparagus* (E). *Strauchasparagel* (D).

Asparago salvatico, *Sparagio agresta*, *Correda* (I).
نوع من الهليون البري يكثر في المناطق الجبلية . ساقه
تحلة مستطيلة متقلقة . فروعها قليلة متشعبة . ردياته
ضمية التجميع ، حزنية تمد من ٤ الى ١٢ م . تصلها جامد
الصفحة ، شالك القصبة ، يطول من ٥ الى ٦ م . ازهاره
عطرية العرف . ثماره سواء اللون . اغاليجه صغيرة القد
تحلة القدر مأكولة .

٣٠٠٠٤ - هليون ريشي

Asparagus plumosus (S). *Asperge plumosae*, *A. plu-*
mée (F). *Asparagus fern*, *Feather asparagus* (E).

Zierspargel (D). *Asparago filiforme*, *A. plumoso* (I).
نوع من الهليون الترنبي الدائم الاضرار . ساقه فراء
شاككة . فروعها ريشية لاقسية التركيب غزوية الشكل ، ردياته
سرخشية دقيقة شاككة تطول من ٣ الى ٦ م . حزنية تمد
من ٦ الى ١٢ م || ضروريه واصرامه عديدة جميعها ترنبية
تزرع في المرائن .

٣٠٠٠٥ - هليون سرحسي

Asparagus filicinus (S). *Asperge fougère* (F).

نوع من الهليون الترنبي السرح . ساقه منتصبه تملو نحو
١٥٠ سم . فروعها اقية الانتشاب والجلوس شكلها
كالسرخس . ردياته عجيبة لاقسية الشكل ، حزنية تمد
من ٣ الى ٥ م . ازهاره الى الخضار الاسفر . ثماره رديية
اللون .

٣٠٠٠٦ - هليون ضمي

Asparagus verticillatus (S). *Asperge verticillée* (F).

نوع من الهليون البقي . مهد التفغاز . اقليمه البلاد
الباردة . ساقه ليفية غشوية تملو نحو ٣٠٠ سم . ردياته
ضمية التجميع حزنية تمد من ٣٠ الى ٣٠ م . تصلها جامد
الصفحة يطول من ١٢ الى ٢٥ م . ازهاره الى الخضار

٣٠١١٣ - هَمَاق مَرُوش *

Cinclosoma punctatum (S).
Cinclosoma punctu (F).

طائر من الجوارح منيات المنساقير ينتمي الى فصيلة
الشحروبديات بألف اللغابات والاشراج القريبة من الحدائق
والخائن. قوته الحشرات الصغيرة وتأثر على اختلاف
اجناسها باستثناء الموز والبرقال في جسمه متوسط القد
يطول نحو ٢٤ سم. ثوبه الى الطحلة يملها موج اشجع
ورقعة سوداء. راسه مقلع بالابيض. يحسره الى اللياس
الماسي. زوره الى الجلوة. يطنه الى الغيرة المنسقة
بالصبية. ذنبه معتدل الطول، ضيق الطرف. قائمته
ورفتان دقيقتان، لونها الى السمرة الزرقية || يدنن عشه
في الاشجار الزينة الوارئة الظل. الاثنى تحضن وحدها من
٣ الى ٥ بيضات بيضا الذكر ويئن لها الغذاء.



هَمَاق مَرُوش

٣٠١١٤ - هَمَامِيس
Hamamite (F).
هو المشتركة، الملبية.

٣٠١١٥ - هَمَمِيَّت * ، حَجَر الدَّم * ، شَاكِيَج
Hématis (F). Hématis (E).
معدن حديدية ادمس اللون يعرف كباريا باسم اكسيد
الحديد الطبيعي. انواعه عديدة اشهرها واكثرها انتشارا
الهميوت. رابع حديد الدم.

٣٠١١٦ - هَمَمِيَّت أُسْمَر *
Hématis bruna (F).
هو الهميوت، اطلية.

٣٠١١٧ - هَمَمِيَّة
Drosophila (S). Drosophila (F).
جنس حشرات من فصيلة الحميجيات. انواعها المعروفة
عديدة جميعها صغيرة القد، سوية الثوب، شفافة الجناح
التائر الاصصاب || يرقاتها ميناوية، نيرة، هواكة،
ناقلة، تعيش على جميع المواد المخضرة او السائرة نحو
الاغيار والاختلال.



هَمَمِيَّة الاجامث

٣٠١١٨ - هَمَمِيَّة الانبعاث *

Drosophila melanogaster (S). Moucheron des
caves (F). Common fruit fly, Pomace fly (E).
Taufiege, Essigfliege (D).

نوع من الحمجة. طولها نحو ٢ مم. ثوبا الى الصفرة
البرتقالية. تركيب جميع انواع الكبار الساقطة المطوية
وتجذب بنشاي مختلف الاختبارات الكحولية والفسورية.
تمنع مكها او تلقى حيث تعيش يفتق من رقات دقيقة
طولها نحو ٦ مم. لونها الى الغيرة || كزودها كسنتية
الون، قصيرة القد، غليظة الشكل، تقضي طورها البشري
في نفس المحيط || وهذه الحمجة هي التي يستخدمها علماء
الوراثة والورث في اجابهم الحياتية والتناسلية.

٣٠١١٩ - هَمَمِيَّات
Drosophilidae
فصيلة حشرات من ربة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها
زهاء ١٠٠ جميعها صغيرة القد بطينة الطرائع تعيش على المواد
النباتية المخضرة || يرقاتها نيرة هواكة وناقلة تعيش ايضا
على مختلف المصاصات والاشجار النباتية.

٣٠١٢٠ - هَمَدَاو *
Haemodorum (S).
Hémadore (F).
جنس نباتات جلمورية معمرة من فصيلة الهمداريات.
انواعه عديدة جميعها ترينية. ازهارها هامة الازكاز.
عشوية التجميع او سلبية، جميلة الاشكال والالوان الزاحية.



هَمَدَاوِيَّة الْوَزَال

٣٠١٢١ - هَمَدَاوِيَّة *
Haemodoraceae (S).
Hémodoracées (F). Haemodoraceae (E).
فصيلة نباتية من وحدات اللقطة. اجناسها ٢٠ انواعها
زهاء ١٠٠ معظمها جلموري معمرة وبعضها عشوية.
اوراقها باغليتها مزدوجة التنصيف. ازهارها نظامية.
اسديتها ثلاث او ست. مدقاتها لا قياسية الارتفاع لذلك
لستوى سطحها قد يكون ارفع او اسفل من مستوى الاسدية.
اشهر اجناسها الهمدار.

٣٠١٢٢ - هَمَدَاوِيَّة الْوَزَال *
Apoplexie de la vigne, Folletage
وصم فبالي شديد الوق مجهول الاسباب يصيب الكرمة
فيابل اوراقها ويسم سرورها التي تجف في بضع ساعات.

٣٠١٢٣ - هَمَرُوفِيَّة الْوَزَال *
Hemerophila abruptaria (S).
Hémérophilie à ailes dentelées, Phalène des
genêts (F). Hemerophila abruptaria (E).

حشرة من فصيلة الالانبات وربة حرشفات الاجنحة.
موطنها معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط والاقليم
الداخلية المتاخمة. فراشتها جارية قوتها رقيق الازهار.
سرقها تعيش على اوراق الوزال والزنان ... || جسمها
ابيض الشكل يطول نحو ١٢ مم. بسطتها نحو ٣٨ مم.
راسها كبير الجرم. عينها كبرتان زبالها مشطيان
عند الذكر، خطيان عند الاثى. جوشها وبطنها الى الخنطي
الخنطي الاكثف للمواج || روشانها الاسيان الى الخنطي
الاكثف تملو سرجية متفرعة سمراء وزراكن وتزادون
كسنتية. روشانها الخلفان الى الخنطي الاشجع يملو
تشيفظ اسمر وسرجية كسنتية. تسليها خاصي الفروض اسمر
الختار. ادعابها الى القصعة || لها جيان في الحبل.
تظهر فراشة الجبل الاول في اواخر آذار وتظهر فراشة
الجبل الثاني في اواسط تموز. تسرح في الليل. تماثل
بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتع الممكن مباحدا على
الصفحات السفلى من نصال الازراق || السرعة عند بلوغها
الكامل تطول نحو ٤٠ مم. جسمها شبه ورشي الشكل.
ثوبها الى الشبهة الخنطية للمواج يملوها في كل سكة ابتداء
من الرابعة زوج من النقط جاذبية الازكاز، سمراء اللون.
راسها شديد السمرة. رواجبها البطنية الوسطى ماصة بما
يعملها تقطوس عند الانتفاخ || طور الاكمال الذي يستمر
نحو ١٥ يوما ينقضي ضمن صليحة تحميها السرعة في كل
مكان باستثناء التربة.

٣٠١٢٤ - هَمَم *
الصغير من الطباء.

٣٠١٢٥ - هَمَق
Herbes tendres (F).
الكلاء الحش اللين.

٣٠١٢٦ - هَمَقِي
Boreava (S). Boreave (F).
نبات عشوي حولي بري وسيد الجنس والنوع من فصيلة
الصليبيات. منته بعض اصقاع الشرق الاذنى || ساقه
مالة فرعاء متصبية تملو نحو ٦٠ سم. اوراقها متناقية،
زهره قليلة النصال المسطيلة الاطراف الحادة. ازهاره
طري، ازهاره صغيرة، لونها الى الصفار الباهت.
تنويره دببي.

٣٠١٢٧ - هَمَقِي
Hammatoelobium (S).
Hammatoelobion (F).
جنس نباتات عشية بوية معمرة من فصيلة القرنيات.

٣٠٠٣٦ - هَمَيْقِيَسُ الصُّفُورُ

Haemanthus rupestris (S). *Haemanthe des rochers* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته ثنائية الساق القلبية الانتشاب: ساق قصيرة تحمل من وريتين إلى أربع وريقات رساق شمرانية تحمل الأزهار. أوراقها أطيالية كبيرة الخضار. نصلها يطول نحو ١٥ سم. ويعرض نحو ١٠ سم. شراخه يطول نحو ٣٠ سم. يتوجه سيوان قطره نحو ٨ سم. يضم من ٦٠ إلى ٧٠ زهرة قرمزية اللون، فارقة البتلات. تنوره يستمر طوال شهر أيار.



هَمَيْقِي

٣٠٠٣٧ - هَمَيْقِيَسُ بَهِيَّ

Haemanthus magnificus (S). *Haemanthe magnifica* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته مستطيلة الشكل. أوراقه طويلة الانتشاب تركّز على ساق بيضة، نصلها يطول من ٣٠ إلى ٤٠ سم. ويعرض من ٨ إلى ١٠، حرفه شعبة الترتيب بارزة، ثمانية أو عشادية الأوراج. شراخه الأزهرى يطول من ٤٠ إلى ٦٠ سم. سيوانه كبير القدر قطره يراوح من ٢٥ إلى ٢٥ سم. أنصافه كثيفة التجميع لنوا إلى البرتقالي الأرجواني المولج. تنوره يستمر من حزيران إلى أيلول.

٣٠٠٣٨ - هَمَيْقِيَسُ زُجْجَرِيَّ

Haemanthus cinnabarinus (S). *Haemanthe cinabre* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته مستديرة الشكل. أوراقه قرصية الانتشاب، شعبة المد الذي يراوح من ٤ إلى ١٦ نصلها شيق الصفعة يطول من ١٥ إلى ٢٥ سم. شراخه الأزهرى يتوسط الأوراق ويطول نحو ٣٠ سم. سيوانه يد من ٣٠ إلى ٤٠ زهرة جملة اللون الأحمر المائل للأصفر المولج. تنوره يستمر طوال شهر نيسان.

٣٠٠٣٩ - هَمَيْقِيَسُ كَثِيرُ الزُّهْرِ

Haemanthus multiflorus (S). *Haemanthe multiflora* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته وحيدة الساق الشمرانية. أوراقه وريّة، ثلاثية أو خماسية. نصلها بارز العروق البداسية أو الثنائية الأوراج، يطول من ١٥ إلى ٣٠ سم. شراخه الأزهرى يطول من ٣٠ إلى ٦٠ سم. يكمله سيوان قطره يراوح من ١٥ إلى ٢٥ سم. يضم من ٧٠ إلى ١٢٠ زهرة قرمزية اللون، صحنه البتلات. تنوره يستمر طوال شهر نيسان.

٣٠٠٤٠ - هَمَيْقِيَسُ لَيْثْدَن

Haemanthus lindenii (S). *Haemanthe de Linden* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته كالاروية. أوراقه بمنقطة دائمة الخضار. نصلها أهليجي الشكل، سناني الزام الأخير، يطول من ٢٠ إلى ٣٠ سم. ويعرض من ١٠ إلى ١٢ سم. شراخه الأزهرى يطول نحو ٤٥ سم. يتوجه سيوان قطره نحو ٢٠ سم. يضم نحو ١٠٠ زهرة أرجوانية اللون. تنوره يستمر طوال شهر أيار.

٣٠٠٤١ - هُمُوشُ أَخْضَرُ

Chironomus tendens (S). *Chironome vert* (F).

حشرة من الهُمُوش طولها يراوح من ٧ إلى ٨ سم. لونها إلى الخضار الأصفر المولج. قربها الاستشادية مركبة من ١٤ حلقة عند الذكر ومن ٧ حلقة عند الأنثى. أرسافه الامامية مهددة مستطيلة ريقها تلم أوراق النباتات اللينة.



هُمُوش أَخْضَر

أنواعها المعروفة قليلة العدد منها بعض أصناف الشرق الأوسط والأفريقية الشرقية والشمالية || سقها مزرية مستطيلة ممتدة الانشعاب. أوراقها مركبة وريسية التجميع. وريقاتها صغيرة بيضية النصال المستطيلة. أزهارها ذهبية اللون أو أرجوانية. تنورها ديمي.

٣٠٠٤٨ - هَمَيْقِيَسُ

Tiarella (S). *Tiarella* (F).

جنس نباتات جذموية معمرة من فصيلة النجيليات. أنواعها المعروفة قليلة العدد. سقها عشوية منتصبه فراء. أوراقها مركبة، مستطيلة الاطراف، لا تناسبه التفرغ والتسكين. نصلها إلى الخضار الزاهي. أزهارها عشوية التجميع، صغيرة القد، بيضاء اللون أو صفراء. ثمارها جرد لا متساوية المصارع. تنورها يستمر من نيسان إلى أيار.

٣٠٠٤٩ - هَمَيْقِيَسُ

Hybride (F). *Hybrid* (E).

هو الهجين الثنائي، ج. هاليج.

٣٠٠٣٠ - هَمَيْقِيَسُ وَهَوَكَة

Amble (F).

ضرب من سير اللرباب.

٣٠٠٣١ - هَمَيْقِيَسُ

Marcescence (F).

Marcescence, Withering (E).

حالة كل زهرة أو نبات في طور الذبول أو التقاع.

٣٠٠٣٢ - هَمَيْقِيَسُ

Haemanthus (S).

Haemanthe (F).

جنس نباتات دوفسية من فصيلة الزنبقيات. أنواعها عديدة، مهدا البلاد الحارة والاستوائية. سقها شمرانية تلمها بأزهار سيوان التجميع تركّز على شراخه عديد المصارع. ثمارها فردية الخدر. حنية الشكل، صحنه البتلة. || أعراف أنواعها وأشهرها ما يتبع.

٣٠٠٣٣ - هَمَيْقِيَسُ أَيْبِيَسُ

Haemanthus albidus (S). *Haemanthe blanc* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته مستديرة صفيرة القد. أوراقه رباعية العدد، حنية التركيب، صفيرة الشكل، نصلها يطول من ١٥ إلى ٣٠ سم. ويعرض من ٦ إلى ٨ سم. حناره مهدب الحافة. شراخه الأزهرى يطول نحو ٢٠ سم. سيوانه صغير الحجم قطره نحو ٧ سم. أزهاره كثيفة التجميع بيضاء اللون. تنوره يستمر طوال شهر حزيران.

٣٠٠٣٤ - هَمَيْقِيَسُ أَحْمَرُ بِهَمَلِ الحمئس

Haemanthus coccineus (S). *Haemantheponceau* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته مستديرة القد، ثنائية الأوراق الكبيرة التي تطول من ٥٠ إلى ٦٠ سم. وتعرض من ١٥ إلى ٢٠ سم. شراخه الأزهرى يطول نحو ٢٠ سم. سيوانه صغير الحجم، قطره نحو ٨ سم. أزهاره كثيفة التجميع حراء اللون. تنوره يستمر من آب إلى تشرين.

٣٠٠٣٥ - هَمَيْقِيَسُ أَرْجَوَانِيَّ

Haemanthus puniceus (S). *Haemanthe scarlate* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته مستديرة الشكل. أوراقه قرصية الانتشاب شعبة المد. نصلها جميل الخضار الزاهي، ضيق الصفعة، يطول من ١٥ إلى ٣٠ سم. ويعرض من ١٢ إلى ١٢ سم. شراخه الأزهرى يتوسط الأوراق ويطول نحو ٤٠ سم. سيوانه يحمل من ٤٠ إلى ٥٠ زهرة جملة اللون الأرجواني. تنوره يستمر من حزيران إلى أيلول.



هُنُوش ريشي

٣٠٠٤٧ - **هَمِيلِيَّةُ الْيَنْ * ، صَدَأُ الْيَنْ ، فَطَرُ الْيَنْ .**
Hemileia vastatrix (S).
Rouille du caféier (F).

فطر مجهرى يصيب اوراق آئين فيضليا ويضل عليها التصفيري الواجب فيؤذي الشجرة ويهيء الى حملها وانتاجها || مظهره الاخضرى يقع صغيرة مستديرة قطرها يراوح من ١ الى ١.٥ م. تركيب نصال الاوراق على صفحاتها السفلى ، تبدو مبدئية رتقالية اللون ثم تتكاثف وتتشعب بفشاء خلى الشكل ، لزج المادة ، يسبب جفاف النسج ويهاسه || يكافح باستعمال سائل بوردو المركز من ١ الى ٢ ٪ على ثلاث او اربع مرات ابتداء من نهاية فصل الشتاء .

٣٠٠٤٨ - **هَمِين**
Marcasclie (F).
الحمين ما كان قابلا للذبول .

٣٠٠٤٩ - **هَمِينَة ***
Haminé (S).
Haminée (F). Hamine (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مهدبات الارجل وفضيلة الطابيات . انواعها المعاصرة المعروفة متوسطة المدد ، منتشرة في معظم بحار العالم || اصداؤها شبه بهضبة الشورن ، شفاقة ، ماسة ، متساوية الالوان الوسيدة الخصب . اجسامها فضفاضة الزداد اللامع .

٣٠٠٥٠ - **هَمِينُون**
Hémione (F).
هو فراء الثوب ، نوع من الحمر الوحشية وفضيلة الخيليات .

٣٠٠٥١ - **هَمِينُولِيَّت** هي البساج الشبكي ، اطلية .

٣٠٠٥٢ - **هَمَاء**
Péduncle (F). Peduncle (E).
هو ملاقق الثمرة ويقال له إهان ، ج. أمْن .

٣٠٠٥٣ - **هَمَاجِل ***
Sirens (F). Sirens (E).
رَبِيَّة حيوانات قاذبة من صف الضفديعت ، لها ، حتى الآن ، فضيلة واحدة تشمل ثلاثة انواع || جميعها من مستقرات الخياشيم . اجسامها مستطيلة ثنائية القوائم ، رباعية الاصابع || تعيش على صفات المستنقعات وبحاري الماء . بلاعيطها مائية || قوتها البيدان والغريبات الصغيرة .

٣٠٠٥٤ - **هَتَان**
Lavande spic (F).
هو الخزامى الذكورية ، اطلية .

٣٠٠٥٥ - **هَنْشِر**
Anon (F).
هو الجيش ابن الاثان .

٣٠٠٥٦ - **هَنْتَر**
Moqueur (F). Mocking-bird (E).
جنس طير كان في التصنيف الماضي ينتمي الى فصيلة الهندديات وهو في التصنيف الحديث ينتمي الى فصيلة مستقلة تسمى هنريات || انواعه المعروفة ١٢ اصنافا المناطق الاستوائية . معظمها افريقي وبعضها اسويى وامريكي || تتميز بطول مناقبها المحدودة وباستطالة اذنانها الرتاجية الریش . اجنتها قصيرة تكاد لا تلمع قاعنة الافنيك || جميعها تألف الغابات والحراج ، قوتها الحشرات اغصان الخنافس والارض والديدان والجراد والنمل والفضفاحيات والمانكب وبعض الثآير البرية || اشهر انواعه المختبر الاحمر المتقاد .

٣٠٠٤٢ - **هَنْشُر ريشي ***
Chironomus plumosus (S). Chironome duvetoux (F).
حشرة من الهنوش طولها يراوح من ٩ الى ١٣ م. ثوبها احمل اللون يقطعه غط اسود ويمتدحه تجليد اصفر . سيقانها صفراء اللون . ارجاسها الانامية مهدبة مستطيلة . يرتبها حواء الين تعيش على النباتات المائية وقد تلم اوراق بعضها .

٣٠٠٤٣ - **هَمْشِيَّات ***
Chironomidae, Tendipedidae (S). Chironomides (F). Midge (E). Zuckmücken (D).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها كثيرة المدد جميعها صغيرة القدد قريبة الشبه من البويض . اجسامها عادمة الحراشف . قرونها الاستشعارية ريشية . رؤوسها صغيرة . اعظامها وتوابيدها قصيرة لا تمكنها من امتصاص الدم || تكثر على الاعشاب المائية وعلى المراد الضفوية المختصرة قرب مجاري الماء . تعتبر من الهوام المزعجة غير الضارة .

٣٠٠٤٤ - **هَمْيْد**
Dette non réglée (F).
كل دين لم يدفع بتواريخ استحقاقه .

٣٠٠٤٥ - **هَمْيَكَة صَفِيَّة ***
Hémichea aestivaria (S). Hémichea estivale (F). Hémichea aestivaria (E).

حشرة من فصيلة الاربابات حرشليات الاجنحة . موطنها بعض الاسواق المختلة الحرارة من الشرق الاوسط والافد وادوية . فراشها جارية قوتها رقيق الانياز . سرقتها تعيش على اوراق السديان || جسمها قصيف يظل نحو ١٠ م. يسطها نحو ٣٠ م. رأسها مستطيل الحجم . عيناها نازرتان . زباناها مشطبان عند الذكر ، غيطبان . عند الانثى . جشنتها ويطبقها الى الخفسار الزرقى الغنطي المواج || رواشتها عند الشقين الى الخفسار الزرقى الاسمر المواج يتوسطه خط متعرج متخلي ويملوء عند الذكر تسع نقط حثارية سمراء اللون ، وسبع نقط حثارية . عند الانثى || لها جيل واحد في الحول . تظهر القراشة في حزيران وتبقى حتى اواخر تموز . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتتمتع الممكن لطفاً صغيرة مربعة على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرقة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٢٢ م. جسمها شبه اسطوانى الشكل ، مقوس المؤخر . ثوبها الى السرة الزرقية المواج تعلوها رشفة خضراء وسبع غطوط متفرعة جزوية . رأسها الى الجلاوة || دراجينها البطينية الوسطى ماسحة بما يحملها تنقبض عند الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً يتقضي تحت القشور وبين شقوق الصفا ضمن صلجة شالوية تحببها السرقة باقل من اربعة ايام .

٣٠٠٤٦ - **هَمِيلِيَّة ***
Hemileia (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة السحاميات . تتميز بدعماها الاطلاقية التي تغلب فيها الاشكال المردنية والبرسية . مشيها يبيض ويتكاثر في التسج الثنائية السطحية . هيئها مجهز بمرواشف خضمة . تكاثرها حزبية التجميع ، اسطوانية الشكل او صوانية || انواعها المعروفة ٢٣ جميعها من فطور البلاد الحارة والاستوائية . اعرفها واشهرها هميلية الين .



هَمِيَّة صِينَة



هَمِيلِيَّة الْيَنْ



هَمِيَّة



هَبْر أَحْمَرُ الْمَنَار



مِندَاءُ شَاكَّة



هَبْد



هَبْدَاءُ



هَبْدَاءُ بَرِّيَّة

المحب الفيق الثالثك، ترتفع من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقها حافضة متعاقبة تطول من ١٥ إلى ١٠ سم. تصالها سنانة، ذرية، مزينة الصفحات العليا. أزهارها يضاء اللون مرقوفة بالبنفسجي، قطرها نحو ٣ سم. || تنويرها ديمي أو غريفي.

٣٠٠٦٥ - هَبْدَاءُ مَرْغَبِيَّة (S). *Tricyrtis pilosa* (S).

Tricyrtis velut (F).

نوع من الهنء. منبها الحث. ساقها خلية السماء، قليلة الفروع، ترتفع من ٩٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقها حافضة متعاقبة، خلية اتصال السنانة الشكل || أزهارها إلى الأبيض الماجي، قطرها نحو ٢ سم. تنويرها يستمر طوال شهر أيار.

٣٠٠٦٦ - هَبْدَاءُ مُسْتطِيلَةُ الزَّيْدَةِ

Tricyrtis macropoda (S).

Tricyrtis à long pédicelle (F).

نوع من الهنء. منبها الصين. ساقها قليلة الخيل والزغب ترتفع من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقها متعاقبة معقبة؛ تصالها المثلج مائلة تطول من ١٥ إلى ٢٠ سم. || أزهارها مستطيلة الزيد، قطرها نحو ٣ سم. لونها إلى الأبيض الماجي يلو تمسح برقالي ينصرف ليا بعد إلى الأصفر || تنويرها ديمي.

٣٠٠٦٧ - هَبْدَاءُ *، طَرَحَقُون

Taraxacum dens leontis, *T. officinale*, *T. vulgare*, *Leonodon taraxacum* (S). *Pissenlit officinal*, *P. commun*, *Dent-de-lion* (F). *Dandelion*, *Blow-ball*, *Canker-wort* (E). *Echte Kuhlbaum*, *Löwenzahn* (D). *Tarassaco*, *Tarassaco*, *Dente di leone* (I).

نبات عشبي بري معمر من فصيلة المركبات. ينبت في جميع الأراضي المزروعة ويكثر من النباتات الكاسية الضاربة. جلوره غليظة اسفلية. أوراقه قرصية الانتشاب ضمية. أزهاره رؤسية التجميع. أوراقه الفتية مأكله هبلية للأنعام الضمية || شروبه الزراعية البقلة المشهورة نحو ٨. يتكاثر بالبذور. تيزر مثله من أوائل الربيع إلى أواسط الصيف. تفرس للشر في مستقرا على أبعاد تراوح من ٤٠ إلى ٥٠ سم.

٣٠٠٦٨ - هَبْدَاءُ *، هَبْدَاءُ

Cichorium endivia (S). *Chicorée endive*, *Endive* (F). *Endive*, *Batzian endive* (E). *Endivia*, *Endivienwegwarte* (D). *Endivia*, *Cicoria degli ordi* (I). نبات يقل من فصيلة المركبات السنية. أصرامه طيبة تجتمع إلى ضربين الهنءا الجمدة والهنءا الخسية. جلوره غليظة حرازية الشكل. أوراقه قرصية الانتشاب. أزهاره إلى الزرقاة السانجورية.

٣٠٠٦٩ - هَبْدَاءُ بَرِّيَّة *، هَبْدَاءُ مَرْغَبِيَّة

شِكُورِيَّة

Chichorium intybus (S). *Chicorée sauvage*, *Ch. amère* (F). *Succory*, *Wild chicory* (E). *Zichorienwegwarte*, *Chichorienwurz* (D). *Cicoria*, *C. amara*, *C. da toglio*, *Radichio* (I).

نوع من الهنءا وهو نبات يقل بري وزراعي. شروبه المشهورة عديدة فوارقها المميزه شكلية، خواصها الضمية والطبية واحدة، جميعها تليق الدم. جلورها حرازية مستطيلة. سوقها فراء تملو نحو ٢٠٠ سم. أوراقها

٣٠٠٧٠ - هَبْر أَحْمَرُ الْمَنَار *

Iris arachnoides (S). *Moqueur à bec rouge* (F).

نوع من الهبر. موطنه أواسط افريقية. جسمه أبيض اللد يطول نحو ٥٠ سم. قوته إلى الزرقاة السماء يلوها مزاج يراوح من الأبيض إلى الأخضر اللص. جناحاه وذنبه مبقجة بالأبيض. عيناه عسلتان. منقاره وسقاء إلى الحمرية || يألف القنابات والأحراج الكثيفة. سربه بعد من ٤ إلى ١٠ أزواج. قوته الحشرات والديدان والذئب الهنبت || يدين منه في تجاوير الأشجار. انتاء تحض ٨ يضاء نحو ١٦ يوما.

٣٠٠٥٨ - هَبْرِيَّات

Mimidaa (S). *Mimidaa* (F).

فصيلة طير من لافقات التل وربة الجوام. اجناسها وأرواحها المعروفة عديدة. معظمها من طيور القنطرة الأمريكية وبهها الفريقي وآسيوري || القسم الذي يستوطن أمريكا الجنوبية أبه في مناطقه. أما القسم الذي يستوطن أمريكا الشمالية فإنه من القنطرة التي تجوب البلاد في طبل الحصيد والمشي || أشهر اجناسها الهبر.

٣٠٠٥٩ - هَبْرِيَّات

٣٠٠٦٠ - هَبْرِيَّات

٣٠٠٦١ - هَبْرِيَّات

Siran (F). *Siran* (E).

جنس حيوانات قازية من فصيلة الهنطليات. أرواحها المعروفة ثلاثة. موطنها بعض مناطق أمريكا الشمالية وكندا. تألف ضفاف مجاري المياه العذبة. توش معظم حياتها في الماء || اجناسها شبه غريبة الشكل تطول من ٢٥ إلى ٧٥ سم. رؤوسها قصيرة. اسفلية. اسطها مستعرة الاشدق. حيويا شديدة الصفر. اعانها مجهر باطنان مجعدة بشرة. وهي مجهر أيضا يقامتين فقط. قانها صغريتان، اماميا الارتكاز || قوتها التيدان والفديوات الصغيرة.

٣٠٠٦٢ - هَبْرِيَّات

Sirenidae (S). *Sirenidae* (F).

فصيلة حيوانات قازية من ربة الهنابل. كانت، قبل التصنيف الأخير الذي يعود إلى ١٩٦٥، تنتمي إلى ربة السرفقيات. أما الآن فهي الفصيلة الوحيدة التابعة إلى ربة الهنابل || أرواحها المعروفة ثلاثة موطنها بعض مناطق أمريكا الشمالية وكندا.

٣٠٠٦٣ - هَبْدَاءُ

Tricyrtis (S). *Tricyrtis* (F).

جنس نباتات جلدورية جادة مسرة من فصيلة الزنبقيات. أرواحها المعروفة سبعة مهذا الشرق الأقصى || سوقها غمراوية مرققة. أوراقها حافضة متعاقبة سنانة التصل. أزهارها طرية يضاء اللون أو مرقوفة بالبنفسجي || تزرع للزينة ولا تحصى البرد. ترطب في الاتربة المعتدلة الاندماج، المتساوية التركيب المتصري، التنية بالمواد الضروية والأزوت || أشهر أرواحها الهنءا الشائكة والمزينة والمستطيلة الزيد.

٣٠٠٦٤ - هَبْدَاءُ شَاكَّة *

Tricyrtis hirsuta (S). *Tricyrtis hirsuta* (F).

نوع من الهنءا. مهذا اليابان. ساقها متصبة كثيفة

٣٠٠٨١ - هَيْكَلَةُ رِبْعِيَّةٍ
Génie rural (F). Rural engineering (E).
علم يتناول التشييد الزراعي على اختلاف أنواعه من الابنية الى الاقنية .

٣٠٠٨٢ - هَيْكَلَةُ زُرَاعِيَّةٍ
Génie agricole (F). Agricultural engineering (E).
علم يتناول التربة والنبات والحيوان والاستثمار .

٣٠٠٨٣ - هَيْكَلَةُ سَطْحِيَّةٍ
Géométrie plane (F). Plane geometry (E).
علم يبحث في السطوح ذات البعدين ويشمل دراسة خصائص الخطوط والزوايا والأشكال من مثلثات ومربعات ودوائر .

٣٠٠٨٤ - هَيْكَلَةُ قُرَاعِيَّةٍ
Géométrie dans l'espace (F). Geometry of space (E).
علم يبحث في الأشكال ذات الأبعاد الثلاثة أي الاجسام كالكرة والمكعب والمخروط .

٣٠٠٨٥ - هَيْكَلَةُ كَهْرَبَالِيَّةٍ
Génie électrique (F). Electric engineering (E).
علم يتناول إنتاج طاقة الكهرباء واستثمارها .

٣٠٠٨٦ - هَيْكَلَةُ مِيعَارِيَّةٍ ، هَيْكَلَةُ مَدَكِيَّةٍ
Génie civil (F). Engineering (E).
علم يتناول البناء بأشكاله ومبانيه .

٣٠٠٨٧ - هَيْكَلَةُ مَكِينِيكَائِيَّةٍ ، هَيْكَلَةُ آلِيَّةٍ
Génie mécanique (F). Mechanic engineering (E).
علم يتناول الميكانيكا وما ينشعب منه من آليات .

٣٠٠٨٨ - هَيْكَلُ
Connaissance (F). Connaissance (E).
المهندس من كان علمه أو اختصاصه يمكنه من تحليل ومعرفة الشيء المطلوب . ج هندسة .

٣٠٠٨٩ - هَيْكَلَةُ
الحفنة منزل من منازل القمر الشامية وهي مجموعة من حصة كواكب يقال لأبرزها الزر والثاني الميسان . وفي شبه شكلها الألف الكوني في قلب الحفنة يدعى النام .

٣٠٠٩٠ - هَيْكَلُ
Volvula (S). Volvula (F). Volvula (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهدبات الارجل وفصيلة البايغات . انواعها المعاصرة المرفوعة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة | اصداؤها شبه اسطوانة الشكل ، صفيرة القد ، وسيدة الألوان السوية . فوهاتنا مسطوية الفلوج القاطبة .

٣٠٠٩١ - هَيْكَلَةُ الْمَرْجُوحِ
Paroplia scamia (S). Paroplie des prairies (F).
حشرة من فصيلة اليزيديات ورتبة متجانسات الاجنحة . جسمها شديد الصغر يقطر من ٣ الى ٥ مم ، | لونها حطلي اللون تملوه رقعة سوداء تمتد من الرأس الى اواسط الظهران . رأسها عريض . خطمها مستدل الطول . عيناتها صغيرتان . زباناها شديدة الصغر والدة . كوسلها يلحف القسم الاكبر من الرأس . سجعها بحمرة . ظهرها كابل

مسطوية مقعرة . ازهارها الى الزرقاة الزاهية | زراعها تسويج بعض النائية اعصها الطمر بالثقل او بالمواد الدبالية للحصول على اوراق عادمة الخصب .

٣٠٠٩٠ - هَيْكَلَةُ جَمْعِدَةٍ
Chlorocée frisée (F).
ضرب من الهندباء الزراعية المأكولة . اوراقها قرصية لينة مجمدة الفسل الكثير التشرح والتفتين .

٣٠٠٩١ - هَيْكَلَةُ حَسْبِيَّةٍ
Escarole, Scarole, Scarole (F). Endive (E).
ضرب من الهندباء الزراعية المأكولة . اوراقها نازقة مستعرضة متراكبة . تصلها شمع الصفحة ، مفرس الخمار .

٣٠٠٩٢ - هَيْكَلَةُ زَرْقَاءٍ
هي الطليسية ، اطليا .

٣٠٠٩٣ - هَيْكَلَةُ وَتْلُوفٍ
Witloof, Chicorée de Bruxelles (F). Witloof (E).
نوع من الهندباء الزراعية تتميز بجلودها الحمرلية الشكل والقد وبأوراقها الصنية المتصبغة . راجع وتلوف .

٣٠٠٩٤ - هَيْكَلُ رُسُولِيَّةٍ
Hendersonia (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنبيات . انواعها قليلة لا مؤذية . وبساتينها سمراء اللون تحضن القمبات البكتيرية التي تخترقها فتقرب الحق . وبساتينها اطليلية الشكل ، عديدة الحلما حطلية اللون .

٣٠٠٩٥ - هَيْكَلُ رُسُولِيَّةٍ
Hendersonia (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنبيات . انواعها المرفوعة زهاء ٢٠٠ | معظمها يدعى علم الاذن او قليله | يكتنفها كروية الشكل او مغلطة ، محصورة الاذنكاز او شارة . جودها لحمي التسج اسمر الصفرة الخارجية . وبساتينها رشيعة ، مؤثرة ، حطلية اللون | اشهر انواعها ما يتبع .

٣٠٠٩٦ - هَيْكَلُ رُسُولِيَّةٍ إِسْرِيَّةٍ
Hendersonia acicola (S).
فطر مجهرى من الهندسوسية يركب اوراق الاجاص فيوشها برقعة حطلية لا نظامية الشكل والحجم والترتيب تنسج الى النصل اذا لانتها العوامل الطبيعية وتسبب الاصابة بالباكر .

٣٠٠٩٧ - هَيْكَلُ رُسُولِيَّةٍ إِجْصَاعِيَّةٍ
Hendersonia pilicola (S).
فطر مجهرى من الهندسوسية يركب اوراق الاجاص والسفرجل والتفاح فيوشها برقعة مزوانية الشكل سمراء اللون تسبب تعميم تسبب النصل والاصبال الباكر .

٣٠٠٩٨ - هَيْكَلُ رُسُولِيَّةٍ وَرْدِيَّةٍ
Hendersonia canina (S).
فطر مجهرى من الهندسوسية يصيب اخضار الورد وثمار . مظهره الخارجي بقع صغيرة مزوانية مبرقة سوداء اللون تملأ الاضغان والتأثر دون ان تقع بها شديدة الاذى .

٣٠٠٩٩ - هَيْكَلَةُ الْإِكْتَرُونِيَّةِ
Génie électronique (F). Electronic engineering (E).
علم يتناول الاكترونيك وتجهيزاته .

٣٠١٠٠ - هَيْكَلَةُ حَلِيلِيَّةٍ
Géométrie analytique (F). Analytic geometry (E).
علم يبحث في تطبيق القواعد الجبرية على الهندسة .



هَيْكَلُ



هَرَكَ



هَوَاجِل



هَوَاجِل

٣٠٠٩٨ - هَوَاجِلِي ، اَيُرُوِيَّيْ Aerobique (F).
Aerobic (E).
نمت تعريفى يطلق على جميع الاحياء المجهرية التي لا تستطيع الحياة والتكاثر بعيداً عن الهواء .

٣٠٠٩٩ - هَوَاجِلِي الْجُدُر Exorhize
نمت تعريفى يطلق على كل نبات ينشعب جذبه في الهواء اي خارج التربة .

٣٠١٠٠ - هَوَاجِلِيَّة ، اَيُرُوِيَّيْ Aérobie (F).
Aerobe (E).
صفة الكائنات المجهرية الحية التي لا تستطيع العيش منقطعة عن الهواء .

٣٠١٠١ - هَوَاجِلِي Pulsatilla (F).
هي شقيق النعناع ، اطبله .

٣٠١٠٢ - هَوَاجِلِي ، هَوَاجِلِي Rhinopithecus (S).
Rhinopithecus (F).
جنس قرد من فصيلة الماريات . انواعه قليلة العدد ، موطنها بلاد التبت . تعيش في الاسراج الجبلية اي يترعرعها الثلج نحو اربعة اشهر . اجسامها متوسطة الحجم تطول من ٦٥ الى ٧٥ سم . ويوجدوا في الخضار الاسود . مناعيتها رقيقة الاذنية . اذنيها طويلة الشعر المرمزي الشكل والقد ، لوله الى الرقبة الصنابية ، اكبه القاعدة اصفر الطرف يعلو مواج فضي . اذنيها حنلة تطول نحو ١٠٠ سم . تتوشج بجناحات كبيرة يراوح عددها من ٦٥ الى ١٠٠ قوتها التبار والاشجاب والجدور والبرام والتلوي . انائها تنزع جرداً واحداً ترشمه نحو ٦ شهور .

٣٠١٠٣ - هَوَاجِلِي الارض المنخفضة .

٣٠١٠٤ - هَوَاجِلِي HUTCHINIA (S).
Hutchinsia (E).

نبات معقود التحريف حل اسم العائلة الايرلندية السيدة هَوَاجِلِي . عشية صغيرة معمرة من فصيلة الصليبيات . اصطلحاً تشمل بعض اقاليم البحر الايضر المتوسط . ساقها فراء قصيرة ، تملو نحو ١٠ سم . اوراقها متعاقبة مركبة ، وريقة البد ، حلجية او سياحية او تساعية الورقيات السنانية الصغيرة . ازهارها متفرقة التجميع . ازهارها بيضاء اللون . تنويرها يستمر من ايار الى آب .

٣٠١٠٥ - هَوَاجِلِي Hotinus (S).
Hotine (F). Hotinus (E).

جنس حشرات واثمة من نصليات الابهضة المتجانسة وفصيلة البرانيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اصطلحاً تحت من الحد الى الصين . تألف النباتات والحيات قوتها سحق الازهار . اجسامها متوسطة القد تطول من ٣ الى ٣٦ سم . رؤوسها صغيرة . عينها صغيرة نازدة . قربونها الاستشعارية دقيقة ، شديدة الصغر ، سفلية الانتساب ، مركزها تحت الاعين . جياها نازلة تحت كالكرون المتسلسلة الشفافة . اذنيها متباينة الالوان تكثر فيها السمرة الصنابية المواج . رواشها لاحقة مبيجة بالاخضر والاصفر .

٣٠١٠٦ - هَوَاجِلِي Hugonia (S).
Hugone, Hugonie (F). Hugonia (E).
جنية طيبة برية معمرة من فصيلة الكنائيات . مهدا

الحنجية ، لاح ، حنطى اللون ، اسمر المرق . رواشها خشايات ، شفافان . بطنها الى الحنطى ، يسر في الصفحة السفلى ويصغر في العليا . قوتها حنطية سمراء مسرحها المروج والمراحي . قوتها النع .

٣٠٠٩٢ - هَوَاجِلِي ، هَوَاجِلِي Heniochus (S).
Hénioque, Cocher (F). Whipl-fish (E).

جنس اسماك بحرية من شالكاكات الزمانف وفصيلة الصليبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من اسماك بحار البلاد الحارة . اجسامها مبططة ، رقيقة الظهور ، تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . بطونها دالقة المتضر . زمانفها الظهوية تنتهي بمرق غشوي المادة يشبه سوط الخوي . اذنيها الى الرقبة الخضراء او الرقبة الفضية يعطها تجديع متعرج اسود . لونها مأكولة ، متوسطة الصنت .

٣٠٠٩٣ - هَوَاجِلِي Air
هو ما يستنشقه كل حي لحياته . وهو مادة غازية مركبة تنفلط سطح الكرة الارضية فتكون السكاك الى السحاب ، وتقل كتلتها كلما ارتفعت عن سطح البحر . ومن المسلم به ان نصف مجموع الهواء الارضي يقع في المنطقة الكائنة بين مستوى سطح البحر او مرمى المروج وارتفاع ٦٠٠٠ م . اما العناصر التي يتكون منها الهواء ونسبها فهي :
ازوت نحو ٧٨ جزءاً
اكسجين نحو ٢١ جزءاً

ثم التزير من الايونين وفاز الكريون والايون والنيون والكريون والهليوم ، الخ . وهو يحتوي ايضاً على بخار مائي يعرف بالرطوبة النسبية .

٣٠٠٩٤ - هَوَاجِلِي Sylviadés (F).
في الدخليات ، اطبلها .

٣٠٠٩٥ - هَوَاجِلِي Saprophage (F).
Saprophagous (E).
الحشرات المهاكة هي التي تعيش على المواد النباتية للتحلل .

٣٠٠٩٦ - هَوَاجِلِي Caloramphus fuliginosus (S).
Caloramphie fuligineux (F).

طائر من المستلفات وفصيلة البقائيات . موطنه بعض اصقاع الهند والبلاد المجاورة . يألف الادخال والخرج اليمترة الاشجار ولا يستقر في مكان اكثر من خمس دقائق . ملهته الحياتي جماعي ، فريته قليل العدد لا يتجاوز خمسة ازواج . جسمه معتدل القد يطول نحو ٢٥ سم . رأسه كبير الجرم . منقاده شبه مخروطي الشكل ، كبير الحجم ، ارتفاعه عند القاعدة يفوق مرضه . جناحاه صغيران ، ذلفان . ذنبه معتدل الطول ضيق النرس ، منقود الطرف . ثوبه الى السمرة الناجية المتفارة الماجات . منقاده وقائمتاه الى السمرة الزرقية . صوته مزيج طنان . قوته الحشرات على اختلاف نضالها وانواعها والثمار النسية البرية . يلدن عنه في غنائب الاشجار . الاثني تحسن وسدعا من ٣ الى ٤ بيضات بين الذكر يلين لها الغذاء .

٣٠٠٩٧ - هَوَاجِلِي Aérhydrique (F).
نمت تعريفى يطلق على ما يتنفل بالهواء والماء او يسمل بالهواء والماء .

الته. جنودها ولحاء ساقها وفاندها مقرقة وتدر البول. ساقها غراء تملو نحو ثلاثة انتار. انتادها فردية او ثنائية الحواف. اوراقها متناقية، مستطبة. نصلها حشوية الجسمية، الشكل، سنائية الاطراف. ازهارها علقى التجميع، محوري الاكزان وطري. ازهارها صغرة اللحم خاسية البتلات، وردية اللون. ثمارها سيقية تلحف صجمة صغرة عددة السطح. ازهارها وجودها عطرية العرف المستحب الشبيه بالبنفسج.

٣٠١١١ - هَوْدَانِيَا *
Phaeostillaceae
عمارة ظلود مجهرية من فصيلة الكحيويات. تتميز بأعضائها الهوائية المباشرة الالوان. تشمل عدة انواع تنتمي الى ثلاثة اجناس: الازارويسيس والسيزانوس والشلفة.

٣٠١١٢ - هَوْدَكَة *
Ranella (S).
Ranella (F). Ranella (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مملئات المياه وقصيلة النيسويات. انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة. اعضاءها المحيط الهندي || اصنافها شبه اهلينية الشكل محاذرة يعلوها جذازان جانبيان مخدات او ماسلس او شاككان يكتنفانها من طرف الفتحة الى العقب.

٣٠١١٣ - هَوْدَكَة *
Stigmatopella (F).
طائر من فصيلة الحمايات قريب الشبه بالترلة. مهدد المناطق الحارة من العالم القديم يجوبها في طلب المريع والمصيد ولشقي || جسمه متوسط القد، يطول نحو ٢٧ سم. لونه الى الطحلة الصنائية الموزج تسمر في الرأس والظهر والجناح والذنب، وقبعر في الحسر والعنق والصدر والبطن والافتيك. متفاده حنلي الاذن. يجلده الى السرعة || يدن منه في الانجار المتوسطة الارتفاع. حشسته يهضان. الاثني تقوم بالترميم اما الذكر فيوطن لها القوت.

٣٠١١٤ - هَوْدَكَة *
Surnia funerea (S).
Surnia, Chouette-épineière (F).
طائر من البويات وهمازة الفداديات. فوه الى البياض الكهيب يطود تسليج اسمر يطوق العين والاذن. رأسه عادم الفقرة مستعرض وقصير. عسره لاطي. القروس. ملسه قوي البهرة. سقطه كبير القد منفرج الزاوية. ذنبه منشف الريش، مستطيل. ارساه ومقاله قصيرة كاسية. موطنه تسبح الاربعاء يشمل معظم المناطق المعتدلة. يألف اسراج الصنوبر والملاز. يسرح في النهار وفي الليل يستريح من الساعة المباشرة الى الرابعة من بعد الظهر ومن المباشرة ليلا الى الثالثة بعد نصف الليل. || يدن منه في تجاريف الانجار ومخالفات الصنوبر. الاثني تقع من ٤ الى ٨ بيضات تحضنها بمنوبة الذكر. || يرقته الجرد والفتار والحشرات لاختلافها. ج. هود.

٣٠١١٥ - هَوْدَكَل *
Etang naturel (F).
Natural pond, N. pool (E).
بحيرة صغرة تفيض بها مياه غياض وأجام فتقع. ج. اهود.

٣٠١١٦ - هَوْدَكَة *
Monstruosité (F).
Monstrosity (E).
الاجساد المشهين عن الشكل المألوف ان في الحيوان او في النبات.

٣٠١١٧ - هَوْر *
Etang naturel (F).
Natural pond, N. pool (E).
بحيرة صغرة تفيض بها مياه غياض وأجام فتقع. ج. اهود.

٣٠١١٨ - هَوْرِيَا *
Haworthia (S).
Hayworthia (F). Haworthia (E).
جنس نباتات لحمية مقرقة معمرة من فصيلة الزنبقيات.

٣٠١١٧ - هَوْد البَطْبَاط *
Heodes phlaeas (S).
Cuivré de l'oselle (F). Heodes phlaeas (E).
حشرة من فصيلة القنليات ورتبة حشرقيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا. فراشها جارية قوتها رحيق الازهار. سرقها تعيش على اوراق البطاطا والمبيض. جسمها صغير القد يطول نحو ١٠ م. سبطها نحو ٢٨ م. رأسها صغير الجرم. حينها ناشزتان. زبائنها شبه صليبية. جوشها حنلي الاذن كسنتي المراج يطنها كسنتي الاذن || روشنها الاماين الى الصهبة المغنية يملوها سبع فقط كسنتية وشار خارجي من الاذن نفسه. روشنها الخلفيان الى السرة الكسنتية الغبراء المراج يملوها قرب الطرف الخارجي جدة ملهية الاطراف لونها الى الصهبة المغنية || لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب. تسرح في النهار. تعاطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتتحرك المكان مباديا على نصال اوراق المائل || السرعة عنه يملوها الكمال تطول نحو ١٥ م. جسمها اهليني الشكل، عجب الظهر، كسيف الخمل القصير. ثوبا الى الخضار الاسمر يملوه غط قاطب احمر وقسمة اطواق كسكية جزوية الاذن. رأسها ارجواني الاذن. مدنها ورواجها الى الطحلة السمره || طور الاكمال الذي يستمر في الجيل الاول نحو ثلاثة اسابيع، يستمر في الجيل الثاني نحو ٢٢ اسبوعا.

٣٠١١٨ - هَوْد الحَمَاض *
Heodes virgurea (S).
فراشة من فصيلة القنليات. طولها نحو ٣٣ م. ذكرها اسمر الجسم غليظ الصدر مستعق البطن. رواشته الى الصفرة الحمراء والمزج يطوقها حمار اسمر ويملوها تنقيط لقياسي الجسم والبهرة. انتادها حمراء الجسم غليظة الصدر والبطن رواشها الى الصفرة الخفيفة يطوقها حمار كهيب ويملوها تنقيط اسمر واسود || يألف المناطق والمراعي. يسرح من حيزران الى آب. يرقته غاضلة تركب اوراق الحماض.

٣٠١١٩ - هَوْد المتناقع *
Heodes chryseis (S).
فراشة من فصيلة القنليات. طولها نحو ٣٢ م. ذكرها اسهب الذوب يملو مزاج مذهب. رواشته الى الحمرة الصنائية يملوها تنقيط اسمر وتتحش ازرق، حمارها عاني اللون، ابيض الطرف. انتادها حمراء الجسم، عطية الراشن المومضة بالاصفر والاخضر يملوها تنقيط اسود ويملوها حمار اسمر || يألف المناطق والمواقع الرطبة. يسرح من حيزران الى تموز. يرقته تركب اوراق معظم النباتات للمقيمة.

٣٠١٢٠ - هَوْد الزَوَاك *
Heodes doritis (S).
فراشة من فصيلة القنليات. جسمها محوري الشكل اسمر اللون يطول نحو ٣٠ م. ذكرها كسنتي الراشن المنقطة بالاسود. انتادها خضمة الشكل، رواشها الى الصهبة الخضراء



هود البطاط



هود الحامض



هود المتناقع



هودكة



هودلة



هودة

مهدا بعض مناطق افريقية الجنوبية . سوقها متدبة لا إر لها . أوراقها صغيرة الجرم ، خمية النصل ، أزهارها بيضاء اللون || تزدهر ثلاثين ضمن البيوت . تربي في الاتربة المعتدلة الاندماج ، الوافرة الحصب ، القنية بالمواد الغذائية العضوية والمعدنية || انواعها عديدة أشهرها التالية :

٣٠١٢١ - هورثيا جاميدة (S). *Haworthia rigida*

Haworthia rigida (F). نوع من الهورثيا . أوراقها مشقعة ، خسية الصفوف ، عريضة الازتكاز ، تطول من ٧ الى ١٢ سم . تصالها شديدة الصلابة ، بحرية الخضار ، يطولها موج اسمر . أزهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من أيار الى حزيران .

٣٠١٢٢ - هورثيا ستروفا (S). *Haworthia strobilifera*

Haworthia strobilifera (F). نوع من الهورثيا . أوراقها متصببة ، ضيقة النصل ، غززية الشكل ، تطول من ١٥ الى ٢٠ سم . وتعرض من ١ الى ٦ سم . تصالها مثاقلة ، مشاربة الخفاف . لونيا الى الخضار الالامس الشديد السرة . أزهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من أيار الى حزيران .

٣٠١٢٣ - هورثيا لزجة (S). *Haworthia viscosa*

Haworthia viscosa (F). نوع من الهورثيا . أوراقها مشقعة ، ثلاثية الصفوف ، النظامية الترتيب ، عريضة الازتكاز ، تطول من ١٥ الى ٢٠ سم . وتعرض من ٢٠ الى ٣٥ سم . عتصتها شالكة . عصاره نصلها لزجة . أزهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من أيار الى حزيران .

٣٠١٢٤ - هورثيا موزقة (S). *Haworthia fasciata*

Haworthia fasciata (F). نوع من الهورثيا . أوراقها مشقعة افقية الازتكاز ، تطول من ٣ الى ٤ سم . وتعرض من ١٥ الى ٢٠ سم . نصلها مائل الصفحة العليا ، لولوي الخطوط المتعرجة النظامية الشكل والترتيب ، غشن الصفحة السفلى . أزهارها بيضاء اللون ، تبينة الموج || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠١٢٥ - هورثيا مشبككة (S). *Haworthia reticulata*

Haworthia reticulata (F). نوع من الهورثيا . أوراقها مشقعة ، افقية الازتكاز ، مقطعية الرؤوس ، تطول نحو ٢٥ سم . وتعرض نحو ٧ سم . نصلها محدودة الصفحات العليا ، محددة السبل . لونيا الى الخضار الزاهي تملوه خطوط متشابكة سمراء اللون . أزهارها تبينة اللون يملوها موج اخبر || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠١٢٦ - هورثوس (S). *Rhacophorus*

Rhacophorus (F). *Rhacophorus* (E). جنس حيوانات قازبة شاجرة من الضفادع وفصيلة الهورثيات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ اعطائها تمتد من اشدت الى الصين واليابان وجزيرة مدغشكر || اجسامها متبانية اللد يكثر فيها الحجم البسيط . اذواها ثمانن البيئة التي تعيش فيها . اصابع قوائمها مقبدة بحبل رجيحة تمتد

٣٠١٢٥ - هورثوسيات (S). *Rhacophoridae*

Rhacophoridae (F). *Rhacophoridae* (E).

فصيلة حيوانات دوداء قازبة شاجرة من لة الحديديات ويرمية السونيات ودبة البربات . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٨٠ مهدا البلاد الاسيرية والاافريقية ومدغشكر . جميعها من الضفادع المعتدلة الجسم || اجسامها متصببة اللد . اذواها مختلفة الالوان يكثر فيها الاصفر . تتميز بمخاط البنية التي تمشي فيها وتتميز ايضا بمسارعة سطح ضلبي قوسها الصدري في مركز قناتها ، ومخلو فقرة السمن من التواءات المنظمة الجانبية . فكلها العليا سفنة . اصابع قوائمها مقبدة بحبل متبانية الرحابة والامتداد . اطراف اصابعها مزينة بلبس عجينة تمكثها من تسلق السطوح المائلة || تعيش معظم حياتها على الاشجار وتختلف النباتات || اناتها تترأ في مخاض خاصة تخلدها بموازرة الذكور على ضفاف المنابع والندران فوق مستوى الماء بنحو ١٠ سم . ثم تحلق نفقا ثانيا متحدرا من المخاض الى سطح الماء . الاناث حنة التفرقة تقرر اول مادة روية فورة متقببة شلة الدليل المولدة من ٤ الى ٦٠ ديلة . ويبقى الدليل ضمن هذه الرغوة التي تقون له الرطوبة حتى التفق فيزلق اذ ذاك على سطح المنحدر وينوس في الماء .

٣٠١٢٦ - هورثوس (S). *Aphomia sociella*

Aphomia sociella (R).

فراشة من فصيلة التاريات ودبة حرشيات الاجنحة . الاث اكبر قدأ من الذكر . مسطحا نحو ٣٥ سم . وبسطة الذكر ٢٦ سم . جميعها الى البياض الخيطي الموج . رشاشها الاسمان الى البنية الشبها في التارئين الارلين ثم الى الطحلة الخضراء تترشها خطوط سمر ونقط سمر تنام الاصاب . رشاشها الخلفاني الى البياض الاخير . اهاب ورانها فضية تركز على جنة سوداء قليلة المرض || يربها الى الطحلة الصفراء تملوها لمل سمر . رأسها جروي اللون || تعيش في عشاء بعض الحشرات من غشائيات الاجنحة وقد تدخل المنازل والمكاتب ويستودعات الورق فترش الورق والكذب والقليل ...

٣٠١٢٧ - هورثوس (F). *Fulax*

حور مجلدسي مطنق من ارقام اولوج البحر . ج هوراث ولواخ .

٣٠١٢٨ - هورثون (F). *Huron*

حيوان لاسم مقترس يلى فرون ، اطليه .

٣٠١٢٩ - هورثوس (S). *Hura*

Hura, *Sablier* (F). *Sandbox*, *Possumwood* (E). *Sandbückenbaum* (D). *Sablier blanc* (I).

جنس اشجار برية وعرجية من فصيلة القريزيويات . انواعها المعروفة ٥ اعطائها البلاد الاسرائيلية والحاد . اوراقها متعقة متبانية نفيزة . نصلها قلبية الشكل ، مدبية القفصة . ثمارها مجموعة من القصوص الثنائية اللفلة تحضن زورأ لياها بجالي المادة الفعالة . والثار حنة انفلاتها بعد الادراك التام تحضن دويأ يشبه دوي الانفجار يستخرج من عصاره سيقا ومن لباب ثمارها مادة قلرية جمالية شديدة التلشط .



هورس



هورث

٣٠١٣٦ - هُوَشِيرَا مُدَهِيَّة٥

Heuchera sanguinea (S). *Heuchère sanguine* (F). *Coral bells*, *Crimson bells* (E). *Alranwurz*, *Rote Alunwurz*, *Purpurglockchen* (D). *Eucera sanguinea* (I).

نوع من الهوشيرا ، شارينها تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها مدورة خماسية او سباعية الفصوص المسنة الملهبة. نصلها مائل البشرة على صفحته . ازهارها عشوية التجميع ، لونها الى الحمرة الدامية || تنورها يستمر من ايار الى تموز .

٣٠١٣٧ - هُوَشِيَّة٥
Hovenia dulcis (S). *Hovénie*, *Hovène sucré* (F). *Japanese raisin tree*, *Ground squirrel*, *Gopher* (E). *Hovanie*, *Zieseln* (D). *Ovenia* (I).

نبات وحيد الجنس والنوع من فصيلة البقييات . هذه الشرق الاقصى من اليابان الى الصين . ثمرته تملو حتى ٢٠ م. اوراقها مسننة متعاقبة حادة؛ نصلها قلبي الشكل بطول ١٦ سم. ويعرض نحو ٩٩ صفحة مائلة البشرة ، مسننة الحافة. ازهاره عشوية التركيب ، صغيرة القذ ، ريشياتها وتنايلها ليلية الماددة ، حمراء اللون ، مأكولة ، سكرية المذاق، طعمها كالزبيب . ويستخرج منها ومن الاوراق عطر مرغوب فيه شائع الاستعمال || تنورها يستمر طول فصل الصيف .

٣٠١٣٨ - هُوَقِل٥
Spermophilus (S). *Spermophile* (F).

جنس حيوانات لينة قاضية من فصيلة السنجائيات. انواعه نحو ٦٠، منها ١٥ موطنها العالم القديم و٥٥ موطنها امريكا الوسطى والجنوبية . جميعها صغيرة القذ طولها يراوح بين ٢٠ و٣٥ سم. واذنانها من ٦ الى ٨ سم. || اجسامها مستطيلة رشيقة . رؤوسها اسطوانية الشكل . هييها كبيرة . اذنانها مستديرة . جرمها الامامية رباعية الاصابع اما الخلفية فمخنثية . اذنانها قصار جيلات الصوف . اذنانها سوية اللون ووسها واطرف جرائها الى الجفوة الصنانية . ظهورها الى الريد . بطونها الى الصفار النني. وفي بعض الانواع الامريكية الذوب مخططة ومنها مؤذرة . تأثت الاذغال والحقول للمؤذرة . تنسلق الانجار بخفة ، لكنها تقضي حياتها على الخفيض . جصورها سحبات فضية مستديرة عديدة الاتفاق تمر كرها في الهواء على اعماق تراوح بين ١٥٠ و٢٠٠ سم. قوتها البزور والحبوب والجلود والفار والوزع والطير . اناتها تنقع من ٣ الى ٦ اذناس تبصر وتكتسب بعد اسبوع .

٣٠١٣٩ - هُوَلَان٥
Semnopithecus (F). نوع من القرود المقتدة يدعى هبار ، اطلبه .

٣٠١٤٠ - هُوَلِيَّات٥
Sphingidae (F). هي فصيلة الصليبات من سرشفيات الاجنحة .

٣٠١٤١ - هُوَلِيَّة٥
Protoparce (S). *Protoparce*, *Sphinx d'Amérique* (F). *Horn worms*, *Horn blowers* (E).

جنس حشرات من فصيلة الصليبات او الموليات . انواعه المعروفة خمسة . جميعها فراشات كبيرة القذ لا يقل طولها عن ٦ سم . وبسطةا تراوح من ١٠ الى ١٢ سم. اذنانها مسننة مابقة الموج يملوها بنمط وتبيح اسمر . رؤوسها الامامية والخلفية مزخرفة وزرقة بالاسفر والاحضر

Horia (S). *Horie* (F). *Horia* (E).

جنس حشرات منغطة طيبة من غديات الاجنحة وفصيلة الذراحيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم المناطق الاستوائية من المائلين القدم والجديد . الجملانة منها خاضعة ولينة ، اما البقية فقاضية وبعضها يتطفل على غشائيات الاجنحة || اجسامها كبيرة بطول ٤٠ الى ٤٥ سم. رؤوسها كبيرة نائفة . علاسها الشفوية قاضية . قرونها الاستشعارية صلبة مقوسة . كسلها اصق من الرأس ويلين . اعقادها بجنية الشكل . الوبها متباعدة اللون اكثر فيها الاحمر الحمرى والجلوي ، بعضها ملون القند بطين ، قاعدي وطرفي || جميعها ناضجة تستعمل استهلاك الزراع .

٣٠١٤١ - هُوَرَب٥
Gyps des Indes (F). هو الغشام الهندي ، اطلبه .

٣٠١٤٢ - هُوَرَنْ٥
Ketupa جنس طير من البويات وحرارة البويات . انواعه المعروفة اربعة . موطنها يند من الصين الى الهند وبلاد فارس. جميعها كبيرة القذ ، قريبة الشبه من البو . طولها يراوح من ٥٠ الى ٦٠ سم. اذنانها الى الطلعة يملوها ريشة سوداء . تأثت الذناب الطويلة القاضية على مجاري الماء . سرورها جدوي يند من السق الى البحر . قوتها المستحب الاسماك والقرشيات || تنم في تجاويف الاشجار . حشنتها تراوح من ٤ الى ٦ يضافت || اشهر انواعه هورن جبارا وهورن سرتيد .

٣٠١٤٣ - هُوَشِيرَا٥
Heuchera (S). *Heuchère* (F). *Heuchera* (E). *Alunwurz* (D). *Eucera* (I). نبات معقود التعريف على اسم الطبيب النساوي هوشير (١٦٧٧-١٧٤٧) وهو جنس نباتات عشوية برية وزيينية من فصيلة القليات . انواعها نحو ٢٠ جميعها جلوسورية معمرة . اوراقها جلعية الانتساب لا قياس الاشكال والتنعيس . ازهارها صغيرة القذ لا نظامية التجميع ، منها العشوية والسليبية والمثولية . جميعها ترتكز على شراحيب منصبة رقيقة .

٣٠١٤٤ - هُوَشِيرَا اَمْرِيكِيَّة٥
Heuchera americana (S). *Heuchère d'Amérique* (F).

نوع من الهوشيرا . شارينها تملو نحو ٥٠ سم. اوراقها مدورة خالصة او سباعية الفصوص المسنة الملهبة . نصلها لينة على صفحته . ازهارها مثكولية التجميع ، صغيرة القذ ، تبو الى الخضار الباهت ثم تنحرف الى الخلفي . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠١٤٥ - هُوَشِيرَا صَغِيرَة الزَهَر٥
Heuchera micrantha (S). *Heuchère à petites fleurs* (F).

نوع من الهوشيرا . شارينها تملو نحو ٦٠ سم. اوراقها مدورة خالصة الفصوص المسنة . نصلها مائل البشرة على صفحته . ازهارها مثكولية التجميع يفيض البتلات ، خضر الكوس ، حر المار || تنورها يستمر من ايار الى حزيران .



هوري



هورن



هوشيرا



هوشية



هول



هولي

٣٠١٤٩ - هوميروا المضطرب Homeria collina (S). Homérie des collines (F).

نوع من الميوية. منبتها المضطرب المشقة على البحر. ساقها شراخية ترتفع من ٤٥ إلى ٩٠ سم. ورقها وسيدة مستطيلة النصل. أزهارها تطلق الشرارات وهي إلى الحمرة السعاء أو الحمرة الموشحة بالبرتقالي في تنويرها صيفي.

٣٠١٥٠ - هوميروا أنيقة Homeria elegans (S). Homérie élégante (F).

نوع من الميوية. ساقها شراخية ترتفع نحو ٣٠ سم. ورقها وسيدة مستطيلة. أزهارها تطلق الشرارات وهي إلى الصغار الكبريتي تعلوه بقعة زرقاء في تنويرها صيفي.



هوميروا أنيقة

٣٠١٥١ - هوميروا Humiriaceae (S). Humiriaceae (F).

فصيلة نباتية من فوات الفلتين مستطيلة القملات مرققة المبيض. أجناسها ثلاثة وأنواعها نحو ٤٠ أعطتها البلاد الاستوائية أغصانها أمريكية الجنوبية إلى نباتاتها عجيرات وجنيات. أوراقها بسيطة، متعاقبة، عديمة الزئفات، جلدية النصل. أزهارها عشكولي التجميع، طرفي الارتكاز. أزهارها خشوية، نظامية، خاسية الأجزاء. ثمارها نورية إلى أشهر أجناسها الميوس.

٣٠١٥٢ - هوهو، كوكرو مذهب Chrysococcyx auratus (S).

Chalcide doré, Coucou doré (F). Gilded cuckoo (E). طائر من الطوقيات وفصيلة الطوقيات. أصله إفريقية الشرقية من البحر الأحمر إلى الموزنيك. يألف الغابات الكثيفة. يحمله الإخصان الألفية الارتكاز في الانجبار الباقية وهو من الضوابط التي تجرب الغابات في طلب الرزق. جسمه متوسط القد بطول نحو ٣٠ سم. قوه إلى السمرة الخطيئة يملؤها مزاج أسفع في الجناحين وموجة ذهبية في ريش سائر الجسم إلى قوته الخشبات والأساربع أثناء كاشي الطوق لا تحضن البيض بل تقعه في عشاش غيرها من الطير أعصها عشاش العصافير الحاضرة.



هويا

٣٠١٥٣ - هويما Hoya (S).

Hoya, Hoyer, Quadrilla (F). Fleishy leaved, Wax flower plant (E). Heischige Hoya, Porzellanblume (D). Fior di cera, Fiore della cera (I). جنس نباتات ترينية مسرة من فصيلة الصقلابيات. جميعها جنات مستطيلة عارشة فروع. أوراقها متعاقبة مسنقة بيضة الشكل. نصلها جامد الصفة، قائم الخصار. أزهارها صيرولي التجميع قلنوسي الشكل أبلي الارتكاز. أزهارها صغيرة القد عاجية اللون يتوسط بتلاتها دائرة حمراء. تنويرها يستمر طوال الربيع والصيف.

٣٠١٥٤ - هويما Lophomys d'Inhous (F).

حيوان لبون قاصم يدمى لليوم، أطلبه.



ميد

٣٠١٥٥ - هياد هياص Hyas (S).

Hyade (F). Hyas (E). جنس حيوانات بحرية من القشريات شاربات الأبريل قصيرات القليل الحركات وفصيلة المراجيات. أنواعه المعروفة قليلة البدن منتشرة في جميع بحار العالم باستثناء القطبية إلى أجسامها عريضة من متدلة التبطيط، مثلثة الصفة العليا، تقطرن من ٥ إلى ١٠ سم. ملاقطها نشطة، قوائمها

والأسفر والآخر المؤري. تظهر الفرائشات وهي وحيدة أو ثنائية الجبل الحولي في أوائل حزيران فتضائل ثم تمتع مكثها على أوراق الصبغ وسائر نباتات الفصيلة الباذنجانية فينتفج بعد متعته خمسة أيام ويكون ذلك عند أواخر التوتيرة الثانية من حزيران. ريقها تسمى اللبوة القرنية. ريقها غفراء اللون، سمره اللب، كبيرة القد، مجعدة الجوانب، تحمل في أصل مؤخرها زائدة صغرى التركيب تشبه القرن. وهي تبلغ حجمها النهائي بعد نفقها بأربعة أسابيع فيراوح إذ ذاك طولها من ٨ إلى ٩ سم. أزهارها كبيرة لأنها تلتهم النصال مع عروقها ولا تبني إلا حل الإصلاح الشخينة. تكاثرها صغيراً أو نفساً باستعمال أخضر باريس أو زرعها في الرصاص أو الكربوليت أو الأندرين.

٣٠١٤٢ - هوم Sous-eol (F). Subeol (E).

الهوم هو بطنان الأرض لا يباله حره أو قبه.

٣٠١٤٣ - هوم الجيوس

« مجرة شبيهة باليامين لها بعض الحلاوة وأجود زهرها الأخير الذي يطو سرة ويكون حديقاً وصيت هوم الحرس لأن عبدة النار يستعملونها في صبادتهم ويسون لها منافع عجيبة. القاموس

٣٠١٤٤ - هومات Humeca

ملح يتأتى من الحامض الدهالي.

٣٠١٤٥ - هومس Humus

هو الدهال، أطلبه.

٣٠١٤٦ - هومي أنيقة Humea elegans (S).

Humée élégante (F). مجلة سبروتية ترينية محملة من فضيلة المركبات. مهدا أستراليا. ساقها فروع تدور من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقها متعاقبة سائفة. نصلها أحليجي الشكل، جميل الخصار، خلي الصفة، يطول من ١٥ إلى ٢٥ سم. رائحته، عند اللمس، هلموية العرف. أزهارها رؤسية التجميع، صغيرة القد، كثيرة العدد، تطول من ٨ إلى ٨ سم. لونها يختلف مع القرب، منها القرمزي والياقوتي والأشقر الخطي والياض. أزهارها هرمي الترتيب. تنويرها يستمر من حزيران إلى تشرين. تتكاثر بالبرر ويجود في جميع الأثرة المعتدلة الانساج والبطوبة.

٣٠١٤٧ - هومير Humirum (S).

Humirie, Humirits (F). جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة الهوميديات. أنواعه المعروفة نحو ٢٠ مهدا أمريكية الاستوائية. سوقها معتدلة التفيد. أوراقها بسيطة، نظامية، متعاقبة، جامدة النصل. أزهارها عشكولي التجميع، طرفي الارتكاز. أزهارها بيضاء اللون أو تبتية أو وردية.

٣٠١٤٨ - هوميروا Homeria (S).

Homérie (F). Homeria (E). جنس نباتات عشبية دوفسية برية وزراعية ترينية معقودة التبريف على اسم هوميرس. منبتها بعض أصفاق الشرق الأدنى وإفريقية الشمالية. سوقها شراخية. أوراقها فردية عقيمة النصل المستطيلة. أزهارها جملة الشكل، متساوية البتلات، ملتصقة الاسدية التي تصبح كالانبوب وهي من فصيلة السوسنيات. أنواعها قليلة العدد أشهرها التالية.



هيبال



هيب الجراب



هيب الفرقل



هيب القطنيات



هيب متلون



هيبون

كبيرة . اقواها الى المرة الصفراء المواج || تألف المواق التي يكثر فيها الخث او الاسفنج او الحيوانات الطحلبية حيث ترتب طرائدها بامثنتان || اشهر انواعه الهيد المتبوكي (H. araneus) .

٣٠١٥٦ - هيباك Eboulis (F). Fallen rocks (E). هي المواد المنهارة من صخور وغيرها .

٣٠١٥٧ - هيباط Marés montante (F). Flood-tide (E). هو اندفاع مياه البحر ودونها من الشط . ويعدى المد ذلك لان المياحة عند ارتفاعها واندفاعها نحو اليابسة تنتشر وتمتد وتقرب .

٣٠١٥٨ - هيبب Hippa (S). Hippa (E). جنس دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الاربل طويلات الاذنان وفصيلة الهيببات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من قشريات بحار المناطق الحارة || اجسامها صلبة اللد ، محبة الظهور ، تطول من ٢ الى ٤ سم . تتميز بقرونها الاستشعارية المشابهة التركيب المستطيلة المنحنية وبماليقاتها البنية المستطيلة وبارجلها القصيرة المشعرة الاطراف التي تمكنها من الانتقال بسرعة . اقواها تراوح بين الزرقه والبركة بطولها الى السرة .

٣٠١٥٩ - هيببال Hybalus (S). Hybale (F). Hybalus (E). جنس غنائل من غديات الاجنحة صفيحات القرون وفصيلة الهيببات . انواعه المعروفة ١٢ اعطائها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط والجزيرة العربية || اجسامها شبه بيضية الشوزن تطول من ١٠ الى ١٥ م . كواهلها وامدادها متدلة الاحدياب . رؤوسها مخروطية . متاكها ناشرة مدبية . هيوتا صغيرة مباحة . قرونها الاستشعارية مكررة الاطراف الصفيحية . قوائمها نشيطة متكاثفة الحلب الذي يملوك ايضا الرأس والجزء الاسامي من الكوسل . اقواها تراوح من الشفحة السراء الى الجفوة . امحادها لاسفة . مستديرة الاطراف . جميعها جامة تعيش على المواد العضوية والنباتية المنحلة .

٣٠١٦٠ - هيبير Hypera (S). جنس حشرات من السمريات . انواعه كثيرة العدد جميعها صغيرة اللد طولها يراوح من ٣ الى ٧ م . اقواها مختلفة الاوان يكثر فيها الخثي الاسر . قرونها الاستشعارية مرفقة منفرجة الزوايا || اعطائها البلاد المتدلة الحرارة . سرسرها دجوي . اشهر انواعها ما يتبع .

٣٠١٦١ - هيبير الجراب Hypera fasciculata (S). نوع من الهيب . طولها يراوح من ٧ الى ٤ م . ثوبه حنطي اللون تملوه مشعة رمادية وتغطى قاطب اسود . تألف الازفة الربلية . يركب جميع انواع الجراب ومثلها النباتات الزرقية التي يقضم اوراقها || يرقاته مؤذية تنخر البراعم وقد تسبب تلفها .

٣٠١٦٢ - هيبير القرقفل Hypera arazor (S). * نوع من الهيب . طولها يراوح من ٥ الى ٧ م . ثوبه الى

السرة الخنطية يملوها توشع قاطب قليل السرة والذكافة . يرغب في الازفة القليلة الانساج والرطوبة . يركب اكثر القرقفليات فيقضم الازراق ويذها .

٣٠١٦٣ - هيبير القطنيات * Hypera nigrirostris (S).

نوع من الهيب . طولها يراوح من ٣ الى ٤ م . ثوبه الى الخضرة الزاحية ، غطه اسود . يرغب في المواق القليلة الرطوبة . يركب القطنيات فيقضم الازراق ويذها . يرقاته تلهم البراعم والازهار تنفض عليها .

٣٠١٦٤ - هيبير متلون * Hypera variabilis (S).

نوع من الهيب . طولها نحو ٥ م . ثوبه الى الصغار الحنطي يملوه مواج اسف . يركب اوراق البرسيم فيسحقها كالغفرال . يرقاته صغيرة اللد فستقية اللون تعيش على البراعم والازراق النابتة .

٣٠١٦٥ - هيبيرسيه Hibbertia (S). Hibbertie (F). Hibbertia (E).

جنس شجيرات وجنيات برية وزراعية تربيتية من فصيلة الدلائيات . انواعها المعروفة نحو ٨٠ منتشرة في جميع جزر الزايج واقاينية واسترالية وتسانية || نصف نباتاتها شجيرات صغيرة والنصف الآخر سرعي او متسلق وعارض . اوراقها متعاقبة ، كبيرة النصال ، معتقة او حاصنة . ازهارها محورية الزنكاز او البطلة ، كبيرة اللد ، خماسية البتلات المنسطة ، يسود فيها الابيض التي المواج ، ومنها الصفراء واللثارية والاريدوانية والمروضة .

٣٠١٦٦ - هيبيرسيه * هي مصرية الشجر ، اطلبها .

٣٠١٦٧ - هيبكون * Hypocum procumbens (S). Hypécaum, Hypécon, Cumin cornu (F). Procumbent hypocum, Horned cumin (E). Pfefferkümmel, Hornkümmel (D). Cornacchia (I).

نبات عشبي بري حولي من فصيلة الخشخاشيات . اوراقه بحرية اللون كثيرة التفريص والتشفرج . ازهاره فردية التجميع ، طرفية الزنكاز ، رباعية البتلات المزدوجة التركيب . محاق قرون مستطيلة ، منجلية الحلق .

٣٠١٦٨ - هيبوب Hippopus (S). Hippope (F). Hippopus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرضويات صفيحات النحاشم وفصيلة الجرابيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض بحار البلاد الحارة اعصها البحر الاحمر والاقريط الهندي || اصدها لاشعوية المصاريح والاضلع والتخديد الطولي ، ملونة ومبجعة بالاحمر والاصفر || تعيش متنمة في الرمال وفي الاسمال على اعماق تراوح من مترين الى خمسة امتار .

٣٠١٦٩ - هيبليات Hippidae (S). Hippides (F). Hippidae (E).

فصيلة دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الاربل ، طويلات الاذنان . اجسامها وانواعها المعروفة نحو ٩٠ || اعطائها بحار البلاد الحارة . تألف المواق الكثيرة الامات والتي لا يزيد عمقها عن ٣٠ م || ادماصها قريبة الهيب بعلاميس السلطان الا ان اذنانها عادة الحمة || اعرف اجناسها الهيب



هيب

السرقة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٦ سم. جسمها اسطواني الشكل. ثوبها الى السطحة القدرها يطولها تديش اسود وضطوط قاطبة ومترعة صفراء اللون وثوبها جانبية مهدية. رأسها شديدة السمر. تحمل في اعل منها زائدة صغيرة يئابة نارية اللون تنتشر عند الانقضاء وتلقح منها رائحة حريفة مزجية. ورائحتها ومنها الى السمر في طور الاكمال يستمر نحو ٢٨ اسبوعا تحضيا للحادة متدلية برباط المشن تقفده الحوصية.

٣٠١٧٦ - هَيْمَة Aglon (F). Eaglet (E).
هو فرخ العقاب لا يزال بحماية أبيه واه.

٣٠١٧٧ - هَيْمَة بقلة من النجيل (اللسان).

٣٠١٧٨ - هَيْج Etiolement (F). Etiolation (E).
اصفرار النبات وتحوله. راسع قضاة.

٣٠١٧٩ - هَيْج Nycticebus tardigradus (S).
Nyxcticeba tardigrada, Loris cardigrade (F).
Kukang Loris, Slow-paced Loris (E).

حيوان لبون وحيد الجنس والنوع من فصيلة البوموريات موطنه يمتد من الهند الى صين. يألف النباتات والاحراج الميمرة الاشجار التي يتسلقها بطفة مدمنة. جلته الحياتي جامعي. جعاهاته قليلة البدد الذي يراوح من ٥ الى ٢٠ سرجه دجوي يستمر من لحة الليل الى الفجر العميق. قوته اوراق الاشجار وزعماتها والثار البانعة واغشرات والصافير ويضيها في يمتن من الحيوانات الشجرة لانه يحفي معظم حياته على الاشجار. جسمه قفص صغير بطول نحو ٣٨ سم. يتميز بالندام اللب. رأسه شبه مكور الشكل صغير الحظم والانس. عيناه كيرتان مستديرتان. اذناه صغيرتان، مستديرتان، كاسيتان. شره جلث بالغ النعومة خالي للمس. ثوبه الى الصبغة الصفراء المواج يطولها تمشيع ادمن في الاطيان ويعطو عطر قاطب كسني يمتد من الحاجبين الى قمة الرأس فتح الظهر فالسرم. عيناه مملوحتان بالاسود الادمن. قصبه انفه غبراء اللون. وقوبه هذا يتحور مع العمر اذ تملوه نمشة فضية تزداد مع مرور الايام في الاثن تتحل يشوب الذكر الا انه اجبت ماجة وهي ثنائية الثدي. يحبلها يستمر نحو سبعة اشهر تضع في تمامه جرأ واحد.



هشام



هشام الزوائد

٣٠١٨٠ - هَيْدَب Cumulus
هو الصير، نوع من النجوم الماطرة المتوسطة الارتفاع.

٣٠١٨١ - هيدرات Hydraz
جزء ماء اسيدتلت منه ذرة الهيدروجين القاعدية بذرة اخرى موجبة الكهربية.

٣٠١٨٢ - هيدرات الكربون، مواد هيدروكربونية Hydrazes de carbone, Matières hydrocarbonées (F).
Hydrocarbon (E).

مركبات عضوية من الكربون والاكسجين والهيدروجين، منها المخلصات غير الاثرية كالنشا والسكر ومنها المواد اللعنية وغيرها.

٣٠١٨٣ - هيدروبكليات Hydroptilidae (S).
Hydroptilidés (F). Hydroptilidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حبلوتات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة البدد منتشرة في بعض مناطق البلاد



هيج

٣٠١٧٠ - هَيْمَة Fibula (S).
Fibule (F). Fibula (E).

جس نباتات نجمية او عشية معمرة بيرة من فصيلة الصليبيات. انواعها المعروفة قليلة البدد. جميعها من ثبوت حوضي البصر الابيض المتوسط في سورها فراء. اوراقها متعاقبة، سنانة الاتصال. ازهارها شبه سنبل التجميع. ازهارها صغيرة صفراء اللون. ثمارها سفاه، شبه بيضيه اللون، مبطة الجرم، خلية السقاء، ثنائية البزور المفلطحة المستديرة في اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية:

٣٠١٧١ - هَيْمَة جوبيه Fibula clypeata (S).
Fibule à bouclier (F).

نوع من الهيمية، نجمة صغيرة. اوراقها الجلدية سنانة الاتصال المستطيلة. اوراقها الدايا غيطية. تنويرها صيفي.

٣٠١٧٢ - هَيْمَة صريلة التمر Fibula eriocarpa (S).
Fibule laineux (F).

نوع من الهيمية. عشية معمرة. اوراقها الجلدية رحيمة الاتصال المستطيلة المسنة الخار. اوراقها العليا صفية الشكل قصيرة. ثمارها مستطيلة الحمل الذي يبدو كالصوف تنويرها صيفي.

٣٠١٧٣ - هَيْمَة متخيشية Fibula rostrata (S).
Fibule éperonné (F).

نوع من الهيمية. عشية معمرة. اوراقها كوراك الجوبية. ثمارها كشية الحمل المتوسط الطول، تنتهي بتاج حادة. تنويرها صيفي.

٣٠١٧٤ - هَيْمَة Zerynthia (S).

جس حشرات فراشية من حمارة المذانيات. انواعها عديدة جميعها متوسطة القد، بسطها تراوح من ٤٦ الى ٥٢ سم. اجسامها اسطوانية الشكل، حنطية اللون. بطونها ملوثة بكثرة فيها الاجر والخطوط القاطبة. رواشها الى الصفرة تملوها زركشة سوداء وتقيح احمر وارزق في اوائل الربيع، تمتع مكثها على مختلف النباتات البرية يفتق من رقات غاضلة تعيش على اوراق النبات. يرقاتها اسطوانية الشكل غبراء اللون منشفة بالاسود.

٣٠١٧٥ - هَيْمَة الزرأوكند Zerynthia polyxena - creusa (S).

Zerynthie du littoral, Thals, Cassandre (F).
Zerynthia polyxena - creusa (E).

حشرة من فصيلة الفراشيات رتبة عرشيات الاجنحة. موطنها البلاد الحارة وبعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط. فراشها رائحة قوتها مغر الازهار، سرتها تمش على اوراق النباتات البرية واعصها الزرأوكند في جميعها متوسط القد بطول نحو ١٩ سم. بسطها نحو ٤٨ سم. رأسها كسني اللون. عيناها كيرتان ناشزتان. زباناها صرغانيان. جوشها كسني اللون. يطها الى الخشلي العنان يملو تعيق جانبي اصفر وضطوط قاطبة ومترعة كسنية في رواشها. عند الشقين الى الصفرة تملوها زراكش وتزادق سود ويقتح قطر حوزق في الحابل واحد في الحبل. تظهر القرائنة في مطلع الربيع تسرح في النهار. تتأكل بمد ظهورها ينحوسه اسابيع ومتم للكن مباحدا على نصال اوراق النباتات البرية واعصها الزرأوكند في

٣٠١٩٢ - **هيدروبيكيات**
Hydrologie (F).
Hydrology (E). علم خصائص المياه وتوزيعها .

٣٠١٩٣ - **هيدروبيكيات**
Hydromys (S).
Hydromys (F). جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الفأريات . أنواعه قليلة موطنها أستراليا . جميعها قاذية . أجسامها مسطيلة . طولها الكامل يراوح من ٤٥ إلى ٦٥ سم . رؤوسها موزنية الشكل . ذلقتها مقبوضة . أذنانها مستديرة . جوارها قصيرة . أصابعها خاسية غشائية القاعدة || تألف شطوط البحر وغفاف الأنهر والبحيرات ، تسبح وتطفئ بسهولة فائقة . قوتها المواد النباتية والأسماك الصغيرة والقشريات .

٣٠١٩٤ - **هيدكة**
Nectria (S).
Nectria (F). جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة المشويات . أنواعه عديدة بعضها شديد الازدياد || يوهها الخاريجي اعليجبي الشكل ، صغير القد ، رمحي الارتفاع . أصابعها فضة ، نديلية السطح ، حمرانية اللون ، ترتكز على ونبية نائقة || بوغ نكتاتيا ثنائي الخياء تشطوره وبيرة متفرعة الى جزئين لا مساويين العلوي اكبر من السفلي || اعرف انواعه واضرها الستة التالية .

٣٠١٩٥ - **هيدكة حمرانة**
Nectria cinnabarina, Tubercularia vulgaris (S). Nécrose du bois (F). Coral spot (E). Rotpustelkrankheit (D). فطر مجهرى يمتري بعض الانجبار المشمرة والحرجية المنخسف الاجاص والبشلا والبنق والنبق والجزوز والجزوز والخجور والخراف وانجبار والنجوع والردار والزان والزيزريق والشرم والصغيراء والصنوبر والصنوبر والغيراء والقرويين والقيقب والكنسة والبلابل والحزان والمثث والنبق والمهلد الخ... فيعطها وقد يسبب يسهها || مظهره الخاريجي يشور جلوية اللون لا قياسية البنية تركب الاغصان والافئان من الربع الى الشاء تنصطب البشرة واللحاء وتقضي على الشكير عند انتشاب البزاهم فيبدو الخشب حاريا من القشور تملو كمة سمراء || يكاثف في الانجبار المشمرة مكافئة الهيدكة الحنطية .

٣٠١٩٦ - **هيدكة حنطية**
Nectria galligena, Cylindrocarpum mali (S). Chancres du pommier, Ch. des arbres fruitiers à pépins (F). Apple canker (E). Apfelbaumkrebs, Nectriakrebs (D). فطر مجهرى يصيب التفصاح والاجاص فيسبب اوعم المروغ بأكلة التفاح || مظهره الخاريجي يشور مقرصة لا قياسية الشكل والحجم تركب الاغصان والافئان والافئان والثر || يبدو على الافئاد والافئان بقع محروبة تركب بشرة اللحاء ، عند انتشاب البرعمة ، فصيدها وتقضي عليها وعلى ما دونها من اللحاء حتى الشكير . وقد تمتد الى البرعمة فتصلها || وهو على الثآير بقع غشائية تركبها قبل الإدراك وعنده ويعد قشطب السؤق وتمجبه يد البشرة والشرة . يأكل الثمر ويستقل او يقصر ويبقى كالموياء تكشفه طبقة غروية لزجة لا تخلو من بعض التجاويف الخملية . يكافح اولاً بقتل الاعضاء المصابة ويتبعثر الجروح إما بملفات الحديد المحلول ٢٪ وأما بالمركب التالي : سلفات النحاس ١ ، كلس يافض ٢ ، زيت كتان محروبة ٢ . ثانياً باستعمال سائل بودو المحلول من ٢ الى ٣٪ او غيره من الفوطير الفعالة على ان تنفع الانجبار في الحريف

المعتدلة الحرارة || اجسامها شديدة الصغر ، سمراء اللون . بسطة اجنتها تراوح من ٦ الى ٨ م . اجنتها الامامية كثيفة الخمل مقبضة || ملجها الحياتي حامي . افواجها كثيرة العدد . طيراتها سريع الحركة . تخلق فوق مجاري الماء من الصخر الى فحة اليل || اساريها تعيش في المياه الراكة ملقوة بمجاليب بسطة او قنينة الشكل ، حريرية التسج || اشهر اجنتها :

Hydroptila (S).
Agrytes (S).
Oxyethira (S).
الهيدروبتلا
الآغريلا
الاكسيثيرا

٣٠١٩٤ - **هيدروبيكيات**

Hydropsychidae (S). Hydropsychidés (F).
Hydropsychidae (E). فصيلة حشرات من رتبة جليزيات الاجنحة . اجنتها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد ، وبداء اللون . بسطة اجنتها تراوح من ٢٥ الى ٣٢ م . اجنتها قليلة الزناويين ، شبه شفافة ، مهدبة الحواف الخلفية . ملابسها الفكية مسطيلة عند الشقين || اساريها طليقة ، تعيش في المياه الجارية بين الاغصان المائية والصخور . بعض اجنتها مقترن يصنع شباك يحبسها بين الاغصان فيقترب ما يعلق من حيوانات || اشهر اجنتها :

Hydropsyche (S).
الهيدروبيك

٣٠١٩٥ - **هيدروجين ، هيدروجين ، هيدروجين**
Hydrogène (F). Hydrogen (E). غاز شديد الاشتراك عادم اللون والطعم والرائحة يوجد في الماء وفي جميع المواد العضوية . رمزه (H٢) وزنه الاتمي ١.٠٠٨ - راجع ايدروجين .

٣٠١٩٦ - **هيدروغراف**
Hydrographe (F).
Hydrographer (E). العالم بالمياه السطحية وبأصولها .

٣٠١٩٧ - **هيدروغرافية**
Hydrographie (F).
Hydrography (E). علم المياه السطحية ووصفها .

٣٠١٩٨ - **هيدروبيكيات**
Hydrophidae (S).
Hydrophidés (F). Hydrophidae (E). فصيلة حيات خفية سامة من امانيات الاغادي . اجنتها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة . جميعها تقرب الشطوط في زمن التساقط لانها تطمر يعضها في الرمل . وبها انواع تقدم الاغوار وتسير بعيداً في الأنهر || اعرف اجنتها واشهرها الهيدروبيك المعروف بحية الماء والقتام والبرداس والتجاجة .

٣٠١٩٩ - **هيدروبيك**
Hydrophilis (F).
أطلب حية الماء .

٣٠١٩٠ - **هيدروكربور**
Hydrocarbure (F).
Hydrocarbon (E). الهيدروكربور تألف الكربون والكربون والهيدروجين .

٣٠١٩١ - **هيدروكوتيل**
Hydrocoteyle (F).
Pennywort (E). هي قصعة الماء ، اطلبها .



هيدروبيك



هيدكة حراء



هيدكة حنطية

أصقاع العالم . سوقها غدية تلشعب عند القمة . اورثاقها جذرية الانتشابه . ازهارها وريسية صغيرة ملونة || أعرف أنواحه وأشهرها ما يلي .

٣٠٢٠٤ - هيراسيوم أزغب ، عطفوة

Hieracium pilosella (S). Piloselle, Vélutée, Oreille de rat (F). Mouse ear hawkweed, Mouse ear (E). Kleines Habichtskraut, Mausohrchen (D). Pelosella, Pelosetta (I).

نوع من الهيراسيوم البري . جلوه طيبة يظل أنها تستعمل في بعض العلاجات الصدرية . ساقه مزينة تملو نحو ٣٠ سم . اورثاقه جلدية الانتشابه ، يضيئة الشكل ، نصلها أزغب البشرة على صفحتيه . ازهاره فردية ، صفراء اللون . ذهبية المخرج .

هيدكة سوداء



هيدكة صنوبرية

٣٠٢٠٥ - هيراسيوم برقوقتي

Hieracium aurantiacum (S). Epervière orange (F).

نوع من الهيراسيوم البري . ساقه تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم . اورثاقه جلدية الانتشابه باسكتها واحدة أو اثنتين . نصلها أحليبي الشكل ذلق الزام الاخير لونه الى الخضرة الداكنة . رؤسياته الزهرية برتقالية اللون ، عابكة المخرج ، كثيرة العدد الذي يراوح من ٥ إلى ١٥ || تنوره يستمر من حزيران الى تموز .

هيدكة قوزمية



هيدكة مرجانية

٣٠٢٠٦ - هيراسيوم صوفتي

Hieracium villosum (S). Epervière à touison (F).

نوع من الهيراسيوم البري . ساقه تملو من ٢٠ إلى ١٠ سم . اورثاقه الجليدية منمقة ، سنائية الشكل ، تطول من ٧ إلى ١٠ سم . وتعرض من ١ إلى ٢ سم . اورثاقه الجليدية لاطئة ، قلبية الشكل ، صغيرة لثقة ، جميعها بحرية اللون . يملوها مخرج أزرق . نصلها مستطيل الزغب المبشر . رؤسياتها الزهرية فردية التصنج أو ثلاثية ، نرسا الى الصفراء القزحي || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

هيراسيوم



Falcaria (S).

٣٠٢٠٧ - هيرودان

Falcaire, Citrums (F). *Falcaria* (E). *Sicheldolde* (D). *Falcaria* (I).

جنس نباتات شجيرة برية من فصيلة الخيميات . انواحه المعروفة اربعة ، منها الحقول والبراري . سوقها غرام متصبية . اورثاقها كلبية مستطيلة الاضلاع والقصير اضيقية . ازهارها صيولي . ازهارها حنطرة اللثه ودية اللون او ليلية .

Hyria (S).

٣٠٢٠٨ - هيريرة

Hyrie (F). *Hyria* (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات صفيحات الخياشيم وفضيلة التبادلات . انواعها المعروفة قليلة العدد . اعطاهنا انهر وميجرات امريكية الجنوبية واصغها نهر الامازون || اصداها كيرة اللثه ، متساوية المصارع الاذنية ، تطول من ٨ الى ١٢ سم . غشاء اصغدا من الداخل مستدل المشاكلة للؤلؤي المادة || تعيش في اسماك السفان وينها انواع تقترب من الاغوار || لحويها مأكولة ، متوسطة الصفت .

هيردان



هيريرة



بعد الاعمال || هذا مع العلم ان التفاح او الاجاص المعرض لهذا الرمم هو الموجود في الموانع الرطبة والمغروس على اعماق تقود ٥٠ سم . وفي تربة كثوم او تربة كثرت فيها نسبة المادة الكلسية .

٣٠١٩٧ - هيدكة سوداء* ، آكلية الزان

Nectria didasima, Cylinrocarpon wilkommii, Fusidium candidum (S). Chancro du hêtre (F).

فطر مجهري يصيب الزان بانثائه الفتية فيضليا . مظهره الخارجي لطع قودية الشكل سواد اللون دائرية الانتشار يراوح طولها من ١ الى ٢ سم . تصيب بشرة الانسان وتنتشر عرضا الى ان تطرقها تنفضي على اللحم وعلى التبادل التنسي . وقد تسبب قروصا فائقة تملب الخشب كما في التفاح والاجاص والخور .

٣٠١٩٨ - هيدكة صنوبرية* ، آكلية الصنوبريات

Nectria cucurbitula, Cylinrocarpon cylindroides tenue (S). Chancro des conifères (F).

فطر مجهري يركب بعض الاشجار الصنوبرية اصغها الصنوبر والنبوب || مظهره الخارجي يقع مهدية الخار لا قياسية الشكل والمجم لونها الى الحمرة الغراء . اعطاهنا يبيض قصار لا متسارية الانتشار والكثافة ، تنمري الاثتان المجروسة وتكثر في الاغصان المقطوعة المطروسة حل التربة الرطبة || اغصان زهيدة لا تستلزم المكافئة .

٣٠١٩٩ - هيدكة قيرمزية* ، آكلية الخور

Nectria coccinea, Cylinrocarpon candidum (S). Chancro du peuplier (F).

فطر مجهري يصيب الخور ليصيب الرمم المعروف بآكلة الخور وقسه يصيب القيقب والاسفندان والزان والمان والسندبان . مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل والمجم قيرمزية اللون . يركب بشرة الانسان والاثان نصلها بعد ان تقرح اللحم والشكر . ويصعب الخشب || يكافض في الخور مكافئة الهيدكة الخطية ومن المستحسن تحفيض التربة لتخفيف رطوبتها .

٣٠٢٠٠ - هيدكة مرجانية*

Nectria ribis, Tubercularia confluenta (S).

فطر مجهري يركب الكشيش والاجاص واليزنون والندبار . مظهره الخارجي يباس فبالي محل يبيض افتاد الشجيرة ثم يعقبه ظهور بتود متسقة لا قياسية الحجم لونها الى الوردي ثم يتحول الى المرجاني || يكافض بقطع الاعضاء المصابة عند ظهور البياض وباستعمال الطرق المذكورة في مكافئة الهيدكة الخطية .

Myrare (F).

٣٠٢٠١ - هيركل

حيوان لاس مفترس يدهى فززون ، اطليه .

Menhe crispue (F).

٣٠٢٠٢ - هيرازماج

هو التمتع الجمعي ، اطليه .

٣٠٢٠٣ - هيراسيوم* ، حشيشة الغرباب

Hieracium (S). *Epervière, Oreille de souris* (F). *Hawkweed, Hawk's eye* (E). *Habichtskraut, Distelkraut* (D). *Ieracio, Orecchio di topo* (I).

جنس نباتات عشبية معمرة برية ويزينية من فصيلة المركبات . انواعه المعروفة زهاء ٢٠٠ منتشرة في معظم

Age (F). *Plough-beam* (E).

٣٠٢٠٩ - هيس

هو السلب اي الجزء الجانح لاثار اجزاء الحشرات .

Choléra des poules (F). **هَيْفَةُ الطير** ٣٠٢٢٠
هي كوليرا الدجاج ، اطليه .

٣٠٢٢١ - **هَيْفَمَكَ** * ، **شَجَلُ التِّلْجِل**

Cochlearia armoracia (S). Ralfort, Grand ralfort, Ravelenlo, Cran des Anglais, Cranson, Radis à cheval, Moutarde des Allemands, Armorac(F). Common horse-radisch (E). Meerrettich Löffelkraut, Meer-Rettig (D). Ramolaccio, Armoraccia, Erbsa forte, Barba forte, Rafano (I).

جلس نباتات عشية طيبة برية معمرة من الهيفانيات وفصيلة الصليبيات . جلورها غليظة مستطيلة يضاء اللون خردلية الطعم . اوراقها متعاقبة متفكة سنانية الشكل . ازهارها صغيرة اللد ، يضاء اللون ، سنطيلة التجميع ، هامة الاوتكاك . محارها غريبات دقيقة مستطيلة . بزورها مستدرة حمراء اللون ، يتصغر منها زيت طيار يشبه زيت الخردل ، يذوي زيت خردل الزهاني او الخردل الاثاني . وهو مضاد لداء الحفر ، يدر اللصاف والبول ، ويقيد الامراض العصبية المزمنة .

Raphanées (F). **هَيْفَمَانِيَّات** ٣٠٢٢٢
سبط من فصيلة الصليبيات يشمل بعض الاجناس اشهرها الهيفان والفجل .

Oryx de Nubie (F). **هَيْفَلَة** ٣٠٢٢٣
هي الاربع السواني ، اطليه .

Molossinés (F). **هَيْفَعَرَات** ٣٠٢٢٤
عمارة من فصيلة الراسيات . اجناسها اربعة ، تتميز بالذنبها المنفصلة من انشاء الجليدي || أما اجناسها الاربعة فهي : الزرداب والقشعر والفرور والطيرة .

Molossa (F). Molossus (E). **هَيْفَعَرَة** ٣٠٢٢٥
جنس خفافيش من عسرة الحيريات . موطنه البرازيل واللاتيل . انواعه عديدة . اجسامها صغيرة اللد رمية . رؤوسها غليظة . فرائسها مستعرضة رافعة . اذانها كبيرة ، قلبية الشكل || يعيش جماعات متوسطة العدد . يسرح في اوائل الليل واواخره . قوته الحشرات . يالفت تجاوبت الانجمار الحرجية والملاور والكهوف .

Vent du Nord-Est (F). **هَيْف** ٣٠٢٢٦
North-East wind (E).
رياح مهبأ بين الشمال والشرق وجهتها بين الجنوب والغرب . وهي ريح حارة تكبأ تهيج النبات وتؤذي .

Hyphales (F). **هَيْفَانِيَّات** ٣٠٢٢٧
مرتبة فطور مجهرية من رتبة الزويات . تتميز بهيئتها السطحي الارتكاز ، التنقي الشكل . كنانها تملو كراميات الثؤادية || فصائلها اربع : الكنتيات والكيميبيات واللصحيات والوطحيات .

Hyph (F). Hypha (E). **هَيْفَة** ٣٠٢٢٨
ج . هيف . مجموعة خيوط نباتية عادمة الخضيف يتألف منها ميكال الفطر والحزاز .

٣٠٢٢٩ - **هَيْفَل** ، **جَرِيَع**

Forsythia (S). Forsythie (F). Golden bells (E). Glockenstrauch, Forsythie (D). Forsythia (I).
جنس جنبات برية وتزيينية من فصيلة الزيتونيات . انواعه

Histogenèse, **هَيْسْتُوجِنِيَة** ٣٠٢١٠
Histogénie (F). Histogeny (E).

الهيستوجنية علم يبحث في تكوين الانسجة الضوية .

Histographie (F). **هَيْسْتُوجَرَفِيَة** ٣٠٢١١
Histography (E).

الهيستوجرافية وصف الانسجة الضوية .

Histon **هَيْسْتُون** ، **هَيْسْتُون** ٣٠٢١٢
عنصر فرضي يقال انه اساس المواد النووية الخلووية .

Roncraie (F). **هَيْشَكَة** ٣٠٢١٣
Brake, Brambly ground (E).

هي دخل البايق او منته وكل ارض كثر فيها هذا النبات .

٣٠٢١٤ - **هَيْشَر** هر الحرف ، اطليه .

٣٠٢١٥ - **هَيْشَرِيَّات**
Carduacées, Carduinées, Cynarées, Cynarocéphales, Flosculeuses (F).

سبط من فصيلة المركبات ، اجناسه وانواعه كثيرة العدد معظمها بري وبعضها زراعي || اشهر اجناسه : الارضي شوكي والقرقرم والقنطريون والضباب والكارارين والارنطين وربي الايل والورطة .

٣٠٢١٦ - **هَيْشَمَ هَرَمِي** ، **كُوشِيَة هَرَمِيَة** ، **مَكْتَسَة الحَنَكَة**

Kochia trichophylla (S). Kochia-cyprès (F). Mock-cyprès, Summer-cyprès (E). Sommer-Cyprasse (D). Cipresso d'estate (I).

نوع من الهيشم وهو عشية سولية تزيينية هرية الشكل . ساقها فراءه نفاه . اوراقها شمرية خطية ليدة تبدو جميلة انفسار الاصفر الزاهي ثم تنحرف ال الصنابي وتستقر على الاحمر الى ان تلوي في اواسط الخريف .

٣٠٢١٧ - **هَيْشُور**

الهيشور والحشوم واحد . قيل . نبات رغو فيه طول على راسه برصوة كأنه علق الرأل . وقال ابو حنيفة : ومن العشب وله ورقة شاكه منها شوك غصم وهو يسقم ، وزهره صفراء وتطول ، له قصبه في وسطه حتى تكون اطول من الرجل (اللسان) .

٣٠٢١٨ - **هَيْض** ، **هَيْض** ، **ذَنْق** (F).
Dung, Droppings (E).

هو ربيع الطير من اي جنس كان وهو من الاemde الضوية النشيطة الدنية بالامدة الاوتية || يقال حاص وهاض وذائق وذائق الطائر : ربي بربيحه .

٣٠٢١٩ - **هَيْصُور** *

Sisor
سمكة بحرية مستطيلة وصيدة الجنس والنوع من مفتحات المانة وفصيلة السلوريات . اصطناعها المياه الخفية . تتميز بفراية جسمها المردني الشكل الدقيق الطرف . رأسها مفلوم الخطم . تحمل في فكها عضلات مستطيلتان ، زعانفها كبيرة اللد . زعنفتها الخشبية تنتهي بإيل حقيق كالأس طولها يعادل طول الجسم .



هيصور



هيفان



هيرة



مِفْلُومِ اسط



مِفْلُومِ تَوَحِي



مِفْلُومِ حَرَمِي



مِفْلُومِ زَنْجَارِي



مِفْلُومِ قَرِيدِي



هَيْفِيَّة

ساقه محتدة الجرم ، ناشرة الطروق يضاء اللون . نكته كالتوبيع قطرها نحو ٤ سم . لونها الى الصفار الاسفع اللامع . اطراسه الى الوردي المايق .

٣٠٢٢٦ - هَيْكَلُومِ حَرَمِي * *

Hypholoma fascicularis (S).
Hypholoma fasciculé (F).

نوع من الميفلوم . يعيش على حذاء الجلود المخطوطة . ساقه رفيعة ، دقيقة ، موحية ، صفراء اللون . نكتته قطنسوية الشكل ، رهلة ، قطرها نحو ٤ سم . لونها لث الساق . اطراسه دقيقة ، نحيلة ، زينة اللون . لحيته صفراء اللون ، مرة المذاق .

٣٠٢٢٧ - هَيْكَلُومِ زَنْجَارِي * *

Hypholoma seargentianum (S).
Hypholome vert de gris (F).

نوع من الميفلوم . يوجد في غابات السديان والمليل . ساقه لزنية ، مستطيلة ، ريادة اللون ، رقيقة الطروق . نكتته دقيقة ، مظلية الشكل ، قطرها نحو ٦ سم . لونها الى الرمادي الزنجاري المايق . اطراسه الى البني الزنجاري .

٣٠٢٢٨ - هَيْكَلُومِ قَرِيدِي * *

Hypholoma sublateritium (S).
Hypholome brique (F).

نوع من الميفلوم . يعيش على الارويات والجلود النشرة . ساقه موحية ممثلة الانفتاح والغلاق ، قليلة الاستدارة ، شبه مسطحة . نكتته صينية الشكل ، قريدية اللون ، قطرها نحو ٨ سم . لحيته يضاء اللون ، مرة المذاق .

٣٠٢٢٩ - هَيْفِيَّات * *

Hyphomycetes (F).
Hyphomycetes (E).

نظور مجهرية خزلية ، حارية البزور ، ظاهرة الخيط الكثيفة التجميع ، تترى ساء الاشجار والجلود والقورق وفيها ... قشيب نوعاً من العفن القدار .

٣٠٢٤٠ - هَيْفِيَّة * شَجَرَةُ المَطَاطِطِ وَمَطَاطِ

Hevea (S). *Hévéa*, *Arbre à caoutchouc* (F). *Caoutchouc tree* (E). *Kautschukbaum* (D). *Evea* (I).
جنس اشجار حرجية وزراعية من التروبيات السوبيتات . انواعه قليلة المدد . اوراقها متعاقبة ، معتمة ، اعلاجية ، مستطيلة النصل الجادة . يتخرج من سيقانها باخر عصارة لزجة مطاطة لها استعمالها الصناعي || اشهر انواعه هيفية البرازيل وهيفية الفريزان .

٣٠٢٤١ - هَيْق ، هَيْكَم ، هَيْكَل

الحيق والحيقم : ذكر النعام . يقال اشم من هيق واهدى من هكل .

٣٠٢٤٢ - هَيْكَل * Ossature (F). Framework (E).

مجسمة الاعضاء الجادة الصلبة الرقسية التي يرتكز عليها الجسم والتي .

٣٠٢٤٣ - هَيْكَلُ عَظَمِي

Squelette (F).
Skeleton (E).

مجسمة النظام التي يرتكز عليها الجسم الحيواني .

المعروفة ، مهدبا عند من اليابان الى اوروبية . سيقانها فراء . اوراقها متعاقبة مائلة . ازهارها رباعية الفصل ، خاسية البيلات المتندمة القاعدة ، ثنائية السداة ، جملة الشكل ، ذهبية اللون ، تنور قبل انبلاج الورق .

٣٠٢٣٠ - هَيْكَلُ أَصْغَرِ الشُّرُوعِ

Forsythia viridissima (S). *Forsythie vert franc* (F).
نوع من الميفل التريبي ، جنيته تملو من مرتين الى ثلاثة امتار . ساقه فراء . فروعه عوجة السلايات ، متصبية ، خضراء اللون . اوراقها مدقة سنائية الشكل ، نصلها جامد الصفحة يطول من ٦ الى ١٥ سم . ويبرص من ٢ الى ٤ . ازهاره الى قياسية التجميع الذي يراوح من ١ الى ٣ ، لونها الى الصفرة الباهة || تنوره يستمر من آذار الى نيسان .

٣٠٢٣١ - هَيْكَلُ أُرُوبِيَّة * Forsythia europaea (S). Forsythie d'Europe (F).

نوع من الميفل التريبي ، جنيته تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ساقه فراء . فروعه متصبية حمراء اللون . اوراقه مدقة نصية الشكل ، نصلها جامد الصفحة متباد التستين يطول من ٤ الى ٨ سم ، ويبرص من ٢ الى ٤ سم . ازهاره لا قياسية التجميع الذي يراوح من ١ الى ٣ ، يتلاها ملطفة الاطراف ذهبية اللون || تنوره يستمر من آذار الى نيسان .

٣٠٢٣٢ - هَيْكَلُ مَدَّتِي الْأَهَارِ

Forsythia suspensa (S). *Forsythia à fleurs pendantes* (F).

نوع من الميفل التريبي ، جنيته تملو من ٢ الى ٤ سم . ساقه فراء . فروعه مجرمة السلايات ، حطية اللون ، للثب مستقيمة متصبية ثم تنطف وتتل . اوراقه مركبة ثلاثية التصرف ، وريقاتها جامدة النصل مشارية الحافة . ازهارها متدلية ، لونها الى الصفار المذهب المايق . تنوره يستمر من شباط الى آذار .

٣٠٢٣٣ - هَيْكَلُومِ * Hypholoma (S). Hypholome (F).

جنس نظور من فصيلة الفاريقونيات . انواعه المعروفة قليلة المدد اعطائها بعض غابات المناطق المعتدلة الحرارة والحارة . تعيش على جذوع الاشجار واوراقها وعلى التزبل والذبال . معظم انواعه كاعن الصنف خير مرغوب فيه . اعرف انواعه واشهرها الخمسة التالية :

٣٠٢٣٤ - هَيْكَلُومِ أَمْعَطِ * Hypholoma depilectum (S). Hypholoma pelé (F).

نوع من الميفلوم . يوجد في حراج الصنوبر . ساقه غليظة ، مضغمة ، دقيقة ، تنتهي بطروق متعرج الحاشية ، لونها الى الطمعة يملوها تمسح ازرقة . نكتته كبيرة ، شبه مستديرة ، لزجة ، قطرها نحو ١٢ سم . لونها الى الطمعة الصفراء . اطراسه ثير ليلكية ثم تحرف نحو الحمرة الابوابانية .

٣٠٢٣٥ - هَيْكَلُومِ تُونِجِي * Hypholoma coronillum (S). Hypholome petite couronne (F).

نوع من الميفلوم . يوجد على التزبل في المواقع الرطبة .

٣٠٢٤٤ - مَيْكَلَة °

Scalétopographie (F).
Scaletography (E).

الميكلة علم يبحث في المياكل النطقية ، من حيث التركيب والشكل ، عند الإنسان والحيوان .

٣٠٢٤٥ - مَيْل ، أَقْنَدُ ، نَكِير

Hille (F).
Hilum (E).

نقرة صغيرة في البزرة لا تقياسية الشكل والموقع تكون عادة نقطة الاتصال بأغشية البذرة .

٣٠٢٤٦ - مَيْلَانِيُوم ° ، هِيلَانِيَة

Helenium (S). Hélénie (F).

جنس نباتات عشبية سريرية من فصيلة المركبات . أنواعه عديدة معظمها أمريكي الخشب . أوراقها متعاقبة ساجدة . أزهارها وريسية مستعرضة السنبات المسنة . مخفيها بضية الشكل . بلورها خماسية البلور المهدية أو المسنة . أعرف أنواعها وأشهرها ما يتبع .

٣٠٢٤٧ - مَيْلَانِيُوم أَمْرِيكِي

Helenium nudiflorum (S). Hélénie nudiflore (F).

نوع من الميلانيوم المعمر . ساقه مزينة فرعاء تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . أوراقها حاشنة ساجدة سنائية التصل . وريساته الزهرية جلوية اللون عادمة السنبات || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

٣٠٢٤٨ - مَيْلَانِيُوم خَرِيفِي

Helenium autumnale (S). Hélénie d'automne (F).

نوع من الميلانيوم المعمر . ساقه سرحة فرعاء تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . أوراقها حاشنة ساجدة سنائية التصل النمن اختار . وريساته الزهرية مذهبة القوس ، كبيرة السنبات الثلاثية أو الخماسية التفريص || تنوره يستمر من آب الى تشرين الاول .

٣٠٢٤٩ - مَيْلَانِيُوم نَحِيلُ الوَرْق

Helenium tenuifolium (S). Hélénie à feuilles grêles (F).

نوع من الميلانيوم الحولي أو المحول . ساقه فرعاء تملو من ٤٠ الى ٥٠ سم . أوراقها خيطية التصل الذي يمرض نحو ١ م . وريساته الزهرية حشوكية التجميع ، صفر الاقراص ، يبيض السنبات الشارفة المقرفة || تنوره يستمر من آب الى تشرين الاول .

٣٠٢٥٠ - مَيْلَسْت الصَنْوَبَر ° ، هَيْلَسْت

Hylistes ater (S).
Hylastes des pins (F).

حشرة من الكرشيات ، طولها نحو ٤ م . جسمها مستطيل الشكل اسود اللون ، تركيب مع ريقاتها بطور الصنوبر فتلفها وتؤذيها .

٣٠٢٥١ - مَيْلَسْت النَقْل °

Hylastinus obscurus (S). Hylaste du trèfle (F).

حشرة صغيرة من الكرشيات ، طولها بمرح ٢ الى ٣ م . قوبها الى السمرة النحسية يطولها خل الحمل . مرتعها يختلف من مرتع سائر أنواع جنسها لانها تعيش على النباتات النحسية بدلا من الاشجار . وهي مع ريقاتها تركيب النمل في جلورها فتلفها وتقضي عليها .



هيلانيوم



هيلست الصنوبر



هيلست النمل



هيلود سداسي الخطوط



هيلود

٣٠٢٥٢ - هَيْلَمَة القَح °

Hylemyla coarctata (S). هي ذبابة الحنطة ، اطليا .

٣٠٢٥٣ - هَيْلَمَة المَلْفُوف °

Hylemyla brassicae (S). هي ذبابة الملفوف ، اطليا .

٣٠٢٥٤ - هَيْلَمَة خَضَابَة °

Hylemyla cana (S). هي الذبابة الغبراء ، اطليا .

٣٠٢٥٥ - هَيْلَمَة رَصَاصِيَة °

Hylemyla brunescens (S). هي ذبابة القرنفل ، اطليا .

٣٠٢٥٦ - هَيْلَمِيَّات °

Anthomyidae (S). عبارة حشرات من فصيلة الذبابيات وربة ذوات الجناسين . اجناسها وانواعها عديدة بعضها ضارة تؤذي النبات . رابع ذبابيات .

٣٠٢٥٧ - هَيْلُوبَات °

Hylobate (F). هو الجبون ، اطليه .

٣٠٢٥٨ - هَيْلُوت سُدَاسِيّ اَنَقَطُرُوط °

Melotes sexlineatus (S). Héloce à six lignes (F).

سمكة بحرية من شائكات الزمانف وفصيلة القرشيات . اصطناعها تمتد من الهند الى استراليا || جسمها شبه وشمي الشكل ، مستدل التبطيط ، يطول نحو ١٧ سم . ثوبها الى الرعدة الزرقاء المزاج ، تشتت زرقته عند الظهور وتتفصل في البطن القضي المزاج ويطولها ستة خطوط سود قاطبة تمتد من الرأس الى الذنب . زعنفتها الظهرية مستطيلة ، القسم الاول منها هربي الشكل ، ذريب المناعص ، القسم الثاني عادم المناعص . زعنفتها الذيلية مقعرة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٣٠٢٥٩ - هَيْلُوتُرُوط °

Hylotrupe (F). هو زعنوق الاعمدة ، اطليه .

٣٠٢٦٠ - هَيْلُود °

Hylodes (S).
Hylode (F). Hylodes (E).

جنس صفادع شاجرة من فصيلة الكدمايات . اجسامها المعروفة قليلة العدد مهدا امريكية الاستوائية || اجسامها صغيرة القدر تطول من ٤ الى ٥ سم . عند الذكور وين ٥ الى ٦ سم . عند الاناث . رؤوسها مستدلة الطول والعرض . صينها مستديرة جاسطة . فكوكها السفلى عادمة الانسان . اصابع قوائمها الامامية والخلفية عادمة الخطاب بمحزة يطابع بمحسية تتحكم من تسلق السطوح المائلة || تعيش كامل حياتها التي لا تقل عن عشر سنوات منتقلة من نبات الى نبات ومن شجرة الى شجرة . قوتها الحشرات والاسادير والحوام || الانثى تقرأ دهيها احاديا ولا تطرحه في الماء بل في المواقع الرطبة تحت النباتات المسطحة وتحت الاوراق وبين الحجارة . صغارها عند النقف لا تغلو من القوائم النحيفة النحيلة ولكنها تتميز بوجود الذنب الذي لا يتفصم قبل مرور اربعة اسابيع .

٣٠٢٦١ - هَيْلُوفِيلَة ثَنَائِيَة اللون °

Hytophila bicolorana (S). Hytophile bicolore (F).

حشرة من فصيلة النسيقيات وربة حشرقيات الاجنعة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبا . فراشها واشمة

الجنس والنوع من فصيلة القرزيات . منته بعض مناطق
حوض البحر الأبيض المتوسط || ساقه مزقية اللحاء ،
متصبية ، قليلة الفروع ، تملو من ٤٠ إلى ٦٥ سم .
أوراقه مركبة ، وقرية التجميع ، متانية النصال . أزهاره
صفراء اللون ، زنادية ، مستطيلة المالحق المزقية || تنويره
ربيعي .

Spirillaceae

٣٠٢٦٥ - هَيْمِيَّات ٥

فصيلة من البكتيريات تتميز بشكلها الخلزوني . خلاياها
وسيدة الاتجاه عمودية الالتقسام .

Millipertuis (F).

٣٠٢٦٦ - هَيْمُولَارِيَّاتُون

هو العاذي ، أطليه .

Hypériscées (F).

٣٠٢٦٧ - هَيْمُولَارِيَّاتُونِيَّات

فصيلة نباتية جاء وصلها في دلذيات .

Protéides (F). Protéid (E).

٣٠٢٦٨ - هَيْمُولِيَّات

هي الاجسام التي تدخل في تركيب ودف حبيرات الانسجة
الحيوانية والخلايا النباتية . وتقسّم الهولليات الى :

Protéides (F). Protéid (E).

هوليدات

Protéines (F). Protein (E).

هوليونات

Configuration

٣٠٢٦٩ - هَيْتَة

هي الشكل الخارجي .

قوتها رقيق الازهار . سرتها تعيش على فصل اوراق
السنبان || جسمها معتدل القه يطول نحو ١٥ سم . بسطها
نحو ٢٢ سم . رأسها يرمي الشكل ، اخضر اللون . عيناها
كبيرتان . زباناها غيطيان . جوشنها اخضر . بطنها الى
الطحلة الغبراء الموج || ورشناها الاسمان الى الخضرة
الجميلة يطوقها حطار ابيض ويملوها غطان ابيضان
معتزبان يقسان الصفحة الى ثلاثة اقسام شبه متساوية .
ورشناها الخلفيان الى الطحلة الغبراء تميح عند الاكر
وتبيث عند الاثى || لها جيل واحد في الجيل . تظهر
الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل .
تعاطل بعد ظهورها بنحو ستة أسابيع وتمتص المكن لطفاً
مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الازراق || السرة
عند بلوطها الكمال تملو نحو ٣٠ سم . جسمها شبه اسطواني
الشكل ، مائل القشار . فوها الى الطحلة السمره || طور
رأسها اسود . مدنها ورواجها الى الطحلة السمره || طور
الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً يتقضي في الجفالة
او في التربة حيث تنفخ السرة ملتصقة بجلباب من الطين .

Spirochéoses avistre (F).

٣٠٢٦٢ - هَيْم

هو زهرى الطير ، أطليه .

٣٠٢٦٣ - هَيْمِيَّات شجرة المدد (اللسان) .

Hymenocarpus (S).

٣٠٢٦٤ - هَيْمِيَّاتُونِيَّاتُون

Hyménocarpe, (F).

ويسمى ايضاً شمرس . ايات عشبي يربي حولي وسيد



هوليلة ثالثة اللون



Dressé (F). Erect (E).

٣٠٢٧٥ - واكد

هو الشيء القائم المودي الانصباب ، يقال قرن واكد وساق واكدة .

٣٠٢٧٦ - واتسونية ، وطسولية Watsonia (S). Bugle lily, Watsonia (E). Watsonia (D). Watsonia (I).

جنس نباتات معقودة التعريف على اسم الطبيب البريطاني واتسون (١٧٨٧-١٧١٥) وهي عشية دولسية من فصيلة السوفيات . انزاعها المعروفة نحو ٢٥ مهدا افريقية الجنوبية . سوقها قرصية الانتشاب . اوراقها عصفية النصل . ازهارها جميلة الشكل متعددة الالوان || اشهر انواعها ما يتبع .

٣٠٢٧٧ - واتسونية أرجوانية

Watsonia coccinea (S). Watsonia écarlate (F).

نوع من الواتسونية السريوية . شراخها الزهري يعلو من ٢٥ الى ٣٥ سم . اوراقها عصفية النصل . ازهارها سبيل التجميع يمد من ١٥ الى ١٦ زهرة . ازهارها ناشرة القصباب المستنقة ، لوها الى الارجواني الزاهي || تنورها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٢٧٨ - واتسونية قصيرة الورق

Watsonia brevifolia (S). Watsonia à courtes feuilles (F).

نوع من الواتسونية الزينية ، شراخها الزهري يعلو من ٢٥ الى ٣٥ سم . اوراقها عصفية الشكل قصيرة النصل . ازهارها سبيل التجميع يمد من ٨ الى ١٢ زهرة . ازهارها محبنة القصباب القصية الاطراف . لوها الى البياض الموشح || تنورها يستمر طوال شهر ايار .

Descendant (F).

٣٠٢٧٠ - وايط ، هايط

هو نفيس الساعد . Descendant, Descending (E).

٣٠٢٧١ - وايل

هو المطر الشديد الغعم القطر ، والويل ايها .

٣٠٢٧٢ - وات

وحدة مقياس قوة التيار الكهربائي .

Watt

Xylopa (S).

٣٠٢٧٣ - وات ، جورة الشراك

Xylopie (F).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة القشديات . انواعها المعروفة قليلة ، مهدا الحبشة ، وقد انتشرت في اكثر المناطق الافريقية . اوراقها متعاقبة متعة كاملة ، نصلها جامد الصفحة قصير الزناد . انزاعها ابطية او عمودية الانكاز عديدة البتلات البيضاء . ثماره حنية . يزود حريفه الطعم فكهة معقودة تستعمل استعمال البهارات . اشهر انواعه وات الحبشة .

٣٠٢٧٤ - وات الحبشة ، فليل السودان

Xylopa aethiopica (S). Xylopie d'Ethiopie, Poivre d'Ethiopie (F). African pepper tree (E). Achlopiischer Pfefferbaum, Mohrenpfeffer (D). Pepe d'Ethiopia (I).

نوع من الوات الزراعي يكثر في الحبشة وقد تمت زراعته معظم الاقطار الافريقية الحارة . شجرته متوسطة القد . اوراقه متعاقبة معقودة . نصلها اهلبيجي الشكل جامد الصفحة . انزاعه فردية التجميع ، ابطية الانكاز . ثماره عنية مستطيلة ثلثت صفا واحداً من البزور الاجانية الشكل || ثماره وبزوره من التوابل المنشطة الشامة الاستعمال .



وات الحبشة

٣٠٢٧٩ - وَأَسْطُورِيَّةٌ كَثِيفَةُ الزَّهْرِ

Watsonia densiflora (S). *Watsonia à épi dense* (F). نوع من الواسطونية الزيبينية البروقية. شراخها الزهري يعلو من ٦٠ إلى ٩٠ سم. أوراقها صفية النصل تطول من ٤٥ إلى ٦٠ سم. وتعرض نحو ١٢ م. حصارها سيمك الخاشية تبني اللون. أزهارها سبلي التجميع كثيف الترتيب يعد من ٤٠ إلى ٥٠ زهرة. أزهارها محببة القصالب المستطيلة، قصيرة البلات، لونها الالوي ونبها فربوب يبيض || تنورها يستمر من أواسط أيار ال أواسط حزيران.

٣٠٢٨٠ - وَأَسْطُورِيَّةٌ مِرْيَالِيَّةٌ

Watsonia meriana (S). *Watsonia mérina* (F). نوع من الواسطونية البروقية. شراخها الزهري يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها سبيلية الشكل تعرض نحو ٣ م. أزهارها سبلي التجميع، وعلى الترتيب، يعد من ١٢ إلى ٢٠ زهرة. أزهارها محببة القصالب مستطيلة البلات. لونها الالباض الناصع ونبها فربوب وريدي ويوهشة || تنورها يستمر طوال شهر أيار.

٣٠٢٨١ - وَأَسْطُورِيَّةٌ مُنْقَصِيَّةُ الزَّهْرِ

Watsonia strictiflora (S). *Watsonia à fleurs dressées* (F). نوع من الواسطونية الزيبينية. شراخها الزهري يعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها صفية النصل المستدق. أزهارها سبلي التجميع يعد من ١٢ إلى ١٨ زهرة. أزهارها مستقيمة القصالب المختصة التي تطول نحو ٤ سم. بتلاتها مستدلة لقد حواء اللون توسط كل منها نجمة بنفسجية اللون قرمزية اللونج || تنورها يستمر طوال شهر حزيران.

٣٠٢٨٢ - وَأَسْطُورِيَّةٌ وَرْدِيَّةٌ

Watsonia roses (S). *Watsonia rose* (F). نوع من الواسطونية الزيبينية البروقية. شراخها الزهري مشعب الفروع يعلو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. أوراقها صفية النصل. أزهارها محببة القصالب. قصالبها وبتلاتها متساوية في الطول، لونها الالوي الوريدي الزاهي || تنورها يستمر من تموز الى أيلول.

٣٠٢٨٣ - وَأَلْنٌ

Alizé (F). *Trade-winds* (E). اسم يطلق على الرياح السائدة المختطة التي تهب بين دارتي الانقلاب من الشرق الى الغرب. وهما واتان، وآتن الشال الذي يهب من الشال الشرقي ويجه نحو الجنوب الغربي وواتن الجنوب الذي يهب من الجنوب الشرقي ويجه نحو الشال الغربي. وواتن تستعمل أيضاً بمعنى الصفة أو الثمت.

٣٠٢٨٤ - وَأَلْجٌ

Zoophage (F). *Zoophagous* (E). الواقع ويدي اللامح ما كان قوته اللحم حيواناً كان ام دويبة ام سحرة.

٣٠٢٨٥ - وَأَجِبٌ

Débet (F). *Debit* (E). هو ما يلزم دمه بعد الحامية.

٣٠٢٨٦ - وَأَجِبٌ الْأَدَاكُم

Exigible (F). *Demandable* (E). هو ما كانت المطالبة به ممكنة.

٣٠٢٨٧ - وَأَحَسٌ

Oasis بقعة خضراء نضرة توفر لها الماء ويحصب التربة في وسط صحراء قاحلة.

٣٠٢٨٨ - وَأَحِفٌ

جناح كثير الريش.

٣٠٢٨٩ - وَأَاحِلٌ

Limicole (F). لمت تعريفني يطلق على الديدان والحويوانات الدنيا الشاملة التي تعيش في الطين والأوسال.

٣٠٢٩٠ - وَأَوْتُ

Héritier, Noir (F). *Heir* (E). هو احد اقرباء الميت اللذين يحق لهم شرعاً اخذ نصيب معين من تركته.

٣٠٢٩١ - وَأَوَشٌ

Hétérotrophe (F). *Heterotroph* (E). هو كل نبات يعيش طفلياً على المواد الغذائية التي يحرمها ويغفلها النبات الشاح.

٣٠٢٩٢ - وَأَوْرَفٌ

Verdoyant (F). *Verdant* (E). ورف النبات؛ لفسر واحتر فهو وارف اي ملج أو ناضر.

٣٠٢٩٣ - وَأَوْرِقٌ

Frondicole (F). الوراق ما كانت حياته مستمدة من الورقة أو أنه يعيش عليها.

٣٠٢٩٤ - وَأَوْرَقٌ

Chien de barger (F). *Shepherd's dog* (E). الوراق هو كلب الراعي لانه يرع الوحش من اللثم.

٣٠٢٩٥ - وَأَشَعٌ، وَأَشَعَةٌ

Floricole (F). هي الجالبة، الحشرة التي تعيش على الازهار.

٣٠٢٩٦ - وَأَشَحٌ

Anthophage (F). *Anthophagus* (E). من يعيش على الازهار ونبها، راجع جابس.

٣٠٢٩٧ - وَأَشِيلٌ

Cryptandra (F). لمت تعريفني يطلق على كل ذكر من الحيوان طلاس الشوار الشقي.

٣٠٢٩٨ - وَأَشْطُورِيَّةٌ

Wachendorfia (S). *Wachendorfia* (F). جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المهادريات. انواعها المعروفة اربعة. مهدها منطقة رأس الرباء الصالح في اطراف افريقية الجنوبية || جميعها تربيتية. أوراقها لائقة، كبيرة، مستطيلة النصال الغددة المدبة الاطراف. شاربخها الزهرية تنتهي بمجموعات من الازهار سبيلية التركيب. أزهارها سداسية البتلات، مستحبة الطرف الخلفت، حيلة الالوان الزاهية.

٣٠٢٩٩ - وَأَشْطُورِيَّةٌ

Washingtonia, *Pritchardia* (S). *Washingtonie*, *Pritchardie* (F). جنس اشجار تزيينية من فصيلة النخلات مفقودة التعريف على اسم واشنطن ورئيس الولايات المتحدة || انواعها



واشدرنية



واشطنونية

٣٠٣٠٧ - وَاقِ الشَّجَرِ* ، هُرَابُ اللَّيْلِ

Nycticorax nycticorax (S). Bihoreau, Héron bihoreau (F). Night heron (E).

طائر من البشريات ، جسمه متوسط القد يطول نحو ٥٦ سم. ثوبه متباين الألوان ، أسود الرأس والرقبة ، أخضر الظهر ، أخضر الصدر والبطن. يحمل على رأسه بعض الريش العتيق الطويل الشبيه بالياض.

٣٠٣٠٨ - وَاقِ صَغِيرٌ* ، مِلْبَحْكَةٌ

Ixobrychus minutus (S). Blongios nain (F). Little bittern (E).

طائر من البشريات ، جسمه صغير القد يطول نحو ٣٧ سم. ثوبه متراكب الألوان ، ظهره اسمر يلعب بالأخضر ، يمتد إلى الصهبة ، باطن جناحه أبيض ، متقارص أصفر الجسم اسمر المثنى. ساقاه إلى الخلف البحرى .

٣٠٣٠٩ - وَاقِعَةٌ

Evénement (F).

الواقعة هي الحادث ، أطلبه .

٣٠٣١٠ - وَاقِلٌ

Balæna japonica (S).

Baleine du Japon (F). Whale of the Japon (E).

نوع من الحبال ، موطنه شمال المحيط الهادى وقد شوهد قرب كاليفورنيا وجزر أوكيا . جسمه كبير القد ، يرمي الشكل ، يطول من ١٤ إلى ١٨ م. ثوبه نفي اللون ، رصاصي الموانج ، يمتد مع اقترابه من ثوب الظفر ويغير عند البطن . أثناء تقصير جرواً واحداً ترشعه نحو الحبل .

٣٠٣١١ - وَاقِيَةٌ

Talles (F). Suckers (E).

الواقية هي فراخ الزرع الناتجة من الاضطهاد ، راجع شطه واضطهاد .

٣٠٣١٢ - وَالْبَرِيَانُ أَخْرٌ

Valériane rouge (F).

هو الوشمة الحمراء ، أطلبه .

٣٠٣١٣ - وَآمٌ

Sarre (F).

هو المصرى ، أطلبه .

٣٠٣١٤ - وَائِكٌ

الوائك بالوائك : نعت تعريفي يطلق على كل طائر ضاحك .

٣٠٣١٥ - وَاقِيْفٌ

Verdoyant (F). Verdant (E).

النباتات الواظفة المهزئة من كثرة الأوراق الخضراء .

٣٠٣١٦ - وَاهِيَّاتُ الْمَنَاقِيرِ

Lévirostras (F).

Levirostrata (E).

مرتبة من الطيور الجوارح التي تتميز بضفائر متناظرة الكبيرة . فصائلها وأجناسها عديدة . أشهر فصائلها الخضرقيات والشرقيات والاركوبيات .

٣٠٣١٧ - وَاقِيٌّ

Chacal (F).

هو ابن آوى ، أطلبه .

٣٠٣١٨ - وَبَاءٌ وَوَتَانٌ

Epidémie, Epiphytie, Epizootie (F). Epidemic, Epizooty (E).

كل مرض شديد المعوى سريع الانتشار يصيب الإنسان أو الحيوان أو النبات وينتقل من مكان إلى مكان ومن

المعرفة حمة جميعها اسطوانية السوق البليغة المائلة المنتصبة . ارتفاعها مرسية الشكل جميلة الخضار القسبي ، كروها مستطيل العمود دقيق شائك ، شوكة صدر القد عخين . ازهارها متكوي التجميع ، كبير القد ، كثير التشعب . ازهارها خشوية التركيب . ثمارها ثنوية جامدة اللب اللامد القاتلة . بزورها خشبية صلبة لا تصلح لشيء . مهدها كاليفورني وجزر الاوقيانوس الهادي . أشهر أنواعها ، واشطوتوتية القوية والواشطوتوتية البليانة .

٣٠٣٠٠ - وَاشْطُوتِيَّةٌ قَوِيَّةٌ

Washingtonia robusta (S). Washingtonie robuste (F).

نوع من الواشطوتوتية . جذعها عمودي الانتصاب ، غليظ القاعدة ، مستدق الطرف ، يطول من ٦ إلى ١٠ أمتار . أوراقها دقيقية مرسية قطرها نحو ٢٠٠ سم. ثوبها إلى الخضار القسبي اللامع الموانج . كروها شديد الخضار يطول نحو ١٠٠ سم. شوكة أصفر اللون صغير القد شديدة التحسين . مهدها شواطئ نهر سكومتو في كاليفورنيا . تمثيل ونموه أينا زرع شرط أن لا تنخفض الحرارة من ست درجات ستيفراد وأن يمين لها الري الوافي عند الحاجة .

٣٠٣٠١ - وَاشْطُوتِيَّةٌ لَيْفَانِيَّةٌ

Washingtonia filifera, Pritchardia filifera (S). Washingtonie filamentsuse (F).

نوع من الواشطوتوتية . جذعها اسطوانى مستقيم يرتفع من ٦ إلى ١٠ أمتار . أوراقها دقيقية مرسية قطرها نحو ١٥٠ سم. ثوبها إلى الخضار القسبي الزاهي يطولها خطوط لينة شقراء اللون تشبه الشعر . كروها دقيق عخين شائك طولها نحو المتر . مهدها كاليفورني ، تحصل الحرارة المنخفضة حتى الست درجات ولا تقطف العلف . تمثيل في جميع الأزقة لكنها تفضل الحوارة حيث تجد رطوبة وسعة .

٣٠٣٠٢ - وَاهِمٌ

Pathogène (F). Pathogen (E).

كل متفطر أو كائن حي يسبب مرضاً ما .

٣٠٣٠٣ - وَالْفِدَّةُ

Grippe (F). Influenza (E).

هي الانفلونزا ، مرض معد يصيب الحيوان ولا سيما الخيل .

٣٠٣٠٤ - وَاقِيٌّ

Préventif (F). Preventive (E).

٣٠٣٠٥ - وَاقِيٌّ

Botsurus stellaris (S).

Butor étoilé (F). Bittern, Common bittern (E).

طائر من فصيلة البشريات ، طويل العنق والمناقير والرجلين والأظفار ، قصير الزنكي ، أصفر الزنكي المرقش . يجب العزلة فيختفي في النهار بين الأسل ويكثر الصباح في الليل . قال الشاعر مرقش السديدي :

ولقد صليت وكنت لا أعود على واق وساتم

فاذا الأهاثم كالأمان من والأمان كالأهاثم

وكذلك لا خير ولا شر على أحد بهذا

٣٠٣٠٦ - وَاقِ أَبْيَضٌ ، صَبِيحَةٌ

Ardeola rallioides (S). Héron crabier (F).

Boatbill (E).

طائر من البشريات ، صغير القد طولها نحو ٤٢ سم. ثوبه إلى البياض الأبيض يحمل على رأسه طرة من الريش المستطيل النقيع الأبيض والأسود . متقاربه إلى الزرق ، أسود المثنى والقاعدة .



واق



واق الشعر



واق صغير

Calonectria (S).

٣٠٣٣١ - وبيلة ٥

جنس فطور مجهرية من السباحيات وفضيلة الشبوات .
أصنافها غنمة ، محبة السطح ، مرجانية اللون ، تركت
حل ونبية ناعمة . تكاثرت صفة الشكل . وبها عديد
الحلابة البثرية الانقسام المتوازي || أنواعها المؤذية قليلة
أمرها وبيلة الأزوع .

٣٠٣٣٢ - وبيلة الأزوع ٥

Calonectria graminicola, C. nivalis, Fusarium nivale, F. miniatulum, F. loliae (S). Moisissure nivale des céréales, Fusariose des céréales (F). Snow mould of cereals (E). Schneeschimmel (D).

فطر مجهرى يركب الزروع وأصعبها الشيلم والحلقة والشربان
وبعض التجيليات البرية || مظهره الخارجى يكون على
شكلين : الأول عندما يصيب الزروع في أبان غبه فيقبلو
ككتلة من القطن المغطى تلحف نواحي الزروع ويصفه
كالحلقة || والشكل الثاني عندما يصيب الزروع بعد غبه
فيبدو أن ذلك لمطحا خلية لا تباينة الشكل والحجم ، لونها
الذات تملو الصف والالوان والسلايات || أضراره
منطقة برطوبة التربة والموائل الجوية المداة || يكالغ
بتطهير البذار بواسطة أحد الفطاطير الناجمة ومنها املاح
الذئبق .

Phacelia (S).

٣٠٣٣٣ - وبيرة ٥

Phacelia (F). Phacelia (E).

الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « حزة » . جنس نباتات
عشبية ، حولية أو محبة من فصيلة التجميات . أنواعها
المعروفة عديدة منها المناطق الحارة من المالحين القديم
والجديد || بعض أنواعها الحولية مرغوبة لزروع للابزار
والاشجار . سوقها خلية الصفاء ، فراء . أوراقها متعاقبة ،
ريشية . أزهارها سبلي التجميع . أنثادها رفاقية يحمرها
النمل وهي زرقاء اللون أو بنفسجية أو ليلية أو بيضاء ||
اشهر أنواعها التالية .

٣٠٣٣٤ - وبيرة جرسية ٥

Phacelia campanularia (S). Phacelia campanulée (F).

نوع من البيرة الزينية . عشية حولية تملو من ١٥ إلى
٣٥ سم . أوراقها اهلجية لشكل مغرسة ويسنة . أزهارها
بيضاء اللون . ثوبجتها مغرسة جرسية الشكل ، لونها إلى
الزرقاء المايقة يملوها عند قواعدها خمس نقط سود ||
تنويرها يستمر من حزيران إلى ايلول .

٣٠٣٣٥ - وبيرة ليدك ٥

Phacelia congesta (S). Phacelia dense (F).

نوع من البيرة الزينية . عشية حولية تملو من ٢٥ إلى
٥٥ سم . ساقها وفروعها مزرقة الصفاء . أوراقها ثلاثية
أو خالسة أو سباعية التفرع القوي . أضراره كبيرة القند
قطرها نحو ٦ سم . لونها إلى الزرقاء الجيلة . ثوبجتها خلية
البشرة ، فصلها سنانية الشكل . اسديتها قليلة التفرع ||
تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٣٣٦ - وبيرة لرجة ٥

Phacelia viscosa (S). Phacelia visqueuse (F).

نوع من البيرة . عشية حولية تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم .
أوراقها شبه قلبية الشكل ، طولها نحو ٦ سم . نصالها
لينة ، مسنة الخمار . أزهارها مستدة الحبر ، قطرها
نحو ٣ سم . لونها إلى الزرقاء تتصلها بقبة ارجوانية ||
تنويرها يستمر من تموز إلى آب .

منطقة جغرافية إلى أخرى . وهو بذلك ينشر عن الأمراض
المعدية التي لا تنتقل من منطقة جغرافية إلى أخرى .

٣٠٣٣٩ - وباء مؤذني

Enzootia (F). Enzooty (E).
هو الوباء المحدث الانتشار الذي لا يتجاوز المزروع أو
المنطقة الجغرافية .

Epidémiologie (F).

Epidemiology (E).

الوباء علم يبحث في ماعية الأمراض الوبائية وفي أسبابها .

Adaptation

٣٠٣٢١ - وبات

من وبات بالمكان : اتم . الوبات هو الالباد الحق
التابع .

٣٠٣٢٢ - وبك

Tridax (S). Tridace (F).
مجلسة عشبية حولية برية من فصيلة المركبات . ساقها
حزنية الفروع تملو نحو ٩٠ سم . أوراقها متعاقبة مثلة
المفصوص المدية الشائكة . أزهارها كثيف التجميع .
رؤسها الزهرية صفراء اللون ، شائكة السينات المثلثة
الحسل . بزورها ريشية التهدب . تنويرها يستمر طوال
شهر حزيران .

Reboursissement (F).

٣٠٣٢٣ - وباط

Stunteding (E).

هي حالة كل حيوان أو نبات شد مجبته وقلة نمو
معدل نموه || أما الحيوان أو النبات الذي يشد يصغر
جسمه عن معدل نموه فهو انصب وهي زباه .

Disproportion

٣٠٣٢٤ - وبك

الويد هو النقص الجسموري الغالب ، ج أوباد .

٣٠٣٢٥ - وبير

هو الزل ، حيوان من السباحيات ، اطليه .

٣٠٣٢٦ - وبير

Poil, Duvet (F). Hair, Down (E).
الوبر هو للابل واللامة والالان وبعمو كالصوف لقم .
وهو إحدى غامات التسج المشهورة يستخدم في صنع
المسجات المختلفة وسوبر اهركات التي تنمض الرطوبة .

Cathcartia villosa (S).

٣٠٣٢٧ - وبيرة

Cathcartia velus (F).

نبات عشبي حولي بري ورثي من فصيلة الحشاشيات .
ساقها فراء كثيفة الزغب المستطيل تملو نحو ٣٠ سم .
أوراقها بيضية الشكل مستعرضة . نصلها عشن الصفحة ،
خلى البشرة ، مهدب الاطراف . زفها واحداها جزوية
اللون . أزهارها ناجية فردية كبيرة القند ، قطرها نحو ٥ سم .
لونها إلى الصفراء الكبرتي الزاهي || تنويرها يستمر
طوال شهر حزيران .

Tomentoux (F).

٣٠٣٢٨ - وبيري ، زغبتي

Tomentous, Downy (E).

نمت تمرني يطلق على اجزاء النبات والحيوان المظا
بور قصير نام .

٣٠٣٢٩ - وبس

ويص الجرو : فتح عليه .

٣٠٣٣٠ - وبك

Rut, Chaleurs (F). Rut, Heat (E).
طلب الفان أو بالاسرى التاج للصفاد .

مفتول، اما اذا انبسط ليدعى الصفاق كما في عضلات الظهر. أما وظيفته فهي التوسط بين اطراف العظام والمضلات او بين العضلات نفسها .

٣٠٣٤٧ - **وَتْر** (F). *Impair* (F). Odd, Uneven (E).
الوتر ما لم يتكثف من اللحم .

٣٠٣٤٨ - **وَتْر التماس** (F). *Corde de contact* (F).

٣٠٣٤٩ - **وَتْر الزاوية القلبيّة** (F). *Hypoténuse* (F).
Hypotenuse (E).

٣٠٣٥٠ - **وَتْرِيّة ، فَرْدِيّة** (F). *Imparité* (F).
Imparity (E).
كون الشيء غسّاً أو فرداً .

٣٠٣٥١ - **وَتْرِيّة التّركيب** (F). *Imparipennée* (F).
نمت وصفي يطلق على الاوراق المركبة المتباعدة بوفرة فردية واحدة .

٣٠٣٥٢ - **وَتْر** (F). *Waltzie* (S). *Waltzie* (F).
جس نباتات حولية برية وتربيتية من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة نحو ١٢ شكلها شكل السرك . سويها فراء . اوراقها متعاقبة جامدة التصل . ازهارها رؤسية . يزدهر بجذوة بامتداد متفادي الشكل || احرف انواعها واشهرها ما يلي .

٣٠٣٥٣ - **وَتْرَة بَيْضَاء** (S). *Waltzie nivea* (S).
Waltzie blanche (F).

نوع من الوتر . عشته تعلو نحو ٥٠ سم . رؤسياتها الزهرية كثيرة العدد . ازهارها الى الصفار الكبيرتي ، قناباتها مهدبة الاطراف ، بيضاء اللون || تنورها يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٣٥٤ - **وَتْرَة عَشْكَوْلِيّة** (S). *Waltzie corymbosa* (S). *Waltzie en corymbe* (F).

نوع من الوتر ، عشته تعلو نحو ٦٠ سم . ازهارها عشكولي التجميع ، لبه الترتيب . رؤسياتها الزهرية كثيرة العدد . ازهارها وريدية اللون قناباتها مسطيلة لينة بيضاء اللون . تنورها يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٣٥٥ - **وَتْرَة مَدَهَبَة** (S). *Waltzie aurea* (S).
Waltzie dorée (F).

نوع من الوتر ، عشته تعلو من ٥٠ الى ٧٠ سم . ازهارها عشكولي التجميع ، وعلى الترتيب المتتابع . رؤسياتها الزهرية كبيرة القليلة العدد . ازهارها وقناباتها ذهبية اللون || تنورها يستمر من آب الى ايلول .

٣٠٣٥٦ - **وَتْلُوف** (S). *Cichorium intybus* (S).

Witloof, *Chicorée à grosse racine* (F). *Witloof* (E).
نوع من المهنداة الزراعية الخنازيرية . هي بقلة مأكولة الجذر والاوراق تكثر زراعتها في البلاد الاروروبية . ترطب في الاربة الحوارة المنقوشة الانتماس الغنية بالمواد المضوية . زراعتها تتطلب بعض العناية اخصها طعم الاوراق عند ازدياد الاربعة الاول منها || أما الوتلوف فهو يحوي ما قدره :

من الماء	٩٣,٠٠ ٪
من المواد الازوتية	١,٢٢ ٪
من المواد الدهنية	٠,٤٧ ٪
من المواد المستخلصة	٥,٣١ ٪

٣٠٣٣٧ - **وَبِيرَة مُهَدَبَة** (S). *Phacelia purshii* (S).
Phacelia frangée (F).

نوع من البويرة . عشبة حولية تعلو من ٢٥ الى ٥٠ سم . اوراقها السفل متعقة تطول نحو ١٠ سم . وتنقسم الى ١٥ سكة . اوراقها العليا لاطئة ، خاسية السك . ازهارها صندرية اللثد قطرها نحو ١٥ سم . لونها يراوح بين الازرق والبيكلي . فلق توجعها مهدبة الاطراف || تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠٣٣٨ - **وَبِيلَة ، وَبِيل** (F). *Fagot* (F). *Faggot* (E).
سزينة اخبط اللدقيق الميدان .

٣٠٣٣٩ - **وَت** (F). *Cri du palombe* (F).
الوت والوت : صياح الورشان .

٣٠٣٤٠ - **وَتَح ، كَبُونِد** (S). *Capnodium* (S).
جس فلور مجهرية من فصيلة الترحيات . انواعها عديدة ، منتشرة في معظم اقطار العالم ، تركب الحشويات والريزن والصلصاف والسديان الب... احسانها مكررة ترتكز على امن دقيقة لتلشب في وثبات المشج . ابراغها الزقية مؤنثة التركيب توتية الشكل سمراء اللون || وهو يركب لحاء السوق والاضغان ويشرة الاثنان ولا يمتري الاوراق . مظهره الخادبي وشاح كالسغام لا لقياس الكثافة والسك ، لزوج للمسس ، اسمر اللون .

٣٠٣٤١ - **وَتَح المَهْلِيُون** (S). *Zopfia rhytosphila* (S).
فلر مجهرية وهي من الترحيات تركب فلور المهلين والسفندر فيؤذيها وقد يقضي عليها . احسانه سود كروية الشكل . لثة يضي مذهب الرأس والمقب ، مغلوط الوسط يحسن ٨ ابراغ ثنائية البويذات المائلة .


٣٠٣٤٢ - **وَتَحِيّات** (S). *Capnodaceae*, *Perisporiaceae* (S). *Périssporiacées*, *Capnodiacées* (F). *Perisporiaceae*, *Capnodaceae* (E).
فصيلة فلور مجهرية تنتمي الى رتبة الزقيات . انقائها عشوة متراكبة منتفخة سمراء اللون . بينها يتحمر عند نفج الانسان ، من مرق رأسي لا لظامي الانشقاق ، وهو كثير العدد اسطولي الشكل او يشبهه ، غيراته لا لقياسه العدد || اجناسها وانواعها كثيرة اما التي تركب النبات وتظلل عليه قليلة ، اشهرها الترح والعاثان .

٣٠٣٤٣ - **وَتَدَة** (F). *Pile*, *Stake* (E). *Pilot* (F).
عود من عشب متوسط الالفة والطول يستعمل للرز في التلح .

٣٠٣٤٤ - **وَتَدَكَة** (F). *Tragus*
هنة مثلفة الزوايا مركزها عند فجة صمخ الاذن .

٣٠٣٤٥ - **وَتَر** (F). *Chord* (E).
جس خيطي مرن يستعمل في بعض الآلات الموسيقية المعروفة بالآلات الوترية . تصنع الاوتار عادة من امعاء بعض الحيوانات ومن اسلاك معدنية . ويجب ان يكون الوتر منسوب الغداء والكثافة في كامل طوله .

٣٠٣٤٦ - **وَتَر** (F). *Tendon*, *Sinew* (E). *Tendon* (F).
الوتر ضغينة من الالياف تتكون من الحبيرات العضلية التي لم تتحول نهائياً الى نسج ضلي . وهو عادة مستدير



وتح المهلين



وتلوف



ونبة



ونفا



ونير

Ampullacera (S). * ٣٠٣٧١ - وكدة ٥

Ampullacère (F). Ampullacera (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الابريل .
انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من عظم زيلنا الجديدة ||
تألف الخلدان حيث تكثر التنبوت البحرية التي تعيش
عليها || اصنافها شبه اجاصية الشرنج ، متباينة الحجم ،
كبيرة القوية ، ملونة ، يكثر فيها الجوزي والكستني
المتاني الموج || جعلها مأكول ، مرغوب فيه .

Structure

٣٠٣٧٢ - وكل

الزهر هو البنية ، راجعها .

Sélectionner (F). To Improve (E). * ٣٠٣٧٣ - وكل

وئل الحويون والنبات : أصله ويمكن فيه مبادئ الاستنخاب .

Parenchyme (F). Parenchyma (E). * ٣٠٣٧٤ - وكلن

هي نسيج الاختلاء والخضيب في نصل الورقة من كل
نبات .

٣٠٣٧٥ - وكيج ، وكيم المكنثر لحماً من المواشي .

٣٠٣٧٦ - وكير * ، غطارية

Gaultheria (S).

Gaulthéria (F).

جنس نباتات معمرة من فصيلة الخلنجيات ، انواعه عديدة
منها بلاد الشرق وأمريكا . معظمها جنات صغيرة القند
متنوعة . اوراقها متعاقبة ، بيضية ، حرة . ازهارها كروية
الشكل . ثمارها لحية ، مأكولة ، حبة القالب والتركيب ،
خلسية الخمر || أشهر انواعها ما يتبع .

٣٠٣٧٧ - وكير شلون

Gaultheria shallon (S).

Gaulthéria Shallon (F).

نوع من الوثير وهو جنبة متصبية فراء تملحو نحو ١٠٠ سم .
اوراقها كبيرة القند تطلو من ٨ الى ١٠ سم . نصلها جلدي
الصفحة مسن الختار . ازهارها متفويذ التجميع ، تاجي
الارتكاز . ازهارها صغيرة القند بيضاء اللون أو وردية .
ثمارها ال الصرة الزرقاء الموج . كمايرها مأكولة .
تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠٣٧٨ - وكير مداد ، غطارية كتدي ، عيب

Gaultheria procumbens (S).

Gaulthéria Shallon (F).

Gaulthéria couchée, Thé de Terre-Neuve, Thé
de montagne (F). Checker berry, Winter-green
(E). Canadischer Tee, Wintergrün (D). Tê di
Terranova, Tê dal Brasile (I).

نوع من الوثير وهو نبات عارض مداد . اوراقه تطلو نحو
٥ سم . وتعرض نحو ٣ ، نصلها جلدي الصفحة مسن
الختار . ازهارها فردية الترتيب ، بسيطة الارتكاز ، لوناً الى
البياض الموش بالوردي . اوراقه تشتمل امتثال الشاي
لانها عطرية الرائحة ولا تملحو من بعض المنافع الصحية وقد
يستخرج منها عطر « النطازين » || تنورها يستمر طوال
فصل الصيف .

٣٠٣٧٩ - وكير ونشي

Gaultheria veitchiana (S).

Gaulthéria de Veitch (F).

نوع من الوثير وهو جنبة متصبية فراء تملحو نحو ١٠٠ سم .
اوراقها اهليلجية مدنية القاعدة تطلو نحو ٨ سم . نصلها
جامد الصفحة ، مسن الختار ، حليبي التسنين ، حلي المروق .
ازهارها عتقويذ التجميع . ازهارها بيضاء اللون ،
صغيرة القند ، ثمارها حنطة اللون يرتقالية الموج . كمايرها
لحمة مأكولة || تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

Autochtone (F).

٣٠٣٧٧ - وتيمي ٥

Autochthonous (E).

نمت تربيتي يطلق حل من كان مقرباً في وطن اسلافه .

٣٠٣٥٨ - وتين وزن الماء : دام ولم ينقطع .

٣٠٣٥٩ - وتين

الوتن هو بروز الخلق عند الولادة في وضع خاص
يختلف عن الوضع الطبيعي .

Mét (F). Meatus (E).

٣٠٣٦٠ - وتيحة ٥

الفجوة بين خلايا النسيج النباتية . ج وتنج وتقالع .

٣٠٣٦١ - وتيددة

Pal, Pieu (F). Pale, Stake (E).

ما رز في الارض أو الحائط من خشب .

٣٠٣٦٢ - وتير

Rolet blanc (F).

هو الوردة الابيض ، اطليه .

٣٠٣٦٣ - وتيرة

Décade (F). Decade (E).

اسم لقد الشرطة .

٣٠٣٦٤ - وتينة ٥

Mycetopus (S).

Mycetopus (F).

جنس حيوانات مائية من الرخويات مسفيحات الخياش
وفصيلة التبادات . انواعها المعروفة قليلة العدد معظمها
من عظم انهر وبحيرات امريكا الجنوبية || اصنافها شبه
بيضية الشكل ، زرقية التصبغ ، تطلو من ٩ الى ١٢ سم .
وهي متساوية المصاريح ، لامتناهية الاصلح . تتميز
بامتطالة الابريل المنجية بلقراض كتنكاف الظهور تشب
في حمزور الجبريات والانهز وفي الحمص ايضا || تنيش
جمجموات كثيرة العدد . لحمها مأكولة ، متوسطة الصف .

٣٠٣٦٥ - وتاجكة كثرة اللحم .

٣٠٣٦٦ - وتاكدة كثرة الشحم .

٣٠٣٦٧ - وتاليد في الياس ، اطليه .

٣٠٣٦٨ - وتالدة

Tectologia (F). Tectology (E).

الوثالة البحث الشوزي الصرف الهيكلية الضوية .

٣٠٣٦٩ - وتامكة

Colladonia (S).

Colladonia (F).

جنس نباتات عشبية معمرة برية من فصيلة الخيلجات .
انواعها المعروفة متوسطة العدد اصنافها بعض مناطق البلاد
الحارة والمعتدلة الحرارة || سفلها فراء متفاعة الارتفاع .
اوراقها متعاقبة ، لانياسية الشكل ، منها الرجمة المستطيلة
والقلبية والمضغعة والريشية . ازهارها صيدلي التجميع ،
طرني الارتكاز . ازهارها صفراء اللون . أشهر انواعها :

٣٠٣٧٠ - وثامة صغيرة اللحم

M. microcarpa (S).

٣٠٣٧١ - وثامة مجتمعة

S. alata (S).

٣٠٣٧٢ - وثامة مشرفة

S. crenata (S).

٣٠٣٧٣ - وثير

الورث : الذي خلا من الحويونات المنوية .

٣٠٣٨٠ - **وَكِيرَكَة**

Cloison (F).

في الحاجز الخليوي.

Dividing membrane (E).

٣٠٣٨١ - **وَكَيْكَة ، مُسْتَنَدَة**

Document

هي في القانون التجاري كل معاملة خاصة بالمصارف المسافرة ان صادرة او واردة .

٣٠٣٨٢ - **وَكَيْكَة التَّامِين**

Police d'assurance (F).

Insurance policy (E).

هي المقدد المهرر الذي يثبت انعقاد التأمين وشروطه .

٣٠٣٨٣ - **وَكَيْكَة**

Pierre à briquet (F). Flint (E).

حجر القداحة . ولا والذي اخراج النار من الويكة .

٣٠٣٨٤ - **وَكَيْكَة مُحَبَّبَة**

Aclius sulcatus (S).

Aclius silloné (F).

حشرة مائية قانصة من فصيلة المكنوزيات ورتبة غدييات الاجنحة . مرتبطها بعض مناطق البلاد المتعددة الحرارة . تألف المتاعق واللدندان . تعيش في الماء . تلتصق كل ما تيسر لها من الحشرات الدنيا والارالي ولا تترك الماء الا في زين الكرم والتسكنة لانها تمتص المكن على الصفحات السفلى من تصال الاوراق التي تلتصق سطح التربة في جسمها شبه يضيي الشكل بطول نحو ١٨ سم . ثوبها الى الخشن الاسمر المواج . ظهرها مائل الصفرة عند الذكر ، عندده عند الانثى . لها جبل واحد في الحبل . يوقتها تسمى الى الماء بعد التفت بنحو اربعة ايام وهي قانصة كاشطرة الجملانة .

٣٠٣٨٥ - **وَجْج** هو عيد الرج ، اطلبه .

٣٠٣٨٦ - **وَجَكَل**

Chanil (F). Dog-Kennel (E).

الويلج . ج. ابيرة ويبر . هو مأوى الكلب ويكون عادة من خشب . وفي الاصل هو سرب الفصيح والقلب والثلث ونحو ذلك .

٣٠٣٨٧ - **وَجَب** الرجب هو انعقاد البيا في الفرج .

٣٠٣٨٨ - **وَجَبَة**

Cure, Fournée (F).

Batch, Baking (E).

ما يستويجه الخفاف من تيل على دفعة واحدة .

٣٠٣٨٩ - **وَجَر ، وَجَر**

Garenne (F). Warren (E).

هو مأوى القواقع .

٣٠٣٩٠ - **وَجَن**

Moraine (F).

حجر على طانية جليدية .

٣٠٣٩١ - **وَجَنَة**

Face (F).

٣٠٣٩٢ - **وَجَنِيَّ**

Facial (F).

٣٠٣٩٣ - **وَجُوب الأَدَاء**

Exigibilité (F).

Exigibility (E).

هو ان يصبح الدين واجباً اداري الى الدائن .

٣٠٣٩٤ - **وَجَّيَات**

Acorées (F).

سيط من فصيلة القنقليات .

٣٠٣٩٥ - **وَجِيد**

Terrain plat (F). Level ground (E).

ما استوى من الارض . ج. ويبدان .



ويكة غُدَّة



وسرة

٣٠٣٩٦ - **وَجِين** الرجين هو شط الوادي المزدوج .

٣٠٣٩٧ - **وَحَاف**

Banc (F). Layer bed (E).

هو الطبقة من الرمل او الساف من الصخر او الرصيف من المرجان الخ...

٣٠٣٩٨ - **وَحَال**

Terrivome (F).

Terrivomous (E).

الرحال قاذف الرمل او التراب . بركان وحال .

٣٠٣٩٩ - **وَحْدَانِي**

Sporadique (F). Sporadic (E).

هو من النبات من ألف العيش منفرداً .

٣٠٤٠٠ - **وَحْدَكَة**

Unité (F). Unity, Unite (E).

اصطلاح يستخدم في العلوم الطبيعية اساساً لقياس . في النظام الفرنسي لمقاييس الاطوال والمساحات والاحجام ، يعتبر المتر والمتر المربع والمكعب وحدة هذه المقاييس . وين اجزائه ومضاعفاته اشقت المقاييس الاخرى . وفي الاوزان يعتبر الغرام واجزائه ومضاعفاته وحدة القياس . وفي النظام الانكليزي يعتبر البرد وحدة لقياس الاطوال والمساحات والاحجام ، والباوند وحدة الاوزان . وفي الهندسة تعتبر الدرجة وحدة القياس وهي الزاوية الناتجة من تقسيم الدائرة الى ٣٦٠ قسماً متساوياً . وفي علم الحرارة تعتبر السرة وحدة القياس ويبر عنها بكمية الحرارة اللازمة لرفع حرارة غرام واحد من الماء النقي من درجة ١٥ الى ١٦ مئوية . وفي الكهرباء يعتبر الاامبير وحدة التيار ويبر بالامبير وحدة المقاومة . وفي الضوء ، وحدة القياس هي الشمة . وفي علم الصوت فوسدة القياس هي الببل .

٣٠٤٠١ - **وَحْدَكَة غِذَائِيَّة**

Unité nutritive (F).

Nutritive unity (E).

هي عنصر الغذاء الرئيسي او القيمة الغذائية القابلة للتشيل الموجودة في مادة معينة او شكك مقرر . لذلك نقول ان التشكيم الصحيح يجب ان يرتكز على محوى العناصر الغذائية وما ينتجم عنه من وحدات . راجع جدول العلف .

٣٠٤٠٢ - **وَحَرَكَة**

Nycterie (S). Nyctère (F).

جنس حيوان من فصيلة الحوريات . انواعه سبعة ، تتميز بتجويف قصبة الأنف وبالزوائد الجلدية التي تملأ ستار التجويف الايمن والايسر . اجسامها صغيرة القد . طولها يراوح من ٧ الى ٩ سم . بما فيه الذنب الذي يطول من ٣ الى ٤ سم . انسابها الى الصعبة الخطية المختلفة المواج ، بطوناً زاهرة . موطنها افريقية الشرقية والحبيشة والسودان ومصر وليبيا وتونس والجزائر ومراكش . تألف الكهوف والمغاور والبيوت الخربة . تعيش جهات قليلة العدد . قوتها الحشرات والدوريات والمفولم .

٣٠٤٠٣ - **وَحَرِيَّات**

Nycteridae (S).

Nyctéridés (F).

فصيلة من الخفافيش مركزها بين الخفافيش والمباشيات . انواعها ١١ ينتمين الى جنسين البصرة والمنطاب . من ميزاتها الخاصة زوائد المخزمية المركبة وكبر آذانها الزنبدية القاعدة المحسوسة . اناتها تضع جرواً واحداً تحمله دائماً حتى بلوغه . موطنها افريقية الشرقية ويسلاد الحبيشة .

Monopétale (F). - وَحِيد البَتَلَة ٣٠٤١٧

Monopetalous (E).

نمت تعريفي وصفي يدل على التوزيع الوحيد البتلة .

Monorchide (F). - وَحِيد الخَيْصَبَة ٣٠٤١٨

Monorchid (E).

من الحيوان ما كان ذا خصى واحدة .

٣٠٤١٩ - وَحِيد الخَلِيَّة

Monocellulaire, Unicellulaire (F). Monocellular, Unicellular (E).

مركب من خلية واحدة ، أو ذو خلية واحدة .

Monotomique (F). - وَحِيد الدَوْرَة ٣٠٤٢٠

Monotomic (E).

Uniflore (F). - وَحِيد الزَهْرَة ٣٠٤٢١

Uniflorous (E).

ذو زهرة واحدة .

Unicaule ٣٠٤٢٢ - وَحِيد السَّاق

Monandre (F). - وَحِيد السَّاق ٣٠٤٢٣

Monandrous (E).

من النبات ما كان ذا عضو تكثير واحد .

Monostigmaté (F). - وَحِيد السِّمَكَة ٣٠٤٢٤

Monostigmatous (E). ذو جسم واحد أو أطوية واحدة .

Unilabé (F). - وَحِيد الشِّفَة ٣٠٤٢٥

Unilabiate (E).

ذو شفة واحدة .

Unisécué (F). - وَحِيد الشَّيْء ٣٠٤٢٦

Unisexual (E). ذو أعضاء تناسلية ذكرية أو أنثوية .

Monoploïd ٣٠٤٢٧ - وَحِيد العِثْرَة

هو كل نبات قوام تركيبه الخلوي عترة بسيطة .

Unilobé (F). - وَحِيد الفص ٣٠٤٢٨

Unilobate (E).

نمت تعريفي يطلق على كل لصل ورقة وحيد الفص .

Monosépale (F). - وَحِيد المِصْلَة ٣٠٤٢٩

Monosepalous (E).

Monocotylédone (F). - وَحِيد النِّسْجَة ٣٠٤٣٠

Monocotyledonous (E).

اسم أو صفة كل نبات من ذوات الفلقة الواحدة .
والنباتات وسيدات الفلقة تولد احد قسمي مستورات
البزور .

٣٠٤٣١ - وَحِيد القَرْن هو الكركدن الهندي ، اخطبه .

Monocéros, Licorne (F). - وَحِيد القَرْن ٣٠٤٣٢

Monoceros (E).

كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها بين الكلب الاكبر
والكلب الاصغر والجبار والنسجاء الاثنى . وهي تمثل
حيوان غرابي له جسم الفرس وني رأسه قرن واحد ||
نجومها متفاوتة الاشكال والالوان وأقرب عددها ٣١ .

Unipolaire (F). - وَحِيد القُطْب ٣٠٤٣٣

Unipolar (E).

Bête sauvage (F).

Wild animal (E).

٣٠٤٠٥ - وَحْش هَكَر ، سَبَّع Bête féroce (F).

Carnivorous animal (E).

٣٠٤٠٦ - وَحْشِيَّة Férin (F).

نمت تعريفي يطلق على كل ما هو متصل بالحيوانات
الوحشية .

٣٠٤٠٧ - وَحْشِي

الوحشي الجانب الخارجى او الايمن من الرشفة ومن كل
شيء يقابله الانسى اى الجانب الداخلى او الايسر .

٣٠٤٠٨ - وَحْشَة Pustule (F).

Pustule, Pimple, Blotch (E).

هي البثرة تركب النسيج الحيواني والنباتية . ج وحش .

٣٠٤٠٩ - وَحْف

الوشت : النبات الريان من اى ففة كان .

٣٠٤١٠ - وَحْشَاء Terre noire (F). Black soil (E).

التربة السوداء وتدعى بالبيجور .

٣٠٤١١ - وَحْشَة Rocher noir (F). Black rock (E).

هي الصخرة السوداء .

٣٠٤١٢ - وَحْل Fange, Boue, Bourbe (F).

Mud, Mire, Silt (E).

مزيج من الطين وبخس المواد العضوية يرسب في المنابع
وعمل صفات مجاري الماء .

٣٠٤١٣ - وَحْن ٥ ، لُؤْس Loss

رواسب طينية رملية عادمة الاحماض تغطي بعض الارربة
في مواقع معينة . أما كلمة لوس فن وضع الامير مصطلى
الشهابي .

٣٠٤١٤ - وَحْشَوَح * Chalcopella afra (S).

Chalcopella africana (F).

طائر من الزلزل . اعطاه تيمت من افريقية الشرقية الى
البالية || جسمه صلب اللد ، يطول نحو ٢٠ سم . رأسه
الى الصهوة الرمادية . ظهره وذنبه الى السمرة الكستنة
المزاج . اذنيكه اسود . جوشته اخضر . يهت الى البياض
الافير . جناحه الى السمرة السوداء . حلقة عينه
كالقوت ، منقاده اسود . وجلاه الى الجوزة || ملجته
الحباتي جماعي . سريره يمد عشرات الازواج . يالغ
البياض وصفات مجاري الماء . قوته البزور والحروب ||
يدلن حش في الادغال الاليفة . الاثنى تضع من بيضتين
الى ثلاث بيضات تحضنها بمناوبة الذكر .

٣٠٤١٥ - وَحِيد الإزْهَرَاو Monocarpien (F).

Monocarpous (E).

نمت تعريفي يوصف به النبات الذي يزهر ويثمر مرة
واحدة .

٣٠٤١٦ - وَحِيد الأسَّاس Monobasique (F).

Monobasic (E).



وَحْش

انواعها المعروفة نحو ١٥ اعطائها تمتد من الجزيرة العربية الى اوروبا الجنوبية وافريقية الشمالية || تألف الرمال والقياني . قوتها الذباب والحمام والحشرات والديدان || اجسامها صغيرة ، نحيلة ، رشيقة ، تطوي من ١٨ الى ٢٢ سم . اقواها بلون الرمال وقد تمتاز البيئة التي تعيش فيها .

Osmia (S).

٣٠٤٤٩ - وَحَاشِ*

Osmia (F). Osmia (E).

جنس حشرات جارية من الحمويات غشائيات الاجنحة وفصيلة المشطليات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة والمنحرفة نحو الباردة || اجسامها صغيرة ، قريبة الشبه من النحل ، تطوي نحو ١٥ سم . اقواها قائمة تكثر فيها السمرة السوداء المألوف والسمرة الصفراء . قشورها كثيف الغلب اللينق الناعم اشعث اللون او اخضر || ملجئها الخياشي الخشبي . تعيش غشائياتها في جلود الاشجار النخرة وفي حيطان الخراب . قوتها رحيق الازهار واللحم وما تجتمع من عمل في تخاريبها المسدسة الاصلع . الواحدة وعشاة .

Cerceris (S).

٣٠٤٥٠ - وَحَاشِ*

Cerceris (F). Cerceris (E).

جنس حشرات قانصة وثنية ناعمة من الحمويات غشائيات الاجنحة المصورة وفصيلة الاقليات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها متوسطة القد معتدلة الحيات . اقواها ملونة يكثر فيها الاسود المخلع بالاصفر والاسود المخلع بالابيض تصغر في المواقع الرملية . اصنافها رداء فسيحة متراكبة اخلايا المحبورة المتفصلة || قوتها بعض غدييات الاجنحة انصها السوس والقرنبيات تقتنصها فتخدرها وتنقلها الى اصنافها زادا لها وليرقاتها .

Fluctuation

٣٠٤٥١ - وَخُطْ*

حالة علم الاستقرار الشوزي التي تتعرض لها الحبوب في طور استنفاها .

٣٠٤٥٢ - وَخُفْ ، وَخُفِيفْ ، نَعْمْ

Macération (F). Maceration (E).

مرث الشيء بآله لاستخلاص مواده .

Ochina (S). Ochine (F).

٣٠٤٥٣ - وَخَنَّة*

جنس حشرات غشائية من فصيلة الغفريات . انواعها قليلة جميعها صغيرة القد طويلا يراوح من ٢ الى ٤ سم . اقواها غشائية اللون يملوها تجلجج اسود || رقاتها منه تركب لحاء وشكير مختلف النباتات المتسلقة المارسة احصها للباب .

Sphaerostilbe (S).

٣٠٤٥٤ - وَخَيْشِ*

جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة المشويات . يتميز باعصانه الجاهية الانتقشاب المركزة على ونبية مدلية لاجولية . يوغها ثنائي العدد ، ثنائي الخلية ، تجتمع تكات صغية الشكل || له نوعان مؤذيان ونبش الموز ونبش مغاسي .

٣٠٤٥٥ - وَخَيْشُ الْمَوْزِ*

Sphaerostilbe musarum, Calostilbella calostilbe (S).

Unipétale (F).

Unipetalous (E).

اسم يطلق في علم النبات على كل زهرة توحيها وحيد البتلة او القعالة .

Monostylé (F).

Monostylous (E).

Monochrome

Homocentrique (F).

Homocentric (E).

Monofique,

Uniloculaire (F). Monocleous, Unilocular (E).

كل نبات تكوّن أزهاره وحيدة الشق والحمل اي أن النبتة الواحدة لا تحمل سوى أزهار جلدية واحدة أن ذكرية او أنثوية .

Univalve

٣٠٤٣٩ - وَحِيدُ الْمَصْرَاعِ
ويدهى وحيد الصام . هو ما كان ذا مصراع أو صام واحد .

Monovalent

٣٠٤٤١ - وَحِيدَاتُ الْأَجْهَرَةِ

رتبة من الرخويات مديات الابل . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة . بعضها من متسجرات الازمنة القادرة والبيض الآخر معاصر . جميعها من الرخويات الوحيدة الخيشوم والاذنية والكلية .

٣٠٤٤٢ - وَحِيدَاتُ الْأَذْيَنْ

رتبة حيوانات من الرخويات المدينة الاماميات الخياشي .

٣٠٤٤٣ - وَحِيدَاتُ الْأَصْدَافِ

Monoaplaphores (F).

شعبة من الرخويات صفيحيات الخياشي تتميز باصدافها الفردية . انواعها المعروفة قليلة العدد لا تتجاوز عشرة .

٣٠٤٤٤ - وَحِيدَاتُ الْفَصَالِ

شعبة من الرخويات صفيحيات الخياشي . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها وحيدة الفصيلة القافلة .

٣٠٤٤٥ - وَحِيدَاتُ الْمَسْلِكِ

Monotremes (F).

Monotremata (E).

رتبة من الثدييات اللاشمسيات ، تتميز اذني رتب اللبونات منها غلد الماء والتضفاس .

٣٠٤٤٦ - وَحِيدَةُ الْيَزْرَةِ

Monosperme (F).

Monospermous (E).

صفة كل نبات ثماره احادية البلية .

٣٠٤٤٧ - وَحِيدَةُ الْخِيَامِ

Monogyne (F).

Monogynous (E).

اسم تعريفي يطلق على كل زهرة وحيدة الخيام او الكريولة .

٣٠٤٤٨ - وَحِيرَةٌ

Eremias (S).

Erémie (F). Eremias (E).

جنس حيوانات بيوضة من الغطاء وفصيلة الضبايات .



وَحَاشِ



وَحَاشِ



وَحَنَة

خاصة بتحويل الذوائف واكثرها وباستنساخ الايلاع والشهوة الجنسية .

٣٠٤٦٢ - وَدَاقِي، وَدَكَان، وَدُوقِي

Rut des solipèdes (F). *Rut of the solipeds* (E).

شهوة أنثى ذات الحافر أو التسلل أو الزين الذي تطلب فيه الاناث نفوسا للسفاد .

٣٠٤٦٣ - وَدَّج

Mobile, Motif (F).

Mobile, Moving (E).

هو السبب والرسالة .

٣٠٤٦٤ - وَدَّحْ، فَاوَانِيَا، قَوْنِيَا، عَوْدَالصليب

Paeonia (S). *Pivoine, Peonie* (F). *Peony* (E). *Paeonia* (D). *Peonia* (I).

جس نياتات خشبية معمرة من فصيلة الشفاريات. أنواعه نحو ٢٠، مظهرها بري وبهشاً زريش. جلودها خضوية، لحسية، غليظة. أوراقها متخاتية. أزهارها كبيرة القد، غليظة الفصل، عديدة البتلات، لا قياسية للكرابل. أشهر أنواعه ما يلي .

٣٠٤٦٥ - وَدَّحْ جَلْدِي الْوَرَقِي

Paeonia cortices (S). *Pivoine à feuilles coriaces* (F).

نوع من الودح، ساقه خشبية جلدية اللون تملو نحو ٤٠ سم. أوراقه قليلة التفريش المتفرش، تصلها جلدي الصفحة، عابك العليا بحري السفلى. زهرته هامة الارتكاز وحيدة، تعرض من ١٠ إلى ١٢ سم. لونها ال الوردي أو الأبيض || تنوره يستمر طوال شهر حزيران.

٣٠٤٦٦ - وَدَّحْ شَاذِي

Paeonia anomala (S).

Pivoine anomala (F).

نوع من الودح الزريش، ساقه خشبية تملو نحو ٦٠ إلى ٧٠ سم. أوراقه كبيرة القد كثيرة التفريش والتفرش والعروق والشرايين. عرقها وشرايينها خلية البشرة. زهرته هامة الارتكاز وحيدة، تعرض نحو ١٠ سم. لونها ال الوردي . تنوره يستمر من أيار إلى حزيران .

٣٠٤٦٧ - وَدَّحْ شَجَرِي

Paeonia moutan (S).

Pivoine en arbre (F).

نوع من الودح الزريش، ساقه خشبية تملو نحو ١٥٠ سم. أوراقه كبيرة القد ثلاثية أو لحسية التفريش، أصلها عابك الصفحة العليا بحري السفلى. أزهارها كبيرة القد تعرض من ١٥ إلى ٢٥ سم. لونها يختلف مع الضروب، منها الأبيض والوردي والاحمر والقرنبي || تنوره يستمر من أوائل أيار إلى أواخر حزيران .

٣٠٤٦٨ - وَدَّحْ صَغِير الْوَرَقِي

Paeonia tenuifolia (S). *Pivoine à feuilles menues* (F).

نوع من الودح . أروته ركوبية . ساقه خشبية تملو نحو ٥٠ سم. أوراقه قليلة متخاتية تمتد من ١٠ إلى ١٢، جميعها صغيرة القد كثيرة التفريش والتفرش . زهرته هامة الارتكاز وحيدة، تعرض من ٨ إلى ١٠ سم. لونها ال القرنبي الباقع المايح || تنوره يستمر من أواسط أيار إلى أواسط حزيران .

٣٠٤٦٩ - وَدَّحْ صِيْنِي*، وَدَّحْ عَطِر

Paeonia albiflora (S). *Pivoine odorante, P. de Chine, P. à odeur de rose* (F).

نوع من الودح، ضروبه الزينية عطيفة . ساقه خشبية جلدية اللون تملو نحو ١٠٠ سم. أوراقه كبيرة القد

Maladie de Bonnygate du bananier (F).

نظر مجهرى يصيب الموز من جلوره الى اوراقه لميله وبعيته || يميلو على الأوراق عصاب شقيقة مستطيلة لونها الى السمرة الداكنة تملب التسج وتسبب يباسه . ويبدو على انحاء الارومة لطخ غنية لونها الى السمرة تحويها اهداب حر تحوي مشج القطر الذي ينخر التسج ويرقي انقياً من نمد الى نمد يفسده حتى القلب || وهو ال الجلور عند انتفاها بؤرة صفن تقود التسج الى الانحلال . وإذا أصراًها عند اطرافها او بعيداً عن زاوية انتفاها فهو بقمة سمراء اللون مهدية بالاحمر || يكافح بانتلاخ وطمر الموز الموبوء بعد تطهيره بالكلس الحراق وين الواجب تطهير البيش أيضاً قبل طمره .

٣٠٤٦٩ - وَعَيْشُ مُفَاجِيْ

Sphaerostilbe repens, Stilbene (S).

نظر مجهرى شديد الأذى يسبب عفن الجلور في بعض الانواع النباتية أعصها المطاط والبابية والمزلة والاهوكتاية، وقد شوهد على جلور البوم الحامض || مظهره الخارجي عفن خلي الشكل ليد التجميع لونه الى الجلوة السمراء وهو كثير المرسات الفسحة الحجم || اغزاره جسيمة لاه بيت الاجبار بعد ان يقضي على جرادة جلوريسا . يكافح بانتلاخ وحرق الاجبار الموبوءه ويتطهير مولاتها وتخفيض التربة . وين الانسب اجتناب التربة الرطبة الكثوم لانها تلام انتشار هذا الوبس .

٣٠٤٧٠ - وَدَّأ، قَدَن

Aplanir, Niveler (F).

To smooth, To level (E).

ودأ الارض أو فلها : يسط سطحها وسواه انقياً .

Alcadium (S).

Alcadium (F). *Alcadium* (E).

الوداب فطر ينمو على جلود وأقصان الاجبار اليابسة، النخرة، المطفة .

٣٠٤٧١ - وَدَّاج، وَدَّج، شَرِيَان صَبَاحِي

Carotide (F). *Carotid* (E).

شريان في العنق وما وداجان أو ودجان : شريانان غليظان حريضان عن بين ثرة العنق وسارها .

٣٠٤٧٢ - وَدَّأَسِي

Enoplotheutis (S).

Enoplotheutis (F). *Enoplotheutis* (E).

جس حيوانات بحرية مقترنة من الرخويات وأسيات الاربيل، مزدوجيات الخياشيم، مشاريات الجرايم وفصيلة الطردوسيات، أنواعه المرفوقة ستة، أعطائها معظم المناطق المعتدلة الحرارة من المحيط الهادي والمحيط الاطلسي والبحر الأبيض المتوسط || أجسامها اسطوانية متباينة الاستطالة التي تود الى النوع . اصفر الانواع وهو وداس المتوسط يطول نحو ثلاثة امتار . اما الانواع الكبيرة كوداس أقيانية فيطول نحو عشرة امتار . ووداس جزر الزانج يطول نحو ١٢ متراً || رؤوسها كبيرة وعيونها كذلك . زعانفها طرفية الارتكاز، منها قليلة الشكل ومنها «زواية» . جرابها مجسمة، متساوية الطول باستثناء الزوج القفيف فانه شديد الطول، ينتهي برسى متانية الشكل تملها الهامب الكبيرة والكلايب القترية اللادة .

Spermatopé (F).

٣٠٤٧٣ - وَدَاقِي

نعت تعريفى توصف به الاغذية الخاصة او المزموم انها



ودح صيني

Mouillage (F).
Soaking, Wetting (E).

٣٠٤٧٩ - وَدَن

٣٠٤٨٠ - وَدَن الْأَسَد

هو المسلج، نبات عشقولي من البرباريسيات .

٣٠٤٨١ - وَدَن الْفَيْل

شجيرة برية تدعى ككتولوب كينو، اطلبه .

Pousse (jeune) (F).
Shoot (young) (E).

٣٠٤٨٢ - وَدِيَة

هي التفتش جاز اقتلاعه . ج. ودي .

Ophiorhiza (S).
Ophiorhize (F).

٣٠٤٨٣ - وَدِيَة *

جنس نباتات شجيرة من فصيلة الفويات . أنواعها المعروفة نحو ٥٠ منها المحلية والموثقة والمعمرة . أعطتها بعض مناطق البلاد الحارة بعضها من نباتات شبه ماليزية وبعضها الآخر من نباتات امريكية الجنوبية || سورها متباينة الارتفاع . اوراقها متعاقبة ، معققة ، سنانية النصال . ازهارها ضبي التجميع ، محوري الارتكاز وطرفي . ازهارها مستطيلة الكؤوس خاصة البتلات ، مختلفة الألوان يكثر فيها الاصفر ثم الوردى ثم الابيض . ثمارها جراد ثنائية الخدر . بزورها سوداء اللون مكدرة تستعمل كدافئة الحمى . ومنها نوع هندي المشب يدعى ودية ترياقية (Ophiorhize mitreole) جلده ترياقية تستعمل ضد سم الافاعي .

٣٠٤٨٤ - وَدَيْس يبيض الشب من اي جلس كان .

٣٠٤٨٥ - وَدِيَشَة * Triosteum (S). Triostée (F).

جنس نباتات شجيرة معمرة من فصيلة الخناثيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد منها البرية والزرينية . سورها فراء تملو من ٣٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها متعاقبة ، سنانية النصال . ازهارها متباين الاشكال . ازهارها عديدة الألوان || اشهر انواعها الزرينية الثلاثة التالية :

٣٠٤٨٦ - وَدِيَشَة تَحَلِيَا * Triosteum Himalayanum (S).

Triostée de l'Himalaya (F).
نوع من الوديشة الزرينية . ساقها كثيرة الفروع تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقها حاشية ملتصقة الاذنات ، سنانية النصل ، تطلو من ٦ الى ١٠ سم . وتعرض من ٢ الى ٣ سم . || ازهارها سنبل التجميع . ازهارها صغيرة ، فسنتية اللون . ثمارها عنبة صفراء || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٤٨٧ - وَدِيَشَة ضَبَقَة الْوَرَقْ * Triosteum angustifolium (S).

Triostée à feuilles étroites (F).
نوع من الوديشة الزرينية . ساقها تملو من ٤٠ الى ٩٠ سم . اوراقها حاشية ، سنانية النصل ، تطلو من ٨ الى ١٤ سم . وتعرض من ٢ الى ٤ سم . ازهارها محورية الانتشاب ، فردية ، صفراء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى آب .

قليلة التفريش المستعرض . نصلها متجمع الصفحة جبل الخضار الباقي . خلي البشرة السفل . ازهارها هامى الارتكاز يمد من ٣ الى ٥ اذهار . زهرته فواحة المرفط المطري ، كبيرة القند ، يبيض اللون او مخضبة || تنوره يستمر من ايار الى اواخر حزيران .

٣٠٤٧٠ - وَدَحْ مَخْرُفِي * Paeonia officinalis (S).
Pivoine officinale, P. des jardins, Rose de Sérané, R. de Notre-Dame (F).

نوع من الودح الزرني ، ساقه عشبية جزوية اللون تملو من ٥٠ الى ٨٠ سم . اوراقه كبيرة القند ثلاثية او حاشية التفصيص ، نصلها مائل الصفحة المتصصة مزيب العروق . ازهارها كبيرة القند تعرض نحو ١٥ سم . بتلاتها مهدبة الاطراف ، لونها الى الحمرة المختلفة المبالغ || تنوره يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠٤٧١ - وَدَحْ مَرَجَانِي * Paeonia corallina (S).
Pivoine corail (F).

نوع من الودح ، ساقه عشبية جزوية اللون تملو نحو ٧٠ سم . اوراقه قليلة التفريش المستعرض ، نصلها جامد الصفحة جبل الخضر . زهرته حامية الارتكاز وسيدة ، تعرض نحو ١٥ سم . لونها كالمرجان . كرابها خلية القشور . بزورها تبرد قرونية وتقتفي عند تمام الادراك ، بالسواد اللامع . تنوره يستمر من لسان الى حزيران .

٣٠٤٧٢ - وَدَر * Trier (F). To pick (E).

نحي ما لا يلسجم مع غيره .

٣٠٤٧٣ - وَدَس * Défat (F). Flaw (E).

الصيب البين ان في الحيوان او في النبات .

٣٠٤٧٤ - وَدَعَة * Forcaline (F).

ج. ودع . الودع ، اصداق بحرية ونهرية من ذوات الصراع الواحد تكون لبعض الحيوانات الرنوة كالقواقع وغيرها . وهي صغيرة القند مختلفة الاشكال والألوان يكثر فيها الشكل الحلزوني .

٣٠٤٧٥ - وَدَعِيَّات * Cypréides (S).
Cypréides (E). Cypréidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل اهابيات الجليش المشطية . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة وبعض البلاد المعتدلة الحرارة || جميعها مفترسة ، يضيخه الاصداق الصغيرة القامة . فوياتها مستطيلة مقعرة الجوانب اليسرى . معدبة الرني المسننة الخنار الداعلي ، المنقطة الخنار الخارجي || اشهر اجناسها الودع .

٣٠٤٧٦ - وَدَف * Sperma (F). Sperm (E).

الودف والوداف هو في الحيوان .

٣٠٤٧٧ - وَدَك * Lard (F). Bacon (E).

هو اللحم الذي يتكون تحت جلده بعض الحيوانات كالخنزير مثلاً ...

٣٠٤٧٨ - وَدَك * Animaux ruminants (F).
Ruminant animals (E).

الودك ما يجتر من الحيوان الوشي ، وما لا يجتر فهو الزهم .



ودح مخرفي



ودية



وديشة

٣٠٤٨٨ - وَدَيْشَة مَثْقُوبَة الزَّرْق ٥

Triosteum perfoliatum (S).

Triostée perfoliée (F).

نوع من الوديشة الأريينية. ساقها تملو من ٩٥ الى ١٢٠ سم. اورثاتها حافضة ملتصقة الاذنيات تبسو كالشكوبية. نصالها بيضية الشكل تطول من ١٥ الى ٢٢ سم. وتعرض من ٥ الى ١٢ سم. ازهارها محورية الالتشاب؛ ضمية التجميع، صغيرة القند، ارجوانية اللون || تنويرها يستمر من ايار الى تموز.

Dépôt (F). Deposit (E).

قد يتسلم به شخص متقولا بملكه شخص آخر ليحفظه عنًا كما يحفظ ماله الخاص ويرد من طلبه صاحبه.

٣٠٤٩٠ - وَدَيْشَة مَبْدُولَة ٥

Liparis nostras (S).

Liparis commun (F).

سكة بحرية من ثنائيات الزفاف وفصيلة الشطاريات موطنها بعض بحار البلاد المحتلة اخراة || جسمها شبه وشي الشكل، ضخم المقدم، دقيق الخصر، يطول نحو ١٦ سم. سمكها اعدام السهف، نزع. رأسها مستطيل الجسم، قصير الخط، كبير الشفق. ضناها ماحتان. زعنفتها الظهرية مستطيلة قاطبة تمتد حتى قاعدة الذيلية. الشرجية تقابل الظهرية وتماثلها. زعانفها الصدرية والحوضية مندهة تاتاه الرأس عنه فكية. زعنفتها الذيلية صغيرة شبه مزاوية الشكل. ثوبها الى السمرة الخنطية الموشحة بالاسود. يطنها الى الغبرة الزرقاء المواج || عليها متوسط الصنف، ما كويل.

٣٠٤٩١ - وَدَيْشَة ٥

Odontias (S). *Odontite* (F).

جنس نباتات عشبية برية، حولية من فصيلة الخنازيريات. انواعها المعروفة قليلة العدد منها معظم مناطق البلاد المحتلة اخراة || سويها قليلة الفروع. اورثاتها متعاقبة. نصالها اهليلجية متجمعة. ازهارها صغيرة حراء اللون || تنويرها ربيعي.

٣٠٤٩٢ - وَدَيْشَة جَمَيْلَة ٥

Enidella speciosa (S).

Enidelle élégant (F).

حشرة من فصيلة الدلفاسيات وذنية متجانسات الاجنحة. جسمها صغير القند يطول من ٦ الى ٧ سم. || ثوبها الى الخنطى الاضخم المواج يطولو تدبيج في الظهران. رأسها معتدل العرض، ناضر اليافوخ الذي يبدو كالقرن. ضناها كبرتاتان. زبابانها مستطيل الفصل الاول والثانية كويله قصير. حصفها محرمة. ظهراتها كامل الحنجية. شارب، بين المروقة. روشناها غشائيات، شفافان. بطنها معتدل التبييط. الزوج الخلفي من قوائمها مجهز كسائر الدلفاسيات || مسرحها ضفاف مجاري الماء.

٣٠٤٩٣ - وَدِين ٥

Mouillable (F). *Wettable* (E).

٣٠٤٩٤ - وَدَيْشَة التَّوْب ٥

Glistochilus quadripunctatus (S).

حشرة من الوديشات، صغيرة القند بيضية الشكل، طولا براوح من ٥ الى ٦ سم. ثوبها الى السواد اللامع يطولها في كل من عمديا تربعة ونقطة برتقالية اللون، زبابانها وارجلها شقر. تفيض تحت لحاء التنوير. قوتها ما تقتصره من الكراشيات.

٣٠٤٩٥ - وَدَيْشَة التَّيَّار الجَلَّة ٥

Carpophilus hemipterus (S).

Carpophile des fruits secs (F).

حشرة من الوديشات، صغيرة القند، تطول نحو ٣ سم. عمداها لا يطيلان كامل ظهرها. ثوبها الى البني اللامع. تركيب التبار الناجمة الساطعة ثم الجافة اصعبها التين والشمش.

٣٠٤٩٦ - وَدَيْشَة السَلْجَم ٥

Meligethes viridescens (S).

Mélégthe du colza (F).

حشرة من الوديشات، صغيرة القند، طولا براوح من ٢ الى ٣ سم. ثوبها الى الخضار الازرق المواج. زبابانها وارجلها شقر. تركيب مع رقتها جميع النباتات الصليبية واصعبها السليم.

٣٠٤٩٧ - وَدَيْشَة المَلْفُوف ٥

Meligethes aeneus (S).

Mélégthe du chou (F).

حشرة من الوديشات، صغيرة القند، طولا نحو ٣ سم. ثوبها الى الخضار الزردي، زبابانها وارجلها سود. تركيب هي ورقها منظم النباتات الصليبية اصعبها الملفوف.

٣٠٤٩٨ - وَدَيْشَة حَنْطِيَّة ٥

Carpophilus dimidiatus (S).

Carpophile brune (F).

حشرة من الوديشات، صغيرة القند، تطول نحو ٣ سم. ثوبها الى الخنطى الاسمر المواج. تركيب التبار الجافة تقتصرها مع رقتها وتنسجها.

٣٠٤٩٩ - وَدَيْشَة غَبَرَة ٥

Soronia grisea (S).

Soronia grise (F).

حشرة من الوديشات، طولا براوح من ٢ الى ٥ سم. ثوبها حنطى اللون يطولو تبيج وتبيج اسمر. زبابانها وارجلها حنطية. تفيض تحت لحاء الاشجار الحرجية والمشمرة.

٣٠٥٠٠ - وَدَيْشَات ٥

Nitidulidae (S).

Nitidulidés (F).

Nitidulidae, Sap-feeding beetles, Sour bugs (E).

فصيلة حشرات من رتبة عمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القند بيضية الشكل مغاطسة. قرونها الاستثمارية صولجانية مركبة من ١١ قاصمة. ارسافها خالية او خضفة الاجزاء. تفيض على الانواع وتحت لحاء الاشجار وعلى المواد العضوية الحيوانية والنباتية الجافة.

٣٠٥٠١ - وَدَيْشَة ٥

Protoplasme (F).

Protoplasm (E).

هي البروتولازما، المادة التي تتكون منها مجموعة او علية الاجسام الحية.

٣٠٥٠٢ - وَدَيْشَة ٥

Protoplasmique (F).

Protoplasmic (E).

ما هو متعلق بالوديشة اي بالمادة الاولية المحرورة او الخليلوية.

٣٠٥٠٣ - وَدَمَاء ٥

Bréhaïne (F).

Barren (E).

الوذاء العاقر. نمت ترميفي يطلق كل اثنى عاقر من الحيوان.

٣٠٥٠٤ - وَدَمَة ٥

Edème (F).

Edema (E).

هي الابدعيا اي الاستقامة الوضعي.



وديشة مبدولة



وديشة التنوير



وديشة التبار الجافة



وديشة السليم



وديشة الملفوف



وديشة حنطية



وديشة غبراء

٣٠٥١٤ - وَرْدَةُ الصَّبَاغِينِ *

Serratula tinctoria (S). *Sarrette des teinturiers* (F). نوع من الورود، ساقها منتصبة سرحة تملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقها لا قابضة التفريص. رؤيساتها الزهرية حشوكية التجميع، كثيرة العدد، تطول من ١٥ إلى ٢٠ سم. وتعرض من ١٥ إلى ٢٠ م. أزهارها متساوية القد قرمزية اللون. قنابات قلائفها خضر الصفحات الخارجية حمر المواج. وفي نبات ضبابي يستخرج من أزهاره وصبوه ويجوده صباغ يفسد اللون مرغوب فيه || تنورها يستمر من تموز إلى تشرين الأول.

٣٠٥١٥ - وَرْدَةُ خُجَاسِيَةِ التَّفْصِيسِ

Serratula quinquefolia (S). *Sarrette à 5 folioles* (F). نوع من الورود، بجملته فروع الساق تملو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. فروعها منتصبة زهاب اللحاء. أوراقها خجاسية التفصيص. فصوصها المتقابلة سنانية الشكل صغيرة القد، قصها الأخير كبير القد مستطيل القاعدة، نصلها مائل الصفحة مسن الحافة. رؤيساتها الزهرية طرفية الارتكاز، فردية || تنورها يستمر من تموز إلى آب.

٣٠٥١٦ - وَرْدَةُ شَعَاعِيَّةِ

Serratula radicata (S). *Sarrette radica* (F). نوع من الورود، بجملته صغيرة القد فروع تملو من ٤٠ إلى ٦٠ سم. فروعها منتصبة زهاب اللحاء. أوراقها غليظة التفريص، فروعها تعد من ١٩ إلى ٢١، جميعها مسنة الحافة. رؤيساتها الزهرية طرفية الارتكاز، فردية التجميع، شعاعية التركيب والشكل. أزهارها حمر اللون قرمزية المواج. تنورها يستمر من تموز إلى آب.

٣٠٥١٧ - وَرْدَةُ عُرْطُيَّةِ

Serratula centauroides (S). *Sarrette centaurée* (F). نوع من الورود، بجملته تملو من ٨٠ إلى ١٢٠ سم. ساقها فروعاً. فروعها سرحة. أوراقها كبيرة القد عرطية الشكل، كثيرة التفصيص. نصلها مسن الحافة، أخضر الصفحة العليا المائلة، أحمر السفلى المثلثية. رؤيساتها الزهرية طرفية الارتكاز، فردية التجميع، كبيرة القد، قطرها يراوح من ٦ إلى ٧ سم. لونها إلى البياض الناصع. قنابات قلائفها حنطية اللون مهدبة الحمار || تنورها يستمر من تموز إلى ايلول.

٣٠٥١٨ - وَرْدَةُ مُتَوَجِّحَةِ

Serratula coronata (S). *Sarrette couronnée* (F). نوع من الورود، بجملته منتصبة قليلة الفروع تملو من ٥٠ إلى ١٥٠ سم. فروعها سرحة. أوراقها مفصصة لا قابضة الترتيب. نصلها مائل الصفحة، مسن الحافة. رؤيساتها الزهرية طرفية الارتكاز فردية التجميع. أزهارها قرمزية اللون، الخارجية منها أطول من الوسطى والوسطى أطول من المركزية. قنابات قلائفها زغبية البشرة حل صفحاتها الخارجية || تنورها يستمر من تموز إلى آب.

٣٠٥١٩ - وَرْدٌ هُوَ اقْطِيعُ مِنَ الطَّيْرِ .

٣٠٥٢٠ - وَرْدٌ

Lion du Guzerat (F). هو اسد الهند، اعليه .

٣٠٥٢١ - وَرْدٌ وَجَلِيٌّ

Rosa (S). *Rosier* (F). *Rose-tree*, *Rose-bush* (E). *Rose* (D). *Rosa*, *Rosajo* (I). جنس نباتات جنينة معمرة من فصيلة الورديات. انواعه

Ultra-violet

٣٠٥٢٥ - وَرْدَةُ النَّفْسَجِيَّةِ

Hérédité (F). *Heredity* (E). وَرْدَةٌ هي انتقال صفات الآباء إلى النسل وسلالاتهم إلى الحيوان والنبات تبعاً لنظام خاص يعرف بقانون الوراثة. وتعتبر الوراثة من العلوم الحديثة التي احتلت مكاناً هاماً في ديس الاحياء ويميز الفصل في لغت الانتظار إليها إلى إعانت العلامة مندل .

٣٠٥٢٧ - وَرْدَاةٌ

Bembex (S). *Bembex* (F). *Bembex* (E). جنس حشرات قاتصة وأجنحة نافذة من الحمويات غشائيات الاجنحة المحصورة وفضيلة الأتقيات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها متباينة الحجم، منها الصغيرة والوسطى والكبيرة. اثارها ملوكة بكثير فيها الاصفر المخلج بالاسود ثم الاصفر الأخضر البقيع بالاسود || جميعها تصفن في التربة. اصنافها رداء التجميع متراكبة الخلايا المسلمة السطح تغور من ٢ إلى ٧ سم. مدخلها انبوبية منحرفة نحو سطح التربة || قوتها الذباب والحوام والصغير من ذوات الجناحين تقتصها فتفخدها وتنقلها إلى اصنافها زائداً لها وليرقاتها .

٣٠٥٢٨ - وَرْدَاقِي

Fouillaison (F). *Folliation* (E). وقت خروج الورق .

٣٠٥٢٩ - وَرْدَانٌ

Uranis (S). *Uranie* (F). *Uranie* (E). جنس حشرات فراشية من حرشفيات الاجنحة وفضيلة الورديات. انواعها المعروفة قليلة العدد موطنها يمتد من تيماليس البحر الاحمر إلى بعض مناطق افريقية الشرقية وجزيرة مدغشقر || جميعها كبيرة القد، ملونة الوراثن الخلفية، جميلة الزخارف والاولوان للجهة المتدخلة || يرقاتها إلى البياض الكبيرتي المواج تملو نمشة سوداء. رؤوسها صفراء اللون أو حمر || اجسامها الحولية ثلاثة .

٣٠٥١٠ - وَرْدَانِيَّاتٌ

Uranidae (S). *Uranidae* (F). *Uranidae* (E). فصيلة حشرات فراشية من رتبة حرشفيات الاجنحة. اجسامها وانواعها المعروفة قليلة العدد، منتشرة في بعض مناطق افريقية الشرقية وجزيرة مدغشقر || جميع انواعها كبيرة القد، متراكبة الاولوان الزاهية اللامعة || اعرف اجناسها واشهرها الوران .

٣٠٥١١ - وَرْدَبٌ

الغرب : وبار الوحي .
Trou de plantation (F). وَرْدَةٌ
الوردة: الحفيرة الصغيرة المدة لانتقال الفرس .

٣٠٥١٣ - وَرْدُجٌ

Serratula (S). *Sarrette*, *Serrate*, *Serratule* (F). *Saw-wort*, *Dyer's savory* (E). *Färbescharte* (D). *Serratula*, *Sarretta*, *Serretta* (I). جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات. انواعه عديدة، معظمها بري وبعضها زراعي. أوراقها شوكية لا قابضة التفريص. رؤيساتها اسطوانية. أزهارها انبوبية. زهورها قرمزية القطب. تعيش في جميع الاراضي الزراعية والكتار بالبر. اعرف انواعه واشهرها ما يلي .



وردة النفاسين

الخضار الأزرق . أزهاره شكولي التجميع . أزهاره عادية العرف ، حراء اللون ، صغيرة القد ، قطرها يراوح من ٣ إلى ٥ سم. || تنوره يستمر من حزيران إلى آب .

٣٠٥٢٦ - وَرْد أصْفَر * ، وِعَاظ

Rosa lutea (S). *Rosier jaune* (F). *Austrian briar* (E). *Gelbe Rosa* (D). *Rosa canina lutea*, *R. c. feldia* (I).
نوع من الورد السبروتي . جنته مدادة تطلو من ٢ إلى ٤ أمتار . ساقه وفروعه متبادعة للمناخس الجالسة أو القليلة الإحديداب . أوراقه لا قياسية التركيب تتألف من ٥ أو ٧ أو ٩ وريقات . وريقاته اهليلجية الشكل . نصلها مستن الحافة بارز المروق . أزهاره صفراء اللون كريمة الرائحة ، قطرها نحو ٧ سم. || تنوره يستمر طوال شهر تموز .



ورد احمر

٣٠٥٢٧ - وَرْد البَنْسَج

Rosa Banksiae (S). *Rosier de Banks* (F).
قرع من الورد الجانح الذي يتطلب موطن خاصة ، ممرضاها الجنب . جنته تطلو من ٣ إلى ١٠ أمتار . فروعهها نحلة عادية الشوك . أوراقها خاسية أو سباعية التركيب غززية الزنمات . وريقاتها مائلة لامة . نصلها مستن الحافة خال الصلع . أزهارها ضمي التجميع . أزهارها صغيرة القد ، بنفسجية العرف ، صفراء اللون || تنوره يستمر من حزيران إلى تموز .

٣٠٥٢٨ - وَرْد الحَكْمَل ، وَرْد مَدَاد

Rosa arvensis (S). *Rosier rampant*, *R. d'Ayrshire* (F).
نوع من الورد الجانح . جنته مدادة تطلو من ٢ إلى ٤ أمتار . فروعه ذليقة مستطيلة ، مناخسها متوسطة التمديد . أوراقه ثلاثية أو خاسية أو سباعية التركيب ، وريقاتها اهليلجية سنانية ، نصلها مابن اللون ، متوسط اللعة ، خال الصلع . أزهارها متوسطة القد ، قليلة العرف ، حراء اللون أو وردية || تنوره يستمر من أيار إلى حزيران .

٣٠٥٢٩ - وَرْد الحَبَار

Bupthalma fétide (F).
هو الريد النتن ، أطلبه .

٣٠٥٣٠ - وَرْد الزَوَاي

Kecmie de Syrie (F).
هو الخطي السوري ، أطلبه .

٣٠٥٣١ - وَرْد السَّهَاء

هو اللخيس ، أطلبه .

٣٠٥٣٢ - وَرْد السَّجَاج

Rosa agrestis, *R. septium* (S). *Rosier des haies* (F).
نوع من الورد السبروتي الميادل . جنته تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم . ساقها وفروعها كثيفة للمناخس المتساوية القد ، القليلة الإحديداب . أوراقها خاسية أو سباعية التركيب ، وريقاتها ثنائية التسين ، نصلها مابن الصلعة مابن الخضار . أزهارها صغيرة القد ، يضاه اللون أو وردية ، مستحبة العرف الطري || تنوره يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٥٣٣ - وَرْد الشَّاي

Rosier thé (F).
هو ورد الهند ، أطلبه .

٣٠٥٣٤ - وَرْد الشَّمْس

هو اليبندان المستدير الورق .

المروفة زمام ٥٥ ، ضرورية وأصرامه وجهته لا تقل عن ٧٠٠٠ سقها شائكة منصبة أو مدادة ، شوكة أو مناخسها غروطية الشكل مدبية الحمة المحببة . أوراقها مركبة متبادعة . أزهارها طرية الارتكاز ، فردية أو شكولية التجميع . كوزها لا قياسية التجميع يكثر فيها التجميع . بصلات توجيحاتها لا نظامية العدد منها الرباعية الخماسية . بزوها يضيصة صغيرة خلية البشرة . وريقاتها وكثيرة العدد . أسديتها عديدة . غنودها طليقة وحيدة المساكن . بزوها يضيصة صغيرة خلية البشرة . يستمر الورد من أشهر النباتات الأزبينة وأسبها للانسان وأرقاها . يموح في جميع الأثرية القليلة الاندماج . يرغب في الخسبة ولا يصر كثيرا في الرمية . يتكاثر بالنسائل والمقل والبذور والتطعيم . يستخرج من زهر بعض أنواعه ، بالتقطير ، دهن الورد ويام الورد || أشهر أنواعه ما يتبع .

٣٠٥٢٢ - وَرْد أَبَيْشَد

Rosa sempervirens (S). *Rosier toujours vert* (F).

نوع من الورد الرنه ، جنته مدادة تطلو من ٤ إلى ٦ أمتار . فروعه سرعية مستطيلة . لواقه أبيدة ، خاسية أو سباعية التركيب . وريقاتها جلدية التصل اللامع المامد الخلل . أزهاره عطرية العرف ، كبيرة القد ، قصية التصل ، ييضاه اللون أو كشدية || تنوره يستمر من أيار إلى حزيران .

٣٠٥٢٣ - وَرْد أَبَيْشَر ، وَكَبَر

Rosa alba (S). *Rosier blanc* (F). *White rose*, *Single white rose* (E). *Weisse Rose*, *W. Gartenrose* (D). *Rosa bianca*, *R. anglica*, *R. carnicina* (I).

نوع من الورد السبروتي . جنته تملو من ٢ إلى ٤ أمتار . ساقها منصبة ، فروعه متدلية . مناخسها لا قياسية التركيب والحليم والتحصين . أوراقها سباعية التركيب . وريقاتها يضيصة الشكل ، نصلها أخضر اللون ، مابن الصلعة العليا ، خال السفل . أزهارها نوروي التجميع . أزهارها كبيرة القد ، ييضاه اللون ، مستحبة العرف || تنوره يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٥٢٤ - وَرْد أَحْمَر * ، حَوَّجَم

Rosa gallica (S). *Rosier de France*, *R. de provins*, *R. rouge* (F). *French rose*, *Common rose* (E). *Gallic Rose* (D). *Rosa domestica*, *R. incarnata*, *R. d'orto* (I).

نوع من الورد السبروتي . أصرامه وجهته كثيرة العدد . سقها وفروعها مستطيلة . مناخسها كثيفة التجميع لا قياسية الارتكاز ، حادة الحمة المحمودية . أوراقها ثلاثية أو خاسية التركيب . وريقاتها كبيرة القد مستطيلة ؛ نصلها غشش اللبس مستن الحافة . أزهارها كبيرة القد ، قطرها يراوح من ٨ إلى ١٠ سم. || تنوره يستمر من أيار إلى تموز .

٣٠٥٢٥ - وَرْد أَحْمَرُ الْوَرَق

Rosa rubrifolia (S). *Rosier à feuilles rouges* (F).

نوع من الورد السبروتي الميادل . ساقه تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم . مناخسها متساوية القد ، مبررة التجميع . فروعه غزورية اللون ، خلية اللحاء ، متبادعة المناخس الجالسة أو القليلة الإحديداب . أوراقه خاسية أو سباعية التركيب وريقاته حر الزنمات والأمن والصلوع ، نصلها مابن الصلعة ، خال الصلع الناشزة ، لونه أو



ورد اصفر

منها دهن الورد ودماء الورد. || تنوره يستمر من الربيع الى اواخر الخريف .

Rosa rugosa (S).

٣٠٥٤٣ - وَرْد حَرَشِي *

Rosier rugueux (F).

نوع من الورد السبروتي. اصراره كثيرة العدد ، ساقها منتصبه تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. مناعها متباعة ، ثنائية الترتيب ، قليلة التحسين . فروعها زياء السماء متقاربة المناسخ الاقياسية الحجم . ثنائيتن من ٣ الى ٩ وريقات نصلها وريبة التجميع ، تتألف من ٣ الى ٩ وريقات نصلها وريقات الصفحة ، باث اللون ، خلي البشرة السفلى . ازهارها فردية او ثلاثي التجميع . ازهارها حطرة متفاوتة اللد تختلف باختلاف الاصرام ، قطرها يراوح من ٦ الى ٩ سم. ثمارها كروية الشكل كبيرة اللد لكنها الى الحسة الزاعية . تنوره يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠٥٤٤ - وَرْد تَحْلِي

Rosa villosa, *R. pomifera* (S). *Rosier velouté* (F).

نوع من الورد السبروتي المبلول . جنته مدادة قطلو نحو ٤ اطار ، ساقها وفروعها متباعة المناسخ المتساوية اللد القليلة الاحدياد . اوراقها مركبة تتألف من ٧ او ٩ او ١١ وريقة ، نصلها خلي البشرة على صفحته . ازهارها عطرية العرف حمراء اللون ، قطرها يراوح من ٣ الى ٦ سم. نصلها وريقاتها حلوية البشرة || تنوره يستمر من حزيران الى آب .

٣٠٥٤٥ - وَرْد صَبِيرِ الْوَرْدِي

Rosa microphylla (S). *Rosier à petites feuilles* (F).

نوع من الورد ، ساقه منتصبه تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. فروعه عادمة الزغب ، ثنائية المناسخ المستقيمة السمره اللون . اوراقها ابيدة ، مركبة ، تتألف من ١١ او ١٣ وريقة . نصلها جامد الصفحة اخضر اللون . ازهارها وردية اللون او بيضاء ، قطرها يراوح من ٦ الى ٧ سم. || تنوره يستمر من آب الى تشرين .

Rosa persica (S).

٣٠٥٤٦ - وَرْد عَصِي

Rosier à feuilles d'épine-vinette (F).

نوع من الورد السبروتي ، بجنته تعلو نحو ٦٠ سم. ساقه وفروعها قليلة المناسخ المتباعة . اوراقه كاملة بسيطة ، نصلها مسن الحافة ، مجري اللون على صفحته ، يطول من ١٥ الى ٣٠ سم. ويرس من ٥ الى ١٥ . ازهارها طرية فردية ، لونها الى الصفار المشبع بالاحمر || تنوره يستمر طلول شهر حزيران .

٣٠٥٤٧ - وَرْد فِيرَجِيَّة

Rosa virginiana, *R. fraxinifolia*, *R. blanda* (S). *Rosier de Virginie* (F).

نوع من الورد السبروتي . هذه البلاد الامريكية . جنته تعلو من ٢ الى ٣ اطار . ساقها وفروعها جزوية السماء ، مناعها لا قياسية الحجم والترتيب والتحسين . اوراقها خاسية او سباعية الترتيب ، وريقاتها صلبة اهلجيلة الشكل ، نصلها جامد الصفحة ، متباعة التسنين ، قليل الزغب على الجهة السفلى . ازهارها كبيرة اللد حمراء اللون لا نظامية التجميع || تنوره يستمر من حزيران الى تموز .

Rosa phœnicia (S).

٣٠٥٤٨ - وَرْد فِينِيْقِي

Rosier de Phénicie (F).

نوع من الورد البري المبلول في جبال لبنان والمولوين .

Rose de Chine (F).

٣٠٥٣٥ - وَرْد الصين

هو الابجره الهندى ، اطله .

Rosa setigera (S).

٣٠٥٣٦ - وَرْد التراكى

Rosier de la prairie (F).

نوع من الورد السبروتي . جنته مدادة تعلو من ٣ الى ٩ اطار ، فروعه سريعة ، مناعه غليظة جالسة . اوراقه ثلاثية او خاسية التركيب . وريقاته اهلجيلة مسنة ، نصلها اخضر الصفحة العليا ، خلي السفلى للبراء اللون . زيمتا اوراقه ورائعها حلوية الحمار . ازهارها حشوكي التجميع . ازهارها عادمة العرف بيضاء اللون او وردية . تنوره يستمر طلول شهر تموز .

Pastel des taincuriers (F).

٣٠٥٣٧ - وَرْد النيسل

هو روضة الصباغين ، اطله .

٣٠٥٣٨ - وَرْد الهنْد، وَرْد الشاي، عُرْشِي

Rosa indica (S). *Rosier de l'Inde*, *R. thé* (F).

نوع من الورد السبروتي الشام الزراعية . اصراره وصفته كثيرة اللد . ساقه منتصبه تعلو من ٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه ثلاثية او خاسية او سباعية التركيب . وريقاته اهلجيلة مدبة ، نصلها لامع البشرة عايق الخصار . ازهارها متوسطة اللد قطرها يراوح من ٥ الى ٧ سم. لونها تختلط باختلاف الصرم والشملاج ، يكثر لونها الاصفر والبرتقال والاحمر ومشتقاتها . || تنوره يستمر طلول فصل الربيع والصيف والخريف .

Egstantier (F).

٣٠٥٣٩ - وَرْد بَرَعِي

هو السرين ، اطله .

Rosa pimpinellifolia (S).

٣٠٥٤٠ - وَرْد بِلَانِي

Rosier pimpinelle (F).

نوع من الورد السبروتي . جنته تعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. ساقها وفروعها كثيرة المناسخ والحلب . اوراقها لا قياسية التركيب تتألف من ٥ الى ٧ او ٩ وريقة . وريقاتها ثلاثية الشكل . نصلها خلي الصفحة السفلى ، فصي المراج . ازهارها صغيرة اللد قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم. لونها يختلط باختلاف الصرم منه الابيض والوردي والاصفر . تنوره يستمر من ايار الى حزيران .

Rosa gigantea (S).

٣٠٥٤١ - وَرْد جَبَلِي

Rosier géant (F).

نوع من الورد السبروتي العاشر . جنته تعلو من ١٠ الى ١٢ م. ساقه وفروعها عادمة الشوك . اوراقه خاسية او سباعية التركيب . وريقاته اهلجيلة نصلها مائل البشرة على صفحته . ازهارها كبيرة اللد قطرها يراوح من ١٠ الى ١٢ سم. لونسا الى البياض التني او الصفار الباهت . تنوره يستمر طلول شهر ايار .

٣٠٥٤٢ - وَرْد جُورِي، وَرْد بَلَدِي، وَرْد شامي

Rosa damascena (S). *Rosier de Damas*, *R. des quatre saisons* (F). *Damask rose* (E). *Damaszenrose* (D).

Rosa damaschina, *R. della quattro stagioni* (I).

نوع من الورد السبروتي المبلول . جنته تعلو من ٦٠ الى ١٨٠ سم. ساقها وفروعها كثيفة الشوك . مناعها حادة الحمة المحنجة . اوراقها خاسية او سباعية التركيب وريقاتها يضيئة الشكل ، جامدة النصل المسن الحافة . ازهارها وردية اللون ، كبيرة اللد ، فواحة العرف المعطري ، يستعطر



ورد حشر

لونها إلى الأبيض أو الوردي؛ فصلها تنتمي بزرائها ودية. تنوره يستمر من أيار إلى تموز.

٣٠٥٤ - **وَرْدٌ مَسْكِيٌّ** *
Rosa moschata (S).
Roser musqué (F). Muskatrose, Bisamrose (D). Rosa muschiata (E).

نوع من الورد. ساقه متضخمة تملو نحو ٣ أمتار، قروصها مستطيلة مثلية، أوراقها خضراء أو سباجية أو تساجية التركيب. وريقاتها بيضبة سائبة؛ فصلها مائل للصفحة العليا، خالي السفلى. أزهارها متكونة التجميع. أزهاره مسكية العرف، قطرها يراوح من ٤ إلى ٥ سم. لونها إلى الأبيض الأصفر || تنوره يستمر من تموز إلى تشرين.

٣٠٥٥ - **وَرْدٌ كَلْبِي**
Colombi-moineau (F).
جس طير من فصيلة الحماميات. أنواره قليلة البند جميعاً ربة الجسم، صغيرة الرأس، قصيرة المنق، مستدلة الجناح، مستديرة الأنيك القصير، نحلة المنقار، حاربة الرسع || أشهر أنواعه الورداني المطوق.

٣٠٥٦ - **وَرْدٌ كَانِي مَطُوقٌ**
Chamaepelia passerina (S). Colombi-moineau passarina, Pigeon de terre (F). White-throat (E).
نوع من الورداني وهو طائر متوسط القد، طوله نحو ١٨ سم. ثوبه إلى الصبغة الزرادية، رأسه وفقرته وعصفه زرق المراج. عنقه مطوق بالأبيض. جناحه أغمر الرقعة تملو وشمة سمراء صفراء المراج. قوائمه وأظفارها حمر الأطار الخارجي. بيض الداخل، حبات برتقالية اللون، منقاره وساقاه حمر. يأنف المراهي والسهول المنزوية والحدائق والبساتين. سره يحد من ١٠ إلى ١٦. قوته الحبوب والبزور على إختلافها. يهتن في الجبال والادغال. أثناء تحضن ستباً من مرتين إلى ثلاث مرات، حضنتها يهتبن.

٣٠٥٧ - **وَرْدٌ كَالِيَّاتٍ**
Blattopteroides (F).
طبقه من الحشرات تنتمي إلى شعبة البرقانيات وطائفة المنحتمات أصلاً. ونسبها الحالية ثلاث: السرانليات والطفانيات والسرانيات. أشكالها وأحجامها عديدة ومختلفة. تتميز بأصنافها المركبة التي يلب فيها الشخص.

٣٠٥٨ - **وَرْدٌ كَلْبِي**
Rosa (F).
زهرة لورد. أشكالها وأحجامها وعدد بساتنها وأوراقها وعرفها تختلف باختلاف النوع والصمم.

٣٠٥٩ - **وَرْدٌ كَالِيَّاتٍ** في كنف البساتين، أظلمها.

٣٠٥٩ - **وَرْدٌ كَالِيَّاتٍ** في لوس القليل، أظلمها.

٣٠٥٩ - **وَرْدٌ كَالِيَّاتٍ** في الحديقة، أظلمها.

٣٠٥٩ - **وَرْدٌ كَالِيَّاتٍ** في الكايل، أظلمها.

٣٠٥٩ - **وَرْدِيَّاتٍ**
Rosaceae (S).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القائلات، أنواعها المعروفة زهاء ١٠٠٠ تنتمي إلى ٧٠ جنساً جميعها عدة أسباط. نباتاتها مجموعة كاملة من الأشجار والجنات والشجيرات والأشجار. أوراقها متضخمة مختلفة الأشكال والتركيب. أزهارها نوري التجميع. أزهارها غشوة. ثمارها متباينة الأشكال والأحجام والألوان. وهي تشمل

ربط في المواقع الربطية. جنسها متضخمة حزيمة الفروع تملو من ٨٠ إلى ٢٥٠ سم. مناسخها حنطة مجتمعة مبرقة لا قياسية التجميع. أوراقها ثلاثية أو خماسية التركيب. وريقاتها أحليجية الشكل. فصلها أظلم البشرة على صفحتيه. أزهارها متكونة التجميع. أزهارها صغيرة القد. بيضاء اللون غشابة العرف || تنوره يستمر من أيار إلى آب.

٣٠٥٩ - **وَرْدٌ كَالِيَّاتٍ**
Rosa bracteata (S).
Roser bractéolée (F).

نوع من الورد الجاهل الذي يتطلب مواقع معينة معرفها الجنوب. جنسها تملو من ٣ إلى ٤ أمتار. ساقه وقروصه مزينة الزهراء، مبرقة المناسخ المبرقة. أوراقها تساجية التركيب، زعماتها مفروسة مهددة الحمار. وريقاتها أحليجية الشكل، فصلها لأص الصفحة العليا خالي السفلى الصفراء اللون. أزهاره كبيرة القد، متضخمة العرف، بيضاء اللون، مطوقة بقلادة من القباب || تنوره يستمر طوال شهر تموز.

٣٠٥٩ - **وَرْدٌ كَثِيرٌ الزَّهَرُ** *

Rosa multiflora (S). Rosier multiflora (F).
نوع من الورد البروتي للحداد. جنسها تملو من ٤ إلى ٦ أمتار. قروصه سرعية مستطيلة، أوراقها خضراء أو سباجية أو تساجية التركيب. وريقاتها أحليجية الشكل؛ فصلها مائل للصفحة العليا خالي السفلى. زعماتها مهددة التشتين المشطي. أزهارها هومي المتقوية. أزهارها متوسطة القد، كثيرة العدد، بيضاء اللون أو وردية || تنوره يستمر من أوائل حزيران إلى أواخر تموز.

٣٠٥٩ - **وَرْدٌ كَرُولِيَّاتٍ**
Rosa carolina (S).
Roser de la Caroline (F).

نوع من الورد البروتي، يربط في المواقع الربطية. جنسها متضخمة لساق تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقه وقروصه جزوية اللون، ثنائية المناسخ المبرقة. أوراقها لا قياسية التركيب منها الثلاثية والخماسية والسباجية والتساجية. وريقاتها أحليجية الشكل؛ فصلها مشاري الحافة خالي البشرة السفلى. أزهاره فردية، وردية اللون، كثيرة العدد، قطرها يراوح من ٤ إلى ٧ سم. || تنوره يستمر من تموز إلى آب.

٣٠٥٩ - **وَرْدٌ كَالِيَّاتٍ**
Rosa nitida (S).
Roser brillant (F).

نوع من الورد. جنسها صغيرة القد، ساقها تملو من ٤٠ إلى ٦٠ سم. مناسخها ثنائية، متفرقة، جاسلة الانتصاب؛ كثيرة الحلب. أوراقها لا قياسية التركيب، وردية التجميع، تتألف من ٣ إلى ٩ وريقات؛ فصلها مائل البشرة على صفحتيه، شديد الزهراء واللحم، مسن الحافة. أزهارها عادمة العرف، قطرها يراوح من ٣ إلى ٦ سم. لونها إلى الحمرة الزاهية البراقة || تنوره يستمر طوال فصل الصيف.

٣٠٥٩ - **وَرْدٌ كَالِيَّاتٍ**
Rosa laevigata (S). Rosier trifloré (F).

نوع من الورد الجاهل الذي يتطلب مواقع خاصة معرفها الجنوب. جنسها مستطيلة تملو نحو ٤ أمتار ساقها وقروصها كثيرة التشوك، طويطة المناسخ المبرقة. أوراقها ثلاثية التركيب، مغززية الزنات. وريقاتها سائبة مستطيلة المسطحة المدببة. فصلها مسن الحافة لأص البشرة النمرسة على صفحتيه. أزهارها قليلة العرف قطرها نحو ٧ سم.



ورد كبير الزهر



ورد مسكي

des bois (F). Wood pigeon, Ring-dove (E). Ringeltaube (D).

نوع من الحمام البري ، كبير الجثة ، نحوله نحو ٤ سم . رأسه وشفاه وزمكاؤه إلى الرمادي الأزرق . ظهره وجناحه إلى الرمادي الاسمر . زونه وصدره وبطنه متراكبة الألوان فيها الرمادي والرمادي والأزرق والاحمر والاشقر . جميعها سفاه للوراج || ضرابه عديدة معظمها من القواطع يحير البلاد في طلب المصيف والمشي . أوباده قليلة أعطائها البلاد الحارة . وهو يألف الاسراع والغنايات . يعيش أسرابا كبيرة العدد . قوته الثأر وألحوب واليزور . يذئن في إلتجار . يعيش ويضن من مرة إلى مرتين في السنة . ج ورشين وورشان .

Epiale de Germanie (F). وَرْدِيَّة ٣٠٥٧١
هي السطاس الجرماني ، اطلبه .

٣٠٥٧٢ - وَرَق
ورق النبات : نضر واهتر فهو وارث اي ناضر رلاف شديد الخفيرة .

Sideroxylon (S). ٣٠٥٧٣ - وَرَق
Sideroxyle, Bois de fer blanc, Bois de sable (F). Iron wood (E). Eisenbaum (D). Bumelia, Legno ferro (I).

جس نباتات حرجية وزراعية من فصيلة الطليحات . انولحه زهاء ٨٠ منها الأشجار الكبيرة الشائعة والمتوسطة القدة والصغيرة . اوراقها متعاقبة مستطيلة جلدية النصل . ازهارها ابيلة الايتكاز ، صغيرة القدة ، قصيرة الزناد ، صفراء اللون . ثمارها لوزية الشكل والقتد ، بعضها مأكول او دهي المصارة الصناعية وبعضها لا يصلح لتهي . اخشابها شديدة الصلابة ، تلبه اللون ، يدهونها غشب الحليسد الأبيض . قشورها طيبة مضادة للحميات .

Morcelet, Partager (F). ٣٠٥٧٤ - وَرَق
To parcel out, To divide (E). ورق الأرض : قسما .

Urvillea (S). ٣٠٥٧٥ - وَرْدِيَّة
Urvillea (F). Urvillea (E).
جنس نباتات عارشة ، مسمرة ، برية ورتيبية من فصيلة السابنديبات . انواعها المعروفة ثمانية ، مهدا بعض مناطق امريكا الجنوبية الحارة || سيقانها مزينة السماء ، فراء . اوراقها متعاقبة ، مركبة ، ثلاثية الوريقات الكفكية المفرقة . حوائطها مستطيلة ، متشعبة . ازهارها عنقودي التجميع ، ابلي الايتكاز . ازهارها صغيرة القدة ، رباعية البتلات المستقلة ، متباينة الألوان ، منها الابيض والاصفر والوردي والاحمر المختلط الماهات || تنويرها ربيعي او صيفي .

Papiers (F). Papers (E). ٣٠٥٧٦ - وَرَق
صانف ورقية رقيقة مصقولة تصنع من مختلف السواد النباتية ، اخشاب الخشب ، بمد تحويها إلى عجينة يمكن مدها وتقليدها وصقلها .

Effeuillage (F). ٣٠٥٧٧ - وَرَق ، مَشَق
Stripping of the leaves (E). ورق الشجرة : انزع ورقها .

أكبر مجموعة من الاشجار الزراعية المثمرة وما لا يستهان به من النباتات العطرية واليلية . اسباطها ما يتبع :

إجاصيات ، نقاصيات
Pirées, Pomacées (F).
إيكاكيات
Chrysobalanées (F).
بلاليات
Potérées (F).
جليات
Rosées (F).
دندسيات
Dryadées (F).
عراويات
Spirées (F).
عليقيات
Rubées (F).
فراويات ، فيلكيات
Fragarités, Potentillées (F).
كلجيات
Quillajées (F).
لوزيات
Amygdalées, Prunées (F).
لورديات
Neuradées (F).

٣٠٥٦٤ - وَرْدِيَّة
هي المصل ، اطلبه .

٣٠٥٦٥ - وَرْس
ورس النبات اخضر . وورس الصخرة في الماء : ركبها الخث .

٣٠٥٦٦ - وَرْس ، غُصْرُكَة
Mamecydon tinctorium (S). Mémécyle tinctorial (F). Caylon cornel tree (E). Safranbaum, Bearbaum (D). Corniolo (I).
شجرة برية وزراعية من الورسيات وفصيلة القرانيات . اوراقها متعاقبة متقابلة . نصلها سناني الشكل ، جامدة الصلابة . ازهارها ضمية التجميع محورية الايتكاز متقابلة التصفيف . اوراقها غشائية مشهورة يستخرج منها صباغ احمر اللون .

٣٠٥٦٧ - وَرْس مَشْوَا
هو القنيل ، اطلبه .

٣٠٥٦٨ - وَرْسِي
Ptilopus (S). Ptilopa (F).
طائر من الحمام الوحي شبيه بالثرفلة . موطنه يمتد من الهند إلى جزر القباية . يعتبر من الضروب التي تجرب البلاد في طلب الرقة . ملجته الحياتي جامي . جماعته متوسطة العدد . قوته الياور ويض الحشرات || جسمه متدل القند يعلو نحو ٣٢ سم . ثوبه اخضر الرأس والرداء والجانح والذنب ، صتاني الصدر المشع بالاحمر ، اصفر البطن المشع بالوردي || يذئن عه في الاشجار القليلة الارتفاع . الاقني تحضن بمناوبة الذكر من مرتين إلى ثلاث مرات في الحبل . حفنشا بيفشان . الترخيم يستمر نحو ١٣ يوما .

٣٠٥٦٩ - وَرْسِيَّات
Mémécylées (F).
سبط من فصيلة القرانيات . اجناسه وانواعه عديدة منها الاشجار والشجيرات والجنبات . جميعها من نباتات المناطق الحارة . اوراقها سنانية متعاقبة متقابلة . ازهارها مشكولية التجميع ، محورية الايتكاز ، متقابلة الترتيب ، صغيرة القدة . ثمارها عنية التكون بعضها مأكول مستحب الطعم . ومنها انواع صناعية صبغية الازراق اشهرها الورس .

٣٠٥٧٠ - وَرْشَان
Columba palumbus (S).
Colombe ramier, Grand ramier, Palombe, Pigeon



ورد



ورس



ورشان



ورد



ورقلة



ورقة

Feuille crépus
ورقة حادة ، مبدية
Feuille auriculée
ورقة حاشية
Feuille curvinervée
ورقة حذاء العروق
Feuille verticillée
ورقة حلقة
Feuille linéaire
ورقة خطية
Feuille peltée
ورقة درية
Feuille palmatinervée
ورقة درية العروق
Feuille acylclée
ورقة دوارة
Feuille lyrée
ورقة رباعية
Feuille mucronée
ورقة رهاية
Feuille pennée
ورقة ريشية
Feuille penninervée
ورقة ريشية العروق
Feuille pennatifide
ورقة ريشية غمرية
Feuille pennatifidate
ورقة ريشية مشرمة
Feuille pennatifidate
ورقة ريشية ملققة
Feuille lancéolée
ورقة سنانية
Feuille sagittée
ورقة سهمية
Feuille spinuleuse
ورقة شوكية
Feuille entière
ورقة صحيحة ، كاملة
Feuille hastée
ورقة طبرزينية
Feuille engainante
ورقة غمدية
Feuille roncinée
ورقة فارية
Feuille décurrente
ورقة نقاء
Feuille palmée
ورقة كفية
Feuille palmatinervée
ورقة كلية العروق
Feuille palmatifide
ورقة كلية غمرية
Feuille palmatifidate
ورقة كلية مشرمة
Feuille palmatifidate
ورقة كلية ملققة
Feuille sessile
ورقة لاطنة
Feuille spiralee
ورقة لولبية
Feuille connée
ورقة متصلة
Feuille alterne
ورقة متعالية
Feuille opposée
ورقة متقابلة
Feuille décussée
ورقة متقاطعة
Feuille boursofflée
ورقة متموجة
Feuille perforée
ورقة مثقوبة
Feuille dentée
ورقة مخزجة ، مسنة
Feuille subulée
ورقة مخزجية
Feuille composée
ورقة مركبة
Feuille rectinervée
ورقة مستقيمة العروق
Feuille laciniée
ورقة مشرشرة
Feuille pétiolée
ورقة متعنة
Feuille crénelée
ورقة مفرجة
Feuille séquée
ورقة ملققة
Feuille émarginée
ورقة مفوكة
Feuille tronquée
ورقة مقطوعة

Billot de banque (F).
Bank-note, Bank-bill (E).
هو من السندات التي تصدرها مصارف الإصدار وتلزم بها أن تلغ نقدًا حاملها لدى الإطلاع مبلغًا معينًا فيها .
Papier filtre (F).
Filter paper (E).
Chalcophaps (S).
Chalcophaps (F).
طائر من الصوروبات يلتصق إلى فضيلة الحاميات . ينقل مع جند من الجزيرة العربية إلى الصين واليابان . ينقل مع فضول السنة من مكان إلى مكان . ملجته الحياتي زويي الأ في زمن الرحيل . يألف الإخراج والبراري . يبدو على الأرض عطفًا ويظهر بسرعة فائقة . قوته الحبوب والبروز البرية وبعض الحشرات || جسمه معتدل القد ، طويل نحو ٤٢ سم . قوته معتدلة الشهية والريادة والكهبة ، جميعها لسفاه المطاج ، ويملو في أواخر الظهر خطان أخضران ، ذنبه معتدل الطول ، مستدير الطرف . يتقاده وقائمه راصابه إلى الصخرة الزرقية || يثنى عنه في الأشجار الرقيقة . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من مرتين إلى ثلاث مرات في العام . حضنتها يبيضتان فقط .
Chape (F).
Cope (E).
ورقة ، إصدا ، شيد
هو ما حلي به الحائط زخو .
Feuille (F). Leaf (E).
هي في النبات عضو التمثيل والتنفس والتي يستمد طاقته الفعالية من الضوء والهواء . تتتركب الورقة من ثلاثة أجزاء : النصل والعنق والقاعدة . فالنصل هو الصحيفة الخضراء التي يملوها الخشب ، يتكون هيكله من ضلع وعروق وأحصاب يمتد في وسطها وتوازيها رشاها باختلاف القصيلة والجنس والنوع . أما العنق فهو امتداد الضلع وهو صلة الوصل بين الساق والنصل أو الفرع والنصل . بين الازراق ما كانت حادة المتع وتعرف باللاطة والجالسة والحاضنة الخ ... وأما القاعدة فهي موضع اتصال العنق أو النصل بالساق أو الفروع وقد تكون هذه القاعدة ثعلولية كافي الكربة أو لاسفة الساق كما في التيجليات أو قرصية مخترقة كافي الجبل . وقد تنمو من القاعدة زوائد ورقية تدعى الاذنيات || وتنقسم الازراق إلى أيبدة أو مرورة أي دائمة الخضرة وإلى عابدة أو نافضة وهي التي تسقط في الخريف . أما أشكال الازراق وتفرعاتها لمعددة تخص منها بالذكر اسمها وهي التالية :

Feuille aciculaire
Feuille cunéiforme
Feuille oblongue
Feuille pédalée
Feuille simple
Feuille ovale
Feuille obovale
Feuille trifide
Feuille tripartite
Feuille bifide
Feuille bipartite

ورقة إبرية
ورقة إسفينية
ورقة إهليلجية
ورقة ريشية
ورقة بسيطة
ورقة يمينية
ورقة يمينية متعكسة
ورقة لولبية التفرع
ورقة لولبية التفرع
ورقة ثنائية التفرع
ورقة ثنائية التفرع

Scalique, Ischlaïque (F). **وَرَقِيٌّ** ٣٠٥٩٢ - وَرَقِيٌّ
Ischlaic (E).

Varanus (S). **وَرَقٌ** ٣٠٥٩٣ - وَرَقٌ *
Varan, Monitor (F). Warran-lizzard, Monitor (E).
جنس زحافات من فصيلة الورليات. أنواعه المروفة ٢٧.
معظمها قازب. أجسامها مستطيلة، أعناقها وغواصرها
دقيقة، أذناها لا تقارب، سنتها الطرف. قوتها الحشرات
وكل حيوان تتسكن منه. موطنها البلاد الحارة. ج. أورال
وورلان ولاني ولة || أشهر أنواعها ما يتبع.

٣٠٥٩٤ - **وَرَقٌ الْبَرِّ، وَرَقٌ الْأَرْضِي، وَرَقٌ الْجَبَلِ**
Varanus griseus (S). Varan des sables (F). Desert
warren (E).
نوع من الورل، جسمه يطول نحو ١٨٠ سم. قوته الحشرات
والحيوان. موطنه يتبع من شمال افريقية إلى مصر والجزيرة
والعراق حتى بحر قزوين والهند حتى السند.

٣٠٥٩٥ - **وَرَقٌ الْحَبَشَةِ**
Varanus ocellatus (S). **وَرَقٌ الْحَبَشَةِ**
Varan d'Ethiopia (F). Eyed warren (E).
نوع من الورل، جسمه يطول نحو ٢٠٠ سم. عيناه مركبتان
كبريتان. قوته الحشرات والحيوان. موطنه الحبشة والسودان.

٣٠٥٩٦ - **وَرَقٌ النِيلِ**
Varanus niloticus (S). **وَرَقٌ النِيلِ**
Varan du Nil (F). Nile warren (E).
نوع من الورل القازب. يستطاع تسلق الأشجار. جسمه
يطول نحو ٢٠٠ سم. قوته الحشرات والسلك والحيوان.
موطنه ضفاف النيل من متبعه إلى مصبه.

٣٠٥٩٧ - **وَرَقٌ كَبِيرٍ**
Varanus salvator (S). **وَرَقٌ كَبِيرٍ**
Varan sauvegarde (F). Salvator warren (E).
نوع من الورل القازب الكبير الجثة. يطول نحو ٢٢٠ سم.
قوته الحشرات والسلك والحيوان. موطنه ضفاف أنهر الهند
ومندسكر وأستراليا.

٣٠٥٩٨ - **وَرَقِيَّاتٌ**
Varanidae (S). **وَرَقِيَّاتٌ**
Varanidae (F). Varanidae (E).
الورليات والورلان، فصيلة زحافات من رتبة العقاليات
المشقيات الأسن. أجناسها وأنواعها عديدة، أشهرها
الورل.

٣٠٥٩٩ - **وَرَمٌ، وَرَمٌ، سَلْمَةٌ**
Tumeur (F). **وَرَمٌ، وَرَمٌ، سَلْمَةٌ**
Tumor, Swelling (E).
نمو في اللحم يرفخها ويؤذيها.

٣٠٦٠٠ - **وَرَمٌ الْخَيْصَةِ الدَّمَوِيِّ**
Hématocèle (F). **وَرَمٌ الْخَيْصَةِ الدَّمَوِيِّ**
Haematocèle (E).
يزيد يصيب الخيل من جرح أو صدمة.

٣٠٦٠١ - **وَرَمٌ دَمَوِيٌّ**
Hématome (F). **وَرَمٌ دَمَوِيٌّ**
Hematoma (E).
يحصل في الخيل من لينة أو رقة وما أشبه.

٣٠٦٠٢ - **وَرَمٌ شَحْمِيٌّ**
Lipome (F). Lipome (E). **وَرَمٌ شَحْمِيٌّ**
Lipoma (E).
يحصل في أجزاء جسم الحيوان الممرضة لضغط كالصهوة
والكتف والمثق..

٣٠٦٠٣ - **وَرَمٌ لَيْفِيٌّ، فَيَرُومٌ**
Fibrome (F). **وَرَمٌ لَيْفِيٌّ، فَيَرُومٌ**
Fibroma (E).
ورم قاس غير مؤلم يمتري الجسم حيث يوجد نسيج
ليفية.

Feuille rétuse ورقة مقنونة

Feuille caulinatre ورقة ملتصقة

Feuille amplexicaule ورقة ملتصقة

Feuille sinuée ورقة ملتحفة

Feuille spatulée ورقة ملوثة

Feuille acuménée ورقة منقنة

٣٠٥٨٣ - **وَرَقَةٌ دَائِمَةٌ، عُرُوكَةٌ، أَيْبَدَةٌ**
Feuille persistante, F. toujours verte (F). Evergreen (E).
هي الورقة التي تتمر أكثر من حول ولا تخضع لنظام
الأحيال الموسمي.

٣٠٥٨٤ - **وَرَقَةٌ عَائِلَةٌ**
Feuille caduque (F). **وَرَقَةٌ عَائِلَةٌ**
Deciduous leaf (E).
هي الورقة الموسمية التي تخضع لنظام الأحيال.

٣٠٥٨٥ - **وَرَقِيٌّ**
Foliaire (F). **وَرَقِيٌّ**
Foliar (E).
هو ما يخص بالأوراق.

٣٠٥٨٦ - **وَرَقِيٌّ**
Fouillété (F). Leafy (E).
لست تعبري بطلق على الزيات التي تكون فواصلها الأخيرة
كالأوراق المنبسطة المتراصة.

٣٠٥٨٧ - **وَرَقِيٌّ انْفِشَعْرُومٌ**
Phyllobranche (F). **وَرَقِيٌّ انْفِشَعْرُومٌ**
نمت وصفي بطلق على كل حيوان من الرغويات غياشيمه
ورقية الشكل.

٣٠٥٨٨ - **وَرَقِيَّاتٌ**
Phyllostomidae (S). **وَرَقِيَّاتٌ**
Phyllostomidae (E).
فصيلة من الخفاشيات تتميز بروسها الفمقة القصيرة،
برؤاها المنخرية الورقية المزركشة، بالثعالب التي تملو
مفاصل فرائضها، بأشراق شفاهها السفلى ولسانها الذي
يخطف مع الأجناس || قوتها الثآليل والحشرات واللحم
والدم. أناتها تقنع جرواً واحداً. ترصمه وتحمله حتى النظم.
أنواعها المروفة عديدة تقتني إلى خمسة أجناس: العلوق
والموثق والمصاص والثآليل والورقية. (اطلعيها في مواضعها).

٣٠٥٨٩ - **وَرَقِيَّاتٌ الْأَرْجُلُ**
Phyllopodes (F). **وَرَقِيَّاتٌ الْأَرْجُلُ**
مجموعة حيوانات من القشريات.

٣٠٥٩٠ - **وَرَقِيَّةٌ**
Phyllostomus (S). **وَرَقِيَّةٌ**
Phyllostome, Fer de lance (F).
جنس خفاش من فصيلة الورقيات. أنواعه ثلاثة فوارق
طيفية. أنثاها من الرمادي إلى الكستني. ظهورها أحمر
من بطونها. أجسامها صغيرة القد، طولها يراوح من ١٠ إلى
١٢ سم. أذناها صغيرة وديقة. زوائدها المنخرية سنانية
الشكل، كبيرة القد. شفاهها السفلى واضحة النقرة المائرة
للتعليق. أختار || موطنها أمريكا الجنوبية اعصها
البرازيل. تعيش منفردة، ذكورها تقرب أناتها عند
الزواج فقط. تألف الأشجار النفضة في الإخراج الكثيفة.
مسرهم في الليل. قوتها الحشرات والثآليل ويستنزف الدم
عند الصدف والجروح.

٣٠٥٩١ - **وَرَقَةٌ**
Hanche, Culotte (F). **وَرَقَةٌ**
Hip, Hook (E).
جزء من الجسم مركزة في الزاوية الخارجية من عظم الحرقفة
وهو موجود بين الحاصرة والكفعل.



ورقة



ورل

٣٠٦٤ - وَرَكَة هو الشفنين المعروف ، اطلبه .

٣٠٦٥ - وَرَهَاء وَرَهَة

نعت تعريفي يطلق على السحابة الكثيرة المطر . صاحب ورد .

٣٠٦٦ - وَرَوَار ، وَرَوَر Anser erythoropus
هو الخفسار ، جنس طير تتميز بجبال انواطها للمراكية الاخوان .
انواعه عديدة ارضها القرمزي والجليل . اطلب غصار .

٣٠٦٧ - وَرَوَار ، غُصْبِيَرَه ، غُصَار

Mérope (F). Mérope (E).
الدورار او الخفراء او الغفار ، اكبر نجم من النجوم السبعة التي تؤلف مجموعة الثريا .

٣٠٦٨ - وَرَبْنَخَة Phytoteime (F).

كل منطقة شديدة الرطوبة في الغابات الاستوائية تدعى ربيخة .

٣٠٦٩ - وَرِيد Veine, Vaisseau sanguin (F).

الاوردة جمع وريد هي الاوعية الدموية التي تميد الدم من انسجة الجسم الى القلب . تبدأ اوردة شعيرية ثم تتحد فتكون اوردة كبيرة . وهي اكثر عدداً من الشرايين واكثر منها جسماً واقع جداراً الا انها عادمة المرونة وقد تنقلص في حالة غلغها من الدم . وهي مجهزة بصمامات باطنية تمنع رجوع الدم الى الشرايين || تقسم الاوردة الى روية رئيسية . فالاوردة الرئوية وعددها اربعة ، اثنان لكل رئة ، تنقل الدم الاخر التي المنسج بالاكسجين الى الاذين الايسر . اما الاوردة الجسمية وهي التي تنقل الدم الفاسد من جميع اجزاء الجسم باستثناء الرئتين فصب في الاذين الايمن || وقد تقسم الاوردة ايضاً الى سطحية تقع تحت الجلد وطارئة تراقب الشرايين .

٣٠٦١٠ - وَرِيد وَدَاجِي Jugulaire (F).

Jugular vein (E).

٣٠٦١١ - وَرَيْف Feuillu (F).

Broadleaved tree (E).
نعت تعريفي يطلق على الاشجار الكثيفة الاوراق ، الكبيرة ، النصال ، العابلة ، من ذوات اللقطين . م . وريفة .

٣٠٦١٢ - وَرَيْق Frondiforme (F). Frondiform (E).

ما كان شكله وشيابه كالورقة .

٣٠٦١٣ - وَرَيْق Feuilla (F). Foliou (E).

كثير الاوراق .

٣٠٦١٤ - وَرَيْق جَبَكِي Dryade (F).

هو الدبيرس ، نبات شبيبي مداد ، اطلبه .

٣٠٦١٥ - وَرَيْكَة Foliole (F). Folliele, Laeflet (E).

واحدة من الورديات التي تتألف منها الورقة المركبة .

٣٠٦١٦ - وَرَ ، وَرَ Ote (F). Goose (E).

جنس طير من فصيلة الوزيات وريفة كفيثا القدم صفحيات المنائر . انواعه ١٢ جميعها برية باستثناء نوع واحد تحدرت منه السلالات الداجنة المعروفة . وهي من القواطع التي تقضي فصل الشتاء في الاصقاع المعتدلة

وتعود في اواسط الربيع الى موطنها الشمالية || احرف انواعها واشهرها ما يلي :

Anser erythoropus ورة الشرق

Anser neglectus ورة الشمال

Anser jubalis ورة الصين

Anser gambeli ورة امريكا

Anser montanus ورة جبلية

ورة وبداه ، ورة وبداه ، ورة شائعة

Anser anser, Anser sinereus

هو النوع الذي تحدرت منه السلالات الداجنة المعروفة .

Anser rubrirostris ورة سيريه

Anser albifrons ورة فراه

Anser canadensis ورة كنديّة

٣٠٦١٧ - وَرَقَطِي ، وَرَقَطِي

Bernicia (S). Bernacle, Barnache, Barnache, Oie marine (F). Barnacle-goose (E).

جنس طير مائية من فصيلة الوزيات . انواعه المعروفة خمسة ، ثلاثة منها تعيش في المناطق الباردة اوراقها تمتد من ٢٠٠ الى ٣٠٠ واثنان يعيشان في المناطق المعتدلة والحرارة وريدها يمد من ٥٠ الى ١٠٠ || جميعها من القواطع تجريب البحار وترتح من شط الى شط في طلب المصيف والمخ || احرف انواعها واشهرها ما يلي :

Bernicia à collier (F).

الوز الحلقوي

Bernicia armée (Oie d'Egypte) (F).

الوز المصري

٣٠٦١٨ - وَرَاكَة سَوْدَاة Penthimia nigra (S).

Penthimie noire (F).

حشرة من فصيلة الوزيدات وريفة متجانسات الاجنحة . جسدها صغير اللد ، بيضي الشكل يطلو نحو ٩ م . || قوتها الى السواد الفضي ، يطوها في كوتها نقتطن ارضياتنا . بطنها الى السرة السوداء || رأسها متعرج . صنادها كبيرتان . زباناها نحيلان ، قصيران . كوتها مستطيل الشكل . حقيقتها محرمة . طوارها كامل الحنجبة . لاسف ، عند السطح . وريثها غشائيان ، شفافان . قوائمها خفيفة كيفية اطلب الشائك || تألف غشاف مجاري الماء حيث يكثر الدب . قوتها التنسج تحبص من الاوراق .

٣٠٦١٩ - وَرَاكَة Acidalia (S).

Acidalie (F). Acidalla (E).

جنس فراشات صغيرة الحرم من فصيلة الاريايات وريفة حشرشيات الاجنحة . انواعها المعروفة اربعة جميعها من حشرات البلاد المعتدلة الحرارة . تألف الغابات الاحراج . مسرهما دجوي || اجيالها الحولية واحدة . تظهر الفراشات في حزيران ويحوز وريثي نحو خمسة اسابيع . تمتد الكن على الصفحات السفلى من نصال الاوراق فيظف عن يرقات صغيرة تعيش على المواد النباتية || اشهر انواعها الوركاكة المخرقة .

٣٠٦٢٠ - وَرَاكَة مَوْخَرَقَة Acidalia ornata (S).

Acidalie ornée (F).

نوع من الوركاكة . وريثها الى البياض الاخر تعلو رقعة خفيفة سمراء وراكش قاطبة لونها الى الحمرة



ورة



ورة قطبية



وركاكة مخرقة

Throschnus (S).

٣٠٦٢٧ - وَزَّان * *

Throschine (F). Throschnus (E).

جنس حشرات من فصيلة الوزانيات ورتبة غمديات الاجنحة انزواحه المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، هيأة ، تطول من ٨ الى ١٤ سم. رؤوسها صغيرة ، قليلة الفصوص ، تبدو كأنها مندرجة بالكول. عينها صغيرة ، بارزة ، تأشيرها ويلاصقها نظامية. قرونها الاستعارية خيطية ، كواسلها شبه مقببة الشكل. اغدادها لاسقة ، ضيقة المخضر. قوائمها نشطة. اثارها ملونة || تألف الغابات والخراج. الحشرة الجبلانة واشنة وعاصلة. البرقة دامتة تعيش في الجلعج النخرة وفي الاجلثة والجريل.

Throsidae (S).

٣٠٦٢٨ - وَزَّانِيَّات *

Throsidae (F). Throsidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة ، اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار بلاد العالم || اجسامها صغيرة ، شبه اهليلجية الشكل ، تطول من ٣ الى ١٥ سم. رؤوسها صغيرة. عينها بارزة. تأشيرها ويلاصقها نظامية. قرونها الاستعارية خيطية ، مركبة من ١١ فصلة. كواسلها ضيقة المقدم ، مستعرضة المخضر. اغدادها لاسقة. قوائمها نشطة. ارسافها خاسية العقل. اثارها ملونة || تألف الغابات والخراج. تعيش على الجلعج والافصان النخرة || اشهر اجناسها الزوان والدريس.

٣٠٦٢٩ - وَزَّغَة ، سَمَّاءُ بَرَّصُ ، اَبْرُ بَرَّصُ ،

Gecko (S). Gecko,

سَمَّيَّة ، مَدَّاد

Margoullat, Tarente, Tokal (F). Gecko, Tokal (E). جنس طاء من فصيلة الوزانيات. انواعه ثلاثة تتميز بصغر اجسامها. رؤوسها اسفينية الشكل، جلودها سرفة اثارها مرفوقة. جميعها من الزنقات النافذة التي تلتهم الحشرات والجرار. ج وزغ ولوزاغ ووزطان || أما انواعها الثلاثة فهي التالية :

Gecko gymnodactylus (S).

وزغة عريانة الاصبع

Gecko platydactylus (S).

وزغة عريضة الاصبع

Gecko hemidactylus (S).

وزغة فصيلة الاصبع

٣٠٦٣٠ - وَزَّغَة مُهْدَبَة *

Uroplatus fimbriatus (S).

Gecko frangé, Gecko à queue plate (F).

Fringed Gecko (E).

حيوان يبيض من العطاء وفصيلة الوزانيات قابلتها الانسان. مالمات الالسة ، رباعيات القوائم ، خاصيات الاصابع || جسمها مستطيل الشكل ، مبط الجرم بطول من ١٧ الى ٢٠ سم. رأسها مخروطي الشكل. عينها جانبيتا الارتكاز ، تلتحف اجفان شفافة ثابتة. اذناها رافعا الفشاء الصواني المكفوف ، لسانها قصير ملفوف. ظهرها متتابع التمايل. بطنها كبير الحرافش. ذنبها مبط كالحذاف. جسمها وقوائمها مهدبة الاطراف التي تلاس الاشياء. اصابعها نصفية الخطاب مجهره بلواقظ ناشطة تمسكها من السير على السطح الماسية ظهورها باتجاه الارض. ثوبها الى الصبغة الخنثوية تشها رشقة وردية مختلفة الزركاش. وثوبها يتميز بالشوكة اي انه يمان المحيط الذي يوجد فيه. بيئاته الشتوية يستمر نحو اربعة اشهر || الانثى اصغر قدماً من الذكر ولا تبيض اكثر من مرتين

القمريه || تظهر الفرائشة في اوائل حزيران ويبقى حتى اواسط او اواخر تموز .

٣٠٦٢١ - وَزَّال ، جَنْدَح ، جَمُولَق

Ulex (S). Ajonc (F). Furze, Gorse, Thorn-broom (E). Seechginster (D). Ulece (I).

جنس نباتات جنينة برية معمرة من فصيلة القترنياس الفرائشة. مهدا حوض البحر المتوسط تكثر في الاراضي الصوانية وبين الصخور. سيقانها كثيرة الفروع المنشعبة للثاقنة الاطراف. اوراقها سنائية خيطية لا يوجد لها على الفروع القديمة. اثمارها مغنرية تجرسها النمل وهي فردية التجميع ، محورية الارتكاز ، صفراء اللون. ثمارها سنيفة صغيرة القند. يزورها صلبة مبطلة || احرف انواعها واشهرها الزوال الكبير والمثلون.

٣٠٦٢٢ - وَزَّالُ الشَّرْقِي * ، بَدَسَكَّان ، مَسِت

Spartium junceum (S).

عَدَّيْجَة

Genêt jonciforme, G. d'Espagne, Spartier genêt (F). Rush broom, Spanish broom (E). Binsap-friem (D). Spazio ginestra, Ginestra di Spagna (I).

جنبة برية وزينية من فصيلة القترنياس الفرائشة. مهدا حوض البحر المتوسط تكثر في المناطق المتوسطة الارتفاع وترقب في الازربة الكلسية. ساقها فرواء غنية تملو من مترين الى حصة امتار. اوراقها بسطة مستطلة. اثمارها متفرقة التجميع ، طرفي الارتكاز. اثمارها كبيرة القند ، فواحة اللون المستعصب ، جملة الصفار الزاوي || تنورها يستمر من ايار الى ايلول.

٣٠٦٢٣ - وَزَّالُ الشَّيْخ *

Sarothamnus (S).

Sarothamnus, Genêt à balais (F).

جنس نباتات سبروتية معمرة برية وزينية من فصيلة القترنياس الفرائشة. ترقب في الازربة الرملية. انواعه قليلة المند جميعها جنات صغيرة القند تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. سيقانها فرواء ، فروعا دقيقة متعصب قليلة الورق. اوراقها صغيرة الخبز ، بسطة او مركبة ، ثلاثية الوردقات. اثمارها فردية التجميع ، كبيرة النورة ، مستحبة اللون الطري ، صفراء اللون او يفساد او ارجوانية || تنورها يستمر من ايار الى تموز .

٣٠٦٢٤ - وَزَّالُ كَبِير *

Ulex europaeus (S).

Grand ajonc, Thule, Lande (F).

نوع من الزوال المثلون. جنيته تملو من مترين الى اربعة امتار. فروعه كثيفة التجميع. اشواكه مستطيلة قوية حادة. اوراقه خيطية ميمرة على النواحي الفنية. اثمارها عطرية ، مغنرية ، كبيرة القند. صفاتها تطول نحو ٣ سم. تنوره يستمر من شباط الى حزيران.

٣٠٦٢٥ - وَزَّالُ مَدَّوْن *

Ulex nanus (S).

Ajonc nain, Landier, Liaunet (F). Dwarf-furze, Whin (E). Echter Heckensame (D). Ginestrone (I).

نوع من الزوال المثلون. جنيته تملو نحو ٧٠ سم. فروعه لينة ، اشواكه مستطيلة. اوراقها صغيرة ميمرة على النواحي الفنية الحولية. اثمارها مغنرية صغيرة القند. تنوره يستمر من تموز الى كانون الاول.

٣٠٦٢٦ - وَزَّامَة

Gynérton (F).

نبات عشبي معمّر يدعى جينيريوم ، اطلبه .



وزال الشرق



وزال الشيخ



وزال كبير



وزال مدنون



وزان



وزغة مهدبة

Beta du Centaure (F).

٣٠٦٣٨ - وَزْن

الوزن نجم من كوكبة قنطورس . تقول العرب حصار والوزن علفان ذلك لانها يملآن قبل سهيل فيحفل انها سهيل لشبه . راجع بيتا قنطورس .

Poids atomique (F).

٣٠٦٣٩ - وَزْن أَتْمِي

Atomic weight (E).

٣٠٦٤٠ - وَزْن جُزْئِي ، وَزْن ذَرْتِي

Poids moléculaire (F). Molecular weight (E).

Pesée (F). Weighing (E).

٣٠٦٤١ - وَزْنَة

Anseridae (S).

٣٠٦٤٢ - وَزَّيَّات

Anserides (F). Anseridae (E).

فصيلة الوز ، من صقسيات الشائير ورتبة كليات القدم .

Cicadella viridis (S).

٣٠٦٤٣ - وَزِيدَة *

Cicadelle verte (F).

حشرة من فصيلة الوزيديات ، طولها يراوح من ٧ إلى ٩ سم . جسمها اخضرى الفكل . زياتها خيشية . نوحا الى الخضار الاصفر اللؤلؤ . منها اصفر مابق . تكثر في الاماكن الرطبة . مرتعا يشل جمع النباتات . تظهر في اوائل حوز وتختفي في اواسط تشرين الاول .

Cicadella ornata (S). ٣٠٦٤٤ - وَزِيدَة هَرَّتِيْن *

Cicadelle ornée (F).

حشرة من فصيلة الوزيديات . جسمها صبر الله يطول من ٧ الى ٩ سم . نوحا الى الخضار الاصفر تلعو زهرقة سوداء وتبيج وتطبع . رأسها كبير ، مجرم . خطمها معتدل الطول . صمغاً كيرلان . زياتها صغران ، خيشيان . كولها اخضر اللون ، اسود الزهرقة . اسودها صغرة ، مجرمة . ظهرها كامل الخيشية ، لاحت . رشتها غشائيان ، شفالفان . قوائمها مكثفة الملب ، مقلقة الافخاذ || تائف كل مبع تكثر فيه الاصحاب . قوتها النصح .

Cicadellidae, Jassidae (S). ٣٠٦٤٥ - وَزِيدَات *

Cicadellidés, Jassidés (F). Cicadellidae, Jassidae, Leafhoppers (E). Kleinzirpen, Zwergzikaden, Kleinzikaden (D).

فصيلة حشرات من فصليات الاجنحة الخشقة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اصطنها العالم . تائف الادخال والمراعي . جميعها صغرة القد . تتميز بطنائها الشائكة الرابية الاكطار . زياتها عتد يوجدوا لا قياسية الارتكار . اخبر اجناسها الوزيد .

٣٠٦٤٦ - وَزِيرَة * ، وَزِيرَة

Zizyphus joazeiro (S). Joazeiro (F).

نوع من العناب الامريكي ، وهي شجرة شجرة من فصيلة التبنيات . مهدا البرازيل . سابقا عجرة سلفة القشور . اغصانها وانادها شائكة . اوراقها متعاقبة بيضية ، صافا جامدة الصفة عابطة الخضار . ثمرها كروية الشكل ، صغرة القد ، قطرها نحو ٣ سم . قشورها حلاوة اللون تصفر عند الادراك . صفتها رقيق الماددة التيقية اللامعة . لباب صجائها غروي الماددة اللامعة المأكولة || وهي شجرة عقدت تنابها الحبل ، لا تنشى الحر ، تعيش وتشر في الاقاليم الشحيحة الامطار .

في الحبل وتقع في كل مرة من يهتئين الى اربع يهيات تطعرا في التربة كل عقم ٥ او ٦ سم . || تائف المساكن الاطلة والخرايب والحيطان القديمة . وتتلحق الانجار . تسرح في النهار ولكنها تجتنب النور . قوتها الحشرات والتاكب والذباب والبموض وصغار المقارب ... || تعتبر من الزحافات المخذبة النافعة .

Geckonidae (S).

٣٠٦٤١ - وَزَّيَّات

Ascalabotes, Geckonidés (F). Geckonidae (E).

فصيلة حيوانات زسافة من رتبة المغاليات السمحيات الالسة . اجناسها وانواعها عديدة جميعها نافعة ، قوتها الحرام والحشرات المفيدة .

Vaseline (F).

٣٠٦٤٢ - وَزَّيْن ، هَرَّتِيْن

Vaselin (E).

دهن معلى يستخرج من النفط ويشتمل في عدة صناعات بربكات .

Urophyctes (S).

٣٠٦٤٣ - وَزَم *

جلس فلور مجهرية من فصيلة الصمغريات . انوعه المعروفة قليلة العدد ، تكاثرها لا شي . تتميز بمخاطها اللبوية المستدرة . وبها يهني الشكل يحمل هذه خيشية دقيقة مستطيلة || يتطاول كل عدة نباتات زراعية اغصانها النفل والجزر والشوذر والقصة .

Parlstorea oleae (S). ٣٠٦٤٤ - وَزَمَة الزَّيْتُون *

Parlstorea globuleuse (F).

حشرة من القرميزات تطول نحو ٢ سم . ذكورها مستطيلة الشكل طرفية السرة . اناثها بيضية عديدة الظهر منبسطة الملب جانبية السرة السمر . اما لوب الحشرة تحت منفردا فهو بنفسجي اللون ، اخر المراج ، مئعب القصصية . تركب الزيتون ويضمم الانجار الحشرة اغصانها انجار الفصيلة الوردية .

٣٠٦٤٥ - وَزَمَة التَّيْمُون *

Parlstorea pergandei (S). Parlstorea des citrus (F).

حشرة من القرميزات تركب الليمون والخرج والمشمش وبعض النباتات الزيتية كالغار والمضاص والقصور... فتفني الجلوع والاصبان والاوراق وتبدو كأنها جزء من اللحاء او البشرة اطحل اللون لغير المراج . اجسامها بيضية محدبة الظهر . اناثها تطول من ١٢ الى ١٦ سم . وتعرض من ٧ الى ١٠ سم . ذكورها دقيقة الاجسام طولها يراوح من ٧ الى ٨ سم . وعرضها نحو ٣ سم . اقواب اناثها الى الصغرة التينية . اقواب ذكورها رمادية اللون بنسجية المراج . اجيالها الحولية ثلاثة . مكثها اسطواني الشكل ، ذري الجسم اغبر اللون .

٣٠٦٤٦ - وَزَمَة التَّخِيل

في قريزة التليل ، اطها .

٣٠٦٤٧ - وَزَمَة التَّخِيل الجَرَادِيَّة * ، حَضَرَة

التَّخِيل القُطْرِيَّة

Phenolcoccus marlati, Sphaerococcus marlati (S). حشرة من القرميزات صلبة الله جوية اللون مستدرة الشكل قطرها نحو ١ سم . زيتها الشمعي الماددة يشنها بهاء يهنا . تركب قواعد جرادة التليل ملتصقة باليات الجذع هرباً من النور الذي يهنيها . اغمرها زيدة لا تستوجب المكافئة .



وزمة الزيتون



وزمة الليمون



وزمة التليل



وزمة التليل



وزيد



وزيرة

Wistaria (F). **٣٠٦٥٦ - وَسْتَارِيَة**
هي البيلة ، نبات عارض زينة ، اطلبها .

Oulstilti (F). **٣٠٦٥٧ - وَسْتِي**
هو الجبال ، من القردة الذبية ، اطلبها .

Billonner (F). To ridge (E). **٣٠٦٥٨ - وَسَد**
وسد الثرية توصيداً : اقام فيها الاكلام .

Médius (F). Middle finger (E). **٣٠٦٥٩ - وَسَطِي**
الوسطى من الاصابع ما بين السبابة والبصر .

Décortiquer (F). **٣٠٦٦٠ - وَسَف**
To decorticate (E).
قشر . اثمار المصفة هي الثار المقشورة وقد يكثر استعمال التوسيف في اللوز والصنوبر والجوز .

Palure (F). **٣٠٦٦١ - وَسَف**
Peel, Skin, Paring (E).
الوسف القشرة الخارجية التي تلحم لب بعض الثار كالجوز والقرز والطماط والبندورة ... اما قشرة الدراق والتفاح واللاجاص والخوخ الخ ، فتدعى حشا . اطلبها .

Whisky (F). Whisky (E). **٣٠٦٦٢ - وَسَكِي**
مشروب كحولي مسكر يصنع من منتخل الشعير والخمير والفيصل . تكثر صناعاته في بلاد الانكليز . يقال ان القليل منه يفيد الجسم البشري .

Ferrade (F). Branding (E). **٣٠٦٦٣ - وَسَم**
كي الحيوان بعلامة فارقة عنماً للفرقة .

Etiqueter (F). **٣٠٦٦٤ - وَسَم**
To ticket, To label (E).
وسم النبات ، وضع له سمعة من خشب أو غيره من المراد كتب عليها التعريف المميز .

Isatis (S). Pastel (F). **٣٠٦٦٥ - وَسَمَة ، وَسَمَكَة ، عَطْلِيم**
جنس نباتات عشبية محولة من فصيلة السبليبات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة . معظمها بري وبعضها صناعي وعلمي . اوراقها كاملة مستطيلة . ازهارها حامي . ازهارها صفراء اللون . ترغب في الاراضي الجصية . اشهرها وسمة الصباغين .

Isatis tinctoria (S). Pastel des teinturiers, Guède (F). Wood, Ash of Jerusalem, Dyer's weed (E). Färber wald, Wilder Indigo (D). Pastello, Giastro, Guado (I). **٣٠٦٦٦ - وَسَمَة الصَّبَاغِين * وَرْد النيل**
لوع من الوسم ، يلوحو المرق ، يزرع لاستخراج مواد الصبغة المصنوعة في اوراقه . اوراقه متعاقبة ، السفلى منها اهلبلجية ولعلها سمية . نصلها جامد الصفحة جانب الحصار || ينمو في اوائل الربيع . تنتزع اوراقه تباعاً ، عند ازدياد نضالها ، وتجفف في الظل ثم تسحق وتحضر .

Mycella stearlia (S). **٣٠٦٦٧ - وَسَيَات * شَجِيَّة عَالِيَة**
مرتبة فطور مجهرية من رتبة الزويديات . انواعها عديدة جميعها خمسة اجناس : الازويديوم ، الروديديوم ، الريزوكتريه ، السايروسيوم والمونيزيوسيس || معظمها

Gynécée (F). Gynaecium (E). **٣٠٦٦٨ - وَزَيْم**
جهاز اخية الزمرة ، يشمل المبيض والسمة والقلم . راجع منفحة .

Botte (F). Bundle, Truss (E). **٣٠٦٦٩ - وَزَيْمَكَة**
ما حزم من البقول والخن على اعطالها .

٣٠٦٦٩ - وَزَيْن
حب الخنثل المطحون .

Wasabi (F). **٣٠٦٥٠ - وَسَابِي**
نبات بقلي مشهور باسم يريوه ، اطلبها .

Palor (S). Pélor (F). **٣٠٦٥١ - وَسَاجِكَة ***
سكة من الجلاجل الشالكاكات الزمائف . اصطلحاً تحت من المحيط المندي الى البحر الاحمر . جسمها غرويبي الشكل صغير القد ، ينتهي زعنفة مستديرة مجذمة بالاسم الجلوي . زعانفها كبيرة ملونة وسنفة كاللشار . الظهيرة منها تمتد من الرأس الى الذنب . رأسها غرويبي الكمم تملوه الزواويق النافرة المستعيرة . ميتاها ناشزتان مستديرتان متقاربتان . ثوبها الى السرة المتصلة تعرضه بعض الخطوط الجلوية وهو يقيق مع اقترابه من الظهر ويبيض عند البطل .

Empodium **٣٠٦٥٢ - وَسَاكَة**

Stenopus gracilis (S). **٣٠٦٥٣ - وَسَلَن ***
Loris grêle (F). Slender loris (E).
حيوان لين وسيد الجفص والنعوج من فصيلة القيروديات . موطنه سردينيا والهند . يألف الاخراج والقباض ويتسلق الانجار بشفة . ملجته الحياتي جامي . جماعته قليلة العدد قلما يتجاوز خمسة . مسرعة دجوي يستمر من النفشة الى الفجر المبكر . قوته الجنادب والجراد وجميع انواع الحشرات والاثار السكرية والسسل والصافير الصغيرة وبعض الاعشاب وورق الاشجار || جسمه قصير صغير بطول نحو ٢٢ سم . يتنهد باستدارة الرأس وبصر الاثف ويخلو مؤخره من الذنب . عناء كبيرتان مستديرتان . اذناه صغيرتان ، مستديرتان الاطراف المرءاء الناعمة الوبر . شعره ناعم . لبد التجميع ، حريري للمس . ثوبه الى الصخرة الشهباء يملوحو ملوح ادهس في الظهر وبقي في سائر اقسام الجسم . حياء مطوئتان بالاسود . قصبة انفه ومقدم سنطه الى البياض الاخير . نحو اطراف قوائمها الى الرقبة للبرء || الاثف ثنائية الشفي ، رباحية الحلمات الصغيرة الثقيلة . مجعلها يستمر نحو سمكة اشهر تقنع في تمامه من جروين الى اربعة جراه .

Flaveria (S). Flavérie (F). **٣٠٦٥٤ - وَسَب**
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها اشباح حولية . سيقانها مسرعة اوراقها مفردة متعاقبة مائسة البشرة . ازهارها رؤسية نورية التجميع || اشهر انواعه وسب الخنش .

Flaveria contrayerba (S). Flavérie du Pérou (F). Peruvian dyers weed (E). Flaveria (D). Flaveria (I). **٣٠٦٥٥ - وَسَب الخنش ***
نوع من الوسب وهو عشبة برية طلية يقال انها تستعمل كشادة لسم الاثافي . ساقها منتصبة قراء . اوراقها مفردة ، غليظة للتشريح ، بحرية اللون . رؤسياتها الزهرية كبيرة القد . ازهارها انبوبية الشكل يضاء اللون .



وساجة



وسان



وسب الخنش



وسمة الصباغين



وسم



وسبة



رشاة



رشاة



رشاة

قصيرة ، ثلاثية الفصل . كوالها شبه اسطوانية . بطونها غروطية ، تنتهي بمرزات ذرية . كواسها وبطونها مبيّرة الملح الاصفر . رواشها باضة الغضاب ، مجلدة بالاصفر || الحشرة الجملانة واثمة اما البرقة جذات او ثائلة او خاسلة || اشهر اجناسها الوسبة .

من الفطور الزمية التي تعيش في التربة على المواد النباتية المتحللة وبعدها طفيل يعيش على النباتات المألفة فيطبل النج ويقرصها دون ان يقع بها شديد الانجر .

٣٠٦٦٨ - وسيت *Catalysor (F), Catalyser (E).*
هو للمسمال ، جسم يحدث التحليل بالمالسة .

٣٠٦٦٩ - وسيت *Remisier (F), Half-commission man (E).*
هو من يتوسط في انعقاد صفقة بين العميل والسمار او بين البائع والمشتري .

٣٠٦٧٠ - وسيتطة ، متحللة *Milieu de culture (F), Medium culture (E).*
الوسط الملائم لزراع الميكروبات والفطور .

٣٠٦٧١ - وسيتكة *Moyen (F), Plea (E).*
هي السبب او الوباء القاتل او القمعي تنب عليه الدعوى ويدل عليه امام المحكمة .

٣٠٦٧٢ - وسيم *Callista (S), Callista (F), Callista (E).*

جنس طير من فصيلة التنغريات . انواعه المروفة نحو ٩٠ جميعا من طيور امريكا الوسطى والجنوبية . تألف القنابات والحراجل التي يكثر فيها اللخل . لظاهها الحياتي جاني . اسرارها متفاوتة المدد ، تكثر فيها القلة || اجسامها صغيرة اللد وشفقة القوام ، تطول من ١٤ الى ١٧ سم . مناقيلها غروطية الشكل تنتهي بمخاطم صغيرة ذرية . اجناسها معتدلة الحجم . اذناها متوسطة اللد ، مقطوعة الاطراف . اسرارها رفيعة دقيقة . اصابعها معتدلة الحجم . اثارها حيلة الاالوان الساطعة فيها الازرق والاصفر والاصهب والالاسيد || جميعها تعيش على البلور وبعض التار المتنية || تدثر اشواشها في الادخال حل ارتفاع بعض الانقاد من سطح التربة . الاثيا تقص من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو ١٤ يوما .

٣٠٦٧٣ - وسيتكة *Palloptera (S), Palloptère (F), Palloptera (E).*

جنس حشرات من فصيلة الوسيمات وذرية ذوات الجناحين . انواعها المروفة قليلة المدد اعطائها بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، هيفاء ، شبيهة الالوان او صفراء ، تطول من ٣ الى ٤ سم . رؤوسها مذكورة . هيئتها صغيرة ، تافق عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل الدقيقة . اعطائها معتدلة الطول . ملامسها صغيرة . كواسها شبه اسطوانية بطونها غروطية تنتهي بمرزات ذرية . رؤوسها وكواسها ويطونها وافضاها مبيّرة الملح الغديق . رواشها باضة الغضاب مجلدة بالاصفر الجفوي || جميعها واثمة تألف كل مكان تكثر فيه الازهار . يرقاتها خاسلة او دامت .

٣٠٦٧٤ - وسيتيمات *Pallopteridae (S), Pallopteridés (F), Palloptérines (E).*

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها للمروفة قليلة المدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تألف المراعي والبراري والحراجل || اجسامها صغيرة هيفاء ، تطول من ٣ الى ٦ سم . رؤوسها شبه مذكورة ، هيئتها فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية

٣٠٦٧٥ - وسيتكة *Anisophylla (S), Anisophyllée (F).*

جنس اشجار وشجيرات حرجية من فصيلة القراصات . انواعها المروفة قليلة المدد منتبها بعض الاصقاع الاستوائية الاسيوية والافريقية || اشجارها كبيرة ، رفيعة ، متباعدة القروع . اورثها معتقة ، متعاقبة ، سنائية التصال . ازهارها ابطي الازكاز ، سنيلي التجميع . ازهارها صغيرة يضاء اللون او صفراء . ثمارها عتية ، بزورها عادمة الالح || اعطائها صناعية ، متوسطة الصلابة .

٣٠٦٧٦ - وشاكّة *Radiolites (S), Radiolite (F), Radiolites (E).*

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحات الحياشيم وفصيلة الرشاقيات . انواعها المروفة قليلة المدد جميعا من متحجرات الطبقة الطباشيرية || اصداها شبه غروطية الشكل ، لامتساوية المصاريم ، الملوي منها صغير اللد ، جلوني الشكل ، مسط الصفة المكفدة ، اما السفلي فخرطوي موشح .

٣٠٦٧٧ - وشاكّيات *Radiolitidae (S), Radiolitidés (F), Radiolitidae (E).*

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفيحات الحياشيم ، عادات الرؤوس . اجناسها وانواعها المروفة قليلة المدد ، جميعها من متحجرات الطبقة الطباشيرية || تتميز انواع هذه الفصيلة بالتباين القائم بين مصرعي اصداها اذ ان المصراع الايسر سطاقي الشكل في حين ان الايمن شبه غروطي || اعرف اجناسها واشهرها الرشاقة .

٣٠٦٧٨ - وشاكّة *Asticot (F), Maggot (E).*

هي دوسمة ذبابة اللحم . تركيب النج الحية فتؤذيها لانها مقومة لاحة .

٣٠٦٧٩ - وشاكّة *Exostemma (S), Exostème (F).*

جنس اشجار وجنيات برية ، طيبة ، من فصيلة الفويات . انواعها المروفة ١٢ مهدا البلاد الاستوائية || اوراقها متعاقبة ، معتقة . فصالحا يضيء الشوزن او اهليلجية او سنائية . ازهارها طرني او عمودي الازكاز ، عطي التجميع . ازهارها انبوية التريج ، يضاء اللون او وردية . ثمارها حقة ، ثنائية الخلد . تحوي العديد من البلور الصغيرة المفلطحة || اشهر انواعها الاثنان التاليان :

٣٠٦٨٠ - وشاكّة كبيرة الزهر *Exostemma grandiflora (S), Exostème à grandes fleurs (F).*

نوع من الشاكّة . منتبها فزويلا . ساقها ترتفع نحو عشرة امتار . قشورها مرة المالح دالعة للمس وسهلة المعلة .

٣٠٦٨٧ - وَشَعَّةٌ عَظِيمَةُ الزُّوْقِ

Centranthus angustifolius (S). *Centranthe* à feuilles étroites (F).

بجلة سبروتية معمرة تملو نحو ٨٠ سم. أوراقها ساقية ملتصحة ضيقة، طويلاً يراوح من ٨ إلى ١٥ سم. ويغريها من ٢ إلى ٥ سم. نصلها شريك الصفحة بحري اللون. ازهارها متفويدي التجميع. ازهارها وردية زاهية، متوسطة الدبابة || تنورها يستمر من ايار الى تموز.

٣٠٦٨٨ - وَشَعَّةٌ عَظِيمَةُ السُّوقِ

Centranthus macrostemon (S). *Centranthe* à grosses tiges, Valériane à grosses tiges (F).

شعبة سبروتية حولية عديدة الاصرام. ساقها غمية خليطة بجوفة كثيرة الفروع تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها ساقية ملتصحة لاطئة، نصلها بحري اللون. ازهارها متفويدي التجميع، فارش القمة. ازهارها وردية اللون او بيضاء او موهجة في بعض الاصرام || تنورها يستمر من سبيران الى آب.

٣٠٦٨٩ - وَشَعَّةٌ نَحِيلَةُ

Centranthus calcitrapa (S). *Centranthe* chaussetrap (F).

شعبة سبروتية حولية نحيلة الساق تملو نحو ٣٠ سم. أوراقها ساقية ملتصحة ريشية مخمرة. ازهارها عتيق التجميع، حامي الاكناز. ازهارها وردية اللون قصيرة الدبابة. تنورها يستمر من ايار الى تموز.

٣٠٦٩٠ - وَشَعِيٌّ

Fusiforme (F). *Fusiform* (E). نمت وصني يندل على الشكل المغزلي المسكوب الجسم المذهب الطرف.

٣٠٦٩١ - وَشَقِي

Lynx (F). *Lynx* (E). الشوق كوكبة نجم شمالية الموقع مركزها بين الدب الاكبر والنناز || عدد نجومها ٤٦ معظمها من المراتب الخامسة والسادسة والسابعة ونها نجم من المراتبة الرابعة مركزه في اواسط الدب.

٣٠٦٩٢ - وَشَقِي

Lynx جلس حيوانات مفترمة من فصيلة السنوريات ودية اللوام. انواعه عديدة، بعضها اصغر قلداً من الفهد، بجلة الشكل، متناسبة التكوين، قصيرة الدب غروبية الاذن، يملو طرف اذنانها جمعة من الزهر الاسود. قوتها ما استطاعت اليه سبيلا من الحيوان والطيور || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

٣٠٦٩٣ - وَشَقِي أَحْمَر

Lynx rufus (S). *Lynx* rouge (F). *Red lynx* (E). نوع من الشوق الامريكي. جسمه متوسط القد يميل نحو ٨٥ سم. وذنبه ٣٠. ثوبه امفر اللون اهره يملو توشم امسح وتوشيع اسمر.

٣٠٦٩٤ - وَشَقِي أُرُوِي *، وَشَقِي مَبْدُول

Lynx vulgaris (S). *Lynx* vulgaire, L d'Europe (F). *Common lynx*, *European lynx* (E).

نوع من الشوق، كبير القصد، شديد الاذن موطنه اوروبا. وهو كبير الجلفة طوله نحو ١٢٠ سم. وذنبه ٢٠ أما ارتفاعه فتحو ٦٥ سم. اطوار اطوار السنور، يتسلق الاشجار. قوته الطير وصغير الحيوان.

٣٠٦٩١ - وَشَاكَّةٌ كَثِيرَةُ الزُّهْرِ

Exostemma floribonda (S).

Exostemma floribonda (F).

نوع من الشاكَّة. منبتها الانتيل. ساقها ترتفع نحو خسة امتار. غواصها الطيبة كغواص الشاكَّة الكبيرة الزهر.

٣٠٦٩٢ - وَشَاكَّةٌ *

Cynogale (S). *Cynogale* (F).

حيوان وحيد الجنس والنوع من فصيلة الزباديات. موطنه جزر الترابج. يخالف البجرات ويحاري الماء. ملجته الحيائي فردي لا يجمع الذكر والانثى الا في زمن الوداق والكوم || جسمه مستطيل الشكل، صغير القد، قصير القوائم، يميل نحو ٧٥ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٥ سم. رأسه شبه غروبي الشكل، مبسط الجسم. عيناه صغيرتان لوزيتان. اذناه صغيرتان مستديرتان. مخارجه مجهز بقلق ينطلق عند الحاجة. سباله كثيف الملبس الطويل الاشر. قوته الى خلسة الاصابع. ذنبه وافر الزهر البله الجمل. ثوبه الى الكوبة السمره يمتد في الرأس والظهر ويهين في الصدر والبطن || يسبح ويغوص في الماء ويمر على الارض بسرعة ويتسلق الاشجار. قوته الاسماك والسرطان وكل ما استطاع اليه سبيلا من الطير والحيوان.

٣٠٦٩٣ - وَشَع

Fleurs des légumes (F). الرش: زهر البقول.

٣٠٦٩٤ - وَشَعُ الْمَاءِ *، وَكَيْسَتَارِيَّة

Valisneria (S). *Valisneria*, *Valisneria*, *Valisneria* (F). *El grass*, *Tape grass* (E). *Sumpfschraube* (D). *Valisneria* (I).

جنس نباتات عشبية ثدية مائية المسكن من فصيلة كلديات الماء. تعيش وتتكاثر في المياه العذبة الراكدة وفي الاحواض. أوراقها ضيقة تطول من ٣٠ إلى ٨٠ سم. ويغرس من ٦ إلى ١٢ سم. ازهارها صغيرة القد، الذكورية منها ثنائية السداة تتفصل من قاعدتها وتقلد على سطح الماء بانتظار الزهرة الانثى المركزة على زناد لولبي نابض يوسه الزهرة عند ادراكها التناسل بانحاء الودع العالم.

٣٠٦٩٥ - وَشَعَّةٌ

Centranthus (S). *Centranthe* (F). جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة النارديات. انواعها المعروفة ستة، موهدا حوض البحر المتوسط. سيقها مفرسة، أوراقها متعاقبة، ازهارها سوية اللون الاحمر او الالبيس. غواصها الطيبة لا تختلف من غواص سائر النارديات لكنها اخف منها بالاناصر العاللة || اشهر انواعها واعضاها زراعة ما يتبع.

٣٠٦٩٦ - وَشَعَّةٌ حَمْرَةٌ *، وَالْيَرِيَّانُ أَحْمَر

Centranthus ruber (S). *Centranthe* rouge, *Valériane* rouge, *Behen* rouge, *Barbe de Jupiter*, *Lilas d'Espagne* (F). *Red spur-valerian*, *Jupiter's beard*, *Fox's brush* (E). *Baldrian*, *Rota Spornblume* (D). *Valeriana* rossa, *Barba Giove* (I).

بجلة سبروتية معمرة طيبة وزيينية تملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. اصرامها الزراعية عديدة. سيقها موهدة. أوراقها بيضية ذرية، نصلها كامل الصفحة مسنن الحافة جميل انقشار يميل من ٨ إلى ١٢ سم. ويغرس من ٢ إلى ٤ سم. ازهارها متفويدي التجميع، صبراني القمة. ازهارها مظهرية الطرف، مستطيلة الدبابة، ارجوانية اللون || تنورها يستمر من ايار الى آب.



وَشَاكَّة



وَشَعُ الْمَاءِ



وَشَعَةُ حَمْرَاء



وَشَقِ أُرُوِي

٣٠٦٩٥ - وَشَقَّ الْفَقْرَ هو صفاق الأرض ، اطلقه .

٣٠٦٩٦ - وَشَقَّ الْمَنَاقِبَ * ، شَيْبَ

Lynx chaus (S). Lynx des marais (F). Chaus (E).

نوع من الشق ، طوله نحو ٦٥ سم. وذنبه ٢٢. ثوبه املح اللون الاغبر ، ابيض البطن ، اكلع العين ، اسمر المرافف . موطنه شامع الاطراف يوم الحيشة والليونة ومصر ولبنان وسورية والمراق وبلاد فارس حتى بحر قزوين .

٣٠٦٩٧ - وَشَقَّ حَيْثِي * Lynx caligatus (S). Lynx botté (F). Booted lynx (E).

نوع من الشق ، طوله نحو ٦٧ سم. وذنبه ٣٠ ، ثوبه اغبر اللون ابيض الصق اسمر الخلد . رشفة الذكر عابطة لامة وذنبه زرقاء المواج . رشفة الانثى باعثة وذنبها وردية المواج . موطنه افريقية الشرقية وبلاد فارس والهند . يكثر في الحيشة .

٣٠٦٩٨ - وَشَقَّ قَهْدِي * ، لَهْمٌ ، شُجَرٌ

Lynx pardus (S). Lynx pardé (F). Pardine lynx, Southern lynx, Spanish lynx (E).

نوع من الشق ، موطنه الشرق الاوسط وادوية الجنوبية . وهو اصغر جئة من الشق الاوروي واغبر سلفاً . ثوبه كدوب القهد لوناً ورشفة . راجع نفه .

٣٠٦٩٩ - وَشَقَّ كَنْدِي * Lynx canadensis (S). Lynx du Canada (F). Canada lynx, Peeshoo (E).

نوع من الشق الامريكي ، اصغر جئة من الاوروي واكبر من القهدي . طوله نحو ١٠٠ سم. وذنبه ٥١ ، موطنه كندا وبعض اجراج امريكا الشمالية . ثوبه املح اللون ، سطي المواج ، اسمر الرشفة . ذنبه اغبر اللون آخر المواج اسود الطرف .

٣٠٧٠٠ - وَشَلَّ Saint (F). Yolk (E).

هو لتتور او مصالة صوف الفم . راجع نص .

٣٠٧٠١ - وَشَلِّي * Ambulacraire (F). Ambulacrum (E).

الجهاز الرثلي بمجرة اقنية متشابكة تسمح بحرور الغذاء عند الشوكيات .

٣٠٧٠٢ - وَشَمَّ اول ظهور النبات على سطح التربة . ج وشوم وشام .

٣٠٧٠٣ - وَشَمِيَّة * Mastigosporium (S).

جنس فطور مجهرية من الفطريات يتميز بحجره الكيتيدية الاسطوانية ، القصيرة ، المتنامية ، الشفافة التي تعمل في اطرافها كاثاد فردية ، مردية ، وتري الانقسام الوثيري . بويضاته مستطيلة عليية ا انواعه قليلة ، اعرفها وشية النجيل وشية الترس .

٣٠٧٠٤ - وَشَمِيَّةُ التُّرْسِ * Mastigosporium lupini (S).

فطر مجهرى يركب اوراق الترس فيسبب ذبوا واحيالا الباكر || مظهره الخارجي لطخ خفيفة مستطيلة سمراء اللون ، زيتونية المواج ، تركب الاوراق فتؤذيها وتقتوحها الى التبلل والاحبال || ينشط في الموامع الظليلة الرطبة .

٣٠٧٠٥ - وَشَمِيَّةُ التَّجِيلِ * Mastigosporium calvum (S).

فطر مجهرى يصيب اكثر النجيليات البرية في اوراقها

فيصلها ويلوحها || مظهره الخارجي لطخ مستطيلة مبيثة طويلا يراوح من ١ الى ٨ سم. لونها اكل الجزيرة العائقة . تركب فصل الصف فتقترحه وتلويه || ينشط في الموامع الرطبة وتري نشاطه المواميل الجوية اللطيفة .

٣٠٧٠٦ - وَشَنَّ Eclage (F). Low-water mark (E). وشن وشن الماء : قل . زين الشين هو زين البروس اي قلة المياه النابتة او الجارية .

٣٠٧٠٧ - وَشَنَّةُ Griotte (F). Morello cherry (E). اسم شامل يطلق على مختلف ثمار غروب الكرز المرادي التي تتميز بصفرها وحوضتها .

٣٠٧٠٨ - وَشَهَ

طائر من الصقور وهو غريب من الشافين او هرق منه . كل ما قيل فيه : « طائر شبه الشافين وليس به » .

٣٠٧٠٩ - وَشَيْجٌ ، هَيْكُولِي Heliconia (S). Héliconie (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الموزيات . انواعه المعروفة ٩ ، اعطانها البلاد الاستوائية والحرارة . تزود القزوين وهي قريبة الشبه من الموز تنمو من ١٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها كبيرة القد ، نصلها اهليلجى الشكل مائل الصفحة الجامدة الزاهية الخضار . كيانها كبيرة القد تطول من ٤٠ الى ٨٠ سم. ازهارها متراكبة ، كثيرة البعد ، مختلفة الالوان البنية .

٣٠٧١٠ - وَشَيْجَمَةٌ Racine secondaire (F). Secondary root (E).

من الجذور الثانوية التي تنشعب عن الرئيسة . ج وشائج .

٣٠٧١١ - وَشَيْحٌ Palissade, Hale (F). Palissade, Hedge (E).

سياج من قصب او قضبان متشابكة وكل ما غرس او وضع حول الحديقة من الشجر والشوك والاسلاك متسا لإباحة الدخول .

٣٠٧١٢ - وَشَيْحٌ هو سنف البيت وهو ما يسقط من ورق الشجر .

ج وشائج .

٣٠٧١٣ - وَشَيْعَةٌ Funeau (F). Spindie (E).

شكل تشذيب ميكل شائع الاستعمال في بعض انواع الاجمار المشدرة . والشكل الشبي يكون عادة اوسع قاعدة من المردي واقل ارتفاعاً منه .

٣٠٧١٤ - وَشَيْعَةٌ Allantoide (F). Allantoid, Allantoic (E).

ملحق جنيني يظهر في اول الحمل ويستمر نحو ثمن يوم ثم يتلاشى .

٣٠٧١٥ - وَصَامَةٌ Pathologie (F). Pathology (E).

علم يبحث في اسباب الامراض واعراضها .

٣٠٧١٦ - وَصَامَةُ نَبَاتِيَّة Pathologie végétale (F). Vegetabile pathology (E).

علم يبحث في اسباب الامراض النباتية وعوارضها .



وشق المناق



وشق شجتي



وشق فدي



وشق كندي

Tuteur de fait وصي خاص
Tuteur légal وصي شرعي
Tuteur ad hoc وصي لعل
Cotuteur وصي مع غيره

٣٠٧٢٧ - وصية ، موصى به
Legs, Testament (F), Legacy, Will (E).
هو كل موقوف في وصية مكتوبة .

٣٠٧٢٨ - وصية عهدية ، وصية إستثنائية
Fidélcommiss (F), Fidei-commissum (E).
هي الوصية التي يشترط فيها دفع المال الموقوف الى شخص
ثان بعد مدة معينة . فالوصى له الاول يدعى للمهدى أو
المكلف والموصى له الثاني يدعى المستحق المهدي .

٣٠٧٢٩ - وصيد ٥
Athermane, Athermique (F), Athermanous (E).

نمت تعريفى يطلق على كل مادة لا تحترقها الحرارة المشعة .

٣٠٧٣٠ - وصيد
Dru (F), Thick (E).
الزراع الوصيد هو الزروع المتقارب الاصول . والزراعة
الوصيدة : المقاربة النبات .

٣٠٧٣١ - وصيدة
خطيرة من الحجارة تنشق المال بينا الخطيرة تكون من
الفضة .

٣٠٧٣٢ - وصيف
Crie des oiseaux (F), Cry of the birds (E).
صوت الصائفر . راجع صقب .

٣٠٧٣٣ - وصيف
هو كزبرة الير ، اطليا .

٣٠٧٣٤ - وصفا
Radiation nocturne, Rayonnement nocturne (F).
Nocturnal radiation, N. radiance (E).

ونهم من قال الرضاء الليلي ، هو اطلاق الحرارة التي كانت
قد تجتمعت في النهار .

٣٠٧٣٥ - وصفا
Rémanence (F), Remanence (E).
خاصة تتميز بها بعض المشاعر التي يستمر انفعالها برعة
من الزين بعد زوال السبب الباحث .

٣٠٧٣٦ - وضع ، ولادة
Mise bas, Part, Parturition (F), Parturition (E).
خروج الجنين من رحم الانثى في نهاية مدة الحمل .

٣٠٧٣٧ - وضع الحدود
Abornement, Bornage (F), Delimitation, Fixing
limits (E).
وضع علامات بين ارضين للالة على الخط الذي يفصلها .

٣٠٧٣٨ - وضع اليد
Malmise, Occupation, Possession (F), Seizure,
Possession (E).
الملك في المباح انما يثبت بالاستيلاء عليه . والاخذ هو
لستولي أو الشاغل . راجع استيلاء .

٣٠٧٣٩ - وضعية
Assiette (F), Posture, Seat (E).
هي حالة الانس التي تقوم عليها بعض الامور .

٣٠٧٤٠ - كوصية الحق
Assiette de droit (F).

٣٠٧١٧ - وصاية
Tutelle (F), Tutelage (E).
نظام قانوني لحماية القصر .

٣٠٧١٨ - وصع ، وصع ، وصعة
Troglodytes parvulus (S), Troglodytes mignon (F).
Wren (E).

صفور أيد من الجوام . جسمه صغير القد يطول نحو
١٠ سم . مقاره دقيق حاد الطرف . جناحه قصيران .
ذهبه متوسط الطول . لونه الى الزبدة السراء ولطبا تجمع
معرض اسود . يأنف الحداث والادغال والبرج والسيجات .
قوته الديدان والناكب والذباب والحوام . يدفن في الادغال
والجنيات الكثيفة . اثناء تحنن مرتان في السنة . حفتها
تراوح من ال ٨ الى ٨ بيضات وتستمر ١٣ يوما .

٣٠٧١٩ - وصعيات
Troglodytidae (S), Troglodytidae (F).

فصيلة طير من الجوام لاقتات النمل سنيات المناخير .
اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٦٠٠ صنفها يشمل معظم
مناطق القارتين القديمة والجديدة || معظم طيورها صغيرة
القد ، نحلة النمل القليلة الانطاف . قصيرة الارباع الاجنحة
والاذناب المستديرة الاطراف . دقيقة الارباع الرفيعة ||
تألف الادغال . طيراتها قصيرة الشوط كثير التصيد
والتهبط . تسرح على الارض خلف وتسلو بسرعة . قوتها
النمل والحشرات الصغيرة والذويات || اشهر اجناسها
اطلافا الوصع .

٣٠٧٢٠ - وصف ، تعريف
Signalement (F), Description (E).
تحديد اشكال الحيوان وملامحه الفارقة بعد ذكر اسمه
او رله وتحدده وملاته وعمره .

٣٠٧٢١ - وصف ، تحت
Qualification (F), Qualification, Title (E).

هو في القانون المدني تحديد طبيعة العلاقة القانونية . وهو
في القانون الجنائي تعيين وضع الجريمة في نطاق الطابع
ومميزات القانون .

٣٠٧٢٢ - وصل
Récapissé (F), Recapit (E).
محرر يدون فيه تسلم أوراق أو اشياء للاطلاع أو الحفظ .

٣٠٧٢٣ - وصم
Maledie (F), Disease (E).
الوصم هو المرض . ج . وصوم وأوصام .

٣٠٧٢٤ - وصم سكو
Mal secco
هو ستادارية الحمضيات ، اطليا .

٣٠٧٢٥ - وصيتيات ٥
Péronosporées (F), Peronosporae (E).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الصناتيات . تتميز بمشيجها
المزني الخليوي الدائلي الذي لا يخرج من دعاماته .
تكاثرها بيئي خارجي || اجناسها ستة . أربعة منها
تركب للنبات فتتغذى بحي التسنة والصنات والصنات واللفحة .
واثنان لا يؤذيان .

٣٠٧٢٦ - وصي
Tuteur (F), Guardian (E).
هو الذي صار قسوته لسهل على مصلحة القاصر وإدارة
اموكه وتقبله امام القضاء وهو قد يكون :

وصي بالوصية Tuteur testamentaire



وصة

وضعية الرهن
وضعية الضريبة
وضعية العقار

٣٠٧٤٠ - وَصَم غشة اجزاء يقطع عليها اللحم .

٣٠٧٤١ - وَصِيحِيَّ هو أرغ الجزيرة ، اطلبه .

٣٠٧٤٢ - وَطَ Cri de la chauve-souris (F).
Cry of the flittermouse (E).
هو صوت مجنحات الايدي من طوطا وخفاش وسما الخ .

٢٠٧٤٣ - وَطَار * Cereopsis (S). Céréopsis (F).
طائر وحيد الجنس والوتر من كثريات القدم وفصيلة فصيحيات المناخير || ملجته الحياتي جملي . يكثر وجوده في جزر المحيط الهادي || جسمه متوسط القد . جسمه سم البطء الصغيرة . راسه معتدل الجرم . يتميز برسابة الزند الذي ينفذ الصفحة العليا من المنقاد . عنقه معتدل الطول . جناحاه كبيران لاسفان . ذنبه قصير مقطوم الطرف || ثوبه الى الزبدة تعلوها ماجات بنفسجية وزرقاء بطنه الى البياض الاخير .

٣٠٧٤٤ - وَطَالَمَة حِرْبَاءَة

Stratiomyia chamaeleon (S).
Stratiome caméléon, Mouche armée (F).
حشرة من فصيلة البطافات . تألف المواقع الرطبة . جسمها متوسط القد ، بطول من ١٤ الى ١٦ سم . رأسها كبير الجرم ، قليل الثشور . صيهاها فارتقان . زبانها مرفقيان . صدرها كثيف الغمل . صيبتها صفراء اللون ، ثنائية المناخص الحادة . ثوبها الى الزرقاء السمره يملوها في بطنها تبيج اصفر هندسي الشكل || يرقتها دودية ، قهراء اللون ، سمره الرأس .

٣٠٧٤٥ - وَطَافِيَّات * Stratiomyidae (S).
Stratiomyidés (F). Stratiomyidae (E).

فصيلة حشرات من ذوات الجناحين قصيرات القرون . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، منتشرة في جميع اصقاع العالم || اجسامها مخبئة ، متوسطة القد او صغيرة ، شبيهة بالذباب . رؤوسها شديدة . عيونها لقياسية الارتكاز تناكها هشة لا تصلح لمس . قرونها الاستشارية متباينة الاشكال ، تكثر فيها الاستقامة ، حد فصلها يراوح من ٤ الى ٨ . صبورها ملحوة يعمل قصير ملعب اللون او فضي . صيهاها شاذكة او سرسة . قوائمها حرياطة . بطونها خاسية او سداسية السكم للواضحة . رواشها نشيطة ، شفاقة ، مطيعة الاسترسال عند الراحة || اناثها اكبر من ذكورها . يرقاتها دودية الشكل ، غبراء اللون ، فسيحة الرؤوس التي تنقبض في مقدم الجوشن . جميعها ناعمة تعيش على المواد النباتية والمضوية || اشهر اجناسها الوطافة والبرية والسمنه .

٣٠٧٤٦ - وَطَافَاة * Monotoma (S).
Monotome (F). Monotoma (E).

جلس حشرات من فصيلة البطافات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المروفة نحو ٣٠ منتشرة في بعض اصقاع البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٣ سم . رؤوسها مخروطية الشكل . عيونها

صغيرة ، ناعمة . تأثيرها وتكونها نظامية . قرونها الاستشارية دويصة الاطراف . كواسلها مستطيلة الشكل ، مسننة الحثار . اتحادها وشبية ، لا تغلف كامل البطن . اثارها رشيقة اللون ، يكثر فيها الاسمر والاصفر || جميعها دامتة تعيش على المواد النباتية المنحلة والساخرة الى الانحلال .

٣٠٧٤٧ - وَطَافِيَّات * Monotomidae (S).
Monotomidés (F). Monotomidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المروفة قليلة العدد منتشرة في بعض اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٥ سم . رؤوسها صغيرة ، مخروطية الشكل . عيونها بارزة . تأثيرها وبلاستها نظامية . قرونها الاستشارية دويصة الاطراف ، تساعية الفصل . كواسلها مسننة الحثار . اتحادها شبه مجنبة الشكل ، لا تلحف كامل البطن . قوائمها نشيطة . ارساها رباعية المقل . اثارها ملونة || جميعها دامتة . بعضها يعيش في ثرى التل اعصها التل الاكثف || اشهر اجناسها الوطافة .

٣٠٧٤٨ - وَطَافِيَّات * Mégachiroptères, Grandes chauves-souris (F).
Megachiroptères (E).

مرتبة حيوانات من مجنحات الايدي ، تشمل فصيلة البطافات والمديد من الاجناس والانواع . تتميز بأذنانها الارزدية ، بأنفها الارزغرية وبانفها ، عند وجودها ، المتركزة تحت الشفا الجلفي والقاعدة النخدية .

٣٠٧٤٩ - وَطَب هو الضرع العظيم في البقر والغنم ولماض .

٣٠٧٥٠ - وَطَبَاء الطوباء : العظيمة الضرع كذلك بقرة ولجاء او هنز وطباء .

٣٠٧٥١ - وَطَحَانِيَّات * Mucédinées (F). Mucedinase (E).

مرتبة فطور مجهرية من فصيلة الكفريات . تتميز ببوغها الشفاف او القليل اللون || اجناسها عديدة ، فوارقها مركزة على تركيب وشكل الكائنات . امرها من الرشيعة الاقتصادية الزراعية حسة : الخيون ، الدندام ، السليمة ، الكتن والكنتية .

٣٠٧٥٢ - وَطَحَانِيَّات * Mucedinaceae (S).
Mucedinacées (F). Mucedinaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من مرتبة الحفريات ورتبة الزويحات . تتميز ببوغها اللاتياشي الترتيب والتضبيب فهو ضعي التجميع او ميسر وهو عادم اللون لشفاف او مشع التضبيب الزاوي . كئالها متعددة الاشكال والالوان . اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها خس مزارات : الزيكيات والطيليات والفنتيتيات والمالموسيات والزويحات والمهويحات .

٣٠٧٥٣ - وَطَدَ Tasser (F). To compress (E).
وطد الارض شرجيا باليدلة لتصلب لاساس بناء او غيره .

٣٠٧٥٤ - وَطَافِيَّات * Monotoma (S).
Monotome (F). Monotoma (E).

٣٠٧٥٥ - وَطَن راجع بلد .



وطار



وطانة

٣٠٧٥٦ - وَطواط

Chauve-souris (F).

Bat, Fliettermouse (E).

اسم شامل عام يطلق على جميع حيوانات رتبة عجميات الالهي.

٣٠٧٥٧ - وَطواط

سمكة بحرية تسمى شفتين العمق ، اطلسا .

٣٠٧٥٨ - وَطواطيات

Pteropodidae (S).

Pteropodidae (F).

فصيلة من البطاريق . اجناسها ٨ وانواعها ١١٠ جميعها ثامرة ، كبيرة ومتوصلة القد . تتميز بقوف اذنبا البوقي الشكل . انثاها تضع جروا واحدا تحملها دائما وترضعه في انثاء طيراتها . اما اجناسها الثانية فهي : الحيتار ، الحيتون ، الرنسة ، السرجاب ، السلطوم ، الشقاسة ، اللثانة والسلسة . (اطلسا في مواضعها) .

٣٠٧٥٩ - وَطيب

Isocardia (S).

Isocarde (F).

جنس حيوانات بحرية من فصيلة البطاريق ورتبة الرخويات صفيحات الخياشيم والارجل . انواعها المعروفة طينة اصطناعها بعمار البلاد الحارة والمتعددة الحرارة . اصنفاتها شبه قلبية الشكل متعددة اللحم او خشبة ، مائنة الصفة او خافتة التخذيد النحيل يغطيها غشاء ليفي المادة دقيق . تعيش في رمال واسماك مصبات الانهر .

٣٠٧٦٠ - وَطِيتَة

Utricule (F).

Utricle (E).

تجويف كالنفرة يوجد في جدار الطلع يستوعب المادة الغضبية .

٣٠٧٦١ - وَطِيتَة

Assise du mur (F).

وطية ج ومالك : هي قواعد البنيان اي اساسه .

٣٠٧٦٢ - وَطِيتَة

حياء الاثنى من ذوات الحافر .

٣٠٧٦٣ - وَطِيتَة

Canon (F).

Shin (E).

عضو من قوائم اصيل وهو في الفرس بين الركبة والحوشب في القامتين الاماميتين ، وبين المرقوب والحوشب في القامتين الخلفيتين .

٣٠٧٦٤ - وَهَاء

Vaisseau (F).

Duct (E).

هو الانبوب الكائن في نسج النباتات الزهرية ، وهو يقع على اشكال غضلة اشبهها بالخزوني والشكي والمغط .

وهاء حلزوني

Vaisseau spiralé (F).

Spirally duct (E).

وهاء شبكي

Vaisseau réticulé (F).

Reticulated duct (E).

وهاء منقط

Vaisseau ponctué (F).

Punctuated duct (E).

٣٠٧٦٥ - وَهَات

Melyris (S).

Mélyris (F).

Melyris (E).

جنس حشرات من فصيلة الوعائيات ورتبة غديات الاجنحة اقواسه المعروفة نحو ٣٠ اصطناعها منطقت حوض البحر الابيض المتوسط . اجناسها شبه اهليلجية الشكل ، متعددة الاسديباب ، طولها من ٨ الى ١٦ م . رؤوسها مستترضة ، قليلة التشوؤ . عينها صغيرة ، بارزة .



وطيب



وهات

تأشيرها وملاسها نظامية . قرونها الاستشعارية قلادية . كواسلها مقببة الشكل . احادها لاسفة ، ثنائية الفلوع الناشرة القاطية . قوائمها نشيطة . اثنائها ملونة تكثر فيها الحوة والصحة . جميعها واثمة ومفترسة تعيش على رحيق الازهار وما تقتنصه من صغار الحشرات . يرقاتها مفترسة .

٣٠٧٦٦ - وَهَاتِيَات

Melyridae (S).

Mélyridés (F).

Melyridae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد . اصطناعها بعض مناطق افريقية الشالية وحوض البحر الابيض المتوسط . اجناسها شبه اهليلجية الشكل ، طولها من ٩ الى ١٨ م . رؤوسها مستترضة ، قليلة التشوؤ . عينها صغيرة ، بارزة . تأشيرها وملاسها نظامية . قرونها الاستشعارية قلادية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها مقببة . احادها لاسفة ، ثنائية الفلوع القاطية ، قليلة الرخافة ، معدلة الصلاة . قوائمها نشيطة . ارسافها خماسية المعقل . اثنائها ملونة . جميعها واثمة ومفترسة ، تعيش على رحيق الازهار وما تقتنصه من صغار الحشرات . يرقاتها مفترسة . اشهر اجناسها الوعائات .

٣٠٧٦٧ - وَهَات

Rosier jaune (F).

هو الورد الاصفر ، اطلسه .

٣٠٧٦٨ - وَهَاتِيَات البُلُور

Angiospermes (F).

Angiospermes (E).

وعائيات البلور او مستورات البلور او النباتات مغطاة البلور هي احد قسمي باديات الزهر . وهذا القسم يشمل النباتات التي تكون بيضها في مبيض وزرعتها في ثمرة .

٣٠٧٦٩ - وَهَاتِيَة

Vascularisation (F).

تغير فيزيولوجي ، راجع قسوتية .

٣٠٧٧٠ - وَهَب

Terrain plat et vase (F).

الموضع الواسع المنحدر من الارض ، ج وهاب .

٣٠٧٧١ - وَهَتْ

Epiphytie (F).

Epiphyty (E).

وهوت النبات : عللها واوساعها في منطقة معينة .

٣٠٧٧٢ - وَهَنَة

Coleosporium (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الوعائيات يتميز بانثاده التراكيب المتشابهة وبدعاماته الاسطوانية المسطيلة الدقيقة القاعدة . انواعها قليلة تنطغل على نباتات الفصيلة السنورية فتركب الاهداب وتؤذيها . مظهرها الخارجي بطور مستدرة مبرزة منقطة لونها الى الخمرية يفسحها اطار بنفسجي ، تثبت على النصل نحو السنة ثم تنطو بعد ذلك الى سويصلات مفلطحة القاعدة العريضة ، مستدرة القمة ، طولها من ١ الى ٢ م . لونها الى البياض التي يرشح منها عند اكمال دورها الفطري وبعد انتجها نقطة من الراتنج . اضرارها زهيدة لا تستوجب المكافحة .

٣٠٧٧٣ - وَهَاتِيَات

Coleosporiaceae (S).

Coléosporiacées (F).

Coleosporiaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة العداميات ، تتميز بركباتها التي تحضن العداميات ، دعائتها عمودية الانغلاق ، رباعية الانحية ، شمعية الانقسام ، غليظة الجراب البوقي . اجناسها قليلة ، اعرفها الوهة والسبع .



وعف التين



وعف المرى المبط



وعف المرى الهاري



وعف أروبة

٣٠٧٨٣ - وَعَفَ الْمُرَى الْهَارِي*

Dactylopius adonidum (S). Pou blanc des serres (F).
حشرة صغيرة من القرمزيات. غبارية الشكل، صفراء اللون، مركزية السرة، غبار الترس الشمعي. تركيب نباتات المساري وتفتك بها.

٣٠٧٨٤ - وَعَفَ صَيْتِي

هو قمرزية فورديزا، اطاليا.

٣٠٧٨٥ - وَعَفَ مَعَارِي

هو قمرزية النضاح، اطاليا.

٣٠٧٨٦ - وَعَل ، وَعَل ، تَيْسَ الْجَيْل

Bouquetin (F). *Steinbok* (E).
جنس حيوان بري جبلي يجتر من فصيلة التنيات. قريب الشبه من المعز التي تحدث منه. أنواعه عديدة، جميعها وبما الجفة، كبيرة القرون اللطيفة المشبعة القوية. الأنثى ثنائية الاختلاف تضع جدياً واحداً في أواسط حزيران يتبع له اسم بعد الوضع بثلاث أو أربع ساعات || اعرف أنواعه وأشهرها : أوبل والبدن والتيليل والماعوس والمزعز. ج اوصال ووصول.

٣٠٧٨٧ - وَعَلْ أُرُوبَة * ، وَعَلْ الْأَب

Capra ibex (S). *Bouquetin des Alpes* (F). *Steinbok of the Alps* (E).

نوع من الوعل. موطنه جبال الالب. جسمه ربع الجفة مسطوب القالب يطول ١٥٠ سم. يعول نحو ١٠٠ وزن ٧٥ الى ١٠٠ كيلو. ثوبه سوي اللون يغط مع الصبر ربع فضلي الصيف والشتاء. وهو يراوح بين الشبهة الصنابية والصمرة. خط ثيبه اكهب اللون. ابطاءه وبطنه اصفر من ظهره. قرناه ضليخان متحنيان كسليين احديين. الاثنى اصفر قرناً من الذكر.

٣٠٧٨٨ - وَعَلْ الْقَفْقَاس ، قُرْ

Capra cylindricornis (S). *Bouquetin du Caucase, B. à cornes cylindriques, Tur* (F).

نوع من الوعل قريب الشبه من الغنم. موطنه جبال القفقاس. طولك يراوح من ٦٥ الى ٩٥ سم. رادقاه كذلك. قرنه يطول نحو ٦٠ سم. وهو يشبه قرن الكبش شكلاً وانسلاطاً. ثوبه الى الكهبة، لحته قليلة الشعر سواد اللون. إجله يمد من ٩ الى ١٠ ازواج.

٣٠٧٨٩ - وَعَلْ حَبْتِي

Capra wail (S). *Bouquetin d'Aysalnie* (F).
نوع من الوعل. موطنه جبال بلاد الجوفة من ارتفاع ٢٠٠٠ الى ٤٠٠٠ م. وهو صئير الجفة احسن القرن مخدب الجبهة. إجله يمد من ٧ الى ١٥ زوجاً.

٣٠٧٩٠ - وَعَلْ سَيْبِرِيَّة

Capra sibirica (S). *Bouquetin de Sibirie* (F).
نوع من الوعل. موطنه شاسع الاطراف يمتد من حلايا الى شرقي سيبيريا. جسمه كبير القند قدر الوعل الاروبي الا انه افتح ثوباً وهو كهيئة اللحية مستطيل القرن. إجله يمد من ١٢ الى ٢٠ زوجاً.

٣٠٧٩١ - وَعَلْ عَرَكِي

ويسمى ايضاً وعل التوبة، هو البدن، اطاليا.

٣٠٧٩٢ - وَعَلْ قَارِصِي

هو البزل، اطاليا.

٣٠٧٧٤ - وَعَسَّس

Dryandra (S). *Dryandre* (F).
جنس جنات ابيدة معمرة من فصيلة الغضيات. اوراقها لا نفاجية الترتيب منها المتعاقبة والقصية والمبشرة. ازهارها روئسية الجميع تغضها قاذفة من القلاب القروطي الشكل. اعرف انواعه وأشهرها ما يتبع.

٣٠٧٧٥ - وَعَسَّس لَنْجِي

Dryandra nives (S). *Dryandre blanc de neige* (F).
نوع من الوص، جنيته تملو نحو ١٥٠ سم. اورتوبيا مادة. فروصها قصيرة عقداة. اوراقها مغمصة، نصلها يطول من ١٠ الى ٢٠ سم. مسفته السفل خلية البشرة فضية اللون. رؤسائها الزهرية بيضية الشكل. ازهارها يفضاء اللون. قناباتها خلية البشرة حنطية اللون والمواج. تنوره يستمر من آذار الى ايار.

٣٠٧٧٦ - وَعَسَّس قَارِصِي

Dryandra formosa (S). *Dryandre magnifique* (F).
نوع من الوص، جنيته تملو نحو اربعة امتار، سالتها عقداة. فروصها امروبية منتصبة مستطيلة. اوراقها حمية متراكبة، نصلها ضيق الصفحة يطول من ١٢ الى ٢٠ سم. ويرض من ٨ الى ٨ سم. رؤسائها الزهرية بيضية الشكل. ازهارها رتقالية اللون، قناباتها حر || تنوره يستمر من ايار الى تموز.

٣٠٧٧٧ - وَعَسَّس كَثِير الزَّهَر

Dryandra floribunda (S). *Dryandre multiflore* (F).
نوع من الوص، جنيته تملو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. سالتها قرصاء. فروصها لينة العود اللتين. اوراقها متعاقبة؛ نصلها اهليجي الشكل، مسن الحافة، مائل البشرة على مسطحه. ازهارها صفراء اللون، قناباتها حنطية. تنوره يستمر طوال فصل الصيف.

٣٠٧٧٨ - وَعَسَّسَاء

الرملة البنية يصعب فيها المشي. ج. وهاس واوماس.

٣٠٧٧٩ - وَعَفَ أُرُوبَانِي

هو قمرزية الحفصيات، اطاليا.

٣٠٧٨٠ - وَعَفَ الْتَيْن *

Lepidosaphes minima, L. *conchyiformis*, *Mytilaspis minima* (S). *Cochenille virgule du figuier* (F).
حشرة صغيرة من القرمزيات، جسمها كروي الشكل تقوله يراوح من ٢ الى ٣ سم. ثوبها ابيض اللون، ترسها الشمسي قليل المادة ولا انتشار. جبالها الخولي واحد. تمتع مكثاً تدريجياً طول شهر نيسان ينفذ من يرقات نهي انسلخاتها في اواسط الصيف. اقلها سوس البحر المختص. تركيب التين دون سواه فتؤذبه اذا كثرت لانها تفتي الساق والاعصان.

٣٠٧٨١ - وَعَفَ الْحُمْضِيَّات

هو قمرزية الحفصيات، اطاليا.

٣٠٧٨٢ - وَعَفَ الْمُرَى الْمَبْطُط *

Eucalymnatus tessellatus, *Locanum tessellatum* (S). *Cochenille plate des serres* (F).

حشرة صغيرة من القرمزيات، جسمها يغيي الشكل مبطط يطول من ٣ الى ٤ سم. ويرض نحو ٢. ثوبها الى البني الاصفر. اطرافها غباراء اللون مسنة، جاتباها شامغيان. تركيب مسطع نباتات المساري اعصها التخليلات والسحليات.

Engraissement (F). **وَعْنَن** - ٣٠٨٠٢

Fasting (E).

توعنت الفم ولايقار : بلغت غاية السمن .

Ladrite (F). **وَعْنَة** - ٣٠٨٠٣

شكل من التراب الصلصالي الاحمر اللون .

Ladérétique (F). **وَعْنِي** - ٣٠٨٠٤

صفة الوعة وهي التراب الصلصالي الاحمر اللون .

Chacal du Sénégal (F). **وَعْوَع** - ٣٠٨٠٥

راجع ابن آوى الافريقى .

٣٠٨٠٦ - **وَعَال**

البقال وكل ياتع يغلي ثمن الاشياء .

Aubergine (F). **وَعْد** - ٣٠٨٠٧

هو الباذنجان ، اطبخه .

Imperméable (F). **وَقَاض** - ٣٠٨٠٨

Imperméable, Impervious (E).

الوقاض : المكان يمسك الماء . والتربة الوقاض هي التي

تحتفظ الماء ولا تسرب .

Eplucher (F). To pick (E). **وَقَل** - ٣٠٨٠٩

وقل وقول الشيء قشر فهو واقل .

Philodendron (S). **وَقِيل** - ٣٠٨١٠

Philodendron (F).

الواحدة وقيلة . جنس نباتات جلدودية مدادة معمرة من

فصيلة التوتليات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠٠ منها

بعض مناطق البلاد الاستوائية اخصها امريكا الجنوبية ||

نوعها جلدودية مدادة . اوراقها متعاقبة ، متعقبة ، كبيرة

القد ، شبه قلبية الشوزن ، جامدة النصل المفرض والمفرس .

انواعها طلمة كما في النخل . انواعها شديدة الصغر ،

عرفية ، مستعينة الارباع || تزود كثيرين في المراكن

داخل المسكن .

Exatbuminé (F). **وَقِين** - ٣٠٨١١

نمت قمريتي يطلق على كل بزة او تخطيط عادم الاح

اي الابيين .

Cri de la pie-grièche (F). **وَقِي** - ٣٠٨١٢

الوق هو صباح المرد .

Chronomètre (F). **وَقَات** - ٣٠٨١٣

Chronometer (E).

جهاز ضبط دقيق الصنع يستعمل لتحديد الوقت الذي

استرجعه العمل المطلوب .

Chronométrie (F). **وَقَاتَة** - ٣٠٨١٤

Chronometry (E).

Combustible **وَقَاد** - ٣٠٨١٥

ما توقد به النار ، اطبخ وقود .

Certhiola (S). Certhiote (F). **وَقَال** - ٣٠٨١٦

جنس طير من الجواثم رقيقات المنابر وفضيلة المنذريات .

انواعها المعروفة نحو عشرة منتشرة في معظم المناطق الحارة

اخصها امريكا الجنوبية || اجسامها مخططة القد .

Commelina (S).

Commeline, Commelyne (F). Blue spiderwort (E).

Commeline (D). Commelina (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الوعلانيات . انواعها

زهاء ٨٠ معظمها بري وبضها طبي وزينى . سيقانها

منتصبة او مدادة . اوراقها لا قياسية الشكل تكثر فيها

الاستطالة . ازهارها لا نظامية التجميع ، سوية الالوان

تلب فيها الزرقاء || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٣٠٧٩٤ - **وَعَلَان الْبَنْغَال**

Commelina benghalensis (S). Commeline du Ben-

gale (F).

نوع من الوعلان ، ساقه وفروعها مدادة تنصب عند اطرافها .

اوراقه بيضية مقطوعة ، نصلها الى الخصار الزاهي ،

اغدادها موهبة بالاخر . ازهارها كثيرة المدد ، بتسجية

اللون ، صغرة القد || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٧٩٥ - **وَعَلَان مَسَاوِي**

Commelina celestis (S). Commeline céleste (F).

نوع من الوعلان ، قاعدة ساقه ديفضية الجئت المستطيل .

ساقه رفاه ، زياء تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقه لاطئة

اهليجية الشكل . نصلها خلى الصفحة العليا ، اسط

السفل . ازهارها الى الزرقاة الساباجوية ، قطرها يراوح من

١٥ الى ٢٥ م || تنوره يستمر من حزيران الى ايلول .

٣٠٧٩٦ - **وَعَلَان فُوجِينِي**

Commelina virginica (S). Commeline de Virginie (F).

نوع من الوعلان ، ساقه منتصبة رفاه تملو من ٥٠ الى

٩٠ سم . اوراقه ستانية الشكل ، نصلها جامد الصفحة

يطول من ٧ الى ١٣ سم . ازهارها الى الزرقاة المابقة الزاهية ،

قطرها يراوح من ٢٠ الى ٣٠ م || تنوره يستمر من

حزيران الى ايلول .

٣٠٧٩٧ - **وَعَلَان مُنْتَصِب**

Commelina erecta (S). Commeline dressée (F).

نوع من الوعلان ، ساقه منتصبة قليلة الفروع تملو من ٤٠

الى ٦٠ سم . اوراقه خمعية ضيقة النصل تطول من ٨ الى

١٥ سم . وكبر من ١٠ الى ٢٥ سم . نصلها خلى البشرة

يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . ازهارها الى الزرقاة الجبيلية ،

قطرها يراوح من ١٥ الى ٢٠ م . || تنوره يستمر من

آب الى تشرين .

٣٠٧٩٨ - **وَعَلَانِيَات**

Commelinaceae (S).

Commelinacées (F). Commelinacées (E).

فصيلة نباتية من سبديات الفلق . اجناسها وانواعها عديدة

جمها من نباتات المناطق الحارة . أشهر اجناسها الوعلان

والمكايبة والزربية والطينيسيا .

٣٠٧٩٩ - **وَعِلَة**

Bouquetin femelle (F).

Cow-bouquetin (E).

الوعيلة اثنى الوعل .

٣٠٨٠٠ - **وَعْمَة**

Gazelle femelle (F).

Cow-gazelle (E).

الوعمة اثنى الغزال .

٣٠٨٠١ - **وَعْن**

Fourmillière délaissée (F).

الوعن قرية النمل المهجورة . ج وعنان .



وعلان



وقيل



وقل

٣٠٨٢٧ - **وقسيات** °
Gymnosaceae (S).
Gymnosacées (F).
نصيلة فطور مجهرية تنتمي إلى مرتبة التنفسيات ورتبة الزقيات . تتميز بأوراق عريضة تلحمها غلفة السن البين الموجه || اجناسها وانواعها عديدة تصبها ثلث حمارات: الترفيزات والفلقيات والحويريات .

٣٠٨٢٨ - **وقف**
Wakf
هو حبس العين ورصد ريعها على الوقف وذريه أو من يوصيه .

٣٠٨٢٩ - **وقف**
Suspension
٣٠٨٣٠ - **وقف الأثر**
Surannance (F).
وقف أثر العقد الموقوت الفاسد عند أجل ما إذا هو لم يحدد في حينه .

٣٠٨٣١ - **وقل ° ، كميرويس**
Chamaerops (S).
Chamérops (F).
جنس اشجار ليفية رية وزيمينة من نصيلة النخلات . منها البلاد الحارة . انواعها عديدة منهاها اسوي المنبت ومنها الاثري والامريكي . سوقها جالسة تملو من متر إلى عشرة أمتار . اوراقها مدوارة ، كبيرة القد ، حيلة الخصار ، مستطيلة الزناد || اشهر انواعه التريينة ما يلي .

الوقل الخافض
Chamaerops humilis (S).
الوقل الشائك
Chamaerops hystrix (S).
الوقل الصلب
Chamaerops martiniana (S).
الوقل الفاخر
Chamaerops excelsa (S).
الوقل الكوشفي
Chamaerops cochinchinensis (S).
الوقل المنبط
Chamaerops fortunei (S).
الوقل المنشاري
Chamaerops serrulata (S).

٣٠٨٣٢ - **وقل محاشع ، مروحة**
Chamaerops humilis (S). Chamérops humble, Palmier éventail, P. nain (F). Dwarf palm, European fan-palm (E). Hanfpalme, Schirmpalme, Europäische Zwergpalme (D). Palma camerops, P. minore, P. femina (I).
نوع من الوقل لا ينشئ البرد العادي يمش على سطح شطوط المتوسط . ساقه قصيرة ، أوراقه مروحية جميلة الخضار الأزرق المالح . يزود الثزين ويستخرج من اوراقه الياق قوية تصلح لصناعة الحبال . يتكاثر بالبذر .

٣٠٨٣٣ - **وقن**
Dénicher (F).
To take out of the nest (E).
وقن وأقن : اخذ الطير من محاضها .

٣٠٨٣٤ - **وقنة**
Nid (F). Nest (E).
الوقنة : محض الطائر دثن في الشجرة .

٣٠٨٣٥ - **وقواق ° ، ققوب**
Cuculus (S).
Cucou (F). Cuckoo (E).
جنس طير من حمارة الوقواقات ورسيلة القيقوبيات . انواعه نحو ٧٥ منهاها متوسط القد قدر الحماة . انواعها قريبة الشبه من ثوب الباشق مع ابدانها ووشحها وحسن تبيجه . تألف الاجراس . ققوا الحشرات . لا تحسن بيضها ولا ترزق فراشها بل تضع بيضها غلطة في اوكان

منقلدها مستطيلة . اذناها مستديرة الأطراف . انواعها حيلة الاوران الزاهية يكثر فيها الاحمر والازرق البنفسجي المالح || ققوا الحشرات ويبض الثار الباقية .

٣٠٨١٧ - **وقاليد**
Tablettes en pierre (F).
الوقاليد : الحجارة المغروشة في الخدائق والممرات واحدا وقيد وقيدة .

٣٠٨١٨ - **وقائع الدعوى**
Points de fait (F).
في البيان باحما المتقاضين والحوادث التي نشأت عنها الدعوى .

٣٠٨١٩ - **وقاية**
Prophylaxie (F). Prophylaxis (E).
في جماع وسائل الحيلة والعناية الممكنة اتخاذها لاثارة الامراض . راجع اتقاء واستراز .

٣٠٨٢٠ - **وقب ، حجاج العين**
Orbite (F).
Orbit, Sockat (E).
في نقرة العين شبه هرية الشكل رباحية السطوح . وما الثتان .

٣٠٨٢١ - **وقبة**
Orbitale (F). Orbital (E).
راجع مدارة .

٣٠٨٢٢ - **وقبي**
Orbital (F). Orbital (E).
راجع مداري .

٣٠٨٢٣ - **وقبيات °**
Arcifères (F). Arciferous (E).
لغة من مرتبة السوطيات دعيات الذنب سليات الاسان . انواعها الممرقة كثيرة المدد جميعها حش فضائل : الشرفيات والمجمويات والصفاجيات والكداميات والكمكربيات || تتميز جميع صفاد هذه اللمة بدم مساواة سطح نعلي قوسها الصوري في مركز تلاقيها || اشهر صفاد هذه اللمة المعلوم والشرف .

٣٠٨٢٤ - **وقر**
Charge (F). Load (E).
هو ثقل الحمل الذي يقع على اعمدة وسقوف وجدران المباني . وهو يقسم الى ثقل ميت مستقر وثقل حي مفروض . ونظراً لكثرة الدوامل التي تدخل في حسابه فالقر قد يكون :

وقر الكسر
Charge de rupture (F).
Breaking load (E).

وقر متحرك
Charge mobile (F).
Travelling load (E).

وقر مستديم
Charge permanente (F).
Permanent load (E).

وقر لامركزي
Charge excentrique (F).
Essentric load (E).

وقر منفرج
Charge isolée (F).
Concentrated load (E).

وقر موزع بالتساوي
Charge uniformément répartie (F). Uniformly distributed load (E).

٣٠٨٢٥ - **وقرعة**
Cicatrice (F). Scar (E).
هي الاثر في الجسم من اي سبب كان . ج. وقرات .

٣٠٨٢٦ - **وقس**
Gale (F). Scab, Scruf (E).
اسم شامل يطلق على جميع انواع الجرب التي تتركب الحيوان والنبات . ومن قارة الجرب فهو مقوس وهي مقوسة .



وقل



وقواق

بالاسود الابيض وبالباليص . ودوارجه ، من الحوافر الى الركب ، تينية اللون . سوارفه الى السواد الاحمر اللامع . ذنبه ذئب الزرافة والجلد في الانثى اصفر قدماً من الذكر واخل جساً ، اما الذئب فبنفسه .

٣٠٨٤٢ - وَكَاةٌ حَرَجِيَّةٌ ٥

Drassus silvestris (S). *Drassoda sylvestre* (E).
Syla drassus (E).

نوع من العناكب الساعية افانصة ثنائية الروايب سداسية المشاقق تنتمي الى فصيلة الوركيات || جسمها متوسط القد يطول عند العنكب نحو ١٣ سم . وعند العنكة نحو ١٧ سم . صدراسها زرواني الشكل ، اشجع اللون حطفي المواج . عينها زئيمتان . شيفها غليسان . فكاهها مستطيلان نفيضان . جزامها كبيرة ، كثيرة الهلب . اسود بطنها بيضي الشكل ، حطفي اللون ، احمر المواج ، اسود التنقيط المبعثر ، ينتهي بشبولة دقيقة فارقة || تالفت الحراج والبراري . صكبتها وطاق تنسجه تحت الحجارة والجفوع المستطيلة . مسرعا جدوي يستمر من الغروب الى الفجر . قوتها الحشرات الصغيرة والاساريح . تسمى الى قصها ركساً وتسمى بالمرافضة والخذاع || بيئاتها الشثري يستمر من ١٦ الى ١٨ اسبوعاً . تعيش نحو ثلاث سنوات . والاثى تمتع المكان حل دفعة واحدة في غشاء من النواص مئين الحبلك ثلثه وتحمله لاصفاً بمشاتها الى ان يم القنف . ثم تحفر الصغار حل سطح بطنها نحو اربعة اصابع || تعتبر من العديريات الثائفة للاموية .

٣٠٨٤٤ - وَكَاةٌ ٥

Drassidae (S). *Drassidae* (E).
Drassidae (E).
فصيلة عناكب من رتبة الزيليدات ، اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع اقطار العالم ، جميعها مفترسة ، متوسطة القد او صغيرة . تتميز بصدرها البيضاء الشوزن ، المبططة الجرم وباستقامة اجهزتها الشفوية || اولجها متبانية الالوان ، شعها وطاقت تقيتها تحت الحجارة والجفوع المستطيلة ولها الانجبار والجمالة || اشهر انواعها الوكاعة .

Coureur (F). *Runner* (E). ٣٠٨٤٥ - وَكَا ٥
هو الداء ، اعليه .

٣٠٨٤٦ - وَكَاةٌ ٥

Coloré (F). *Coloured* (E). ٣٠٨٤٧ - وَكِيَّةٌ ٥
وكب الصر : لون وزهى وقد يكون ذلك عند الادراك .

Coloris (F). *Colouring* (E). ٣٠٨٤٨ - وَكِب ٥
هو زعاه ماجة لون الثمر او اى لون كان .

Point (noir ou rouge) (F). ٣٠٨٤٩ - وَكَنَّةٌ ٥
Point (black or red) (E).
نقطة سوداء او حمراء . اوراق موكوة : ظهر فيب لقط .

٣٠٨٥٠ - وَكُج ٥
الوكج : هو المكان الصلب . يقال بلغ في سفره الوكج اى بلغ الصخر .

٣٠٨٥١ - وَكُرْ ٥
الوكر : هض اللأثر وان لم يكن فيه .

بعض الطيور ولا تُلقي في العش الوالد أكثر من بيضة واحدة . ذكرها أكثر عدداً من انثاها . وهي من الطيور شبه القواطع تدير في الليل . تحضي الربيع والصيف في الاقاليم المعتدلة والحريف والشتاء في الاقاليم الدافئة || اشهر انواعها : البوق المأزق والبوق المطوق والبوق المرتبط والبوق الكبير الدارة والمقصص والقيص والقيص والكوكو والكلكر والكلكر والكلكر والفوقل والحام القوال والمهور والطالوى .

٣٠٨٣٦ - وَكُولِيَّاتٌ ٥
Cuculidae (F).
عارة طير من فصيلة القيقوبيات . اجناسها اربعة وانواعها المعروفة ١٤٥ موطنها احوال العالم القديم . وهي باكريتها من الطيور الثائفة التي تلهم الحشرات . من ميزاتها الخاصة انها لا تحسن بيضاها ولا ترق فراشها وصوتها يشبه البوق .

٣٠٨٣٧ - وَكُودٌ ٥
Combustible
هي المواد التي تستخدم لتوليد الحرارة باستراتها في الهواء . تقسم الكود من حيث حالتها الطبيعية الى ثلاثة اقسام تعرف بالصلبة كالنفط والسائلة كالبنزين والغازية كغاز الاستيلاج . وتقسم ايضاً من حيث مصدرها الى طبيعية كالنفط والنفط ومضرة كالكحول .

٣٠٨٣٨ - وَكِيدٌ ٥
Brûlis (F).
Denshered, Patch of burnt (E).
ما يتولد به النار من حطب وكود و الارض التي احترق نباتها .

٣٠٨٣٩ - وَكِينَةٌ ٥
المقع الذي اعتاد المأثر اتيانه والوقوف عليه .

٣٠٨٤٠ - وَكِيمَةٌ ٥
Lamelle (F). *Lamella* (E).
القيصة والسلة ، راية صغيرة من الزجاج متناهية في البقة تستعمل لتغطية القنطرة المطوب صحتها تحت الحجر .

٣٠٨٤١ - وَكَاكِ ٥
Dichroisme (F). *Dichroism* (E).
الركاب غاصة تتميز بها بعض الاجسام فظهر لثاظر اليها كألوانها غضة بلونين وفك بالنسبة الى انعكاس اللون او انكساره .

٣٠٨٤٢ - وَكَاكِ ٥ وَكِي ٥

Okapia Johnstoni (S). *Okapi de Johnston* (F).
حيوان يون مشاب جمر اكتشفه الرحالة الانكليزي السير جوستون عام ١٩٠٠ في غابات الكونغو المناخلة لفضة التالية من نهر « سيمليكي » . يبدو ، من الهيكل والشكل الخارجي ، كانه ينحدر من الزرافة ولهاها وحار الزرد . يألف الغابات المستحصية . مناطق مرتبة ترتفع عن سطح البحر نحو ٤٠٠٠ م . ملجته الحيائي زويبي || جسمه يطول نحو ٢٥٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٢٠ سم . ارتفاعه الى الحاروك ١٥٠ سم . معادلته السنية ٢٢ كما هي الحال عند الزرافة . رأسه معتدل الجرم . قصبة انفه مخدبة . خطمه وشي الشكل . حاروكه ارفع من الظهر . عتقه حلق الهامة . كفله كلال حار الزرد ودوارجه متساوية كدوارجه || ثوبه الى الجفوة القرمزية المواج . يحرسه الى البياض الاصفر . خطمه الى السمرة القاعة . جبهته الى الحمرة الدموية . سبالته سوداء تمتد حتى الجحفة . اذناه اكبر من اذني الحمار وهما كاسيتان جويوتا اللون . عتقه وشكابه الى الجفوة السوداء المواج . فضلاء جملعتان



وكاب



وكَاة حرجية

Curatelle (F). **٣٠٨٦٤ - ولاية ، قوامة**
Guardianship, Trusteeship (E).
هي إدارة شؤون وأموال المجهور عليه .

٣٠٨٦٥ - **وَلْت** الرُّك هو القليل من المطر .

Herbes effluës (F). **٣٠٨٦٦ - وَتَح**
الوتح هو العشب المستطيل .

Lapement (F). **٣٠٨٦٧ - وَتَح ، وَلُوح ، وَلَعْلَان**
Lapping (E). شرب السباع باللسان .

Vivipara (F). Viviparous (E). **٣٠٨٦٨ - وَلُود**
مدلول التكاثر القسلي بالولادة ، بماكسها بيوض .

٣٠٨٦٩ - **وَلُود ، وَلُودَة** **بُيُوتَة الأَطْلَال**
Otus ascalaphus (S). Hibou ascalaphe (F).

طائر من البوم ينتمي إلى عمارة البوميات . موطنه أريفة
التيالية ويحس مناطق حوض البحر المتوسط . جسمه
صغير القد يطول نحو ٣٠ سم . ثوبه أبيض من ثوب البومة
وأكتف رقيقة . يألف الأطلال والإحراج ولا يقرب إلا إذا كان
الأملة إلا عند موسم الحاجة . ينس قوته في الليل . يصيد
جميع أنواع القراصم والحشرات .

٣٠٨٧٠ - **وَلُودَة** **وَلُودَة** هي ريش الماء ، اطلبه .

Pollen **٣٠٨٧١ - وَكِين**
هو الصلح ، اطلبه .

Pollinique (F). Pollinic (E). **٣٠٨٧٢ - وَكِينِي**
اطلب طلي .

Braula coeca (S). **٣٠٨٧٣ - وَكَاكَة النَّحْل**
حشرة راشنة مؤذية من فصيلة البواشيات ورية ذوات
الجناتين || جسمها شبيه الصفر يطول نحو ١ م . تعيش
كامل حياتها الحشرية معلقة بالنحل || مكثها شبيه
الصفر تحتمه الاثنى فردياً في أغلاها فينطف من يرقات
متناهية الصفر واللثة تعيش على المكبر الفزون والتغارب .

Brulidæ (S). **٣٠٨٧٤ - وَكَاكِيَات**
Brulidæ (F). Brulidæ (E).

فصيلة حشرات راشنة مؤذية من رتبة ذوات الجناتين .
لها نومان جسمها جنس واحد || أجسامها صغيرة ، صلبة ،
شبه بيضية الشكل ، طول من ١ إلى ١٥ م . رؤوسها
صغيرة ، مبطن . صيرتها دقيقة فائرة . قربها الاستعمارية
صغيرة ، صغيرة ، ثلاثية الفصل . كواسلها ويطونها
متلاصقة . وهي عادمة الجناح والزران . قوايتها قوية ،
مشعبة الأطراف || أشهرها وشاة النحل .

Asterocystis (S). **٣٠٨٧٥ - وَنَمَة**
جنس فطور مجهرية من فصيلة المصقريات . تكاثرها
لاشي . تتميز بجها البيئي المستطير الشكل المدمر الرباط .
تتغذى على عدة نباتات زراعية فتركب جلودها وتؤذيها
وقد تميها .

Asterocystis radialis **٣٠٨٧٦ - وَنَمَة الجُدُر**
نوع من الورقة تركب جلود بعض النباتات أخصها
الكتان والسلمج واللفت والنس والكرات والشوان والفت

Partide (F). Pairing (E). **٣٠٨٥٢ - وَكِع**
الوكع هو سواد الطيور الالية . واكم انيك السجاجة :
سعدا . وكمت الحامة والباقة : غصمت لسداد الذكر .

Vice (F). Defect, Viciousness (E). **٣٠٨٥٣ - وَكِف**
هو العيب الظاهر في الشيء . ج أوكاف .

٣٠٨٥٤ - **وَكَن**
الوكن والوكنة : هي محض الطائر في حصر أو جدار .

Menon (F). **٣٠٨٥٥ - وَكِين**
الكيش أو الشاة تلبها الفم .

Mandataire (F). Mandatory (E). **٣٠٨٥٦ - وَكِيل**
هو من استندت إليه الوكالة .

Régisseur (F). **٣٠٨٥٧ - وَكِيل ، جَرِي**
Manager, Bailiff (E).
هو الذي يدير المزرعة ويقوم بشؤونها بدلاً من صاحبها .

Contramaître (F). **٣٠٨٥٨ - وَكِيل ، عَوَلِي**
Overseer, Foreman (E).
هو رئيس العمال في ورشة مينة .

٣٠٨٥٩ - **وَكِيل التَّكْلِيَّة ، مَسْتَدِيك**
Syndic de faillite (F). Syndic of bankruptcy (E).
هو الوكيل القانوني من كتلة الدائنين ويصيره القانون
وكيلاً أيضاً عن المفسد ليدر أمواله ويصلحها .

Macropus (S). Wallable (F). **٣٠٨٦٠ - وَلَاب**
جنس حيوانات لبونة عاشية من فصيلة القنقرات .
أنواعه المعروفة نحو ١٢ موطنها أستراليا وتبالية . تألف
الأجام والياض والادخال . ملجئها الحيالي جمالي ||
أجسامها معتدلة القد تطول من ١٦٠ إلى ١٨٠ سم . بما
فيه الذئب الذي يطول من ٦٠ إلى ٧٠ سم . أثولها إلى
الططة الخفاضة السمرة . أفاها رباهية الاغلاف ||
أعرف أنواعه وأشهرها :

Wallable à cou rouge (F). **وَلَاب أحر العنق**
Wallable à queue noire (F). **وَلَاب أسود الذئب**
Wallable agile (F). **وَلَاب رشيق**

Mise bas (F). **٣٠٨٦١ - وَلَادَة**
هي الوضع أي خروج الجنين من رحم الانثى في نهاية
مدة الحمل .

Parthenogénèse (F). **٣٠٨٦٢ - وَلَادَة العَدَكْرِي**
Parthenogenesis (E).
هي الولادة التي لم يستبقها كرم ؛ وقد تحصل في بعض
الحشرات منها الأرق .

Avellana (S). **٣٠٨٦٣ - وَلَانَة**
Avellana (F). Avellana (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مليات الأذبل
وفصيلة الجينيديات . أنواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد
منتشرة في بعض مجار البلاد المعتدلة الحرارة وأخصها البحر
الأبيض المتوسط . تألف الشطوط الحسية والرملية .
أعدادها بتدقيق الشكل واللقد ، مستديرة الفوية الثلاثية
الاستان . مألصة الصفة المعتدلة الساكنة ، الجميلة
الألوان الزاهية ، يكثر فيها الجؤوي .



رول

للاستعمال إلا بعد مرورها بمدة مراحل تخميرية وتخميرية تستلزم الوقت الطويل الذي يراوح من ٨ إلى ٩ أشهر .

٣٠٨٨٩ - **ونيلين** Vanilline (F). Vanillin (E).
عطر الزبانية يستخرج من الثمار التي تحوي ما يقارب ٢٪ من وزنها .

٣٠٨٩٠ - **وكيمية** Sclérote, Stroma (F).
مشيمة نباتية صلبة المادة تتكون من بعض الفطور فتحتفظها بتقويتها . ج. وثم .

٣٠٨٩١ - **وهاجة** Photomorphose (F).
Photomorphosis (E).
المرحلة تأثير الضوء على النمو والانتشار عند الكائنات الحية .

٣٠٨٩٢ - **وهانة** Sénescence (F). Senescence (E).
هو التور الذي يتسبب الذبول في النسيج الحية ان حيوانية او نباتية .

٣٠٨٩٣ - **وهججكة** Photologie (F).
Photology (E).
المرحلة علم يبحث في وهج الضوء ونواتجه وعملياته .

٣٠٨٩٤ - **وهيد** Terrain bas, encaissé (F).
المراد بالمراد : الارض المنخفضة ايما كان مؤلفها . ج. اورد وهدان يروها .

٣٠٨٩٥ - **وهير**
المر : ترفع يقع الشمس على الارض حتى ترى له اضطرابا كالبخار .

٣٠٨٩٦ - **وهض** Emasculation
هو انتزاع الخصيتين لانقاذ عمل التناسل في ذكر الحيوان .
الغاية منه حث الحيوان على التكاثر .

٣٠٨٩٧ - **وهط** Bocage (F). Copse, Basket (E).
غاية صغيرة ظلية وكل حرجية من عثر .

٣٠٨٩٨ - **وهف** Feuillage (F). Foliage, Leafage (E).
جناح اوراق الشجرة .

٣٠٨٩٩ - **وهق** Lasso
هو حبل في طرفه اشواطة يطرح في عتق الدابة للقبض عليها . يقال صاده بالوق . ج. اوراق .

٣٠٩٠٠ - **وهلنبرجية** Wahlenbergia (S).
Wahlenbergia (F). Wahlenbergia (E).
جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة الجرسيات . كسماها واوراقها متباعدة الاشكال والاحجام . ازهارها مختلفة الالوان ، يكثر فيها الازرق || انواعها المعروفة عديدة ، اشهرها التالية .

٣٠٩٠١ - **وهلنبرجية صمغية الورق**
Wahlenbergia serpyllifolia (S).
Wahlenbergia à feuilles de serpolet (F).
مهدا البلقان ، ساقها قصيرة تملو نحو ١٠ سم . اوراقها

والقصة || مظهرها الخارجي يقع كستنية اللون مستطيلة الشكل تنشق الجلود عند انتشارها . وعند تمام شراها تطبق الاوراق وتنبب بناسها .

٣٠٨٧٧ - **ومد** الورد والوردة : شدة حر الليل .
٣٠٨٧٨ - **ومس** ويس وروس المنب : لان يقرب النضج

٣٠٨٧٩ - **وميش** Fulguration (F). Fulguration (E).
لحان كالبرق يظهر في الطبقات العليا من السحاب لا يعقبه رعد .

٣٠٨٨٠ - **ونثير** Winters (S). Wintare (F).
جنس نباتات برية وتربوية من فصيلة النثريات . انواعها المعروفة خمسة . جميعها جنات معمرة فراء . اوراقها معنقة ، جامدة اتصال السنائية الشكل ، الجسيلة اغصان اللامس . ازهارها حيلة ، كبيرة ، خاسية ثيليات الملوثة ، عديدة الالوان الصفراء اللون || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٨٨١ - **ونثيريات** Winteraceae (S).
Wintéracées (F). Winteraceae (E).
فصيلة نباتية من فوات الفلفتين مستقلة القنات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها جزر الزايج || جميع نباتاتها شجيرات وجنبات فراء . اوراقها معنقة ، متعاقبة ، فصاها سنائية جامدة . ازهارها عشكولي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها كبيرة حيلة اقارب ملونة || اشهر اجناسها الوثير .

٣٠٨٨٢ - **ونسي** هو المماس المتوج ، اطله .

٣٠٨٨٣ - **ونك**، **ونك**، **ونك** Couver (F).
ونك الطائر : حنن اليفس .
To incubate (E).

٣٠٨٨٤ - **ونكا** هي القنصاب ، اطله .

٣٠٨٨٥ - **ونكة** ، **ونكم** ، **ونكم** سلح اللذاب .

٣٠٨٨٦ - **ونيكية** ، **ونيكية** ، **ونيكية** Vanille (F). Vanilla (E).
ثمر الزبانية وهي حل شكل سفة مستطيلة يستخرج منها عطرها المشهور الشائع الاستعمال .

٣٠٨٨٧ - **ونيكية** ، **ونيكية** ، **ونيكية** Vanilla (S).
Vanillier (F). Vanilla-plant (E).
جنس نباتات عديدة عارضة من فصيلة السحليات . انواعها عديدة ، اصلاتها المناطق الحارة ، معظمها بري وبعضها تربوي وصناعي || اشهر انواعها الزراعية للزبانية المنبسة الورق .

٣٠٨٨٨ - **ونيكية منبسة الورق**
Vanilla planifolia (S). Vanillier commun (F).
Common vanilla-plant (E). Echte Vanille (D). Vaniglia, Vanigliero (I).
اشهر انواع الزبانية واعماها زراعة . جنبها قصفة عارضة متدللة . اوراقها معنقة متعاقبة منبسة الصفحة قليلة الصل . سواقها دقيقة مستطيلة تقابل الاوراق . ازهارها عنقودي التجميع محوري الارتكاز . ازهارها كبيرة القد عطرية العرف . ثمارها سقية الشكل مستطيلة لا تصلح



ونير



ولبية منبسة الورق



وهلنبرجية

Faculaire (F). ٣٠٩٠٦ - وَهَيْجِيَّةٌ
نمت مضروب الى وهيجة الشمس .

Carrière de terre glaise (F). ٣٠٩٠٧ - وَقَارْ

Quarry of clay (E).
هو محفر الطين الذي تلاط به الحياض وغيرها من
لرشح الماء .

٣٠٩٠٨ - وَبِيَّةٌ
الويه طائر يعرف بالطيطوى الخيسال ، اطلبه . وهي
ايضاً نبات غرام الصباغين .

Age de la charrue (F). ٣٠٩٠٩ - وَبِجْ
Plough-beam (E).
هو سلب المحراث الجامع لساير اجزائه .

Vératrine (F). ٣٠٩١٠ - وَيرَاتُونِ ، وَرَاتُونِ
Veratrine, Veratrina (E).

مادة نباتية شبه قلوية تستخرج من بلور الخربق
الابيض . تستعمل طبياً ضد الحيات والانهابات .

Wigandia (S). ٣٠٩١١ - وَيْغَنْدِيَّةٌ

Wigandia (F). Wigandia (E).
نبات معقود الشريف حل اسم الطبيب «ويغند» . بجلة
معمرة وسيدة الجنس والنوع من فصيلة التجميات . مهدها
بعض مناطق يوليوية || مجلتها تملو نحو ثلاثة امتار .
ساقها قليلة الفروع متكاثفة الغطاء الشائك ، اوراقها
متعاقبة ، محدقة ، متموجة النصال الكبيرة التي يبلغ طولها
نحو ٩٠ سم . وعرسها نحو ٥٠ سم . صفحتها العليا الى
الخضار البحري . صفحتها السفلى كثيفة الحمل ، فضية
المواج || ازهارها سستية قرق . ازهارها كبيرة ، عطرية
الشكل ، بنسجية اللون ، خالصة التويج || تنويرها
يستمر طوال شهر نيسان .

Raisin noir (F). Black grapes (E). ٣٠٩١٢ - وَنْ
هو العنب الاسود اللون من اي شرب كان .

كاوراق الصمغ تملو نحو ٢ سم . نصالها خالية فضة
المواج . ازهارها بنسجية التويجات ، حر الكلوس ،
قطرها يراوح من ٢ الى ٣ سم . || تنويرها يستمر طوال
فصل الصيف .

٣٠٩٠٢ - وَهْلَنْبَرْجِيَّةٌ عَشَقِيَّةٌ الْوَرْق

Wahlenbergia hederacea (S).
Wahlenbergia à feuilles de lierre (F).
منبتها يمتد من الشرق الاقصى الى اوروبا ، يكثر وجودها
في المناقع وعلى الضفاف الرملية . ساقها بجلة مستقيمة
تطول نحو ٢٠ سم . اوراقها كاوراق المشقة شكلاً وقداً .
ازهارها فردية ، مستطيلة المفايق ، زرقاء اللون ، قطرها
من ٢ الى ٤ سم . || تنويرها يستمر من حزيران الى
تشرين الاول .

٣٠٩٠٣ - وَهْلَنْبَرْجِيَّةٌ عَصَلِيَّةٌ

Wahlenbergia graminifolia (S).
Wahlenbergia à feuilles de graminées (F).
مهددا يمتد من البلقان الى حوض البحر الابيض المتوسط .
ساقها تملو من ١٥ الى ٢٠ سم . اوراقها عصلية الشكل
كاوراق النجيليات وتطول نحو ١٦ سم . ازهارها زرقاء
اللون ، قطرها نحو ٢ سم . || تنويرها يستمر من حزيران
الى آب .

٣٠٩٠٤ - وَهْلَنْبَرْجِيَّةٌ كَرْوَاتِيَّةٌ

Wahlenbergia croatica (S).
Wahlenbergia de Croatie (F).
مهددا كرواتيية ودلاسيه . ساقها تملو نحو ١٠ سم .
اوراقها سنانية خفيفة تملو من ٣ الى ٥ سم . ازهارها
بنسجية التويجات والكلوس ، صغيرة القد ، قطرها نحو
٢ سم . || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٩٠٥ - وَهَيْجِيَّةٌ

Facule (F). Facula (E).
الويجة بقعة اكثر تأجباً ولعناً من غيرها في القصر
الشسي . ج وهائج .



ويغندية



ي

٣٠٩١٨ - ياسم ، قعّو ، وثالفة ، نزار أبيض

Ligustrum (S). Troène, Prune, Bois noir (F). Privet, Priry, Prim (E). Gemeiner Liguster, Ligustar, Gewöhnliche rainweide (D). Ardivela, Baciare, Ligustro, Lamitra, Rovistica, Olivella, Mimolo (I).

جلس نباتات برية وزينة من فصيلة الزيتونيات. انواعه نحو ٢٠ معظمها بري وبعضها زينة. نباتاتها مختلفة الاجسام منها الشجيرات والجنبايات والجنبايات. سوقها فراء فناء. اوراقها منقطة متقابلة ابدة صغيرة النصل اهليلجية الشكل. ازهارها مستحبة العرف صغيرة القذ متكررة التجميع تاجية الارزكاز او هامة || تزور في الحدائق والبساتين لتسيح وحل جوانب الممرات. وهي سهلة الانتقاد تأخذ جميع الاشكال المطلوبة وتصلح لصد الريح حتى ارتفاع ثلاثة امتار || اشهر انواعه الزينة ما يتبع.

٣٠٩١٩ - ياسم بيضي الورق

Ligustrum ovalifolium (S). Troène à feuilles ovales (F).

جنية صغيرة القذ فناء. اوراقها بيضة الشكل مائلة، نصلها جميل الخضار الاصفر المالح. تكثر زراعتها في المراكب وفي الحدائق المرتبة المصممة الاشكال والالوان. تتكاثر بالتعجيل.

٣٠٩٢٠ - ياسم صيني

Ligustrum sinensis (S). Troène de Chine (F).

شجيرة سريضة فناء تملو نحو ٤ امتار. تصلح للزينة ولصد الريح. اوراقها ابدة، نصلها سناني الزام الاخير، جميل الخضار المالح || تتكاثر بالتعجيل وبالزور.

٣٠٩٢١ - ياسم حبيبي الورق

Ligustrum angustifolium (S). Troène à feuilles étroites (F).

جنية متوسطة القذ تملو نحو ٢٥٠ سم. ساقها فناء. اوراقها

Hortensis (F).

٣٠٩١٣ - يابلية

نبات زينة يسمى اربلسيا، اطلبه.

Bacris zelleri (S).

٣٠٩١٤ - ياروز الارز

حشرة من الحسيريات، فراشها صغيرة القذ تطول نحو ٣٠ م. قوامها الى النبي الزيني المالح. رواشها الامامية مبقجة بالابيض. رواشها الخلفية حطية اللون برتقالية المالح || يكثر ويوجد في الربيع والصيف. رقاتها تنفق حل صف الازر فتلتهم النصال وتؤدي النبات.

Adopaea ectaeon (S).

٣٠٩١٥ - ياروز المرحي

حشرة من الحسيريات، فراشها تطول نحو ٢٨ م. جسمها مردي الشكل كسني الثوب. رواشها حطية اللون زينة المالح زهو في الذكور وتبقى في الاناث || يكثر ويوجد من حموز الى آب. رقاتها تركب الزورع والمراعي فتؤذي اذا كثر عددها.

Adopaea lineola (S).

٣٠٩١٦ - ياروز التجليات

حشرة من الحسيريات فراشها صغيرة القذ تطول نحو ٢٦ م. في الذكور والانات. جسمها مردي الشكل كسني الثوب. رواشها برتقالية اللون حطية الحمار والتسليج. يكثر ويوجد من حموز الى آب. رقاتها تركب صف التجليات فتؤذي.

Termite femella (F).

٣٠٩١٧ - ياروز

She termite (E).

هي الارضة الانثى الكاملة الاعضاء التناسلية. وظيفتها منع المازن لاستمرار وجود الرمية.



ياروز الارز



ياروز المرحي



ياروز التجليات

عروة. نصلها شيق الصفحة، اخضر اللون، جوي الملمح. تتكاثر بالتعقل وبالزبور.

٣٠٩٢٢ - ياسم كثيف الورق

Ligustrum compactum (S). *Troène compact* (F).
جنية زيبية صغيرة القد كثيفة الالوان. اوراقها داكنة
اهليجية الشكل، نصلها جبل الخضار المايك || تتكاثر
بالتعقل وبالزبور.

٣٠٩٢٣ - ياسم مفروق

Ligustrum vulgare (S). *Troène commun* (F).
جنية سبروتية شاملة الاستعمال التريبي. ساقها فرعاء نفا.
اوراقها ابيدة اهليجية الشكل مدهية الطرف جميلة الخضار
القائم الجوي الملمح || تتكاثر بالتعقل وبالزبور.

٣٠٩٢٤ - ياسم ياباني

Ligustrum japonicum (S). *Troène du Japon* (F).
جنية سبروتية شاملة الاستعمال التريبي ولصد الرياح.
ساقها فرعاء نفا تملو نحو ثلاثة اثمار. اوراقها ابيدة.
نصلها اهليجي الشكل، لسن الزام الاخير، اخضر اللون.
فستني الملمح || تتكاثر بالتعقل وبالزبور.

٣٠٩٢٥ - ياسمين

هو الياسمين، اطله.

٣٠٩٢٦ - ياسمين * ياسمين

Jasminum (S). *ياسمين* (F). *Jasmin* (D). *Gelsomino* (I).
جنس نباتات معمرة برية وزراعية من سبط الياسمينيات
وفصيلة الزيتونيات. انواعها زهاء ١٠٠ منظرها بري
وبعضها زراعي تريبي وصناعي || سيقانها فرعاء عارضة.
اغانها جالسة الالتلاب. اوراقها متقابلة مركبة، وريقاتها
لا تباينة التجميع والشكل، ازهارها جميلة المنظر مخلفة
الالوان يكثر فيها الالبيش ثم الاسفر والاخر. بعضها
فولح العرف المعطري يستخرج منه دهن فاخر الصفت
مرفوب فيه || يتكاثر الياسمين بالتعقل والترقيع. يجيد
في جميع الارزبة اغصانها الخفيفة المتوسطة الاندماج لانه
يغطى الرطوبة المستحكة || اشهر انواعه ما يتبع.

٣٠٩٢٧ - ياسمين ابيض و ياسمين مفروق

Jasminum officinale (S). *Jasmin commun*. *J. blanc* (F).
Jasmin of poetry. *White flowered Jasmin* (E).
Echter Jasmin, *Weisser Jasmin* (D). *Gelsomino*
blanco (I).
نوع من الياسمين السبروتي الميول. اقلية البلاد المختلة
الحرارة المتفرقة نحو اطراف. جنته متقلبة تملو نحو
٩ اثمار. فروعه متقابلة مضلعة المقطع والزاويا. اوراقه
متقابلة، وريقاته وريته الترتيب لا قياسية التجميع والعدد
منها الخاضية والسباعية والاسماعية. لونها الى الخضار المايك.
نصلها دلي الصفدة || ازهارها متشوية التجميع محوري
الارتكاز. ازهارها متفوقة العرف المعطري المتصب، لونها
ابيض بلق || تنوره يستمر من ايار الى ايلول.

٣٠٩٢٨ - ياسمين اذغب

Jasminum pubigerum (S). *Jasmin à duvet* (F).
نوع من الياسمين السبروتي. يعيش في جميع الاقاليم المختلة.
بجنته منتصبه تملو نحو ١٥٠ سم. اغانها مضلعة الزوايا.
اوراقها متقابلة، مركبة، وريته الترتيب، خماسية أو سباعية
أو تساعية الوريقات. وريقاتها اهليجية الشكل، نصلها
اذغب الصفدة السفلى، غلي العليا. ازهارها متشوية

التجميع. متشوية اليد من ٥ الى ١٥ زهرة. زهرتها صغيرة
القد، صفراء اللون، خابطة العرف || تنورها يستمر من
اذار الى تشرين الاول.

٣٠٩٢٩ - ياسمين إسباني، ياسمين كبير الزهر

Jasminum grandiflorum (S). *Jasmin d'Espagne*, *J. à*
grandes fleurs (F).
نوع من الياسمين السبروتي. زراعه الصناعية شائعة
لاستخراج دهنه المعطري. جنته تملو نحو ٣ اثمار اوراقه
متقابلة، وريقاته وريته التجميع لا قياسية العدد. ازهارها
الى الخضار اللامع. نصلها جامد الصفدة. ازهارها
متشوية التجميع، محوري الارتكاز. ازهارها كبيرة القد،
لونها الى الياض الموشح بالوردي، عريها فولح الرائحة
الاغاذة || تنوره يستمر من حزيران الى تشرين.

٣٠٩٣٠ - ياسمين اصفر، ياسمين البر

Jasminum fruticosum (S). *Jasmin à feuilles de cyprès*,
J. frutescent (F).
نوع من الياسمين الميول. جنته تملو نحو ٢٠٠ سم. اوراقها
متقابلة مركبة. وريقاتها زراعية الشكل صفيرة القد تطلو
نحو ٢ سم. نصلها جامد الصفدة || ازهارها صفراء اللند،
شفية الترتيب، ثنائية أو رباعية التجميع || تنوره
يستمر من ايار الى حزيران.

٣٠٩٣١ - ياسمين أصوري

Jasminum azoricum (S). *Jasmin des Açores* (F).
نوع من الياسمين، اقلية البلاد المختلة المحرفة نحو
الحارة. جنته عارضة. فروعه متقابلة اسطوانية المقطع.
اوراقها مركبة ثلاثية. وريقاته شبه قلبية الشكل. نصلها
جامد الصفدة الامة. ازهارها متشوية التجميع محوري
الارتكاز. ازهارها بيضاء اللون، متوسطة القد، نواحة
العرف المتصب || تنوره يستمر من حزيران الى آب.

٣٠٩٣٢ - ياسمين صيني

Jasminum besianum (S). *Jasmin de Bees*, *J. de*
Chine (F).
نوع من الياسمين السبروتي وهو جملة معمرة صغيرة القد
تملو من ٧٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها بيضية الشكل،
سنانية الزام الاخير، نصلها بطول من ٢٥ الى ٣٠ سم.
وهو جامد الصفدة فستني اللون. ازهارها طرية العرف،
حراء اللون، متوسطة القد، ثلاثية التجميع أو فردية.
تنورها يستمر طوال شهر حزيران.

٣٠٩٣٣ - ياسمين عطري

Jasminum odoratissimum, *J. suaveolens* (S). *Jasmin*
suave, *J. jonquille* (F).
نوع من الياسمين السبروتي. منته جزر كناري ومادرا.
جنته تملو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها وانادها
اسطوانية المقطع. اوراقها متقابلة، مركبة، وريته الترتيب،
ثلاثية أو خماسية التجميع، وريقاتها ابيدة، نصلها
بيضي الشكل مقطوع القاعدة. ازهارها ثلاثية التجميع،
صفراء اللون، نواحة العرف المتصب || تنورها يستمر
من نيسان الى تشرين الثاني.

٣٠٩٣٤ - ياسمين اخضر

هو الكوكليت، اطله.

٣٠٩٣٥ - ياسمين الليل

هو شراحت الليل، اطله.

٣٠٩٣٦ - ياسمين زنبقي

هو الفل، جملة زيبينة عطرية، اطلها.



ياسم صني



ياسم معروف



ياسمين

٣٠٩٣٧ - ياسمين عزائلي

هو صريمة الجدي الشائعة ، اطليا .

٣٠٩٥٢ - يامن * Dextrorse (F). Dextrose (E).

يامن م. يامة . نمت تعريف يطلق على كل ساق نباتية متسلقة دودتها اللولبية من البسار الى الجبين .

٣٠٩٣٨ - ياسمين هندي

هو الفتنة ، اطليا .

٣٠٩٣٩ - ياسمينيات

Jasminacées, Jasminées, Jasminiacées, Jasminidées, Jasminariées (F).

سبط من فصيلة اليزونيات ، اجناسه وانواعه عديدة اشهرها آلياسين . نباتاته جذبات وجنبيات فروع السوق . ازهاره جميلة الشكل ثنائية السداة ، خاصة التركيب ، بعضها عطر فروع النورف المستحب .

٣٠٩٤٠ - ياستنوس

Jacinthe (F).

هو الجاستن ، اطليا .

٣٠٩٤١ - ياشكيد

Azoon (F).

جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة الظهريات مشهور باسم حنظل ، اطليا .

٣٠٩٤٢ - ياعزال دوزر

Erodion clutin (F).

هو ابرة المجوز ، اطليا .

٣٠٩٤٣ - يالغ

Adulte (F). Adulte (E).

يالغ بالغ ، ملك ، شوب ، شطب ، ثعوت تعريفية لمق واحد يوصف به طور الاستقرار الحياتي القائم بين طوري الفتوة والشيوخنة .

٣٠٩٤٤ - يالغوج

Fontanelle (F).

فرجة غشائية في الجسم .

٣٠٩٤٥ - يالغوج

Fontanel, Fontanelle (E).

هو قرة الرأس يقابله القفن .

٣٠٩٤٦ - يالغوك

Sinclud (F).

شجرة تعرف بأبنة يوم ، اطليا .

٣٠٩٤٧ - يالغويات

Ephémère (F).

رتبة حشرات صغيرة القد تحلج الجسم من طبقة البويضات .

٣٠٩٤٨ - يالغوت

Procephamera (E).

رتبة حشرات صغيرة القد تحلج الجسم من طبقة البويضات . فصلاتها واجناسها وانواعها عديدة ، جميعها من الحوام التي تقضي حياتها البرية في الماء .

٣٠٩٤٩ - يالغوت آخر

Protéphémères (F).

حجر كرم شفاف ، صلب الجسم رزينة ، اجوده اسفله . وهو مختلف الالوان فيه الاحمر والاصفر والاخضر والازرق .

٣٠٩٥٠ - يالغوت زعفراني

Corindon (F). Corundum (E).

عشب من سيليكات الزئبق ، وهو حجر كرم زعفراني اللون يوجد عادة في بعض قطع البراكين .

٣٠٩٥١ - يالغون

Hyacinthe (F).

عشب من سيليكات الزئبق ، وهو حجر كرم زعفراني اللون يوجد عادة في بعض قطع البراكين .

٣٠٩٥٤ - يالسون

Anis (F).

هو الالسون ، اطليا .

٣٠٩٥٥ - يالسون بري

هو الكون الحبي ، اطليا .

٣٠٩٥٦ - يالغ

Mature, Mûr (F). Mature (E).

نمت تعريف يوصف به جميع المحاصيل الزراعية التي اجازت دور الادراك ودخلت في دور الانباع .

٣٠٩٥٧ - يالغوب

Pamphila (S).

جنس حشرات فراشية من فصيلة المسيريات . انواعه المؤدية قليلة . اجسامها تحلج القد تطول نحو ٢٨ م . في الاكوار والانات . رواشن ذكورها حطلة اللون يبيض التبديع والزرشفة . رواشن اناثها بنية اللون حر التبديع والزرشفة . يكثر وجودها من ايار الى حزيران . يرقاتها تركب النجيليات دون ان تؤذيها شديد الاذى .

٣٠٩٥٨ - يائوف النجيليات

Pamphila sidæ (S). Pamphile des graminées (F).

حشرة من فصيلة المسيريات ورتبة حشرقيات الاجنحة . موطنها الشرق الاقصى وينتشر الاصحاح الاروبي . فراشتها جارية قوتها رقيق الانواع . سرقتها تعيش على عصف النجيليات . جسمها متوسط القد ، رمدي الشكل يطول نحو ١٤ م . سطها نحو ٢٩ م . رأسها كبير اطيرم . بني اللون . عينها كبرتتان نافرتان . زبانها صرطانيان . جوشها ويطعها الى الحطلي الشديد السرة . زلب طوقها السري الى الشقفة . رواشن الذكر الى الحطلي يطول تبقيع وزرشفة صناعية . الزوج الاسامي اكثر زرشفة من الخلفي الذي يتميز بنقطة كبيرة تطوقها نقطة صغيرة جميعها الى السرة القائمة . رواشن الانثى الى البني يطول تبقيع احمر وتبقيع اشقر اكلس وبعض نقط صغيرة شراه اللون . لها جبل واحد في الحيل . تظهر الفراشة في ايار . تسرح في النهار . تعامل بعد ظهورها بنحو سبعة اسابيع وتضع المكن مبيدات على الصفحات السفلى من نصال الارواق . السرقه عند بلوغها الكمال تطول نحو ٢٢ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مستقيم الوسط ، يسحر اطبا . اريك اللون يطول شمس اسم . رأسها ونديها ودواجها سود . طور الاكمال الذي يستمر نحو خمسة اشهر ينقضي داخل صلبة تحببها السرقه بين اوراق الاشجار الابيدة .



يالغون



يالغور



يالغوت



يالغوت النجيليات



نباتة



بيد



بروح مخزني



يترومه

٣٠٩٦٦ - يَتْرُوح، لَفَّاح، مَنَدَرَجُور، مَنَدَرَاك لَفَّاح المَجْنُون، لَفَّاح الجِنِّ

Mandrora (S). *Mandrage* (F). *Mandrake*, *Devil's apple* (E). *Alraun*, *Hundsapfel* (D). *Mandrora*, *Mano di gloria* (I).

البروح عبر التاريخ : اصل الاسم العلمي من لغز ولفظ ويلفظ مندرافور . أما لفظة بروج فهي عبرانية ومعناها ناقص الروح وذلك لان شكل جذر هذا النبات يشبه جسم الانسان . وقد ورد ذكر البروح كسكن في بعض الاساطير القروسطية المألفة الى نحو ٢٠٠٠ سنة قبل الميلاد . وقد استعمل منوما عند الاشوريين وصنعت منه مرهم مخدرة في عصر الولادة وآلام الانسان . وكان هذا النبات يستعملون الجذور والاوراق كعندل للاصابة في العمليات الجراحية وفي بعض جبر الكسور المقلية . ويؤمن ان جذور المشرقة اذا لقت في الحقل كانت مقوداً جسدياً عظيماً . وكان ايضاً شائع الاستعمال في السرور وفي طقوس افروديت . تعلية العلمية : جنس نباتات مفترية ، عشية ، طيبة ، ومرة ، برية وزراعية من فصيلة الباذنجانيات . انواعه خمسة جميعها من نباتات حوض البحر المتوسط . سيقها جلود لينة لحمية تلتصق فيها الاذنائية . شكلها شكل جسم الانسان . اوراقها قرصية الاذنكاز ، كبيرة الله ، معتقة . نصلها رافعة الصلصة ، متشعب الحافة . اذنائها متصلة الله ، كثيرة العدد ، فردية التجميع تقوم على مائيل قرصية الالتئاب . البانها غطلة بيا الابيض والازرق والاحمر والبني . ثمارها باذنجانية مستديرة . جلودها وثمارها وابواقها بحوى مادة مخدرة عنصرها كمنصر الاروين ان لا يكن اقل || اعرف انواعه واشهرها البروح المخزني .

٣٠٩٦٧ - يَتْرُوح مَخْزَنِي

Mandrora officinarum (S). *Mandrora officinalis* (F).

نوع من البروح وهو نبات مفري طبي بري وزراعي . مهده المقدد الشرق الاوسط . ساقها جلدية ، سترائية الشكل ، قرقة ، لونها الى اخضر الاسمر . اوراقها قرصية الالتئاب ، معتقة ، كاملة ، مستطيلة . نصلها سبك الصلصة متشعب الاطراف . ازهارها فردية التجميع ، قصرية للمعاليق المتصبة . يبيض اللون ، غصراء المروج . ثماره مستديرة ، كبيرة الله . راجع خواصه الطبية في المأدة السابقة .

٣٠٩٦٨ - يَتْرُوقِي

Picrasma (S). *Picrasma* (F). *Picrasma* (E).

جنس اشجار حرجية طيبة وتزينية من فصيلة السوربيات . مهده الشرق الاقصى . ساقها ملساء السماء حراء اللون سقية بالاصفر ، ترتفع نحو عشرة امتار . اوراقها مركبة . ورقها تطلو نحو ١٠ سم . وتعرض نحو ٤ سم . ازهارها على التجميع . اذنائها الذكرية رباعية الفصل والنباتات والاسدية . ازهارها الاثنية خماسية الياص . اعصابها صلبة صفراء اللون . لحاء السوق والاصنام مرة الطعم طيبة .

٣٠٩٦٩ - يَتْرُومَة ، وَسَابِيَة

Eutrema wasabi (S). *Wasabi* (F).

نبات يلقى معمر من فصيلة الصليبيات . مهده اليابان . ساقه سترائية مستطيلة . اوراقها قرصية الالتئاب ، غليظة الاصلاح ، كبيرة النصل الغليظة الشكل . غصاءه الزمري يملو نحو ١٠٠ سم . ازهاره عنقودي منتصب . ازهاره

٣٠٩٦٩ - يَتْرُومَة * *Potamogetalus velox* (S). *Potamogetalus véloce* (F).

حيوان وحيد الجنس والنوع من فصيلة اليانبات . اصطناعه بعض مناطق افريقية الشالية || جسمها كثيف اليرير النام ، يطلو نحو ٦٠ سم . بما فيه الذنب الذي يطلو نحو ٣٠ سم . رأسها شبه غرطبي الشكل ، مستدير الخلف . اسنانها صغرية ، متراصة ، حادة الاطراف ، صعدا ٤٠ . ساقها متوسط الكثافة واللؤلؤ . عينها كيزتان لوزيتان . اذنائها مستديرتان صغيرتان . ذنبها شبه مردي الشكل جتل اليرير . قوائمها قصيرة . ثوبها الى السمرة يطلو في الرأس والظهر موج ارجواني . ابطاها ويطنها الى البياض اللين || تتميز بجلود هيكلها المظلي من الترقوة || تألف صفاف مجاري الماء . قوتها الاسماك والظاء والاواني والغشرات الكبيرة .

٣٠٩٦٩ - يَتْرُومَاتِيَة *Potamogetalidae* (S). *Potamogetalidae* (F). *Potamogetalidae* (E).

فصيلة حيوانات لبونة حائرة وجمدة الجنس والنوع تشبه القفصاعة تعيش على صفاف مجاري الماء || نوعها الوحيد اليبانية .

٣٠٩٦٩ - يَتْرُومَاتِيَة *Dothideaceae* (F). *Dothideaceae* (E).

عارة فطور مجهرية من فصيلة الشوفيات وربة الزقيات . تتميز بأصنافها المركبة المحبة القائمة على روية لا جولية . انفلاتها يحصل في من ساقها المستديرة || اجناسها التي تم الانتصاب الزراعي قليلة وهي التبيكة والتبيكة والتبيكة والتبيكة .

٣٠٩٦٩ - يَتْرُومَة

Sesleria (S). *Sesleria* (F).

جنس نباتات عشية مروهية معمرة من فصيلة النجيليات . انواعه قليلة العدد . ساقها خماسية او سداسية الاضلاع ، دقيقة التصلب ، ثنائية او ثلاثية السلايات . صنفها ضيق النصل المستطيل . ساقها اسطوانية الشكل ، صغيرة الله . يكثر وجودها في الاراضي الجبلية الكلسية اللساسة . اشهر انواعها ما يتبع .

٣٠٩٦٩ - يَتْرُومَة لُزُوقِي

Sesleria coerules (S).

Sesleria bleue (F).

نوع من اليبد البروتي المبلول . عشية سداسية الاضلاع تفلو من ٢٠ الى ٥٠ سم . صنفها مستطيل النصل المحجن يرض نحو ٤ م . ساقها قصيرة الله اسطوانية الشكل تطلو نحو ٣ م . قطرها ٧ م . ساقها الى الزرق الجميلة . يوجد في الارربة الكلسية الغليظة او المتوسطة الرطوبة .

٣٠٩٦٩ - يَتْرُومَة فُضِي

Sesleria argentea, *S. nitida* (S). *Sesleria brillante* (F).

نوع من اليبد البروتي المبلول . عشية خماسية الاضلاع يرض نحو ٤ م . ساقها قصيرة الله اسطوانية الشكل تطلو نحو ٣ م . قطرها ٧ م . ساقها الى الزرق الجميلة . يوجد في الارربة الكلسية الغليظة او المتوسطة الرطوبة .

٣٠٩٦٩ - يَتْرُومَة

Feuille de vigne (F).

البرقة ورقة البكرة . ج يرق . وتدعى ايضاً الخيلب .

الارتكاز . ازهارها وردية اللون مشيرة بالازرقاني . بتلاتها مهدية الخمار || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٩٨٠ - **يُخْمُومُ عَطِير** (S). *Adenandra fragrans*
٣٠٩٨١ - **يُخْمُومُ عَطِير** (F). *Adenandra odorante*

نوع من اليشموم الزيتي . ساقه تملو من ٨٠ الى ١٠٠ سم .
اوراقه اهلبيجية مستطيلة . نصالها منبسطة مرصاة بحيلة
الخضار الزاهي . ازهارها عتيق التجميع ، طرفي الارتكاز .
ازهارها مستطيلة المماثلق ، وردية اللون ، مفرسة الفصل
والبتلات ، عطرية العرف المستحب || تنويره يستمر طوال
شهر ايار .

٣٠٩٨١ - **يُخْمُومُ لَوْدِيّ الزَهْرَة**

Adenandra uniflora (S).
Adenandre à fleurs solitaires (F).

نوع من اليشموم الزيتي . ساقه ترتفع نحو ٤٠ سم .
اوراقه سنائية الشكل ، مدهبة ، شاذكة . نصالها ملتفة
الاطراف . ازهارها فردية التجميع ، طرفية الارتكاز ،
بيضاء اللون من الداخل ، وردية من الخارج || تنويرها
يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٩٨٢ - **يَحْجُوج** (F). *Halophila*
لعت تمرني يطلق على النباتات التي تمش وتكثر تلتكأيا
في الاربة الماخة .

٣٠٩٨٣ - **يَحْجُور** (F). *Outarde (mille)*
ذكر الحباري .

٣٠٩٨٤ - **يَحْجُور**
قد يكون اليامور . قال الجاحظ في وصفه : وداية
وحشية نافرة لما قرنا طويلا كأنها مشاران . وقروته
كقرون الأيل وفي صامتة لا تجويف فيها وهو أسرع من
الأيل .

٣٠٩٨٥ - **يَحْجُور** (F). *Hémoglobine*
٣٠٩٨٦ - **يَحْجُوم** (E). *Hemoglobin*
مادة آسية يتألف منها غضاب دم الفقريات .

٣٠٩٨٦ - **يَحْجُوم**
طائر من الفقعن ، يلي الفقعن المدى ، اطلبه .

٣٠٩٨٧ - **يَحْجُوم** (F). *Oena*
هو الخسعة ، طائر من الحمايات ، اطلبه .

٣٠٩٨٨ - **يَحْجُوش** (S). *Erythrinus*
٣٠٩٨٩ - **يَحْجُوش** (F). *Erythrin*

الواحدة عيشية . جنس اسمك نهرية من مفتوحات انهر
وفصيلة القرصانيات . انواعها المعروفة اربعة موطيا انهر
ومجيرات امريكة الاستوائية || اجسامها مستطيلة ، شبه
اسطوانية الشكل ، تطول من ٣٠ الى ٤٠ سم . رؤوسها
مستطيلة مقطوعة كبيرة الاشداق . زعانفها الظهرية كبيرة
متباعدة بزيجيات محمية صغيرة . زعانفها الذيلية مستديرة
الاطراف . اذواجا تراوح من الخضار الالامس الى الخضار
الاسفح . بطونها فضية لحوها مأكولة ، متوسطة
الصنف .

٣٠٩٨٩ - **يَحْجُوش** (F). *Gazon*
هو الخضير والخضرة . ج يخاضير .

صغيرة القند ، بيضاء اللون . ساقه واوراقه مأكولة || يتكاثر
بالبرز والقضائل . يرشب في المواقع الرطبة التليلية وفي
الآرربة الصلصالية الرطبة الوفرة العناصر الغذائية .

٣٠٩٧٠ - **يَحْجُور** هو الفريون ، اطلبه .

٣٠٩٧١ - **يَحْجُور السُحُور**
هو فريون الفجر ، اطلبه .

٣٠٩٧٢ - **يَحْجُور الكسكس**
هو الفريون الاسريكي ، اطلبه .

٣٠٩٧٣ - **يَحْجُور هِنْدِيّ**
هو فريون الاقدمين ، اطلبه .

٣٠٩٧٤ - **يَحْجُوريات** *Euphorbiaceae*
فصيلة نباتية تعرف بالفريونيات . اطلها .

٣٠٩٧٥ - **يَحْجُور** (S). *Michauxia*
جنس نباتات عشبية نارية وزوادية محولة ومعمرة من
فصيلة الجربسيات . انواعها للمعرفة قليلة منها الشرق
الاعد . سورها متعصية . اوراقها متعاقبة متبادلة قليلة
العدد . ازهارها ابطية الارتكاز ، كبيرة القند ملتفة البتلات .
أعروف انواعها واشهرها ما يتبع .

٣٠٩٧٦ - **يَحْجُور لَوْدِيّ** (S). *Michauxia levigata*
٣٠٩٧٧ - **يَحْجُور** (F). *Michauxia à tige lisse*

نوع من اليشمه المحولة . منها بلاد ايران ، ساقها مرصاة
فرداء تملو من ٣٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها جامدة النصل
الازرقاني . ازهارها بيضاء اللون ، فردية التجميع ، ابطية
الارتكاز تملو الساق والفروع . تنويرها يستمر من تموز
الى آب .

٣٠٩٧٧ - **يَحْجُور سُورِيّ** (S). *Michauxia campanuloides*
٣٠٩٧٨ - **يَحْجُور** (F). *Michauxia fausse-campanula*

نوع من اليشمه المحولة . منها الجبال السورية واللبنانية .
ساقها فرداء تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . بشرتها حلوية
الزغب الشاذك . اوراقها جامدة النصل الازرقاني . ازهارها
وردية او بنفسجية اللون ، فردية التجميع ، ابطية الارتكاز ،
مشيرة على الساق والفروع . لتويرها يستمر من حزيران
الى آب .

٣٠٩٧٨ - **يَحْجُوم** (S). *Adenandra*
٣٠٩٧٩ - **يَحْجُوم** (E). *Adenandre*

جنس جنيات برية وتربينية معمرة من فصيلة السابيات .
موطنها بعض مناطق افريقية الجنوبية والشمالية . سورها
فرداء قصيرة تملو من ٤٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها ابيدة
متباينة الاشكال . ازهارها خماسية الفصل والبتلات ،
عشارية الاسدية || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها
الثلاثة التالية .

٣٠٩٧٩ - **يَحْجُوم صِيْرَاي**
Adenandra umbellata (S).
Adenandre en ombelle (F).

نوع من اليشموم الزيتي . ساقه تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم .
اوراقه سنائية الشكل صغيرة القند تطول من ٢ الى ٣ سم .
وتعمر من ٤ الى ٦ م . نصالها مهدية الاطراف ، حلوية
الصفحات السفلى . ازهارها صيرواني التجميع ، طرفي



بخشور



يُصَوِّر الحَوَر



يُصَوِّر المَصْفَاف



رَبَاة



رَبُود

الاجنحة . تألف الاماكن التي يكثر فيها الحلزون والبزاق والرطوب . تتميز بلين القشور والبصايف في الظلام وبضارب الشكل الغاريبي بين الذكر والانثى ، ذكرها مجنحة و انثاها سماري || جسمها متوسط القد ، يطول عند الذكر من ١١ الى ١٣ سم . يطول عند الانثى من ١٤ الى ١٦ سم . ثوبها ال البني الاسمر ، يتصرف ال الجوزي عند الذكر ويبيت عند الانثى . رأسها صغير الحجم فكاهما ذريبان . عيناها صغيرتان . زباناها خيطان صغيران . ظهورها عند الذكر مستطيل القد وهو عند الانثى جعدة تركل على التربة الاولى . ارسافها خماسية النعل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر الربيع وتموت حتى اواسط الصيف . تسرح في الليل . تساقط في اوائل حزيران تمتع المكن ميحاديا تحت الجلفاة والحجارة || البرقة مبطلة الشكل ، سداسية الرؤوس سمره اللون ، تعيش في اول عهدها على المواد العضوية ثم تم ما تقتوسه من البزاق والحلزون .

٣٠٩٩٧ - رِبَاة شَرْبِيَّة ، حُبَابِ شَرْبِيَّة ، بَصْبُوسُ اللَّيْلِ الشَّرْبِيَّة

Luciola orientalis (S). *Luciola orientalis* (F).
Orient Fire-fly, Orient Glow-worm (E).

حشرة مفترسة نافعة من فصيلة الرباعيات ورتبة مفدمات الاجنحة . تألف الاماكن التي ترتادها البرقة اللبوية وهي اكثر انتشارا منها واثبت بصيصا في الظلام وانثاها مجنحة كالذكر || جسمها متوسط القد يطول عند الذكر نحو ١٤ سم . يطول عند الانثى نحو ١٦ سم . ثوبها ثنائي اللون ، جوزي الرأس والظهران ، خطي الكورل والجلانة والجرازم . رأسها صغير الحجم ملوحي بالكورل . زباناها مستطيلان . عيناها صغيرتان بارزتان . ظهورها يلحم كامل البطن . بطنها مبطط . اسمر اللون . ارسافها خماسية النعل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر آذار وتموت حتى اواخر آب . تسرح في الليل . قوتها البزاق والحلزون والرطوب . وهي كالبرقة اللبوية تحارس القضم الاستباقي فتسحق فسيحتها برضاب ذفاقي للمادة ثم تعقبه بالليل ليرضي على التسحق ويذهبها لتتغذى بها فكها الاجنحين || البرقة مبطلة الشكل ، سداسية الرؤوس ، سمره اللون ، مقلدة الحراج وهي كالخشرة الجملانة لا تخطو من الجهاز الصوتي || طور الاكمال الذي ينسر نحو ٦٠ يوما يتغني في التربة تحت الحجارة .

٣٠٩٩٨ - رِبَاة عِيَات
Lampyridae (S).
Lampyridae (F). *Lampyridae*, Fireflies, Glowworms, Lightning beetles (E). *Leuchtkäfer* (D).

فصيلة حشرات مفترسة من عديات الاجنحة ، ليات البشرة ، صليات القد ، مستطيلة الشكل ، تسحق في الظلام لان تربيتهن اللطيفة تجعل عدداً مفترسة بصيصها يشع في الظلمة . اجناسها المبرقة نحو ٥٠٠ أما اترافها فعدة مئات . معظمها من حشرات المناطق الحارة . تتميز بذكرها المجنحة وانثاها للماردي . وهي تنصير من الحشرات النافعة لانها تقضي على بعض البزقيات الفاسدة بالزراعة .

٣٠٩٩٩ - رِبُوع
Cyclamen (F).
هو السكك ، الحلب .

٣١٠٠٠ - رِبُود
Rhizothorus (S).
Rhizothorus (F). *Rhizothorus* (E).
مائل من العجائبيات وفصيلة التذريجات ، موطن ماليزية .

٣٠٩٩٠ - بُذُ الحِجْرَاء
Baudrier d'Orion (F).
بذ الجوزاء ثلاثة كواكب وباصة من كوكبة الجوزاء . راجع فطار الجوزاء .

٣٠٩٩١ - بُذُ صَوْر الحَوَر
Idiocerus tremulae (S).
حشرة من فصيلة الزيزيديات ، طولها يراوح من ٥ الى ٩ سم . جسمها مخروطي الشكل . رأسها مستعرض . زباناها شريطة قصيرة . ثوبها خطي اللون . رأسها واخراف جناحها الى الخصار الاطول الباهت . مدنها خطي اللون اسمر الحار والظرف . تركب الحور من آذار الى تشرين .

٣٠٩٩٢ - بُذُ صَوْر المَصْفَاف
Idiocerus ustulatus (S).
حشرة من فصيلة الزيزيديات طولها يراوح من ٤ الى ٦ سم . جسمها مخروطي الشكل . رأسها مستعرض . زباناها شريطة قصيرة . ثوبها الى الخصار الاسمع الموج ، مدنها اسمر تركب المصفاف دون ان تؤذيها .

٣٠٩٩٣ - بُذُ صَوْر الَيْف
Idiocerus socialis (S).
Idiocerus social (F).

حشرة من فصيلة الزيزيديات ورتبة متجانسات الاجنحة . جسمها صغير القد يطول نحو ٥ سم . رأسها مستعرض ، قليل النتوء اصفر اللون . خطها معتدل الطول . عيناها كبيرتان . زباناها قصيرتان ، نحيلان . كورلها قليل الاحتداد اصفر . حجبها عريضة صفراء . ظهورها كامل الحنحية ، لاحت ، خطي اللون يعلو موج اسمر . وثنانها غشائيات ، شفاهان . بطنها اصفر اللون على صفحتيه . قوائمها كثيفة الحلب تشالك || تألف جميع المراتع التي يكثر فيها الاشباب والاشجار . قوتها التسحق تحصه من الاوراق .

٣٠٩٩٤ - بُذُ يَرْبِيَّة ، بُذُ يَرْبِيَّة
Idesia (S). *Idesia* (F).

خبرة برية ورتبينة من فصيلة النضيات . مهدا الصين واليابان . مائلها منتصبه تملو من ١٢ الى ١٧ سم . اجناسها فارة نظامية الارتكاز . اورافها حاملة ، متعاقبة و متعاقبة ، رمية الشكل ، مستطيلة النعق . نصلها جامد الصفعة بحري اللون . انزافها وسيدة الفق ، حادة القلعة ، صغيرة القد ، خطراء اللون . انزافها عشكري التسبيح ، بحوري الارتكاز . حثاكلها متعددة . تحارها عنبة الشكل والنقد برتقالية اللون || تنورها يستمر طوال شهر ايار .

٣٠٩٩٥ - رِبَاة كَ ، حُبَابِ
Lampyrus (S).
Lampyrus, *Ver luisant* (F). *Firefly* (E).
جلس حشرات مفيدة ، صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، مبطلة الجسم ، من فصيلة الرباعيات . انواعها المبرقة نحو ٩٠ جميعها من ليات البشرة يفسق في الظلام . معظمها من حشرات المناطق الحارة . ذكرها تسرح في الليل للاعتداد . انثاها للماردي . ثوبها مختلفة الالوان يكثر ليسا البرادي والبي .

٣٠٩٩٦ - رِبَاة دُجُوبِيَّة ، حُبَابِ دُجُوبِيَّة ، بَصْبُوسُ اللَّيْلِ
Lampyrus noctiluca (S).
Lampyre nocturne, *Ver-luisant* (F).
Fire-fly, *Glow-worm* (E).
حشرة مفترسة نافعة من فصيلة الرباعيات ورتبة مفدمات

جوي الرقطة الصنائية التهديب . رقطة لا قياسية الحجم والشكل صدره وبعته الى البياض الناصع || موطنه يتعد من ايران والانفان واغدت الى التبت . يآلف الجبال العالية من ارتفاع ٣٠٠٠ الى ٦٠٠٠ م .

٣١٠٠٧ - **يَرْبُوعُومُ** (F).
Pernoptère mâle (F).
He pernopterus (E).
اليربوعوم واليربوعوم هو الذكر من الربوع .

٣١٠٠٨ - **يَرْبُوعُ** (F).
Yard
وحدة قياس الكيلزية تساوي ٠.٠٩١٤٣٨٢ م . يقال اخذت من طول سيف الملك هنري الاول || كسور اليرد القدم والبوصة . القدم او الفوت يساوي ٣٠.٤٨ سم . والبوصة او الانش تساوي ٢٥.٤٢ م . فاليرد يساوي اذًا ثلاثة اقدام او ٣٦ بوصة .

٣١٠٠٩ - **يَرْبُوعُومُ** (F).
Monstera (S). Monstère (F). Coriman (E). Kœchlicher, Kolbenriesse (D). Monstera (I).
جنس نباتات عشبية متسلقة من فصيلة الفصليات . انواعه المعروفة ١٢ ، مهدا البلاد الامريكية . منظرها عرجل وبعضها معمر . اوراقها مزديجة التصنيف . ازهارها حمراء . ازهارها صغيرة لائحة وصيدة الشق . ثمارها لوزية مأكولة القشور في بعض الانواع .

٣١١١٠ - **يَرْبُوعُ** (F).
Pinasse (F).
هو الصنوبر البري ، اطلية .

٣١١١١ - **يَرْبُوعُونُ** * (F).
Erycina (S).
Erycène (F). Erycina (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الرخويات . انواعه المعروفة كثيرة العدد ، جميعها من متحجرات الطبقات المسانية والبليسانية . اصدانها بيضيه الشئون او عرسمة ، متدلة التبطيط ، رقيقة ، مائسة .

٣١١١٢ - **يَرْبُوعُونِيَّاتُ** * (F).
Erycinidae (S).
Erycinidés (F). Erycinidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها عديدة ، منها الغالبة وهي من متحجرات الاراضي الثالثة ، ومنها الماصرة || تتميز باصدانها الصغيرة الرقيقة الشفافة . جميعها ثنائية المصارع ، مستطيلة الارجل القابضة الانحناء || اعرف اجناسها واشهرها اليرسون والبيتين والقلبية والخطوة .

٣١١١٣ - **يَرْبُوعُ** * (F).
Tragelaphus scriptus (S). Tragelapha écrite, Guib (F). Bush buck, Hornessed antelope (E).
نوع من الجهل صغير القد جسمه حجم الماعز . اصدانه البلاد الافريقية من جنوب الصحراء الكبيرة الى الحيف . ثوبه امركيت يعلو بخطوط ابيض وتبقيج اسمر لا نظامي الترتيب ولا قياسي الشكل . راجع نباح .

٣١١١٤ - **يَرْبُوعُونُ** (F).
Eriogonum (S). Eriogone (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة البطاطيات . انواعه عديدة ، منظرها بري وبعضها تريبي . سورها متعصبة عادة الفروع . اوراقها غمية التجميع لا قياسية الارتكاز يكثر وجودها عند قاعدة الساق . ازهارها صغيرة القد شذوية الانتظام ثنائية او رباعية التجميع تغلفها قلافة جرسية الشكل او اسطوانية || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

يألف البراري والادغال . ملجئه الحياتي عصامي ، جماعته قليلة العدد . قوته اشترات والقنل والبلور . البرية || جسمه متدلل القد قريب الشبه باجمل الا انه اطول عنقاً وينقاداً واصفر رأساً . جناحه مستديرا الاطراف . ذنبه صغير القد ، مخروطي الشكل . ثوبه الى اليردة الزرقاء المزجج يعلوها توشيم ابيض واسمر . زوره وصدره وبعته الى القبة السمره يعلوها موج وودي || يثخن اضموصه من القرية بين النباتات المشايكة . الاثني تخشن وسطها من ١٤ الى ١٦ بوصة . الترسيم يستمر نحو ثلاثة اسابيع . الذكر يثخن الفداء والحلمية .

٣١١٠١ - **يَرْبُوعُ** * (F).
Dipus (S). Gerboise (F). Jerboa, jaculus (E).
جنس حيوانات ليلية قاضية جاسة من فصيلة اليربويات . انواعه عديدة موطنها جميع الاصقاع الصحراوية الحارة والمتدلة الحارة || شكله كمثل فأرة كبيرة . طوله نحو ١٧ سم . وذنبه ٢٠ . حياء جاحظان . اذناه كبيرتان متصبتان وهو طويل الرجليين قصير اليدين جدا وله ذنب مستطيل يرفعه صعداً يحل في طرفه غصيلة صوف لونها يتخلط من لون ثوبه || ثوبه الى الصهبة الصفراء . ظهره بلون الرمل ، بطنه ابيض || يآلف القفاني والشاطئ الجافة يتغذى جسره في نثر الارض . اثناء حمل ثمانية اطباء وتضع اربع مرات في السنة في كل مرة من ٤ الى ٦ ادراس . قرته المواد النباتية حل اختلاف انواعها وصادها والاشترات والجراد || اعرف انواعه واصحها ما يتبع .

٣١١١٢ - **يَرْبُوعُ تَدْمُوعِي** (F).
Dipus macrotarsus (S). Gerboise macrotarse (F).
موطنه البلاد السورية . ثوبه بلون الرمل . طوله نحو ١٦ سم . وذنبه ١٩ || يكثر في البادية .

٣١١١٣ - **يَرْبُوعُ دُوْرْمِيحُ** (F).
Dipus sagitta (S).
Gerboise flèche (F).
موطنه العراق وتركية واروبه . ثوبه بلون الرمل . ظهره عاين لليج . ذنبه اسود الخصلة ، ابيض الثورة .

٣١١٠٤ - **يَرْبُوعُ مِصْرِي** (F).
Dipus sagittatus (S). Gerboise d'Egypte (F).
موطنه فسيح الاجزاء يمتد من الجزائر الى تونس وليبيا ومصر واليرة وفلسطين وشمال الجزيرة العربية || ثوبه الى الصهبة الصفراء . ظهره بلون الرمل الرطب . بطنه ابيض . غصيلة ذنبه سمراء ، طرفها اشبر .

٣١١٠٥ - **يَرْبُوعُونِيَّاتُ** (F).
Dipodidae (S).
Dipodidés (F). Dipodidae (E).
فصيلة حيوانات ليلية قاضية جامة من مرتبة قردنيات الشربز ورتبة القوارض . اجناسها وانواعها عديدة تتميز باستطالة جراسمها الخلفية وقصر الامامية . رؤوسها غليظة . اذانها ملحقة الشكل متعصبة . اعناقها قصيرة . اذنانها طويلة || موطنها العالم ، تألف القفاني والقيمان . قوتها الاشباب والجلود والثار || اعرف اجناسها اليربوع والزيبود والعوانة والهاقل .

٣١١٠٦ - **يَرْبُوعُونُ** * (F).
Felis uncia (S). Snow leopard, Irbis (E).
حيوان مفترس من فصيلة السنوريات . يشبه النمر ككوتنا وتغلفاً . يقال انه ضرب منه . طوله نحو ٣٢٢ سم . بما فيه الذنب الذي يطول نحو ١٠٠ سم . ثوبه ابيض الاساس



يربوع



يربوع



يربوعون



يرسون



يربوع

٣١٠٢٢ - يَرْغُونُ نَاصِعُ الْخَلْبِ *

Eriulus setosus (S). Eriulus soyeux (F).

حيوان لبين حاشر من فصيلة الذبابيات . موطنه جزيرة مدغشقر . يألف الحشبات والتجارات التي تكثر فيها الأعشاب سرسح دجوي . قوته الحشرات والديدان || جسمه صغير القد ، قريب الشبه بالفتلة ، يطول نحو ٢٤ سم . عليه مستطيل الخشونة ، عديم المسال . ثوبه الى السمرة السوداء || الاثني ثلثون تقصع في كل رصص من ١٥ الى ١٢ جرراً || يياته الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر .

Larvae (F). Larval (E).

٣١٠٢٤ - يَرْقِي

راجع ديموي .

Pierre calcaire molle (F).

٣١٠٢٥ - يَرْقَع

هو كل حجر كلسي عديم الصلابة أو سريع الانفلات .

Asperge (F).

٣١٠٢٦ - يَرْقَع

هو الحليون المعروف . ج رابع ، اطليه .

Sparmannia (S).

٣١٠٢٧ - يَرْصُوم

Sparmannia (F). Sparmannia (E).

جنس جنبات وشجيرات برية وزراعية تربيتية من فصيلة التريزوفيات . منبتها البلاد الافريقية . سطوها منتصبة تملو من متر الى ستة امتار . اوراقها متباينة الاشكال . ازهارها صوباني التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها صغيرة القند يضاء اللون || انواعها المعروفة قليلة البد ، اشهرها التالية :

٣١٠٢٨ - يَرْصُومُ افريقي

Sparmannia africana (S). Sparmannia d'Afrique (F).

نوع من البريوم . ساقه تملو نحو ستة امتار . اوراقه قلبية الشكل تطول من ١٢ الى ١٥ سم . وتعرض من ٨ الى ١٥ سم . تصالها مسنة الخفاف ، مزينة البشرة على الصفحتين العليا والسفلى . ازهارها صغيرة الحجم ، يضاء اللون || تنويرها يستمر طويلاً شهر ايار .

٣١٠٢٩ - يَرْصُومُ كَلْبِي الْوَقْ

Sparmannia palmata (S). Sparmannia palmée (F).

نوع من البريوم . ساقه تملو من متر الى مترين . اوراقه كلبية الشكل ، خماسية الخلق المستطيل المختار . تصالها عديم الزغب ، بحري الخشار . ازهارها يضاء اللون ، صغيرة الحجم || تنويرها يستمر من آذار الى تموز .

Henné (F).

٣١٠٣٠ - يَرْوَاء

هي الحناء ، اطليه .

Pedetes caller (S).

٣١٠٣١ - يَرْوَب *

Pédète calro. Lièvre sauteur (F).

حيوان لبين قاضم سيد الجلس والنوع من فصيلة الدبابيات . موطنه بعض الاسواق الافريقية . طوله نحو ٤٠ سم . وزنيه ٤٠ . رأسه كراس الانب . عيانه كبيرتان جاسطتان . ذنبه جنل الصوف . جرائره قصيرة ، خماسية الاصابع ، قوية الاظافر القوية . جرائره الخلفية مستطيلة ، رباعية الاصابع ، قوية الاظافر القصيرة المستقيمة || ثوبه الى الصبغة السوداء . بطنه وشوالبه بيض . يعيش جماعات كثيرة البد || جحره ردة فضية تكتنفها اربعة انفاق مصالبة مستطيلة . قوته الاعشاب والجلود والجلبوب .

٣١٠١٥ - يَرْغُونُ أَصْفَرُ *

Eriogonum flavum (S). Eriogone jaune (F).

نوع من اليرغون التريبي . ساقه زياه تملو نحو ٣٠ سم . اوراقه معتقة لمعية الشكل تطول من ٣ الى ٨ سم . تصالها خلى البشرة على صفحتيه . ازهاره حامية الارتكاز صوبانية التجميع ، خلية البشرة ، صفراء اللون || تنوره يستمر من حزيران الى ايلول .

٣١٠١٦ - يَرْغُونُ غَيْسِي *

Eriogonum umbellatum (S). Eriogone en ombelle (F).

نوع من اليرغون الجليلي المنبت . ساقه تملو من ١٥ الى ١٥ سم . اوراقه معتقة لمعية الشكل . تصالها بحري الصفحة العليا ، خلى السفلى . ازهاره حامية الارتكاز ، خمسية التجميع ، صفراء اللون || تنوره يستمر من حزيران الى ايلول .

٣١٠١٧ - يَرْغُونُ عَدَقِي *

Eriogonum corymbosum (S). Eriogone en corymbe (F).

نوع من اليرغون التريبي . ساقه مزينة تملو من ١٥ الى ٢٠ سم . اوراقه معتقة اهليجية الشكل ، تصالها خلى البشرة ، متصبع الاطراف . ازهاره حامية الارتكاز ، ملبية التجميع ، لونها الى البياض الموشح بالوردي || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

٣١٠١٨ - يَرْغُونُ مَرْسَب *

Eriogonum compositum (S). Eriogone composite (F).

نوع من اليرغون التريبي . ساقه مرءاه تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم . اوراقه يفضية الشكل ، قلبية القاعدة ، تصالها اعصر الصفحة العليا خلى السفلى . ازهاره حامية الارتكاز ، خمسية الشكل ، مركبة الصفوف المتراكبة . لونها الى البياض الاخر || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

Pterostyrax

٣١٠١٩ - يَرْفِيل *

جنس نباتات برية وتريزينة من فصيلة الاصطركيات . انواعها المعروفة قليلة البد منها الاشجار والشجيرات . سطوها منتصبة فراءه . اوراقها عابلة معتقة متضاربة . تصالها اهليجية جامدة الثقل ، مسنة الحوافي . صفحتها السفلى كثيفة الخمل الاطلى . ازهارها محورية الارتكاز ، عقدوية التجميع . ازهارها رباعي . ثمارها جرداء برسية الشكل ، رباعية الاجنحة .

Ictère, jaunisse (F).

٣١٠٢٠ - يَرْقَان

Icterus, jaunisse (E).

حالة مرضية تترى نج الحيوان تنصفر ، سببها العدائي تملد الصفراء من بلوغ المني بسهولة تختلط بالدم .

Chlorose (F).

٣١٠٢١ - يَرْقَان - يَرْقَان

Chlorosis (E).

ومنهم من قال ارقان . حلة فيزيولوجية تصيب النبات فتسبب اصفرار الارواق ونقصها من القيام بعملها التنشيطي على الرية الاكلى مما يؤدي الى تأخير النمو والذبول الباكر . وينتقل للارواق والنباتات المصابة باليرقان مبرقة .

Larve (F).

٣١٠٢٢ - يَرْقَلَة - يَرْقَالَة

هي الدعوص ، اطليه .



يرقول ناصع لللب



يرب

الاستشعارية قصيرة ، ثنائية الفصل . أعضائها قصيرة . ملاسها دقيقة ، كواسلها وبطنها شبه اسطوانية الشكل . رواشتها معتدلة الحجم ، شفافة ، قوائمها نشيطة || تألف المواقع الجافة والنازلة الريفية . قوتها المواد العضوية المنحلة . يرقاتها - عادمة البصر ، نائلة ودائمة .

٣١٠٤١ - يثوريكيات *
Scenopinidae (S). Scénopinidés (F). Scenopinidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها واولوها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تألف المواقع الجافة وتضيق المساكن الريفية || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٨ مم . رؤوسها كبيرة ، عيونها متقاربة ، مثائلة عند الشقين . قرنها الاستشعارية قصيرة ، ثنائية الفصل . أعضائها صغيرة . كواسلها وبطنها شبه اسطوانية الشكل . رواشتها شفافة ، قوائمها قوية || يرقاتها كبة ، دودية الشكل . بعضها واثج والبعض الآخر دامن || أشهر اجناسها البركة .

٣١٠٤٢ - يثوروم *
Georyssus (S). Géorysse (F). Georyssus (E).

جنس حشرات من فصيلة اليرمويات ورتبة غديات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٢٠ جميعها من حشرات المناطق الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها عادمة الراشح صغيرة القد ، بيضية الشكل ، تطول من ٢ الى ٥ مم . رؤوسها صغيرة ، ملحوة . عيونها بارزة . أعضائها مستطيلة . تأثيرها وبلاسها نظامية . قرنها الاستشعارية قصيرة ، دبوسية الاطراف . كواسلها شبه غروبية . مقطوعة المقدم . المحامدا لافعة قتلها حطوط من التفرقات الدقيقة . قوائمها نشيطة . اولواها وحيدة اللون يكثر فيها الاسود ويشققاته والجلوي والكسني || تألف صفات المناطق ويجاري الماء حيث تنعم في الرمال والاسمال الرطبة . قوتها المواد العضوية المنحلة وما تستطيع اقتناصه من حشرات وهوام .

٣١٠٤٣ - يثوروسيات *
Georyssidae (S). Géoryssidés (F). Georyssidae (E).

فصيلة حشرات متفرقة من غديات الاجنحة . اجناسها واولوها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها عادمة الراشح صغيرة القد ، بيضية الشكل ، تطول من ٢ الى ٥ مم . رؤوسها صغيرة ، ملحوة . عيونها بارزة . تأثيرها وبلاسها نظامية . قرنها الاستشعارية قصيرة ، ثنائية الفصل ، دبوسية الاطراف . كواسلها شبه غروبية الشكل ، تلحف الرأس . المحامدا لافعة . قوائمها نشيطة ، اولواها سوية اللون || تألف الرياض وصفات ويجاري الماء . تمسح على المواد العضوية المنحلة وما تستطيع اقتناصه من حشرات وهوام || أشهر اجناسها اليرمو .

٣١٠٤٤ - يسكر ، يسكر *
Ben (F). هو البسان ، الحليه .

٣١٠٤٥ - يثورور *
شجر تصنع منه المساريك ومساريكه اشد المساريك إنقاء لثغر ونايته بالبراة وفيها شيء من مرارة مع لين .

٣١٠٤٦ - يثوروية *
Ostryer (F). هي الثناينة الشهورة بصلابة خشبها .

يسرح في الليل ويبعث في النهار . انثاء تحمل اربعة اطياف وتضع اربعة ادراس مرة واحدة في السنة .

٣١٠٣٢ - يثوريثيم ، نديية *
Eriophyllum (S). Eriophylle (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات . انواعها عديدة ، معظمها بري وبعضها زراعي . بعضها فروع مستطيلة الزغب الذي يشبه ندف القطن . اوراقها متعاقبة ورشية خمرية . ازهارها وريسية صفراء اللون . يزورها منجبة بقشبة || أشهر انواعها ما يتبع .

٣١٠٣٣ - يثوريثيم عدي ، نديية عديية *
Eriophyllum confertiflorum (S). Eriophylle à corymbes (F).

نوع من اليروثيليم ، مشبهه تلو من ٣٥ الى ٦٠ سم . اوراقه صغيرة القد ثلاثية التفرخ او خماسية . رؤوساته الزهرية كثيفة التجميع ، قصيرة الاعم ، حمية الملح . ازهاره يستمر من لوالل سريان الى اواسط تموز .

٣١٠٣٤ - يثوريثيم يثوروي ، نديية يثوروية *
Eriophyllum consoposum (S). Eriophylle gazou-nant (F).

نوع من اليروثيليم ، مشبهه تلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقه السفل خماسية التفرخ . رؤوساته الزهرية كبيرة القد ، متوسطة العدد ، مستطيلة الاعم || ازهاره يستمر طوال شهر تموز .

٣١٠٣٥ - يثوريي *
Yurumi (F). حيوان لبيون ادره مشهور باسم يثورور احمر ، الحليه .

٣١٠٣٦ - يثورون *
Sperme des animaux féroces (F). البرون عصد الحيوانات المفترسة .

٣١٠٣٧ - يثورون *
دماغ الفيل .

٣١٠٣٨ - يثورليات *
Spermaphytes (F). تعريف يطلق على جميع النباتات التي تلتف بزور حقيقة من اي قسم كانت ان من المستورات أو البريات أو التسميرات .

٣١٠٣٩ - يثوراع *
Bioplane (S). Bioplane (F).

جنس حشرات لافذية من فصيلة البليشيات ورتبة صفدات الاجنحة . انواعها المعروفة خمسة مهددا الشرق الاذلي يكثر ويوجد في بعض مناطق سورية الداخلية || اجسامها صغيرة تطول من ٨ الى ١٢ مم . اولواها وحيدة اللون منها الاسود والجلوي والاسمر والكسني والبي . رؤوسها صغيرة مستديرة . قرنها الاستشعارية دبوسية الشكل ، كواسلها معبودية ، ناشرة الاطراف الامامية . المحامدا غفدة ، مقطوعة الاطراف لا تلحف كامل الجسم || تألف المرح وزرائب البقر والغنم والماش . تعيش تحت القش على المواد العضوية والنباتية المنحلة .

٣١٠٤٠ - يثوريكة *
Scenopinus (S). Scénopine (F). Scenopinus (E).

جنس حشرات من فصيلة اليركيات ورتبة ذوات الجناحين . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة تطول من ٣ الى ٦ مم . رؤوسها كبيرة . عيونها متقاربة عند الشقين . قرنها



يراث



يرمو

تركب النباتات المروعة والمتعوية || أشهر أنواعها اليفف
الفرزاف وسف فرموزا .

Chenille (F).

٣١٠٤٧ - يَسْرُوع
هو الاسرود ، اطله .



يفف اثيق



يفف ثائي اللون

٣١٠٤٢ - يَسْرُوع *
Tritonia (S). Tritonia (F). Tritonia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مملات الاريل
خلفيات الخياشيم وفصيلة اليوسفيات . انواعه المروعة
كثيرة العدد منتشرة في معظم بحار العالم . تعيش على
النبوت البحرية || اجسامها عراطة اهلبيجية الشكل
شبيهة باليزاق . رؤوسها قصيرة مقطوعة ، ثنائية القواس
المحاسة . خياشيمها ظهريه الازنكاز ، ثنائية الصف ،
منشعبة . انوعها ثنائية الفكوك القترية المسنة الاطراف .
انوعها مملوة بكث في الاحمر والازرق والاصفر .

٣١٠٤٤ - يَسْرُوعِيَّات *
Tritonidae (S). Tritonidae (F). Tritonidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مملات الاريل
خلفيات الخياشيم . اجسامها وانوعها المروعة عديدة
منتشرة في معظم بحار العالم . اكثرها عبي وبعضها يقترب
من الشطوط . اسرابها متفارقة العدد || اجسامها مستطيلة
عامة الصفد . رؤوسها ثنائية او رباعية الملاص .
خياشيمها متسلسلة ، مركزها فوق الرءاء على الظهر او
على الجانبين || اعرف اجناسها واشهرها اليسوع والبرارة
وغلوكس .

٣١٠٥٥ - يَسْرُوع
Pimpinella (S). Pimpinella (F). Pimpinella (E).

جنس نباتات عشبية من فصيلة الخياميات . انواعه المروعة
عديدة منها الحلوية والمهولة والسمرة الشهيرة الايسون ||
سوقها متعصبه فراءه . اوراقها مركبة . ازهارها مركبة
التجميع ، ابطي الازنكاز او تاجيعة . ازهارها يبهض
اللون . غمارها يزور صغيرة || أشهر انواعها :

P. ansum (S). يسون انهبي ، آهون
P. cretica (S). يسون اكرتي
P. viridis (S). يسون اعضر
P. puberula (S). يسون ذهبي
P. anthriscoides (S). يسون سرلي
P. eriocarpa (S). يسون صدقي اللبر
P. corymbosa (S). يسون مدقي



يفف مزاز

٣١٠٥٦ - يَخْشِب
Jaspe (F). Jasper (E).

حجر اليشب حجر صواني التركيب مختلف الاالان
منه حجر الحلك الاسدي اي صمداق الصافه .

٣١٠٥٧ - يَخْشِبِيَّة ، كَوَسْب افرقيبة
Agathaea amelloides, Aster capensis (S). Agathaea,
Aster d'Afrique, A. du Cap, Marguerite bleue (F).
Cape daisy, Cape aster (E). Afrikanischer Agath (D).
Aster d'Africa (I).

نبطة ترينيدية معمرة من فصيلة المركبات . مهدا افرقيبة
الجنوبية وقد عمت زراعتها معظم سحايق العالم . ساقها
فراءه تملو من ٧٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها متعاقبة ،
حافضة ، ملقطة الاطراف . نصلها يفيض الشكل ، خلي
الصفحة . ازهارها رويفية ، فردية التجميع ، مستطيلة الزنناد ،
زرقاء اللون . ازهارها يستمر طوال الصيف .



يسع

Ortalis formosa (S). Ortalis élégante, Otile élégant (F).

حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة اليسفيات .
جسمها صغير القد يطول من ٧ الى ١١ م . رأسها كبير ،
شبه مخروطي الشكل ، حطلي اللون ، اقشر الموح .
جبهتها برتقالية اللون . خطمها مستدل الطول ، صناعي
اللون . عينها مكورتان ، فاشرتان ، اربوايتشان ،
مطوئتان بالفضي . زباناها قصيران . رؤشاها كيران ،
صناعيان ، مقيبان بالاسمر المابق . قوائمها الى الحطلي .
صدورها صناعي اللون ، فضي العمل ، تقطبه بعض الخطوط
السر . بطنها يرسمي الشكل ، صناعي الخصب ، اصفر
المواج ، تملو ستة اطواق سم || تظهر الحشرة المجللنة
من حزيران الى ايلول . مرتها المرابي والاشباب المتعوية
حيث تقترس مختلف انواع الارق والمولم || يرقاتها غاصلة
تركب الارواق وتمش عليها حتى الاكمال .

٣١٠٤٩ - يَسْتَف ثنائي اللون *
Ortalis bicolor (S). Ortalis bicolor (F).

حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة اليسفيات .
جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٧ م . رأسها محدب
الشكل ، صناعي اللون . خطمها مستدل الطول . زباناها
صغيران ، مقيبان . عينها كبيرتان ، ذهبيتان . صدورها
الى انخضار اللامس . بطنها يرسمي الشكل ، ازرق اللون ،
اسلع المواج . مرزا الى السمرة الخفيفة العابقة . رؤشاها
كيران ، صفافان . قوائمها الى السمرة الكستانية || تظهر
الحشرة المجللنة من اواسط نيسان الى اواسط تشرين الاول .
مرسها يشمل كل مكان حتى الاماكن الملهولة || قوتها
المولم . يرقاتها نائلة .

٣١٠٥١ - يَسْتَف قُرْمُوزِيَّات *
Ortalis formosa (S). Ortalis élégante (F).

ذبابة من اليسفيات صغيرة القد ، طويلا يراوح من ٧
الى ١١ م . رأسها وقوائمها الى الحطلي الاقشر . عريتها
فضية . جبهتها برتقالية . تسرح من حزيران الى ايلول .
مرتها المرابي الزبطة والاشباب المتعوية حيث تلتهم مختلف
انواع المولم || يرقاتها غاصلة تركب الارواق وتمش
عليها .

٣١٠٥١ - يَسْتَف هَزْلُوك *
Seoptera vibrans (S). Ortalis vibrante (F).

ذبابة من اليسفيات صغيرة القد ، طويلا يراوح من ٥
الى ٧ م . جسمها ازرق اللون . رأسها الى الشقرة العابقة .
قوائمها سود . اسافلها حطلية كتنيق باستمرار اعتراز
جناحها . تسرح من حزيران الى آب . مرتها الاشباب
والمرابي حيث يكث الارق والمولم || يرقاتها هواكة
مضاعلة عند الحاجة .

٣١٠٥٢ - يَسْتَفِيَّات *
Ortaliidae (S). Ortaliidae (F).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . انواعها المروعة
نواد ٤٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم . حشرات ذبابية
الشكل . اناتها سلسلة بارزة حادة تستعملها للفرز . انوعها
عديدة الالوان الزاهية المتراكبة || يرقاتها دامتة او غاصلة

Chevreau (F).

Small goat, Young roe (E).

٣١٠٦٤ - يَغَر

هو الجدي والحلام والرفلة .

Diplax, Sympetrum (S). * ٣١٠٦٥ - يَغْرُوس

جنس حشرات من فصيلة البسويات، أنواعه عديدة جميعها مفترسة تقتضي على الحوام . طول اجسامها يراوح من ٣٠ الى ٤٠ سم . وبسطة أجنحتها تراوح من ٤٢ الى ٦٠ سم . ألوانها المتخلية إلى الخطي الصنابي المارح . أجنحتها وردية الجسم ، صفر الفؤاد يعلوها في أول زاماتها الاخيرة خطوط معتزلة صناعية اللون . رقباتها عارية عديمة الحلب مستطيلة الاربعل تعيش في رسوخ المنائق ويحاري الماء .

Orthetrum (S). * ٣١٠٦٦ - يَغْس

جنس حشرات مفترسة من فصيلة البسويات ، أنواعه عديدة، طول اجسامها يراوح من ٣٥ الى ٤٧ سم . وبسطة أجنحتها تراوح من ٥٥ الى ٧٠ سم . ألوانها إلى الزرق . روسيا خضر . اناتها ابيض ثوباً ويحنا . رقباتها زياه الجسم تعيش في الاسال .

Libellula (S). * ٣١٠٦٧ - يَغْسُوب

Libellule (F). Dragon fly (E). جنس حشرات من فصيلة البسويات، أنواعه عديدة، اجسامها مستطيلة ، طولها يراوح من ٢ الى ٤٦ سم . وبسطة أجنحتها من ٥٥ الى ٧٦ سم . ألوانها خطية أو مكتنية اللون . أجنحتها شفافة شرجية الزاويق . جميعها مفترسة، بعضها يحمل على النحل .

Libellulidae (S). * ٣١٠٦٨ - يَغْسُوبِيَات

Libellulidae (F). Dragon flies (E). فصيلة حشرات من رتبة العناشات . أجنحتها وانواعها كثيرة العدد، جميعها مفترسة تألف المنائق ويحاري الماء . كدودها اصفر قداً من اناتها ولونها لوناً سبياً . اناتها تقذف بمكثها فردياً على سطح المنائق وعلى صفحة الماء فينتفخ عن دمايص جاسة تعيش كامل حياتها البرقية في الماء او في الرطل . حشرات الكاملة تتميز بعدم انطلاق أجنحتها في الاستراحة والرقاد || اشهر اجناسها البسوب واليسس والبسوس والكرولون .

Stachyurus (S). * ٣١٠٦٩ - يَغْشِيل

Stachyure (F). Stachyurus (E). جنس جنات مصرة برية وزمانية تزينة من فصيلة البشليات، سقها تملو من مزين إلى اربعة امتار . اوراقها عابلة متناقة ، مسنة الحصار ، تظهر بعد الانزهار . انزهارها سبلي التجميع . انزهارها صغيرة يضاء اللون أو صفراء ، رباعية الفصل والبتلات واللياس ، ثمانية الاسدية . ثمارها متينة صغيرة || اعرف ألوانها واشهرها التالية :

Stachyurus praecox (S). Stachyure précoce (F).

نوع من البشيل . جنيته تزينة تملو نحو ثلاثة امتار . ساقها منتصبة . افئذها قضيعة مرنة . اوراقها الاليجية طولها نحو ١٨ سم . وثمره نحو ٩ سم . نصلها رفيعة ، مسنة الحصار ، جميلة الحصار الزاهي . انزهارها سبلية التجميع ، متدلية ، صفراء اللون || تنويرها يستمر من شباط إلى نيسان .

Jade (F).

٣١٠٥٨ - يَسْم

حجر صواني التركيب شديد الصلابة .

Echites (S). Echitès (F). * ٣١٠٥٩ - يَسْمِيَت

جنس نباتات برية طيبة من فصيلة الدخليات . انواعها المعروفة قليلة . جميعها امريكية الميث . معظمها لولبي متسلق وبسها جبني . سقها سرسة مائلة . اوراقها متعكة ، يصفية ، متناقلة . انزهارها كبيرة القند زاهية الالوان منها الابيض والاصفر والاحمر . ثمارها جرابية الشكل نجيله القند || يستخرج من سقها بالحز عصاره لبنية يضاء اللون ، حريقة الطعم ، جمالية المادة لها استعمالها الطبي || اعرف انواعه واشهرها .

Echites biflora (F).

يَسْمِيَت ثنائي الزهر

Echites à feuilles verticillées (F).

يَسْمِيَت ضميّ الورق

Echites à corymbes (F).

يَسْمِيَت علقيّ الزهر

٣١٠٦٠ - يَسْمُورَةُ الْبَاذَنْجَان ، نَارِيَةُ الْبَاذَنْجَان

Euzophora osseatella (S). Euzophore de la bergine (F). فراشة من الثاريات ، صغيرة القند . بسطها نحو ١٧ سم . ريشها الاماميان إلى السمرة يتوصلها يتبع أسود داكن . ريشها الخلفيان مفضان . رقبها مستطيلة الجسم ، خبازة اللون ، مكتنية الرأس ، تركب نباتات الفصيلة الباذنجانية اخصها الباذنجان والبقيلة والبطاطا تنشب السوق وتدخلها مع جوام التربة وتتابع نخرها وأذاها صمداً ما استطاعت .

Raie (F). Trost of the deers (E). * ٣١٠٦١ - يَسَّار

صوت الأيل . واليهار شمرة في الصحراء تأكلها الأيل (الأسان) .

Paophia (S). Agami (F). * ٣١٠٦٢ - يَسْمَحْمِي

جنس طير من طوال الساق . أنواعه المعروفة قليلة العدد تجمع بين الضفك واللقلق . أصنافها ضفاف نهر الامازون . اجسامها ربة . أعتاقها متوسطة الطول . رؤوسها كبيرة . مناقبها غرورية ذرية سادة الملاقط . أجنحتها قصيرة . انانيتها شديدة القصر . ارسافها جيفية مستطيلة . ارياشها ناعمة دملة . رؤوسها وأعتاقها وبطنها مخملية الريش والرقن || اعرف أنواعه واشهرها البسمي للجب .

٣١٠٦٣ - يَسْمَحْمِي جَبب * ، طائر البوق

Paophia crepitans (S). Agami bruyant, Oiseau-trompette (F).

نوع من الباجيم صوته ككتلين البوق يردد أكثر من ٢٠٠ مرة في النهار . وهو طائر كبير القند طوله يراوح من ٥٢ الى ٦٠ سم . ثوبه شديد السمرة اللامعة . رأسه وصفته وظهروه ومدبره وبطنه واكتيكه سود . جناصه ألى الجفوة السوداء يعلوها موج أزرق وانخضر . حلقه صبه غرورية . زفده وصفاه حمر . مقاروه أس || أصنافه ضفاف نهر الامازون اخصها الصفاف الثالية . يعيش زمرّاً وارساباً يراوح عدد افرادها من ٣٠ الى ٥٠٠ وأكثر قوته البار واليدور والحشرات والبهدان . يث في الخوص للفسوي الشكل يلفه بالحشرات الناعمة ويطوقه بجمار من القش والطين . أثناء تفتش من ١٠ الى ١٢ بيضة تحضنها نحو ٣ اسابيع || يلدن بدون عناء وإذا عاش مع البط والأوز والدجاج والحش حافظ عليها كالحارس الأمين .



يَسْمِيَت



بسمي جب



يغروس



يغس



يغسوب



بصوم النجيبات



بغصيد



بغصيد



بغصيد



بغصيد

٣١٠٨ - بَحْثُ بَحْثٍ

هو الرأوند الربابسي ، اطلية .

٣١٠٨١ - بَحْثُ بَحْثٍ

Callichromis (S). Callichromis (E).

جنس حشرات من عذبات الاجنحة طول القرون وصيلة الزعقبات . انواعه المروقة كثيرة البدن منتشرة في جميع اصقاع البلاد الحارة . جميعها نائلة ودائمة تميش على المواد العضوية والنباتية المنحلة || تتميز باستطالة الاجسام والقرون الاستشعارية والقوائم الخلفية . اجسامها معتدلة الخطوط طول من ٢٥ الى ٤٥ سم . كواهلها مكورة محصورة . عيونها بارزة . اذناها خفية للاحقة . اولياها عديدة الالوان السوية . يتكرر فيها الاخضر والاسفج والكتشي الافتح المواج .

٣١٠٨٢ - بَحْثُ بَحْثٍ

Coleonema (S). Coléonème (F). Coleonema (E).

جنس نباتات جنينة معمرة من فصيلة السذابيات . منها بعض مناطق افريقية الجنوبية والشرقية . سيقانها ترتفع من ٣٠ الى ١٠٠ سم . اولياها ابيدة متعاقبة شبيهة اتصال المسنة الاطراف الجامدة . اذناها خفية لفصل والبلايتات ، صهارية الاجنحة ، مختلفة الالوان والتجميع || انواعها المروقة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

٣١٠٨٣ - بَحْثُ بَحْثٍ

Coleonema album (S). Coléonème blanc (F).

نوع من البيرة الزرقانية . ساقها تملن من ٣٠ الى ٦٠ سم . اولياها تطلو نحو ١ سم . وتعرض نحو ١ سم . اذناها بيضاء اللون ، فردية التجميع ، طرفية الاوتكاز ، مهدبة التوزيع والقنابات ، مقبوضة البلات || تنويرها يستمر طوال فصل الربيع والخريف .

٣١٠٨٤ - بَحْثُ بَحْثٍ

Coleonema pulchrum (S). Coléonème superbe (F).

نوع من البيرة الزرقانية . ساقها فراء تملن نحو ١٠٠ سم . اولياها سنانية التصل تطلو من ٢ الى ٥ سم . عصبها مهدبة شاذكة . اذناها ثلاثية او رباعية التجميع ، طرفية الاوتكاز ، حراء اللون ، خافتة العرف الطري || تنويرها يستمر طوال فصل الخريف .

٣١٠٨٥ - بَحْثُ بَحْثٍ

Hygrobia (S). Hygrobia (F). Hygrobia (E).

جنس حشرات مائية مفترسة من فصيلة البيرويات ونبات عذبات الاجنحة . انواعه المروقة قليلة البدن منتشرة في بعض مناطق المالمين القديم والجلدي || اجسامها صغيرة ، شبه بيضوية الشكل ، تطلو من ٨ الى ١٠ سم . رؤوسها صغيرة ، مستعرضة المؤخر . عيونها صغيرة ، بارزة . قرونها الاستشعارية غليظة . تآشيرها وفكوكها ولباسها متوسطة القد . كواهلها مستعرضة ، قليلة الطول . اذناها مهدبة ، للاحقة . قوائمها شديدة النقط . اولياها وحيدة اللون . تكثر فيها البصرة الحيدوية المواج || تألف المنايع والادوار والياه الراكدة . تميش على النباتات المائية وفي الاحمال ، قوتها كل ما تصطبغ قصه من دوبيات .

٣١٠٨٦ - بَحْثُ بَحْثٍ

Hygrobiidae (S). Hygrobiidae (F). Hygrobiidae (E).

فصيلة حشرات مائية من عذبات الاجنحة . اجناسها

٣١٠٧١ - بَحْثُ بَحْثٍ

Stachyurus chinensis (S). Stachyura de Chine (F).

نوع من البشيل . جنينة تربيتية تملن نحو اربعة امتار . ساقها متراكبة الانقاد المنسطة . اولياها اعليجية ، ذلقة الزام الاخضر ، تطلو نحو ٢٥ سم . تصالها بحيلة الخصار الماكن ، مسنة الحار . اذناها سبلي التجميع . اذناها بيضاء اللون ، صغيرة القد || تنويرها يستمر من ايار الى تموز .

٣١٠٧٢ - بَحْثُ بَحْثٍ

Stachyuraceae (S). Stachyuraceae (E).

فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة مستقلة القامات اجناسها وانواعها المروقة قليلة البدن منها بعض مناطق الشرق الاقصى والجزر . جميع انواعها غبريات وجنبات معظمها بري وبعضها زراعي تربيتي || اشهر اجناسها البشيل .

٣١٠٧٣ - بَحْثُ بَحْثٍ

Isosoma graminicola (S). Isosoma des graminées (F).

حشرة خاضعة من فصيلة السوبليات ونبات غشائيات الاجنحة المحصورة . موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة والمنسرفة نحو الحارة || جسمها صغير القد يطلو نحو ٣ سم . رأسها مستعرض . جوشها مستطيل . يطنها فاسر وقصير . زرقوتها الاضيرة عحرانية الشكل . مرزها مدبب وقصير || تصطبغ على النجيليات ومنها القمح فتذليها .

٣١٠٧٤ - بَحْثُ بَحْثٍ

Leontodon (S). Léontodon, Dent de lion (F). Hawkbit, Lion's tooth (E). Löwenzahn, Kuckblume (D). Tarassaco, Dente di leone (I).

نبات عشبي بري معمر من فصيلة المركبات . اولياها كبيرة مفترسة زراعا الماشية وتسن عليها . اذناها رؤسية ، صغيرة القد ، كثيفة التجميع ، لينا الى الصفار الكبير . مصارة لزجة ، مرة الطعم ، طيبة .

٣١٠٧٥ - بَحْثُ بَحْثٍ

Hera (F). Young deer (E).

صغير الابل لا يزال يتبع امه .

٣١٠٧٦ - بَحْثُ بَحْثٍ

هو الحجل الرومي ، اطلية .

٣١٠٧٧ - بَحْثُ بَحْثٍ

Jacobaea (S). Jacobée, Herbe de St Jacques (F). Jacoby (E).

نوع من الشروفة من فصيلة المركبات . وهو نبات عشبي بري معمر يبدل في معظم المناطق المعتدلة من العالم القديم . ساقه تملن نحو ٧٠ سم . اولياها خافتة متعاقبة ، تصالها مفترس الصلصة المستطيلة . اذناها رؤسية صفراء اللون . يقال انه من النباتات النافعة . مصارته تملن الجرح . ونهم من قال انه يغيد القرعة .

٣١٠٧٨ - بَحْثُ بَحْثٍ

Pragmatisme (F). Pragmatism (E).

البيعية مذهب فلسفي محوره معرفة الحقيقة من قدر نتائجها العملية .

٣١٠٧٩ - بَحْثُ بَحْثٍ

الجلدي والصغير من الفان . ج يماير .

٣١٠٩٣ - يَقَنْ

اليقن: هو البعل اذا اربع. ج يقن.

٣١٠٩٤ - يَقَنَّة

هي البقرة الحامل لأول مرة. ج يقنات.

٣١٠٩٥ - يَقَاطُ ٥

Scrapera

Strépare, Réveilleur (F).

جنس طير من الجواثم وفصيلة القرايبات، انواعه المروقة قليلة العدد موطنها بعض مناطق استرالية. تألف الغابات وصفات الاثر. ملجئها الحياتي جماعي. افواجها تمتد من ٣٠ الى ٨٠ زوجاً. قوتها الثمار والبذور والحشرات والذوئيات || تتميز بكثرة لعيمها المزيج الذي تردده مثل الصياح الباكر || اجسامها شبيهة باجسام الشقوة او غراب الزرع. مناقبها غروطية جالسة. اجنحتها لاحفة. اذناها شبه غروطية. اقلوها الى السواد الاسفنج وبعضها الى السواد الازرق المزاج. اقفاؤها واجنحتها مبطنة ومطوقة بالابيض || تدقن في الاقفاص الباسقة. اناثها تضع من ٦ الى ٧ بيضات تحضنها بمفردها بينا الذكور تلقن لها الغذاء.

٣١٠٩٦ - يَقْصُرْم ٥

جنس حشرات من فصيلة القيصويات ورتبة ذوات الجناحين انواعه المروقة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٥ الى ٨ م. رؤوسها شبه مزوانية الشكل، مسطحة. ميوزها كبيرة، فارقة عند الشقين. قرونها الاستشعارية قصيرة، ثلاثية القنصل. تأثيرها صغيرة. ملاسها ثنائية العمل. كواسها ضيقة. بطونها مستطيلة، صغيرة المرزات القلبية، رواشها تلبية الخصب. افخاذ قوائمها الخلفية شديدة الضخامة || تألف الحراج والغابات. قوتها طلع الانهار ورحيقها. يرقاتها وأجنحة تفتقر ما تستطيع من حركات.

٣١٠٩٧ - يَقْصُومِيَات ٥

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجسامها وانواعها المروقة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم. تألف الغابات والحراج || اجسامها متفاوتة القد، تطول من ٥ الى ١٢ م. رؤوسها مزوانية. عيونها فارقة عند الشقين. قرونها الاستشعارية ثلاثية القنصل. تأثيرها صغيرة. ملاسها ثنائية العمل. كواسها شبه اسطوانية. بطونها مستطيلة. رواشها شائعة عند معظم الاجناس. الافخاذ قوائمها الخلفية مستضخمة || يرقاتها وأجنحة، شبه دودية الشكل || اشهر اجناسها اليقصوم.

٣١٠٩٨ - يَقْطِين هو القرقع، اطليه.

٣١٠٩٩ - يَقْطِين اقْرَع * ، قتاوون المير

Cucumis melopepo (S). Pétison, Mélépépon, Bonnet d'électeur (F). Squash (E). Melon-Kürbiss (D). Melopopeo (I).

نوع من القرقع وهو نبات عشبي قوامه رزاعي شائع الاستعمال. ساقه مدادة لا قياسية الطول والارتفاع والتساقط. ثماره متصلة قلنسوية الشكل مستديرة الحمار الشقين المفروض. لياها جامد المكسر، متوسط الحلاوة، جيد الصنت يبلخ ويريب || زراعته لا تستوجب عناية خاصة.

وانواعها المروقة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق المالحين القديم والجديد || اجسامها صغيرة، شبه يفسية الشكل، تطول من ٦ الى ١٥ م. رؤوسها مستقيمة، مستقلة. عيونها ناشزة. قرونها الاستشعارية عيطية، مركبة من ١١ فصلة. كواسها مستديرة، قليلة الطول. افخاذها لاحفة. قوائمها شديدة التقط || جميعها مفترسة ودائمة تميش في امال المياه الرائكة || اشهر اجناسها القيرروب.

٣١٠٩٧ - يَقَاع هو الققمة، اطليا.

٣١٠٨٨ - يَقْرُود ٥

Aphrodes (S). Aphrode (F). جنس حشرات صغيرة القد من فصيلة الورديات. انواعه عديدة، اصطناعها العالم، مرتعها اعشاب المراعي. اجسامها يفسية الشكل تطول من ٣ الى ٥ م. رؤوسها مثقلة اقزوايا. اقواها ملونة يكثر فيها التلجيج المتفرس. اقصرها زعيدة لا تستوجب المكافحة.

٣١٠٨٩ - يَقْرُود الرِيَّاس ٥

Aphrodes histrionicus (S). Aphrode comédien (F). حشرة من فصيلة الورديات ورتبة متجانسات الاجنحة. جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ م. رأسها كبير الجرم، لونه الى الخضار الالسي ملون زعقة يضاء. عظمها معتدل الطول. عيناها كبيرتان. زبانها قصيران. كواسها مستطيل الشكل، ابيض اللون، اخضر الحمار الذي يتنام الحبيطة. حبيبتها حمرة، بنية مجذعة بالاسود. ظهراها كامل الحبيبة، لاحف، ابيض اللون، بني التلجيج والتدبيج. رواشها شقائق شفافان. بطنها اسمر. قوائمها كثيفة الحلب الشالك || تألف الرِيَّاس والمروج. قوتها التسع.

٣١٠٩٠ - يَقَعَة

Raphiolepis (S). Raphiolepis (F). جنس شجيرات برية وزراعية ثمرتية من فصيلة الورديات. مهدا يتد من القرقع الاقوى الى اليانها. سوكها فراء، مبشرة الاقنان، تملو من متر الى ثلاثة امتار. اوراقها ابيدة، احليجية الشكل او ستانية. نصلها جامدة، حبيبة الخضار العانيق. ازهارها عطرية العرف، عتقودية التجميع او عتقودية، مختلفة الاقنان. ثمارها حنينة سوداء اللون || انواعها المروقة قليلة، اشهرها التالية.

٣١٠٩١ - يَقَعَة البَتَّخَال ٥

Raphiolepis indica (S). Raphiolepis du Bengale (F). نوع من البقعة البتريينية. ساقها تملو من مترين الى ثلاثة امتار. اوراقها ابيدة، احليجية، مستديرة القاعدة والطرف. نصلها جميل الخضار اللامع. ازهارها يضاء اللون بعلها تمسح وري واجر. اسديتها بنية اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران.

٣١٠٩٢ - يَقَعَة عَيْمِيَّة ٥

Raphiolepis umbellata (S). Raphiolepis à ombelles (F). نوع من البقعة البتريينية. ساقها تملو من متر الى ثلاثة امتار. اوراقها ابيدة، يفسية متمكة تطول نحو ٩ م. وتمرض نحو ٥ م. نصلها جلدية التسج، مستديرة الاطراف تبدو كجسومة من الخيام. ازهارها يضاء اللون عطرية العرف، صغيرة القد، ظهراها من ١٥ الى ٢٠ م. || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران.



يقرود



يقاع



يقطين اقرق

إيطلي الارتكاز أو طرقي. ازهارها قرمزية اللون، قطرها نحو ٢٥ م. || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف.

٣١١٠٨ - **بَكُورِيَّةٌ** *
lochroma (S). lochroma (F). lochroma (E).

جنس جنبتا معمرة من فصيلة الباذنجانيات. مهدا بعض مناطق امريكية الجنوبية. سقاها تملو من متر الى ثلاثة امتار. اوراقها كاملة، متعقبة، متعاطية. ازهارها زرقاء اللون أو حراء. || تزرع للزينة في الحدائق وهي من النباتات السريوية التي تجود في جميع الاقربة || انواعها المرفوعة عديدة، اشهرها التالية.



بقليّة

٣١١٠٩ - **بَقْلِيَّةٌ** *
Citrouille, Courge (F). Pumpkin, Gourd (E).
هي القرعة ثمرة القرع أو البقطين. اشكالها واحسانها عديدة متباينة. اوراقها متضاربة تراوح من كيلو واحد الى ٥٠ كيلو. لبها غذائي يطبخ ويريب، متوسط ما يحويه من مواد:

ماء	% ٩٥٦٠
مواد ازوتية	% ٠٢٨
مواد دهنية	% ٠٢٥
مواد استخلاصية	% ٣٨٧

٣١١١٠ - **بَقْلِيَّةِيَّات** هي القرعيات، فصيلة نباتية.

٣١١٠٢ - **بَقْتِي**
البَقْتِي: جبار التفل. القلمعة منه يقد.

٣١١٠٩ - **بَكُورِيَّةٌ اَنْبُوِيَّةٌ**

lochroma tubulosum (S). lochroma tubuleux (F).

نوع من البكورية. منبتها كولومبيا. ساقها تملو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها احليجية مستطيلة. نصالها خلية البشرة. ازهارها مطبق التجميع، محوري الارتكاز. ازهارها مستطيلة المالحق، متدلية، لونها الى الزرقاء الحسيلة. ثمرجاتها انبوية الشكل تطلو من ٣ الى ٤ م. || تنويرها يستمر طول شهر آب.

٣١١١٠ - **بَكُورِيَّةٌ سَنَابِيَّةٌ**

lochroma lanceolatum (S). lochroma lancéolé (F).

نوع من البكورية. منبتها بلاد الشيل. ساقها ترتفع من ١٢٠ الى ٣٥٠ سم. اوراقها سنانية الشكل تطلو من ١٢ الى ١٥ سم. وثمر من ٤ الى ٦ سم. نصالها كثيفة الحبل الاخير اللون. ازهارها شبه صيواني الشكل، محوري الارتكاز. ازهارها بنفسجية اللون، ثمرجاتها تطلو نحو ٥ سم. || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف.

٣١١١١ - **بَكُورِيَّةٌ قِرمِزِيَّةٌ**

lochroma coccineum (S). lochroma écarlate (F).

لوع من البكورية. منبتها بعض مناطق امريكية الوسطى. ساقها مزينة العماء تملو من متر الى مترين. اوراقها سنانية الشكل مستطيلة الطرف. نصالها خلية الصفحات السفلى. ازهارها شبه صيواني التجميع، محوري الارتكاز. ازهارها قرمزية اللون متوسطة القد، قصيرة المالحق. ثمرجاتها تطلو نحو ٥ م. || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف.

٣١١١٢ - **بَكُورِيَّةٌ كَبِيرَةٌ الزَهْر**

lochroma grandiflorum (S).

lochroma à grandes fleurs (F).

نوع من البكورية. منبتها جبال البرير. ساقها تملو من مترين الى ثلاثة امتار. اوراقها احليجية الشكل تطلو من ١٥ الى ١٧ سم. وثمر من ٧ الى ٩ سم. نصالها عادية الحبل حل الصفحات العليا، مزينة الصفحات السفلى. ازهارها كبيرة القد، لونها الى الزرقاء السيلاجينية. ثمرجاتها تطلو من ٥ الى ٦ م. || تنويرها يستمر من الصيف الى الخريف.



بكورية

٣١١٠٣ - **بِكَاكْسَةٌ**

Sphaeraleas (S). Sphéralcée (F). Sphaeraleas (E).

جنس نباتات جنبتا أو عشية من فصيلة الخيازيات. مهدا بعض اصناف امريكية الجنوبية، اقلها اقليم البرتغال. سقاها فراء تملو من ٥٠ الى ٣٠٠ سم. شكلها شكل الخبازة. اوراقها مهدبة النصال، حراء اللون أو بنفسجية || انواعها المرفوعة قليلة المدد، اشهرها التالية.

٣١١٠٤ - **بِكَاكْسَةٌ خَمْرَاء**

Sphaeraleas miniata (S). Sphéralcée rouge (F).

نوع من البكاسة. جنبتا تزينية معمرة مهدا بلاد الاربعين. ساقها فراء تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها ثلاثية الفلق المتضاربة المختار. نصالها خلية البشرة، بحرية الخصار. ازهارها فردية حراء اللون زنجفورية المالحق || تنويرها يستمر من تموز الى تشرين الثاني.

٣١١٠٥ - **بِكَاكْسَةٌ صِيَوَانِيَّةٌ**

Sphaeraleas umbellata (S).

Sphéralcée en ombelle (F).

نوع من البكاسة. جنبتا تزينية معمرة مهدا المكسيك. ساقها ودية تملو نحو ثلاثة امتار. اوراقها خاصة أو سباعية الفلق البامدة التستين. نصالها بحرية الخصار. ازهارها صيواني التجميع، محوري الارتكاز. ازهارها بنفسجية اللون، كبيرة القد، قطرها نحو ٦ سم. || تنويرها يستمر طوال فصل الخريف والشتاء.

٣١١٠٦ - **بِكَاكْسَةٌ قَبْلِيَّةِيَّةٌ اَلْوَرَق**

Sphaeraleas acerifolia (S).

Sphéralcée à feuilles d'érable (F).

لوع من البكاسة. جنبتا تزينية معمرة مهدا بعض مناطق كاليفورنيا. ساقها فراء تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها ثلاثية أو خاصة الفلق، قريبة اللون بوبق القيقب. ازهارها فردية ليكية اللون أو بيضاء، قطرها نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف والخريف.

٣١١٠٧ - **بِكَاكْسَةٌ مُمْنُو**

Sphaeraleas Munroana (S). Sphéralcée de Munro (F).

نوع من البكاسة. شبه تزينية سريوية مهدا بلاد كولومبيا. ساقها فراء تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم. اوراقها ثلاثية الفلق المستنة الاطراف. ازهارها متفويدي التجميع،

٣١١١٣ - **بِكُفُورِي**

Camphorifère (F). Camphoriferous (E).

نمت تعريفي يطلق حل كل ما ينتج الكافور.

Ullucus tuberosus (S).

Ulluco, Ulluque (F).

نبات عشبي حولي وحيد الجلس واللون من فضيلة السرمقيات. اعطاهن البلاد الامريكية يكثر في الأند وبوليفيا والبرازيل وفرنسا الجديدة. جلوه صفولية. ساقه عشبية جارية اللون. اوراقه متعاقبة منمقة، نصلها تليي الشكل غليظ الصفحة. ازهاره صغيرة القد عنقودية التصنيع عوروية الارتكاز. عسلها تشمل استعمال البطاطا وهي اجاصية الشكل، جوزية الحجم، وردية اللون، صفراء اللرب. يكثر بالزور وبالصالق.

Columba intermedia (S).

Biset, Bizet, Petit ramier (F). Rock-dove, Stock-dove (E). Hohitauba (D).

نوع من الحمام البري الخفيف الطيران. يقال ان الحمام الداجن نحد منه بين الحيدان. طوله نحو ٣٠ سم. لونه الى الرمادي الخفيف. اجنته مضطعة بالاصفر، نوادها بيض. رأسه شديد السمرة عايق الموج. صدره جوي. مقار جالس دقيق. افنكه اسمر الانتساب، حطلي انطرف. موطنه فسج الارياض يسم الشرق واروية وافريقية. يأنف المناطق البرية القليلة الانجار. يعيش ارباباً صغيرة يروح منه الواحد من A الى ٣٠. قوته الجيوب واليزور. يذئق عقه في تجاليف الانجار وقباب الصخور. اناله تحسن من مرتين الى ثلاث مرات في السنة. حشفتها ييشتان.

Phascolomys (S).

Phascolome, Wombat (F). Wombat (E).

جنس حيوانات لبونة جاسنة من فصيلة اليكسباتيات اي الجرذان الجارية. انواعها المعروفة ثلاثة موطنها استراليا والجزر المجاورة. اجسامها رمية، قصيرة القوائم والذنب، تطول من ٦٥ الى ٧٥ سم. رؤوسها شبه مخروطية الشكل، قصيرة الاطعام المقطوعة. عيونها صغيرة. اذنانها قصيرة متصببة. اوبارها ناعمة. اثنواها تراوح من الصفرة الى السمرة السوداء. اخافيرها قوية تمكها من حفر التربة. الاثني تحمل رضيعها في جراب رجب البب مركزة في مؤخر البطن. تسرح في الليل وتبيت في النهار داخل انفاق تحفرها في التربة. قوتها الاعشاب البرية والجلود. اما الانواع الثلاثة فهي:

Phascolomys ursinus (S).

Wombat ourson (F).

Phascolomys latifrons (S).

Wombat à front large (F).

Phascolomys vulgaris (S).

Wombat commun (F).

٣١١٢٣ - يُصْبَاطِيَّات (F).
فصيلة حيوانات لبونة جاسنة قديمة جرذان جارية، اعطيا.

٣١١٢٤ - يُسْخُور، رَعْل (F).
Abellie mâle (F). Drone (E).

اليسخور او الرعل الذكر من النمل. وهو كابل الشوار الشقي، عادم الشذام اللاسع، اطول قدماً من النحلة العاملة واعظف جسماً منها. يحكم الملكية، اي الانثى الكاملة الاعضاء التناسلية والمعروفة ايضاً بالجل، مرة واحدة في حياتها وذلك قبل ان تهاش متع المان، ثم يموت على اثرها. ج يساخير ورسال.

Ortalis (S).

Ortalide (F). Ortalis (E).

يكوس هو الاسم البرازيلي. جنس طير من رتبة الدجاجيات وفصيلة الغرناسيات. انواعها المعروفة نحو ٢٠ منتشرة في معظم مناطق امريكا الاستوائية. تألف الغابات والاراج الغظلية القريبة من الماء. ملجأها الحيائي جماعي. باعائها لامتسارية البعد الذي يراوح من عشرة اذراع الى مئة زوج واكثر. قوتها التار والحبوب والبلور والخشرات المختلفة الفصائل والاناوج. اجسامها مستطيلة رشيقة. رؤوسها صغيرة. مناقيدها كبيرة، جالسة، مدنية الملاط. اعناقها مستطيلة. اجنتها مستديرة. اذياها كبيرة مزروانية الاطراف. اثنواها تختلف مع الانواع، ويكثر فيها انخضار الزيتي والشهية والشمسة. انانها اصفر قدماً من ذكورها وتحتل بنفس الاثواب. تكدن اعشاشها في الانجار الريفية. انانها تحسن وسعها من الى ه يسات على مرتين في اخل. الترخيم يستمر نحو اربعة اسابيع. الذكور تزين الهامة والذئاد. تتجر من الطرائد المزيرة. لحومها فاخرة الصنف، مرغوب فيها. اشهر انواعها واعرها:

Ortalis ruficeps (S).

Ortalis motmot (S).

Ortalis veluta (S).

Lantzia (S).

Lantzie (F). Lantzia (E).

جنس حيوانات متعينة من الرخويات مدنيات الارجل وفصيلة القنيات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطاهن بعض جزر المحيط الهادي. تعيش في المناطق قوتها المواد النباتية والاعشاب. اصداها صغيرة القد، محلزة، قصيرة القوائم الاشد. رؤوسها ريفية مقطوعة. لواسها مبطلة سبانية الشكل، اربطها وحيدة مستعرضة.

Fallenia (S).

Fallénio (F). Fallénio (E).

جنس حشرات من فصيلة النيصيمات ودية ذوات الجناحين انواعها المعروفة خمسة اعطاهن بعض المناطق الحارة والمعتدة الحرارة. اجسامها ضخمة، شبه ييفية الشكل، كثيفة الخمل، تطول من ٩ الى ١٦ م. رؤوسها مستعرضة، قليلة النشور، عيونها كبيرة، فارقة عند الشقين. قرونها الامتسارية صغيرة، ثلاثية الفصل. ملابسها نحلة. اطعامها صغيرة. كواسها محدودة. يطونها مستعرضة، شبه مقطوعة المؤخر. واثناها شبه شفافة، شفاها غضاب تني باحت. قوائمها متعلة الطول. جميعها وائمة تألف الغابات والمروج حيث تكثر الانجار. يرقاتها غاضلة ودائمة وبمضها نائل.

Unone odorant (F).

٣١١١٧ - يَلَانِي (F).
هو الينون، اعطيه.

٣١١١٨ - يَلَكَة (F).

اليلقة: الهمية البيضاء من عز أو بقرة. ج يلق.

٣١١١٩ - يَلْتَجُوج (F).

Bols d'Aloès (F).
هو عود الد، اعطيه.


بُكُوس



يَلُوكُو



يَام



يَامِاط

٣١١٣٣ - يَمُور

Source (F). Spring (E).

هو الماء الذي ينبع من الأرض. والنباتات حبيبة الاشكال تختلف باختلاف مصادرها واسرارها. منها المتغيرة والمتقطعة والمستمرة والوقتية والاروائية. الخ.

Fontinal (F).

٣١١٣٤ - يَمُورِي

نعت تعريفي يطلق على ما يعيش في الينابيع أو على ما تحويه مياهها من املاح ورواد معدنية.

٣١١٣٥ - يَمُورُح

جنس طير من فصيلة النقيانيات. انواعه قليلة جميعها كروية الجثة تقدرها قدر الحبيشة. رأسها قنبري الريش المستطيل. متقاربا صغير وضعيف. اجنتها عريضة مستديرة. ذنبها متوسط الطول. اسافلها قوية. اطيافها الى الزرقاء الزاوية. اجنتها الى الزرقاء الداكنة تحيطط بعرض فيه الابيض والاريد والاسود. ريش عنفها ويوسها ابيض الانتشاب اسود الجسم. ثأنت السهل المنخفضة الكثيرة الادغال، للقليلة الشجر. تموش ذكراً وأنثى كالحمام. اسراجها متوسطة المدد يراوح عندها من ١٢ الى ٢٠ زوجاً. قوتها الحبوب والحشرات من نصفيات الاجنحة وستقياتها. اناثها لا تحضن البيض بل تضعه في محض من الرمل والورق تحضره على شكل قلة صغيرة قطرها يراوح من ٤٠٠ الى ٥٠٠ سم. وطولها من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. تصف يعضها في ثلثة على حق أو ٤ سم. صفياً متتابعة ابتداء من الاسفل. وهي تبقي في موضعها الحولي الذي يستمر نحو خمسة اشهر من ١٠ الى ١٢ بيضة بعدل بيضة واحدة كل ١٢ يوما. اما البيضة فتفتت بعد وضعها ياسويين من فرخ تشيط كاسي الريش يدر امر نفسه بدون عناء.

٣١١٣٦ - يَمُورُح

Onychiurus, Lipura (S).

Onychiurus, Lipure (F).

جنس حشرات دامت من فصيلة النخوريات. انواعه المعروفة متوسطة المدد، منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة. اجسامها صغيرة، مستطيلة الشكل، مبرشة الحلب، تطول من ٢ الى ٣ سم. اطيافها تراوح من الرمكة السوداء الى البياض الاخير الموج. رؤوسها مفلطحة متحركة الى الاسفل. حيزها طامسة. بطونها مفلطحة، ضيقة المؤخر. قوتهاها قصيرة. ارسافها ثنائية الاظفار للثلاثة القريبة للامتساوية. مبدولة في المواقع الرطبة وتحت الحجارة وفي الجلالة.

٣١١٣٧ - يَمُورُحِيَات

Onychiuridae, Lipuridae (S).

Onychiuridae, Lipuridae (F).

فصيلة حشرات دامت من رتبة الكهكديات. اجنتها وانواعها المعروفة قليلة المدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة. اجسامها صغيرة، مبرشة الحلب، تطول من ٢ الى ٤ سم. رؤوسها مفلطحة، مائلة. حيزها طامسة. قوتها الامتساوية صغيرة رباعية التصل. صدورها ثلاثية المقلات للامتساوية، اصغرها الكحول. بطونها مداسية السكم. قوتهاها قصيرة. ارسافها ثنائية الاظفار القدية للامتساوية القده. أشهر اجنتها النخور.

٣١١٣٨ - يَمُورُ

Triton (S).

Triton (F). Trumpet-shell (E).

جنس دويبات مجرمة من الرخويات وفصيلة الينوسويات.

Hymenanthra (S).

Hymenanthra (E).

جنية معمرة برية وزراعية تربيينة من فصيلة الينسجيات. شكلها قريب الشبه بالمرج. ساقها تطول نحو ١٠٠ سم. اوراقها صغيرة متناحية جلدية المتصال المحروطة الشكل تطول من ٣ الى ٤ سم. ازهارها محورية الارتكاز، قصيرة المالحق، لحسية التركيب، يعضاء اللون، يطولها موج اصفر. ثمارها عتية يصير الحمص، لونها الى البنسجي الموشح بالابيض. تنويرها ربيعي.

٣١١٣٩ - يَمُورُح

Ormosis (S). Ormosie (F).

جنس ابحار حريمية من فصيلة القرنيات القراشية. انواعها المعروفة نحو ٢٠ منها بعض المناطق الحارة والامتساوية من القارة الاسيوية والريكة الجنوبية. سيقها منتصبة، فراء. فروعه شبه افقية الانتشاب. اوراقها مركبة، ريشية، ازهارها عتوية التجميع. ازهارها كبيرة، جميلة الالوان المتراكبة. مستحبة النرف الحالت.

٣١١٤٠ - يَمُورُحِي

Androme (F).

Andromous (E).

نعت تعريفي يطلق على الاسماك التي ترك البحر الى التبر في زمن التلثة.

٣١١٤١ - يَمُورُحِي

Andromie (F).

Andromy (E).

الينسرية غريبة الاسماك التي تجمر المياه البحرية الى النهرية العذبة في زمن التلثة.

٣١١٤٢ - يَمُورُحِي

Pélagique (F).

Pelagic (E).

نعت تعريفي يوصف به كل ما له علاقة مباشرة بالم كقوك العظيم الحية والتيتو الحية.

٣١١٤٣ - يَمُورُحِي

Pélagie (F). Deep-sea life (E).

الحية حياة الكائنات المضاهية في غضم الم.

٣١١٤٤ - يَمُورُحِي

Anagris (S).

Anagry (F).

جنس نباتات برية جنية ونجمية من فصيلة القرنيات القراشية. اوراقها قليلة منها شواطي البحر المتوسط والبلاد العربية ويتركون كناربه. الواحدة بنبوتية. اشهر انواعها الينوت الثن.

٣١١٤٥ - يَمُورُحِي

Anagris foetida (S). Anagris foetida, Bols puant, Pudis (F). Bean-clover, Stinking wood (E). Stinkbaum, Stinkholz (D). Anagride foetida, Fascolaria, Laburno foetida (I).

نوع من الينوت وهو جنية برية طية تعلم من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقه مركبة عابلة، وديقاتها ثلاثية التجميع، فصلها سناني الصفحة، خيل البشرة، يطول نحو ٨ سم ويعرض نحو ٢. ازهارها عتوية الترتيب. ازهارها كبيرة القده مدراء اللون. سفاتها عتوية تطول من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض نحو ٢ سم. زورها بنفسجية اللون جسمية المادة. القليل من نقيج ازهارها واوراقها ينشط الايلاج والياه، والكثير منه مقي.



ينوت



ينوت

اصطابها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداها
بقية الشكل ، حلزونية ، ذرة الاطراف ، جميلة الاذن
المريضة والجذعة || اشهر اجناسها البنوع والمودعة .

٣١١٤٦ - يَنْطُوبَة شَهْبَاء *

Achroia grisella (S).

Pectis teigne des ruches (F).

وقدعى أيضاً حطوبه شهباء || فراشة من فصيلة الترابيات
وقدرة حرشيات الاجنحة . طولها يراوح من ١٨ الى
٢٠ سم . ووشاشها الاماميان رجوشنها الى الصهباء الشهباء
الخالية من التنشج والتنجيد . ووشاشها الخلفيان وبعطها
الى الثغرة الخطية المواج || الاثنى اكبر قدماً من الذكر ||
البرقة عاجية اللون ، سمراء الرأس ، تعيش في خلايا النحل
من امار الى تشرين وقفل ما يفعله عمل النحل من افى
واضرار || وهي من الحشرات الناحية المؤذية لانها تدهل
النازل فخرض الفراء والجلود والقرطاسية والفلين ...

٣١١٤٧ - يَنْمَة ، يَنْشَع ، يَنْشَع (E). Maturité

هو بلوغ الثمرة كالمها المجمودي وقد يتم هذا الفور
من حينها بعد الادراك وقبل النضج .

٣١١٤٨ - يَنْمَة

ضرب من المقيق ، حرته بجودة المواج يطولها توشع
اصفر .

٣١١٤٩ - يَنْمَة Telopea (S). Télépée (F).

جنبة برية وزينية معمرة من فصيلة الفصيات . ساقها
قرعاء تملو من ٢٥ الى ٣٥ سم . اوراقها معتقة ، نصلها
اهليجي الشكل ، غروبي الزام الاخضر ، يطول من ١٥
الى ٢٥ سم . ويعرض من ٣ الى ٦ سم . ازهارها عقودية
التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها ارجوانية اللون ، كبيرة
القد ، ثنائية الترتيب || تنورها يستمر من نيسان الى
حزيران .

٣١١٥٠ - يَنْمَة هو السط الصفي ، اطبله .

٣١١٥١ - يَنْمَة Podanthum (S). Podanthe (F).

جنس نباتات عشية عملة او معمرة من فصيلة الجريسيات .
انواعها المعروفة عديدة ، بعضها من نباتات حوض البحر
المتوسط . ساقها تنصبه اكثر فيها التفصيح . جلولها
حزانية الشكل او لفتية . اوراقها مستطيلة النصل لا
قياسية . ازهارها عقودية التجميع او سلبية ، قاجية
الارتكاز ، جريسية الشكل ، زرقاء اللون || اعرف
انواعها واشهرها ما يتبع .

٣١١٥٢ - يَنْمَة بَيْشَاء Podanthum

canescens (S). *Podanthe blanchâtre* (F).
نوع من الينمة المعمرة ، ساقها دقيقة خالية البشرة تملو من
٦٥ الى ١٠٠ سم . اوراقها لاطفة ، بيضبة الشكل ، سنائية
الزام الاخضر . نصلها خلى البشرة حل صفحته السفلى .
ازهارها عقودية التجميع ، بيضاء اللون . تنورها يستمر
من حزيران الى آب .

٣١١٥٣ - يَنْمَة جِبَارَة Podanthum

giganteum (S). *Podanthe géant* (F).
نوع من الينمة العملة . مهدا جزر اليونان . ساقها
مسطحة قليلة الفروع تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . جلولها
وتدي الشكل . اوراقها معتقة سنائية النصل جامدة الصلصة
المسنة الختار . ازهارها سبيل التجميع ، هامي الارتكاز .

انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة
والمعتدلة الحرارة || اصداها بقية حلزونية وحلزونية تطول
من ٨ الى ٥٠ سم . الوانها جميلة مرقشة وجذعة || اعرف
انواعها واشهرها البنوع اليسوسي .

٣١١٤٩ - يَنْشُوع Tritonia (S). Tritonie (F).

جنس نباتات دوفصية عشية من فصيلة السوسنيات . انواعها
عديدة برية وزراعية زينية . ساقها شراعية تنشج
بالانزهار الابلاسي التجميع . اوراقها صفة سيفية الشكل
او عيطية . ازهارها صغيرة القذ او متوسطة ، الوانها عديدة
تختلف باختلاف النوع || زراعتها لا تتطلب عناية
خاصة وهو يرغب في الارية للمسوية التركيب ، للمضلة
الاندماج ، الفنية بالمواد الازوقية || اشهر انواعها ما
يتبع .

٣١١٥٠ - يَنْشُوع زَعْفَرَانِي Tritonia

crocata (S). *Tritonie safranée* (F).
نوع من البنوع الزيني . ضروبها الزراعية عديدة .
شراخه الزهري يملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . صفة سبي
الشكل مستطيل النصل يعرض من ١٢ الى ١٥ سم . ازهارها
سبيل الترتيب . ازهارها رباعية التجميع ، ثنائية التصنيف
للتقابل لونها الى الصفار الزعفراني || تنوره يستمر
طوال شهر حزيران .

٣١١٥١ - يَنْشُوع عَشَلِي الزهر Tritonia

scillaris (S). *Tritonie à fleurs de scille* (F).
نوع من البنوع الزيني . شراخه الزهري يملو نحو
٣٠ سم . صفة عيشلي النصل يحين الطرف . ازهارها
سبيل التجميع . ازهارها صغيرة القذ ، ودية اللون متراكبة
البلات المقلقة الاطراف || تنوره يستمر طوال فصل
الصيف .

٣١١٥٢ - يَنْشُوع مُدْهَب Tritonia

aurea (S). *Tritonie dorée* (F).
نوع من البنوع الزيني السبروتي الشائع الزاخرة .
شراخه الزهري يملو نحو ٦٠ سم . صفة سبي الشكل
يعرض من ١٨ الى ٢٠ سم . ازهارها سبيل التجميع . ازهارها
كبيرة القذ نظرها نحو ٦ سم . لونها الى البرتقالي الزاهي .
تنورها يستمر من اواسط الصيف الى اواسط الخريف .

٣١١٥٣ - يَنْشُوع مَرُوس Tritonia

securigera (S). *Tritonie arquée* (F).
نوع من البنوع الزيني . شراخه الزهري يملو نحو
٤٠ سم . صفة سبي الشكل يعرض نحو ١٦ سم . ازهارها
سبيل التجميع ، مقوس الشكل . ازهارها متوسطة القذ تطول
نحو ٣ سم . وقطرها ٤ سم . لونها الى البياض العاجي .
تنورها يستمر طوال شهر ايار .

٣١١٥٤ - يَنْشُوع يَنْسُوي Triton


tritonis (S).
اشهر انواع البنوع . يبلغ طول نحو ٥٠ سم . يكثر
رجوده في المحيط الهندي .

٣١١٥٥ - يَنْسُويَات Tritonidae (S).

Tritonidae (F). *Tritonidae* (E).
فصيلة دوبيات بحرية من الرنويات مدييات الارجل
اماميات الهاشم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة .



يَنْشُوع زَعْفَرَانِي



يَنْشُوع يَنْسُوي



يَنْطُوبَة شَهْبَاء

انزهارها ضباب متتابعة لونها الى الزرقاء العابقة يعلوها مواج بنسجي . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣١١٥٤ - يَهْمَةُ حَمَلَةِ النَّجَاح

Antholyza cafra (S). **يَهْمَةُ الكَفَر**

Antholyse cafre (F).
نوع من البهفة التريبتية . شراعتها الزهري يعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم . شراعتها مستقيمة التصل المستطيل . انزهارها سنبل التجميع . انزهارها ثنائية الارتكاز تمتد من ١٢ الى ٢٠ زوجاً . لونها الى الحمرة الارضوانية || تنورها يستمر طوال شهر حزيران .



ينون

٣١١٦٢ - يَهْمَةُ عُنْكَبُتِيَّة

Antholyza paniculata (S). **Antholyse en panicule** (F).

نوع من البهفة التريبتية . شراعتها الزهري يعلو نحو ٩٠ سم . شراعتها تطويل من ٤٠ الى ٦٠ سم . وتفرس من ٦ الى ٨ سم . نصلها لا نظامي الانسجام والتجميع . انزهارها عشكولي التجميع . انزهارها كبيرة القد فريدة الارتكاز . لونها مراكب الصفرة والحمرة البنفسجية || تنورها يستمر من حزيران الى تموز .

٣١١٦٣ - يَهْمَةُ كُونُو

Antholyza cunonia (S). **Antholyse de Cuno** (F).

نوع من البهفة التريبتية . شراعتها الزهري يعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . شراعتها مستقيمة التصل المستطيل . انزهارها سنبل الترتيب . انزهارها فريدة التجميع ، متعاقبة الارتكاز ، لا يفرق عنها ٦ ولا ينقص من ٤ . لونها مراكبة ، انبساطا كبريتية الصفار ، يتلاتها الى الحمرة الزاهية . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

Monsonia (S). *Monsonie* (F). **بَهَق**

Monsonia (E). *Monsonie* (D). *Monsonia* (I).

جنس نباتات عشبية مسمرة من فصيلة الفروقييات . انوعه عديدة ، مهدها بعض الكوار افريقية الجنوبية انحصا منطقة رأس الرجاء الصالح . سوطها مفصلي مستطيلة . اوراقها متعاقبة ساجنة . انزهارها جملة الشكل ، مختلفة الالوان ، ذكية العرف الخافت || معظمها نبات بري وبعضها ترابي يزدهر في المزارك والحدائق . يتكاثر بالبذور والتعقليل .

٣١١٦٥ - يَهْمِير ٥

Anomalurus (S).

Anomalure (F).

جنس حيوانات قاضية من فصيلة البيريات . انواعه المعروفة تسعة موطنها البلاد الافريقية الحارة || اجسامها متوسطة الحجم ، طولها يراوح من ٣٠ الى ٤٠ سم . وذانها من ١٢ الى ١٦ سم . رؤوسها صغيرة القد . اذنانها بيضبة الشكل . اذنانها جلطة الصفو . جرائرها قصيرة ، انزهارها حادة مستطيلة . روافلها الجانسية مستعرضة . الزوايا سوية اللون تراوح بين الصهبة والصفرة || تألف الكفافات ، تتسلق الاشجار وتطير من واحدة الى اخرى . طيراتها دائم الانحراف نحو الارض ، سوطها لا يفوق ٣٠ سم . || قوتها جميع المواد النباتية || احرف انواعها واضرها :



بير

Anomalurus pelei (S). **يَهْمِير بِل ٥**

Anomalure de Pele (F).

نوع من البير ، موطنه افريقية الشمالية . ثوبه الى السمرة تعلق مع اقاربها من ثقب الظهر .

انزهارها ضباب متتابعة لونها الى الزرقاء العابقة يعلوها مواج بنسجي . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

Podanthum trichocalycinum (S). **Podanche à calice velu** (F).

نوع من البهفة المصرة ، مهدها اليونان . ساقها غصاه تطلو من ٥٠ الى ٨٠ سم . جذرها لقي الشكل وللمادة اوراقها ضفدية ، نصلها لا قياسي للتسعين المتقاعد . انزهارها عشكولية الشكل ، ثلاثية الترتيب ، طرفية الارتكاز ، زرقاء اللون ، خلية الناج ، قصبة الاذن . تنورها يستمر من حزيران الى تموز .

٣١١٥٥ - يَهْمَةُ حِرْيَانَةِ

Podanthum virgatum (S). **Podanche à tige nue** (F).

نوع من البهفة المصولة الطبيعية في جبال لبنان . ساقها لوزع ، غليظة ، مضطمة الزوايا ، غصاه ، تطلو من ٣٠ الى ٤٠ سم . فروعها قصيرة متضبة . اوراقها ضفدية التجميع ، مركزها في أسفل الساق وهي سانية التصل ، جامدة الصفحة ، متبادلة التسعين . انزهارها بنفسجية اللون ، قصيرة الاذن ، فريدة او ثلاثية التجميع . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣١١٥٦ - يَهْمَةُ مَشْطَلِيَّة

Podanthum pinnatum (S). **Podanche penné** (F).

نوع من البهفة المصرة . مهدها الشرق الاذن . ساقها متضبة غصاه . جذرها حزاني الشكل ، مأكول للمادة . اوراقها مشطية التصل ، ثلاثية او خلبية التضيق اللانقياسي التفريغ . متعادلة الزهري رقة التجميع . انزهارها الى الزرقاء الزاهية . تنورها يستمر من حزيران الى آب .

٣١١٥٧ - يَنْتُونِيَّة ، يَنْتُونِيَّة ، دَهْمُوز

Inosita, Dambosa

مادة سكرية توجد في فصلات الجسم وفي اللوبيا الخضر ، وفي مسطار النبق وورق الجوز والقيق .

٣١١٥٨ - يَنْتُون ٥ ، يَنْتُونِيَّة

Cananga (S).

Canang des Molluques, Unona odorant (F). **Ylang-ylang tree** (E). *Canangebaum* (D). *Cananga* (I).

جنية بزية وزراعية من فصيلة القشديات . ساقها متضبة غصاه تملو نحو ٥ امتار . اوراقها متعاقبة اهليلجية التصل . انزهارها جملة الشكل ، متوسطة القد ، قارية اللون ، فواحة العرف المستحب . يستخرج منها بالتقطير ادمان عطرية لافخرة الصنف شائعة الاستعمال . لها ساقها وفروعها لوني التركيب بين التيلة الناعمة اللدنية يستعمل في صناعة بعض الاوتار الموسيقية .

٣١١٥٩ - يَهْمَةُ

Antholyza (S). *Antholyse* (F).

جنس نباتات دوصية ضفدية من فصيلة السونيات . انواعها عديدة ، بزية وتريبتية . سوطها شراعية تنهي بالانزهار اللانقياسي الترتيب . اوراقها شرفلية الشكل . انزهارها قريبة الشبه من انزهار الدلبوث || زراعتها لا تنصلب متعاقبة خاصة لكنها تقفل الازرية البدالية البازرة المتعمر الازدري || احرف انواعها واضرها ما يتبع .

٣١١٦٠ - يَهْمَةُ اَثْيُوبِيَّة

Antholyza aethiopica (S). **Antholyse éthiopienne** (F).

نوع من البهفة التريبتية . شراعتها الزهري يعلو من ١٠ الى ١٢٠ سم . شراعتها مستطيلة تعرض من ٢ الى ٣ سم .

٣١١٧٩ - **يُوكَا** *Yucca (S). Yucca, Yuque (F).*
Yucca, Bear grass (E). Palmenlilie (D). Iucca (I).
 جنس نباتات معمرة من فصيلة الزنبقيات . أنواعها عديدة
 سطوها عشوية تملو مع المعمر وقولي السنين . أوراقها
 جلدية ضمية التجميع . أزهارها متفردية يرتكز على شاربين
 منتصبية مستطيلة . أزهارها كبيرة القد متدللة الارتكاز
 لا متباينة الألوان تلب فيها النبتة || أشهر أنواعها
 التيينية المحكن غرسها في أقاليم المعتوسط ما يتبع .

٣١١٨٠ - **يُوكَا أَلْوِيَّة** *Yucca alofolia (S).*
Yucca à feuilles d'aloès (F).
 نوع من اليوكا، منتبها البلاد الأمريكية . ساقها نخيلة
 مستقيمة منتصبية تملو نحو ٥ أمتار . أوراقها الوية الشكل
 تطول من ٣٠ إلى ٦٠ سم . وتعرض من ٣ إلى ٤ ، فصولها
 جلدي الصفحة ، باحت أخضر المادي ، بحري المتعصم ،
 ينتهي بشوكه جبروية اللون سادة الطرف . أزهارها بيضاء
 اللون تطول من ٤ إلى ٥ سم . أزهارها متفردية الشكل ،
 كثيف التجميع ، يملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم . ثمارها حبة ،
 طسية السق ، لا مأكولة . تنورها يستمر من اوائل آب
 إلى اواخر ايلول .

٣١١٨١ - **يُوكَا بحرية** *Yucca glauca (S).*
Yucca glauque (F).
 نوع من اليوكا، منتبها أمريكا الجنوبية . ساقها منتصبية
 قصيرة . أوراقها جلدية النصل ، بحرية اللون ، جبروية
 الختار ، تمتد من ٢٥ إلى ٣٠ ، طولها من ٦٠ إلى ٩٠ سم .
 وزورها من ٦ إلى ١٢ سم . أزهارها إلى البيضاء الأخضر
 المزاج . أزهارها متفردية ، كثيف التجميع ، يملو من ٦٠
 إلى ١٠٠ سم . ثمارها حبة جافة . تنورها يستمر من
 أيار إلى حزيران .

٣١١٨٢ - **يُوكَا رَجُل الفيل** *Yucca elephantipes, Y. guatemalensis (S).*
Yucca pied d'éléphant, Y. du Guatemala (F).
 نوع من اليوكا، منتبها الفراتيالا . ساقها منتصبية رافعة
 القاعدة النطيفة ، تملو من ٥ إلى ٦ أمتار . أوراقها
 جلدية الصفحة ، حيلة الختار ، بيضاء الختار المسنن .
 نصلها يطول من ٦٠ إلى ١٠٠ سم . ويعرض من ٥ إلى
 ٨ سم . أزهارها تطول من ٦ إلى ٨ سم . لونها إلى البيضاء
 المايجي . أزهارها متفردية ، هربي الشكل ، يملو من ٧٠
 إلى ١٠٠ سم . ثمارها حبة طسية السق لا مأكولة .
 تنورها يستمر من آب إلى اواخر ايلول .

٣١١٨٣ - **يُوكَا عَشِيَّة** *Yucca baccata (S).*
Yucca à baies (F).
 نوع من اليوكا، منتبها أمريكا الشالية . ساقها منتصبية
 تملو نحو ٣ أمتار . أوراقها جلدية النصل نخيلة الصفحة
 تطول من ٥٠ إلى ١٠٠ سم . وتعرض نحو ٥ سم . أزهارها
 جبرية الشكل تطول من ٥ إلى ٨ سم . لونها إلى البيضاء
 المايجي . أزهارها متبدل المتفرد يملو من ١٥٠ إلى ٢٠٠ سم
 ثمارها طسية الشكل ، قرمزية اللون ، تطول من ٨ إلى ١٢ سم
 وهي مأكولة منتصبية الطعم . تنورها يستمر من نيسان
 إلى حزيران .

٣١١٨٤ - **يُوكَا لِيْفِيَّة** *Yucca filamenteux (F).*
 راجع ابرة آدم .

٣١١٧٧ - **يَهْر زَاهِر** *Anomalurus fulgens (S).*
Anomaluro éciatant (F).
 نوع من الير ، موطنه افريقية الوسطى اجتداء من الصحراء
 الكبرى . ثوبه يرتكز اللون . محمره وبيته بيض .

٣١١٦٨ - **يَهْر فِرْلُو** *Anomalurus fraseri (S).*
Anomalure de Fraser (F).
 نوع من الير ، موطنه الفايون . ثوبه إلى اليردة السمراء .
 صدره وبيته إلى الصبهة السناينة .

٣١١٦٩ - **يَهْرِيَّات** *Anomaluridae (S).*
Anomaluridés (F).
 فصيلة حيوانات ليفة قاضية . أنواعها تسمى تسمى إلى
 جنس واحد || موطنها البلاد الافريقية تتميز بزواهدا
 الجلدية الجناحية الشكل القائمة على كامل غرسها من
 ساعد الجرموز الامامي إلى مفصل رصع الجرموز الخلفي .

٣١١٧٠ - **يُود** *Iode (F). Iodine (E).*
 جسم بسيط من ألبان المادان شائع الانتشار في مياه
 البحر وفي بعض النباتات البحرية انصها الصريع .
 صفاتها بلورية سريعة الغطب . لونه إلى الجزرة الكستنية
 البنفسجية المزاج . أثره على الجلد اصفر الخضاب . رمزه
 (I) . وزنه الأتني ١٢٦,٩٢ . ثقله النربي ١٩٨ و٤
 ينصهر في ١١٣°س ويغلي في ١٧٥°س . يذوب
 في الماء بمعدل ١ إلى ٥٠٠٠ و يذوب في الايثر والكحول .
 يستعمل في تطهير الجروح .

٣١١٧١ - **يُودَات** *Iodates (F).*
 هو ملح حفص البرديك .

٣١١٧٢ - **يُودُس** *Virus (F).*
 هو الفيروس ، اطلبه

٣١١٧٣ - **يُودِيْنَا** *في القريض ، اطلبه .*

٣١١٧٤ - **يُودُ بَاشِي** *Roi des rouges (F).*
 سكة بحرية تسمى طلع آخر ، اطلبه .

٣١١٧٥ - **يُوسُفُ أَقْشَدِي** *يُوسُفِي*
 هو الليمون الاقشدي ، اطلبه .

٣١١٧٦ - **يُوسُفِي** *Hieraciden (S). Iéracido (F).*
 جنس طير من حماره السقور . أنواعه المعروفة اربعة .
 واحد افريقي وثلاثة أمريكية وأسترالية . جميعها من القواطع .
 أجسامها دبة . أثوابها نيرة الریش ، غبراء البطن . سواقلها
 مستطيلة . مناسرها حادة البكرة الحديثة . أرسافها دقيقة
 خالها قوية . تمشي بجاذات كبيرة سرها نحو المنة .
 قوتها صغير الحيوان والمطاد والافاعي . تدث أوكارها في
 اعلى الاشجار الشاذة . ضفتها من ٣ إلى ٤ رفقات
 تعرضها الاناث دون الاكور .

٣١١٧٧ - **يُوسُفَا** *Yoga (F). Yoga (E).*
 اليرفا نعل تلمبي هندي يرتكز على قواعد صوفية زهدية
 ومعارين عقلية وجسدية .

٣١١٧٨ - **يُوسُفِيَّة** *Yogisme (F). Yogism (E).*
 اليرفية مجموعة المصطلحات التقنية الصوفية الزهدية والتارين
 العقلية والجسدية التي يمارسها اليرفي .



يُوسُفِي

٣١١٩ - يوكا

Dlaire (F). Daily (E).

تتمتع تعريف يوكا على كل ما لا يولد أكثر من يوم واحد.

٣١١٩١ - يوكا

Ephéméroptères (F). Ephemeroptera (E).

طبق حشرات صغيرة القذح تعيش في المناطق وحول غابات اللد. أجسامها وأرجلها كثيرة العدد جميعها عدة فصائل تنتمي إلى رتبتي: الزنبقيات وألفوفيات. جميعها من الحشرات التي لا تطول حياتها الفراضية أكثر من بضعة أيام في حين أن مدة حياتها البيئية تبلغ الثلاث سنوات. أجسامها دقيقة مستطيلة. قرونها الاستشعارية قصيرة، ينتهي بمخيطين في الذكور وبثلاثة عيوط في الإناث. أظفارها إلى الأبيض الأغبر تشوبه خضرة أو صفرة كبريتية.



يوكا مجيدة

٣١١٩٢ - يوكا

Iontidium, Hybanthus (S).

Ionida, Ionidie, Hybanthe (F).

جنس نباتات برية معمرة من فصيلة البنتليجات أنواعها المعروفة عشرة، مهددا بالباد الاستوائية والحارة أصعبا أسيكة الجنوبية || بعضها أعشاب نضادة وأبيض الآخر جنات فرعاء. سطها ينبت في دال الشواطئ البعيدة عن مرمى المرج || جميعها طيبة جلورها مهددة.

٣١١٩٣ - يوكا

Cystoderma (S).

Cystoderma (F).

جنس فطور عشائية من فصيلة اتاريفريات. أنواعها المعروفة قليلة العدد منها بعض سلوح جبال المناطق المعتدلة الحرارة || تعيش على الدبال وعلى المواد المتحللة. جميع أنواعها صغيرة القذح، كاتمة الصف، لأكولة || تتميز بأشبهتها التي تلتف الساق كالزنان من القاعدة حتى أوائل الزمان الثالث || ألوانها متباينة منها الأشجع والأمر والأصفر والأطمل.



يوكا

٣١١٩٤ - يوكا

Wouwou

هو الجبين الرمادي، أطله.

٣١١٩٥ - يوكا

Falcon (F). Falcon (E).

طائر من الكوكب وفصيلة الصقريات. كنيه أبو رباح ويحكي الجمل لطفه جناحيه وسرعة انقضائه وهو حمر المزاج، قوي الشككة، بطاش شجاع. جسمه صغير القذح، جميل القالب، قصير الذنب. ثوبه أغبر أضر.

صدره ويظهر إلى الأبيض الأغبر النقي المزاج تملو ريشة قياسية الترتيب سمراء. رأسه مستعرض الشكل، عيناه كالباقوت يكتنفها إطار أصفر || وهو من القرامطع محب البلاد في طلب القوت والمصيد والمخ || قوته الطير والقواضم والنسار والجراد. يلدن وكه في أرقاب الصخور وفي قن الأشجار اليابسة. أنه تفيض وتغفن من هـ إلى ٦ رفثات، ترعيها يستمر نحو أربعة أسابيع.



يوكا

٣١١٩٥ - يوكا متجيدة *

Yucca gloriosa (S).

Yucca magnifica (F).

نوع من اليوكا السبرية الملبولة على شطوط المتوسط. ساقها منتصبة تملو نحو ٣ أمتار. أوراقها جلدية النصل كثيرة العدد تطول من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. وتعرض من ٥ إلى ٨ سم. لونها إلى الخضار الباهت. حناجرها قليل العرض، جزوي اللون، أزهارها متوسطة القذح، يضاه اللون تملوها ريشة حمراء. أزهارها لينة التجميع يطول من ١٢٠ إلى ٢٠٠ سم. ثمارها حقة جافة. تنورها يستمر من تموز إلى أواخر أيلول. سرورها وأصرامها عديدة أشهرها القلعة والمقرة واللحمة، جميعها جميلة القالب تعيش في المراكن.

٣١١٩٦ - يوكا متجيدة *

Yucca arborescens (S).

Yucca arborescent (F).

نوع من اليوكا، منها أريزولة وكليفورنية. ساقها غليظة منتصبة تملو من ٦ إلى ٩ أمتار. ثمارها يراوح من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها جلدية النصل، بحرية اللون، شاذكة المقصبة تطول من ١٥ إلى ٣٠ سم. وتعرض من ٦ إلى ١٥ سم. أزهارها إلى الأبيض الأصفر المزاج. ثمارها حقة الشكل، جافة السرق، حمراء اللون، تطول من ٥ إلى ٨ سم. تنورها يستمر طوال الصيف.

٣١١٩٧ - يوكا متجيدة *

Yucca radiosa (S).

Yucca rayonnant (F).

نوع من اليوكا، منها بلاد الأريزولة. ساقها منتصبة تملو من ٥ إلى ٧ أمتار. أوراقها جلدية النصل، يراية اللون، تعد من ١٠٠ إلى ٢٠٠ طولاً يراوح من ٤٥ إلى ٦٠ سم. عرضها من ٣ إلى ١٠ سم. أزهارها حرة الشكل غيراه اللون، طولاً نحو ٥ سم. يجمعها شراخ يراوح طوله من ٨ إلى ١٢ سم. ثمارها حقة جافة. تنورها يستمر طوال الصيف.

٣١١٩٨ - يوكا متجيدة *

Yucca rostrata (S).

Yucca à bec (F).

نوع من اليوكا، منها المكسيك. ساقها منتصبة تملو نحو ٣ أمتار. أوراقها جلدية النصل، بحرية اللون، صفراء المزاج، مسلة الحمار، شاذكة المقصبة، تطول من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. وتعرض من ١٥ إلى ٢٠ سم. أزهارها حمراء اللون غصير المزاج. ثمارها حقة الشكل، جافة السرق، تنتهي بمقار غشي المادة أحسن الطرف.

٣١١٩٩ - يوكا

Jour (F). Day (E).

اليوم هو مدى أربع وعشرين ساعة تحسب من نصف الليل إلى نصفه. وقد يحسب اليوم من شروق الشمس إلى غروبها فهو النهار ولا يجوز تغليب المهام أو إعلان أكثر المقدر إلا خلافه. وفي اعتبار الأيام يمكن تحديدها كما يتبع:

Jour de planche (F).

Jour utile (F).

Jour férié (F).

Jour ouvrable (F).

Jour franc (F).

Jour fixe (F).

يوم الشحن والظرف

يوم صريح

يوم عطلة، بطالة


يوم عمل

يوم كامل

يوم معين

مُلْحَقُ الْمَجَلَّاتِ الثَّلَاثَةِ أ - ي

ملحق



عنصر معني نادر. يوجد في بعض الأثرية الخاصة. رمزه (Er) وزنه الذئبي ١٦٧,٢٠ املأه وردية اللون.

Synergides

٣١٢٠٣ - آزران
اطلب عومران.

Homozygotie (F).

٣١٢٠٤ - إسكالة

Homozygoty (E)

الاسالة هي تماثل العوامل الوراثية عند الحيوان والنبات.
راجع جنس.

Strophisme (F). Strophism (E). ٣١٢٠٥ - إسكاس

طسم خاص بعض النبات يقود نصال الأوراق الى الالتواء الكامل.

Méiotique (F).

٣١٢٠٦ - إنكديكري

راجع ميوزي.

Catabolisme (F).

٣١٢٠٧ - إنكدام، إنكافس

Catabolism (E).

الإنكدام تفاعل كيميائي يسمح بتحويل المواد الباقية في الأنسجة الحية الى طاقة جهد. وهو بذلك يشكل، في معاوضات الايض، الطور المعاكس للبناء.

Catabolique (F).

٣١٢٠٨ - إنكديكري، إنكافسي

Catabolic (E)

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بمنشع الإنكدام أو الانقراض.

Anabolieme (F)

٣١١٩٦ - إنكفاء، تشيد

Anabolism (E).

هو تحويل المواد المنقبة الى نسج حية. وهو ما يشكل الطور الرئيسي من معاوضات الايض.

Anabolique (F).

٣١١٩٧ - إنكفالي، تشيدي

Anabolic (E).

نعت تعريفي يطلق على ما هو مختص بالإنكفاء أو التشيد.

Plasmogamie (F). Plasmogamy (E). ٣١١٩٨ - إنكالة

الانكالة حالة تأهب اعصابي يكون نوى الوذات شديدة التقارب.

Plasmétique (F).

٣١١٩٩ - ألي، بلاسي

Plasmetic (E).

كل ما هو مشتق من الانكالة أو ناجم عنها.

Macroptère (F).

٣١٢٠٠ - أوني

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة طويلة الجناح أو الروشن أو الغمد. م. دواء.

Aragonite (F).

٣١٢٠١ - أراغونيت

Aragonite (E).

الاراغونيت في علم المعادن صخر متبلور من كربونات الكالسيوم. تبلوره معني قائم. ثقله النوعي ٢,٩٥ وهو ضرب من الكلسيت الثنائي الشكل المتبلور. يستعمل في الزعفرقة المعمارية والتزيينية.

Erbium (F). Erbium (E).

٣١٢٠٢ - إريوم

Protistologie (F). Protistology (E). **بَرِيَّيَّة** ٣١٢١٦ -
الديتيَّة علم يبحث في اول واسط الكائنات الحيَّة .

Exondation (F). Emergence (E). **بَرَاغَة** ٣١٢١٧ -
البرَاغَة حصليًا هي البروز فوق سطح الماء . وهي ظهور
الحضيض او التربة بعد تقلص مياه الغمر .

Exondé (F) **بَرِغ** ٣١٢١٨ -
نعت تعريفي يطلق على ما برز فوق سطح الماء . يقال
اراض برِغَة وصخور برِغَة .

Surrection (F). **بُصُوق** ٣١٢١٩ -
هو الشخصوس ، اطلبه .

Pallopius (S). **بَسَالَف** ٣١٢٢٠ -
Pallopie (F) Pallophilus (E).

جنس طحالب صرخويَّة صغيرة القد تشبَّه بحواشيها
الحويَّة الشكل | أنواعه المعروفة قليلة العدد منبتها بعض
الاصقاع الباردة اخصها الشمالية .

Cerastophyllaceae (S). **بَشَفِيَّات** ٣١٢٢١ -
Cérastophyllacées, Cérastophyllées (F)
Cerastophyllacées (E).

فصيلة نباتات عشبيَّة مائيَّة من ثنائيات الفلقة . اجناسها
وانواعها المعروفة قليلة العدد . جميعها عشبيَّة ، مائيَّة ،
مضرة ، عاصمة الجنور ، ضميَّة الأوراق الحافليَّة .
ازهارها وحيدة المسكن | اعطانها البلاد المعتدلة الحرارة
تعيش في المنافع والاحوار والمغاضب والحقائق الدافئة
الماء | اعرفت أنواعها ولشهورها بشت القرد المعروف أيضًا
بحامول الماء ونطوش الحوت .

بَعَالَة ٣١٢٢٢ -
المبالة من الحشرات والنيريات هي الأثني التي تقضي
على بعلها فور الانتهاء من البهال او الكوم كاسرعوبة
والخرب والرتيلة...

Plesmétique (F). **بَلَسْمِي** ٣١٢٢٣ -
راجع ثلثي

Bélidé (F) **بَلْدُوس** ٣١٢٢٤ -
حيوان لبون من الجرابيات الشاجرات يدعى بروس ،
اطلبه .

Hypopharynx (F). **بَلْهَة** ٣١٢٢٥ -
Hypopharynx (E).

الجزء الداخلي من فم الكثير من الحشرات . وهي امتداد
للبلعوم . وعلى هذه البلعمة ، الناشزة عند غمدبَات
الاجنحة وتستقيانها ، يوجد الكثير من العقد العصبية ممَّا
يدلُّ على انها مركز احساس خاص لا يزال مجهول الغاية
حتى الآن .

Mésozoïque (F). **بَلْوسِي** ٣١٢٠٩ -
Mesozoic, secondary stratum (E).
نعت تعريفي يطلق على ارضين الاباج الثاني المعروف
أيضًا بالوسط .

Blastoceros (S). **بَلَّوَالِي** ٣١٢١٠ -
Blastocère (F).
حيوان لبون مجتزأ من فصيلة الابلوات . موطنه فاني امريكا
الجنوبية . يعيش جماعات قليلة العدد . اجله مؤلف من
ذكر مانع وثلاث او اربع اناث . اناث مع ارشامها | جسمه
يطول نحو ١٢٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٥ سم .
ارتفاعه ٧٥ سم . ثوبه الى الشقعة السوداء السفهاء الموج
- عنه مملوءة بالابيض . قرنه مصمت ، ثلاثي الشعب
ينصله كل عام | الاثنى جساء ، ضرعها ثنائي
الاخلاف ، تحمل نحو ٥ اشهر وتضع من بغير الى
بغيرين .

Petsurus, Belideus (S). **بَلُوس** ، **بَلُوس** ٣١٢١١ -
Pétaure, Bêlîd (F)
جنس حيوانات لبونة من الجرابيات الشاجرات وفصيلة
الفلجربيات . انواعه المعروفة ثلاثة موطنها استراليه
والجزر المجاورة . جميعها بجوية السرح . تألف
القامات والخراج ، تبيت في النهار اما في تجاويف
الأشجار الفخرة او على قننها | اجسامها صغيرة . آذانها
كبيرة . اذنانها مستطيلة منقطة الاطراف - قوائمها
الامامية أقصر من الخلفية - اصابعها خماسية حادة
الاطراف . اوصافها ناعمة ، لبدة . اغشيتها الابطالية جلدية
تمتد من الايدي الى الارجل . اناثها مجهزة بجراب عذ
اسفل البطن تقيم فيه الرضيع حتى النضام | اما انواعها
الثلاثة فهي :

- **بَلُوس أسترالي** P. australis (S).
- **بَلُوس سنجابي** P. sciurus (S).
- **بَلُوس قصير الرأس** P. brevirostris (S).

Bathydrique (F). Bathydic (E). **بَلْدِي** ٣١٢١٢ -
نعت تعريفي يطلق على كل كائن يعيش في غور الماء |
تقول العلم البلية والنبت البلية .

Inné (F). Innée (E). **بَلْدِي** ٣١٢١٣ -
نعت تعريفي يطلق على ما هو اثل في المنطوق . وهو
بذلك يرادف عقلي (Congenital). يقال صفة بجدية وعامة
بجدية .

Bathybius (F). Bathybius (E). **بَلْدِيَّة** ٣١٢١٤ -
اسم يطلق على كتل هلاميَّة توجد في قاع البحر . يقول
فيها العالم دموكسلي ، وبعض علماء الطبيعة انها الحالة
الاولى من المادة الحية .

Protiste (F). Protiste (E). **بَلْدِي** ٣١٢١٥ -
كائن حي وحيد الخلية . جسمه وسومه المصنفة حتى الآن
تجعله متارجحًا بين النبات والحيوان . ومن العلماء من قال
انه اقرب الى النبات منه الى الحيوان .

Isostase (F). Isostasy (E)

٣١٢٣٨ - **تساوية**
نظرية حصيلية ترتكز على تعامل القوى المحركة النابذة والمماسية.

Enkystement (F)

Encystation, Encystment (E)

٣١٢٣٩ - **تكيس**
التكيس، في علوم التاريخ الطبيعي والبيولوجية والطب، هو الالتصاف الكلي بشيء معين يسمى كيساً.

٣١٢٤٠ - **تأريخي الأولي**، ميزوزون
Mésozoisme (F). Mésozoön (G).

كان مركزه بين الأولي والتولي، ويرتكب من حجرة مركزية تغلفها حجرات مسطحة موزعة. أما الرغيلة فلا وجود لها.

Lorique (F). Loricate (E).

٣١٢٤١ - **جليم**
نمت تعريفي يطلق، في علم النبات، على كل حبة أو بذرة غلافها الخارجي جامدة أو يطلق في علم الزوولوجية على كل جسم تغلفه صلتاح غطمية.

Troncature (F).

٣١٢٤٢ - **جرّز**
حالة الشيء المقطوع جزء منه.

٣١٢٤٣ - **جرّزوق**، **جرّزوق**
Lithocrane, Géndruk, Gazelle-Girafe (F).

جرّزوق هو الاسم الصومالي. حيوان لبون من الغنم، وحيد الجنس والنوع. موطنه يمتد من الصومال إلى شرقي الكونغو. ملجئه النهائي جسامي. أجله يمتد من ١٢ إلى ١٥ يركسه ذكر مانع أو ذكوران وما تبقى ثلاث وظلي. لونه الأشباح خضراء وباهية، وأوراق بعض الأشجار أعصها المستطيلات أو شوزنه يشبه الظرافة جسمه بطول نحو ١٦٥ سم. ارتفاعه ١٠٠ سم. قرنا الذكر منقفا للطرف المنحني. عناء كبيرتان، متوجتان بقبضة بضاء. أذناه صغيرتان جالستان. عنقه شديدة الطول. حاروكه ارفع من كفه كما في الظرافة. ذنبه قصير ورفيق، ينتهي بخصلة من الشعر. الأثني جمام، لثائية الإغلاف، رقيقة الطلي أو توبه إلى الطرفة السوداء. رأسه وظهره شديدة السمر. الأثني إلى السمر السوداء باستثناء البطن الأبيض الأغبر.

Adéphage

٣١٢٤٤ - **جرّزوق**
نمت وصفي يطلق على كل مقرر يمتد بالشرارة أن حيوان أو حشرة.

Caroténoïde (F).

Carotenoid (E).

٣١٢٤٥ - **جرّزاني**
نمت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالكاروتين المعروف أيضاً بالجزرين. الشفاحات الجزرانية شفاحات صفراء وبرتقالية وحمراء اللون يكثر وجودها في النبات والحيوان. وهي غير قابلة الانحلال في الماء إنما تذوب في بعض الشحوم.

Sporogonie (F). Sporogony (E).

٣١٢٣٦ - **بوغنة**
البوغنة، في علم الزوولوجية، طريقة تلقيح خاصة ببعض التوالي.

Sporophyte (F). Sporophyte (E).

٣١٢٣٧ - **بوغنة**
طور من أطوار التكوين التشوي عند النباتات اللاشعوية من ذوات البوغ وهي بذلك تماكس النجامة عند النباتات الشعية.

Sporose (F). Sporose (E).

٣١٢٣٨ - **بوغنة**
البوغنة في علم النبات هي إبراز البوغ ونشرو عند السراخس ولشامها.

Hétérothallisme (F).

Heterothallism (E).

٣١٢٣٩ - **تباين مغري**
التباين المغري، في علم النبات. حالة تكون فيها الغامات الذكرية والأنثوية مثالية من هيئات مختلفة الشعية أيضاً.

Autochtonie (F).

Autochtony (E).

٣١٢٣٠ - **تلك**، **مكود**
صفة الشيء الموجود طبيعياً وأساساً في مكان جنائياً معين.

Accouage, Accouage (F).

Lighterage (E).

٣١٢٣١ - **تجرّيم**
التجرّيم هو نقل البضاعة من رصيف الميناء إلى السفينة أو من السفينة إلى رصيف الميناء. لذلك فالتجرّيم يعني الشحن ويعني التفريغ أيضاً.

Terrigène (F). Terrigenous (E).

٣١٢٣٢ - **تريجية**
نمت تعريفي يطلق على الرسوب المترامية في قعر البحار والمالحة إلى انحسار وانجفاف الأميرة القارية.

Homothallisme (F).

Homothallism (E).

٣١٢٣٣ - **تساوي مغري**
التساوي المغري، في علم النبات، حالة تكون فيها الغامات الذكرية والأنثوية ناتجة عن هيمنة واحدة.

Placentation (F).

٣١٢٣٤ - **تسفيد**
هي التسخدة، أظلمها.

Anaboliame (F).

٣١٢٣٥ - **تفصيد**
اطلب ابتناء

Anabolique (F)

٣١٢٣٦ - **تفصيد**
راجع ابتنائي.

Isostatique (F). Isostatic (E).

٣١٢٣٧ - **تساوية**
نمت تعريفي يطلق، حصيلياً، على كل ما له صلة بالتعادلية الأرضية وهو ميكانيكا الاتزان المتعامل في الخطوط والسطوح.



جرّزوق

Abomasum (F). Abomasum (E). **٣١٢٥٣ - حَافِصَة**.
الحافضة الجيب الرابع من معدة المجترات.

Cénozoïque (F). **٣١٢٥٤ - حَظِث**
اطلب سنوي

Monécle (F). **٣١٢٥٥ - حَصَاوَة**
الحصاة حالة فيزيولوجية عند المشرّبات تتسم بفرديّة الطليّة.

Pédologue (F). Pédologist (E). **٣١٢٥٦ - حِصْلَام**
هو صاحب الاختصاص في الحصلة اي في علم الاربة الزراعية من حيث تكوينها وطرق استثمارها.

Ovula (S). Ovule (F). **٣١٢٥٧ - حَيْدَاء**
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معيّبات الأرجل وفصيلة الودعيات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة | اصداؤها متوسطة القد، شبه بيضية الشكل، كطرفة، مقعرة الظهر، صلبة الصلابة الخارجية، وبضاه اللون | اشهر انواعها حيداء الزابج Ovuia ovum (S). طولها نحو ١٠ سم. لونها الى البياض المالح الاسفع المواجه.

Charophytes (F). Charophytes (E). **٣١٢٥٨ - حَيْثَاقي**
فئة من النبات معظم انواعها يعيش في المياه العذبة الراكدة وبعضها في الماء الاجاج | خضائها الى الخضار القائم ويخرج منها عند لمس صلبة كبريه | وهذه الفئة من النبات تشكل صلة الوصل بين المشرّبات والطحليّات.

Céramiste (F). Céramiste (E). **٣١٢٥٩ - حِرَاف**
الحِرَاف من تعاطى صناعة الخزف من نَحَار ومطلي وصفي.

Céramique (F). Céramie (E). **٣١٢٦٠ - حِرَاف**
فن صناعة الآنية الفخاريّة وشيئا.

Ginglymostoma **٣١٢٦١ - حَفَاشَة سَوِيَّة اللّون**
concolor (S). Ginglymostome concolor (F).

Ginglymostoma concolor (E).
سمكة بحرية من السفنقات الاشلاقي. اعطانها تمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي | جسمها وشعي الشكل بطول نحو ٢٠٠ سم. تتميز بزغفتها الظهرية المتأخرة الاركانز والمقابلة مع البطنية والشرجية. ثوبها سوي اللون الاصفر.

Cryptogènes (F). **٣١٢٦٢ - حَقِيبَات الجِين**
Cryptogenous (E).

نعت تعريفي يطلق على الفئات الحية، من حيوان ونبات، التي تصنف بالتنتسل اللامنطور.

Caryogamie (F). Caryogamy (E). **٣١٢٦٣ - خِلَاط**
الحلاط هو اعادة نشاط الاخصاب اللاشفي عند

Dermaptera (S). **٣١٢٦٤ - حَبْلِيَّات القَوَائِم**
Dermapteres (F). Dermoptères (E).

مرتبة من الحشرّيات. تنسوها في الزمن الماضي الى الليموريات ثم الى مِحَنَات الادي. ووجدوا اخيرا انها اقرب الى الحشرّيات | وهذه المرتبة تضم فصيلة واحدة تدعى كوبنّيات وجسّ واحد يدعى كوبن.

Gymnura (S). Gymnura (F). **٣١٢٦٧ - جِمْنُور**
جنس حيوانات لينة من فصيلة الفسفنّيات ورتبة الحشرّيات. انواعها المعروفة ثلاثة موطنها جزر الزابج | اجسامها شبه لسطوانية الشكل تطول نحو ٦٥ سم. بها فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٣٠ سم. رؤوسها مخروطية الشكل. عيونها صغيرة. اذنانها مستديرة. اعناقها قصيرة. قوائمها معقلة الطول. اصابعها مجعّزة باظافر حادّة. اثنائها الى النسيب الصنّائية الموج. ويرها ليد ناعم يتخلّله حلب جامد شائك. اذنانها جرداء عارية | اثنائها امز قدّم ذكورها واهت ثوبها منها، قوتها الحشرات والديدان والزحافات الصغيرة.

Parétienne (F). **٣١٢٦٨ - جُولِي**
نعت تعريفي يطلق على كل نبات ينتمي الى فئة الجوليات.

Parétales (F). **٣١٢٦٩ - جُولِيَّات**
فئة نباتات من ثنائيات الفلقة مشيمتها تاوي الى جدار الفلقة كما هي الحال عند البنفسجيات والالامنيات وغيرها.

Gymnorhinus (S). **٣١٢٧٠ - جِمْنُورِين**
Gymnorhine (F). Gymnorhine (S).
جنس طير من الجوانم سيّات المناظر وفصيلة الغرابيات. انواعها المعروفة ثلاثة اعطانها استرالية وجزر الزابج | اجسامها متوسطة القد تطول من ٤٠ الى ٤٥ سم. منقبرها مخروطية الشكل. اجنحتها لاحة، زلقة. اثنائها مزعزعة | اشهر انواعها الجيمنورين الزّمار G. fluteur (F). طولها نحو ٤٥ سم. ثوبه اسود اللون يطوه يتّيج ابيض في القفن والجنّاح | يالّف حياة الاسر ويقلّد جميع الاصوات والاصوات.

Ginkgoales (E). **٣١٢٧١ - جِنْكَوَات**، **مَمَائِل**
قسم من عريانات البزور يعود ظهورها الى الحقبة الباليونية من الاباج الاول | كانت، في الماضي البعيد، تعدّ الكثير من الانواع الا انها اضمحلت مع مرور الزمن ولم يبق منها في عصرنا الحاضر سوى النوع المعروف بشجرة المعبد او الجينكو وهي شجرة مقدّسة عند البوئين.

Actualisme (F). Actualism (E). **٣١٢٧٢ - حَاضِرِيَّة**
الحاضرية نظرية حصيلية تفسّر المناشع والتطورات الارضية الغالبة بالمناشع الحاضرة مع اعتبار هذه التطورات مستمرة العمل البطيء | والحاضرية بمعناها الحصيلي تماكس النظرية الجليّة.



جمنور



جيمنورين



حفّاشة سوية اللون

Danaide, Danaids (F).

جنس حشرات فراشية من رتبة حرشفيات الاجنحة وعضلة التنسيكات. انواعها المعروفة نحو ٣٠ اعطانها المناطق الحارة من العالم القهم باستثناء اربعة انواع، ثلاثة منها تعيش في امريكا الوسطى ونوع واحد اعطانه تشمل حوض البحر الابيض المتوسط وتمتد حتى اورنوبه الوسطى، يدعى تنسيك خريزيب D. Chrysopus (S) | جسمها كبير القد. ووشانها الى الصغار الاضلل تلوه | زخارف بيض وسود واطار اسود منبج بالابيض | اساربعها باهقة الخضار تعيش على اوراق الصقلابات.

Ptéridospermes (F) ٣١٢٧٣ - دَورَيات

فلة من السراخس المتفرقة التي كانت ثمارها يزور بقلة مجنحة بدلاً من بويغ.

Diatomite (F). Diatomite (E) ٣١٢٧٤ - دِيَاثُومِيْت

صخور صوانية نائية الاصل تكونت من تراكم وتكسج روبات الضفدرات العائمة الى المشطورات.

Dinertion (F).

٣١٢٧٥ - دِيْنَانِيْت
ساف من الحقبة الكربونية ويدعى ايضاً كليمي، اطله.

Melanocetus (S).

٣١٢٧٦ - دَحَاظَة
Melanocetus (F) Melanocetus (E).

جنس اسماك بحرية لجمه من شالكات الزعاف وعضلة الكواحيات. المعروف منها حتى الآن نوعان منتشران في لبحر المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط | اجسامها قصيرة، شبه صلبة الشكل، تطلو نحو ٤٠ سم. تتميز برووسها المستقيمة وبخلفها الكبيرة الفائرة وبكثرة اسنانها الحادة وبانهاها الكثيرة المسنقة. سنها عرياط عادم السهف. عيونها علوية الارتكاز تحت ثمة الرأس. ويطولها في مقدم خطمها ملمس مستطيل، غصروني المانة ينتهي بثره صغيرة تستعمله الدخاظة لاجتذاب الاسماك.

Acutangula (F). Acutangular (E). ٣١٢٧٧ - دَرِيْب

نعت تعريفي يطلق في علم النبات على كل عضو او شكل ضيق الزوايا.

Germigne (F). Germigen (E). ٣١٢٧٨ - رَاجِم

راشم او راشمة نعت تعريفي يطلق جسمورياً، اي في علم الفيزيولوجية، على غنجة في الجهاز الهضمي تحضن علة الجيلة حتى الانعصاب وذلك عند المهزات والمقنيات والمنطقات.

Manubrium (F). Manubrium (E). ٣١٢٧٩ - رَدِين

الاسم القرشي واللاتيزي من اللاتيني بمعنى ردن وكيم. والردين، في علم النبات، خلية من المشق التي ترتب منه اثيرة الخبيات من الخبيات الخضر | وهو في علم الحيوان، شبه انبوب ادم التركيب مركزه في وسط مظلة المدوس يحمل في طرفة فم الحيوان.

وحيدات الخلية وذلك بايجاد نوى الوانف المقاربة.

Dermatogène (F). Dermatogen (E) ٣١٢٨٤ - دَرْمِيْجِيْن

الدربة هي نسج الطبقة الخارجية من غلاف التيط في النبات.

Desmidiées (F).

٣١٢٨٥ - دِسْمِيْدِيَات
عمارة نباتات مائية من فصيلة البضفات التابعة الى الخبيات الخضر. اجناسها المعروفة قليلة الحد جمعها من وحيدات الخلية تعيش في المياه العذبة | اشهر اجناسها اللصبي.

Périlème (F). Perilem (E).

٣١٢٨٦ - دَرْمِيْجِيْن
الطبقة هي نسج الطبقة الوسطى من غلاف التيط. مركزها بين الدربة والكلمسة.

Acrogamie (F). Acrogamy (E).

٣١٢٨٧ - دَعَاظَة
الدعاطة، في علم النبات، تطور يطرأ على الانبوب الظلي فيدخل البيضاء من السم.

Alléomorphisme (F).

٣١٢٨٨ - دَعَاظَة
Alléomorphisme (E).

الدعاطة، في علم النبات، طور من اطوار التنسل الباني يتميز بالتقابل الشكلي والتخالف الوراثي.

Pérolème (F). Perolem (E).

٣١٢٨٩ - دَرْمِيْجِيْن
الملمسة هي نسج الطبقة الداخلية من غلاف التيط في النبات.

Bombylidae (S).

٣١٢٩٠ - دَبَابِيْجَات
Bombylidae (F).

فصيلة حشرات من نوات الجناحين قصورات القرون. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٢٥٠ منتشرة في جميع اقطار العالم اخصها المناطق الحارة | اجسامها مبطنة صغيرة القد او متوسطة. رؤوسها صغيرة ويرة، مستطيلة الاضطام الماصة. كوسلها ويطولها مزتر. قرونها الاستشعارية قصيرة ودقيقة. اجنحتها ضيقة مستطيلة | يوقتها طفولية تعيش في عشوات واصبان ومحاجر غشائيات الاجنحة | اشهر اجناسها: الدانة، المترس، الملمسة.

Danaidae (S). Danaidés (F).

٣١٢٩١ - دَنِيْجِيْجَات
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة صولجانيات القرون. اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد اعطانها المناطق الحارة في جميع اقطار العالم | اجسامها رشيقة، متوسطة القد او كبيرة. ولفنها مززقة، جميلة الالوان، مستترة الاطراف. قرونها الاستشعارية صولجانية الشكل | اساربعها خاضلة تعيش على اوراق النبات | اشهر اجناسها التنيسية.

Danae (S).

٣١٢٩٢ - دَنِيْجِيْجَة



دَحَاظَة

ولو كان جزئياً ، الحاصل في البلاد السكتانية منذ تقلص المسك او هبوطه .

٣١٢٨٩ - رَوْدَكِي [○] Ontogénétique, Ontogénique (F).
Ontogenetic (E)

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالروضة أي بشوكة الكائنات .

٣١٢٩٠ - رَوَقَشَة [○] Glyptognosie (F).
Glyptognosy (E).

الروقة هي معرفة وتمييز الحجارة المقوشة القديمة العهد .

٣١٢٩١ - رَوْد [○] Cinérites (F).
الروماد رماد بركاني منضد .

٣١٢٩٢ - زَبَيْتَة [○] Sorculus (S). Soricula (F).
Soriculus (E).

جنس حيوانات لينة من فصيلة الزبائيات ورثة الحشریات . انواعها المعروفة خمسة اعطائها المناطق الجبلية الاسيوية اخصها الهند والصين || جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الذنب . قوتها الحشرات والدهان .

٣١٢٩٣ - رَوَحِن [○] Abortif (F). Abortive (E).
نعت تعريفي يطلق في علم المواليد والنبات على الاعضاء والثمار التي تسقط قبل اكتمال نموها .

٣١٢٩٤ - زَعَالَة [○] Pyrrhocoris

جنس حشرات ناهمة من نصفيات الاجنحة وفصيلة الزعاليات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها احليجية ، مبططة ، طولها من ٧ الى ١٢ سم . رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها صغيرة ناشزة . قوتها الاستشارية رباعية الفص المستطيلة . بطونها سوداء اللون او حمراء . اجنتها ملونة بكث فيق فيها التبقيع والتشجيع || تألف بمظلمها الحياة الجماعية . شراندها تمذ بعض الحشرات . قوتها اوراق النبات وما تستطيع اقتراسه من حشرات وهوام .

٣١٢٩٥ - زَعَالِيَّات [○] Pyrrhocoridae (S).
Pyrrhocorides (F).

فصيلة حشرات من رتبة نصفيات الاجنحة المختلفة || اجنتها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة .

اجسامها احليجية او بياضية الشوزن ، معتدلة التبطيط ، طولها من ٧ الى ١٥ سم . رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . قروتها الاستشارية رباعية الفص . اخطامها مستطيلة ثلاثية الحلل || اجنتها متقاوية الطول ، معظمها نصيفية وبعضها يلحف اكثر من زامين || قوائمها ضخمة معتدلة القد || معظم انواعها ناهمة قوته النبات وما يستطيع اقتراسه من حشرات || اشهر اجناسها الزعالة .

٣١٢٩٦ - زَكَوَاة [○] Diécie (F)

الزكاوة حالة فيزيولوجية عند المشربات تسم بازنواجية الخلطة .

٣١٢٨٠ - مَيْسَب [○] Métabolite (F). Metabolite (E).
نعت تعريفي يطلق فيزيائياً وكيمائياً على كل نظام او تركيب ثباته الظاهري يشكو من ندق الوجوب .

٣١٢٨١ - رَصَيَّات [○] Lycopodiales (F).

فئة من النبات عاصرت بانواعها العجينة المختلفة الاشكال جميع الازمنة الحصلية منذ الحقبة الكربونية || انواعها المقروضة شملت الكثير من الاشجار التي كان ارتفاعها يراوح من ٢٠ الى ٢٥ م . والتي كانت تشكل معظم غابات مناطق الحقبة الكربونية || وما طبقات الفحم الحجري سوى بقايا هذه الاشجار المنضودة || اما الانواع المعاصرة فجميعها عشبية تجمعها فصيلة الطريقات .

٣١٢٨٢ - رَفِيصَة [○] Batholite, Batholith (F).
اسم يطلق في علم الحصلية على كتلة من الطخس او الصخور الثائرة لا تيسر الشكل انما مستعرضة القاعدة .

٣١٢٨٣ - رَغِيل [○] Périgyne (F). Perigynous (E).
نعت تعريفي يطلق على توجع الزهرة واسديتها عندما تكون متجمعة في الكأس حيث تشكل طوقاً يحوق بالمبيض .

٣١٢٨٤ - رَغِيْلِي [○] Périgynique (F). Perigynio (E).
نعت تعريفي يطلق على شكل من اشكال امتجاج الاسدية في كم الزهرة او حول المبيض .

٣١٢٨٥ - رَيْلَة [○] Enicurus (S). Enicure (F).
Enicurus (E).

جنس طير من الجوائم سيات النافير وفصيلة الذعريات . انواعها المعروفة عشرة اعطائها نعتاً من الهند الى ماليزية || اجسامها معتدلة القد ، طولها من ٢٥ الى ٢٨ سم . بما فيه الذنب الفارق المستطيل الرئال || انثاها سوداء اللون ، مقلقة بالابيض || تألف ضفاف مجاري المياه . قوتها الحشرات والنباتان || تتخذ الماحصها في المواقع الوعرة المنيمة الشارة على مجاري المياه . انثاها تبض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٤ يوماً .

٣١٢٨٦ - رَقَّاش [○] Glyptographe (F).
Glyptographer (E)

الرقاش من تعاطى الرقاشة أي علم الحجارة المقوشة القديمة العهد .

٣١٢٨٧ - رَقَّاشَة [○] Glyptographie (F).
Glyptography (E).

الرقاشة هي علم الحجارة المقوشة او المحفورة القيمة العهد .

٣١٢٨٨ - رَكَاجِي [○] Epigénique (F).
Epirogenic (E).

نعت تعريفي يطلق على الحركة العمودية التي تصيب بعض اجزاء الكتل القارية . مثلالا على ذلك الارتفاع المستمر .



ريله



زينة

٣١٣٠١ - سَحْجَة ° Etéiens (F).

اسم يطلق على رباح خاصة تهب فوق البحر الأبيض المتوسط وصفات حوضه. مصدرها تناوبي من الشمال ومن الجنوب، يحترقها التبريد فوق الماء ودرجة حرارة الصحاري، من الصحراء الكبرى إلى الجزيرة.

٣١٣٠٢ - سَحْجَة ° Placentation (F).

السحجة في النبات هي كيفية انجراج السند داخل المبيض. وقد تكون على ثلاثة أشكال: سحوية أو جولية أو مركزية.

٣١٣٠٣ - سَحْجَة ° Aboral (F). Aboral (E).

تحت تعريفي يطلق في علم الزولوجية على ما هو كائن في الناحية المقابلة للتم عند الحيوانات النخاعية.

٣١٣٠٤ - سَحْجَة ° Géothermie (F). Geothermy (E).

السحجة هي حرارة الأرض.

٣١٣٠٥ - سَحْجَة ° Géothermique (F).

تحت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بحرارة الأرض.

٣١٣٠٦ - سَنَبِيل ° Sphenophyllum (S).

جنس نباتات متحجرة من فئة السنبليات. جميع أنواعها جذمورية، عشبية، موزقة. منبتها المنابع والوديان.

٣١٣٠٧ - سَنَبِيلِيَّات ° Sphenophyllées (F).

فئة نباتات متحجرة ظهرت في الحقبة الباليوينة وانقرضت في البرمية من الأماج الأول إلى آخره. يقال إن الأمسويات سوية البوغ تنحدر منها ذلك لأن نقط الشبه بينها لا تقل عن ٨٥٪.

٣١٣٠٨ - سَنَبِيلَة ° Pinnule (F). Pinnule (E).

السنبيلة ورقة لا تيسر الشكل، غالباً مستطيلة.

٣١٣٠٩ - سَنَبِيل ° Saproel, Saproëlle (F).

السنبيل حصة تنبت تعود إلى بقايا حيوانات مجهزة رست في ثمر المحار فستحتها البكتيريا.

٣١٣١٠ - سَنَبِيلِي ° Saproelique (F). Saproëlle (E).

تحت تعريفي يطلق على المادة العضوية المائعة إلى العظم والنبوت التي فستحتها المياه الناعمة.

٣١٣١١ - سَنَبِيلَك ° Cimbex (S). Cimbex (F).

جنس حشرات ماصة من غشائيات الأجنحة وصفيلة السنبليات. أنواعها المعروفة نحو ٢٠ إعطائها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة. تألف النباتات والحراج الطفيلة | أجسامها كبيرة، شديدة النشط. إعطائها ماصة، قرونها الاستشعارية صلبة الأطراف. أكتابها

٣١٢٩٧ - زَمَنَة ° Melipona (S). Mélipone (F)

جنس حشرات عسالة من غشائيات الأجنحة وصفيلة الزمعات. أنواعها المعروفة نحو ٦٠ إعطائها المناطق الاستوائية والحرارة | أجسامها معتدلة القد أو صغيرة، محبة البطون، خفيفة القشار، عاصمة الشذام. ملجنها الحيواني جماعي كالنحل. نولها يتكون من ثلاث قنات: الأولى ثم الذكور ثم فئة العاملات العامة الشوار الشقي. نالها تطول، حسب الأنواع، من ١٢ إلى ٢٧ سم. ذكورها تطول من ١٠ إلى ١٤ سم. أما عاملاتها فتطول من ١١ إلى ١٥ سم | كوارتها أو مهاجرها محروسة، شبه هرمية الشكل، أنواعها سلوجها. نثارها صفوف أفقية الارتكاز تستعملها الأولى لمتح السرة. أما رحق الإزهار التي تنجبها العاملات فتتأخر به أجربة يصبغ الشكل مركزها في الزام الأول أي الأسفل من الكؤارة | عملها يختلف مع اختلاف الأنواع والمراعي. أما الإنتاج الحولي فيتراوح من ٢ إلى ٦ كيلو | أعرف أنواعها وأشهرها الثلاثة التالية:

— زَمَنَة التزليل Melipona scutellaris (S).
أكبر أنواع الزمعة وأعماها انتشاراً. عملها جيد الصنف، منبري العرف، مستحب الطعم. إنتاجها الحولي نحو ٦ كيلو.

— زَمَنَة الترافوي Melipona fluvipes (S).
متوسطة القد والانتشار. عملها جيد الصنف، عطري العرف، مستحب الطعم. إنتاجها الحولي نحو ٥ كيلو.

— زَمَنَة أنكسوي Melipona enxui (S).
متوسطة القد. تربى في كؤارات خاصة تلقى على الأشجار. عملها طيب، مقو، ناعش، مستحب الطعم. إنتاجها الحولي نحو ٣ كيلو.

٣١٢٩٨ - زَمَنِيَّات ° Melliponidae (S). Méliponitidae (F)

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الأجنحة. أجسامها وأنواعها المعروفة متوسطة الحد. إعطائها بعض المناطق الاستوائية والحرارة من المالمين القديم والجديد | أجسامها شبيهة بأجسام النحل لكنها أصغر قدماً ولا شذام لها. جميعها عسالة. معظمها يقيم كؤارته في جذوع الأشجار النخرة | ملجنها الحيواني جماعي كالنحل. نولها يتألف من اثني كاملة الشوار الشقي وظيفتها منح السرة. ومن بعض الذكور وظيفتها كود الأولى المالكة. ومن عاملات عاصمة الشوار الشقي تنبد الكؤارات وتنبني فيها النحارب وتجنبي الرحق والطلع | أشهر أجسامها الزمعة والصواعة.

٣١٢٩٩ - زَمَلَف ° Spermatie (F).

الزملف اسم يطلقه علماء النبات على البوغ الخارجي، الحظي الشكل، عند بعض الفطور والخفيات.

٣١٣٠٠ - سَنَبِيلَاتِي ° Sigillariées (F).

مجموعة نباتات متحجرة قريبة الشبه بالهشوميات. تميزت بسهولة النضجة الكبيرة وأوراقها المركبة المنتظمة التصيق الطولي.

الزمنية عن رابطته النخني في بعض الالتفات اخصها المشطورات .

Stèle (F). Stèle (E). ○ غُطَّاب ٣١٣٢٠

الشطاب ، في علم النبات ، هو الجزء الداخلي من الجذر او الساق الذي يشمل الاعوية الخشبية واقنية النجب .

Acrogène (F). Acrogenous (E). ○ شَمَاح ٣١٣٢١

نمت تعريفي يطلق على كل فطر نوعه ساقه وارسوسته رأسية الشماخ .

Hétérozygotie (F). Heterozygosity (E) ○ شَيْكَاة ٣١٣٢٢

الشباة هي عدم تماثل العوامل الوراثية عند الحيوان والنبات | ومنهم من قال اختلائية الأزواج . راجع اشهب .

Travertin (F) ○ صَدُوج ٣١٣٢٣

حجر من الفليس الجصي يصلح للبناء .

Pétrographe (F). Petrograph (E). ○ صَمَّام ٣١٣٢٤

الصمَّام من تعاطى الصنامة اى علم الصخور .

Haliëtur (S). Haliëtur (F). ○ صُفَّر ٣١٣٢٥

جنس طير من الكولير وفصيلة الصقرجات . انواعه المعروفة ثلاثة اعطائها الهند وآسية الشرقية وأستراليا | اجسامها شبيهة اجسام العقبان إلا انها اصفر قداً . اطوالها تراوح من ٥٠ الى ٦٠ سم . اثنائها ثنائية اللون . رؤوسها واعناقها وصنوبرها بعض . اربيتها وساقها اطراف بطونها وانخادها واذنابها الى الشقة السراء ، مواجها يختلف مع اختلاف الانواع | تألف الشطوط البحرية والمواني . تطفس في الماء كالنورس . قوتها الاسماك وكل ما تيسر لها من مواد عضوية .

Trigona (S). Trigone (F) ○ صَوَاعَة ٣١٣٢٦

جنس حشرات مسالة من غشائيات الاجنحة وفصيلة الزيمعات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها المناطق الاستوائية | اجسامها شبيهة اجسام النحل لكنها اصفر قداً ولا شدام لها انا تعض وعضتها مؤذية | ملجئها الحياتي جماعي كسائر انواع الزيمعات . شيد كزاراتها على الاشجار وعلى الصخور . تنهبها بالطين وتغلفها بمختلف المواد النباتية . مداخها فريدة انبوية الشكل ، تسمح بمرور صواعة واحدة . نخابرها اقلية الارتكار . اجرة الصل بيضية الشكل ، صغيرة القد ، تحتل الزمام الاول والثاني من الكوارة | عملها دون الوسط . اتاجها الحولي نحو ٥ كيلو .

Phylétique (F). Phyletic (E). ○ صَوْغِي ٣١٣٢٧

نمت تعريفي يطلق على التسلسل الكينوني في الحيوان والنبات .

ملونة ، يكثر فيها الاصفر | يرقاتها خاضلة لتلثم لوراق معظم الاشجار الحرجية باستثناء الصنوبريات . وريقاتها هذه تفتد ، عند الدفاع عن النفس ، بسائل اخضر اللون كاو . طور الاكمال ينفضي ضمن فليجة سمراء اللون تحبكا على الافئدة او على الاوراق العروة .

Cimbridae (S). Cimbricidés (F). ○ سَبَكِيَّات ٣١٣٢٨

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة الحد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة . يكثر وجودها في الغابات والحراج الجبلية | اجسامها متوسطة القد او كبيرة ، مخاطمها ماصة . قرونها الاستشعارية ممتدة الطول ، صلبة الاطراف | يرقاتها خاضلة ، مؤذية عند كثرتها | اشهر اجناسها السبك .

Suncus (S) ○ سُنُقُس ، سُنُور ٣١٣٢٩

جنس حيوانات لبونة جاسدة من فصيلة الزبابيات ورتبة الحشرات . انواعه المعروفة نحو ٢٥ اعطائها بعض مناطق العالم القديم اخصها الهند وافريقية وجزيرة مدغسكر | اجسامها صغيرة القد تعول من ٧ الى ١٢ سم . رؤوسها مخروطية الشكل . عيونها غريزية . اذ انها صغيرة . جرادتها معتدلة الطول . اصابعها مجهزة باظافر حادة . اذناها طويلة . اثنائها متباينة الالوان السوية تكثر فيها الدسمة والسمرة القائمة | اثنائها اميز قداً من ذكورها وامهت ثوبا منها | قوتها الحشرات والديدان .

Cénozoïque (F). سَنُوزِي ، حَيَيت ٣١٣٣٠

نمت تعريفي يطلق ، حصلياً ، على برهة من الزمن تشمل الاحقاب التي توالى منذ الحقبة النيواليت الى المعاصرة .

Concolore (F). سَوَيِّ اللُّون ٣١٣٣١

نمت وصفي يطلق على ما كان ثوبه متساوي اللون الواحد .

Isosporé (F). Isoporous (E). ○ سَوِيل اللُّون ٣١٣٣٢

نمت تعريفي يطلق على كل نبات من مستورات الزهر الوعائية بوجه متجانس الشق والشكل .

Atypique (F). Atypic (E). ○ شَلِيخ ٣١٣٣٣

نمت تعريفي يطلق ، في علم النبات ، على كل تسلسل غلويي يثد عن القش المثالي .

Surrection (F). شُخُوص ، سُنُوق ٣١٣٣٤

الشخوص ، حصلياً ، هو الارتفاع الذي يطرأ على مكان معين من سطح الأرض .

Frustule (F). Frustule (E). ○ شُدِّيْرَة ٣١٣٣٥

جسيم صواني التركيب . شديد الصغر ، فصلته الموامل



صن

الاولان المزخرفة الجميلة | مسرحها بحار المناطق الحارة. يكثر وجودها قرب وحاف وحشاف المرجان والريجان.

31328 - صَبْوَة Blague (F). Tobacco-pouch (E).
الصَبْوَة كيس من جلد يستعمل لحفظ التبن، التبغ المدفون، صغير المقد يوضع في الجيب.

31336 - طَهَب Pangium (S).
Pangie (F) Pangium (E)



فجرة

جنس اشجار حرجية من فصيلة الطهيبات. منهاها البلاد الحارة، يكثر وجودها في جاوا | سوفها فرياء. اوراتها منطوقة، متباعدة، ازهارها ثنائية السكن. ثمارها عنبة لوبية | اشهر انواعها الطهبة المأكولة. P. odula (S).
منهاها اجزائها من خشب ولحاء وقشور واوراق وثبار جمالي العانة وافر الحامض السانديريكي | ثمارها مأكولة بعد ثمنها في ساعة في الماء. ويستخرج من بزورها بعد ثمنها ايضا مادة زيتية سهلة شائعة الاستعمال | اما اشجارها فمفيدة الصلاة فاخرة الصنف.

31329 - صُجْرَة Enicognathus (S).
Enicognathe (F) Enicognathus (E).

جنس طير من المتكشّات وفصيلة البغاوات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها البلاد الحارة احصاه الهند وامريكا الجنوبية | ملجنها الحياتي جماعي، قوتها الثمار البرية وبعض الحشرات | اجسامها معتلة القد. تتميز بمنافرها المستطيلة الالاف العليا المعزجة الشكل | اشهرها فجرة الشيلي ثوبها الى الخضار الاسفع الموج. قمته رأسها واطراف قوامها الى الزرق المابقة. محسراها وذننها الى الصخرة القرمزية.

31337 - طَهِيَّات Panglaciae (S).
Panglaciée (F). Panglaciée (E).

فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منهاها البلاد الحارة والاسوائية من العالم القديم | اعرف اجناسها واشهرها الطهَب والصَّوْرَة.

31330 - هَرَسِيَّة Delphinula (S).
Delphinula (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الصُرَسَات. انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار المناطق الحارة من العالم القديم | اصداها شبه مخروطية الشكل، لؤلؤة الصفحات الداخلية، كثيرة التضاريس والتتواءات الشاكلة من الخارج | اشهر انواعها الصُرَسَة المعزجة D. tacinata (S) التي يكثر وجودها في بحار الصين.

31338 - حُذْرَيْن Andrena (S) Andrena (F).

جنس حشرات حبوبية من فصيلة العنبيات. انواعه المعروفة عديدة معظمها من علم المناطق الشالية. ملجنها الحياتي فريدي. اوكرها محاجر تحفرها في التربة | اجسامها صغيرة شبيهة باجسام النحل. اوابها متبانية منها السوءة اللون ومنها المخضبة والمجعدة | قوتها رحيق الازهار وطعمها تختزن بعضه في تغاريب ورتبة العانة تقيها من محاجرها كذله لدها قبل ان تتحول الى حشرات جميلة سارحة | اشهر انواعها واعضا انتشارا Andrena cineraria (S) العنبرية الرمادية
Andrena fulva (S) والعنبرية الصفراء

31331 - هَرَسِيَّات Delphinulidae (S).
Delphinulidés (F).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم الجحشية. اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة | اصداها شبه مخروطية الشكل، كثيرة التضاريس والاطنات والتتواءات الشاكلة. نوهاتها مستديرة. اجسامها صغيرة، راحة الاردية، معتلة الارجل | اشهر اجناسها الصُرَسَة.

31339 - حُذْرِيَّات Andrenidae (S).
Andrenidés (F)

فصيلة حشرات من الحبوبيات ورتبة غشائيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة، اعطانها المناطق الشالية وبعض الاقاليم المعتلة المنعرة نحو الباردة | اجسامها صغيرة شبيهة بالنحل. اوابها ملونة تكثر فيها السمرة المختلفة الحاجة وبعضها اصفر او مخضب بالاصفر الاخضر | ملجنها الحياتي فريدي. الذكر يمشى حتى زمن الدحاب فيكون الاش وبلاشي. الانثى تمتع مكثها في تغاريب غشاهما التي تقيها في محجر تحفرها في التربة | اعرف اجناسها واشهرها الحذرين والمكسود.

31342 - طَائِي Stationnel (F).

نمت تعريفى يطلق، في علمي الحيوان والنبات، على كل مجين سقتر الصفات.

31340 - عَلِيمَات الخَلَايا Pluricellulaire (F).
Pluricellular (E)

نمت تعريفى يطلق على كل كائن حي مركب من تكتل الخلايا.

31333 - طَائِي Parallele (F). Paralle (E).

نمت تعريفى يطلق على كل ما هو خاص بالسطوط البحرية.

31334 - طَلَسَاة Glyptogénès (F).
Glyptogenesis (E).

طور من اطوار المتاعش الحصلية حيث العوامل الطبيعية الناقضة، احصاه الماء والرياح، قوّضت معالم القشامة الاولى.

31341 - عَلِيمَات المِرْعَة Lipotyphle (S).
Lipotyphles (F). Lipotyphia (E).

مرتبة من الحشريات تتميز بخلق امثالها من المِرْعَة وشبه

31335 - طَلَرِيَّات Acronuridae (S).
Acronuridés (F). Acronuridae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شاكيات الزمات، اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها صغيرة القد، اراهية

طَرْدِيَّةٌ . ثمارها عَنَبِيَّةٌ لَبِيَّةٌ ۖ اَشهر انواعها العصرة السامة H. venenata . ثمارها سامة ذائعة .

٣١٣٤٨ - عِنَاكَة ○ Gonochorisme (F).

Gonochorism (E).
العنَاكة هي الانفصال الشقي . وهي بيولوجيًا عكس العنثية .

٣١٣٤٩ - عَيْنِك ○ Gonochorique (F). Gonochoric (E)

نعت تعريفي يطلق ، بيولوجيًا ، على كل كائن وحيد الشق أن في الحيوان أم في النبات .

٣١٣٥٠ - عَوْس ○ Eos (S). Eos (F). Eos (E).

جنس طير من المسققات وفصيلة الببغاوات . انواعه المعروفة نحو ١٠ موطنها يمتد من الهند الصينية الى جزر الزابج . ملجنها الجاهلي جماعي . افواجها تراوح من ٢٠ الى ١٠٠ زوج ۖ اجسامها معتدلة القد . اناؤها تزاوج من الصخرة الارجوانية الى البرتقالية ۖ اعرف انواعها واشهرها :

Eos rubra (S) - العَوْسُ الْبَاوُوسِي
Eos Cochineensis (S). - العَوْسُ الْكُوْنِيْنِي

٣١٣٥١ - عَوَمَرَان ، اَزْرَان Synergides (F).

الموربان او الازران اسم يطلق على غلطيون تَوْجَان نصّ الملك أو ينتهي بهما جراب الطلع .

٣١٣٥٢ - عَشَارِيَات ○ Pallophytates, Profilliales (F).

لقمة من النبات تنتمي الى مستورات الزهر الوعائية . مركزها التسلسلي يأتي بعد الطريقات وبين الشُعَبَات والطعلات ۖ وهي من النباتات البسيطة التركيب العادة الجذور الحقيقية .

٣١٣٥٣ - عُلْجِيَّات ○ Galeidae (S).

Galeidae (F). Galeidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من السنقليات . اجناسها المعاصرة المعروفة ثلاثة ، جميعها من الاشكال الوشعية الشكل ۖ تتميز بتناسمها المثلثية بأغشية سادات متحركة . أشهر اجناسها واعما انتشارًا الفطروس .

٣١٣٥٤ - غَلِيْتُودُون ○ Glyptodon (F).

Glyptodon (E).
جنس حيوانات احفورية من اللبونات الدرد . احافيرها تعود الى الابعاج الرباعي . جميعها من المفترسات الامريكية المهة ۖ اجسامها مضغوطة ، كبيرة ، مغطاة بذبال عظمية سميكة الزوايا . اطوالها بما فيه الرأس والذنب نحو ثلاثة أمتار ۖ يقال أنها كانت تعيش حياة التناو أو المنزوع .

٣١٣٥٥ - غَيْشِيل ○ Dentalium (S). Dentale (F)

جنس حيوانات بحرية من الرخويات الزورقيات وفصيلة الضليليات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم ۖ اصدانها بوقية الشكل او مردنية . منها الجالسة والمنطلقة والمحسنة . صفحتها الخارجية مخدنة السطح .

اتعدام مرتبتها الحوضي . وهي تضم سبع فصائل الزبايات والطلوبينيات والبيانيات والمقتذبات والمذاتيات والمكسبات والمصريبات .

٣١٣٤٢ - عُشْرَب ○ Chrysochloris (S).

Chrysochlore (F).
جنس حيوانات لبونة من فصيلة المصريبات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع افريقية الشرقية والجنوبية ۖ شكله قريب الشبه بالخط . جسمه بطول من ١٢ الى ١٦ سم . رأسه مخروطي الشكل ، نلق الخطم . عيناه صغيرتان مغلوقتان بغشاوة من الجلد متحركة . اذناه صغيرتان ، ماسحتان ، لا قوتية التركيب . عنقه شديدة القصر . ذنبه جعدة . جرابزه قصيرة ، مسحة باظافير ضلعية . جلسته . الامامية منها رباعية الاصابع . الخلفية خصلتها . ثوبه قسطنطي اللون كثيف الوبر الناعم القصير . الاشي ابرز قدا من الذكر ۖ قوته الحشرات والنباتان والزحافات الصغيرة ۖ أشهر انواعه :

Chrysochloris aures (S).
Chrysochlore doré, Taupe-dorée (S).
موطنه افريقية الجنوبية . ثوبه قسطنطي اللون ، ذهبي المواجه .

٣١٣٤٣ - عُشْرِيَّات ○ Chrysochloridae (S).

Chrysochloridés (F). Chrysochloridées (E).
فصيلة حيوانات لبونة حاضرة من عجميات المعرعة ورتبة الحشریات . انواعها المعروفة عديدة جميعها جنس واحد الصرب ۖ اجسامها مكسرة ، اسطوانية الشكل ، صغيرة القد . رؤوسها مستطيلة ، مخروطية ، نالقة الاخطام . عيونها صغيرة مغلوقة بغشاء جلدي متحرك . اذناها صغيرة ، ماسحة . جرابزها الامامية مسحة باظافير نشيطة . الزوايا قسطنطي اللون ، جميلة الماجات . المترابكة ، كثيفة الوبر الناعم القصير . اثنائها اكبر قدا من ذكورها .

٣١٣٤٤ - هَمِيم ○ Holometabole (F).

Holometaboleus (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حشرة نامة التطور الاكتمالي . م عسمة .

٣١٣٤٥ - هَلِيد ○ Tractus (F). Tractus (E).

اسم يطلق على الخيوط والحزم اللينة المروجة في وثن النسيج النباتية والحيوانية .

٣١٣٤٦ - هَصْبُون ○ Nevraze (F). Nevraze (E).

اسم يطلق على الجهاز العصبي المركزي الذي يشمل الدماغ والنخاع الشوكي .

٣١٣٤٧ - هَصْبُونَة ○ Hydnocarpus (S). Hydnocarpe (F)

جنس اشجار حرجية من فصيلة الطيبيات . انواعها المعروفة ستة . منهاها البلاد الحارة والاستوائية ۖ اشجارها كبيرة دائمة . اوراقها متعاقبة . ازهارها محورية الاركان ،



عسرب



عوس



غليتودون

Gal. tigrinus (S).

فُطْرُوس تَيرِي
يكثر وجوده في المحيط الهندي. طوله نحو ١٥٠ سم.
ثوبه بين الصبغة والشفقة المروقة بالسرعة المعلقة. بطنه
الى الشهية الماجية.

Phyllite, Phyllithe (F).

Phyllite (E).

ورقة متحجرة او حجر غشقة الأوراق بوسوما.

Astrophysique (F).

Astrophysical (E).

الفيزياء الكوكبية علم يبحث في طبيعة الكواكب وفي
المنامح والاساليب التقنية الخاصة بها.



فطرس

Bathyal (F). Bathyal (E).

٣١٣٦٥ - قَاعِي
نعت تعريفي يطلق في علم الحسيلة (الجيولوجية) على
المنطقة البحرية التي يراوح عمقها من ٢٠٠ الى ١٠٠٠ م
لأن ميزات هذه المنطقة: عدم اضطراب المياه وتقلتها.
استقرار الحرارة وتساويها. عدم نفاذ التور. ثقل وجود
النوت في الطبقة العليا وانحائها في الطبقتين الوسطى
والسفلى. عظمها مصورة بالرخويات رأسيات الأرجل
والقشريات والاسماك المقترسة والسامة التي تعيش على
المواد العضوية المائعة الى البحث الراسية | اما الانثوية
الكثائية او الشهية المنتشرة على سطح الارض فهي
بعضها تنمو الى الفشار او الصلصال القاعي الذي كان
راسيا على هذه الاعماق في الاباح الاول.

Xerophilie (F). Xerophily (E)

٣١٣٦٦ - قَنَانَة
القنانة منشع طبيعي يتولد النبات القن، الذي يرغش في
المنحدرات الجافة، الى تكاثف الامعة واغوار الخلايا
السمية في داخلها.

Dryopithecus (S).

Dryopithecus (E)

٣١٣٦٧ - قِرْدُ الطَّص
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى قرد الطص. جنس قرد
مفترسة تنود احاطتها الى الزمن الميوسيني من الحقبة
البليوجينية | هيكلها العظمي شبيه بهيكل القورلي وشبه
البهامة من حيث القد | وقد ثبت الآن ان لا صلة بينه وبين
السلالات البشرية.

Crosopus, Neomys (S)

Crosopus (F).

٣١٣٦٨ - قُرُصُوب
حيوان ايون وحيد الجنس والنوع من فصيلة الزبانيات
ورتبة الحفريات. اعطاه تيم من الصين الى اربعة.
يألف ضفلات الانهار، يحوم ويخس في الماء فيقتنص
الحشرات المائية واسماكها والاربابها وسرور الاسماك
وبلاعيها | جسمه صغير القد، شبه بالزبابة. طوله بما
فيه الذنب نحو ٢٠ سم. رأسه مخروطي الشكل، نلق
الحصم، عنانه صغيرتان، مستديرتان، عتقه قصيرة.
توالده ككبة الاطراف، عاتمة الاصابع، حناجره حلب لب
جامد. ذنبه الذي يبلغ طوله نحو ٨ سم. شبه مجاتي
الشكل، يطوقه حنار من الهلب القصير الجامد. ثوبه الى

اجسامها اسطوانية. ارنبتها قليلة الرحابة. ارجلها
قصيرة، ثلاثة القلق | تعيش متغذية في الرمال والاسمال.

Dentalides (S). Dentalidés (F).

٣١٣٦٩ - دُنتَالِيَّات
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات الزورنات.
اجسامها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في جميع العالم.
اكثرها قد ابعدها غورا | اصنافها كسيلة المادة، متباينة
الاشكال والحجوم، منها المرنبة واليونية والانويوية
والكبيرة والصغيرة. جميعها مفتوحة الطرفين. صنفاتها
العارجية مخددة السطوح او ماسية، الداخلة صقيلة
اشهر اجسامها التليل.

Gamétophyte (F).

Gametophyte (E).

٣١٣٧٠ - دُتَامَة
الهامية، في علم النبات، طور من اطوار الانصاب
الشري، يمتد مع التحويل الكروماتيني وينتهي عند
الانصاب.

Anisotrope (F).

Anisotrope (E).

٣١٣٧١ - دُور مَسَاوِي الْاَاجَا
نعت تعريفي يطلق، فيزيائيا، على كل مائة صفاتها
الحكمية او الميكانيكية لاشعاع الاتجاه.

Chlamydé (F).

٣١٣٧٢ - دُحَيْث
اسم يطلق على كل زهرة ثنائية الكم. ويطلق ايضا على
كل عضو يشبه غلات خارجي.

Tuniciera, Urochordés (F)

Urochordata (E)

٣١٣٧٣ - دُصِيَّات
صنف حيوانات بحرية ركبته او طوحية ملحونة يشبه
الثقل | فصائلها وانواعها المعاصرة متوسطة العدد.
اجسامها صغيرة القد، مستطيلة الشكل. تتميز بجهازها
العصبي الظهري الاركانز وهو مؤلف من مكاف شوكي
يمتد امتداد الجسم. اما التنفس فتؤتفه فلولج خيشومية
مركزها في جانبي البلعوم.

Interstellaire (F).

Interstellar (E).

٣١٣٧٤ - دُفَاء حَسَائِي
اسم يطلق على الفضاء القائم بين النجوم والمجرات.

Galeocorde (S).

Galeocorde (F). Galeocorde (E).

٣١٣٧٥ - دُفُورُوس
جنس اسماك بحرية من السفنقات وفصيلة الطلجات.
انواعها المعاصرة المعروفة ثلاثة اما المفترسة المتحجرة في
الاراضي الطباشيرية والثالثة فارعة | اجسامها وشبه
الشكل تطلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. تتميز بانسانها
الحزرة والتساوية العدد في التكنين | لشهر انواعها
المعاصرة فطروس الشمال والفطروس النوري

Gal. Arcticus (S)

٣١٣٧٦ - دُفُورُوس الشَّمال
يكثر وجوده في بحار الشمال. ثوبه الى الزرقة الخضراء.
طوله من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم.

٣١٣٧٣ - قَصَائِدُ

Bittacidae (S). Bittacidae (F).
فصيلة حشرات قانصة من رتبة شارات الاجنحة
عصيات الجناح. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة
منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء المناطق الشمالية
اجسامها قضيبة متباينة الطول. قوائمها دقيقة مستطيلة.
اجنحتها ضيقة، مستديرة الاطراف || قوتها كل ما
استطاعة قصه من ذباب وهوام وحشرات. يرقاتها
بأكثرتها دامة نائلة ومنها الواجبة والقضابة | اشهر
اجناسها القاصصة.

٣١٣٧٤ - قُصَامَة

Xenophora (S). Xenophore (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهنات الأرجل
امامتات الصلصم وفصيلة القمقيات. انواعها المعروفة
قليلة العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة | اصداها
شبه مظلة الشكل، كسبة المائدة، متراكبة الاطانات
المتباينة الاشكال والالوان | اعرف انواعها واشهرها :

- القُصَامَة المَهْنِيَّة X. lithophora (S).
- القُصَامَة المَصْدَلَة X. corrugeta (S).

٣١٣٧٥ - قُصَامَات

Xenophoridae (S). Xenophoridés (F).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مهنات الأرجل
امامتات الصلصم. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة
العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة | اصداها
صغيرة القد، مظلة الشكل أو صيوانية. صلصاتها
الداخلية صاعدة المادة اللؤلؤة اما الخارجية فمدبجة
بالزخارف والاطانات المتباينة الاشكال والالوان | اشهر
اجناسها واعرفها القمعة.

٣١٣٧٦ - الْقُرَاسَة

Nomada (S). Nomade (F).
جنس حشرات حنوية من غشائيات الاجنحة وفصيلة
القوراسيات. انواعها المعروفة نحو ١٢٠ منتشرة في جميع
اقطار العالم | اجسامها رشيقة هيفاء متوسطة القد أو
صغيرة. انواها متباينة تغلب فيها الشقعة فالصعبة
والتنجيب بالاصفر أو الزنجري | للحشرات الجلالنة
تمشي على رجليها الاقدام وظلها. يرقاتها طفيلية تعيش في
محاجر الدرنيات والنوازل وغيرها.

٣١٣٧٧ - الْقُرَاسِيَّات

Nomadidae (S). Nomadidae (F).
فصيلة حشرات حنوية من رتبة غشائيات الاجنحة.
اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع
العالم | نظامها الحياتي فريدي. اناتها تضم المكن قرب
مداخل محاجر غيرها من غشائيات الاجنحة اخصها
الدرنيات والهكتراسيات والنوازل، فتصرع البرقات
فور نفقا الى داخل المحاجر حيث تعيش كامل حياتها
البرقية على ما تبنيه العوائل | اشهر اجناسها القوراسية.

٣١٣٧٨ - قَيْسِي

Phénotypique (F). Phenotypic (E).
ويدعى النمط الظاهري. نعت تعريفي يطلق على كل ما له
صلة بالنمط. التنازل القيسي لا وراثي.

الشبهة السوداء تشبه سمرتها في الظهر وتغير في الصدر
والطن | الانثى ابيض قد من الذكر وتحتل بالتوب نفسه.

٣١٣٧٩ - قُرْصَامَة

Crocudra (S). Crocudra (F). Crocudra (E).
جنس حيوانات لبونة من فصيلة الزبابيات ورتبة
الحشرجات. انواعها المعروفة نحو ٦٠ اعطانها البلاد
الحارة والمتوسطة الحرارة من العالم القديم. جميع انواعها
جاسة قوتها الحشرات والبهائم | اجسامها تطول من ١٢
الى ٢٦ سم. رؤوسها مخروطية، ذلقة الانحطام. عيونها
صغيرة، مستديرة. اذانها مسحة. جرامها معتلة القد،
خصاسية الاصابع، مستطيلة الاظافر الحادة. النواها
تزاحم من السمرة الحنكية المواج الى السمرة الماعقة |
انها امير قضا من ذكورها، يعتقد ان حملها يوم نحو
٢٠ يوما تضع في تمامه من ٣ الى ١٠ ايراص وذلك
حسب الانواع.

٣١٣٧٠ - قُرْط

Embletonia (S). Emblétonie (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهنات الأرجل،
خلقيات الصلصم، جلبات التنفس. انواعها المعروفة
قليلة العدد منتشرة في بحر النصف الشمالي من الكرة
الأرضية | اجسامها صغيرة، عريضة، صلبة
الاصداص، مستطيلة الشكل، عديدة اللوامس القنوية
الاهليجية، المبطلة. معظم انواعها يعيش على
الصخور المعدة للغور.



قُرْصَامَة

٣١٣٧١ - قُورَسِيَّات

Xyridaceae (S). Xyridacées (F).
فصيلة نباتية من وحيدة الفلقة. اجناسها وانواعها المعروفة
متوسطة الحد. مهدها بعض الاصقاع الاسيوية
والامريكية. جميعها من ثوب المناطق والمواقع الرطبة |
نباتاتها جذمية معمرة. اولقاتها قرصية الانتشاب عصفية
الشكل أو منصلية. تنويرها شعراخي. سننلي التجميع،
هامي الارتكاز. ازهارها خنثوية، كبيرة القد، ملونة.
اكمامها منضغة الراسات. ثمارها جراء ثلاثية الفلق.
يزورها آحية، نشوبة المائدة.

٣١٣٧٢ - قَصَاصَة

Bittacus (S). Bittaque (F).
جنس حشرات قانصة عصبية الجناح من فصيلة
القصاصيات. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم
اقطار العالم | اجسامها قضيبة مستطيلة القوائم والاجنحة.
يكثر وجودها في المواقع الرطبة وترب مجاري الماء |
جميعها معتدلة قوتها الذباب والهوام. يرقاتها دامة ونائلة
تعيش في الجلالة وتحت المدر.

القَصَاصَة المَصْدَة

- B. tipuloides (S).
- اعطانها شرقي حوض البحر الابيض المتوسط
- القَصَاصَة الافريقية B. capensis (S).
- اعطانها معظم مناطق افريقية الجنوبية.
- القَصَاصَة البرازيلية B. Blancheti (S).
- اعطانها البرازيل وخاصة حوض الامازون.

Colloïde (F). Colloïd (E).

٣١٣٨٦ - كُولِيد

اسم يطلق في علم الكيمياء على كل جسم لا يذوب في الماء كاستماع شبه المتبلورات.

Prothalle (F).

Prothallium, Prothallus (E).

٣١٣٨٧ - كُوتَحَة

تنوع صغير، صفحي الشكل غالباً، يعلو بويضة مستورات الزهر الوعائية، تنمو عليه الأشيرة والسمن.

Condylura (S). Condylure (F). * ٣١٣٨٨ - كَنْدُل

حوان لون جاش وحيد الجنس والنوع من فصيلة الطوبانيات ورتبة الحشرات، موطنه امريكا الشمالية | جسمه صغير القد، اسطوانتي الشكل، يعلو نحو ٢٤ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١١ سم. رأسه مخروطي الشكل ينتهي بنقطة صلبة بطولها اكمل من انزاع طليستان. ذنبه مبطن الهلج القصير. جرابه خصاصة الاصابع المجزأة باظفار قوية، مستطيلة. ثوبه اسود اللون، اشجع الموج | الانثى اميز عن الذكر ولها ثوب منة. تحمل مرة واحدة في العام وتضع من يرصين الى خمسة ايراص | قوت الحشرات واليدان. يعيش في تلق يخلطه على صق يراوح من ٣٠ الى ٦٠ سم.

Terre non cultivée (F).

٣١٣٨٩ - كَنْكُث

الكثكث كل تربة غير مزروعة مستحالة كانت او غير مستحالة.

Exothermique (F).

Exothermic (E)

٣١٣٩٠ - لَاحِش

نعت تعريفي يطلق على كل تفاعل كيميائي يند الحرارة الناتجة عن تفاعله او تركبه.

Brassolite (S). Brassolia (F).

٣١٣٩١ - كَجَاجَة

جنس حشرات فراشية صولجانيات القرن من فصيلة اللجانيات ورتبة حشرات الاجنحة | انواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها البلاد الحارة اجسامها كبيرة القد. رولانها مقلقة جميلة التضبيب. قوتها الانتشارية صولجانية الشكل | اسارها خاضعة. ملجها الحياتي واحد غشائي المانة. تسرح في الليل وتعود لي جرابها في النهار. تلهم اوراق الكثير من النبات ومنها الموز فتؤنبه اشء الاذى.

Brassolidae (S).

Brassolidae (F).

٣١٣٩٢ - كَجَاجِيَّات

فصيلة حشرات من رتبة حشرات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها البلاد الحارة الافريقية والامريكية | جميع انواعها كبيرة القد، جميلة الالوان والتقيح والزخرفة | اسارها خاضعة قوتها اوراق النبات. جميعها شرعية الملج الحياتي تعيش مع بعضها البعض في اجرة كبيرة غشائية المانة تبيت فيها من

Bathymétrie (F).

Bathymetric (E)

٣١٣٩٦ - قِيَاسِي

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالقياصة.

Castnidae (S).

Castnides (F). Castnidae (E)

٣١٣٩٠ - كَسْتِنِيَّات

فصيلة حشرات فراشة من حشرات الاجنحة مختلفات القرون. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع المناطق الاستوائية اعصها الامريكية | جميع انواعها متوسطة القد او كبيرة. تتميز بجبال رولانها الخشلة القشار الساطعة الالوان. وتتميز ايضا باسترسال رولانها عند الراحة، على شكل جملون | اشهر اجناسها الكستنية.

Castnia (S). Castnie (F). * ٣١٣٩١ - كَسْتِنِيَّة

جنس حشرات من حشرات الاجنحة وفصيلة الكستنيات انواعها المعروفة عديدة اعطائها معظم الاقاليم الاستوائية | اجسامها كبيرة القد تطول من ٣٥ الى ٤٥ سم. وبسالتها تراوح بين ١٠٠ الى ١١٥ مم. رولانها خشلة القشار جميلة الالوان الساطعة الموج بكثر فيها الاسمر الحظلي يعلوه تجنص وتقيح يراوح، حسب الانواع، من الاصفر الكبريتي الى الاحمر القرميدي | اسارها مؤنبه تغلظ سوق الموز والانناس والصبار وغيرها من النباتات اللينة.

Atta (S). Atta, Atte (F).

Atta (E).

٣١٣٩٢ - كُطَبَة

جنس حشرات من غشائيات الاجنحة وفصيلة النمليات. انواعها المعروفة قليلة العدد، معظمها امريكية المهد. ملجها الحياتي جماعي كسائر انواع النمل | اجسامها معتدلة الجرم لكنها تتميز بكبر وبخلاطة رؤوسها، فكوكها حادة قاضمة، حماتها ذرية تهريق مائة مختره.

Calamariidae (F).

٣١٣٩٣ - كَلَمَارِيَّات

فئة نباتات متخضرة يعود ظهورها الي الحقبة الكربونية. نباتاتها قريبة الشبه بالكنائيات. سولها لينة، مخشوشة، مجنونة، تطول من ٤ الى ١٠ امتار اوراقها حافظة الانتساب، عصية الشكل، مستطيلة. اعرف نباتاتها الكليمت والبصريات.

Culm, Dinantien (F).

Culm, Dinan (E).

٣١٣٩٤ - كَلِيمِي، نِيَتَانِي

كليمي من دكولم اسم موقع في المانية. ونيناني من ديتان اسم موقع في بلجيكة | ساف او طبق من الحقبة الكربونية تتميز بشسها الكثير المانة النباتية.

Calamite (F). Calamite (E).

٣١٣٩٥ - كَلِيمِيَّة

جنس نباتات متخضرة يكثر وجودها في الحقبة الكربونية من الاباح الاول | تتميز من الاسوسميات الجاكارة المتفرقة. شكلها قريب الشبه بالبوص. ارتفاعها يراوح من ٧ الى ٨ امتار.



كندل

٣١٣٩٧ - لَوْرَنْتِيَّة [○] *Laurentien (E) Lawrentien (E)*
نمت تعريفي يطلق على الطبقة السفلى من الحبة السحيقة
العائقة إلى الأباح ما قبل الكمبري.

٣١٣٩٨ - لِيُتُوْرِيَّات [○] *Lithosidae (S). Lithosidés (F).*
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الأجنحة. اجناسها
وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها المناطق الجبلية
والاقاليم الباردة من العالم القديم | اجسامها كثيفة الخمل ،
شبه لسطوانية الشكل ، تطول من ٢٢ الى ١٨ مم . سبطها
تتراوح من ٤٢ الى ٥٢ مم . رؤوسها مزوانية الشكل .
عيونها صغيرة . ملاسها ومرافها دقيقة . قرونها
الاستشعارية خيطية . رواشها الامامية ضيقة . اثوابها
عائمة الزخرفة ، الوانها تختلف مع اختلاف الانواع
| اشهر اجناسها الليتوزية .

٣١٣٩٩ - لِيُتُوْرِيَّة [○] *Lithosis (S) Lithosie (F). Lithosis (E)*
جنس حشرات فراشية من فصيلة الليتوزيات . انواعها
المعروفة نحو ٣٠ اعطائها جبال البالد المعتدلة الحرارة
من العالم القديم | اجسامها متكاثفة الخمل الناعم تطول
من ١٥ الى ١٨ مم . سبطها تتراوح من ٤٥ الى ٥٢ مم .
رؤوسها معتدلة الجسم ، صغيرة العيون ، دقيقة الملاس
والمرافش . ازيتها خيطية الشكل . رواشها الامامية
ضيقة . مقطوعة الأطراف . رواشها الخلفية رحيبة
الانفراج ، مستديرة الأطراف | اساريها تعيش على
الحزاز .

٣١٤٠٠ - مَاحِي [○] *Endothermique (F). Endothermic (E).*
نمت تعريفي يطلق على كل تفاعل كيميائي يمتص الحرارة
الناجمة عن تفاعله | معظم المتطجرات من العناصر
المالحة .

٣١٤٠١ - مَكَيَانِ الصَّخْر [○] *Hétérothallique (F). Heterothallic (E)*
نمت تعريفي يطلق في علم النبات على كل جهاز عضوي
يجاري منشع الثباين المشري .

٣١٤٠٢ - مَسَاوِي الصَّخْر [○] *Homothallique (F). Homothallic (E).*
نمت تعريفي يطلق في علم النبات على كل جهاز عضوي
يجاري منشع التساوي المشري .

٣١٤٠٣ - مَكْلُوْث [○] *Triquêtre (F).*
نمت تعريفي يطلق في علم النبات على كل سطح مستدير
تلوه ثلاث زوايا ناشرة تتخللها ثلاث زوايا غائرة .

٣١٤٠٤ - مَحَاة [○] *Vitellogène (F). Vitellogen (E).*
محاح او محاحة نمت تعريفي يطلق في علم الفيزيولوجية
على غنية تنشأ منها الخلايا المحية المزودة بالمواد
الغذائية عند المنطقات والمنطقات .

الصباح الى الغروب لانها تصرح في الليل سمياً وراء الزاد
| اشهر اجناسها للآجاية .

٣١٣٩٣ - لَحَازَةٌ [○] *Cuterebra (S) Cutérébre (F).*
جنس حشرات من رتبة ثوات الجناحين وفصيلة
الحزازيات . انواعها المعروفة نحو ٢٠ منتشرة في بعض
اقطار العالم اعخصها امريكة الجنوبية والشرق الاقصى |
اجسامها مكرنة ، شبه اسطوانية الشكل . رؤوسها وعيونها
ناشزة . ازيتها نحيلة وتصيرة . اعظامها فسحة . اثوابها
ملونة ، مجذعة الكوسل والبطون | انائها تمتع الممكن على
جلود معظم الحيوانات الوحشية والداجنة فينقب عن
يرقات دقيقة تنقب جلد المائل حيث تعيش كامل طورها
البرقي . طور الاكمال ينقضي في التربة وينتهي بظهور
الحشرة جميلةة .

٣١٣٩٤ - لَحَازِيَّات [○] *Cuterebridae (S). Cutérébrides (F). Cuterebridae (E)*
فصيلة حشرات من رتبة ثوات الجناحين قصيرات
القولن . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٦٠ تألف الحراج
والغابات والمراعي . معظمها امريكي المهد وبعضها
اسوي | اجسامها صغيرة مكرنة . رؤوسها معتدلة
الضخامة ، ناشزة . عيونها كبيرة . قرونها الاستشعارية
قصيرة ونحيلة . اعظامها صغيرة القد ، فسحة . اثوابها
مجزعة | انائها تمتع الممكن على جلود الحيوانات البرية
والاعلمة فينقب عن يرقات صغيرة ، دقيقة تنقب في جلد
المائل فتنقب له قروح وحامل وتبقى حتى يحين زمن
الاكمال فتخرج عوائلها الى التربة حيث تتحول الى
حشرة جميلةة | اشهر اجناسها اللحازة .

٣١٣٩٥ - لَحَاسَةٌ [○] *Gracilaria, Caloptilis (S). Gracilire (F)*
جنس حشرات فراشية من حرشفيات الأجنحة وفصيلة
اللاحسات . انواعها المعروفة نحو ٤٠ اعطائها معظم
اقاليم البالد المعتدلة الحرارة | اجسامها صغيرة نحيلة
تطول من ٤ الى ٦ مم . سبطها تتراوح من ١٠ الى ١٤
مم . قرونها الاستشعارية خيطية مستطيلة . مرافها
وملاسها نشطة . رواشها جميلة التخضيب الزاهي ،
مستعرضة التهذيب المتحاري | اساريها تعيش على اوراق
الاشجار العائقة اعخصها اللبك والحوور والزيزنون
والنولا .

٣١٣٩٦ - لَحَاسِيَّات [○] *Gracilariidae (S). Gracilariés (F).*
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الأجنحة . اجناسها
وانواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها معظم مناطق
البالد المعتدلة الحرارة | اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة
الزباني الصمغية الشكل ، مهابة الرواشن الجميلة
التخضيب . تتشبه رؤوسها المزوانية الشكل ومرافها
النشطة وبلاسها اللدكية القوية | اساريها تعيش على
اوراق الاشجار النفضية اعخصها الحرجية والتزيينية |
اشهر اجناسها للآسة .

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الفرغيات. انواعها المعروفة عديدة اعطانها بحار البلاد الحارة ااجسامها مستعرضة، مبطلة، تطول من ١٥ الى ٢٥ سم. رؤوسها صغيرة. عيونها مستديرة، جاحظة. اختطافها ناشزة الفك الاسفل الزاوية فكية اللون يعلوها تعصب مخروص اسود. زعانفها الظهرية والشرجية شائكة. زعانفها الذيلية غارقة لاجسامها مأكولة.

Ginkgoles (F)

٣١٤١٣ - مَكَاثِمَة

اطلب جينكوات.

Bathomètre, Bathymètre (F).

Bathometer, Bathyrometer (E).

٣١٤١٤ - مَقْيَاح

المقياس جهاز يتركز على التثقل النوعي يستعمل في سبر اغوار البحار.

Syngamie (F). Syngamy (E).

٣١٤١٥ - مَكَاثِمَة

المكاثمة في علم النبات هي اتحاد الاشجار في التناسل اللقي.

Autochtonie (F).

٣١٤١٦ - مَكُون

راجع تيك.

Solenodon (S). Solénodon (F).

٣١٤١٧ - مَكِيس

Solenodon (E).

جنس حيوان لبون من فصيلة المَكِيسَات. له نوعان يعيشان في جزر الانتيل. والمكيس هو اسمه في تلك البلاد | جسمه يطول نحو ٦٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٢٥ سم. شكله شكل الجوز إلا انه اسفلي الرأس عري الذنب | لسانه الحياقي فري. يسرح في الليل، قوته الحشرات والديدان والزحافات الصغيرة وبعض الفئار البرية والجذور | لهما نوعان فهما مكيس الانتيل S. Cubanus (S) ومكيس كوبا S. Paradoxus (S). مكيس الانتيل كان كثير الوجود في جزيرة مايني الى حين انحطوا على الجزيرة بعض النحوس للقضاء على الاناعي نقضت على الاناعي والمكيس.

Enkyste (F). Encysté (E).

٣١٤١٨ - مَكِيس

المكيس، في علوم البيولوجية والطب والنبات، هو ما كان موجودا ضمن كيس.

Solenodontidae (S).

٣١٤١٩ - مَكِيسَات

Solénodontidae (F). Solenodontidae (E).

فصيلة حيوانات من الثدييات عمليات الممرغة ورتبة الحشرات. المعاصر منها الآن جنس واحد يدعى مكيس يفضل على نوعين مبهما جزر الانتيل الكبرى والصغرى.

Menotyphle (S).

٣١٤٢٠ - مِثْرِيَّات

Ménotyphles (F). Menotyphle (E).

مرتبة من الحشرات تتميز حيواناتها بوجود الممرغة

Endothermichté (F)

٣١٤٢٠ - مَحَاثِمَة

Endothermicity (E)

المحاشية، كيماء، هي امتصاص الحرارة الناتجة عن تفاعل بعض الاجسام أو العناصر.

Panspermie (F). Panspermy (E).

٣١٤٢١ - مَقْدَامَة

المقادمة، بيولوجيا، نظرية افتراضية تبحث عن اصل الحياة ومصدرها. ملخصها ان الحياة على الارض تعود الى جراثيم كونية انتقلت في الفضاء من بعض الكواكب | الثقافة العلمية الحديثة تنفي هذه النظرية ذلك لأن لشعة ما وراء البنفسجي التي تهب من الفضاء الخارجي لا تسمح بالحياة لأي جرثومة كانت.

Marattiaceae (S). Marattiaceae (F).

٣١٤٢٢ - مَرَاتِيَّات

Marattées (F). Marattiaceae (E).

فئة نباتات من مستورات الزهر الوعائية تنتمي الى الشرنبات. انواعها المعروفة عديدة، معظمها من متحجرات الازمنة الغابرة. اما المعاصر منها فنحو ٥٠ جميعها من ثبوت المناطق الحارة | سوقها قصيرة، بونصية الشكل، منتصبه. اوراقها ضخمة الارتكاز، تاجية الانتساب، كبيرة اللد، تطول من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. نصالها مستعرضة يقلب فيها التبريض الريشي ثم الكلي.

Cipolin (F). Cipolin (E).

٣١٤٢٨ - مَوْرِيَّير

حجر من الجص المتبلور تخترقه عروق من الطلق (ميك) مشتركة المركز. يستعمل استعمال الرخام وهو اصعب منه.

Tactisme (F). Tactism (E).

٣١٤٢٩ - مَوْسَاس

تفاعل أو ارتكاس الحاسة الحية من جراء تأثيرات مختلفة المصادر، كيماء، حرارية، كهربائية، الخ ... تأثيرات قد تكون جاذبة أو دافعة تدفع لاجابة او سلبية.

Thalloide (F). Thalloid (E).

٣١٤٣٠ - مَظْرِي

هو في النبات ما كان تركيبه وشكله كالشعر.

Crossoptérygiens (F). مَصْلَبَات الزَعَايِف

٣١٤٣١ - مَصْلَبَات الزَعَايِف

Crossopterygii (E).

فئة من الاسماك اللامعات يعود ظهورها الى الحقبة الديفونية. اجسامها مستطيلة الشكل تتميز زعانفها الموضعية والبطنية الشاذة عن القنوس المألوفة وذلك بانتشائها عند مؤخر الصدر والبطن، وبارتكازها على مادة حشوية ناصلة. زعانفها الذيلية مدببة ومصلبة | فصائلها واجنتها وانواعها المعروفة قليلة العدد، معظمها من متحجرات الحقبة الديفونية وما يليها. النوع الوحيد المعاصر والمعروف حتى الآن يدعى «لانيمره» وهو من عظم ارتشيل الكومور في المحيط الهندي. يعيش بين منطقتان الصحور وفي تجاويلها على اعماق يراوح غورها بين ٣٠٠ و ١٢٠٠ م.

Glyphisodon (S).

٣١٤٣٢ - مَقَادَة

Glyphisodon (F). Glyphisodon (E).



مَقَادَة



مَكِيس

- 31427 - **مُؤَزِّي** ، **إِنْجِدَايِي** (F) Méiotique (F)
Meiotic (E)
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالموزة أو الانقسام.
- 31428 - **نَاجِدٌ** (F) Propodite
اسم يطلق على الفصلة قبل الأخيرة من قوائم القفريات عشاريات الأرجل.
- 31429 - **نَاسِيعٌ** (F) Allométrique (F). Allometrie (E).
نعت تعريفي يطلق في علم البيولوجية على كل عضو يتميز بنوعة لا تتجم مع نوعة سائر الأعضاء الأخرى.
- 31430 - **نَيْبِثٌ** (F) Coccolithe.
النبيت جسم مجوهر من كربونات الكالسيوم مشبع بالمواد الصمغية يرسب في قاع البحر.
- 31431 - **نَيْلُ الْبُوعِ** (F) Hétérosporé (F). Heterosporous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات من مستورات الزهر الوعائية كمثقتة متباينة البوغ المختلف الشق.
- 31432 - **نَاسِجٌ** (F) Gamétangie (F). Gametangy (E).
الثانة طريقة انخصاب شائعة عند الفطور وبعض العتبات. قوامها التحام الثنائك الذكرية بالانثوية واتسامها بفتلتها وانخسابها.
- 31433 - **نَاسِجَةٌ** (F) Gamétange (F). Gametange (E).
النسج في علم النبات هي الخلية الأم أي أم الغامات عند النباتات الدنيا ومنها الفطور وبعض العتبات.
- 31434 - **نَسَاجٌ** (F) Histogène (F). Histogenous (E).
اسم يطلق على العناصر والمواد الحيوانية التي تتكون منها الأنسجة الحية.
- 31435 - **نَسَاجَةٌ** ، **هَيْسُوجِيَّةٌ** (F) Histogénèse, (F) Histogénese, Histogeny (E).
قسم من النسجة، علم الاجنة، يبحث في تكوين النسج الحية وفي تطورها.
- 31436 - **نَسَاجِيٌّ** (F) Histogénique (F). Histogenic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالنسجة.
- 31437 - **نُسُوعٌ** (F) Allométrie (F) Allometry (E).
خاصة جسمورية يتمتع بها عضو من الأعضاء فيسرع نشاط نوعته أو بانقاصها بالنسبة إلى سائر أعضاء الجسم. وهو ما يميز عنه بالنسج الإيجابي أو السلبي.
- 31438 - **نُسْبَةٌ** (F) Chète (F).
زائدة دقيقة إبرية الشكل تطلو زجان الحشرة في فصلته الأخيرة. يقال ان وظيفتها تماثل وظيفة الهلب الذي يعلو الفصل عند بعض الحشرات.
- والمرتفع المائي أو الحوضي. وهي تضم فصيلة الحجابيات وفصيلة الطوابيات.
- 31421 - **مُتَدَوِّلَةٌ** (F) Monedule (S) Monédule (F).
جنس حشرات قانصة من الحوريات وفصيلة الوراشيات. أنواعها المعروفة نحو 30 معظمها أمريكية المهد | أجسامها متوسطة القد أو كبيرة، قرينة الشبه بالزناوير. أنوارها ملونة تكثر فيها الصفرة المجذعة بالأسود أو الأسمر | تقيم أصفانها في محاجر تحتفرها في الأنزبة الرطبة على أعناق ترواح من 5 إلى 7 سم | قوتها ما تستطيع اقتناصه من حشرات انحصا الذباب والهوم ولا تصف عن العناكب والتحلل.
- 31422 - **مِيزُورُونٌ** (F) Mésozoaire (F).
راجع ناني الاوالي.
- 31423 - **مِيَكْرُو جَهْدِيَّةٌ** (F) Microénergétique (F). Microenergetic (E).
علم من علوم الفيزياء يبحث في يند (كوانتا) الطاقة أو الجهد.
- 31424 - **مِيَكْرُو فِيزِيَاءٌ** (F) Microphysique (F). Microphysics (E).
قسم من علوم الفيزياء يبحث في الذرة.
- 31425 - **مِيَمَارٌ** (F) Mymer (S) Mymer (F). Mymer (E).
جنس حشرات مغطاة من غشائيات الاجنحة وفصيلة الميماريات. أنواعها المعروفة قليلة لا تتجاوز السبعة منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة | أجسامها شديدة الصغر تطول نحو ٦ مم. تتميز بأجنحتها المتباينة الشكل والحجم، الأمامية منها مجدافية مهيبة الأطراف، الخلفية ضيقة، مجدافية الشكل، عاصمة التزنين. زباني ذكورها مخيطية، زباني انثاهي صولجانية | جميع أنواعها مغطاة تعيش على مكن الحشرات المختلفة الفصائل.
- 31426 - **مِيَمَارِيَّاتٌ** (F) Mymeridae (S). Mymaridés (F) Mymeridae (E).
فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المنصورة. أجسامها وأنواعها المعروفة قليلة العدد أعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة | أجسامها شديدة الصغر تطول من ٥.٥ إلى ٦.٨ مم. رؤوسها مستعرضة، مقطوعة الاقنية. قرونها الاستشعارية مستطيلة، عديدة الفصل، من ٨ إلى ١٣. زين الاناث صولجانية الأطراف. أعناقها دقيقة. صغورها شبه بيضية، نصوصها انبوبية، مستطيلة عند معظم الأنواع. بطونها شبه مردنية. أجنحتها الامامية مجدافية الشكل، مهيبة الأطراف، مستطيلة الاهداب. أجنحتها الخلفية مجدافية، ضيقة. قوامها مستطيلة | جميعها مغطاة تعيش على مكن الحشرات من مختلف الفصائل والرتب. ومنها التي تفوص في طلب مكن الحشرات المائية | يرقاتها مرقاة وعاصمة الرؤوس والمنافذ القوية، تتنذى بالمتنازع | أشهر أجناسها واعرضها الميمار.

جنس حشرات من الحمويات وفصيلة الهلكتوسيات. أنواعه المعروفة نحو ١٣٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة حتى في جبالها | أجسامها مستطيلة الشكل، متوسطة القد أو صغيرة. ذكورها امير قفًا من أنثاه. أوابها قليلة التباين بين الأنواع، تكثر فيها الشهية والشحمة والتزوير البطني بالأصفر أو الأطح أو الأسمر | جميعها تصنف في محاجر تحفرها في التربة. قوتها رحيق الأزهار وطلما | أشهر أنواعه الهلكتوس السداسي الزناتير H. sexcinctus. أتوبه إلى السمرة السوداء العواج، زناتيره البطنية طحلاء اللون، ثلاثة الأزواج.

٣١٤٤٨ - هَلِكُوسِيَّاتٌ (F) Helictidae (S)

فصيلة حشرات من الحمويات ورتبة غشائيات الأجنحة. أجناسها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع أصقاع البلاد المعتدلة الحرارة | أجسامها متوسطة القد أو صغيرة. ذكورها اغلظ من أنثاه وأطول منها. قوتها رحيق الأزهار وطلما | تقيم أصفانها في محاجر تحفرها في التربة | أشهر أجناسها الهلكتوس.

٣١٤٤٩ - هَلِكُونِيَّاتٌ (F) Heliconiidae (S)

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الأجنحة. أجناسها وأنواعها المعروفة نحو ١٦٠ جميعها من عظم أمريكا الجنوبية | أجسامها دقيقة مستطيلة أو معتدلة الطول. روافدها كبيرة، مستعيرة الأطراف، جميلة الألوان الزاهية والزخرفة المنسقة | معظم أنواعها يفرز عند الدفاع عن النفس مادة سائلة صفراء اللون كريهة الرائحة | أسارىها تعيش على أوراق النبات | أشهر أجناسها الهلكتونوس.

٣١٤٥٠ - هَلِكُونِيُوسٌ (F) Heliconius (S)

جنس حشرات من حرشفيات الأجنحة وفصيلة الهلكتونيات. أنواعه المعروفة نحو ٩٠ أسطنتها أمريكا الجنوبية | أجسامها دقيقة تطول من ٢٢ إلى ٢٨ مم. بسطتها تراوح من ٣٤ إلى ٤٢ مم. رؤوسها شبه مكررة. عيونها بارزة. قرونها الاستشعارية ثلاثية الفصل. مناظفها معتدلة الطول ثلاثية العقل. أجنحتها متباينة الأشكال والحجوم. فوائدها الخفيفة مستفصحة الانخاد. أوابها ملوثة | يكثر وجودها في المناطق والأهوار وعلى ضفاف مجاري الماء. جميعها قانصة تسرح على سطح الماء. قوتها الهوام وكل ما استطاعت إليه سبيلا من حشرات.

٣١٤٥١ - هَلَوَايَيْتٌ (F) Halloya (S)

تسليكات الألوينيوم الطبيعي المشع.

٣١٤٥٢ - هُورِيٌ (F) Lacustra (S)

نمت تعريفي يطلق على كل حيوان أو نبات يعيش في الأهوار والبحيرات والغدران | ويطلق حصلياً على تكوين خاص أو تربة خاصة فتقول كوين هوري وتربة هورية | ويطلق أركيولوجياً على الساسكر والقرى التي كانت تشاد فوق الماء على ركائز وأوتاد مفروزة في اللقاع

٣١٤٣٩ - نُشْ (F) Bipertition (E)

النش في علم النبات هو الانقسام إلى شطرين متساويين.

٣١٤٤٠ - نُشُوءٌ ذَاكِيٌ (F) Abiogenesis (E)

النشوء الذائي نظرية بيولوجية قديمة كانت تصمم بنشوء الحياة من مواد طبيعية خام.

٣١٤٤١ - نَقْلَةٌ (F) Pénépleine (F)

نقعة ج نقاف اسم يطلق على الجبال القديمة العهد التي قُضت عليها العوامل الأرضية السحيقة فاصبحت منبسطة كالسهول | أشهر هذه النقاف ورحبها أنصاعاً سهل فنندة في شمالي أروية ونجد البحيرات الكبرى في كندا.

٣١٤٤٢ - نُكَلَةٌ (F) Nucleus (E)

اسم يطلق، في علم التشريح، على نواة الحجرة الحيوانية أو الخلية النباتية.

٣١٤٤٣ - نُيَقِيٌ (F) Intandale (F)

اسم يطلق على كُتة الجلد التي تلحف الأراضي القطبية | النبيق الذي يلحف بعض أجزاء الغرولند يقدر بنحو مليون كيلومتر مربع | النبايق التي تلحف أراضي القطب الجنوبي تقدر بملايين الكيلومترات المربعة | أما سماكة هذه النبايق فتتراوح من متر واحد إلى ٣٠٠٠ متر وأكثر.

٣١٤٤٤ - هُورِيُوسٌ (F) Velle (S)

جنس حشرات قانصة من نصفيات الأجنحة وفصيلة الهوروسيات. أنواعها المعروفة نحو ١٥ منتشرة في جميع انظار العالم | أجسامها صغيرة تطول من ٧ إلى ٩ مم. رؤوسها مخروطية الشكل، قليلة البروز. عيونها صغيرة ناشزة. قرونها الاستشعارية ثلاثية الفصل. مناظفها معتدلة الطول ثلاثية العقل. أجنحتها متباينة الأشكال والحجوم. فوائدها الخفيفة مستفصحة الانخاد. أوابها ملوثة | يكثر وجودها في المناطق والأهوار وعلى ضفاف مجاري الماء. جميعها قانصة تسرح على سطح الماء. قوتها الهوام وكل ما استطاعت إليه سبيلا من حشرات.

٣١٤٤٥ - هُورِيُوسِيَّاتٌ (F) Vellidae (S)

فصيلة حشرات من رتبة نصفيات الأجنحة المختلفة. أجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة الحد منتشرة في جميع أصقاع العالم | تألف المناقع ومجاري الماء وضفاف الأنهر. تسرح على سطح الماء برشاقة الشايرات. قوتها الهوام والحشرات الصغيرة | أشهر أجناسها الهوروسية.

٣١٤٤٦ - هِرْسِيْنِيٌ (F) Hercynien (E)

نمت تعريفي أو اسم يطلق على أقدم التضخعات التي حصلت في القشرة الأرضية وما نجم عنها من سلاسل جبلية.

٣١٤٤٧ - هَلِكُوسٌ (F) Helictus (S)

Enzoique (F). Enzoic (E). **٣١٤٦٠ - يُحْطُورِي**
نعت تعريفي يطلق على كل موقع أو ارض تكثر فيها
الاحافير الحيوانية أو النباتية.

Ammomenes (S) **٣١٤٦١ - يُرْمَل**
Ammomane (F).

جنس طير من الجوائم مخروطيات المنابر ونصيلة
الْقُرْبَات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها الصحارى
والبلاد الحارة. تألف الواحات والمواقع المبعثرة الاشجار
وبعضها يرغب في البراري القاحلة اجسامها شبيهة باجسام
الْقُرْب، تطول من ١٤ الى ١٨ سم. مناقيرها مخروطية ذرية.
اجتمعتها مستلة الطول ذلقة. اذناها فارقة. اتواها الى
الصهبة المنمشة والمرفوشة بالاطحل والاسمر || ملجئها
الحياتي جماعي. جميعها من الضواري التي تجوب البلاد
في طلب الرزق. قوتها الحشرات وبعض البزور والثمار ||
افواجها متوسّطة العدد إلا في زمن القطاع حيث يتألف
السرب من عدة مئات || اناها تدن في التربة بين الاعشاب
المتراكبة. حضنتها تراوح من ٣ الى ٥ بيضات. ترعيها
بستمّر نحو ١٤ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر || اعرف
انواعه واشهرها الهرملة الاليتة

Am. dinctura (S). Am. élégante (F)
اعطائها تمتد من الصحراء الكبرى الى جبال الاطلس،
تجوبها كل عام.

Casae (S). Casque (F). **٣١٤٦٢ - يَلِكَة**
جنس حيوانات بحرية من الرخويات محبات الارجل
مسطحات الخياشيم ونصيلة الخنوثات. انواعها المعروفة
عديدة، معظمها من متحجرات الاراضي التالكة،
الماصرة منها الآن نحو ٥٠ متشرة في بعض بحار البلاد
الحارة والمعتلة الحرارة. تتميز بشحانة اصدانها الخنوتية
الشكل المتراكبة الاطانات والزخارف والالوان.

Lilleles (F). **٣١٤٦٣ - يُسْلِيَات**
النباتات مجسومة نباتية من وحدات الفلقة تضم خمس
فضائل وهي الزنقيات والفرماريات والوعلاتيات
والقوسريات والزغليات.

Corynantha Yohimba, **٣١٤٦٤ - يُوَهْبِيَّة**
Pausinystalia Yohimba (S).
Yohimbé (F). Yohimbehe (E).

شجرة حرجية طيبة، كبيرة الحجم، دائمة، من فصيلة
الفويات. منبتها بعض مناطق البلاد الاستوائية اخصها
الكامرون والفاون والكونغو || ساقها متضبة، رفيعة، عتية
الاغصان. اوراقها معتقة، متقابلة، اهليلجية النصال.
ازهارها عكولي التنجيم، طرفي الارتكاز. ثمارها جراء
شبه بيضيه الشكل تغلف العديد من البزور الصغيرة ||
يستخرج من لحاء ساقها واغصانها مادة اليوهيمين المشهورة
بخواصها الشافية.

Lépidodendrées (F). **٣١٤٥٣ - هَيْسُويَات**

مجسومة نباتات متحجرة قريبة الشبه بالخرنبات.
اجناسها المحققة متوسّطة العدد جميعها من نوات الحقيقة
البفونية والكريونية العائدة الى الاباج الاول || تميزت هذه
النباتات بفضامة سوتها المستطيلة اذ كان قطرها يراوح
من ٨٠ الى ١٢٠ سم. وارتفاعها من ١٠ الى ١٥ متراً.

Achlemydée (F) **٣١٤٥٤ - وَالِيَّة**
اسم يطلق على كل زهرة عادمة التويج والكأس. جهازها
وزيم وعطيل.

Monodelphes (F). **٣١٤٥٥ - وَحِيدَات الرِّحْم**
Monodelphia (E).

اسم يطلق على جميع الثنيات التي تضع اولادها كاملة
الخلقة بخلاف نوات الرحين او الجرانيات التي تنقل
اولادها من الرحم الباطني الى الجيب الخارجي المعروف
ايضا بالجواب حيث تقيم فيه حتى اكتمال فالطام.

Bembecidae (S). **٣١٤٥٦ - وَرَّاهِيَّات**
Bembécides (F).

فصيلة حشرات من الحويّات ورتبة غشائيات الاجنحة
المختصرة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة متشرة في
جميع اصقاع العالم خاصة في البلاد الحارة والمعتلة
الحرارة || اجسامها متباينة الحجم، منها الصغيرة
والوسطى والكبيرة، جميعها قريبة الشبه بالثعل
والزناير. اتواها ملونة بكثر فيها الاصفر المجزع بالاسود
|| جميعها تصنّف في التربة. مهاجرها رداء فسيحة تغور
نحو ١٠ سم. مداخلها افاق انبوبية الشكل منحرفة نحو
السطح. اصقاعها متراكبة المتخاريب المصنّسة المسطوح ||
قوتها الذباب والهام والصغير من نوات الجناحين
تقتنصها فتتغذّر وتقلها الى اصقاعها زائدة لها وليرقاتها ||
اعرف اجناسها واشهرها الورّاسة والمنقولة.

Achlemyde (F). **٣١٤٥٧ - وَلِيَّت**
نعت تعريفي يطلق على كل نبات عتي من نوات الالياف
المضنونة بخلاف واحد بدلاً من غلافين.

Ytterbium (F). Ytterbium (E). **٣١٤٥٨ - يَتْرَبِيُوم**
عنصر معدني بسيط. رمزه (Yb) وزنه الاتومي ١٧٣,٠٤
رقمه الاتومي ٧٠ يستخلص من الاثربة الاربية. اول من
اكتشفه ماريتاك عام ١٨٧٨.

Yttrium (F). Yttrium (E). **٣١٤٥٩ - يَتْرَبِيُوم**
عنصر معدني بسيط. رمزه (Y) وزنه الاتومي ٨٨,٩٢
رقمه الاتومي ٣٩ اول من اكتشفه غاندولان عام ١٧٩٤.



يرمل

*L'Encyclopédie des Sciences de la Nature
se compose de quatre volumes, dont le dernier
comprend les lexiques des termes
allemands,
anglais,
français,
grecs,
italiens et
latins.*

Edouard Ghaleb
Ingénieur agronome

ENCYCLOPEDIE DES SCIENCES DE LA NATURE

ENCYCLOPEDIA OF NATURAL SCIENCES

Agriculture, Botanique, Zoologie, Ornithologie,
Ichtyologie, Entomologie, Parasitologie, Bactériologie,
Microbiologie, Affections animales et végétales.

Termes techniques:

(Physique, Chimie, Mathématiques, Géologie, Astronomie, Droit)

Volume III

2ème ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE

**ENCYCLOPEDIE DES
SCIENCES DE LA NATURE**

**ENCYCLOPEDIA
OF NATURAL SCIENCES**



Dar el-Machreq sarl
Boite Postale 946 Beyrouth, Liban

Distribution :



Librairie Orientale - Boite Postale 1986
Beyrouth, Liban



ARTICLES ET INDEX
en arabe, anglais, français
allemand, italien, latin et grec

Edouard Ghaleb **ENCYCLOPEDIE DES
SCIENCES DE LA NATURE**

Agriculture • Botanique • Zoologie • Géologie

**ENCYCLOPEDIA
OF NATURAL SCIENCES**

2420 pages • 31464 articles
6962 illustrations • 24 planches en couleurs

Agriculture • Botany • Zoology • Geology



DAR EL-MACHREQ
BEYROUTH